
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(KFAS)

مركز تعريب العلوم الصحية
(ACMLS)



المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية



(الحرف C)

إنجليزي - عربي



إعداد

د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف

د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

الطبعة الأولى

الكويت - 2010

المعجـم المفســر
للطــب والعلــوم الصحيــة

Illustrated Dictionary
for Medical and Health Science

مركز تعريب العلوم الصحية

(ACMLS)

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

(KFAS)

المعجم المفسر
للطب والعلوم الصحية

إنجليزي - عربي

إعداد

د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف

د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

الطبعة الأولى
2010

610.3 مـركـز تعـريـب العلـوم الصـحيـة الشراح الكويت
فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر

المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية (C)
مركز تعريب العلوم الصحية . - ط 1.- الكويت : المركز، 2010 م
896 ص: رسوم، صور؛ 24x17 سم.
ردمك: 978-99966-11-01-8
1.الطب - معاجم أ. العنوان
ب. مركز تعريب العلوم الصحية. الكويت (ناشر) ج. السلسلة

رقم الإيداع: 2010/362
ردمك : ISBN: 978-99966-11-01-8

يرحب مركز تعريب العلوم الصحية بتلقي الاستفسارات والاقتراحات حول المصطلحات وتفسيراتها الواردة في هذا المعجم إلى قسم التأليف والترجمة بمركز تعريب العلوم الصحية على البريد الإلكتروني **acmls@acmls.org**.

التحـريـر

د. إيمـان حسـين سـيد ***د. هبـة حـافـظ إبراهيـم***

الإخراج
مركز تعريب العلوم الصحية

الطبعة الأولى 2010

ص.ب 5225 الصفاة ـ رمز بريدي 13053 ـ دولة الكويت
هاتف : 25338610/1/2 (965)+ فاكس : 25338618/9 (965)+
http:// www.acmls.org

بسم الله الرحمن الرحيم

مركز تعريب العلوم الصحية

منظمة عربية تتبع مجلس وزراء الصحة العرب، ومقرها الدائم دولة الكويت وتهدف إلى:

- توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
- تبادل الثقافة والمعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في المجالات الصحية والطبية.
- دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية في مجالات العلوم الصحية.
- إصدار الدوريات والمطبوعات والأدوات الأساسية لبنية المعلومات الطبية العربية في الوطن العربي.
- تجميع الإنتاج الفكري الطبي العربي وحصره وتنظيمه وإنشاء قاعدة معلومات متطورة لهذا الإنتاج.
- ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.
- وضع المناهج الطبية باللغة العربية للاستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم الطبية والصحية.

ويتكون المركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر والمعلومات، كما يقوم المركز بوضع الخطط المتكاملة والمرنة للتأليف والترجمة في المجالات الطبية شاملة المصطلحات والمطبوعات الأساسية والقواميس، والموسوعات والأدلة والمسوحات الضرورية لبنية المعلومات الطبية العربية، فضلاً عن إعداد المناهج الطبية وتقديم خدمات المعلومات الأساسية للإنتاج الفكري الطبي العربي.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

لقد تم إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد رحمه الله يوم كان ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء، وقد رحب القطاع الاقتصادي بدعوة سموه وسارعت الشركات المساهمة العامة والمقفلة إلى الاستجابة لتلك الدعوة. وفي اجتماع عقد بهذا الشأن في غرفة تجارة وصناعة الكويت ـ وذلك في منتصف عام 1976 ـ وافق الحاضرون على مبادرة سموه، وصدر بعد ذلك سند إنشاء المؤسسة بمرسوم أميري بتاريخ 1976/12/12.

ويشرف على المؤسسة مجلس إدارة يرأسه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله، ويتألف المجلس من ستة أعضاء تختارهم الشركات المساهمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى إدارة المؤسسة مدير عام مسؤول أمام مجلس إدارتها، ويعاونه مديرو الإدارات، وعدد من المستشارين والخبراء الذين يعملون في المؤسسة بعض الوقت.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمؤسسة في دعم الأبحاث الأساسية والتطبيقية من خلال منح تقدمها في مجالات العلوم الطبيعية والهندسية والصحية والغذائية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وكذلك تقديم المنح لتشجيع ودعم الأبحاث المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، وأعمال التطوير والتجارب ذات الصلة بالاقتصاد الكويتي، كما تقدم المنح والجوائز والمكافآت لدعم التطور الفكري في الكويت والأقطار العربية الأخرى. هذا وتعمل المؤسسة على تدريب المواطنين الكويتيين من خلال منحهم بعثات وزمالات للدراسة والتدريب، كما تشارك في تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية.وتقوم المؤسسة أيضاً بتشجيع ودعم وتنمية مشاريع البحوث والبرامج العلمية المشتركة بين الهيئات العلمية الكويتية من جهة والعربية والدولية من جهة أخرى، إضافة إلى ذلك تسعى المؤسسة جاهدة إلى دعم روح التكافل بين الأجيال في الكويت.

ويمثل نشر الكتب المؤلفة والمترجمة والموسوعات العلمية أحد الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه المؤسسة. لذا رسمت الأهداف التالية المنشود تحقيقها:

1 ـ دعم المكتبة العربية بالمراجع المتخصصة والدراسات الجادة والكتابات الهادفة العربية منها والمترجمة.

2 ـ العمل على إحياء اللغة العربية عن طريق نشر المؤلفات العلمية في المجالات التخصصية.

3 ـ ربط التراث بمنجزات العصر في العلوم التقنية والتربوية.

4 ـ تيسير سبل الإطلاع والنشر وتوفير المراجع والنشرات، وإعداد المعاجم والقواميس العلمية والمخطوطات لدفع عجلة نقل العلوم والتقنية قدماً.

5 ـ مساندة حركة التعريب وتوحيد المصطلح العلمي العربي في الوطن العربي.

6 ـ تمكين القارئ العربي للاستفادة من الكتب في المجالات المختلفة التربوية والكيميائية والجيولوجية والنبات والكائنات الدقيقة والرياضيات والفيزياء وغيرها باللغة العربية.

7 ـ تشجيع استخدام اللغة العربية لتصبح لغة علمية عن طريق توحيد المصطلح العلمي العربي واستخدام مصطلحات عربية جديدة مقابل المصطلحات المستحدثة في مجالات العلوم المختلفة.

8 ـ نشر الكتب والموسوعات الصادرة عن المؤسسة وتقديمها إلى القارئ بعد تحكيمها وتحديث موادها العلمية في طباعتها الجديدة.

المحتـــويـــات

المقـــدّمـــة

الدكـتـور
عبدالرحمن عبدالله العوضي
الأمين العام
لمركز تعريب العلوم الصحية

لقد كرمنا الله بأن جعل اللغة العربية لغة القرآن الكريم حفظها لنا سبحانه بحفظه للقرآن فقال تعالى: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾** سورة الحجر، كما اشتملت هذه اللغة ألفاظ ومعاني الحديث الشريف والشريعة السمحاء. ومع ذلك فإننا دون سائر الأمم مازلنا نهمل لغتنا ونحارب التمسك بها، ونلجأ لتعليم أبنائنا باللغة الأجنبية في مؤسسات التعليم، وأحياناً نتحدث في منازلنا مع أبنائنا بلغة أخرى أو بلغة مهجّنة من العربية والأجنبية.

وإنه لمن العجب أن نجد بعض الدول محدودة القدرة والإمكانات تهتم بلغتها، وتُدرّس بها مختلف المعارف ومنها العلوم الطبية والصحية. والكثير من دول العالم يضع القوانين من أجل التعامل مع لغاتها وعدم إحلالها بلغات أخرى في التراسل والتعليم والترجمة والتأليف وغيرها، انطلاقاً من اعتزازها بلغاتها الوطنية، وعلى أساس أن اللغة مرتبطة بالأمة والهوية والوجود والتفكير.. لكن الذي نشاهده في عالمنا العربي واقعاً يختلف عن واقع اللغات في العالم، فنحن مازلنا نُدرّس أبناءنا في المؤسسات التعليمية، وخاصة كليات الطب مختلف المعارف باللغات الأجنبية، بل إن اللغة الأجنبية أصبحت لغة التخاطب والتراسل والنقل والنشر في الكثير من أقطارنا العربية.

الدارس لهذا الواقع في أقطارنا العربية يستشعر مخاطر التعليم بغير العربية والتي من أبرزها خلق شعور الغربة والضياع عند المتلقي، وتطبيع فكره وثقافته بطابع اللغة الأجنبية، وبمدها الثقافي، وتأثيراتها الذهنية والنفسية التي لا يستطيع الطالب في المدرسة، أو الجامعة أن يتخلص منها أو يقاومها حتى لو حاول ذلك. هذا في الوقت الذي ندرك تماماً أن نظريات التعليم والدراسات النفسية والاجتماعية تؤكد مخاطر التعليم بغير اللغة الأم، وخاصة في المراحل الأولى من التعليم.

منظمة اليونسكو أيضاً اكتشفت مشكلات التعليم بغير اللغات الوطنية، فأصدرت بياناً تؤكد فيه أهمية استخدام اللغة الوطنية في التعليم إلى أقصى مرحلة ممكنة. فأين نحن من هذه التوصيات الدولية ونتائج الدراسات البحثية في مجالات التعليم واللغة والفكر والمعرفة، خصوصاً وأن العالم يعيش عصراً تتنافس فيه اللغات، وتتوغل الثقافات بسلبياتها وإيجابياتها، وتسعى الأمم لحفظ لغاتها من خلال إصدارها للتشريعات المُلزِمة باستعمالات اللغات الوطنية في التعليم والتراسل والثقافة وغيرها.

واقعنا اللغوي هذا لا يسعدنا كثيراً ما دمنا نُعلِّم أبناءنا بلغة أجنبية، ونُقدّم الحوافز والوظائف في أسبقية مكشوفة تحدد أن كل من يتخرج من الجامعات الأجنبية له الأفضلية على غيره من خريجي الجامعات العربية. لذلك ليس بمستغرب أن يتعلم أبناؤنا باللغة الأجنبية في أكثر من (90٪) من كليات الطب العربية التي تُعلِّم أو تُدرّس بالأجنبية، وينطبق هذا الواقع على كليات العلوم والاقتصاد والإدارة والمعلومات والصناعة والتكنولوجيا.

وللتعليم الطبي بلغة أجنبية في الكليات العربية مساوئ لا حصر لها، أبرزها أن المتخرج من كلية الطب العربية، لا يمتلك المهارات الأساسية لا في اللغة العربية ولا في اللغة الأجنبية، خصوصاً وأن المعلم يُدرّس أحياناً بلغتين وعلى نحوٍ مهجّن، وكثيراً ما سمعنا محاضرات أُلقيت في قاعات جامعات عربية مرموقة بلغةٍ مهّجنة اختلطت فيها العامية المحلية بالمصطلحات الأجنبية اختلاطاً عجيباً.

المعارضون لتعريب العلوم الصحية ـ مع الأسف ـ يركزون على محاربة التعريب من منطلق أن المصطلحات الطبية مصطلحات أجنبية لا يمكن إيجاد مقابلات لها، أو خلق مصطلحات طبية عربية حديثة أسوة بما كان يقوم به العلماء العرب والمسلمون في الحضارة العربية. فليس لدى هؤلاء حجة ضد التعريب إلا الاستشهاد بالمؤسسات المصطلحية الأجنبية التي تتعامل مع آلاف المصطلحات، وتهتم بمسائل تطويرها اشتقاقاً ونحتاً ووصفاً لدلالاتها في إطار القياسات المصطلحية والمنهجية العلمية. لكنهم يتعمدون تجاهل أصل مشكلة المصطلح العربي على أنه نابع من لامبالاتنا أو إهمالنا للمصطلحية، وأن الأمر لا علاقة له باللغة العربية الثرية بالمصطلحات والمتمكنة من استيعاب كل شروحها ومبادئها.

ما من شك أن المصطلحات الطبية جزء من اللغة رغم أنها تُشكِل لغة خاصة بها، وفهماً قد يختلف المصطلحيون على أنماطه وأشكاله وتبايناته وتعقيدات القبول العام لتوحيد كل المصطلحات. وهذه الظاهرة لها أسباب كثيرة منها التحيز للاختصاص، وتباين الخلفيات الثقافية والاجتماعية والفلسفية والمنطقية وغيرها، لكن البعد اللغوي للمصطلح هو أكثر العوامل تأثيراً، وبالتالي فالمصطلح يعتمد عليه أكثر من اعتماده على الأبعاد الأخرى. وهذا البعد اللغوي ساهم في تذليل الكثير من العقبات التي واجهها المركز، في سعيه المتواصل لإنجاز مشروع المعجم المفسر الذي هو بمثابة موسوعة طبية، ومرجع يضم المصطلحات وتفسيراتها الطبية مدعّمة بالأشكال والصور ووسائل الإيضاح الضرورية التي تعُين على الفهم والمتابعة.

والدليل على ذلك ما قام به الأطباء العرب منذ الستينيات بوضع معجم طبي موحد، تطور مع مرور الزمن إلى مجلد يحوي آلاف المصطلحات الموحدة الطبية من كل التخصصات وباللغة العربية. بل إن هذا المعجم الطبي الموحد ظل ومازال معجماً يعتمد عليه مركز تعريب العلوم الصحية بالكويت في كافة أعماله واستخدام مصطلحاته، وقد وضع المركز لها شروحات باللغة العربية بدءاً بالحرف (A) ثم الحرف (B) وبعده الحرف (C) الذي هو بين أيدينا الآن وفي طبعته الأولى. فإنجاز الحرف (C) من أحرف المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية هو مواصلة للعمل المستمر لاستكمال بقية الحروف، وحين الانتهاء من شروحات كامل المعجم المفسر فإننا أمام إنجاز كبير لتفسيرات طبية لأكثر من (15) ألف مصطلح طبي مطبوع ورقياً ومخزن إلكترونياً.

نتمنى أن يكون هذا العمل خطوة تحفّز المزيد من الأعمال والمُنجزات التي تنمي وتصون اللغة العربية، وتجعلها أكثر صلابة ومنافسة أمام صلابة ومزاحمة اللغات الأخرى، وخاصة اتساع تأثيراتها الفكرية واللغوية والثقافية على العالم. إن أهمية اللغة تنبع من كون اللغة كيان ثقافي وحضاري ممتد، يحتاج دائماً إلى رعاية وتغذية وإسهامات لا تتوقف فقط على الأفراد، وإنما أيضاً الحكومات والمؤسسات والهيئات المختصة على امتداد وطننا العربي. فالعمل المعجمي يحتاج إلى تنظيم وتنسيق ودعم مادي وبشري لكي لا يكون التشتت الحالي لعدد كبير من الجهات التي تجتهد في وضع المصطلحات في المجالات المعرفية المتنوعة، لكنها في الغالب مصطلحات مكررة، وبعضها غير مقبولة علمياً لأنها لا تستند على منهجية ومبادئ توحيد المصطلحات، ولا على الأسس العلمية التي ينبغي أن تؤسس عليها.

ونحن في مركز تعريب العلوم الصحية يحدونا الأمل في أن يكون المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية (الحرف C) معيناً ومفيداً لكل طالب طب وطبيب، وباحث وكاتب ومترجم وناشر ومهتم بالعلوم الطبية والصحية، فلقد ساهم فيه نخبة من الأطباء العرب الذين أبدوا ملاحظاتهم على المصطلحات الموحدة، وقاموا بوضع الشروح بالاعتماد على مصادر متعددة. ولقد أُجريت تعديلات كثيرة على الشروح، ولم يكن العمل هيناً، ولا السير في طريقه ممهداً، فقد وفر المركز كل الأدوات الضرورية التي يتطلبها إنجاز العمل على النحو المطلوب. كما أن تعاون الأطباء وتقبلهم للعمل وحماسهم له من العوامل المهمة التي ساعدت على تحقيق خطة وإجراءات المركز في إنجاز الحرف (C) من المعجم الطبي.

لاشك أن أي عمل علمي لا يخلو من العقبات، لكن خبرة العاملين في المركز وعلى مدى سنوات طويلة في ميدان الترجمة والتأليف وبناء قواميس متخصصة، وتعاون الأطباء معه، وعلاقاته بمؤسسات البحث واللغة والترجمة في الوطن العربي، كلها عوامل ساعدت في تذليل هذه العقبات. إن هذا العمل المعجمي الطبي المفسر للحرف (C) الذي يتضمن أكثر من خمسة عشر ألف مصطلح يستحق الثناء، ولابد له من ملاحقة التطور الطبي، ومواكبة المتغيرات ومتابعة كل ما يجدّ في كل فترة من الزمن.

وختاماً لا يفوتني أن أشكر كل الأطباء الذين عملوا سنوات في وضع تفسيرات للمصطلحات الطبية، وكذلك الهيئات والمؤسسات المهتمة بالتعريب والثقافة والعلوم، وخاصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي وفرت نصف تكلفة دعم المشروع لاهتمامها بكل ما يطوّر ويثري الحياة الثقافية، ويعزز مكانة اللغة العربية في أقطارنا العربية. فالشكر والتقدير والثناء لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكذلك الشكر موصول لكافة العاملين بالمركز على جهودهم المتواصلة في إنجاز الحرف (C) من المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، فبارك الله في الجميع.

وعلى الله قصد السبيل ،،،

خطة وإجراءات العمل في المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية

الدكتور
يعقــوب أحمــد الشــراح
الأمين العام المساعد
لمركز تعريب العلوم الصحية

الحمد الله رب العالمين الذي جعل اختلاف ألسنة الناس آية من آياته الكبرى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد،

الحديث عن المصطلحات عامة، والمصطلح الطبي خاصة يحتاج إلى بحث مستفيض وسرد لجوانبه، انطلاقاً من أهميته في عالم تتعدد فيه اللغات وتتنافس من أجل المكانة والانتشار والسمو والتأثير. والمصطلح يتأثر باللغة والمعرفة والفهم، ناهيك عن تأثره بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية في أي مجتمع. ويزداد التأثير على المصطلح بدلالاته وألفاظه ونحته واشتقاقه وتراكيبه، وبمعدلات سرعة نمو المحيط اللغوي الذي يخضع له المصطلح عندما تتفجر المعرفة، وتحدث التغيرات السريعة في المفاهيم والأفكار والتحولات المتتالية في بنية العلم والتقنية «التكنولوجيا» ومطالب الناس.

لاشك أن المصطلح له دور أساسي وفاعل في تكوين المعرفة، وعندما تتعدد حقول المعرفة ويحدث لها التغيير تبعاً للأثر التاريخي والبحثي، فإن ذلك يعني أن المفهوم الذي ينطوي عليه شكل المصطلح يتعدد تبعاً لحقول المعرفة المختلفة، ونموها وتعقيداتها التي تتجاوز أحياناً حدود التفكير، وتؤدي إلى الاعتقاد بسلامة أو كفاية العلاقة بين المصطلح والمفهوم. لذلك فالعمل المصطلحي لا يخلو من التعقيدات التي تتصل بدرجة عالية بميدان البحث في الأصول المصطلحية للمفاهيم المعرفية، فيواجه المصطلحي أحياناً إشكالية ضبط حدود المصطلح، والغموض، والانقطاع، والتراجع عن الاعتماد بسبب التأثيرات الكثيرة التي يواجهها المصطلح، ومنها تشابك حقوله المعرفية وتداخلاتها، وخاصة المعارف أو التخصصات المجاورة والتي تغيّر من بنية المصطلح الشكلية والدلالية.

والمصطلح يتأثر أيضاً بالثقافة، أي أنماط التفكير والممارسات الفعلية والتحولات الاجتماعية والبيئية والأبعاد التاريخية والتراثية، وكذلك الإنجازات الإنسانية الحديثة. لذلك فالأطر الثقافية والحضارية تلعب دوراً مهماً في الدلالات المصطلحية، ليس فقط في أبعادها المحلية، وإنما أيضاً في علاقتها بالثقافات والحضارات الأخرى. هذا الواقع يجعل المصطلح ومفاهيمه خاضعاً للبيئة الثقافية وشروط حقل المعرفة، وأيضاً مواكبة الحاجات الأخرى.

إن تراكم المعرفة بذاته يؤدي إلى تعقيدات مصطلحية، منها عدم استقرار المفاهيم وتكاثرها، وإزالة ومحو بعضها، وظهور أخرى جديدة، وخلق مفردات ضرورية، وغيرها تشكّل عقبة أمام المصطلحيين ليس في الوصف والتحليل والاستقراء، وإنما في القدرة على التحليل واستخراج النتائج. ويبدو أن ذلك مرتبط بعدة أمور منها: المحاولات المخلة عند نقل المصطلح من ثقافة أجنبية إلى عربية دون مراعاة لخصائص بنية المصطلح الأصلية سواء في اللغة الأصلية أو اللغة المنقول إليها. كذلك انتزاع المصطلح الذي أنتجته ثقافة معينة ونقلها إلى ثقافة أخرى مختلفة، وإدخال دلالات حديثة عليه تجعله غريباً وشاذاً ولا يتناسب مع السياقات الثقافية للبيئة التي احتضنت هذا المصطلح الوافد.

لذلك فشحن المصطلح القديم بدلالة جديدة مغايرة لدلالته الأصلية، أو نقل المصطلح ذي دلالة محددة ضمن ثقافة ما إلى ثقافة أخرى يؤدي عادة إلى اختلال مصطلحي، وارتباك في فاعلية الإرسال الثقافي والتواصل والفهم والقبول. أكثر المشكلات التي تواجه العمل المصطلحي تلك التي تتجلى في مسائل لها علاقة بتعدد الثقافات واللهجات ومستوى التطور والتنمية في المجتمع. هناك بلاشك فوضى مصطلحية في عالمنا العربي التي مازالت تشكّل عقبة أساسية في تقدم العمل المصطلحي، ليس فقط في المجال الطبي وإنما تكاد تلامس كل الميادين المعرفية، وخاصة ميادين الاتصال والمعلومات، والصناعة وعلوم الفضاء والكون والبحار والإدارة والتجارة والاقتصاد، أي تلك المجالات المعرفية التي تتصف بمعدلات التغيير المصطلحي فيها عالية.. فالفوضى تتجلى في كثرة الخلافات المصطلحية، وعدم الاتفاق، والانسياق نحو العامية، وعدم المتابعة، والتمسك بالموروثات والاعتماد على المصطلح الأجنبي.

هذه الفوضى في الممارسات المصطلحية تؤدي أيضاً إلى عدم العمل بأبسط إجراءات المصطلح، وإجراءات المنهج، والمبادئ التي تقوم عليها، والاستمرار في

مقاومة التوحيد المصطلحي انطلاقاً من التباينات في اللهجات العربية، واتساع جغرافية العالم العربي، وتأثر سكانه بموروثات ثقافية أجنبية متباينة. وتحديداً يمكننا أن نشير باختصار إلى مجموعة من المؤثرات التي تساهم سلباً في تخلفنا المصطلحي، وإشاعة حالة الارتباك التي ترّسخ إهمالنا للمصطلح، واعتمادنا على المصطلحات الأجنبية في التعليم والبحث والدراسة، وربما في شتى مجالات الثقافة. هذه السلبيات أو إشكالات الممارسات المصطلحية تتجلى في الجوانب التالية:

* الغزو الثقافي وأفكار العولمة وتنامي الانفتاح على الخارج، خصوصاً في المجال التعليمي والتقني والاتصالي والمعلوماتي، رغم إيجابياته إلا أن مخاطره لم تؤخذ في الحسبان فكان جراء ذلك جعل التعليم العربي تعليماً يدرّس بلغة أجنبية وباستخدام مصطلحات أجنبية، تنقل المفاهيم وترسخها في نفوس الناشئة.

* تراجع وضآلة الإنتاج الفكري العربي في ميادين المعرفة ومنها الطب باللغة العربية، مما ساهم في عزوف المختصين المصطلحيين عن العمل في مجالاتهم لعدم حصولهم على المساندة والتعزيز والدعم والتشجيع، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى محاربتهم وإحباطهم لما يقومون به من عمل مصطلحي عربي على أنه لن يكون له فائدة أمام الإقبال على المصطلحات الأجنبية، بسبب التقدم العلمي والبحثي في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

* زادت وتيرة معارضة التعريب الطبي بسبب تنامي مؤسسات التعليم العربية التي تدرّس الطب باللغات الأجنبية، فحوّلت هذه المؤسسات عقول الشباب إلى الاهتمام باللغات الأجنبية، وإهمال اللغة الأم، خاصة بعد أن وطدّت مؤسسات المجتمع المدني واقعاً مؤلماً يعكس هذا الواقع أن المتخرجين من التعليم الأجنبي، أو التعليم باللغة الأجنبية لهم الأسبقية في الوظائف والحوافز المادية وإتاحة الفرص لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في المستقبل.

* عدم الأخذ بمبادئ ومنهجية العمل المصطلحي العربي، وخاصة توحيد المصطلحات الطبية والعلمية والإدارية والصناعية والحضارية وغيرها؛ مما أدى إلى ارتباك مصطلحي ملحوظ في العالم العربي، خاصة وأن الجهات التي تعمل في المجال المصطلحي كثيرة مثل الجامعات، والهيئات، والمجامع اللغوية، والأفراد، ومراكز البحث واللغات وغيرها والتي تضع المصطلحات وتنشرها بأشكال وتراكيب ودلالات مختلفة.

* التباين في أسلوب ومنهجيات انتقاء وصياغة المصطلح من قِبَل واضعي

المصطلحات العربية، وإدخال الرموز العلمية والمختصرات بحروفها الأجنبية أو بألفاظها الأصلية.

* صياغة المصطلحات لفظياً دون إدراك أو فهم للدلالات، واستعمالاتها حسب تنوع الاختصاصات العلمية والطبية.

* النزعة الواضحة عند بعض المصطلحيين تجاه الخلط بين المصطلحات التراثية والحديثة، وعزوفهم عن الحديثة وتفضيلهم للتراثية. أي أن الجانب التراثي والتاريخي للمصطلح هو الأهم أمام الحاجة إلى المرونة عند هؤلاء، للمساهمة في تطور المصطلح وتغييره حسب التغيرات الثقافية والتحولات الاجتماعية والبيئية والعلمية.

* يتصف واضعو المصطلحات العربية بتنوع خلفياتهم الثقافية والعلمية واللغوية، فمنهم من تعلم علومه بغير اللغة التي يترجم منها مصطلحاتها. لذلك نجد أن الذين تعلموا باللغة الروسية والصينية والإيطالية والفرنسية والأسبانية، وغيرها يصعب عليهم فهم الدلالة العميقة للكثير من المصطلحات الإنجليزية.

* هناك بعض من تعلم علومه بالعربية وليس له إلمام كافٍ باللغة التي يترجم منها لكي يكون على بيّنة بالمفاهيم والمصطلحات على نحو معّمق، فنجده غير متمكن من معرفة التباينات في مدلولات المصطلحات الأجنبية متشابهة اللفظ والمستعملة في اللغات المختلفة.

* التعددية في اللهجات العامية وفي مضامينها في البلدان العربية تعكس الارتباك في وضع المصطلحات، خاصة عندما تمتزج المصطلحات بالدلالات العامية فلا يفهمها الكثيرون لأنها غير دارجة في أوطانهم.

* يواجه المصطلح العربي إشكالية تعدد المعاني الواحدة، أي أن المصطلح الواحد قد يعني أشياءً مختلفة حسب المجال المعرفي الذي تخضع له، فكلمة (Control) الأجنبية تعني في علم الطب معانٍ متعددة، مثل «يكافح»، وتعني «تضبيط» وهو تنظيم الضوابط المتعلقة بأمور معينة أو بأحداث معينة، وأيضاً تعني «شاهد» وهو المعيار الذي يمكن على أساسه تقييم ملاحظات اختبارية معينة، وتعني أيضاً «مراقبة» وهي مراقبة مجموعة من المرضى موضع الدراسة من حيث عدم إصابتهم بالمرض أو عدم تلقيهم للعلاج أو النظام الدوائي وبخلاف ذلك تتشابه مجموعة المراقبة ومجموعة العلاج في أمور تسمح أو تسهل إمكانية المقارنة بينهما، وتعني في علم النفس «يضبط» وهي عملية الضبط والتنظيم الواعي

للدوافع وكبت الغرائز. وتعني أيضاً «تحكم»، و«مُكافَحَةٌ» كذلك نجد أن كلمة (Convergence) تعني «تقارب» وهو في علم التطور: «نشوء أو تطور بنيات أو عضويات متماثلة في أصانيف غير مترابطة»، وفي علم الأجنة: «هي حركة الخلايا من المحيط باتجاه الخط الناصف أثناء تكوّن المعيدة، وفي الفيزيولوجيا البصرية: «هو الميلان المتناسق لخطي الإبصار المستقيمين باتجاه نقطة التثبيت المشتركة أو نقطة التثبيت بعينها، وفي طب الأعصاب: «هي استشارة عصبون حسي واحد بدفعات واردة من عصبونات متعددة أخرى، وبخاصة في الجهاز العصبي المركزي».

* ظهور النزعة المحلية في بعض المصطلحات في غياب المنهج العام، والتركيز على البُعد النظري للمصطلح أدى إلى ركود المصطلح بسبب عدم استخدامه أو إيجاد أرضية حقيقية مناسبة تتوافق مع واقعه ودلالاته ومحيط استعمالاته.

* غياب الجانب الإلزامي للمنتجات المصطلحية المبنية على الأسس أو المنهجية السليمة، وكذلك التي تقرها المؤسسات المصطلحية في البلاد العربية. فالمصطلح الطبي الموحد الذي أصدره المكتب الإقليمي للصحة العالمية لشرق الأوسط يهدف إلى توحيد المصطلحات الطبية في البلاد العربية، ولا يعني بالضرورة تمسك كل الجهات بما ورد فيه رغم أهميته وكفاءته في التوحيد والاستخدامات من الأطراف العاملة في مجال التعريب والأطباء والطلاب والباحثين وغيرهم.

* يواجه العمل المصطلحي إشكالية عدم توظيف التقنيات المعاصرة.

* الاعتماد الكبير على إلزام المجامع العربية لتذليل معيقات اللغة والمصطلح، بينما الحاجة ماسة إلى تغيير فكري ونفسي يعزز الثقة بالعربية ويدفع الناس بالإخلاص لها. وهذا يتطلب الإيمان بأهمية التغيير وبوعي الذات وتحريك الذهنيات.

هذه بعض الجوانب المؤثرة في المصطلح العربي الذي نأمل أن يتم معالجته، خاصة وأن هناك رغبة عارمة واتجاهات متنامية عند المتخصصين المصطلحيين والعاملين في حقل التعريب، وخاصة الطب في أن ما أمكن بناؤه وتأسيسه حتى الآن قليل، ولا يرقى إلى المستوى المأمول ولابد من تعاون جماعي، أفراد ومؤسسات وحكومات، للمساهمة بشكل واضح وفعّال في بناء وتطوير المصطلحات في شتى الميادين، وعلى أساس إلزامية استخدام المنتجات في الإنتاج الثقافي والفكري

والتربوي. لاشك أن المؤسسات اللغوية والمصطلحية تقع على عاتقها مسؤولية قيامها ليس فقط بوضع المصطلحات وإشاعتها، وإنما أيضاً أهمية دورها في التنمية الثقافية والعلمية والتي ترتكز عليه اللغة العربية.

المعجم الطبي المفسر للطب والعلوم الصحية الذي بين أيدينا الآن وفي طبعته الأولى هو موسوعة تخص الحرف (C) من المعجم الذي يضم أكثر من خمسة عشر ألفاً من المفردات بتفسيراتها، ودعمها بالصور والأشكال والوسائل المناسبة التي تم اختيارها من أجل المزيد من الإيضاح والبيان، وتيسيراً على المُطّلع لفهم مضمون المصطلحات المكتوبة بالإنجليزية والعربية. فالشروح لها أهمية بالغة في الفهم وتوضيح القصد دون غموض، بهدف إعانة القارئ على استيعاب دلالات المفردات. إنه اتجاه يعزز وظيفة المعجم في التأليف والترجمة الطبية، فالشروح تعين على سهولة فهم ما يخص من ألفاظ النصوص، وما استعصى فهمه، والمساهمة في تحديد إطار المصطلح وميدانه، والعثور على المفردة المطلوبة أو المستهدفة من خلال النص المفسر، وإجراء المقارنات والمقابلات الصحيحة، وتجنب استخدام المصطلحات غير المقصودة استناداً على نصوص شرحها وتحديد ماهيتها وأهدافها.

التفسير المعجمي يهدف أيضاً إلى بيان ترتيب المفردات وتفرعاتها وأصولها وألفاظها، وفهم زوائدها ونواقصها، وإعادتها إلى جذرها الأصلي. والشروح تعين على تحديد وفهم التعاريف بالمصطلحات بلغة العصر وروحه، وتصويب ما ورد عند القدامى على نحو خاطئ. لذلك فالتفسير المعجمي الطبي يضيف خاصية مهمة من خواص منهجية وضع المصطلحات، في إنه يجعل المعجم موسوعة مرجعية، وليس فقط معجم يشتمل على كلمات أجنبية تقابلها كلمات عربية، ربما يحدث التباس في فهم المصطلحيين والأطباء من أن المفردة وإن كانت صحيحة، إلا أن خلوها من التفسير يجعل فهمها على نحو مغاير لما تعنيه الكلمة في هذه الحالة، خاصة وأننا نواجه تعقيدات مصطلحية من حيث القبول والرفض إذا وردت مفردات لا يستسيغها السامع وعليها خلافات في ألفاظها ودلالاتها في بعض الأقطار العربية.

والمعجم المفسر للطب والعلوم الصحية يعين أيضاً على تطوير المصطلحات والتعرّف على أوجه القصور والنقص فيها، من خلال فهم المعاني والعلاقات والتداخلات بين المفردات والألفاظ. إنه عنصر مهم في تقليل الخلافات المصطلحية بين الناس الذين يرون أنه من الأفضل استعمال مصطلح دون آخر، أو تجنب

المصطلح كليةً، واستخدام اللفظ الأجنبي اعتقاداً بأنه أقرب إلى المعنى والهدف. وهذا يضعنا في خانة التحيز للمصطلح بغض النظر عن صحته وسلامته والاتفاق العام عليه.

ومن مميزات التفسير المصطلحي أنه يوطد ويقوي علاقة المفردات والألفاظ العربية التي تتقابل مع الأجنبية في المعارف، ومنها العلوم الصحية، وعلى نحو محدد وواضح للمعاني والإطار المفاهيمي، وذلك من أجل إزالة الالتباس أو الغموض في السياقات المصطلحية وتفرعاتها وتباين شروحها. كذلك يساهم شرح المصطلح في فهم تعدد اللفظ الواحد واستعماله بدلالة مختلفة في أكثر من علِم، فلا يحدث تداخل مصطلحي، أو استخدام ألفاظ لا علاقة لها بميدان المعرفة التي يقصدها الباحث والمختص.

وتفسير المصطلح يعزز أيضاً مفهوم الحاجة إلى مواكبة التطورات في علم المصطلح وتعقيداته، واستيعاب الطفرة التقنية الكبيرة التي تعم العالم حالياً، خاصة باستخدام وسائل الإيضاح وتقنية المعلومات، وسرد الأمثلة المناسبة الداعمة لأسس التوضيح والشرح. لذلك يعتبر المعجم الطبي المفسر مرجعاً للمعاني والمصطلحات وقاعدة لغوية وعلمية واصطلاحية..

ورغم أن عالمنا العربي يفتقر إلى معاجم للمعاني والشروحات في شتى ميادين المعرفة ومنها الطب، إلا أن الجهود العربية في هذا المجال مازالت مبعثرة ومحدودة، خاصة إعداد المعاجم المفسرة بمنهجية وعلمية، تعتمد على جمع وتصنيف المصطلحات ووضع الألفاظ الحديثة، واتباع مبادئ مصطلحية، وإثرائها بالشروحات والمعلومات والأشكال والصور التي تجعل المعجم مرجعاً شاملاً، ومشوقاً لكل باحث ومختص يسعى للمعرفة ويهتم بقضايا التعريب.

ولذلك فإن هذا المعجم الطبي المفسر الذي بين أيدينا حالياً هو نتاج جهد عربي، شارك في تقديم شروحاته جمعٌ عالي المستوى من الأطباء العرب الذين سارعوا في التفاعل مع إجراءاته ومنهجيته من خلال تقديم النصح والمشورة والمساهمة في إخراجه على النحو المأمول. ولقد اعتمد المركز على المعجم الطبي الموحد في طبعاته الأولى، وحتى الثالثة بعد أن أدخل إضافات جديدة لمفردات لم ترد في الموحد، رغم أن الجهد أساساً ينصب على وضع الشروحات المناسبة والمبسطة، من أجل تعميم الفائدة وتوسيع دائرة الاستخدام، خاصة في مجالات التأليف والترجمة والبحث والتعليم والثقافة.

لاشك أن جهد منظمة الصحة العالمية في إعداد المعجم الطبي الموحد أثمر عن نتائج ملموسة ليس فقط باستخدامات المعجم الموحد في أعمال التعريب الطبي، وإنما أيضاً في سعي المركز مع الأطباء في إعداد الشروحات لآلاف من المصطلحات الطبية التي شملت كل حروف اللغة، بعد أن أعد المركز خطة متكاملة بدأت تحديداً في عام (2000)، عندما طالب مجلس وزراء الصحة العرب بوضع التفسير المناسب لكل مصطلح رئيسي أو تفرعاته ـ إن وجدت ـ في إطار يحقق قدراً من المرونة والشمولية والإيضاح. فالتفسير المصطلحي تابع للمصطلح وليس العكس، والتعقيدات في التفسير تفوق أحياناً تلك التعقيدات التي تواجه وضع المصطلح، وخاصة على المستوى اللفظي المُعَبِر عن المضمون أو المعنى العلمي.

إن الاتجاه نحو توحيد المصطلحات من قِبَل اتحاد الأطباء العرب سنة 1966، ومواصلة لجنة المصطلحات الطبية في منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لتطوير المعجم الموحد في الطب، أكد رغبة القطاع الصحي العربي في التعريب. فلقد ساهمت جهات عديدة في بناء وتطوير هذا المعجم، وخاصة الأطباء والصفوة من المؤمنين بتوحيد المصطلحات أمثال الدكتور عزة مصطفى الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب آنذاك، والدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي الذي كان رئيساً للجمعية الطبية الكويتية في اتحاد الأطباء العرب قبل أن يكون وزيراً للصحة بالكويت ورئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لسنوات طويلة، فقد بادر الدكتور العوضي بالتبرع من ماله الخاص بمبلغ يعين على مشكلة الطبعة الأولى للمعجم الموحد. وكذلك ساهم الأطباء واللغويون والمهتمون بالمصطلحات ودلالاتها أمثال الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري (المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط)، والدكتور محمد هيثم الخياط (كبير مستشاريّ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط) عندما تبنوا أعمال لجنة المصطلحات الطبية ووفروا لها سُبل النجاح بعد أن انتقلت المهمة من اتحاد الأطباء العرب إلى منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ترسيخاً لمفهوم أهمية التعريب الطبي في الوطن العربي.

هؤلاء وكثيرون وضعوا الأساس وتبنوا الخطوات اللازمة لمسيرة المعجم الطبي الموحد انطلاقاً من قناعتهم وإيمانهم بأن المعلومات الطبية، والتواصل بين الطبيب والمريض، وتحسين الخدمات الصحية لا تتحقق على الوجه الأمثل ما لم تكن باللغة التي يتكلم بها الناس، ويتعاملون بها فيما بينهم. فكيف يمكن للمريض أن

يوصل رسالته ويشرح العلة التي يعاني منها، إذا كان الطبيب لا يعرف لغة المريض العربية. لاشك أن التعامل بين البشر بلغة أجنبية وغريبة تَخلِق الغربة والنفور بين المريض والطبيب، وتجعل المريض يعزف عن المعالجة وزيارة المستشفى؛ مما يعني استفحال المرض فيه، وربما نقل العدوى لغيره من الأصحاء.

شرح المصطلح ليس له حدود ثابتة، وتراكيب الألفاظ ليست بالضرورة واحدة، كما يكون عادة في وضع المصطلح حيث نجد مصطلحاً واحداً للمفهوم العلمي الواحد. فلقد وجدنا تباينات كبيرة في لغة الشرح بين مصدر وآخر نظراً لاختلاف الأداء والقدرات اللغوية عند الأطباء، دون المساس طبعاً بالمفهوم العلمي للمصطلح. ولقد أدى ذلك إلى إعادة مراجعة صياغات الشروح مرات عديدة من قِبَل العديد من الأطباء، وكذلك قطاع التحرير في المركز، فضلاً عن مراجعات نهائية من قِبَل اللغويين الذين تم تكليفهم بالعمل، بهدف التركيز على الجانب اللغوي من حيث التراكيب والسرد والترابط، والمحددات والنسق والاختصار غير المخُلّ، ومناسبة الكلمات وحسن اختيارها، والبعد عن التكرار في الألفاظ وغيرها.

إن السير على هذا الطريق استدعى وضع خطة منهجية سهلت تذليل الكثير من العقبات المتوقعة، خصوصاً وأن وضع الشروح بالكلام والأشكال والصور، ووسائل الإيضاح لمعجم طبي مفسّر يقارب عدد مفرداته أكثر من (15) ألف مصطلح لا يمكن أن يتصوره أحد، بأنه عمل هين أو أنه مشروع يمكن إنجازه في سنة أو سنتين، ثم لا يحتاج إلى تنقيح وتصويب وتطوير. فمع أن المشروع أُنجز كمرحلة ثالثة في حرفه الثالث (C) والذي يضم أكثر من خمسة عشر ألف مصطلح طبي، وبنسخة إلكترونية، وطباعة ورقية، إلا أن المركز سيتابع تطويره بالتنسيق مع الأطباء والمصطلحيين اللغويين لأخذ ملاحظاتهم من خلال برنامجه الإلكتروني الذي أُعد خصيصاً للاتصال بين المركز والجهات المتعاونة من أفراد ومؤسسات وهيئات معنية بالمصطلحات والتعريب.

إن الحرف (C) من المعجم الطبي المفسّر الذي بين أيدينا حالياً هو الجزء الثالث من العمل المعجمي التفسيري للمركز، والذي على أساسه سيعمل المركز على استكمال شرح بقية الحروف في المعجم المفسّر. إننا حريصون على تعديل ما لم يلق القبول في المصطلح وتفسيره، والتعاون مع الأطباء والمصطلحيين والمترجمين واللغويين، خصوصاً في إنجاز بقية أحرف المعجم. ففي الحرف (C) تم تصميم برنامج إلكتروني، وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توزيع المسودات،

ووضع البرامج، والاتصال والتنسيق مع الأطباء، وتبادل المعلومات والأفكار، وإجراء التصويبات ووضع الشروحات، وإدخال قواعد بيانات الأشكال والصور والرسومات المناسبة.

إن إدخال واختيار أشكال الصور والإيضاح استند على معايير منها، مناسبة وسيلة الإيضاح للمصطلح، واختيار الوسيلة الداعمة للشرح والتي تساعد على الفهم وتفسير المصطلح، والتركيز على الوسائل البيانية المشروحة والمُعبِرة عن المعنى، واعتماد الوسائل التي تعكس الوضوح والنقاوة الإخراجية، وظهور الأجزاء والقطاعات دون إعاقة مطبعية أو اهتزاز مُخلّ لفهم معاني الأشكال والبيانات. كما روعي التوازن في كمية الوسائل الضرورية بما يتوافق مع عدد المصطلحات في الحرف (C)، دون إفراط في الكم أو الاختلال في النوع أو الأهمية أو في دواعي اختيار وسيلة إيضاحية دون أخرى.

لقد راعينا أن يكون المعجم (إنجليزي ـ عربي ثم التفسير بالعربي)، أي أن البحث يكون بالمصطلح الإنجليزي، وأن يتم ترتيب المصطلحات وفقاً للأبجدية الإنجليزية من (A حتى Z)، وأن يعتمد النطق الأمريكي وليس البريطاني للمصطلحات الطبية. كما أن المشروع اعتمد في وضع الشروح باللغة العربية للمصطلحات الواردة بالمعجم على الموحد، وكذلك على مصادر أخرى أجنبية مثل (ستدمان) و(موزبي) وغيرهما. فلم يؤخذ الشرح من مصدر واحد، وإنما من عدة مصادر، فضلاً عن شروحات اعتمدت على جهد وقدرات الأطباء العاملين في المعجم الطبي المفسر.

ويلاحظ من المعجم الطبي المفسر أن إخراج المصطلحات استند على أساس تلوين المصطلح الرئيسي بلون أزرق، وببنط أكبر من اللون الأسود والبنط المسُتخدم للمصطلحات الفرعية، وذلك للتمييز بين الأصول والفروع المصطلحية. كما كُتب الشرح باللغة العربية ببنط عادي. ويتراوح حجم الشروح بين (2-7) أسطر حسب طبيعة المصطلح، وقد تُفسر بعض المصطلحات بأسطر أكثر إذا كانت هناك حاجة لذلك.

لقد شارك في وضع الشروح أكثر من (100) طبيب من المهتمين بعملية تعريب التعليم الطبي، ومن ذوي الخبرة في مجالات التأليف والترجمة الطبية باللغة العربية. كما تم اختيار من لهم خبرة في مجال ترجمة وإعداد المعاجم والقواميس الطبية. فضلاً عن إلمام الأطباء بالحاسبات الآلية (الكمبيوتر). وقد تنوع الأطباء المشاركون

في المعجم المفسر حسب التخصصات والدول العربية، ولم يقتصر العمل على فئة واحدة من الأطباء، وإنما كان التنوع في الاختصاص والخبرة والجنسية هدفاً سعى المركز إليه منذ بداية العمل في المشروع.

وفي البداية بعد اختيار الأطباء المشاركين زُوِد كل طبيب مشارك بمادة المعجم حسب التخصصات الطبية، وبالتعليمات التي يجبُ مراعاتها في الترجمة والكتابة، كما تم إرسال نسخة إلكترونية من كامل العمل المراد ترجمته أو كتابة الشروح. هذا بالإضافة إلى نسخة محوسبة من برنامج العمل في المعجم، مع كتيب تعريفي بطريقة العمل، وكيفية حفظ البيانات المسجلة. لقد تم العمل (الترجمة والإعداد) بالكامل على قاعدة بيانات محوسبة، بحيث يضع المترجم المصطلح الأجنبي الرئيسي المراد وضع مرادف له في النافذة المخُصصة لذلك، ثم باستخدام مفتاح التغيير يظهر في النافذة المقابلة والمكتوب عليها «المصطلح العربي» للمقابل العربي ـ الذي تم إدخاله. بعد ذلك تظهر نافذة جديدة مكتوب عليها «الشرح» يضع فيها المترجم شرح المصطلح الأجنبي باللغة العربية مباشرة على البرنامج، ومن ثم يقوم بحفظ ما تم إدخاله.

بعد انتهاء جميع الأطباء المشاركين في العمل، تم تجميع المصطلحات وشروحها بالكامل في قاعدة بيانات واحدة. ثم قامت بعد ذلك لجنة مختصة من الأطباء بمراجعة وتحرير العمل، والتأكد من سلامة التفسير وصحة البيانات. ولإنجاز المشروع على النحو المنشود فقد تم التركيز على الحرف (C)، كما أشرنا، من حيث التدقيق والمراجعة والإخراج في صورته النهائية، وقد أُخرج الحرف (C) إلكترونياً وورقياً.

تابع المركز بقطاعاته الفنية والإخراجية والتحرير والمعلوماتية كافة متطلبات إنجاز العمل في مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، حيث تم الصف والإخراج في المركز، وكذلك إجراءات التصويبات اللغوية والعلمية والمراجعة المصطلحية. وكان في كل مرحلة من مراحل خطة تنفيذ المعجم يستعين المركز بالأطباء، ويعرض ما تم إنجازه على مجلس أمناء المركز، وكذلك مجلس وزراء الصحة العرب بغية الاسترشاد بتوجيهات وآراء هذه الجهات.

إن اعتماد المركز على أجهزته في عملية إنجاز الجوانب الفنية والإخراجية والتحريرية والمتابعة والتنسيق وغيرها، كان بهدف إنجاز المعجم على أكمل وجه وبكلفة محتملة ومقبولة، خاصة وأن التعامل مع المشاريع الكبيرة مثل المعجم المفسّر

للطب والعلوم الصحية محفوف بمخاطر ارتفاع كُلّفة الإنجاز، وحدوث ما يُعكر سلامة المنتج في جوانبه الفنية والتقنية والإخراجية والطباعية وغيرها.

لاشك أن مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الدعم المادي للمشروع، وبالمناصفة مع المركز ساعدت على تخفيف الكُلّفة، وتحملها من جانب واحد، فالشكر والتقدير لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على تقديمها العون ووقوفها مع العمل الريادي المعجمي الذي يثري الفهم والفائدة، ويساعد على حماية اللغة العربية، ويرفع من مكانتها لدى الشعوب، ويرسخ العزم على المضي في تنمية الثقافة العربية.

ونحن في مركز تعريب العلوم الصحية نشعر بالفخر والاعتزاز بإنجاز الجزء الثالث من المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية الذي هو استمرار للانطلاق نحو إنجاز ما تبقى من أحرف المعجم الأخرى، فلقد علمتنا التجربة في إعدادنا لشروح المعجم للحرف (A ،B ،C) كيفية مواجهة المشكلات والتغلب على التحديات، والتمكن من اختيار أنسب الطرق التي تعيننا على تحقيق الأهداف في إطار يتطلب أحياناً قدراً من المرونة، والتغيير الضروري والإصرار على الوصول إلى الأهداف في زمن تزداد فيه التحديات والعقبات.

إن الواجبات في نطاقها المهني والأخلاقي ينبغي أن تتحقق بالكامل، لكن الإتقان فيها من موجبات العمل العلمي الخالص، فإن كان هناك تقصير أو أخطاء غير مقصودة، فإننا كفريق واحد في المركز نظل مسؤولين عن هذا التقصير أو الخطأ، لكن الأمل كبير في أن يظل هذا العمل لبنةً، ليست فقط في تقديم موسوعة معجمية مفسرة في الطب والعلوم الصحية يُستفاد منها في بلادنا العربية، وإنما أيضاً نتمنى أن يكون عملنا هذا حافزاً للآخرين لبناء معاجم تفسيرية في مجالات المعرفة المختلفة. فالمعاجم التفسيرية تساهم في تعزيز مكانة اللغة الوطنية، وهي وسيلة فاعلة في تنمية المعرفة واللغة ونشر الثقافة، وتحفيز العمل في الترجمة والتأليف والنقل والاتصال، وترسيخ قيم التعليم باللغة الوطنية.

وعلى الله قصد السبيل
وبه المستعان،،

شكر وتقدير

يتقدم مركز تعريب العلوم الصحية ـ مجلس وزراء الصحة العرب ـ جامعة الدول العربية بأسمى آيات الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز الذي بين أيدينا (الحرف C) وهو الجزء الثالث من إنتاج المركز في مجال المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، الذي يواصل المركز العمل فيه ضمن خطة تنتهي بإنجاز كل حروف المعجم المفسر. لاشك أن مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية له أهمية بالغة في الوطن العربي لأنه يضع الشروح ويقدم الإيضاح للمصطلح الأصلي الإنجليزي باللغة العربية.

لقد قام بوضع الشروح لمفردات المعجم أطباء كثيرون وفي مختلف التخصصات الطبية، بذلوا الجهد وسعوا بكل إخلاص وحب للعمل في أن تُقدم هذه التفسيرات الطبية للطالب والطبيب والمهتمين بالتعريب الطبي وبعلم المصطلحات والباحثين وغيرهم في صورة مبسطة فيها سهولة ويسر، وليس فقط من أجل بيان قوة وصلابة اللغة العربية كلغة علم وطب وقدرتها على منافسة اللغات العالمية، وإنما أيضاً لإعانة التعليم الطبي على وجه الخصوص، أن يكون تعليماً مُعرباً يعين على تدريس المعرفة الطبية باللغة العربية.

والمركز إذ يعرب عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم من الأطباء وغيرهم في إنجاز الحرف (C) من المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، ولا ينسى تقديم الشكر والثناء للذين ساهموا في إنجاز الحروف الأخرى من المعجم، وهي حروف مازال المركز يعمل على إنجازها كاملةً، وسترد أسماء كل من شارك في أي حرف من الحروف التالية للحرف (C) بعد أن يصدر المطبوع ورقياً وإلكترونياً لبقية الحروف مستقبلاً بإذن الله .

كما يتقدم المركز بخالص الشكر للجنة الإشرافية العليا للمعجم المفسر للطب والعلوم الصحية ولأعضائها:

د. عبد الرحمن عبدالله العوضي	*رئيساً للجنة*	الكويت
د. أحتيوش فرج أحتيوش	عضو	ليبيا
د. أحمد ذياب	عضو	تونس
د. عبد الكريم خليفة	عضو	الأردن
د. محمود محفوظ	عضو	مصر
د. زهير السباعي	عضو	السعودية
د. مفيد جوخدار	عضو	سورية
د. يعقوب أحمد الشراح	*أميناً للسر*	الكويت

كما يشكر المركز ويثني على الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الفنية لتوحيد المصطلحات الطبية العربية برئاسة *الدكتور إبراهيم الصياد* والتي استمرت سنوات تنسق مع وزارة التخطيط الكويتية، مستفيدة من أجهزتها الحاسوبية ومبرمجيها في وضع البرامج وإصدار النسخ الإلكترونية التي ساهمت في متابعة وترتيب المفردات الطبية وأعانت على وضع الشروح لها، والشكر موصول للعاملين في (المركز الوطني للحاسبات والمكروفيلم) التابع لوزارة التخطيط الكويتية الذين كانوا خير عونٍ للمركز في تسهيل مهمة العمل بالمعجم المفسر للطب والعلوم الصحية.

وفي إطار تفعيل العمل المعجمي بالمركز فقد خصص المركز عدة ندوات حول المصطلحات الطبية والدلالات اللغوية، شارك فيها نخبة من المختصين في علوم اللسانيات والمصطلحات واللغة العربية، كانت لدراساتهم وآرائهم في مجال المصطلحات وتفسيراتها الأثر الكبير في إثراء العمل ومنهجية إنجاز المعجم المفسر، فالشكر لكل من ساهم في ذلك من خلال هذه الندوات ونخص بالذكر:

د. أحمد الشطي	الكويت	د. رشيد الحمد	الكويت
د. ممدوح خسارة	سورية	د. محمد حلمي هُليل	مصر
د. محمد زياد الشويكي	سورية	د. علي السيف	الكويت

د. عدنان غزال	الكويت	د. أحمد رجائي الجندي	مصر
د. عبد العزيز سفر	الكويت	د. ليلى السبعان	الكويت
د. يحيى خواجي	السعودية	د. محمد الرخاوي	مصر
د. نجاة المطوع	الكويت	د. عبد الله الغنيم	الكويت
د. عبد القادر الخديم	تونس	د. فتحي طاش	مصر
د. رضا علي	البحرين	د. عثمان الكاديكي	ليبيا
د. خالد الصالح	الكويت	د. خالد الشايجي	الكويت
د. سالمان أبو الفتوح	مصر	د. عدنان الحموي	سورية
د. فريال الفريح	الكويت	السيد/ عبد الله خلف	الكويت
د. جاكلين ولسن	مصر	د. شايش اليوسف	سورية
د. عبد الله محارب	الكويت	د. صالح الراشد	الكويت
د. سعاد الفريح	الكويت	السيد/ عبد الله الخضري	الكويت
السيد/ منذر يازجي	سوريا	د. دلال الهدهود	الكويت
د. علي اليعقوب	الكويت	السيد/ شاكر عبد الرحيم	مصر
د. سعد مصلوح	مصر	د. وائل محمد صبح	سورية
السيد/ إبراهيم عزو	لبنان	د. أسمهان العنزي	الكويت
د. عبد الحميد بسيوني	مصر	د. أحمد شيخ السروجية	الأردن
د. محمد جميل العويد	سوريا	د. محمد فوزي منتصر	مصر

وخالص الشكر لجميع الأطباء الذين تعاونوا مع المركز في وضع شروح الحرف (C) ومراجعتها والتدقيق فيها، ونخص بالذكر :

د. ضياء الدين الجماس	سوريا	د. مصطفى يوسف عبدالصادق	مصر
د. أحتيوش فرج أحتيوش	ليبيا	د. طه بن عبدالله قمصاني	السعودية
د. محمد براء الجندي	سوريا	د. داود مزيد أبو سعدى	سوريا
د. ناصر بوكلي حسن	سوريا		

وأخيراً نتقدم بالشكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي ساهمت في تحمل نصف تكلفة إنجاز المشروع لإيمانها بتعزيز دور ومكانة الثقافة العربية، والعمل على تطويرها، والمساهمة في الحفاظ على اللغة العربية وتنميتها، في عالم تتنافس فيه اللغات على الريادة والمكانة، ومواكبة كل المستجدات التي تطرأ على حياة البشر في كل مكان.

الحرف C C

رمز الكربون (عادة مايرمز إلى ذرات الكربون الجزيئية C1، C2، C3 وهكذا . أو ألفا -C أو بيتا -C وهكذا ، وذلك ابتداء من أول نقطة قياسية مرجعية ، ويرمز الحرف C إلى الكالوري الكبير ، وإلى المهبط أو (المهبطي) ، وإلى الفقرات الرقبية (من الفقرة الرقبية الأولى إلى الفقرة الرقبية السابعة) ، وإلى الرمع ، والغلق ، وحاسة اللون ، والمتممة (التي ترقم من C1 إلى C9) ، يرمز الحرف C إلى المطاوعة (تشير اللاحقات السفلية التي توضع أسفل الحرف C إلى البنية فعلى سبيل المثال (Cl) تعني المطاوعة الرئوية) . ويرمز الحرف C إلى التقلص ، وإلى الكولوم (أي وحدة الشحنة الكهربائية) ، وإلى الاسطوانة وإلى السيتيدين ، أوالسيتوزين والعدسات الاسطوانية . ويرمز أيضاً إلى المواسعة (في مجال الكهرباء) ، والتصفية (تشير اللاحقات أسفل الحرف C إلى المادة ، فعلى سبيل المثال CI أو Cin تشيران إلى تصفية الإينولين) ، ويرمز الحرف C إلى السعة الحرارية .

الحرف c c

يرمز الحرف c إلى التركيز المولي ، وإلى السعة الحرارية النوعية ، ويرمز إلى سرعة الضوء في الفضاء (الفراغ) .

رمز درجة الحرارة المئوية C° (Centigrade)

يرمز الحرف C إذا وضع فوقه دائرة علوية صغيرة إلى درجة الحرارة المئوية .

رمز الكالسيوم (كا؛ Ca) Ca (=calcium)

انظر تحت Calcium

خزانة cabinet

أي وسيلة حافظة للأشياء وتصلح لخزنها ، كخزانة الثياب وخزانة الأدوية وخزانة الأسنان .

خزانَةٌ سنِّيَّة dental cabinet

نوع منَ الخزائن يستخدمها طبيب الأسنان لحفظ وتخزين مواد الأسنان التي يستعملها . وهناك بعض الأدوات لها خزائن لتحميل المواد فيها .

1ـ يُبْرِق (يرسل ببرقية) cable

2 ـ كَبْل (حزمَة أسلاك)

3ـ برَقيَّة

يستعمل هذا المصطلح كاسم وفعل ، وكاسم بمعنيين الأول برقية الاتصال ، والثاني حزمة من الأسلاك لتوصيل النقل بين جهازين أو أكثر . وكفعل بمعنى يرسل برقية أو يُبرق أو يربط ما بين جهازين بحزمة من الأسلاك .

مُحَرِّكٌ كَبْليّ cable engine

جهاز محرك مجهز بمقابس تسمح بربط حزمة أسلاك توصيلية ، أي ليس جهازاً لا سلكياً .

الأجسام الحلقية المنسوبة لكابوت Cabot's ringbodies

[أجسام حلقية منسوبة للطبيب ريتشارد كلارك

داء كاكي ـ ريتشي **Cacchi-Ricci disease**

[داء منسوب للطبيب روبرتو كاكي (Cacchi-Ricci) ، وهو طبيب إيطالي عاش في القرن العشرين ؛ والطبيب فينسنزوريتشي (Vincenzo Ricci) ؛ وهو طبيب إيطالي عاش في القرن العشرين] ، وهو مرض خلقي يتميز بتوسع كيسي متعدد بالنبيبات الجامعة في الجزء اللبي بالأهرام الكلوية ، وتعطي الكلية شكل الأسفنج .

انظر تحت sponge kidney .

مُعْتَلُّ الحَواس **cacesthenic**

مصاب بعلة في أحد الحواس أو أكثر من حاسة . كالصمم أو البكم أو العمى أو اعتلال حس اللمس والحرارة .

1 ـ مُدْنَف **cachectic**

2 ـ دَنَفِي

متعلق أو متصف بالدنف .

مركب دنفي **cachectin**


عامل نخر خاص بالورم (Tumor necrosis factor) .

بُرْشانَة (أدوية) **cachet**

كلمة فرنسية تعني رقاقة شبيهة بالقرص أو كبسولة تحتوي جرعة من الدواء .

دَنَف **cachexia**

حالة مرضية وخيمة وتتميز بمجموعة من الاضطرابات البنيوية مع اعتلال عام في الصحة وسوء التغذية .



الأجسام الحلقية المنسوبة لكابوت
Cabot's ringbodies

كابوت *(Richard Clarke Cabot)* وهو طبيب أمريكي ، عاش مابين *(1868-1939)]* ، وهي خطوط في شكل عرى أو على شكل رقم 8 ، وفي الغالب هي بقايا الغشاء النووي ، وترى في حالات فقر الدم الوخيم داخل كريات الدم الحمراء ، وتسمى أيضاً حلقات كابوت.

انظر تحت body .

كابُوفوكون A **cabufocon A**

(مِنْ مَواد العَدَسَاتِ اللاصِقَة)

الاسم الكيميائي له : بوتانوات أسيتات السلولوز ، وهو أحد نوعين من مواد العدسات اللاصقة الكارهة للماء ، التي يشار لها A أو B .

مِقْياسُ فسادِ الهَوَاء **cacaerometer**

جهاز لقياس الغازات الضارة أو الفاسدة في الجو كغاز أول أكسيد الكربون أو ثنائي أكسيد الكربون والغازات السامة للأعصاب .

كاكاو **cacao**

1 ـ زبدة الكاكاو .

2 ـ بذور الكاكاو ، ويسمى كذلك فولة الكاكاو .

3 ـ الكاكاو : وهو بودرة محضرة من بذور الكاكاو المحمصة ، والتي تحتوي على الكافين والثيوبرومين .

زُبْدَةُ الكاكاو **cacao butter**

دهون نباتية مستخرجة من حبوب الكاكاو ، وتسمى أيضاً زيت الثيوبروما (Theobroma oil) ، ولونها أصفر فاتح ولها رائحة الشوكولاتة ، وتستخدم في الصناعات الصيدلانية ومواد التجميل ، وتصنع منها الشوكولاتة البيضاء بعد إضافة السكر وتخليصها من الروائح غير المرغوبة .

تَغَوُّط **cacation**

(=defecatnion)

التبرز : وهوعملية افراغ البراز من المستقيم .

إسْهالِيّ **cacatory**

يميز بالإسهال الوخيم .

دَنَفٌ قَلْبِيٌّ المَنْشَأ **cardiac cachexia**

حالة مَن الهزال والراجع سببه لمرض بالقلب ، ويحدث عادة نتيجة زيادة السعرات الحرارية المستهلكة ونقص في السعرات الحرارية الداخلة .

دنف فلوري **fluoric cachexia**

هزال يرى في حالات التسمم بالفلور .

دَنَفٌ نُخاميّ **hypophyseal cachexia**

الهزال وَالضعف العام والذي يحدث في حالات القصور النخامي الشامل .

انظر تحت panhypopituitarism .

دَنَفٌ لِمْفيّ **lymphatic cachexia**

(= ابْيِضَاضُ الدَّم الكاذب) **(=pseudoleuKemia)**

تسمية قديمة لاضطرابات الكريات البيضاء ، وكانت تسمى الابيضاض الكاذب (Pseudoleukemia) ، ثم تبينت منها أنواع من اللمفومات وداء هوجكين .

دَنَفُ المَلارْيا **malarial cachexia**

مجموعة من العلامات البدنية ذات الطبيعة المزمنة التي تنجم عن هجمات سابقة للملاريا الوخيمة ، والعلامات الرئيسية هي فقر الدم وشحوب الجلد واصفرار صلبة العين وضخامة الكبد والطحال ، وتأخر النمو والبلوغ عند الأطفال .

دَنَفٌ عَضَليّ **muscle cachexia**

تسمية قَديمة لحالات الضمور العضلي لأي سبب كان .

دَنَف نُخاميّ **pituitary cachexia**

انظر تحت Panhypopituitarism .

دَنَفُ التَّسَمُّم الرَّصاصي **saturnine cachexia**

دنف يشاهدَ في التسمَم المزمن بالرصاص .

دَنَفٌ دُرَقيّ **thyroid cachexia**

(= داء جَريفز) **(=Graves's disease)**

تسمية قديمة لداء جريفز (Graves' disease) .

انظر تحت cachexia exophthalmica .

دَنَفُ المَناطق المَداريَّة **tropical cachexia**

دَنَفُ الضُّمُور العَضَلي **amyotrophic cachexia**

دنف يتميز بَضعفَ تدريجي غير متماثل مع تنكس في العضلات .

دَنَفٌ جُحُوظيّ **cachexia exophthalmica**

نقص الوزنَ مع جحوظ العينين بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية . وهو ما يسمى بداء جريفز (Grave's disease) .

دَنَفُ الحِرْمَان النُّخامي **cachexia hypophysiopriva**

سلسلة من الأعراض الناجمة عن الحرمان التام من وظائف الغدة النخامية ، ويتضمن السحاف ، وفقد الوظيفة الجنسية وضمور الغدد الهدف النخامية ، وبطء القلب وخفض الحرارة والخمول أو اللامبالاة والغيبوبة .

دَنَفُ التَّسَمُّم الزِّئْبَقي **cachexia mercurialis**

دنف يشاهدَ في التسَمم بالزئبق .

دَنَفُ الحِرْمَان الدَّرَقي **cachexia strumipriva**

هي حَالة مَن أعراَض وعلامات نقص نشاط الدرق مع وجود الوذمة المخاطية أو بدونها . وقد يكون بسبب تلف النسيج الدرقي بسبب الاستئصال الجراحي ، ويسمى أيضاً (Cachexia thyreopriva) .

دَنَفٌ كُظْري **cachexia suprarenalis**

(= داءُ أديسون) **(=Addison's disease)**

انظر تحت Addison's disease

دَنَفُ الحِرْمَان التُّوتي **cachexia thymopriva**

نقص الوزن أو الضعف العضلي الناتج عن ضمور النسيج التوتي أو استئصال .

الدَّنَفُ التَّالي لاسْتِئْصال الدَّرَقيَّة **cachexia thyreoidectomica**

هو دنف الحرمان الدرقي والحادث كنتيجة لاستئصال الغدة الدرقية .

دَنَفُ الحِرْمَان الدَّرَقي **cachexia thyreopriva**

انظر تحت cachexia strumipriva .

دَنَفٌ سَرَطانيّ **cancerous cachexia**

حالة من الضعف والهزال ترى في حالات الاصابة الأورام الخبيثة .

تعرضه للهواء ، أعراض التسمم الناجم عنه تشبه التسمم بالزرنيخ .

cacodylate **كاكوديلات (كيمياء)**

أحد أملاح حمض الكاكوديل ؛ الكاكوديلات كان لها استعمال طبي قديماً ، ولكنها تطلق مركبات زرنيخية عند استقلابها مما يسبب التسمم الزرنيخي .

cacodylic acid **حمض الكاكوديل**

حمض ثنائي ميثيل الزرنيخ ، وهو مبيد للأعشاب سام جداً .

cacoethes **1 ـ سُوءُ العادات**
2 ـ خَبَاثة

يدل المصطلح على كل ما يشير للسلوكيات والأخلاقيات الفاسدة .

cacoethic **1 ـ سَيّءُ الحال**
2 ـ خَبِيث

خاصة بالظروف والعادات لشخص أو مجموعة .

cacogenesis **عَيْبُ التَّخَلُّق**

خلل في التكوين .
انظر تحت dysgenesis .

cacogenic **مَعِيْبُ التَّخَلُّق**

صفة التوليد والتخلق المعيب أو النشوء الشاذ .

cacogenics **تَرَدِي السُّلالة**
(باستِنْجابِ المتخلفِين)

دراسة أسباب التدهور في الأنسال .

cacogeusia **استِكراهُ المَذاق**
(حسُّ طعْم كريه بدون منبه حقيقي)

خطل الذوق والمكون من طعم كريه غير مرتبط بابتلاع مواد نوعية ، أو مصاحب لمنبهات ذوقية عادة ماتعتبر مقبولة الطعم .

cacolalia **بَذاءَة**

التلفظ بالألفاظ البذيئة السيئة .

cacomelia **تَشَوُّهُ الأطْراف**

انظر تحت dysmelia .

cacoplastic **متعلق بالاستِعْداد لنَقص التَّكَوُّن**

صفة منسوبة لشذوذ التخلق والنشوء .

هو الدنف الناتج عن بعض الأمراض التي تنتشر في المناطق المدارية والتالي لبعض أمراض الإسهالات الأميبية .

uremic cachexia **دَنَفٌ يوريمي**

الدنف المصاحب للأعراض المجموعية الأخرى للفشل الكلوي المتقدم .

cachexy **دَنَف**

حالة مرضية وتمتاز بمجموعة من الاضطرابات البنيوية ، اعتلال عام في الصحة وسوء التغذية .
انظر تحت cachexia .

cachinnation **قَهْقَهَة**

(قهقهة بمعنى أن يضحك بصوت عالي) ، وهو ضحك غير معتدل وبصوت مرتفع وغير ملائم ؛ يرى بشكل شائع في الفصام اللامنتظم.

cachou **حَبَّة سُكَّرِيَّة (لِتعْطيرالنَّفس)**

حبة تفوح منها رائحة عطرة لتعطير رائحة النفس .

caco- **سابقة بمعنى فاسِد ؛ كَريْه ؛ سَيِّء**

(سابقة اغريقية بمعنى رائحة كريهة) ، بادئة بمعنى فاسد أو عليل .

cacodemonomania **هَوَسُ الأرْوَاح الشريْرَة**

حاله من الوهام أو الضلال ، وتوهم بوجود أرواح شريرة .

cacodontia **فَسادُ الأسْنان**

نخر الأسنان سواء بالعوامل الجرثومية أو الكيميائية .

cacodyl **كاكودِيل (مُركّبٌ زرْنيخيٌ عُضْويٌ)**

هو رباعي ميثيل ثنائي الزرنيخ ، وهو سائل عديم اللون يحتوي على مركب الزرنيخ ، $[(CH_3)_2 AsH]$ ، له رائحة كريهة ، يطلق بخار سام قابل للإشتعال عند تعرضه للهواء .

cacodyl cyanide **سيانيد الكاكوديل**

مسحوق أبيض ، $[(CH_3)_2 As CN]$ يطلق بخار سام جداً عندما يتعرض للهواء .

cacodyl hydride **هيدريد الكاكوديل**

سائل عديم اللون $[(CH_3)_2 AsH]$ له رائحة الثوم القوية ، يطلق بخار سام يشتعل تلقائياً عند

cadaverous **جُثيّ**

مشابه للجثة .

caddis **القِمْص (ذبابة من شعريات الأجنحة)**

انظر تحت fly .

cadherin **كادهيرين**

جزيء من عائلة الجزيئات الملتصقة بالخلايا المرتبطة بالكالسيوم .

cadmiosis **سُحارُ كادمْيُومِيّ**

تغبر في الرئة ناجم عن استنشاق وتفاعل نسيج الرئة لغبار الكادميوم .

cadmium **الكادمْيُوم (العنصر الثامن والأربعون)**

معدن ثنائي التكافؤ ، يشبه القصدير في المظهر والخواص ، رمزه الكيميائي Cd ، رقمه الذري 48 ، وزنه الذري 112.40. الكادميوم و أملاحه يعتبر من السموم .

cadmium bromide **بروميد الكادميوم**

تركيبه الكيميائي ($CdBr_2$) ، وهومركب يستعمل في التصوير الفوتوجرافي ، وعمليات النقش والحفر والطباعة الحجرية ، يسبب عند ابتلاعه التسمم بالكادميوم .

caduca **السَّاقِط**

(=membranae deciduae TA) **(= الأغْشِيَةُ السَّاقِطَة)**

هو غشاء مخاطي يبطن الرحم ثم يطرح خارج الرحم عند الولادة .

caduceus **صَوْلجَانُ هِرْمِس**

(شِعارُ الطب والأطبَّاء)

صولجان هرمس ذو الجناحين ، أو عطارد ، وهو رسول الآلهة ، له ثعبانان يلتفان حوله ، يستعمل كشعار طبي ، وكرمز للهيئة الطبية في الجيش الأمريكي ، وهوالشعار الرسمي للمهن الطبية هو صولجان اسقولابيوس .

caducous **1ـ السَّاقِط**

2ـ ساقِطِيّ

انظر تحت deciduous .

caecitas **عَمَى**

(=blindness)

cacorhythmic **مُضْطربُ النَّظْم**

اضطرابات النظم أو سوء الانتظام (مصطلح قديم) .

cacosmia **اسْتِكْراهُ الرَّائِحَة**

(حس برائحة كريهة بدون منبه)

خطل الشم والمؤلف من رائحة كريهة غير مرتبط بالتعرض لرائحة معينة ، أو المصاحب لمنبهات شمية عادة ماتعتبر مقبولة .

cacostomia **بَخَر**

cacothenic **مُتَرَدِي السُّلالَة**

متعلق بتردي السلالة وليس تحسنها .

انظر تحت cacothenics .

cacothenics **تَرَدِي السلالَة (بتأثير البيئة)**

تدهور السلالات والأعراق الناجم عن التأثيرات المؤذية في البيئة .

cacotrophy **سُوءُ التَّغْذِيَة**

(=malnutrition)

انظر تحت malnutrition

cactinomycin **كاكتينوميسين**

(مُضادٌ حَيَوِيٌّ شَدِيدُ السمِيّ)

مضاد حيوي مشتق من مركب أكتينوسين ، والذي ينتج من أنواع متعددة من المتسلسلة (جنس من الجراثيم الشبيهة بالفطريات) .

cacumen **قِنَّة (قمة النبات)**

قمة النبات أو ذروته وهو تركيب تشريحي .

cadaver **جُثَة**

الجسم الميت ، يطلق بصفة عامة على جسد الإنسان المحفوظ لغرض الدراسة التشريحية .

cadaveric **جُثيّ**

متعلق بالجثة أو مشابه لها .

cadaverine **كادافيرين (كيمياء)**

قاعدة نيتروجينية ذات رائحة كريهة ، وهي خماسي ميثيل إينيديامين ، ينتج عن نزع الكربوكسيل من الليزين (حمض أمينى) ، والذي ينتج عن تحلل المادة البروتينية بسبب فعل الجراثيم خاصة من نوع الجراثيم الضامة (Vibrio) .

سابقة بمعنى الخلوّ **caeno-**

أزرق **caeruleus**

«زرقة» ، «اللازوردي» ، «الأزرق» . ويكتب هذا المصطلح بالإنكليزية كالتالي (Ceruleus) و (Coeruleus) .

القيصريَّة **caesarean**

عملية استخراج الجنين بشقِّ البطن .

السيزْيوم (العُنْصُرُ الخامِسُ والخَمْسون) **cesium (=caesium)**

العُنْصُرُ الخامسُ والخَمْسون ، وهو عنصر كيميائي رقمه الذري 55 ، وهو معدن نادر .

كافيرجيكت **Caferject**

الاسم التجاري لمستحضر الآلبروستاديل .

بُنّ **caffea**

هو القهوة أو البُنُّ ، ويسمى أيضاً (Coffee) .

كافين **caffeine**

واحد من المثيل الزانثين ، وهو ذواب في الماء والكحول ، يمكن الحصول عليه من القهوة أو البن ومن المتة والشاي والجوارنا ، ينبه الجهاز العصبي المركزي ، وبصفة خاصة المخ ، له مفعول مدر في الكليتين ، ينبه العضلات المخططة ، وله مجموعة من التأثرات على الجهاز القلبي الوعائي ، يستعمل كمنبه مركزي وكمنبه تنفسي ، وبالتوليف مع الأرجوتامين (مادة لعلاج الشقيقة) لعلاج الصداع الوعائي ، ويستعمل كمساعد لتعزيز تفريج الألم بالتوليف مع المسكنات ، يعطى عن طريق الفم ، وابتلاع مقادير مفرطة منه يسبب التسمم الكافيني . ويدعى أيضاً الجوارانيين والميثيل ثيوبرومين .

الكافين وبنزوات الكافين **caffeine and sodium benzoate**

انظر تحت injection .

بنزوات الكافين **caffeine benzoate**

ملح يستعمل كمعجل لتحويل البيليروبين اللامقترن إلى الآزوبيليروبين في طريقة ييندراسيك ـ جروف لتعيين البيليروبين

عدم القدرة على الرؤية .

انظر تحت blindness

الأعْوَر **caecum TA (=cecum)**

1 ـ جيب مغلق النهاية أو ردبة .

2 ـ الجزء الأول من الأمعاء الغليظة ، ويشكل جيب متسع وفيه يفتح اللفائفي والقولون والزائدة الدودية ، ويسمى أيضا الأعور ، المعى المقفل ، المعى الأعور .

الأعْوَرُ القُبَيْبيُّ للقَناة القَوقَعيَّة **caecum cupulare ductus cochlearis TA**

النهاية القمية المقفلة المغلقة للقناة القوقعية .

الأعْوَرَ الدِّهْليزيُّ للقَناة القَوقَعيَّة **caecum vestibulare ductus cochlearis TA**

تجيبَ خارجَي ، أو اندلاق صغير مغلق في النهاية الدهليزية للقناة القوقعية .

أعْوَر **caecus**


جيب مغلق النهاية .

الأعْوَرُ الصَّغير للمَعِدَة (=جُزْءُ المَعِدَة الفؤادي) **caecus minor ventriculi (=pars cardiaca ventriculi TA)**

انظر تحت cardia .

سيديباكتر **Caedibacter**

جنس من الجراثيم غير محددة الإرتباط ، وتكون طفيليات للمتناعلات .



Caecum الأعور

[1934-1852] ، وهي خلية في القشرة المخية .
انظر تحت Cell .

الكاجيبوت cajeput
الأشجار البلقاء ، وهي شجرة استرالية صغيرة .

يُوكاليبتول cajeputol (=eucalyptol)
يوكاليبتول هو دواء معقم ومنكه وطارد للبلغم .

البلقاء cajuput
نبات يعطي زيت أخضر اللون ويستخدم في العطور والأدوية.

كِتلة cake
في الصيدلة بمعنى التجمع والتكتل على شكل مجموعة متراصة كتلية تقابل كلمة (Mass) ، وأما المعنى العام فيدل على القرص العجيني الممزوج من الطحين والدهون والسكريات والمخبوز بالنار .

تكتُّل caking
في الصيدلة وصف لحالة التكتل والتجمع للجزيئات أو المادة .

كالاكتين calactin
أحد أنواع الجليكوزيدات القلبية .

تَسْنيد calage
مادة تستخدم لمعالجة دوار البحر .

كالامين calamine
(دواء جلدي)
مادة كيميائية تستعمل كمضادة للحكات الجلدية .

قلَم calamus
(بنية تشريحية)
1ـ بنية مثل القصبة .
2ـ قلم قصب الذريرة .
3ـ جذمور أروماتي (عطري) لقلم قصب الذريرة ، يستعمل كعامل منكه وكمنفر للحشرات ، ولقد استعمل سابقاً كطارد للأرياح وطارد للديدان .

الإجمالي

سيترات الكافين **caffeine citrate**
مستحضر ذو مقادير متساوية من حمض السيتريك (حمض الليمون) والكافين ، يستعمل لاستخدامات الكافين نفسها ، ويعطى عن طريق الفم .

تسمُّمٌ بالكافين caffeinism
حالة مرضية ناجمة عن ابتلاع مقادير مفرطة من الكافين ، تتضمن التظاهرات : الأرق والتململ والإثارة وتسرع القلب والرعاشات والإدرار البولي .

داء كافي Caffey' s disease
[داء منسوب للطبيب جون كافي (John Caffey) ، وهو طبيب أطفال أمريكي عاش مابين 1978-1895] ، وهو فرط التعظم القشري عند الرضيع .

قفص cage
صندوق أو علبة ، باحة مسيجة .

قَفَصُ الجَمْهَرَة (الوراثيَّات) **population cage**
القَفَصَ الذي يمكن أن يعزل فيه جمهرات ذبابة الفاكهة إلى عدة أجيال .

القَفَصُ الصَّدْريُّ **thoracic cage**
هو هيكل الصدَر .
انظر تحت skeleton thoracis .

أذن كاجوت، الأذن عديمة الفصوص Cagot ear
(كاجوت هي منطقة في جبال البيرينية حيث يشيع حدوث هذا التشوه)
انظر تحت ear .

سابقة بمعنى الجَدِيْد caino- (=ceno)

كاخال Cajal
انظر تحت Ramón y Cajal .

خلية كاخال ، إلخ Cajal's cells,etc
[خلايا منسوبة للطبيب سانتياجو رامون كاخال (Santiago Ramón y Cajal) ، وهو طبيب واختصاصي الهيستولوجيا أسباني عاش مابين

عَقِبيٌّ ظُنْبُوبيّ calcaneotibia

متعلق بالعقب والظنبوب .

حَنَفٌ عَقِبيٌّ رَوَحيٌّ أجْوَف calcaneovalgocavus

حنف القدم الذي يشترك فيه حنف العقب والحنف الرَوَحي والحنف الأخمصى .

العَقِبيّ (عَظمُ العَقِب) calcaneum

هو عظم العقب .

انظر تحت calcaneus .

العَقِبيّ calcaneus TA

(=عَظْمُ العَقِب)

1 ـ عظم رباعي الزوايا غير منتظم عند ظهر الرصغ ، ويدعى أيضاً عظم العقب وله مرادفات مختلفة في اللغة الإنكليزية مثل (Calcaneum) ، (Heel bone) ، (Os calcis) و (Os tarsi fibular) .

2 ـ حنف العقب (Talipes Calcaneus) .

ألَمُ العَقِب calcanodynia

مِهْماز (تشريح) calcar

1 ـ مهماز .

2 ـ بنية تشبه المهماز .

مِهْمازُ الطَّير calcar avis TA

المهماز المهمازي : بارزة في الجدار الإنسي للقرن القذالي للبطين الوحشى ، أسفل بصلة القرن القذالي ، تنتج كامتداد وحشي للتلم المهمازي .

مِهْمازُ الفَخذي calcar femorale

الصفيحةَ (الشريحة) من نسيج قوي ، والتي تدعم عنق عظم الفخذ .

العَقب calcar pedis

كلس calcarea

هو أكسيد الكالسيوم أو هيدروكسيد الكالسيوم .

هيدروكسيد الكالسيوم calcarea hydrica

هو محلول هيدروكسيد الكالسيوم الموضعي .

فسفات الكالسيوم calcarea phosphorica

هو فسفات الكالسيوم المرسب .

أكسيد الكالسيوم calcarea usta

انظر تحت calcarea .

قَلَمُ الكتابَة calamus scriptorius

(بنية تشريحية أسفل البطين الرابع)

القسم الأسفل من قاع البطين الرابع ، يشبه القلم عندما يشاهد من الجانب الظهراني ، ويتوضع بين الأجسام المرسية الشكل .

كالان calan

العلامة التجارية لمستحضرات هيدروكلورايد الفيراباميل ، (دواء للذبحة الصدرية) .

سابقة بمعنى العَقِب calcane-

[سابقة بمعنى العقب] عندما تأتى فى شكل اتحادى تدل على علاقة مع عظمة العقب .

عَقِبيّ calcaneal

متعلق بالعقب .

عَقِبيّ calcanean

انظر تحت calcaneal .

التِهابُ العَقِب calcaneitis

التِهابُ النُّتوءِ العَقِبي calcaneoapophysitis

علة في القسم الخلفي من العقب تتسم بالألم عند نقطة غرز العرقوب ، مع تورم في الأقسام الرخوة .

عَقِبيٌّ كاحِليّ calcaneoastragaloid

متعلق بالعقب والكاحل (أحد عظام القدم) .

حَنَفٌ عَقِبيٌّ أجْوَف calcaneocavus

انظر تحت talipes .

عَقِبيٌّ نَرْدِيّ calcaneocuboid

متعلق بالعقب والعظم النردي .

ألَمُ العَقِب calcaneodynia

عَقِبيٌّ شَظَويّ calcaneofibular

متعلق بالعقب والشظية .

عَقِبيٌّ زورَقيّ calcaneonavicular

متعلق بالعقب والعظم الزورقي .

عَقِبيٌّ أخْمَصيّ calcaneoplantar

متعلق بالعقب وقدم الرجل .

عَقِبيٌّ قاربِيّ calcaneoscaphoid

متعلق بالعقب والعظم القاربي .

انظر تحت calcaneonavicular .

يحتوي على الكالسيوم مثل الجير ، حجر الجير ، أو الرخام (المرمر) .

calcidiol **كالسيديول**
(=25-hydroxy-cholecalciferol) **(= 25- هيدروكسي كوليكالسيفيرول)**

calcifames **جوعُ الكالسْيُوم**
(=calcium hunger)
التعطش لمادة الكالسيوم أو الشعور بالحاجة لتناولها من حجارة الكالسيوم .

calcifediol **كالسيفيديول**
(=25-hydroxy-cholecalciferol) **(= 25- هيدروكسي كوليكالسيفيرول)**
1 ـ هو 25 ـ هيدروكسي كوليكالسيفيرول .
2 ـ يستخدم مستحضر هذه المادة لمعالجة الخلل العظمي الكلوي المنشأ أو نقص كالسيوم الدم المصاحب للفشل الكلوي المزمن ، ويستخدم أيضا في علاج مختلف اضطرابات ڤيتامين D التغذوية والاستقلابية .

Calciferol **كالسيفيرول**
(=ergocalciferol) **(= ارجوكالسيفيرول)**
(=vitamin D) **(= ڤيتامين D)**
الاسم التجاري لمستحضر الإرجو كالسيفيرول ، وهو مركب له فعالية الڤيتامين D ، ومثال ذلك كوليكالسيفيرول أو إرجو كالسيفيرول .

calcific **1 ـ مُوَلِّدُ الكِلس**
2 ـ كِلسِيٌّ
مُشَكِّلٌ للكلس .

calcification **تكلُّس**
العملية التي يصبح بها النسيج العضوي متيبس بسبب ترسب أملاح الكالسيوم بداخل مادته .

aortic calcification **تَكَلُّسُ الأورطي**
ترسب الكالسيوم على جدار الشريان الأورطي لأسباب عديدة منها التصلب الوعائي بتقدم العمر ، ويظهر ذلك شعاعياً بالصور البسيطة للصدر مثلاً .

Conjunctival metastatic calcification **تَكَلُّسُ الْمُلْتَحمة النَّقيليُّ**

calcarea chlorata **الجير المكلور**
عامل مطهر ومبيض ، ويسمى أيضا (Chlorinated lime) .

calcareous **كِلسِيّ**
متعلق بالجير أو الكالسيوم أو مؤلف منهما ؛ أو طباشيري .

calcarine **مِهْمازيّ**
1 ـ مشابه للمهماز .
2 ـ متعلق بالمهماز .

calcariuria **بيلةٌ كِلسِيَّة**
وجود أملاح الكالسيوم في البول .

calcaroid **شِبْهُ كِلسيّ ؛ شُبَيْهُ الكالسيوم،كلساني**
مشابه للكالسيوم ، مصطلح يطلق على بعض الترسبات في النسج الدماغية ،و التي تشبه التكلس ولكنها لاتظهر التفاعل النوعي للكالسيوم .

calcemia **فَرْطُ كالسيوم الدَّم**
(=hypercalcemia)
هو فرط الكالسيوم في الدم (Hypercalcemia)

calci- **سابقة بمعنى الكالسيوم**
بادئة أو لاحقة تبين الصلة مع الكالسيوم أو أملاح الكالسيوم .

calcibilia **وُجُودُ الكالسيوم في الصَّفْراء**
وجود الكالسيوم في الصفراء .

Calcibind **كالسيبند**
العلامة التجارية لمستحضر فسفات الصوديوم السليلوزي .

calcic **كلسي جيري**
خاص بالجير أو الكالسيوم أو متعلق بهما .

calcicosilicosis **سُحارٌ كِلسِيٌّ سيليسيّ**
نمط من تغبر الرئة بالغبار المختلط الذي ينجم عن استنشاق الغبار المعدني الذي يحتوي على السيليكا (ثاني أكسيد السيليسيوم) ، والمعادن المحتوية على الكالسيوم مثل الجير ، أو حجر الجير ، أو الرخام (المرمر) .

calcicosis **سُحارٌ كِلسِيّ**
تغبر في الرئة ينجم عن استنشاق الغبار الذي

وخـاصـة المحـفظة المفـصليـة ، ويظهـر ذلك بالصورة الشعاعيةالبسيطة .

تَكَلُّسُ التَّامُور **pericardial calcification**

ترسب الكالسيوم في الغلاف المحيط بالقلب وخاصة في الالتهاب المزمن العاصر أو السلي ، ويظهر ذلك بالصورة الشعاعية البسيطة .

تَكَلُّسُ الرِّئَة **pulmonary calcification**

ترسب الكالسيوم في النسج الرئوية الملتهبة التهاباً مزمناً ، كالسل مثلاً . وتظهر التكلسات بالأشعة البسيطة .

تَكَلُّسُ اللُّب **pulp calcification**

تكلس لب الغدة الكظرية أو لب الكلية ، وخاصة بوجود الأورام أو الالتهابات المزمنة ، وتظهر التكلسات بالصورة الشعاعية البسيطة .

تَكَلُّسُ الكُلْيَة **renal calcification**

ترسب الكالسيوم في النسج الكلوية لأسباب متعددة ، وتظهر التكلسات في الصورة الشعاعية البسيطة .


مُتَكلس **calcified**

صفة تشير إلى وجود التكلس في العضو أو النسج المصابة .

1ـ حامِلُ الكالسيوم **calcigerous**

2ـ مُنْتِجٌ للكالسيوم

منتج أو حامل لأملاح الكالسيوم .


CALCIFEROL(D2)

Calciferol كالسيفيرول

ظهور تكلسات متفرقة في الملتحمة العينية .

كَلُّسُ التَّاجي **coronary calcification**

ترسب الكالسيوم على جدر الأوعية التاجية التي تقوم بتروية القلب . ويظهر ذلك بالتصوير الشعاعي الوعائي القلبي .

تَكَلُّسٌ حَثَلِيّ **dystrophic calcification**

ترسب الكالسيوم في النسج غير السوية مثل النسيج الندبي أو اللويحات التصلبية الشريانية ، ولكن من غير شذوذات في كالسيوم الدم .

تكلس رقيق ، كقشرة البيضة **eggshell calcification**

ترسب طبقة رقيقة من الكالسيوم حول العقد اللمفاوية الصدرية ، غالباً مايشاهد في السحار السيليسي .

تَكَلُّسُ العنان **habenular calcification**

تكلس الغدة الصنوبرية ومجاوراتها حسب المدلول القديم للعنان ، وهو في الوقت الحاضر يطلق على الكتلة الخلوية المحيطة بالمنطقة الظهرانيةالإنسية من المهاد ، والدفينة في النهاية الخلفية من الشريط الإنسي ، والتي تتلقى معظم الألياف العصبية الواردة .

تَكَلُّسٌ نَقيليّ **metastatic calcification**

ترسب الكالسيوم في النسج الحية كنتيجة لارتفاع مستويات الكالسيوم والفسفات في الدم والسوائل النسيجية .

تَكَلُّس مونكيبرج **Monckeberg's calcification**

توضُّع الكالسيوم في الطبقة المتوسطة من الشرايين المتصلبة .

انظر تحت arteriosclerosis

تَكَلُّسُ العَضَلَة القَلْبيَّة **myocardial calcification**

ترسُّب الكالسيوم ضمن ألياف العضلة القلبية السليمة أو المعتلة .

تَكَلُّسٌ حَولَ المَفْصل **periarticular calcification**

ترسُّب الكالسيوم في النسج المحيطة بالمفصل

بين الفقرات ، ويدعى أيضاً الالتهاب المكلس للغضاريف بين الفقار وداء ڤيرس (Verse's disease) .

كُلاَسٌ شامل calcinosis universalis

ترسب واسَع الانتشار لأملاح الكالسيوم في الأدمة (بالجلد) ، السبلة (الطبقة الغشائية) والعضلات ، فى شكل عقيدات أو لويحات ، وأكثر مايحدث فى الأطفال وبشكل أساسي البنات مع التهاب جلدي عضلي .

كلاس متوطن بالحيوانات enzootic calcinosis

حالة مزمنة عند المجترات بسبب التسمم النباتي أو فقد التوازن المعدني ؛ تتضمن الأعراض تكلسات النسج الرخوة ، والتهاب المفاصل ، والإسهال ، والهزال . تتضمن النباتات المسببة (Cestrum diurnum) ، وعدة أنواع من الباذنجانيات وخاصة (Solanum malacoxylon) ، و (Trisetum flavescens) ، ويسمى أيضاً إنتان الدم المزمن النزفي في المواشي ومرض مانشيستر المسبب للضمور .

كَلاَسٌ وَرَمِيّ tumoral calcinosis

نمو كتل كبيرة في ماحول المفصل كما في الكتف والمرفق والورك ، يتسم بأعراض مثل النسا (عرق النسا) الناجم عن الضغط على الأعصاب المجاورة ، ليس له سببيات معروفة ، وبدايته غالباً ماتكون في العقد الأول أو الثاني من العمر .

تحْرِيكُ الكالسيُوم calciokinesis

تحريك الكالسيوم المخزون في الجسم .

مُحَرِكُ الكالسيُوم calciokinetic

متعلق بتحريك الكالسيوم أو مسبب له .

وُجُوْدُ الكالسيوم في السَّائِل النّخاعِي calciorrhachia

وجود الكالسيوم في السائل النخاعي الدماغي .

مُثبتُ الكالسيُوم calcipectic

متعلق بتثبيت الكالسيوم ، أو خاص بتثبيت الكالسيوم ، أو مسبب لتثبيت الكالسيوم .

كالسيجكس Calcijex

الاسم التجاري لمستحضر كالسيتريول (Calcitriol) .

كالسيمار Calcimar

الاسم التجاري لمستحضر هرمون الكالسيتونين (Calcitonin) .

مِقياسُ الكالسيوم calcimeter

المقياس الذي يمكنه تحديد مقدار الكالسيوم في مصل الدم أو النسج .

كَلسَنَة calcination

عملية لاختزال المسحوق الجاف بالحرارة .

يُكَلسِن calcine

الاختزال إلى مسحوق جاف بالحرارة .

مِلحٌ مُكَلسَن calcined salt

كل ملح من الأملاح المتعرضة للحرارة دون درجة الذوبان بقصد طرد الشوائب منها ، أو أكسدتها وتغيير خصائصها . والأصل في تعبير الكلسنة هو تعريض الأحجار الجيرية (الكلسية) للحرارة دون درجة الذوبان لطرد ثنائي أكسيد الكربون منها والحصول على أكسيد الكالسيوم ، ثم أصبحت التسمية معممة لتشمل جميع أنواع المعادن أو الأملاح .

كلاس calcinosis

حالة تتسم بترسب أملاح الكالسيوم في مختلف نسج البدن .

كُلاسٌ مُتَحَدِّد calcinosis circumscripta

ترسب موضعي للكالسيوم في عقيدات صغيرة في النسج تحت الجلد أو في العضلات ، وعادة مايكون ذلك في التصلب الجلدي المجموعي ، أو التهاب الجلد والعضلات .

كُلاسٌ جِلْدِيّ calcinosis cutis

حالة تتسَم بَترسب أملاح الكالسيوم في الجلد بشكل عقيدات أو لويحات .

كُلاسٌ خلاَلِيّ calcinosis interstitialis

ترسب الكاَلسيوم في الأنسجة الخلالية .

كُلاسٌ بَيْنَ الفَقَار calcinosis intervertebralis

ترسب الكالسيوم في واحد أو أكثر من الأقراص

calciprivic **1ـ فاقِدُ الكالسيُوم**

2ـ متعلق بحِرْمَان الكالسيُوم

3 ـ مَحْرُومُ الكالسيُوم

4ـ متعلق بفقدِ الكالسيُوم

متعلق بفقد الكالسيوم ، أو خاص بفقد الكالسيوم من الجسم .

calcipyelitis **التِهابُ الحُوَيْضَة الحَصَوِيُّ**

(=calculous pyelitis)

التهاب حوض الكلية التالي لوجود حصوات بالكلى .

Calcitite **كالسيتيت**

العلامة التجارية لهيدروكسيل الأباتيت (Hydroxylapatite) .

calcitonin **كالسِيتونِين (هرمون)**

هرمون عديد الببتيد مكون من 32 حمضاً أمينياً ، ينتج في الخلايا المجاورة للجريب في الغدة الدرقية استجابة لفرط كالسيوم الدم ، ويعمل على خفض مستويات الكالسيوم والفسفات في الدم ، يثبط ارتشاف العظم ، ويعمل كمناهض لهرمون الدريقة (الغدة المجاورة للدرقية) ، يفرز في الفقاريات الدنيا من الأجسام الخيشومية القصائية ، يستعمل في معالجة فرط كالسيوم الدم الوخيم ولمعالجة داء باجيت . يدعى هذا الهرمون أيضاً بالكالسيتونين الدرقي (Thyrocalcitonin) .

calcitonin-salmon **الكالسيتونين السلموني**

شكل من الكالسيتونين ، أصلياً يستخرج من سمك السلمون ولكنه يستحضر الآن بطريقة صناعية ، يعطى بطريق الحقن تحت الجلد أو في العضل .

calcitriol **كالسيتْرِيُول**

(دواء لبعض الاضطرابات العظمية)

1ـ هو 1، 25 ثنائي هيدروكسي كولي كالسيفيرول .

2ـ يستعمل مستحضر هذا المركب لمعالجة نقص كالسيوم الدم ونقص فسفات الدم والرخد والخثل العظمي المصاحب للعديد من

calcipenia **قِلَّة الكالسيُوم**

عوز الكالسيوم ، ويدعى أيضاً نقص الكالسيوم (Hypocalcia) .

انظر تحت hypocalcemia .

calcipenic **قليلُ الكالسيُوم**

متعلق أو خاص بقلة الكالسيوم .

calcipexic **مُثبِتُ الكالسيُوم**

انظر تحت calcipectic .

calcipexis **تثبيت الكالسيُوم**

انظر تحت calcipexy .

calcipexy **تثبيت الكالسيُوم**

تثبيت الكالسيوم في أنسجة الكائن الحي .

calciphilia **ألفة الكالسيُوم**

الميل لامتصاص أملاح الكالسيوم من الدم ليحدث التكلس .

calciphylactic **متعلق بالتَأق التَكَلُسِيّ**

متعلق أو خاص بالتأق الكلسي .

calciphylaxis **التَأقُ التَكَلُسِيّ**

تشكيل نسيج متكلس كاستجابة لإعطاء عامل التحدي (الضد) التالي لتحريض حالة التحسس المفرط .

systemic calciphylaxis **التَأقُ التَكَلُّسِيُّ المَجْمُوعِيّ**

مظهر التكلس العام في الأعضاء الداخلية أو الأنسجة ، الذي يحدث كاستجابة للحقن الوريدي أو داخل الصفاق لعامل التحدي .

topical calciphylaxis **التَأقُ التَكَلُّسِيُّ المَوضعِيّ**

تشكيل منطَقة محدَدَة من التكلس كاستجابة للحقن تحت الجلد لعامل التحدي .

calcipotriene **كالسيبوترين**

مشتق صناعي لفيتامين D_3 (كوليكالسيفيرول) ، و يستخدم موضعيا كمضاد للصدفية .

calciprivia **1ـ حِرْمَانُ الكالسيُوم**

2 ـ فقدُ الكالسيُوم

حرمان الكالسيوم أو فقده .

انظر تحت hypocalcemia .

2ـ كاربيميد الكالسيوم السيتراتي .

كاربيميد الكالسيوم السيتراتي **calcium carbimide, citrated**

مزيج مؤلف من سياناميد الكالسيوم وحمض السيتريك ، ويستخدم كمضاد للكحول .

كربونات الكالسيوم **calcium carbonate**

مركب ($CaCO_3$) ، موجود طبيعيا في مصادر مختلفة ، تتضمن العظام والمحار والحجر الجيري . يستعمل بصفة رئيسية كمضاد للحموضة فى شكله الأصلي وفي شكله المحضَّر (الطباشير المحضر) ، وفي شكله المرسَّب .

كازينات الكالسيوم **calcium caseinate**

مستحضر غذائي من الكازين والكالسيوم .

مُحْصِرات قَنَوات الكالْسيُوم **calcium channel blockers**

أدوية تحصر الأقنية التي تمرر أيونات الكالسيوم من الخلايا ، فتعمل على توسيع الأوعية الصغيرة ، ولذلك تستعمل كخافضات للضغط وتوسيع الأوعية التاجية القلبية .

كلوريد الكالسيوم **calcium chloride**

هو ملح ، تركيبه ($CaCL_2 2H_2O$) ، يستحصل كحبيبات أو شدف صلبة بيضاء ، يستعمل كتعويض عن الكالسيوم ، يعطى وريدياً ، ويستعمل كمدر بولي منتج للحموضة وكمحمض للبول ، وللتحكم في النزف في بعض الحالات مثل الفرفريات والنزف المعوي والنزوف الصغيرة المتعددة ، وهو درياق للتسمم بالمغنيزيوم ويعطى وريدياً .

سياناميد الكالسيوم **calcium cinamide**

هو مركب ، تركيبه ($CaCN_2$) ، يستحصل من تفاعل النيتروجين مع كربيد الكالسيوم في فرن (تنور) كهربائي ، وهو يثبط واحداً أو أكثر من الإنزيمات المطلوبة لأكسدة الأسيتيل ألدهيد المتشكل من الكحول ، يستخدم كسماد ومبيد للأعشاب والهوام ، إن شرب الكحول بعد ابتلاع أو استنشاق سياناميد الكالسيوم يسبب أعراضاً غير مقبولة (الداء الأحمر) ، ولذا

الاضطرابات ، وبصفة خاصة الفشل الكلوي المزمن وقصور الدريقات (الغدة المجاورة للدرقية) . يستعمل أيضاً للوقاية والمعالجة في التكزز عند الرضع المبتسرين وفي عوز الڤيتامين D الناجم عن عدم الكفاية الغذائية أو الاستقلابية .

الكالْسِيُوم (العنصر العشرون) **calcium**

معدن أصفر فضي ، العنصر الأساسي في الجير . رمزه Ca ، رقمه الذري 20 ، وزنه الذري 40.08 . يوجد تقريبا في جميع الأنسجة العضوية لكونه المعدن الأكثر تواجدا في الجسم . يشكل بالاتحاد مع الفسفور فسفات الكالسيوم ، وهي المادة الصلبة الكثيفة في الأسنان والعظام . إنه عنصر أساسي في النظام الغذائى . المستوى الثابت للكالسيوم بالدم ضروري للمحافظة على ضربات القلب الطبيعية وللوظائف الطبيعية للأعصاب والعضلات . ويؤدي دوراً في مراحل متعددة من تخثر الدم (التي يدعى فيها عامل التخثر الرابع) ، وفى العديد من العمليات الانزيمية

الكالسيوم 45 **calcium 45**

انظر تحت radio calcium .

الكالسيوم 47 **calcium 47**

انظر تحت radio calcium .

أسيتات الكالسيوم **calcium acetate**

ملح كالسيوم من حمض الأسيتيك ، يعطي فموياً كمصدر للكالسيوم عند مرضى الديال الدموي وغيرهم .

أسكوربات الكالسيوم **calcium ascorbate**

ملح كلسي من حمض الأسكوربيك ، يستعمل كمصدر لحمض الأسكوربيك (الڤيتامين C) ، في المكملات الغذائية .

بنز أميدو ساليسيلات لكالسيوم **calcium benzamidosalisylate**

هو بنزو يلباس الكالسيوم (دواء مضاد للسل) .

كاربيميد الكالسيوم **calcium carbimide**

1ـ سياناميد الكالسيوم .

لاكتات الكالسيوم **calcium lactate**
عياض الكالسيوم ، يعطى فموياً لمعالجة عوز الكالسيوم .

ليفولينات الكالسيوم **calcium levulinate**
عياض الكالسيوم ، يعطى بالحقن لمعالجة عوز الكالسيوم .

أوكسالات الكالسيوم **calcium oxalate**
تركيبه الكميائي (CaC_2O_4) ، ملح حمض الأوكساليك ، الذي عندما يتكون بتراكيز عالية في البول قد يؤدي لتشكل الحصيات الأوكساليتية

أكسيد الكالسيوم **calcium oxide**
قلوي أكال وكاو للتربة ، (CaO) ، يستعمل لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء ، ويستعمل في الصناعة كقلوي رخيص وكقاعدة للهاون . يدعى أيضاً الكلس والجير والكلس الحي .

بانتوثينات الكالسيوم **calcium pantothenate**
ملح كلسي لمصاوغ يميني التدوير لحمض البانتوثينيك ، (ڤيتامين B المركب) ، عادة ما يستعمل كتوليفة مع ڤيتامينات B الأخرى كمكمل غذائي .

بانتوثينات الكالسيوم ، راسيمي **calcium pantothenate, racemic**
خليط من أملاح للكالسيوم لمصاوغات يمينية التدوير وأيسري التدوير بكميات متساوية لحمض البانتوثينيك ، ولها فعالية فيزيولوجية تعادل نصف فعالية بانتوثيبنات الكالسيوم .

فسفات الكالسيوم **calcium phosphate**
أي من ثلاثة أملاح تحتوي الكالسيوم وجذر الفسفات (PO4) .

فسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة **calcium phosphate, dibasic**
مسحوق أبيض لا طعم له ولا رائحة ، ($CaHPO_4$ $2H_2O$) ، يستعمل كمكمل كلسي وكقاعدة لتحضير الحبوب ، يدعى أيضاً الفسفات ثنائي الكالسيوم .

استعمل لمعالجة الكحولية (إدمان المسكرات) في مزيج مع حمض السيتريك (كارباميد الكالسيوم السيتراتي) . ويدعى أيضاً كارباميد الكالسيوم والسياناميد .

سيكلامات الكالسيوم **calcium cyclamate**
تستخدم سيكلامات الكالسيوم كمادة للتحلية .

إيديتات الكالسيوم ثنائية الصوديوم **calcium disodium edathamil (=calcium disodium edetate)**

ڤيرسينات الكالسيوم الثنائي الصوديوم **calcium Disodium Versenate**
العلامة التجارية لإيديتات الكالسيوم ثنائية الصوديوم .

إيديتات الكالسيوم **calcium EDTA**
هي ايديتات الكالسيوم الثنائية الصوديوم ، و (EDTA) هي حمض الإيثيلين ثنائي الأمين رباعي الأسيتيك .

مُحْصِرَاتُ دُخُول الكَالْسِيُوم **calcium entry blockers**
الأدوية المعيقة لدخول الكالسيوم من فوهات الأقنية المخصصة لمروره .

فلوريد الكالسيوم **calcium fluoride**
مركب ، تركيبه (CaF2) ، وهو موجود في العظم والأسنان .

جلوبيونات الكالسيوم **calcium glubionate**
مركب عياض للكالسيوم ، يستعمل كمكمل غذائي ولمعالجة نقص كالسيوم الدم ، يعطى فموياً .

جلوكونات الكالسيوم **calcium gluconate**
ملح للكالسيوم من حمض الجلوكونيك ، يستعمل كعياض للكالسيوم ، يعطى وريدياً أو فموياً ، وهو درياق فموي للتسمم الفلوريدي أو التسمم بحمض الأوكساليك .

هيدروكسيد الكالسيوم **calcium hydroxide**
هو ملح ، $Ca(OH)_2$ ، موجود كمسحوق أبيض ، يستعمل محلوله كقابض موضعي.

بنتيتات الكالسيوم ثلاثية الصوديوم **calcium trisodium pentetate**

تستخدم كعامل مستحلب .

أنديسيلانات الكالسيوم **calcium undecylenate**

ملح كلسي من حمض الأنديسيلينيك ، يطبق موضعياً لمعالجة العدوى الفطرية البشروية والشعروية وفطور البويغاء .

كالسيميدوتات الصوديوم **calciumedetate sodium**

هي إديتات الكالسيوم ثنائية الصوديوم .

بيلة كِلسيَّة **calciuria**

وجود الكالسيوم في البول .

ألمُ العَقِب **calcodynia**

ألم ينشأ في العقب بسبب حمل الجسد أو أكثر من ذلك وخاصة عند المشي ، وكثيراً ما يكون مجهول السبب أو بسبب نشوء بارزة عظمية تَنَكُّسية إبرية تسبب التهاب النسج الليفية في المنطقة كمتلازمة مهماز العقب .

جلوبولينٌ تكلُّسيّ **calcoglobulin**

شكل من الجلوبولين الذي يوجد في النسيج المتكلس .

كُرَيَّة كِلسِيَّة **calcospherite**

أحد الأجسام الكروية الصغيرة التي تتشكل في خلال عمليات التكلس ، بوساطة الاتحاد الكيمبائي مابين جسيمات الكالسيوم والمادة العضوية الألبومينية من المواد بين الخلوية ، تلتحم هذه الجزيئات لتشكل الجلوبولين التكلسي .

1ـ قلَحِيّ [أسنان] **calculary**

2ـ حَصَوِيّ

حَسَّابَة **calculator**

آلة تقوم بالعمليات الحسابية ، أصبحت صغيرة الحجم وتعمل بالكهرباء ، وتقوم بعمليات حسابية معقدة .

حَصَى ؛ حَصَيات **calculi (sing.calculus)**

فسفات الكالسيوم ثلاثي القاعدة **calcium phosphate tribasic**

1ـ مركب $Ca_3(PO_4)_2$ ، وفسفات الكالسيوم ثلاثي القاعدة الحقيقي شكل نادر الوجود .

2ـ مزيج من فسفات الكالسيوم المتغير عديم الشكل له صيغة تقريبية $(Ca_3(PO_4)_2)_3$ $Ca(OH)_2$. يستعمل كمكمل كلسي ؛ ويستعمل أيضاً كمضاد للحموضة وكملين .

كالسيوم بولي كربوفيل **calcium polycarbophil**

ملح كلسي ضعيف الارتباط تصالبياً ، راتين محب للماء من نمط عديد الكربوكسيل ، يستخدم كمسهل .

روبيونات الكالسيوم **calcium propionate**

ملح كلسي من حمض البروبيونيك ، له خصائص مضادة للفطريات ، يستعمل وحده أو كتوليفة مع بروبيونات الصوديوم أو عوامل أخرى كمواد حافظة لتثبيط انتاج العفن في منتجات المخابز والحليب ، وسائر الأغذية والتبغ والمستحضرات الدوائية ، ويستعمل كمضاد موضعي للفطريات لمعالجة الفطارات المختلفة .

بيروفسفات الكالسيوم **calcium pyrophosphate**

ملحٌ بيروفسفات الكالسيوم ، $Ca_2O_7P_2$ ، يستعمل كعامل صقل في منظفات الأسنان ، تتكون بلورات ثنائية الهيدرات في المفاصل فى مرض ترسيب بيروفسفات الكالسيوم .

ستارات الكالسيوم **calcium stearate**

مركب من الكالسيوم والأحماض العضوية المأخوذة من الدهن ، يستعمل كحبوب مزلقة .

سلفات الكالسيوم **calcium sulfate**

ملح سلفات الكالسيوم ، $(CaSO_4)$ ، يوجد بدرجة شائعة في الطبيعة كأنهيدريت ، ويعرف الشكل المميه أي المهدرت باسم الجبس ، عندما يتكلس الجبس يشكل جبس(لاصق) باريس . يستعمل مجفف سلفات الكالسيوم ثنائي الهيدرات كحبوب مخففة .

حَصاةٌ دَمَويَّة **blood calculus**

حَصاةٌ قَصَبِيَّة **brochial calculus**

(= حَصاة رِئَوِيَّة) **(=lung calculus)**

حصاة تتموضَعَ في الرئة .

انظر تحت broncholith .

حصاة بروشتية **brushite calculus**

حصاة بولية قاسية فاتحة اللون تتكون من البروشيت .

حَصاةُ أوكْسالات الكالْسِيُوم **calcium oxalate calculus**

هي حصاة تتكون من أوكسالات الكالسيوم (CaC_2O_4) .

حَصاةٌ كُولِيسْتِيرولِيَّة **cholesterol calculus**

حصاة متشكلة منَ الكوليستيرول

انظر تحت gall stone .

حَصاة تَوليفيَّة **combination calculus**

(= حَصاة مُتَناوِبَة الطَّبَقات) **(=alternating calculus)**

حصاة متناوبة الطبقات المختلفة .

1 ـ حَصاةُ المَثانَة **cystic calculus**

2 ـ حَصاةُ المَرارَة

حَصاةٌ سِيسْتِينيَّة **cystine calculus**

نوع رخو مَن الحصيات البولية يتألف من السيستين .

حَصاةُ الاسْتِلْقاء **decubitus calculus**

حصاة تتكون في السبيل البولي بسبب التثبيت المديد .

قَلَحٌ سِنِّيّ **dental calculus**

قلح قاس كالحجر ، متفاوت اللون من لون الكريمي الأصفر إلى اللون الأسود ، وهو يتشكل في الأسنان أو البدلات السنية (التعويضات) من خلال التكلس في اللويحات السنية . وبحسب التموضع يوجد نمطان عامان : القلح فوق اللثة والقلح تحت اللثة ، وتدعى أيضا القلح السني (Dental tophus) .

حَصاةٌ مُتَكَيِّسَة **encysted calculus**

حصاة بولية مغلفة بكيس نامي من جدار

جمع من الحصى .

متعلق بتَهْشيم الحَصَى **calculifragous**

صفة متعلقة بتفتيت الحصى .

تكَوُّنُ الحَصَى **calculogenesis**

تكون الحصى وترسبه داخل الجسم .

تحَصٍّ **calculosis**

1 ـ مصاب بالحُصَيَات؛ مَحْصُوّ؛ مُحَصًّى **calculous**

2 ـ حَصٍ

1 ـ متعلق بالحصية ،

2 ـ من طبيعة حصوية ،

3 ـ مصاب بحصاة أو بالحصيات .

1 ـ قلَح (أسنان) **calculus**

2 ـ حَصاة (ج: حَصَيَات) (pl.calculi)

حصاة شاذة تحدث ضمن الجسم وعادة ما تتركب من أملاح معدنية ، وتسمى أيضا (Stone) .

حَصاةٌ مُتَناوِبَة الطَّبَقات **alternating calculus**

حصاة بولية تتألف من طبقات متتالية من مواد مختلفة ، وتدعى أيضاً حصاة توليفية (Combination Calculus) .

حَصاةٌ مِعَويَّة **alvine calculus**

تكلسات كبيرة ضمن التجويف المعوي ، وتشاهد في الصور الشعاعية البسيطة .

حصاة الأباتيت **apatite calculus**

حصاة بولية تتكون من أباتيت (أحد المكونات المعدنية للعظام والأسنان) .

حَصاةٌ مَفْصِليَّة **articular calculus**

ترسب في المَفصل ، عادة ما يتركب من يورات الصوديوم وأحيانا من يورات الكالسيوم ، تدعى أيضا الحصاة الكلسية والحصاة الطباشيرية .

حصاة القناة الصفراوية **bile duct calculus**

هي حصاة قناة الصفراء .

انظر تحت choledocholith .

حَصَيَاتٌ صَفْراوِيَّة **biliary calculi**

انظر تحت gallstone .

انظر تحت spermatic calculus .

حَصاةُ الحُوَيصلَة المَنَويَّة **gonecystic calculus**

انظر تحت spermatic calculus .

حَصاةٌ دَمَويَّةُ المَنْشأ **hematogenic calculus**

حَـصـاةٌ دَمَـويَّة **hemic calculus**

حصاة تتنامى من جُلطة دموية .

حَصاةٌ كبذرالقنَّب **hemp seed calculus**

حصاة أوكساَلاتية صغيرة ملساء ذات حجم مشابه لبذر القنب .

حَصاةٌ كَبديَّة **hepatic calculus**

حصاة صَفَراوية تتشكل في القنوات الصفراوية داخل الكبد .

حَصاةٌ نيلَجيَّة **indigo calculus**

حـصـاة تتَشكل من أكسـدة إنديكان البـول ، والانديكان هو ملح البـوتاسيـوم الموجـود في المثانة . تسمى أيضا الحصاة المتكيسة (Pocketed Calculus) .

حَصاةٌ دُهْنيَّة **fatty calculus**

ترسبات كَلسية ضمن النسيج الدهني .

حَصاةٌ فبْرينيَّة **fibrin calculus**

حـصـاة بوَلـيـة تـتـشكـل بدرجـة واسـعـة من فبرينوجين الدم .

حَصاةٌ صَهورَة **fusible calculus**


حصاة تتألف من مزيج من فسفات الكالسيوم والفسفات الثلاثية التي تنصهر إلى كتلة سوداء شبيهة بالمِيناء عندما تخضع للحرارة العالية .

حَصاةٌ مَعديَّة **gastric calculus**

تشكل حصوي في المعدة .

انظر تحت gastrolith .

قلَحٌ لثَويّ **gingival calculus**



Kidney & urinary system calculi حصيات الكلى والجهاز البولي

ترسبات كلسية تشاهد بالصور الشعاعية البسيطة على المبيض أو ضمنه .

حَصاةٌ أوكْسالاتيَّة **oxalate calculus**

حصاة بولية قاسية من أوكْسالات كالسيوم ، غالباً مايكون شكلها (ملتف كالوردة) (Weddellite or Whewellite) . تغطي بعضها شوكات حادة دقيقة قد تسحج الظهارة الحويضية ، وبعضها (مثل حصيات بذر القنب والحصيات التوتية) ملساء . وتدعى أيضاً الحصيات الكلسية الأوكْسالاتيَّة .

حَصاةٌ بَنْكرياسيَّة **pancreatic calculus**

حصاة تتشكل في القناة البنكرياسية من كربونات الكالسيوم وبعض الأملاح والمواد العضوية .

حَصاةٌ فُسْفاتيَّة **phosphate calculus**

حصاة بوليَة تتركب من الفسفات ، ومنها الحصاة البروشيتية والستروفيتية أوالوايتلوكيتية ، مع أوكْسالات الكالسيوم ؛ ربما تكون صلبة أو رخوة أو سهلةَ التفتت ، ومن الممكن أن يكون كبيرة جداً وتملأ الحويضة والكؤوس الكلوية .

حَصاةٌ فُسْفاتيَّة **phosphatic calculus**

حصاة بولية تتركب من الفسفات ومنها الحصاة البروشيتية والستروفيتية أو الوايتلوكيتية ، سوية مع أوكْسالات الكالسيوم ؛ ربما تكون صلبة أو رخوة أو سهلةَ التفتت ، وكبيرة جداً وقد تملأ الحويضة والكؤوس الكلوية .

حَصاةٌ مُتكَيِّسَة **pocketed calculus**

(=encysted calculus)

انظر تحت encysted calulus .

حَصاةُ القُلْفَة **preputial calculus**

(=postholith)

انظر تحت postholith .

حَصاةٌ كُلْوِيَّةٌ أوَّلِيَّة **primary renal calculus**

حَصاة تتشكل في السبيل البولي السليم بدرجة واضحة ، وعادة ماتتركب من الأوكسالات أو اليورات .

العرق والبول .

حَصاةٌ معَوِيَّة **intestinal calculus**

حصاة تتَموضع في المعي .

انظر تحت enterolith .

حَصاةٌ مَفْصليَّة **joint calculus**

انظر تحت articular calculus .

حَصاةٌ دَمْعيَّة **lacrimal calculus**

توجد في الغدة الدمعية أو القناة الدمعية . وتسمى أيضا حصاة كيس الدمع أو حصاة القنية الدمعية (Dacryolith) .

حَصاةٌ لَبَنيَّة **lacteal calculus**

(= **حَصَاةٌ ثَدْيِيَّة**) **(=mammary calculus)**

حصاة في أحدَ القنوات المفرزة أو الناقلة للبن .

حَصاةٌ رئَويَّة **lung calculus**

1 ـ حصاة رئوية (Pneumolith) .

2 ـ حصاة قصبية (Broncholith) .

حَصاةٌ ثَدْيِيَّة **mammary calculus**

حصاة فيَ أحد القنوات المفرزة أو الناقلة للبن ، وتدعى أيضاً الحصاة اللبنية .

حَصاةٌ مَطْرِسيَّة **matrix calculus**

حصاة بوَليَة بيضاء اللون مائلة للصفرة إلى تسفع خفيف (اسمرار لون الجلد بالشمس) لها قوام المعجون ، تحتوي أملاح الكالسيوم ، ولكنها تتكون بدرجة رئيسية من محتوى مطرسي عضوي من البروتينات المخاطية وعديد السكاريد المخاطي الكبريتي .

حَصاةٌ استْقْلابيَّة ؛ حَصاةٌ أَيْضيَّة **metabolic calculus**

حصاة تتكوَن بعد عملية الأيض .

حَصاةٌ توتيَّةُ الشَّكْل **mulberry calculus**

حصاة أوكسالاتية قاسية ملساء ، تشبه التوت .

حَصاةٌ أَنْفيَّة **nasal calculus**

انظر تحت rhinolith .

حَصاةٌ كُلْوِيَّة **nephritic calculus**

(=renal calculus)

انظر تحت renal calculus .

حَصاةٌ مَبيضيَّة **ovarian calculus**

الحصاة المصلية (Serumal calculus) .

حَصاةٌ نصْفيَّةُ التَّبَلْوُر **submorphous calculus**

حصاةَ تتكون من جزيئات من الملح البللورى ومن جزيئات المادة الغروانية التي تحتوي الملح .

حَصاةٌ فَوقَ اللِّثَة **supragingival calculus**

حصاة تغطي السطح التاجي للسن حتى العرف اللثوي الهامشي ، وتدعى أيضاً الحصاة اللعابية (Salivary calculus) .

حَصاةُ اللَّوزَة **tonsillar calculus**

انظر تحت tonsillolith

حصاة ثلاثية الفسفات **triple phosphate calculus**

هي حصاة ستروفيتية .

انظر تحت struvite calculus .

حَصاةٌ يُوراتيَّة **urate calculus**

حصاة تتَركب من اليورات ، عادة ماتكون ملساء ومدورة و لونها أصفر بني ، وتتواجد بشكل رئيسي لدى الولدان والرضع الصغار .

حَصاةُ الحالب **ureteral calculus**

حصاة فيَ الحالب لها أعراض متفاوتة بحسب الجنس و موضع الاستقرار .

حَصاةُ الإحْليل **urethral calculus**

حصاةَ في الإحليل ، لها أعراض تتفاوت بحسب الجنس وموضع الاستقرار .

حَصاةٌ يوريكيَّة **uric acid calculus**

حصاة بوليَة قاسية صفراء اللون أو صفراء ضاربة إلى الحمرة تتألف من حمض اليوريك .

حَصاةٌ بَوليَّة **urinary calculus**

حصاة في أي جزء من السبيل البولي ، أو الحصوات المثانية تلك التى تستقر في المثانة ، أو الحصوات الكلوية تلك التى تستقر في الحويضات الكلوية و تسمى الأنماط الشائعة بحسب محتواها الأساسي مثل الحصيات الأوكسالاتية ، والحصيات الفسفاتية ، وحصيات حمض اليوريك .

حَصاةٌ بَوليَّةٌ شَحْميَّة **urostealith calculus**

حصاة بولَية تتشكَل من مادة دهنية .

حَصاةٌ بروستاتية **prostatic calculus**

حصاة تتشكل في البروستاتة بدرجة رئيسية من كربونات الكالسيوم والفسفات .

حَصاةٌ كُلْويَّة **renal calculus**

حصاة موجودة في الكلية .

1 ـ قَلَحٌ لُعابيّ **salivary calculus**
2 ـ حَصاةٌ لُعابيَّةٌ

1 ـ حصاة لعابية (sialolith) .

2 ـ حصاة فوق اللثة (supragingival calculus) .

حَصاةٌ كُلْويَّةٌ ثانَويَّة **secondary renal calculus**

حصيات تتكوَن في السبيل البولي وتكون مصاحبة للعدوى والانسداد ، عادة ماتتركب من فسفات المغنيزيوم الأمونيومي .

حَصاةٌ مَصْليَّة **serumal calculus**

حصاة تحت اللثة ، وتدعى حصاة مصلية بافتراض أنها تنجم عن نضح المصل .

حَصاةُ الشِّيلاك **shellac calculus**

حصاة معدية تنجم عن شرب الورنيش الشيلاكي (الصمغي) ، والورنيش هو مادة راتنجية تستخدم في الطلاء العازل والواقي .

حَصاةٌ مَنَويَّة **spermatic calculus**

حصاة في الحويصلة المنوية ، وتدعى أيضاً حصاة الحويصلة المنوية .

حَصاةٌ مَرْجانيَّة **staghorn calculus**

حصاة في حويضة الكلية ، عادة ما تمتد إلى الكؤوس العديدة .

حَصاةٌ مَعديَّة **stomachic calculus**

حصاة تتكَون في المعدة .

حَصاةٌ ستْروفيتيَّة **struvite calculus**

حصاة بولية ستروفينية ، ترى عندما تصاب حويضة الكلية بالجراثيم الشاطرة لليوريا مثل الجرثومة المتقلبة (Proteus) ، وتدعى أيضا الحصوة المعدية .

1 ـ قَلَحٌ تَحْتَ اللِّثَة **subgingival calculus**
2 ـ حَصاةٌ تَحْتَ اللِّثَة

حصاة تتوضع أسفلَ العرف اللثوي الهامشي ، وعادة في جيبة دواعم السن . وتدعى أيضاً

تنظيم الشبكة الخيطية .

Caldwell-luc operation **عملية كالدويل لوك**

[عملية منسوبة للطبيب جورج w كالدويل (George W.Caldwell) ، وهو طبيب أمريكي عاش مابين 1818-1970 ، والطبيب هنري لوك (Henri Luc) ، وهو طبيب أمراض حنجرة فرنسي عاش مابين 1855-1925] .

انظر تحت operation .

Caldwell-Moloy classification **تصنيف كالدويل مولوي**

[تصنيف منسوب للطبيب ويليام إدجار كالدويل (William Edgar Caldwell) . وهو طبيب مولد أمريكي عاش مابين 1880-1943 ، والطبيب هوارد كارمان مولوي (Howard Carmen Moloy) ، وهو طبيب مولد كندي عاش مابين 1903-1953] ، وهو تصنيف للحوض الأنثوي وفقا لأبعاده .

انظر تحت classification .

Caldwell's position **وضعية كالدويل**

[وضعية منسوبة للطبيب يوجين ويلسون كالدويل (Eugene wilson caldwell) ، وهو أخصائي أشعة أمريكي عاش مابين 1870-1918] .

انظر تحت position .

Calef. (=calefac) **يُدفّأ (صيدلة)**

مصطلح من اللغة اللاتينية (calefectus) ، بمعنى يدفأ ، أو يجعل ساخناً.

calefacient **مُدفئ**

1 ـ مدفئ أي يسبب الإحساس بالدفء .

2 ـ عامل يسبب الإحساس بالدفء

Calendula **آذَرْيون**

(جِنسُ نباتٍ مِنَ الفصيلةِ المركّبة)

أحد أجناس النباتات الزهرية المركبة (الفصيلة المركبة) ، وزهور الآذريون المجففة ، وآذريون الحدائق ، تكون منبهة ومحللة ، كان يستعمل فيما مضى خارجياً لمعالجة الآفات للجلد

uterine calculus **حَصاةٌ رَحميّة**

حصاة دَاخل الرحم تتشكل بدرجة كبيرة من تكلسات ورمية . وتدعى أيضاً حصاة الرحم (Womb stone) .

vesical calculus **حَصاةٌ مَثانيَّة**

حصاة توجَد في المثانة .

vesicoprostatic calculus **حَصاةٌ مَثانيَّةٌ بروستاتية**

حصاة بروستاتية ممتدة إلى المثانة .

weddellite calculus **حصاة ودلايتية**

نمط شائع من الحصيات الأوكسالاتية ، تحتوي الودلايت ، وهو أوكسالات الكالسيوم ثنائية الهيدروكسيل وترى تلك الحصاة في الحصيات البولية .

whewellite calculus **حصيات الوويلايت**

نمط شائع من الحصيات الأوكزالاتية يحتوي الوويلايت ، وهو أوكسالات الكالسيوم أحادي الهيدروكسيل ، وترى في الحصيات البولية .

witlockite calculus **حصيات الوايت لوكايت**

حصيات بولية تتألف من الوايت لوكايت ، وهو نوع من فسفات الكالسيوم ثلاثي القاعدة وتتواجد تلك الحصيات في الحصيات البولية .

xanthic calculus **حَصاةٌ زَنْتينيَّة**

حصاة بوليَة تتركب من الزانثين بنسبة كبيرة

Caldani's ligament **رباط كلداني**

[رباط منسوب للطبيب ليوبولدو ماركو أنطونيو كلداني (Leopoldo Marcantonio Caldani) ، وهو مشرح إيطالي عاش مابين 1725-1813] ،

انظر تحت ligament .

caldesmon **كالديسمون**

بروتين له شكلان متساوقان : أحدهما ذو وزن جزيئي عال يوجد في العضلات الملساء وهو يرتبط بالأكتين والتروبوميوزين ، ويمنع ارتباط الأكتين ـ ميوزين ، ويثبط التقلص العضلي ، أما الثاني فهو ذو وزن جزيئي ضئيل يوجد في النسج اللاعضلية والخلايا التي تلعب دوراً في

ومنها أجهزة لتعيير الجرعات الدوائية

مُعَيِّرُ الجُرْعَة **dose calibrator**

جهاز لتحديد الجرعات الدوائية وتعييرها .

كأسِيّ **caliceal**

متعلق بالكأس (تجويف أو وعاء دموي شبيه بالكوب) أو مؤثر عليه.

توَسُّعُ الكأس **calicectasis**

توسع كأس من الكلية .

استِئْصالُ الكأس **calicectomy**

استئصال كأس من الكلية .

كؤوس **calices**

(ف.كأس) (sing.calix)

جمع كأس ، وفي التسمية التشريحية يستخدم هذا الجمع مثل المفرد .

كأسِيّ **calicine**

متصل أو مشابه للكأس .

فيروسي كأسي **caliciviral**

متعلق أو متسبب بالفيروسات الكأسية .

الفيروسات الكأسية **Caliciviridae**

الفيروسات الكأسية : إحدى عائلات فيروسات الرنا (RNA) ، لها فيريون غير مغلف (27-40) نانومتر في القطر ، مع 32 انخفاضاً تشبه الكأس ، في ترتيب = 3 (t = 3) ، يتألف الجينوم من جزيء أحادي مذيل بعديد الأدينيلات ذو حس إيجابي الرنا ، وزنه الجزيئي X 2.6-2.7 (1000000 ، الحجم (7.7-7.4 كيلوبايت) ، وتحتوي الفيروسات واحداً من عديدات الببتيد الكبيرة واثنين من عديدات الببتيد الصغيرة ، وتقاوم الكلوروفورم والإيثر والمنظفات الخفيفة وحالات الدهون ، بعضها يصبح غير فعال بالتريبسين . يحدث التنسخ والتجمع في الهيولى ، وتنطلق الفيريونات من الخلية المتخربة ، مجال الثوي المضيف ضيق وينتقل بالطعام المحتشر أو بالمخالطة أو بالجسيمات المنقولة بالهواء ، يوجد جنس وحيد هو الفيروس الكأسي (Calicivirus) .

والأغشية المخاطية .

ضَرْبَةُ الشَّمْس **calentura**

(=sunstroke)

هو التعرض المديد للشمس المؤدي إلى درجة من التجفاف المؤذي أو الحروق الشمسية .

الرَّبْلَة **calf**

(=sura TA)

1 ـ الربلة (Sura) ، وهي الجزء الخلفي من الساق السفلية .

2 ـ صغير البقر .

3 ـ الصغير من العديد من الأجناس الشديدة المختلفة .

الربلة الملساء **baldy calf**

ربلة ذو حالة موروثة مميتة تتصف بالثعلبة (أي فقد الشعر الموضعي) ، وتشقق الجلد وتقرحه ، وتطاول القدمين ، وفرط الإلعاب (Hypersalivation) .

الربلة البلدوجية **bulldog calf**

الولادة بربلة مع تشوهات هيكلية مميتة تتضمن الأطراف القصيرة ، وتورم القحف والحنك المشقوق .

عَظْمُ الشَّظِيَّة **calf bone**

(=fibula)

هي عظمة طويلة تقع على الحافة الخارجية للساق .

جف، مَقاس **caliber**

(القطر الداخلي لقناة أو أنبوب)

يُعَيِّر **calibrate**

يقيس ويحدد القطر ، أو يضبط قراءة جهاز ما .

تَعْيِير **calibration**

1 ـ تحديد مضبوطية أداة أو جهاز ، وعادة مايقاس التفاوت مع المعيار للتحقق من التصويبات الضرورية .

2 ـ قياس القطر الداخلي لأنبوب.

مُعَيِّر **calibrator**

جهاز تعيير وقياس الأقطار الداخلية للأنابيب أو القياسات الدقيقة الأخرى ، وله نماذج متعددة .

Calicivirus **الفيروسات الكأسية**

جنس من عائلة الفيروسات الكأسية التي تتضمن فيروس الطفحي الحويصلي الخنزيري ، والفيروس الكأسي الإنساني ، والفيروس الكأسي الهري ، وفيروسات نوروك وغيرها من الفيروسات المشابه لفيروس نوروك ، وفيروسات الالتهاب الكبدي E ، وفيروس حمى الأرانب النزفية وغير ذلك من الفيروسات التي تسبب العدوى الحيوانية .

feline Calicivirus **الفيروسات الكأسية الهرية**

إحدى أجناس الفيروسات الكأسية ، تنتقل بواسطة قطيرات الضبوب والأدوات المعدية التي تسبب مرضاً تنفسياً عند القطط .

human Caliciviruses **الفيروسات الكأسية الإنسانية**

مجموعة من الفيروسات من جنس الفيروسات الكأسية التي تتضمن فيروس نوروك وعدداً من الذراري الأخرى التي تسبب التهاب حاد محدود ذاتياً بالمعدة والأمعاء في البشر .

Calicophoron **كاليكوفورون**

جنس من المثقوبات من عائلة الفوهانيات (Paramphistomatidae) ، والتي تحتشر في كرش المجترات وأمعائها وتسبب داء الفوهانات .

caliculi **كُؤَيسات**

(sing.calculus) (ف: كُؤَيْسَة)

الجمع والمضاف إليه من كلمة كؤيس .

caliculus **كُؤَيسَة**

(pl.caliculi) (ج: كُؤَيْسات)

بنية شبيهة بالكأس (الكوب) أو بالبرعم .

caliculus gustatorius TA **الكُؤَيسَةُ الذَوقيَّة**

البرعم الذوقي : أحد الأعضاء النهائية للأعصاب الذوقية الدقيقة الشبيهة ببرميل ، تتوضع حول قواعد الحليمات الكمئية والكأسية والورقية في اللسان ، تضم العديد من الأنماط الخلوية التي تتضمن الخلايا القاعدية والخلايا الذوقية والخلايا الداعمة و من هذه الخلايا مايكون داعماً وذوقياً في آن معاً . ويسمى كذلك الكؤيسة الذوقية وجسيم شفالبة وكؤيسة الذوق والبرعومة الذوقية .

caliculus ophthalmicus **الكُؤَيسَةُ العَينيَّة**

العيني : تفرض في الجدار القاصي للحويصلة البصرية أو الحويصلة العينية ، يواكب النمو الحافوى السريع والإنتاج لكأس مزدوج الطبقة ، يلتصق بالدماغ البيني بوساطة السويقة النبيبية . ويسمى كذلك الكؤيس العيني والقديح البصري .

caliectasis **توَسُّعُ الكأس**

توسع في الكأس .

انظر تحت calicectasis .

caliectomy **استِئصالُ الكأس**

انظر تحت calicectomy .

californium **الكاليفورنيُوم**

(العُنْصُرُ الثّامِنُ والتّسْعُون)

[أتت التسمية من كاليفورنيا (وهي ولاية وجامعة) حيث أنتج للمرة الأولى] ، وهو عنصر كيميائي رقمه الذري 98 ، ووزنه الذري 249 ، ورمزه Cf ، ينتج بواسطة تشعيع نظير الكوريوم ذي الوزن الذري 242 مع أيونات الهليوم ، العمر النصفي 45 دقيقة .

calipers **فِرْجار**

(لِقِياس الثّخانة)

فرجار ذو شعبتين مقوستين أو منحنيتين يستعمل لقياس الثخانة أو القطر لشيء جامد .

skinfold calipers **فِرْجارُ ثَنْيَة الجِلْد**

فرجار مصمم لقياس ثنيات الجلد .

calisthenics **رياضَة تجْميليَّة**

نظام من التمارين العضلية الخفيفة لتعزيز القوة والرشاقة .

calix **كأس**

(pl.calces) (ج: كؤوس)

كأس ، والجمع كؤوس ، وهي بنية شبيه بالكوب .

أجسام كول إيكسنر **Call-Exner bodies**

(في أورام المبيض)

[أجسام منسوبة للطبيب ، فريدريخ فون كول (Friedrich Von Call) ، وهو طبيب نمساوي عاش مابين 1844-1917 ، والطبيب سجموند إيكسنر (Siegmud Exner) ، وهو طبيب نمساوي واختصاصي بالفيزيولوجيا عاش مابين 1846-1947] .

انظر تحت body .

مستضد الابيضاض الدموي اللمفاوي الحاد الشائع **CALLA**

مستضد الابيضاض الدموي اللمفاوي الحاد الشائع (Common acute lymphoblstic leukemia antigen).

بتر الركبة بحسب كالاندر **Callander's amputation**

[بتر منسوب للطبيب لاتيمر كالاندر (Latimer Callander) ، وهو جراح أمريكي عاش مابين 1892-1947] .

انظر تحت amputation

جُزيرات كاليها **Calleja's islands** (islets)

[جزيرات منسوبة للطبيب جوليان كاليها ئي سانشيز (Juliun Calleja y Sunchez) ، وهو مشرح إسباني عاش مابين 1836-1913] ، وهي مجموعات محدودة من خلايا هرمية متعددة الأشكال في القسم الخلفي من المادة المثقبة الأمامية .

انظر تحت island .

كالِيكرين **callicrein (=kallikrein)**

(إنزيم حال للبروتين في الدم) .

خَوتع **Calliphora**

(جِنسُ ذبابٍ مِنْ فصيلةِ الخَوتعيَّات)

جنس من الذباب الكاسح (Scavenger flies) من فصيلة الخوتعيات التي تتضمن الخومع ، وهو ذباب يضع بيضه في المواد المتحللة والجروح وفوهات الجسم ، تضع عدة أنواع

الكؤوس الكلوية **calices renales**

هي أرداب للحويضات الكلوية التي تطوق الأهرامات الكلوية ، وتسمى كذلك الكؤوس الكلوية و أقماع الكلية .

الكؤوس الكلوية **renal calices**

هي أرداب للحويضات الكلوية التي تطوق الأهرامات الكلوية ، وتسمى كذلك الكؤوس الكلوية و أقماع الكلية .


الكؤوس الكلوية ، الكبيرة **renal calices, greater**

الكؤوس الكلوية الكبيرة **renal calices , major**

إثنان أو أكثر من التقسيمات الأكبر للحويضة الكلوية ، تنفتح ضمنها الكؤوس الكلوية الصغيرة .

الكؤوس الكلوية الصغيرة **renal calices , minor**

عدد متفاوت من التقسيمات الأصغر للحويضة الكلوية التي تنطوي على الأهرام وتنفتح على الكؤوس الكبيرة .



كاليكوفورون **Calicophoron**

متعلق بالجسم الثفني (Corpus Callosum) .

كاللوزيلازما **Calloselasma**

جنس من الحيات السامة من عائلة الحرابيش ، ومنها نوع يدعى أفعى الحفر الملايى (الماليزي) ، والذي يتواجد في آسيا الجنوبية ، وماليزيا ، وأندونيسيا ، والذي عضته تكون مميتة للإنسان .

دُشْبُذ **callositas**

نسيج صلب يتكون فى منطقة انكسار العظام فى مرحلة الترميم .

دُشْبُذ **callosity**

انظر تحت callositas .

ثفنِيٌّ حافويّ **callosomarginal**

متعلق بالجسم الثفني والتلافيف الحافوية (Marginal gyri) .

الثَّفنِيّ **callosum**

(= الجِسْمُ الثَّفنِيُّ)

الجسم الثفني (Corpus Callosum) وهو أشرطة واسعة من الألياف العصبية تصل نصفي كرة المخ .

ثفنِيّ **callous**

قاس مثل الثفن .

1ـ ثفن **callus**

2ـ دُشْبُذ (نسيج صلب يتكون في منطقة انكسار العظام في مرحلة الترميم)

1ـ فرط تنسج متموضع في الطبقة المتقرنة من البشرة ؛ ينجم عن الضغط والاحتكاك ، ويسمى أيضاً الدشبذ ، أو التقران ، أو الثغن . انظر أيضاً فرط التقرن (Hyperkeratosis) وتقرن الجلد (Keratoderma) .

2ـ شبكة غير منتظمة الشكل من العظم المحبوك المتنامي على الجلطة الفبرينية الأصلية ، والتي تتشكل بعد كسر العظم ويحل محلها بصفة سوية العظم القاسي البالغ إلى درجة كبيرة ، وتدعى الدشبذ العظمي .

3ـ كتلة من النسج الناشئة على الجرح أو قاعدة القطع .

دُشْبُذٌ عَظْمِيّ **bony callus**

البيوض في الجروح أو الصوف ، تسبب النغف الجلدي (Cutaneous myiasis) ، ومن أنواعها الخوتعية الزرقاء ، والخوتعية الحمراء الرأس ، والخوتعية الأسدية ، والخوتعية المقيئة .

الخَوتَعُ المُقَيِّء **Calliphora vomitoria**

ذبابة خومعية شائعة ، والتي قد تغزو يرقاتها الحفرة الأنفية أو تحدث النغف المعوي .

الخوتعية **calliphorid**

عضوَ في الخوتعيات (فصيلة من الذباب)

الخَوتعِيَّات **Calliphoridae**

(فصيلة من الذُّباب)

فصيلة من الحجم المتوسط إلى الكبير من الذباب من رتبة ذوات الجناحين ، التي تتضمن الأجناس التالية : المصفَّقرة (Auchmeromromyia) ، منهكة البقر (Booponus) ، الخوتع (Calliphora) ، المورم ، المتحلزة ، الذهبية ، الخشف ، الأخيضر ، اليسف (Phormia) . تعدَ جميع الأنواع ناقلة للعوامل الممرضة وقد تسبب النغف الجلدي عند الإنسان والحيوانات المنزلية .

سائل كاليسون **Callison's fluid**

[سائل منسوب للطبيب جيمس كالّيسون (James S.Callison) ، وهو طبيب أمريكي ولد عام 1873] . وهو محلول من الماء المقطر ، وزرقة الميثيلين بحسب لوفلر ، ومحلول الفورمالدهيد ، والجليسرين ، وأوكسالات الأمونيوم ، وكلوريد الصوديوم يستخدم كمخفف في عدد الكريات الحمراء .

انظر تحت fluid .

كاليستا **Callista**

جنس من المحاريات ، هو كاليستا برڤسفوناتا (Callista brevisphonata) كانت سبب التسمم بالكاليستين المحاري في اليابان .

المتحلزة **Callitroga**

(=Cochliomyia)

جنس ذباب من فصيلة الخوتعيات.

ثفنِيّ **callosal**

دُشْبُذٌ لِيفيّ **fibrous callus**

دُشْبُذٌ غائر **inner callus**

(= **دُشْبُذٌ مَرْكَزِيّ**) **(=central callus)**

دشبذ احتياطيّ وقتي يتشكل ضمن الجوف النخاعي للعظم المكسور ؛ ينشأ عن الخلايا التي تغطي بطانة العظم والسطوح التربيقية القريبة من الكسر ، ويدعى أيضاً الدشبذ الداخلي ، أو الدشبذ النقيي ، أو الدشبذ النخاعي .

دُشْبُذٌ مُتَوَسِّط **intermediate callus**

(= **دُشْبُذٌ نهائيّ**) **(=definitive callus)**

انظر تحت definitive callus .

دُشْبُذٌ داخليّ **internal callus**

(= **دُشْبُذٌ مَرْكَزِيّ**) **(=central callus)**

دشبذ احتياطيّ وقتي يتشكل ضمن الجوف النخاعي للعظم المكسور ؛ ينشأ عن الخلايا التي تغطي بطانة العظم والسطوح التربيقية القريبة من الكسر ، ويدعى أيضاً الدشبذ الداخلي ، أو الدشبذ نقيي المنشأ ، أو الدشبذ النخاعي .

دُشْبُذٌ لُبِّيّ **medullary callus**

(= **دُشْبُذٌ مَرْكَزِيّ**) **(=central callus)**

انظر تحت central callus .

دُشْبُذٌ نقيي المَنْشَأ **myelogenous callus**

(= **دُشْبُذٌ مَرْكَزِيّ**) **(=central callus)**

دشبذ احتياطيّ وقتي يتشكل ضمن الجوف النخاعي للعظم المكسور ؛ ينشأ عن الخلايا التي تغطي بطانة العظم والسطوح التربيقية القريبة من الكسر ، ويدعى أيضاً الدشبذ الداخلي ، أو الدشبذ نقيي المنشأ ، أو الدشبذ النخاعي .

دُشْبُذٌ دائم **permanent callus**

انظر تحت definitive callue .

دُشْبُذٌ مَرْحَلِيّ **provisional callus**

دشبذ وقتي يتشكل ضمن الجوف النخاعي وحول نهايات العظم المكسور ، والذي يمتص كاملاً عندما يتم إصلاح العظم .

دُشْبُذٌ مُؤَقَّت **temporary callus**

(= **دُشْبُذٌ مَرْحَلِيّ**) **(=provisional callus)**

دشبذ وقتي يتشكل ضمن الجوف النخاعي

انظر تحت callus .

دُشْبُذٌ مَرْكَزِي **central callus**

دشبذ احتياطي وقتي يتشكل ضمن الجوف النخاعي للعظم المكسور ، ينشأ عن الخلايا التي تغطي بطانة العظم والسطوح التربيقية القريبة من الكسر ، ويدعى أيضاً الدشبذ الداخلي ، أو الدشبذ النقيي ، أو الدشبذ النخاعي .

دُشْبُذٌ نهائيّ **definitive callus**

نضحة تتشكل بين النهايات المكسورة للعظم ، وتكون دائمة وتتبدل إلى عظم حقيقي ويدعى أيضاً الدشبذ المتوسط و الدشبذ الدائم .

دُشْبُذٌ مُغَمِّد **ensheathing callus**

دشبذ مرحلي وقتي يشكل غمداً حول نهايات شدف العظم المكسور .

دُشْبُذٌ ظاهر **external callus**

طوق من الدشبذ يتشكل بسمحاق العظم الطويل .



Callus دُشبذ

جنس من الذباب الأمـــريكي الجنوبي الذي تعيش يرقاته أحياناً في أمعاء الإنسان .

calomel **كالوميل**

الاسم الكيـــمـــيــائي لكلوريد الزئبق ، وهو مسحوق ثقيل ، أبيض ، لا رائحة له ، غير قابل للجس (مسحـوق طهـمل أي ليس له حـجم بالجس (HgCl)) ، لا يذوب في الماء أو الكحول أو الإيثر والأحماض المخففة الباردة ، نادراً ما يستعمل كمسهل .

calor **حَرارَة**

أحد العلامات الرئيسية للالتهاب .

calor febrilis **حَرارَةُ الحُمَّى**

حرارة الحمى .

calor fervens **حَرارَةٌ عاليَة**

حرارة شَديدة .

calor innatus **حَرارَةُ الجِسْمِ الطَّبيعيَّة**

الحرارة الَطبيَعية للجَسم .

calor internus **حَرارَةُ بَاطِنِ الجِسْم**

الحرارة الدَاخليَة للجسم .

calor mordax **حَرارَةٌ لاذِعَة**

1 ـ لسعةَ الحرارة أو ضربة الحرارة .

2 ـ جلد متلون بالأحمر وساخن و ملتهب يوجد في الحمى القرمزية .

calor mordicans **حَرارَةٌ لاذِعَة**

انظر تحتَ calor mordax .

caloradiance **الأَشِعَّة الحَراريَّة**

الإشعاعات أو الأشعة التي تقع بين 250-55.000 ميلي مكرون ، مثل أشعة الشمس ، والأقواس الفحمية ، والعيدان والأسلاك المتوهجة ، والأجسام السوداء الحارة .

calorescence **لَمَعانٌ حَراريّ**

تحول الأشعة الحرارية غير اللماعة إلى الأشعة الحرارية اللماعة .

calori- **سابقة بمعنى حراري**

سابقة أو لاحقة تبين العلاقة مع الحرارة .

Calori's bursa **جراب كالوري**

[جـراب منسـوب للطبيب ، لوجي كـالوري

وحول نهايات العظم المكسور ، والذي يمتص عندما يتم الشفاء والإصلاح الكامل للعظم .

calmant **مُهَدِئ**

(=sedative)

تعبير قديم حل محله تعبير (Sedative) ، وهو العامل الدوائي الذي يؤدي إلى تهدئة المريض المتهيج عصبياً ونفسياً .

calmative **مُهَدِىء**

العامل المؤدي إلى تهدئة الجهاز العصبي والنفسي للمريض المتهيج .

Calmette-Guerin bacillus **عصيات كالميت جيران**

[عصيات منسوبة للطبيب آلبيرت ليون شارل كالميت (A.L.C. Calmette) ، وهو اختصاصي جراثيمي فرنسي عاش مابين 1863-1933 ، والطبيب كاميل جيران (Camille Guerin) وهو اختصاصي جراثيمي فرنسي عاش مابين 1872-1961] .

انظر تحت bacilli Calmette-Guérin .

Calmette s test, vaccine **اختبار، أو لقاح كالميت**

[لقاح منسوب للطبيب آلبيرت ليون شارل كالميت (A.L.C. Calmette) ، وهو اختصاصي جراثيمي فرنسي عاش مابين 1863-1933] .

انظر تحت BCG Vaccine .

calmodulin **كالمودُولين**

(برُوتِينٌ رابِطٌ لِلكالسيُوم)

بروتين رابط للكالسيوم واسع الانتشار في الخلايا ذو النواة الحقيقية ، ويعمل كوسيط لمختلف الاستجابات الخلوية للكالسيوم . يعمل معقد الكالمودولين ـ الكالسيوم كرسول ، ويؤثر على فعالية العديد من الإنزيمات والبروتينات اللاإنزيمية ، والتي تتضمن مضخة الكالسيوم ، وعدة كينازات بروتينية نوعية ، والنوكليوتيدات الحلقية للفسفودايستيراز (إنزيم) والسبكترين والهيستونات والتوبولين (البروتين المكون للنبيبات الخلوية) .

Calobata **القَلْبَاطَة**

(جِنْسُ ذُبابٍ أَمْريكِي)

كيلوجرام واحد من الماء درجة واحدة مئوية (سيليسيوس) من 14.5 إلى 15.5 تحت ضغط جوي مقداره واحد ، واختصاره (kg-cal) ، ويسمى كذلك كيلو كالوري ، ويستعمل أيضاً للتعبير عن قيمة الوقود أو القيمة الحرارية للطعام .

كالُوري مُتَوَسِّط **mean calorie**
(= 100 كالوري صغير)

جزء من المئة (عشير) من الحرارة اللازمة لرفع درجة جرام واحد من الماء من درجة الصفر المئوي إلى درجة مئة مئوية .

كالُوري صَغير **small calorie**

مقدَار الحرَارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة واحدة سيليسيوس ، وبصفة خاصة من 14.5 إلى 15.5 مئوية تحت ضغط جوي مقداره واحد ، واختصاره (g-cal) ، ويسمى كذلك جرام كالوري والكالوري المعياري .

كالُوري عياري **standard calorie**
(= كالُورَي صَغير) **(=small calorie)**

انظر تحت small calorie .

كالُوري حَراريٌ كيميائيّ **thermochemical calorie**

وحدة حرارية تعادل 4.184 جولاً.

مُوَلّدُ الحَرارَةِ **calorifacient**

مايولد الحرارة ، يقال بعض الأطعمة والتي لها فعل حراري .

مُوَلّدُ الحَرارَةِ **calorific**

منتج للحرارة .

تَوليدُ الحَرارَةِ **calorigenesis**

عملية توليد وإنتاج الحرارة من مصادر الطاقة .

مُوَلّدُ الحَرارَةِ **calorigenetic**

انظر تحت calorrigenic .

مُوَلّدُ الحَرارَةِ **calorigenic**

يولد الحرارة أو الطاقة ، يزيد انتاج الحرارة أو الطاقة ، يزيد استهلاك الأوكسجين .

مِقياسُ الكالوري ؛ مِكلار **calorimeter**

(Luigi Calori)، وهو مشرح إيطالي *[1896-1807]* ، وهو جراب بين الرغامى وقوس الأورطي .

انظر تحت bursa .

حَراريّ **caloric**

متعلق بالحرارة أو الكالوري (السعرات) .

الإحْرار **caloricity**

قدرة جسم الحيوان على تنمية الحرارة ومداومتها .

كالوري **calorie**
(سُعْرَة، حريرة)

إحدى الوحدات الحرارية الخاصة التي تعرّف بمقدار الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة كيلو جرام من الماء درجة واحدة مئوية (سيليسيوس) عند حرارة محددة ، إن الكالور d المستخدم في الكيمياء والكيمياء البيولوجية يعادل 4.184 جولاً ، رمزه (cal) .

ملاحظة : كان التفريق في السابق بين الكالوري الصغير المعرف سابقاً ، وبين الكالوري الكبير الذي يكتب الحرف الأول منه كحرف كبير ويختصر (Cal) ، والذي يعادل ألفاً من الكالوري الصغير أو يساوي كيلوكالوري ، ولم يبق للكالوري الكبير من استعمال إلا في التغذية . أما الآن فعادة مايكتب بحرف c الصغير الذي يعني كيلو كالوري عندما يحدد الطاقة الموجودة في الطعام .

كالُوري صَغير **gram calorie**
(=small calorie)

انظر تحت small calorie .

الجدول الدولي للكالوري **IT calorie**

الجدول الدولي للكالوري (International Table Calorie) ، وهي وحدة من الحرارة تعادل 4.1868 جول .

كالوري كَبير **large calorie**
(= 1000 كالوري صغير)

الكالوري المستعمل في الدراسات الاستقلابية ، ويحدد بمقدار الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة

قياس كمية الحرارة الناتجة عن شخص بواسطة تعيين مقدار الأكسجين المستهلك وتعيين كمية النتروجين وثاني أكسيد الكربون المنصرف .

بَزْلٌ بالحَرارة **caloripuncture**

عملية البزل أو اختراق الجدار التشريحي للبطن مثلاً باستخدام الحرارة .

مُبَيِّنُ الكالوري **caloriscope**

(جهاز لبيان الكالوري في أغذية الأطفال)

جهاز لبيان قيمة الكالوري في توليفات من طعام الرضع .

مُتَّجِهٌ للحَرارة **caloritropic**

متوجه للحرارة أو محب للحرارة .

كالوري **calory**

(=Calorie)

انظر تحت calorie .

مثلث كالو **Calot's triangle**

[مثلث منسوب للطبيب جون ـ فرنسيس كالو (Jean-Francois Calot) ، وهو جراح فرنسي ، 1861-1944] .

انظر تحت triangle .

قَلَنْسُوَة **calotte**

1 ـ جزء شبيه الشكل بالقلنسوة الجمجمية .

2 ـ في طب العين ، النموذج قلنسوي الشكل ، والذي ينتـزع من المقلة للفحص الخلوي الباثولوجي .

3 ـ في التشريح ، هي القسم العلوي من القبة .

كالبين **calpain**

وهو بروتيناز الخلايا حقيقية النواة المفعلة للكالسيوم ، والتي تضع هي نفسها عدة إنزيمات خلوية ، تؤثر في الكريات الحمراء على عدة بروتينات هامة في تعيين الشكل وقابلية تغيير الشكل .

كالريتوكولين **calreticulin**

بروتين مرتبط بالكالسيوم ذو ألفة عالية وزنه (kDa 55 -65) ، يوجد في الشبكة الهيولية العضلية ، ويوجد أيضاً في الشبكة الهيولية الباطنة في الخلايا اللاعضلية ، تتضمن وظائفه

جهاز لقياس كمية التبادل الحراري في أى نظام (جهاز) ، وفي الفيزيولوجيا جهاز لقياس كمية الحرارة التي ينتجها فرد ما .

مِقْيَاسُ الكالوري القُلِّيّ **bomb calorimeter**

(مقياس ذو حاوية تحوي الأكسجين)

جهاز لقياس الطاقة الكامنة في الطعام ، توضع كمية موزونة من الطعام في صحن من البلاتين ضمن وعاء فولاذي مجوف (قُلَّة) مملوء بالأكسجين النقي . تمتص الحرارة الناتجة عن احتراقها بوساطة كمية معروفة من الماء الذي يغطس فيه الوعاء (القلة) سامحا لقياسه .

مِقْيَاسُ الكالوري المُعاوِض **compensating calorimeter**

جهاز يفحص فيه المادة ، مثل نمو الدجاجة في البيضة ، حيث توضع المادة عند إحدى الموصلات المكونة من مزدوجة حرارية وتوضع مقاومة كهربائية عند الأخرى . ومن خلال كمية التيار التي يجب أن يمر خلال المقاومة ليحفظ كلا من الموصلين عند نفس درجة الحرارة (كما يوضح بنقص التيار في دارة المزدوجة الحرارية) فمن الممكن حساب كمية الحرارة المتولدة في الشيء تحت الاختبار .

مِقْيَاسُ الكالوري التَّنَفُّسِيّ **respiration calorimeter**

مقياس الحرارة التنفسي الذي يقيس درجة الحرارة في الجهاز التنفسي .

متعلق بِمِقْيَاس الكالوري **calorimetric**

متعلق أو يؤدى بمقياس الكالوري .

قِياسُ الكالوري **calorimetry**

قياس كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة .

قِياسُ الكالوري التَّفَرُّسيُّ التَّفْريقيّ (كيمياء) **differential scanning calorimetry**

قِياسُ الكالُوري المُباشر **direct calorimetry**

قياس كمية الحرارة الناتجة عن الشخص المحبوس في غرفة صغيرة .

قِياسُ الكالُوري اللامُباشر **indirect calorimetry**

من العظم القذالي والعظمان الصدغيان ، ويسمى كذلك قلنسوة الجمجمة ومحارة القحف .

قبيّ **calvarial**

متعلق بالقبة .

القبَّة **calvarium**

الصَّاقوريَّة **Calvatia**

جنس من فطريات المشروم الدعامية .

الصَّاقوريَّةُ العِمْلاَقَة **Calvatia gigantea**

جنس من فطريات المشروم (الدعامية) الضخمة .

داء كالف-بيرتيس **Calve-Perthes disease**

[مرض منسوب للطبيب جاك كالف (Jacques Calvé) ، وهو جراح تقويم عظام فرنسي عاش مابين 1873-1954 ؛ والطبيب جورج كليمانس بيرتيس (Georg Clemens Perthes) ، وهو جراح ألماني عاش مابين 1896-1927 ، وهو التنكس العظمي الغضروفي في مشاشة رأس الفخذ] .

انظر تحت osteochondrosis .

المتعددة أدواراً في استتباب الكالسيوم ، والتحكم بالتنسخ في الرنا (RNA) الفيروسي ، وتفعيل الخلايا اللمفاوية وسمية الخلايا .

كالسيكويسْتِرين **calsequestrin**

(بروتينٌ رابطٌ لِلكالسيوم)

بروتين رابط للكالسيوم غني بالسلاسل الكربوكسيلية الجانبية ، موجود في السطوح الغشائية الداخلية للشبكة الهيولية العضلية ، يستخدم لخلب أيونات الكالسيوم وإدخارها .

كالوستيرون **calusterone**


علامة تجارية لمضاد إستروجيني ومقو للمفعول الأندروجيني يستعمل في معالجة الأورام خاصة لدى النساء .

كالفاسين **calvacin**

مادة مضادة للأورام ذات بروتينات مخاطية سامة .

القبَّة **calvaria TA**

القسم العلوي من القحف المشابه للقبة ، مشتق من الأغشية العصبية القحفية ويتكون من العظم الجبهي والعظمان الجداريان والأقسام الحرشفية



مثلث كالو Calot's triangle

calyculus **كُؤيسَة**

هي كل شكل تشريحي يشبه الكأس ، وقد يستعمل لجمع السائل عادة مثل الكؤيسة الكلوية ، وقد يكون تكويناً مصمتاً مثل الكؤيسة الذوقية ، وتكتب أيضاً (Caliculus) .

calyculus gustatorius **كُؤَيسَةٌ ذوقِيَّة**

برعم ذوقي فطري الشكل يشبه الكأس ، وينقل الإحساسات الذوقية كدفقات كهربية محرضة بالمواد الكيميائية المسببة للشعور بالذوق .

calyculus ophthalmicus **كُؤَيسَةٌ عَينيَّة**

جدار منخمص يشبه الكأس في جانبي رأس الجنين يتطور كل واحد منهما لتشكيل العين .

Calymmatobacterium **المُغَمَّدَة**

(جِنسٌ من الجَراثيم)

جنس من الجراثيم اللاهوائية الاختيارية السلبية الجرام ، عصوية الشكل ، ذات محفظة ، توجد بصفة مميزة ككائنات حية داخل الخلايا في هيولى البلعميات أحادية النواة ، جميعها ممرضة للإنسان .

Calymmatobacterium granulomatis **المُغَمَّدَةُ الوَرَمِيَّةُ الحُبَيبِيَّة**

نوع من الجراثيم المغمدة غير العيوشة في الأوساط الاعتيادية ، ولكن يمكن زرعها في مح البيض الطازج ، تتشابه من الناحية المصلية مع الكلبسيلات الرئوية ، وهي العامل المسبب للورم الحبيبي الأربي البشري ، ويسمى كذلك أجسام دونوفان (Donovan's body) ، والدونوفانية الورمية الحبيبية .

calyx **كأس**

(pl. Calyces) (ج: كؤوس)

مصطلح عام في التسميات التشريحية للعضو الشبيه بالكوب أو الشبيه بالجوف ، ويسمى أيضاً (Calix) .

calyces renales **الكُؤوسُ الكُلْوِيَّة**

انظر تحت calix .

calyces renales majores **الكُؤوسُ الكُلْوِيَّةُ الكَبيرَة**

Calvin cycle **دورة كالفِين**

[دورة منسوب للكيميائي ميلفين كالفين (Melvin Calvin) ، وهو كيميائي أمريكي ولد عام (1911) ، فاز بجائزة نوبل في الكيمياء عام (1961) لتطويره تقنية لتحديد التفاعلات الكيميائية لتمثيل ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى سكر في النباتات الخضراء] .

انظر تحت cycle .

calvities **صَلَع**

(=baldness)

هو الثعلبة ، حاصة (Alopecia) ، فقد الشعر الموضع .

calx TA **العقِبُ**

1 ـ العقب : البروز الأخير للقدم .

2 ـ ما يتبقى من التكلس .

3 ـ الجير أو أكسيد الكالسيوم (CaO) ، أما الجير الحي فهو قلوي حارق محدث للخشارة .

calyceal **كأسِيّ**

(=caliceal)

انظر تحت caliceal .

calycectasis **توسُّعُ الكأس**

(=calicectasis)

calycectomy **استِئصالُ الكأس**

(=calicectomy)

calyces **كؤوس**

(=calices)

جمع كأس .

calycine **كأسِيّ**

(=calicine)

calycle **كُؤَيسَة**

(=caliculus)

تصغير كأس .

calyculi **كؤيسات**

(=caliculi)

جمع كؤيسة ، وهو مكان لجمع البول من النبيبات الكلوية ، وتجتمع عدة كؤيسات لتكوين الحويضة الكلوية .

انظر تحت calices renales majores .

الكُؤوسُ الكَلْوِيَّةُ الصَغيرَة **calyces renales minores**

انظر تحت calices renales minores .

كامالانوس **Camallanus**

جنس من المسودات من طائفة الحجناوات ، وهي أنواع تتطفل على أمعاء السمك والزواحف والبرمائيات .

كامباروييدات **Cambaroides**

جنس من الإربيان (جراد البحر) الذي يأوي من خلائف الذوانب ، من جانبية المناسل (Paragonimus) وهي جنس من الديدان المثقوبة .

كامْبيندازول **cambendazole**

(دَواءٌ مُضادٌّ لِلديدان)

هو بنزيميدازول (مضاهئ طبيعي للثيتامين B_{12}) ، ويستعمل كمضاد للديدان عند الإنسان وحيوانات المزارع .

القلب **cambium**

1 ـ في النبات: الطبقة المنتجة للحاء وللخشب

2 ـ الطبقة الرخوة الداخلية من سمحاق العظم

1 ـ الطبقة الرخوة الداخلية من نسيج سمحاق العظم في التعظم داخل الغشاء للعظم .

2 ـ الطبقة الخلوية تحت اللحاء في النباتات الخشبية .

الكاميليا **Camellia**

جنس من الأشجار والشجيرات الإزهارية دائمة الخضرة من الفصيلة الشايية ، متوطنة في المناطق الحارة في آسيا . منها الكاميليا ذات الفويهين الصينية (C. sinensis) ، وهي نبتة الشاي الذي يصنع من أوراقه المجففة النوع الأشيع من الشاي .

جُدَرِيُّ الجَمَل **camelpox**

مرض طفحي عند الجمل ينجم عن الفيروسة الجدرية (Pox virus) .

1. آلَةُ التَّصْوير **camera**

2. غُرْفَة

(ج: غُرَف) (pl.camerae)

1 ـ صندوق ، أو حيز .

2 ـ غرفة : تسمية تشريحية عامة لحيز أو بطين مسور .

3 ـ جهيزة أو جهاز لتحويل الضوء أو أي طاقة أخرى من شيء ما إلى صورة مرئية .

آلة التصوير أنجر **Anger camera**

جهاز يستخدم لتكوين بتوزيع النوكلين المشع القاذف لأشعة جاما للمريض . وفيه يمر الإشعاع خلال ميزاء لتقليل التشتت والتفاعل مع بلورة يوديد الصوديوم ، وهذا يؤدي إلى إنتاج نبضات من الضوء .

الغُرْفَةُ الأماميَّةُ للعَين **camera anterior bulbi TA**

هي الغرفة الأمامية للعين ، وهي قسم من الحيز ذي المحتوى المائي بين القرنية والعدسة الذي يتحدد من الأمام بالقرنية وجزء من الصلبة ، ويتحدد من الخلف بالقزحية وجزء من الأجسام الهدبية ، وذلك الجزء من العدسة الذي يتجلى من خلال الحدقة ، ويسمى أيضاً الغرفة الأمامية العينية

غُرْفَةٌ صافيَة **camera lucida**

جهيزة بصرية تستخدم منشوراً أو مرايا مرتبة جداً لتعكس الصورة المنعكسة لشيء ما على الورق ، مما يسمح باقتفاء حدوده بالقلم .

غُرْفَةٌ مُظْلِمَة **camera obscura**

صندوق مشترك من عدسات وشاشة للعرض ، يستعمل للمشاهدة أو الاقتفاء أو صنع الصور الفوتوجرافية .

غُرْفَةُ العَين **camera oculi**

أي من غرف العين .

الغُرْفَةُ الأماميَّةُ للعَين **camera oculi anterior**

الغرفة الأمامية للعين وهي قسم من الحيز ذي المحتوى المائي بين القرنية والعدسة الذي يتحدد من الأمام بالقرنية وجزء من الصلبة ، ويتحدد من الخلف بالقزحية وجزء من الأجسام الهدبية ، وذلك الجزء من العدسة الذي يتجلى

غُرَف **camerae**

(ف: غُرْفَة) **(sing.camera)**

جمع غرفة .

قانون كاميرر **Camerer's law**

[قانون منسوب للطبيب يوهان فريدريخ ويلهلم كـاميـرر (Johann Friedrich Wilhelm Camerer) ، وهو طبيب أطفال ألماني عـاش مابين 1842-1910] .

انظر تحت low

قميصُ التَّقْييد (لتقييد المريض العنيف) **camisole (=straitjacket)**

جهـيـزة لتقـييـد الأطراف وخـاصـة الأذرع عند شـخص مـضطرب ؛ ويتـألف من قـمـيص من قـمـاش القنب ، ومن زوج من الأكـمام الطويلة التي يمكن ربطها خلف ظهر المريض ، ويدعى أيضاً سترة الحجر (للمرضى المختلين عقلياً) .

سماعة كامّان **Cammann's stethoscope**

[سماعة منسوبة للطبيب جورج فيليب كامان (George Philip Cammann) ، وهـو طـبـيـب أمـريكي عـاش مـا بين 1804-1863] ، وهي سماعة الأذنين .

كاموكين **Camoquin**

الاسم التـجـاري لمسـتـحـضـر هيـدروكـلوريد أموديـاكين ، (الأموديـاكين دواء لمعالجة الملاريا) .

جُرَيس **campanula**

أي بنية تشريحية تشبه شكل الجرس .

رباط كامبيل **Campbell's ligament**

[رباط منسوب للطبيب وليام فرنسيس كامبيل (William Francis Campbell) ، وهـو جـراح أمـريكي عـاش مـابين 1867-1926] وهو الرباط المعلق للإبط .

الكيناز البروتيني المعتمد على أحاديِّ فسفات الأدينوزين الحلَقيّ **cAMP-dependent protein kinase**

أي من مـجـمـوعـة شـديدة الارتبـاط بكيناز البروتين ، والتي تنشط بوساطة أحادى فسفات الأدينوزين الحلقي ، وتحـفـز نشـاط مـخـتلف

من خلال الحدقة .

الغُرْفَةُ الكَبيرَةُ للعَين **camera oculi major**

هي الحجرة الأمامية العينية الكائنة وراء القرنية وتمتلئ بسائل مائي ، وتتصل بالحجرة الخلفية بواسطة الحدقة العينية . وتسمى أيضاً (Camera anterior bulbi) .

الغُرْفَةُ الصَّغيرَةُ للعَين **camera oculi minor**

وهو حيز حلقي خلف القزحية يملؤه خلط مائي يمر إلى الغرفة الأمامية ليتسرب منها عبر قناة أشليم الحلقية ، وتسمى (Camera posterior bulbi) ، (camera oculi posterior) .

الغُرْفَةُ الخَلْفيَّةُ للعَين **camera oculi posterior**

انظر تحت camera posterior bulbi .

الغُرْفَةُ الخَلْفيَّةُ للعَين **camera posterior bulbi TA**

هذا قسم من الحيز ذو المحتوى المائي بين القرنية والعدسة الذي يتحدد من الأمام بالقزحية ، ويتحدد من الخلف بالعدسة والنطيقة الهدبية .

غُرْفَةُ اللُّبّ (أسنان) **camera pulpi**

غُرْفَةٌ زُجاجيَّةُ العَين **camera vitrea bulbi TA**

حيز في المقلة يحيط الخلط الزجاجي ، يتصل من الأمام بالعدسة والأجسام الهدبية ويتصل من الخلف بالجدار الخلفي للمقلة .

آلة التصوير الجامائية **gamma camera**

هي آلة التصوير الومضانية .

انظر تحت scintillation camera .

آلَةُ التَّصْوير التَّسْجيليَّة **recording camera**

هـو مـخطاط التـمـوج الفـوتوجـرافي (Photokymograph) .

آلَةُ التَّصْوير الوَمَضانيَّة **scintillation camera**

جهاز إلكتروني يتنج صوراً فوتوجرافية ، أو ينتج صوراً بوساطة أنبوب الأشعة المهبطية من انبعاثات أشعة جاما الناجمة عن الأعضاء التي تحتوي المركبات القائفة (Tracer Compounds) ؛ النمط الأصلي والأشيع والمستخدم هو « كاميرا أنجر» .

1 ـ كيتون له رائحة نفاذة مميزة وطعم لاذع ، يستخلص من خشب القرفة الكافورية أو ينتج صنعياً ، يطبق موضعياً على الجلد كمضاد للحكة وكمضاد للعدوى ويستعمل أيضاً كضرورة صيدلانية . يدعى أيضاً صمغ الكافور .

2 ـ أي مركب يمتلك مميزات مشابهة للكافور .

كافورُ الأنيسون **anise camphor**
(= أنيثول) **(=anethole)**

أنيثول .

كافورٌ اصْطِنَاعي **artificial camphor**

الكافور المحضَر من زيت التربنتين ، ويستعمل في المنتجات التجارية وكمطهر جلدي ومضاد حكة .

كافور بُورْنيُو **Borneo camphor**

يدعى أيضاً بورنيول ، وكانفول .

انظر تحت camphol .

كافورٌ نَعْناعيّ **peppermint camphor**
(= مَنْثُولٌ طَبيعيّ) **(=natural menthol)**

كافورٌ تَخْليقيّ **synthetic camphor**

كافور ينتَج من البينين ، المقوم الأساسي للتربنتين .

كافورُ السَّعْتَر **thyme camphor**
(= ثيمول) **(=thymol)**

كافورُ التِّرْبَنْتين **turpentine camphor**
(= كلوريد البورنيل) **(=bornyl chloride)**

الكافور الصناعي المستخرج من زيت التربنتين ، ويسمى أيضاً كلوريد البورنيل (bornyl chloride) .

كافور **camphora**

انظر تحت camphor .

كافوريّ **camphoraceous**

له مميزات مشابهة للكافور .

مُكوفر **camphorated**

يحتوي الكافور أو مصبوغ به .

التَّسَمُّمُ بالكافور **camphorism**

التسمم بالكافور ، وهي حالة تتسم بالاختلاج

البروتينات الموجودة داخل الخلايا عن طريق فسفتة السيرين النوعي وأجزاء الثريونين للبروتينات الأخرى . ويدعى أيضاً كيناز البروتين A ، وكيناز البروتين المعتمد على أحادى فسفات الأدينوزين الحلقي .

البَقَّم **campechy**
(=Hematoxylon)

(جنس نبات من القرنيات الفراشية) .

كامبشى **campechy**

ولاية كامبشى فى جنوب شرق المكسيك حيث يوجد البقم (جنس من الأشجار ذو القرنيات الفراشية) .

لفافة كامبر، **Camper's fascia ,**
رباط كامبر **ligament**

[لفافة منسوبة للطبيب بيتر كامبر (Pieter Camper) ، وهو طبيب هولندى ، عاش مابين 1722-1789] .

انظر تحت diaphragma urogenitale .

انظر تحت fascia .

خَطُّ كامبر **Camper s line**

خط يمتد من الحافة السفلية لجناح الأنف إلى الحافة العلوية من الزنمة الأذنية (من مجرى السمع الظاهر لما تحت الشوك الأنفي) .

كامفيكلور **camphechlor**

هو توكسافين (مبيد للحشرات الزراعية) .

كامْفين (كيمياء) **camphene**

تيربين يوجد في عدة زيوت أساسية أو محضرة صناعياً من البينين في عملية انتاج الكافور الصنعي ، وهو سام إذا ابتلع .

كامْفول (كافوربورنيو) **camphol**

مادة تسمى أيضاً كافور بورنيو ، وهو شكل نادر من الكافور ينتج من أشجار بورنيو وسومطرة ، ويشبه الكافور العادي في كونه يمكن إنتاجه بعملية الاختزال أو الإرجاع ، وهو غير رائج في التجارة الأوربية والأمريكية لكنه مرغوب جداً في الصين .

كافور **camphor**

انظر تحت syndrome .

مُنْعَطِفُ الأطراف camptomelic

متعلق بانعطاف الأطراف .

كامبتوسار Camptosar

الاسم التجاري لمستحضر هيدروكلوريد إيرينوتيكان (Irinotecan hydrochloride) .

انعِطافُ الجِذْعِ التَّشَنُّجِيُّ camptospasm

انظر تحت camptocormia .

العَطيفة Campylobacter

(جِنسٌ من الجَراثيم السلبية الجرام)

جنس من الجراثيم عصوية الشكل المنحنية أو الحلزونية تنتمي إلى الخلايا سلبية الجرام الأليفة للهواء القليل وإلى الخلايا اللاحيوائية ، اللاهواء وهي تتحرك بالسياط القطبية . توجد هذه الأحياء في الجوف الفمي والسبيل المعوي والأعضاء التناسلية عند الإنسان والحيوانات ، بعض أنواعها ممرض ، ويسبب التهاب الأمعاء ومرضاً جهازياً عند الإنسان والإجهاض عند المواشي والأغنام .

العطيفة السينادية Campylobacter cinaedi

الملوية السينادية .

العَطيفةُ القَولونِيَّة Campylobacter coli

نوع من العطيفة الذي يسبب الإسهال عند البشر .

العَطيفَةُ البرازيَّة Campylobacter fecalis

نوع غير ممرض يعزل من براز الأغنام والأعضاء التناسلية للمواشي .

العَطيفَةُ الشُّمْرِيَّة Campylobacter fennlliae

نوع يسبب الْتِهاب المستقيم والإسهال عند الذكور اللواطيين .

العطيفة المنتنة Campylobacter fetus

نوع أليف للهواء القليل يوجد منه نويعات مختلفة ، ويسمى كذلك الضمة الجنينية (Vibrio fetus) .

العطيفة المنتنة ، نويع الجنينية Campylobacter fetus Subspecies fetus

نويع يسبب الإجهاض والعقم عند المواشي ، والغيبوبة والتهاب المعدة .

مِقياسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّةِ المَرْكَزِيَّة campimeter

جهاز لموضعة القسم المركزي من ساحة الرؤية على سطح مسطح .

مقْياسُ السَّاحَة البَصَرِيَّة المُجَسَّم stereoscopic campimeter

مقياس للساحة البصرية المركزية وهو صغير محمول ذو شاشة زاوية وذو قدرة تجسيمية .

قِياسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّةِ المَرْكَزِيَّة campimetry

تعيين وجود عيوب في القسم المركزي لساحة الرؤية باستعمال مقياس الساحة البصرية .

انعِطافُ الجِذْعِ التَّشَنُّجِيُّ campospasm

بَضْعُ ساحةِ فوريل campotomy

(جراحة عصبية لمعالجة داء باركنسون)

الطريقة الجراحية التوضعية التجسيمية المسببة لآفة في ساحة فوريل ، تحت المهاد ، لتصويب الرعاش في داء باركنسون .

سابقة بمعنى الانعِطاف campto-

الجزء الطليعي من المصطلح حتى الحرف O الرابط ويدل على معنى الانحراف أو الانعطاف .

انعِطافُ الجِذْعِ التَّشَنُّجِيُّ camptocormia

تشوه استاتيكي يتضمن ثنياً قدمانياً (أمامياً) للجذع .

انعِطافُ الجِذْعِ التَّشَنُّجِيُّ camptocormy

انظر تحت camptocormia .

انعِطافُ الإصْبَعِ المُسْتَديم camptodactylia

انْعطافُ الإصبَع المُسْتَديم .

انعِطافُ الإصْبَعِ المُسْتَديم camptodactylism

انْعطافُ الإصبَع المُسْتَديم .

انعِطافُ الإصْبَعِ المُسْتَديم camptodactyly

ثني دائم ومتعسر الرد (غير مرتد) لإصبع أو أكثر .

انعِطافُ الأطراف camptomelia

انحناء في الأطراف ، ينتج تقوساً أو انعطافاً في الجزء المصاب ؛ انظر أيضاً المتلازمة الفاتلة للأطراف (Camptomelic Syndrome) .

نويع من العطائف هو السبب الشائع لالتهاب المعدة والأمعاء الجرثومي الحاد عند الإنسان ، والإجهاض العدوائي عند الخرفان ، والتهاب الكبد الطيري بالضمات عند الطيور . يوجد كذلك كمُطاعم (Commensal) عند الخنزير والمواشي والقططَ والدجاج ، ويدعى أيضاً الضمات القولونية والضمات الصائمية .

العَطِيفَةُ البَوَّابِيَّة Campylobacter pylori

انظر تحت helicobacter pylori .

العطيفة المستقيمة Campylobacter rectus

نوع مصاحب لمرض (آفات) دواعم السن ، ويعزل من عداوى نفق جذر السن ، وتسمى كذلك (Wolinella recta) .

العَطِيفَةُ البَلْغَمِيَّةُ Campylobacter sputorum

نوع غير ممرض في الظروف العادية ، يوجد منها ثلاثة نويعات ، وهي أليفة الهواء أو لاهوائية .

أحياناً تكون ممرضة للإنسان مسببة عدوى جهازية في منقوصي المناعة .

العطيفة المتتنة ، Campylobacter fetus
نويع المعوي subspecies intestinalis

انظر تحت campylobacter fetus

انظر تحت subspecies fetus .

العطيفة المتتنة ، Campylobacter fetus
نويع الصائمي subspecies jejuni

انظر تحت campylobacter jejuni .


العطيفة المتتنة ، Campylobacter fetus
النويع المنقول جنسياً subspecies veneralis

نويع يسبب الإجهاض والعقم عند المواشي .

العطيفة المعوية اللامية Campylobacter hyointestinalis

نوع يسبب التهاب الأمعاء التكاثري الخنزيري .

العطيفة الصائمية Campylobacter jejuni



العطيفة Campylobacter

يتـصف بالإجـهـاض وينقل عن طريـق الفم ، ويسمى كذلك داء الضمات الضأني التناسلي .

camsylate **كامسيلات**

من الأسـمـاء المعـتـمـدة في الولايات المتـحـدة (USAN) للتـقـلص بسـبب سلفـونات الكافـور (Camphorrsulfonate) .

Camurati-Engelman disease **داء كاموراتي- أنجلمان**

[داء منسوب للطبيب ماريو كاموراتي (Mario Camurati) ، وهو طبيب إيطالي عاش ما بين 1896-1948 ، والطبيب جويدو إنجلمان (Guido Engelmann) ، وهو جراح تشيكوسلوفاكي في القرن العشرين] ، وهو خلل التنسج الجدْلي .

انظر تحت diphyseal dysplasia.

Canada-Cronkhite syndrome **متلازمة كندا- كرونكايت**

[متلازمة منسوبة للطبيب وليام جيان كندا (Wilma Jeanne Canada) ، وهو اختصاصي أشعة أمريكي عاش في القرن العشرين ، ليوناردو كرونكايت (Leonard W. Cronkhite) ، وهو طبيب أمراض باطنية ولد عام 1919] ، وهي سلائل معوية عائلية مع تبديلات جلدية .

canal **قناة (تمرُّ فيها سوائل)**
(pl:canalis) **(ج: قنَوات)**
(=ductus) **(= نفق) (تمرُّ فيه أوعِيَة أو أعصاب)**
(ج: أنفاق)

ممر أنبوبي ضيق نسبياً أو قناة .

انظر تحت canalis .

abdominal canal **النَّفَقُ البَطْنِيّ**
(=canalis inguinalis) **(= النَّفَقُ الأُرْبِيُّ)**

هو نفق يمر فيه الحبل المنوي أو الرباط المبيضي .

accessory palatine canals **الأَنْفاقُ الحَنَكِيَّةُ الإضافيَّة**
(=canales palatini minores) **(= الأَنْفاقُ الحَنَكِيَّةُ الصَّغيرَة)**

تسمى الأنفاقُ الحَنَكِيَّةُ الصَّغيرَةُ (Canales

Campylobacter sputorum subspecies bubulus **العطيفة البلغمية ، النويع الجاموسي**

نويع موجود في السبل التناسلية عند الأغنام والمواشي .

Campylobacter sputorum subspecies mucosalis **العطيفة البلغمية ، النويع المخاطي**

نويع يوجد بدرجة شائعة في المخاطية المعوية وجوف الفم عند الخنزير . وتسبب أحياناً التهاب الأمعاء التكاثري الخنزيري .

Campylobacter sputorum subspecies sputorum **العطيفة البلغمية ، النويع البلغمي**

نويع يوجد في جوف الفم عند الإنسان .

campylobacteriosis **داءُ العَطائِف**

العدوى بأحياء من جنس العطائف .

avian campylobacteriosis **داء العطائف الطيري**

عدوى الدجاج ومختلف الطيور بالعطيفة الصائمية مع التهاب كبدي متفاوت الوخامة ، تتراوح الأعراض من مادون الإكلينيكي ، أوقلة إنتاج البيض المنتج إلى نقص الوزن والنزف والموت ، ويسمى كذلك الداء الضمي ، أو الضمي الطيري ، أوالتهاب الكبد العدوائي الطيري .

bovine genital campylobacteriosis **داء العطائف البقري التناسلي**

مرض منقول جنسياً بين المواشي ناجم عن النويع الجنيني للعطائف المنتنة ، يتميز بالعقم وموت الجنين المبكر ، ويسمى كذلك داء الضمات التناسلي البقري .

enteric campylobacteriosis **داء العطائف المعوي**

عدوى معوية بنوع من العطائف ، يصيب العديد من الثدييات بما فيها الإنسان .

ovin genital campylobacteriosis **داء العطائف الضأني التناسلي**

مرض عدوائي يصيب الأغنام بسبب العطائف الصائمية والعطائف المنتنة من نويع الجنينية ،

hypoglossi) ، وهي القناة التي يمر من خلالها العصب تحت اللسان ، وتسمى أيضاً النفق اللقمي الأمامي للعظم القذالي (Anterior condyloid canal of occipital bone) ، والثقبة اللقمية الأمامية (anterior condyloid foramen)

anterior ethmoid canal **النَّفَقُ الأماميُّ للغرْبالي**

وهيَ الثقبة الغربالية الأمامية .

انظر تحت foramen ethmoidale anterior .

anterior internal orbital canal **النَّفَقُ الحَجاجيُّ الأَمَامِيُّ الغائِرُ**

(=foramen ethmoidale anterius) **(= الثُّقْبَةُ الغِرْباليَّةُ الأماميَّة)**

anterior palatine canal **النَّفَقُ الحَنَكيُّ الأماميّ**

(=canalis incisivus) **(= النَّفَقُ القاطعيُّ)**

(=foramen incisivum) **(=الثُّقْبَةُ القاطعَيَّة)**

تعني النفق القاطعي (Canalis incisivus) ، وهو أحد الأنفاق العظمية المتعددة الذي يمتد من أرضية التجويف الأنفي على السطح الحنكي للفك العلوي ويمرر الأعصاب الحنكية الأنفية وشعب الشرايين الحنكية الكبيرة والتي تتفاغر مع الشعبة الحاجزي .

anterior semicircular canal **النَّفَقُ الهِلاليُّ الأماميُّ**

تمر فيهَ القناة الهلالية الغشائية الأمامية .

arachnoid canal **القَناةُ العَنْكَبُوتيَّة**

(=cisterna venae magnae cerebri) **(= الصِّهْريجُ الوَريديُّ الكَبيرُ للدِّماغ)**

ويعنى أيضاً الصهريج الوريدي الكبير للدماغ ، وقناة بيشا (Bichat's canal) وثقبة بيشا . وهي توسع للحيز تحت العنكبوتي يمتد أمامياً ما بين الجسم الثفني والمهاد ويقترب من الأوردة الدماغية الداخلية ملتحماً معها خلفياً ليشكل الوريد الدماغي الكبير (وريد جالين) .

archenteric canal **القَناةُ المِعَويَّةُ البدائيَّة**

(=neurenteric canal) **(= القَناةُ العَصَبيَّةُ المِعَويَّة)**

القَناةُ العَصَبيَّةُ المعَويَّة .

palatini minores) ، وهي أقنية صغيرة في مؤخرة العظم الحنكي وتسير فيها الأعصاب الحنكية الصغيرة .

accessory root canal **النَّفَقُ الإضافيُّ للجَذْر**

قناة جانبية من القناة اللبية السنية ، وتوجد عادة في القناة الذروية الثالثة .

adductor canal **نَفَقُ العَضَلَة المُقَرِّبَة**

تمر فيه الأوعية الفخذية والوريد الصافن .

Alcock's canal **نَفَقُ آلكوك**

(=canalis pudendalis) **(= النَّفَقُ الفَرْجيُّ)**

انظر تحت canalis pudendalis .

alimentary canal **القَناةُ الهَضْميَّة**

هو السبيل الهَضمي ، أو المسلك الهضمي .

انظر تحت digestive tract .

alisphenoid canal **نَفَقُ جَناحِ الوَتَدي**

نفق ضمن الجَناح الكبير للعظم الوتدي عند مختلف الحيوانات ، وهو الذي ينقل الشريان السباتي الباطن .

alveodental canal **النَّفَقُ السِّنْخيُّ السِّنّيُّ**

القناة التي تمر منها الأوعية والأعصاب إلى السن عبر السنخ السني .

alveolar canal of maxilla **النَّفَقُ السِّنْخيُّ للفَكِّ العُلْويّ**

انظر تحت canales alveolares maxillae .

alveolar canals **الأنْفاقُ السِّنْخيَّة**

هي الأنفاق الفكية السفلية ، والأنفاق السنيخية للفك العلوي .

anal canal **القَناةُ الشَّرَجيَّة**

انظر تحت canalis analis .

anterior alveolar canal **النَّفَقُ السِّنْخيُّ الأماميُّ**

نفق سنخي في الفك العلوي يتوضع في الأمام ، وهي الأنفاق السنخية للفك العلوي .

anterior condyloid canal **النَّفَقُ اللُّقْميُّ الأماميّ**

(=canalis hypoglossi) **(= النَفق تحت اللسان)**

وتسمى النفق تحت اللسان (Canalis

archinephric canal **القَنَاةُ الكُلْوِيَّةُ البدائيَّة**
(=pronephric duct) **(= قَنَاةُ سَلِيفَةَ الكُلْوَة)**
انظر تحت pronephric duct .

Arnold's canal **نَفَقُ أَرْنُولْد**
(يمر فيه العصب المبهم)
1 ـ النفيق الخشائي (Canaliculus mastoideus) .
2 ـ ثلم العصب الصخري الصغير (sulcus nervi petrosi minoris) .

arterial canal **القَنَاةُ الشِّرْيانيَّة**
وهي قناة بَين الشريان الرئوي والأورطي في الجنين ، وتعمل كطريق جانبي للرئة لتوزيع الأكسجين من مشيمة الأم . وفي الظروف الطبيعية فإن هذه القناة تغلق حالما تمت ولادة الجنين وانتفخت رئتيه وتم الفصل بين الدوران الجهازي والرئوي .

atrioventricular canal **القَنَاةُ الأُذَينيَّةُ البُطَينيَّة (في الجَنين)**
قناة مشتَركة تصل الأذين الابتدائي مع البطين ، تبقى أحياناً كشذوذ خلقي كنتيجة لفشل انغلاق الفجوة بين الحاجز بين البطينين وبين الأذينين بسبب توقف النمو في الوسائد الشغافية .

basipharyngeal canal **النَّفَقُ البُلْعُومِيُّ القاعديّ**
(=canalis vomerovaginalis) **(= النَّفَقُ الميكَعِيُّ الغمْديّ)**
انظَر تحت canalis vomerovaginalis .

Bichat's canal **قَنَاةُ بيشا**
(=cisterna venae agnae cerebri) **(=الصِّهْرِيجُ الوَرِيديُّ الكَبِيرُ للدِّماغ)**
انظر تحت arachnoid canal .

biliary canals , interlobular **القنوات الصفراوية ، بين الفصيصات**
هي القنيات بين الفصيصات .
انظر تحت ductuli interlobulares .

biliary canals , intralobular **القنوات الصفراوية ، داخل الفص**
هي القنيات الصفراوية.
انظر تحت ductuli biliferi

birth canal **قَنَاةُ الولادَة**
القناةَ التي يمر الجنين من خلالها عند الولادة ، تشمل عنق الرحم والمهبل والفرج ، وتسمى كذلك قناة التوليد وقناة المخاض .

blastoporic canal **قَنَاةُ مَسَمِّ الأُرَيمَة**
(=neurenteric canal) **(= القَنَاةُ العَصَبيَّةُ المعَويَّة)**
القَناةَ العصبية المعوية .
انظر تحت neuerteric canal .

bony canals of ear **الأَنْفاقُ العَظْميَّةُ للأُذُن**
هي الأنفاق الهلالية العظمية .
انظر تحت canales semicirculares ossei .

Braun's canal **قَنَاةُ براون**
(=neurenteric canal) **(= القَنَاةُ العَصَبيَّةُ المعَويَّة)**
انظر تحت neurenteric canal .

Breschet's canals **أَنْفاقُ بريشت**
(=canales diploici TA) **(= أَنْفاقُ خلال اللَّوحتَين)**
أنفاق خلال اللوحتين (في عظام القحف) .

bullular canals **الأَقْنيَةُ الفُقَّاعيَّة**
(=spatia zonularia TA) **(الأَحْيازُ النُّطَيقيَّة)**
فضوات بين أَلْياف الأهداب النطيقية على مستوى خط استواء العدسة العينية .

calciferous canals **القَنَواتُ الكِلْسيَّة**
قنوات تحتَويَ على أملاح الجير في الغضروف الذي يخضع للتكلس .

canal for Jacobson's nerve **نَفَقُ عَصَب جاكوبسوَن**
(=canaliculus tympanicus) **(=النُّفَيقُ الطَّبْليُّ)**
القناةَ التي تنقل الشعبة الطبلية من العصب البلعومي اللساني ، ولذلك تسمى بالنفيق الطبلي . وهي قناة دقيقة جداً تمر من السطح السفلي من الجزء الصخري للعظم الطبلي بين

المسـال الدهليزي ونفيق القوقعة ، ويعـد كممر مستمر .

قَناةُ كوفييه **canal of Cuvier**
(=القَناةُ الوَريديَّة) **(=ductus venosus)**
انظر تحت ductus venosus .

قَناةُ البَرْبَخ **canal of epididymis**

نَفَقُ جويدي **canal of Guidi**
(=النَّفَقُ الجَناحيُّ) **(=canalis pterygoideus)**
انظر تحت canalis pterygoideus .

قناة هوفيوس **canal of Hovius**
واحـــدة من سلسلة الـوصـــلات بين الأوردة الدُورانية في مختلف الثدييات .

قَناةُ نوك **canal of Nuck**
(=النَّاتيء الغمْديُّ الصِّفاقيّ) **(=processus vaginalis peritonei TA)**
انظر تحت processus vaginalis peritonei .

الثقبة الوداجية والقناة السباتية إلى قاع التجويف الطبلي .


نَفَقُ العَـضلَة المُوَتِّرَة للطَّبْلَة **canal for tensor tympani muscle**
(=ميزابَة العَضلَة المُوَتِّرَة للطَّبْلَة) **(=semicanalis musculi tensoris tympani)**
هي ميزَابَةُ العَضلَةِ المُوَتِّرَة للطَّبْلَة .
انـظـر تحـت semi canalis musculi tensoris tympani .

قَناةُ أرانْتيوس **canal of Arantius**
(=القَناةُ الوَريديَّة) **(=ductus venosus)**
انظر تحت ductus venosus .

نَفَقُ عَصَب الحَبْل الطَّبْلي **canal of chorda tympani**

نَفَقُ كُورْتي **canal of Corti**

قَناةُ كُوتُونْيوس **canal of Cotunnius**



Biliary system الجهاز المراري

انظر تحت ductus subinguales minores .

الأنْفاقُ السُّباتيَّةُ الطَّبْليَّةُ **caroticotympanic canals**
(=النُّفَيقاتُ السُّباتيَّةُ الطَّبْليَّةُ) (=canaliculi caroticotympanici TA)
انظر تحت canaliculi caroticotympanici .

نَفَقُ السُّباتي **carotid canal**
يمر فيه الشريان السباتي الغائر .

النَّفَقُ الرُّسُغيُّ **carpal canal**
(يمر فيه وترَ عضلي)
النفق الرسغي ، والذي يمر فيه وتر العضلات المثنية لليد .

النَّفَقُ الذَّنَبيّ **caudal canal**
(=النَّفَقُ العَجُزِيُّ) (=canalis sacralis)
حيز مشغول بَالامتداد العجزي للحيز فوق الجافية .

نَفَقُ عماد القَوقَعَة المَرْكَزيُّ **central canal of modiolus**
انظر تحت canales lonitudinales modioli .

القَناةُ المَركَزيَّةُ للنُّخاع **central canal of spinal cord**
انظر تحت canalis centralis medullae spinalis

النَّفَقُ المَرْكَـزيُّ بحسب ستيَلينج **central canal of Stilling**
(=نَفَقَ الزُّجاجيَّة) (=canalis hyaloideus TA)
هو نفق يَمر فيه شريان الزجاجية عند الجنين .

نَفَقُ الزُّجاجيَّة المَرْكَزيُّ **central canal of vitreous**
يمر فيهَ شريان الزجاجية عند الجنين .

القَناةُ الدِّماغيَّةُ النُّخاعيَّة **cerebrospinal canal**
الجوف الابتَدائي للدمَاغ والحبل النخاعي .

قَناةٌ عُنُقيَّةٌ **cervical canal**
وتسمَى أيضاً (Canalis cervicis uteri) ، وهي قناة مخروطية مغزلية تمتد من برزخ الرحم عبر عنق الرحم لتنفتح على المهبل .

قَناةُ عُنُق الرَّحم **cervical canal of uterus**

قَناةُ أوكن **canal of Oken**
(=قَناةُ الكُلْوَة الجَنينيّة المُوسَّطَة) (=ductus mesonephricus)
انظر تحت ductus mesonephricus .

قَناةُ ستينو **canal of Steno**
(=القَناةُ النَّكَفيَّة) (=ductus parotideus)
انظر تحت ductus parotideus .

نَفَقُ ستيلينج **canal of Stilling**
(=نَفَقُ الزُّجاجيَّة) (=canalis hyaloideus)
انظر تحت canalis hyaloideus .

قناة المعـدة **canal of stomach**

نفق العضلة الموترة للطبلة **canal of tensor tympani muscle**
(=ميزابة العضلة الموترة للطبلة)
ميزابة العضلة الموترة للطبلة .

قَناةُ ويرسونج **canal of Wirsung**
(=القَناةُ البَنْكرياسيَّة) (=ductus pancreaticus TA)

أنْفاقُ عـمَاد القَـوقَـعَة **canals of modiolus**
هي نفقَ عـمَاد القوقعة الحلزوني ، ونفق عماد القوقعة الطولاني .

قَنَواتُ الغُضْروف **canals of cartilage**
قنوات في الغضروف المتعظم في مرحلة تكون أوعيته .

قَنَواتُ هيـرينج **canals of Hering**
(في القنَيَاتَ الصفراوية)
الفـتـحـات التي تـتـصل من خـلالـهـا القنيـات الصـفـراوية مع الفروع النهـائيـة من جـهـاز القناة الصفراوية . تـتـميز القنيات الصفـراوية بجدرانها التي تتضمن خلايا متن الكبد من جهة وتتضمن خلايا القنوات الصفراوية من جهة أخرى .

قَنَواتُ ركْلنْجهاوزن **canals of Recklinghausen**
أَحيَاز لمفاويَة صغيرة في النسيج الضام .

قَنَواتُ ريفينيوس **canals of Rivinus**
(=القَنَواتُ الصُّغيرَة تَحتَ اللِّسَان) (=ductus sublinguales minores)

النَّفَقُ السَّاقِيّ بحسب هنلي **crural canal of Henle**
(=نَفَقُ المُقَرِّبَة) **(=canalis adductorius TA)**

الأَنْفاقُ العَاجِيَّة **dentinal canals**
(=النُّفَيقاتُ السِّنِّيَّة) **(=canaliculi dentales)**

القَناةُ الهَضْمِيَّة **digestive canal**
انظر تحت tract .

أَنْفاقُ خلاَل اللَّوحتَين **diploic canals**
أَنْفاقُ خلاَل اللَّوحتَين في عظام القحف ، تمر فيها الأَوْرِدة في عظام القحف .

نَفَقُ دُوريلُّو **Dorello's canal**
(في القَسم الصخري من العظم الصدغي) فُتحة توجد أحياناً في العظم الصدغي التي يمر من خلالها العصب المبعد والجيب الصخري السفلي معاً إلى الجيب الكهفي .

القَناةُ المِعَوِيَّةُ الجِلْدِيَّة **entodermal canal**
(=القَناةُ الهَضْمِيَّةُ) **(=canalis alimentariusTA)**
انظر تحت primordial gut .

نَفَقُ يوستاكيوس **eustachian canal**
(=النَّفير) **(=tuba auditiva)**

النَّفَقُ السَّمْعيُّ الظَّاهِرُ **external auditory canal**
(=الصِّماخُ السَّمْعِيُّ الظَّاهِر) **(=meatus acusticus externus TA)**
القناةَ السمعية في الأذن الظاهرة وتربط بين الوسط الجوي المحيط بغشاء الطبلة وتبدأ بالصماخ السمعي الظاهر . وتتألف من قسم غضروفي وقسم عظمي .

نَفَقُ الوَجْهِيّ **facial canal**
(= نَفَقُ العَصَبِ الوَجْهِيّ) **(=canal for facial nerve)**

نَفَقُ فالوب **fallopian canal**
(=نَفَقُ العَصَبِ الوَجْهِي) **(=canalis facialis)**

النَّفَقُ الفَخذيُّ **femoral canal**

قَناةُ فرَّان **Ferrein's canal**
(=التُّرْعَةُ الدَّمْعِيَّة)
انظر تحت rivus lacrimalis .

انظر تحت canalis cervicis uteri .

النَّفَقُ الحَبْلِيّ **chordal canal**
(=نَفَقُ الحَبْلِ الظَّهْري) **(=notochordal canal)**
انظر تحت notchordal canal .

الأَقْنِيَةُ الهَدَبِيَّة **ciliary canals**
(=أَحْيازُ الزَّاوِيَةِ القُزَحِيَّة القَرْنِيَّة) **(=spatia anguli iridocornealis TA)**
انظر تحت spatia anguli iridocornealis .

قَناةٌ دَوَرانِيَّة **circulatory canal**

نَفَقُ تشيفيني **Civinini's canal**
(=نُفَيقُ الحَبْلِ الطَّبْلي) **(=canaliculus chordae tympani TA)**
انظر تحت canaliculus chordae tympani .

نَفَقُ كلوكيه **Cloquet's canal**
(=نَفَقُ الزُّجاجِيَّة) **(=canalis hyaloideus)**
انظر تحت canalis hyaloideus .

القَناةُ القَوقَعِيَّة **cochlear canal**
1 ـ نفق القَوقعة الحلزوني .
2 ـ القناة القوقعية .

القناة الأذينية البطينية المشتركة **common atrioventricular canal**
قناة اشتراك بين الأذين والبطين .
انظر تحت atrioventricularis communis .

النَّفَقُ اللُّقْمِيُّ (يمر فيه وريد) **condylar canal (=canalis condylaris TA)**

النَّفَقُ اللُّقْمِيُّ (يمر فيه وريد) **condyloid canal**
انظر تحت canalis nervi hypoglossi .

القَناةُ المُوَصِّلَة **connecting canal**
هي النبيبات الكلوية المقوسة .

القَناةُ القحفِيَّةُ البُلْعُومِيَّة **craniopharyngeal canal**
يمر أحياني من خلال العظم الوتدي ، ينفتح ضمن السرج التركي ، من المحتمل أن يكون بقايا لجيب راتكه .

القَناةُ السَّاقِيَّة **crural canal**
(=النَّفَقُ الفَخذيُّ) **(=canalis femoralis TA)**

flexor canal نَفَقُ الْمُثْنِيَة
(=canalis carpi) (=النَّفَقُ الرُّسْغِيُّ)
انظر تحت canalis carpi .

ganglionic canal النَّفَقُ العُقْدِيّ
(=canalis spiralis modioli) (=نَفَقُ عِمَادِ القَوقَعَة الحَلَزُونِيُّ)

Gartner's canal قَناةُ جارتنر
(=ductus epoophori longitudinalis) (=القَنَاةُ المَبَاضِيَّةُ الطُّولانِيَّة)

gastric canal القناة المَعِدية

genital canal قَناةٌ تَناسُلِيَّة
قناة لمرور البيضة ، أو لاستعمال التزاوج ، وتسمى أيضاً (Genital duct) .

gubernacular canals الأنْفاقُ الرَّسَنِيَّة
أربع فتحاتَ صغيرة في القحف الفتي ، واحد خلف كل سن من القواطع ، أي أنها أنفاق خلف فوهات الأسنان .

Guyon's canal نفق جويون
نفق سطحي صغير عند قاعدة الضرة مرتبط بقيد قابضات اليد والعضلة المثنية الزندية للرسغ ، وتمر عبره الأوعية الدموية والعصب الزندي من الساعد إلى اليد .

gynecophoral canal قَناةُ مَحْمِل الأُنْثَى (في البِلْهارْسِيَّات)
الشَق البَطنيَ الذي يحمل فيه ذكر البلهارسيا أنثاه .

gynecophorous canal قَناةُ مَحْمِل الأُنْثَى (في البِلْهارْسِيَّات)
الشَق البَطنيَ الذي يحمل فيه ذكر البلهارسيا أنثاه .

hair canal قَناةُ الشَّعْرَة
قناة بشروية تنمو من خلالها الشعرة بغرض البزوغ .

Hannover's canal قَناةُ هانُوفر (في الرباط المعلق للعدسة)
(=spatium zonulare) (=الحَيِّزُ النُّطَيقِيّ)
حيز كامن موجود بين القسم الأمامي والقسم الخلفي للرباط المعلق للعدسة .

haversian canal النَّفَقُ الهافيرسيّ
(=canalis nutriens ossis TA) (=النَّفَقُ المُغَذِّي لِلْعَظْم)
اَلنفق المغذي للعظم والذي يمر من خاله الأوعية الدموية .

hemal canal النَّفَقُ الدَّمَوِيُّ
حيز ضمنَ القوس الدموية (عند الحيوانات)

Henle's canals قَنَواتُ هِنْلي
(=Henle's loops) (=عُرَى هَنْلي)
انظر تحت canalis nutricius .

Hensen's canal قَناةُ هنسن
(بين القُرَيْبَة والكُيَيْس)
(=ductus reuniens TA) (=القَنَاةُ الاتِّحادِيَّة)

hernial canal قَناةُ الفَتْق
القناة التي يمر منها الفتق إلى خارج الجسم .

Hirschfeld's canals أَنْفاقُ هرشفيلد
(=interdental canals) (=الأَنْفاقُ بَيْنَ الأسنان)

His' canal قَناةُ هيس
(=ductus thyroglossus) (=القَناةُ الدَّرَقِيَّةُ اللِّسانِيَّة)

Holmgren-Golgi canals قَنَواتُ هولمجرين ـ جولجي
(=intracytoplasmic canals) (=القَنَواتُ داخلَ الهَيُولَى)
قنوات دقيقة في هيولى الخلايا ، وبصفة خاصة في الخلايا العصبية ، والتي تشكل جهازاً معقداً في كل مكان من الهيولى ، وتدعى أيضاً القنوات داخل الهيولى .

horizontal semicircular canal النَّفَقُ الهِلالِيُّ الأُفُقِيُّ
النَّفَقَ الهلاَلِيُّ الأُفُقيُّ والذي تمر فيه القناة الهلالية اَلغشائية الأفقيَة .

Huguier's canal قَناةُ هوجييه
(=iter chordae anterius) (=المَعْبَرُ الأَمامِيُّ لِلحَبْلِ الطَّبْلِيِّ)

Hunter's canal **نَفَقُ هَنْتَر**
(=canalis adductorius) **(= نَفَقُ المُقَرِّبَة)**

Huschke's canal **نَفَقُ هوشْكه**
قناة تتولد من اتحاد الحلقات الطبلية .

hyaloid canal **نَفَقُ الزُّجاجيَّة**
نفق يمر فيه شريان عند الجنين .
انظر تحت canalis hyaloideus .

hypoglossal canal **النَّفَقُ تَحْتَ اللِّسان**
النفق تحت اللسان ، والذي تمر فيه شرايين وأعصاب .

iliac canal **القَناةُ الحَرْقَفيَّة**
(=lacuna musculorum TA) **(=الجَوبَةُ العَضَليَّة)**

incisive canal **النَّفَقُ القاطعيُّ**
النفق القاطَعي ، تمر فيه أوعية وأعصاب .

incisive canal of mandible **النفق القاطعي في الفك السفلي**
امتداد للنفق الفكي السفلي ، والذي يتجه متجه نحو الأمام من الارتفاق الأمامي إلى القواطع .

inferior dental canal **النَّفَقُ السِّنِّيُّ السُّفْليُّ**
(=canalis mandibulae) **(=النَّفَقُ الفَكِّيُّ السُّفْليّ)**

infraorbital canal **النَفَقُ تَحْتَ الحَجاج**

inguinal canal **النَّفَقُ الأُرْبيُّ**
تمر فيه الحبل المنوي أو الرباط المبيضي .

intercellular canals **القَنَواتُ بَيْنَ الخَلايَا**

interdental canals **الأَنْفاقُ بَيْنَ الأَسْنَان**
قنوات في الناتئ السنخي للفك السفلي بين جذور القواطع الأنسية والوحشية ، تستخدم لمرور الأوعية الدموية التفاغرية بين الشرايين السنية السفلية والشرايين تحت اللسان ، وتدعى أيضاً قنوات هيرشفيلد (Hirschfeld's canal) .

interfacial canals **القَنَواتُ بَيْنَ الأَوْجُه**
(=intercellular canals) **(=القَنَواتُ بينَ الخَلايَا)**
(في الخلايا المطبقة)
نظام تيهي من الأحياز الممتدة بين الخلايا بين الجسيمات الرابطة ، وتدعى القنوات بين الخلايا .

interlobular biliary canals **القُنَيَّاتُ الصَّفْراوِيَّةُ بَيْنَ الفُصَيْصَاتَ**
(=ductuli interlobulares)

internal acoustic canal **النَّفَقُ السَّمْعِيُّ الغائر**
(=meatus acusticus internus) **(=الصِّماخُ السَّمْعِيُّ الغائر)**
قناة تَسير من الثقبة السمعية الباطنة عبر القسم الصخري من العظم الصدغي لتنتهي بقاع ذي صفيحة عظمية رقيقة تفصلها عن الدهليز وهي تعطي ممرات للعصب الوجهي والأعصاب الدهليزية القوقعية مع الشريان والأوردة التيهية .

internal auditory canal **النَّفَقُ السَّمْعِيُّ الغائر**
(=meatus acusticus internus TA) **(=الصِّماخُ السَّمْعِيُّ الغائر)**
الصِّماخُ السَّمْعِيُّ الغائر .

intersacral canals **القَنَواتُ بَيْنَ الفَقَرَاتِ العَجُزِيَّة**
(=foramina intervertebralia ossis sacri) **(=الثُّقُوبُ بَيْنَ فقَرات عَظْم العَجُز)**
الثقوب بين فقرات عظم العجز .

intestinal canal **القَناةُ المِعَوِيَّة**
الأمعاء هي القسم من القناة الهضمية الذي يصل مابين البواب والشرج .

intracytoplasmic canals **القَنَواتُ داخِلَ الهَيُولَى**
قنوات هولميجران ـ جولجي .

intralobular biliary canals **القنيات الصفراوية بين الفصيصات**
القنيات الصفراوية .

Jacobson's canal **نَفَقُ جاكوبسون**
(=canaliculus tympanicus) **(=النُّفَيْقُ الطَّبْليّ)**
النفيق الطبلي .

Kovalevsky's canal **قَناةُ كوفاليفسكي**

(=القَناةُ العَصَبِيَّةُ المَعَوِيَّة) **(=neurenteric canal)**
القَناةُ العَصَبِيَّةُ المَعَوِيَّة .

lacrimal canal **النَّفَقُ الدَّمْعِي**
النفق الأنفي الدمعي ، تمر فيه القَنَاة الدَّمْعِيَّة .

ateral inferior vomerobasilar canal (=canalis palatovaginalis) **النَّفَقُ الميكَعي القاعدِيُّ السُّفْلِيُّ الوَحْشِي (=النَّفَقُ الحَنَكِي الغِمْدِيّ)**

lateral semicircular canal **النَّفَقُ الهِلالِيُّ الوَحْشِي**
تمر فيه القناة الهلالية الغشائية الوحشية .

lateral superior vomerobasilar canal (=canalis vomerovaginalis) **النَّفَقُ الميكَعِيُّ القاعِدِيُّ العُلْوِيُّ الوَحْشِي (=النَّفَقُ الميكَعِيُّ الغِمْدِيّ)**

Laurer's canal **قناة لَوريرَ**
ممر عند الديدان المثقوبة يمتد من القناة المبيضية إلى السطح الظهري من جسمها .

lesser palatine canals (=canales palatini minores TA) **الأَنْفاقُ الحَنَكِيَّةُ الصَّغيرَة**
انظر تحت canales palatini minores .

longitudinal canals of modiolus **أَنْفاقُ عِمادِ القَوقَعَة الطولانِيَّة**

lowenberg's canal ductus cochlearis) **قَناةُ لُوفينْبرغ (=القَناةُ القَوقَعِيَّة)**

mandibular canal (=canalis mandibulae TA) **النَّفَقُ الفَكِّيُّ السُّفْلِيّ**

medullary canal (=canalis vertebralis TA) (= cavum medullare ossium) **النَّفَقُ النُّخاعِي (=النَّفَقُ الفقري) (= الجَوْفُ العَظْمِيُّ للنِّقْي)**
انظر تحت canalis vertebralis .

membranous semicircular canals **القَنَواتُ الهِلالِيَّةُ الغشائِيَّة**
قنوات تشتمل على اللمف الباطن .

mental canal **النفق الذقني**
امتداد للنفق الفكي السفلي ، والذي يتجه نحو الأعلى ليصل نحو الفتحة الذقنية .

Muller's canal (=ductus paramesonephricus TA) **قَناةُ مُولَّر (=قَناةُ الكُلْوَةِ الجَنينِيَّة المُوَسَّطَة)**

musculotubal canal **نَفَقُ العَضَلَةِ النَّفيرِيَّة**

nasal canal (=canalis nasolacrimalis) **النَّفَقُ الأَنْفِيّ (=النَّفَقُ الأَنْفِيُّ الدَّمْعِيّ)**
هو النَّفَقُ الأَنْفيُّ الدَّمْعِي ، والذي تمر فيه القناة الدمعية الأنفية .

nasolacrimal canal **النَّفَقُ الأَنْفِيُّ الدَّمْعِيّ**
تمر فيه القناة الدمعية الأنفية .


nasopalatine canal (=canalis incisivus) **النَّفَقُ الأَنْفِيُّ الحَنَكِيّ (=النَّفَقُ القاطِعِيّ) (فيه عقدة عصبية)**
النفق القاطعي ، والذي يحتوي على العقدة العصبية .

neural canal (=canalis vertebralis) **النَّفَقُ العَصَبِيّ (=النَّفَقُ الفَقارِي)**
انظر تحت canalis vertebralis .

neurenteric canal (of Kovalevsky) **القَناةُ العَصَبِيَّةُ المَعَوِيَّةُ بحسب كُوفالفسكي**
ممر في المضغة من القسم الخلفي للأنبوب العصبي نحو المعى الابتدائي . ويسمى كذلك قناة براون والقناة المعوية الابتدائية وقناة مسم الأورِمة .

notochordal canal **نَفَقُ الحَبْلِ الظَّهْري (في الجَنين)**
نفق ممتد من الوهدة الابتدائية إلى ناتئ الحبل الظهري في المضغة ، ويسمى كذلك النفق الحبلي .

nutrient canal of bone **النَّفَقُ المُغَذِّي للعَظْم (تمر فيه أوعية)**
نفق تمر فيه الأوعية الدموية التي تغذي العظم .



Neural canal النفق العصبي

الغرْباليَّة) **ethmoidalia)**
ثقوب تمرر النهايات العصبية الشمية من القحف إلى سقف التجويف الأنفي عبر الصفيحة الغربالية أو المصفوية .

النَّفَقُ القَوقَعِيُّ العَظْمِيُّ **osseous cochlear canal**
التجويف العظمي ضمن الصخرة والذي تستقر فيه القوقعة الغشائية .

نَفَقُ يوستاكيوس العَظْمِيّ **osseous eustachian canal**
(= نَفَقُ عَضَلَة النَّفير) **(=canalis musculotubarius)**
جزء عظمي من نفير أوستاكيوس (أوستاش) يقع في القسم الخلفي الوحشي من النفير وهو الأقرب للحجرة الطبلية . ويلتقي هذا القسم العظمي مع القسم الليفي الغضروفي من النفير في منطقة الشق الوتدي الصخري وهي أضيق منطقة من النفير .

النفق الحنكي ، الكبير ، الأنفاق الحنكية الكبيرة **palatine greater, canal , canalis palatinus major**

obstetric canal **قَناةُ الولادَة**
(=birth canal)
انظر تحت birth canal .

obturator canal **نَفَقُ المُسدَّة**
(تمر فيه أوعية وأعصاب)
(=canalis obturatorius)
تمر فيه أوعية وأعصاب .

obturator canal of pubic bone **نَفَقُ المُسدَّة لعَظْم العـانَة**
(=sulcus obturatorius ossis pubis) **(=تَلَمُ المُسدَّة لعَظْم العانَة)**

olfactory canal **القَناةُ الشَّمِّيَّة (في الجنين)**
الحفرة الأنفية في المرحلة المبكرة من تطورها المضغي .

omphalomesenteric canal **القَناةُ السرِّيَّةُ المَساريقيَّة**
(=yolk stalk) **(=السُّوَيقَةُ المُحِّيَّة)**
انظر تحت yolk stalk .

optic canal **نَفَقُ العَصَب البَصَريُّ**

orbital canals **الأَنْفاقُ الحَجاجيَّة**
(=foramina **(=الثُّقوبُ**

النفق الذي يمر عبره العصب السابع عبر الصخرة ثم ينفتح في ذروة الخشاء .

pharyngeal canal **النَّفَقُ البُلْعُومِيّ** **(=canalis palatovaginalis)** **(=النَّفَقُ الحَنَكِيُّ الغِمْدِيّ)**

انظر تحت canalis palatovaginalis .

pharyngotracheal canal **النَّفَقُ البُلْعومِيُّ الرُّغامِيّ**

الممر الرابط بين البلعوم والرغامى عبر الحنجرة .

plasmatic canal **النَّفَقُ المُغَذِّي للعَظْم**

pleural canals **القَناتان الجَنْبيَّتان**

زوج من الممرات في المضغة يصلان الشغاف الابتدائي مع الأجواف الصفاقية .

pleuropericardial canal **القَناةُالجَنْبِيَّةُ التَّامورِيَّة**

حيز في كل جانب على شكل قناة تربط بين التجويفين الجنبي والتاموري لدى الجنين.

pleuroperitoneal canal **القَناةُ الجَنْبِيَّةُ الصِّفاقِيَّة**

portal canal **النَّفَقُ البابِيّ** (تمر فيهَ الأوردة البابية والشريان الكبدي)

حيز ضمن محفظة جلبسون والخلايا الكبدية ، والذي يحتوي على فروع الوريد البابي وفروع الشريان الكبدي وفروع القناة الكبدية .

posterior alveolar canal **النَّفَقُ السِّنْخِيُّ الخَلْفِيّ**

القناةَ السنخية للفك العلوي المتوضعة في الخلف .

posterior dental canals **الأَنْفاقُ السِّنِّيَّةُ الخَلْفِيَّة** **(=canales alveolares maxillae)** **(=الأَنْفاقُ السِّنْخِيَّةُ للفَكِّ العُلْوِيّ)**

1 ـ الأنفاق السنخية للفك العلوي

2 ـ الثقبة السنخية للفك العلوي .

posterior ethmoid canal **النَّفَقُ الخَلْفِيُّ للغِرْبالِيّ**

الثقبة الغربالية الخلفية .

انظر تحت foramen ethmoidale posterius .

posterior internal orbital canal **النَّفَقُ الحَجاجِيُّ الخَلْفِيُّ الغائِر**

palatine canals , accessory canalis palatine minores **الأنفاق الحنكية ، الإضافية ، الأنفاق الحنكية الصغرى**

palatomaxillary canal **النَّفَقُ الحَنَكِيُّ للفَكِّ العُلْوِيّ** **(=canalis palatinus major)** **(= النَّفَقُ الحَنَكِيُّ الكَبير)** **(= foramen palatinum majus)** **(= الثُّقْبَةُ الحَنَكِيَّةُ الكَبيرَة)**

النفق الحنكي الكبير هو ممر في العظم الوتدي والحنكي يمر فيه العصب والأوعية الحنكية الكبيرة ، وينتهي بالثقبة الحنكية الكبرى ، ويدعى أيضاً النفق الجناحي الحنكي ، والنفق الحنكي للفك العلوي ، والنفق الوتدي الحنكي .

palatovaginal canal **النَّفَقُ الحَنَكِيُّ الغِمْدِيّ** **(=canalis palatovaginalis TA)**

paraurethral canals of male urethra **القنوات المجاورة للإحليل الذكري**

parturient canal **قَناةُ الوِلادَة** **(=birth canal)**

انظر تحت birth canal .

pelvic canal **النَّفَقُ الحَوضِيّ**

الممر من الفتحة العلوية إلى الفتحة السفلية من الحوض .

perivascular canal **القَناةُ حَولَ الوِعاء**

حيز لمفاوي يحيط بوعاء دموي .

persistent common atrioventricular canal **اسْتِدامَةُ القَناةِ الأُذَيْنِيَّةِ البُطَيْنِيَّةِ الأَصْلِيَّة** **(=atrioventricularis communis)** **(=الاشْتِراكُ الأُذَيْنِيُّ البُطَيْنِيّ)**

هو شذوذ خلقي لاستدامة القناة الأذنينية البطينية الأصلية .

Petit's canal **قَناةُ بيتي** **(=spatia zonularia)** **(=الحَيِّزُ النُّطَيْقِيّ)**

الحيز النطيقي في العين .

petromastoid canal **النَّفَقُ الصَّخْرِيُّ الخُشَّائِيّ**

نَفَقُ جَذْرِ السِّن **root canal**
(of tooth)

نفق الجذر ، الإضافي **root canal , accessory**
تفرع جانبي لنفق جذر السن الرئيسي ، عادة مايوجد في القمة الثالثة للجذر .

نَفَقُ روزنتال **Rosenthal's canal**
(=نَفَقُ عماد القَوقَعَة) **(=canalis spiralis modioli TA)**
نفق عماد القوقعة الحلزوني ، والذي يمر فيه عصب .

القَناةُ الطَّوقيَّة **ruffed canal**
(= الحير النطيقي) **(= spatia zonularia)**
وتسمى أيضاً أقنية بيتي (Petit's canals) ، أو الأحياز النطاقية (Spatia zonularia) ، وهي الأحياز الموجودة بين الأهداب النطاقية من خط الاستواء في العدسة العينية .

القَنَاةُ الكُيَيْسِيَّةُ القَوْقَعِيَّةُ **sacculocochlear canal**
انظر تحت ductus reuniens .

القَناةُ الكُيَيسيَّةُ القُرَيبِيَّة **sacculoutricular canal**
انظر تحت ductus utriculosaccularris .

النَّفَقُ العَجُزِيُّ **sacral canal**

قَناةُ سانْتورِيني **Santorini's canal**
(=القَنَاةُ البَنْكِرياسِيَّةُ الإضافيَّة) **(=ductus pancreaticus accessorius)**

قَناةُ شليم **Schlemm's canal**
(=الجَيبُ الوَريديُّ للصُّلْبَة) **(=sinus venosus sclerae TA)**
وَعاء متفرع كفافي يقع في التلم الصلبوي الداخلي ، والذي يعمل كمكون رئيسي لمسلك النزح الخاص بالخلط المائي ، ويسمى كذلك الجيب الوريدي للصلبة .

نَفَقُ الصُّلْبَة **scleral canal**
النفق الصلبوي المشيمي ، وهي قناة في المشيمة والصلبة في العين والتي يمر فيها العصب البصري .

النَّفَقُ الصُّلْبَوِيُّ المَشيمَوِيُّ **scleroticochoroidal canal**

(=الثُّقْبَةُ الغرْباليَّةُ الخَلْفيَّة) **(=foramen ethmoidale posterius)**
الثقبة الغربالية الخلفية .

الأنْفاقُ الحَنَكِيَّةُ الخَلْفيَّة **posterior palatine canals**
(=الأنفاق الحنكية الصغيرة)
يراد منها الثقبة الحنكية الخلفية في كل جانب ، وتوجد بمحاذاة السن الطاحنة الخلفية في الزاوية الخلفية الوحشية من الحنك العظمي وتحدد النهاية السفلى من القناة الجناحية الحنكية .

النَّفَقُ الهِلاَلِيُّ الخَلْفِيّ **posterior semicircular canal**
(تمر فيه القناة الهلالية الغشائية الخلفية)

النَّفَقُ الجَناحيُّ **pterygoid canal**

النَّفَقُ الجَناحِيُّ الحَنَكِيّ **pterygopalatine canal**
(=النَّفَقُ الحَنَكيُّ الكَبير)
1ـ النفق الحنكي الكبير .
2ـ النفق الحنكي الغمدي .

النَّفَقُ الفَرْجِيُّ **pudendal canal**
ويسمى أيضاً (Canalis pudendalis) ، أو قناة ألكوك (Alcock's canal) هو الحيز ضمن بطانة اللفافة السادة والجدار الوحشي للحفرة المستقيمية الإسكية وتمر فيها الأعصاب والأوعية الفرجية .

القَناةُ الرِّئَويَّةُ الأورطية **pulmoaortic canal**
(=القَناةُ الشِّرْيانيَّة) **(=ductus arteriosus)**

نَفَقُ اللُّب **pulp canal**
(=نَفَقُ جَذْرِ السِّن) **(=canalis radicis dentis)**

القَناةُ البَوَّابيَّة **pyloric canal**
القناة البوابية .

النَّفَقُ الرَّاجِعُ **recurrent canal**
(=النَّفَقُ الجَناحيُّ) **(=canalis pterygoideus)**
النفق الجناحي .

قَناةُ رايخيرت **Reichert's canal**
(=القَناةُ الاتِّحاديَّة) **(=ductus reuniens)**
هي قناة تكونت بين الكييس والقريبة .

(= نفق وجهي) (=canalis facialis TA)

هي قناة العصب الوجهي ضمن الصخرة ، وهي تمر ملتوية فتبدأ بالمرور أمامياً ثم خلفياً ثم إنسياً في التجويف الطبلي ، وأخيراً تستدير للأسفل حتى تصل إلى الثقبة الإبرية الخشائية ، وتسمى أيضاً القناة الوجهية (Canalis facialis) .

قَنَاةُ ستينسين **Stensen's canal**

(= القناة النكفية) **(ductus parotideus TA)**

لهذه القناة أسماء متعددة أهمها : (Blasius' duct) والقناة النكفية (Parotid duct) وقناة ستينسين (Stensen's duct) وهي قناة الغدة النكفية التي تنفتح على الشدق في الدهليز الفموي مقابل عنق السن الرحوية الثانية .

قناة متلمة **streak canal**

هي قناة الحلمة .

انظر تحت teat canal.

النَّفَقُ تَحْتَ الخَيَّاطِيَّة **subsartorial canal**

(=نَفَقُ العَضَلَة المُقَرِّبَة) **(=canalis adductorius)**

انظر تحت Canalis adductorius .

قَنَاةُ سوكيه ـ هوير **Sucquet- Hoyer canal**

(= تَفَاغُرُ سُوكيه هُويَر) **(=Sucquet-Hoyer‗ anastomosis)**

قطعة شريانية تفاغرية شريانية وريدية كبية الشكل ، وأيضاً هي تفاغرات وريدية شرينية في لب الأصبع .

النَّفَقُ العُلْوِيّ لِلفَكِّ العُلْوِيّ **superior maxillary canal**

(=الثُّقْبَةُ المُدَوَّرَةُ لِلْعَظْمِ الوَتَدِي) **(=foramen rotundum ossis sphenoidalis)**

النَّفَقُ الحَاجِبِيّ **supraciliary canal**

فتحة صغيرة توجد أحياناً قرب الثلمة فوق الحجاج ، والتي يمر منها الشريان المغذي وفرع من العصب فوق الحجاج إلى الجيب الجبهي .

القَنَاةُ فَوقَ البَصَرِيَّة **supraoptic canal**

القناة الدقيقة التي هي الاستمرارالأمامي للردب البصري فوق التصالبة البصرية .

قناة في المشيمية والصلبة في العين والتي يمر فيها العصب البصري .

الأَنْفَاقُ الهِلالِيَّةُ (العَظْمِيَّة) **semicircular canals**

القَنَاةُ المَنَوِيَّة **seminal canal**

ممر لنقل المني أو النطاف .

قَنَاةٌ مَصْلِيَّة **serous canal**

(= شُعَيرَةٌ لِمْفِيَّة) **(=lymphatic capillary)**

حيز لمفاوي دقيق .

النَّفَقُ الغِمْدِي **sheathing canal**

ممر من جوف الصفاق إلى الغلالة الغمدية للخصية .

القناة المفردة **singular canal**

قَنَواتُ سُونْدَرْمان **Sondermann's canals**

امتداد مخروطي لتجويف قناة شليم ، يلاحظ أحياناً في الجدار الداخلي للقناة ويتواجد في الجيب الوريدي لصلبة العين .

النَّفَقُ المَنَوي **spermatic canal**

القناة الأربية عند الذكر ، والتي بمثابة ممر للحبل المنوي .

النَّفَقُ الوَتَدِيُّ الحَنَكِيّ **sphenopalatine canal**

(= 1ـ النَّفَقُ الغِمْدِيُّ الحَنَكِيُّ) **(=1- canalis palatovaginalis)**

(=2ـ النَّفَقُ الحَنَكِيُّ الكَبِير) **(= 2- canalis palatinus major)**

النَّفَقُ الوَتَدِيُّ البُلْعومِيّ **sphenopharyngeal canal**

(=النَّفَقُ الغِمْدِيُّ الحَنَكِيُّ) **(=canalis palatovaginalis)**

النَّفَقُ السِّيسَائِيّ **spinal canal**

(=النَّفَقُ الفِقَرِيُّ) **(=canalis vertebralis)**

انظر تحت canalis vertebralis .

نَفَقُ القَوقَعَة الحَلَزُونِيُّ **spiral canal of cochlea**

نَفَقُ عِمَادِ القَوقَعَة الحَلَزُونِيُّ **spiral canal of modiolus**

النَّفَقُ الحَلَزُونِيُّ **spiroid canal**

القَنَوَاتُ البَولِيَّةُ التَّناسُلِيَّة **urogenital canals**
ذلك القسمَ من الجيبَ البولي التناسلي المتكون بصفة مشتركة من الأقنية المولِّرية والأقنية الكلوية الجنينية الموسَّطة .

القَنَاةُ الرَّحمِيَّةُ **uterine canal**
(=جَوفُ الرَّحم) **(=cavitas uteri)**
انظر تحت cavitas uteri .

قَناةُ عُنُق الرَّحم **uterocervical canal**
انظر تحَت canalis cervicis uteri .

القَنَاةُ القُرَيبِيَّةُ الكُيَيسِيَّة **utriculosaccular canal**
انظر تحت ductus utericulosaccularis .

قَناةُ المَهْبل **vaginal canal**
حيـز ضـمن المهـبل ، وتسمى كـذلك القناة الفرجية الرحمية .
انظر تحت vulvouterine canal.

قَناةُ فان هورن **Van Hoorne's canal**
(=القَنَاةُ الصَّدْرِيَّة) **(=ductus thoracicus TA)**
انظر تحت ductus thoracicus TA .

قناة فيلبو **Velpeau's canal**
هي القناة الأربية .
انظر تحت canalis inguinalis .

القَنَاةُ البُطَينِيَّة (فِي المَعِدَة) **ventricular canal**
(=القَنَاةُ المَعدِيَّة) **(=canalis gastricus)**
انظر تحت canalis gastricus .

قَنَواتُ فيرنُوي **Verneuil's canals**
هي أوعية رادفة جانبية للجذع الوريدي .

النَّفَقُ الفقَرِيُّ **Verteral canals**
قناة تمتد بطول العمود الفقري وبداخلها الحبل النخاعي (النخاع) .

القَنَاةُ المَثانيَّةُ الإحْليلِيَّة **vesicourethral canal**

القَنَاةُ الدِّهْلِيزِيَّة **vestibular canal**
(=السِّقالَةُ الدِّهلِيزيَّة) **(=scala vestibuli)**
انظر تحت scala vestibuli .

نَفَقُ فيديوس **vidian canal**
(=نَفَقُ الجَناحي) **(=canalis pterygoideus)**

أَنْفاقُ فُولْكمان **Volkmann's canals**
ممرات لمرورالأوعـية الدمـوية في العظام غيـر

القَنَاةُ فَوقَ الحَجاج **supraorbital canal**
(=الثُّلْمَةُ الجَبْهيَّة) **(=incisura frontalis)**
انظر تحت incisura frontalis .

القَنَاةُ الرُّصُغِيَّة **tarsal canal**
(= الجَيبُ الرُّصُغيُّ) **(=sinus tarsi TA)**
هو الجيب الرصغيَ (الكاحلي) .
انظر تحت sinus tarsi TA .

القناة المتلمة **teat canal**
هي قناة الحلمة ، والتي تتجه من الجيب المولد للبن إلى ظاهر ضرع الحيوان .

قَناةُ تَيله **Theile's canal**
(= الجَيْبُ التأموريُّ المُسْتَعْرِضُ) **(=sinus transversus pericardii)**
انظر تحَت sinus transversus pericardii .

القَنَاةُ التُّوتِيَّةَ البُلْعومِيَّة **hymopharyngeal canal**

نَفَقُ تورْتوَال **Tourtual's canal**
يسمى القناة الحنكية الكبيرة (Canalis palatinus major) ، أوالقـناة الجناحـيـة الحنكيـة (Pterygopalatine canal) ، وهي قناة تتكون بين الفك العلوي والعظام الحنكية وتنقل الشريان الحنكي النازل والعصب الحنكي الكبير .

النَّفَقُ النَّفيريّ **tubal canal**
(= المِيزَابَةُ النَّفَيرِيَّة) **(=semicanalis tubae auditivae)**
انظر تحت semicanslis tubae auditivae .

النَّفَقُ النَّفيْرِيُّ الطَّبْلي **tubotympanic canal**
القسم الدَاخلي للَفلج البلعومي(الخيشومي) في المضـغـة الذي يشـتق منه النفيـر والأذن الوسطى .

النَّفَقُ الطَّبْلِيُّ للقَوقَعَة **tympanic canal of cochlea**
(=السِّقالَةُ الطَّبْلِيَّة) **(=scala tympani)**
انظر تحت scala tympani .

القَنَاةُ السُّرِّيَّة **umbilical canal**
(=الحَلَقَةُ السُّرِّيَّة) **(=annulus umbilicalis)**
انظر تحت annulus umbilicalis .

القَنَاةُ البَولِيَّة (فِي الجَنين) **urinary canal**

متعلق أو مشابه للقنية أو النفيق .

canaliculi 1ـ نفيقات (ف: نفيق)
2ـ قنيوات (ف: قنيَّة)
(sing.canaliculus)

canaliculi dentales نُفَيقاتٌ سِنِّيَّة
هي نفيقات (تصغير نفق تعبيراً عن صغرها) في العــاج السني وتمتــد من لـب السن إلى الملاط السني والميناء ، وتدعى أيضاً : القُنَيْوَات السِّنِّيَّة أو العاجية (Dental or dentinal tubules) .

canaliculitis التِهابُ القُنَيَّاتِ الدَّمْعِيَّة

canaliculization 1ـ استِقناء
2ـ استِنْفاق
نماء القناة وتطورها كـمـا في العظم ، وتكون النفيقات أو القنيوات .

canaliculodacryocystostomy مُفاغَرةُ كِيْس وقَناةِ الدَّمْع
عملية وصل قناة الدمع بكيس الدمع .

canaliculorhinostomy مُفاغَرةُ كِيْس الدَّمْع بالأنفِ
(=dacryocystorhinostomy)
مُفاغَرَةُ كِيْس الدَّمع بالأنْف .

canaliculus TA 1ـ نفيْق
(ج: نفيْقات) (يمر فيه أوعية أو أعصاب)
(pl.canaliculi)
2ـ قنيَّة
(ج: قنيَّات) (يمر فيها سوائل)
القناة أو النفق : مـصطلح عــام يطلق على الأنبوب الضيق أو القناة الضيقة أو الممر الضيق ، والذي يمر فـيــه ســوائل أو أوعـيــة دمـوية أو أعصاب .

apical canaliculus قُنَيَّةٌ قِمِّيَّة
(فيَ الخلايا الكلوية)
إحدى الانغمادات النبيبية العديدة التي تبزغ من الفلوح مابين زغيبات النبيب الملفف الداني في الكلية ، وتمتـد إلى الأسـفل ضـمن الهـيـولى القمية .

auricular canaliculus النُّفَـيـقُ الأُذُنيّ

قنوات هافيرس .

vomerine canal النَّفَقُ الميكَعي
(=canalis vomerovaginalis TA) (=النَّفَقُ المَيكَعِيُّ الغمْدِيّ)
انظر تحت canalis vomerovaginalis TA .

vomerorostral canal النفق الميكعي المنقاري

vomerovaginal canal النَّفَقُ الميكَعِيّ الغمْدِيّ

vulvar canal القَنَاةُ الفَرْجِيَّةُ
(=vestibulum vaginae TA) (=دهْليزُ المَهبَل)
دهليز المهبل .

vulvo-uterine canal القَنَاةُ الفَرجيَّةُ الرَّحْمِيَّة
(=vaginal canal) (=القَنَاةُ المَهْبلِيَّة)
انظر تحت vaginal canal .

zygomaticofacial canal النَّفَقُ الوَجْنِيُّ الوَجْهي
(=foramen zygomaticofaciale) (= الثقبة الوجنية الوجهية)
وتسمى أيضاً الثقبة الوجنية الوجهية (Foramen zygomaticofaciale) ، والثقبة الخدية أو الوجنية (Malar foramen) ، وهي فـتـحـة على السـطح الجـانـبي من العظم الـوجني تحت الحـافــة الحجاجية التي تنقل العصب الوجني الوجهي .

zygomatico-orbital canal النَّفَقُ الوَجْنِي الحَجَاجيّ

zygomaticotemporal canal النَّفَقُ الوَجَنيُّ الصُّدْغيّ
(=foramen zygomaticotemporale) (=الثُّقْبَةُ الوَجْنيَّةُ الصُّدْغيَّة)
الثُّقْبَةُ الَوجنيَّةُ الصُّدْغيَّة .
انظر تحت foramen zygomaticotemporale .

canales 1ـ أنفاق (ف: نفق)
2ـ قنوات (ف: قناة)
(sing.canalis)

canalicular 1ـ قنَيوِيّ
2ـ نفيقِيّ

(=النُّفَيقُ الخُشَّائيُّ) **(=canaliculus mastoideus)**

القُنَيَّاتُ الصَّفْراويَّة **bile canaliculi**
(=الشُّعَيراتُ الصَّفْراويَّة) **(=bile capillaries)**
قنيات نبيبية رفيعة تمتد مابين الخلايا الكبدية ، في المتن كله ، وعادة ماتوجد بصفة مفردة بين كل زوج مجاور من الخلايا ، ويشكل شبكة ثلاثية الأبعاد لعين الشبكة المتعددة السطوح ، مع خلية مفردة لكل عين من الشبكة . وتدعى أيضاً الشعيرات الصفراوية .

القُنَيَّاتُ الصَّفْراويَّة **biliary canaliculi**
(= الشُّعَيراتُ الصَّفْراويَّة)
ممرات نبيبية رفيعة تمتد مابين الخلاياالكبدية ، في المتن كله ، وعادة ماتوجد بصفة مفردة بين كل زوج مجاور من الخلايا ، ويشكل شبكة ثلاثية الأبعاد لعيون الشبكة متعددة السطوح ، مع خلية مفردة لكل عين من الشبكة . وتدعى أيضاً الشعيرات الصفراوية .

نُفَيقاتٌ عَظْمِيَّة **bone canaliculi**
ممرات نبيبية متفرعة تتشعع مثل برامق العجلات (شعاع العجلة) من كل جوبة عظمية لتتصل مع قنية الجوبة المجاورة ومع القناة الهافيرسية .

النُّفَيقاتُ السُّباتيَّةُ الطَّبْلِيَّة **canaliculi caroticotympanici TA**
ممرات صغيرة جداً في العظم الصدغي ، وهي التي تربط النفق السباتي الجوف الطبلي ، وتحمل غصينات الاتصال مابين السباتي الباطن والضفيرة الطبلية ، وتسمى كذلك الثقبة السباتية الطبلية .

النُّفَيقاتُ السِّنِّيَّة **canaliculi dentales TA**
قنوات دقيقة في العاج ، تمتد من الجوف اللبي إلى الملاط والميناء . وتسمى كذلك النبيبات السنية أو النبيبات العاجية .

القُنَيَّةُ النَّاقلَةُ للصَّفْراءَ **canaliculus bilifer TA**
قنوات دقيقة مسؤولة عن نقل الصفراء التي يفرزها الكبد .

نُفَيقُ الحَبْلِ الطَّبْلي **canaliculus chordae tympani**
نفيق صغير ينفتح بعيداً عن النفق الوجهي قبل انتهائه ، يمر منه عصب حبل الطبل نحو الجوف الطبلي . ويسمى كذلك نفق الحبل الطبلي ، ونفق تشيفيني ، والنفق الحبلي الطبلي .

نُفَيقُ القَوقَعَة **canaliculus cochleae TA**
قناة صغيرة في القسم الصخري من العظم الصدغي التي تصل مابين السقالة الطبلية في الأذن الداخلية مع الجوف تحت العنكبوتية ، وبها قناة لمفية محيطية ووريداً صغيراً ، ويسمى كذلك مسال كوتينّيوس .


قُنَيَّةُ آرنولد اللاَّمُسَمَّاة **canaliculus innominatus of Arnold**
(=الثُّقْبَةُ الصَّخْرِيَّة) **(=foramen petrosum)**
انظر تحت foramen petrosum .

القُنَيَّةُ الدَّمْعِيَّة **canaliculus lacrimalis TA**
(في الجفن)
ممر قصير في الجفن ، يبدأ عند النقطة الدمعية التي تتجه من البحيرة الدمعية إلى كيس الدمع ، وتسمى كذلك قناة الدمع ، والقناة الدمعية .

القُنَيَّةُ المائِيَّة **canaliculus laqueiformis**
(=عُروَةُ هنْلي) **(=Henle's loop)**
(في الكلوة)
انظر تحت Henle's loop .

النُّفَيقُ الخُشَّائيُّ **canaliculus mastoideus TA**
ممر صغير يبدأ من الجدار الوحشي للحفرة الوداجية للعظم الصدغي ويمر ضمن العظم الصدغي . يمر الفرع الأذني من العصب المبهم ضمنه ليخرج من الشق الطبلي الخشائي . ويسمى كذلك النفيق الخشائي لعصب آرنولد .

نُفَيقُ الحَبْلِ الطَّبْلي **canaliculus of chorda tympani TA**
نفيق صغير ينفتح بعيداً عن النفق الوجهي قبل إنتهائه ، يمر منه عصب حبل الطبل نحو الجوف الطبلي . ويسمى كذلك نفق الحبل الطبلي ، ونفق تشيفيني ، والنفق الحبلي الطبلي .



canaliculus laqueiformis **القُنَيَّة المائِيَّة**

الصـخـرية ، يمر منهـا الفـرع الطبلي لـلعـصب اللساني البلعـومي وشريان صغـير ، وتسمى كـذلك قناة جـاكـوبسـون ، وقناة عـصب جـاكـوبسـون ، والقناة الطبليـة لعـصب جاكوبسون .

caroticotympanic canaliculi **النُّفَيـقـاتُ السُّبـاتِيَّةُ الطَّبْـلِـيَّة**

ممرات صغيرة جداً في العظم الصدغي ، وهي التي تربط النفق السـبـاتي والجـوف الطبلي ، وتحمل تغضنات الاتصال مابين السباتي الباطن والضـفـيـرة الطبليـة ، وتسـمى كـذلك الثـقـب السباتية الطبلية .

dental canaliculi **النُّفَيقاتُ السِّنِّيَّة**

قنوات دقيقة في العاج ، تمتد من الجوف اللبي إلى الملاط والميناء . وتسمى كـذلك النبيبـات السنية أو النبيبات العاجية .

haversian canaliculus **النُّفَيقاتُ الهافيرْسِيَّة**

canaliculus of cochlea **نُفَيقُ القَوقَعَة**

قناة صـغـيـرة في القـسم الصـخري من العظم الصـدغي التي تصل مابين السقالة الطبلية في الأذن الداخليـة مع الجوف تحت العنكبـوتيـة ، وبها قناة لمفية محيطية ووريداً صغيراً ، ويسمى كذلك مسال كوتينّيوس .

canaliculus petrosus (=sulcus nervi petrosi minoris) **النُّفَيقُ الصَّخْرِيّ (= تَلَمُ العَصَبِ الصَّخْرِيِّ الصَّغير)**

قناة صـغـيـرة في القـسم الصـخري من العظم الصـدغي التي تصل مابين السقالة الطبلية في الأذن الداخليـة مع الجوف تحت العنكبـوتيـة ، وبها قناة لمفية محيطية ووريداً صغيراً ، ويسمى كذلك مسال كوتينّيوس .

canaliculus tympanicus TA **النُّفَيقُ الطَّبْلِيُّ**

فـتـحـة صـغـيـرة في السطح الأمـامي لـلقـسم الصـخري من العظم الصدغي في قاع الحفرة

انظر تحت capillary .

قُنَيَّةُ تيرْش **Thiersch's canaliculus**

وتسمى أيضاً قنيات تيرش (Thiersch's canaliculi) ، وهي قنيات دقيقة تتكون في النسج الجديدة وتسمح بمرور سوائل التغذية والدوران . وتمثل طلائع التكوين الدوراني الجديد .

النُّفَيقُ الطَّبْلِيُّ **tympanic canaliculus**

فتحة صغيرة في السطح السفلي للقسم الصخري من العظم الصدغي في قاع الحفرة الصخرية ، يمر منها الفرع الطبلي للعصب اللساني البلعومي وشريان صغير ، وتسمى كذلك قناة جاكوبسون ، وقناة عصب جاكوبسون ، والقناة الطبلية لعصب جاكوبسون .

النُّفَيقُ الطَّبْلِيُّ لعَصَب جَاكوبسون **tympanic canaliculus for Jacobson's nerve**

انظر تحتَ tympanic canaliculus .

1ـ قناة (تمر فيها سوائل) **canalis TA**
(ج: قنوات) **(pl.canales)**
2ـ نفق (تمر فيه أوعية وأعصاب..)
(ج: أنفاق)

القناة أو النفق : مصطلح عام يطلق على الأنبوب الضيق أو القناة الضيقة أو الممر الضيق ، والذي تمر فيه أوعية دموية وأعصاب أو سوائل .

الأنْفاقُ السِّنْخِيَّة **canales alveolares**

الأنْفاقُ السِّنْخِيَّةُ للفَكِّ العُلْوِيِّ **canales alveolares maxillae TA**
(تمر فيها الأوعية والأعصاب السنخية)

عدة أنفاق في الفك العلوي لمرور الأوعية والأعصاب السنخية العلوية الخلفية ، بداية كل نفق من السطح تحت الصدغ للفك العلوي عند الثقبة السنخية ، وتسمى كذلك الأنفاق السنية الخلفية .

أنْفاقُ خلاَل اللَّوحتَين **canales diploici TA**
(في عَظامَ القحف)

أنفاق عظمية في عظام القحف تتوضع في إحدى مجموعة النفيقات الدقيقة التي تصل بين كل نفق هافيرسي في العظم المكتنز .

القُنَيَّةُ القاطعيَّة **incisor canaliculus**
(=ductus incisivus)

انظر تحت ductus incisivus .

النُّفَيقُ اللامُسَمَّى **innominate canaliculus**
(=1ـ تَلَمُ العَصَب الصَّخْرِيِّ الصَّغير) **(= 1- sulcus nervi petrosi minoris)**
(2ـ الثُّقْبَةُ الوَرِيدِيَّة) **(= 2- foramen venosum)**

القُنَيَّاتُ بَينَ الخَلايا **intercellular canaliculi**

قنية تتوضع بين خلايا مجاورة مثل الشعيرات الإفرازية للخلايا الجدارية المعدية (قنيات إفرازية) .

القُنَيَّاتُ داخل الخَلايا للخَلاَيا الجَدَارِيَّة (في المَعدَة) **intracellular canaliculi of parietal cells**

عدة أنفاق في الفك العلوي لمرور الأوعية والأعصاب السنخية العلوية الخلفية ، بداية كل نفق من السطح تحت الصدغ للفك العلوي عند الثقبة السنخية ، وتسمى كذلك الأنفاق السنية الخلفية .

النُّفَيقُ الخُشَّائيُّ **mastoid canaliculus**

انظر تحت canaliculus mastoideus TA .

النُّفَيقُ الخُشَّائيُّ لعَصَب أرْنولد **mastoid canaliculus for Arnold's nerve**

انظر تحتَ canaliculus mastoideus TA .

قُنَيَّةٌ صَفْراوِيَّةٌ كاذِبَة (في تشمعَ الكبدَ) **pseudobile canaliculus**

إحدى أعمدة الخلايا المصطبغة القاتمة في الأقنية الصفراوية التي تشاهد في المنطقة البوابية في تشمع الكبد .

قُنَيَّةٌ إفْرازيَّة **secretory canaliculus**

واحدة من التقنيات بين الخلوية الدقيقة المتوضعة بين خلايا الغدية المتجاورة ، مثل الخلايا الجدارية المعدية تبدأ بالتكون بين أتلام في سطح الخلايا ، وتفتح في تجويف الغدد .

المتوسط من الفخذ ، تحتوي الأوعية الفخذية والعصب الصافن . يتشكل الجدار الوحشي من المتسعة الإنسية ، ويتشكل الجدار الخلفي من العضلة المبعدة الطويلة والعضلةالمبعدة الكبيرة ، ويتشكل السقف من طبقة لفافية ، ويتغطى بالخياطية ، ويسمى كذلك النفق الساقي بحسب هنلي ، والنفق تحت الخياطية ، ونفق هنتر .

القَنَاةُ الهَضْميَّة **canalis alimentarius**

انظر تحت alimentary tract .

القَنَاةُ الشَّرجيَّة **canalis analis TA**

القسم النهائي من القناة الهضمية الذي يمتد من المستقيم إلى الشرج .

النَّفَقُ البُلْعُوميُّ القَاعديُّ (= النَّفَقُ الميكَعيُّ الغمْديُّ) **canalis basipharyngeus (=canalis vomerovaginalis TA)**

انظَر تحَت canalis vomerovaginalis TA .

نَفَقُ السُّباتيُّ **canalis caroticus TA**

(يمر فيه الشريان السباتي الغائر)

ممر في القسم الصخري من العظم الصدغي ، يبدأ من السطح السفلي في الأمام تماماً عند الثقبة الوداجية ، ويمضي إلى الأمام والأنسي بحوالي 2 سنتي متر ، يظهر في الأمام في قاع الحفرة القحفية الوسطى ، حيث يلتقي مع التلم السباتي في جسم العظم الوتدي ، به الوريد السباتي الباطن .

النَّفَقُ الرُّسْغيُّ **canalis carpi TA**

(يمر فيه وتر العضلات المثنية لليد)

نفق عظمي ليفي لمرور أوتار العضلات المثنية لليد والأصابع ، يتشكل من مثنيات اليد كسقف يغطي تقعر الرسغ على سطح الراحة ، ويسمى كذلك نفق المثنية .

القَنَاةُ المَرْكَزيَّةُ للنُّخاع **canalis centralis medullae spinalis TA**

قناة صغيرة تمتد على طول الحبل النخاعي مبطنة بخلايا البطانة العصبية ، تستمرمن فوق ضمن العظم الاسفنجي بين لوحين مكتنزين مما يؤمن ممراً لأوعية مابين اللوحتين . وتسمى كذلك أنفاق بريخت .

نَفَقُ عماد القَوقَعَة الطُّولانيُّ **canales longitudinales modioli TA**

(يمر فيه أوعية وأعصاب)

نفق قصير في عماد القوقعة ، يمر منه أعصاب وأوعية دموية .

الأَنْفاقُ الحَنَكيَّة **canales palatini**

(يمر فيها أوعيَة وأعصاب)

أنفاق يمر فيها أوعية دموية وأعصاب للحنك .

الأَنْفاقُ الحَنَكيَّةُ الصَّغيرَة **canales palatini minores TA**

(يمر فيها أوعية وأعصاب)

فتحات في العظم الحنكي والتي تتفرع بعيداً عن النفق الحنكي الكبير لنقل الأوعية والأعصاب الحنكية الصغيرة والمتوسطة إلى سقف الفم ، وتنتهي عند الثقبة الحنكية الصغيرة . وتسمى كذلك الأنفاق الحنكية الإضافية .

القنوات المجاورة للإحليل الذكري **canales paraurethrales urethrae masculinae**

الأنفاق الهلالية العظمية **canales semicirculares ossei**

ثلاثة أنفاق طويلة في التيه العظمي للأذن ، تشكل عرى وتنفتح ضمن الدهليز بواسطة خمس فتحات ، وبها القنوات الهلالية . وتسمى كذلك الأنفاق الهلالية .

الأَنْفاقُ الهِلاَليَّةُ العَظْميَّة **canales semicirculares ossei TA**

(تمر فيهَ القنوات الهلالية الغشائية)

ثلاثة أنفاق طويلة في التيه العظمي للأذن ، تشكل عرى وتنفتح ضمن الدهليز بواسطة خمس فتحات ، وبها القنوات الهلالية . وتسمى كذلك الأنفاق الهلالية .

نَفَقُ المُقرِّبَة **canalis adductorius TA**

(تمر فيه العَضَلَة المُقَرِّبَة)

فاصل بين العضلات في المنظر الإنسي للثلث

انظر تحت canalis nervi hypoglossi .

النَّفَقُ القاطعيُّ **canalis incisivus TA**

(تمر فيه أوعَيَة وأعصاب)

نفق صغير ينفتح في حفرة العضلة القاطعة للحنك الصلب ، ويمر منه أعصاب وأوعية صغيرة من قاع الأنف إلى القسم الجبهي من سقف الفم ، ويسمى كذلك النفق الأنفي الحنكي وثقبة ستينسون .

النَّفَقُ تَحْتَ الحَجاج **canalis infraorbitalis TA**

(تمر فيه أوعية وأعصاب)

ممر تحت السطح الحجاجي للفك العلوي ، يستمر نحو الخلف بالثلم تحت الحجاج وينفتح من الأمام على السطح الأمامي لجسم الفك العلوي في الثقبة تحت الحجاج ، ويحتوي العصب والأوعية تحت الحجاجية .

النَّفَقُ الأُرْبيُّ **canalis inguinalis TA**

ممر سطحَي من الحلقة الإربية العميقة يمر فيه الحبل المنوي عند الذكور والرباط المبيضي عند الإناث ، ويسمى كذلك النفق البطني ، ونفق فيلبو .

النَّفَقُ الفكِّيُّ السُّفْليّ **canalis mandibulae TA**

(تمر فيه أوعية وأعصاب)

النفق الذي يجتاز جسم الفك السفلي وفرعه بين الثقب الذقني والفكي ، ويمر منه الأوعية السنخية السفلية والعصب ، ينشطر إلى النفق الذقني والنفق القاطعي تحت الضاحكة الأولى أو الثانية . ويدعى أيضاً النفق السني السفلي (Inferior dental canal) .

نَفَقُ العَضَلَة النَّفيريَّة **canalis musculotubarius TA**

الميزابَة المشتركة للنفير والعضلة الموترة للطبلة في العظم الصدغي .

النَّفَقُ الأنْفيُّ الدَّمْعيّ **canalis nasolacrimalis TA**

(تمر فيه القناة الدمعية)

يتشكل النفق الدمعي من التلم الدمعي في العظم الفكي العلوي ومن العظم الدمعي ومن البصلة حيث تنفتح في البطين الرابع .

قَنَاةُ عُنُق الرَّحم **canalis cervicis uteri TA**

الجزء من جوف الرحم الذي يرتبط من خلال عنق الرحم .

نَفَقُ الحَبْل الطَّبْلي **canalis chordae tympani**

نفق يمر فيه عصَب الحبل الطبلي .

النَّفَقُ اللُّقْميُّ **canalis condylaris TA**

(يمر فيه ورَيد)

فتحة توجد أحياناً في قاع الحفرة اللقمية لانتقال وريد من الجيب المستعرض . وتسمى كذلك الثقبة اللقمية الخلفية .

النَّفَقُ اللُّقْميُّ **canalis condyloideus**

(يمر فيه ورَيد)

فتحة توجد أحياناً في قاع الحفرة اللقمية لنقل الوريد من الجيب المستعرض . وتسمى كذلك الثقبة اللقمية الخلفية .

نَفَقُ الوَجْهيِّ **canalis facialis [Fallopii]**

نفق يمر فيه العصب الوجهي .

نَفَقُ الوَجْهي **canalis facialis TA**

(يمر فيه العَصب الوجهي)

النَّفَقُ الفَخذيُّ **canalis femoralis TA**

الجزء الإنْسَي مخروطي الشكل من الغمد الفخذي بجانب قاعدة الرباط الجوبي . ويسمى كذلك النفق الساقي .

القَناةُ المَعديَّة **canalis gastricus TA**

قناة متلَمَة طولانية تتشكل من حروف منتظمة تقريباً على امتداد الانحناء الصغير للمعدة . وتسمى كذلك قناة المعدة ، والقناة البطينية .

نَفَقُ الزُّجاجيَّة **canalis hyaloideus TA**

(يمر فيه شريَان)

ممر يجرى من أمام القرص البصري إلى عدسة العين ، يمر منه الشريان الزجاجي في المضغة ، ويسمى كذلك النفق المركزي بحسب ستيلنج ونفق الزجاجية المركزي ونفق كلوكية .

النَّفَقُ تَحْتَ اللِّسان **canalis hypoglossi**

(تمر فيه أوعية وأعصاب)

فتحة ضمن الغشاء المسد لمرور العصب والأوعية المسدة ، حدوده هي حافة الغشاء المسد مع التلم المسد للعظم العاني .

نَفَقُ العَصَبِ البَصَرِي **canalis opticus TA**

إحدى الفَتحتَين في العظم الوتدي حيث يلتصق الجناحان الصغيران إلى جسم العظم عند قمة الحجاج ، يمر من كل نفق واحد من الأعصاب البصرية والشريان العيني الخاص بذلك الجانب . ويسمى كذلك الثقبة البصرية للعظم الوتدي .

النَّفَقُ الحَنَكِيُّ الكَبِير (تمَرّ فيه أوعية وأعصاب) **canalis palatinus major TA**

ممر في العظم الوتدي والعظم الحنكي لكل من العصب والأوعية الحنكية الكبيرة ، ينتهي عند الثقبة الحنكية الكبيرة . ويسمى كذلك : النفق الجناحي الحنكي ، أو النفق الحنكي للفك العلوي ، أو النفق الوتدي الحنكي .

النَّفَقُ الحَنَكِيُّ الغِمْدِيُّ **canalis palatovaginalis TA**

نفقَ ضَيق يتوضع في سقف جوف الأنف بين السطح السفلي لجسم العظم الوتدي والناتئ الوتدي للعظم الحنكي ، يفتح من الخلف في جوف الأنف ومن الأمام في الحفرة الجناحية الحنكية . ويسمى كذلك : النفق البلعومي ، أو النفق الجناحي الحنكي ، أو النفق الوتدي البلعومي ، أو النفق الميكعي القاعدي السفلي الوحشي .

النَّفَقُ البُلْعوميّ (= **النَّفَقُ الحَنَكِيُّ البُلْعوميُّ**) **canalis pharyngeus (=canalis palatovaginalis TA)**

انظر تحت canalis palatovaginalis .

النَّفَقُ الجَناحيُّ **canalis pterygoideus TA**

نفق متواصلَ أفقياً يمر نحو الأمام ضمن قاعدة الصفيحة الإنسية الجناحية للعظم الوتدي لتفتح ضمن الجدار الخلفي للحفرة الجناحية الحنكية أسفل وأنسي الثقبة المدورة تماماً . تمر فيه الأوعية والأعصاب الجناحية . ويسمى كذلك نفق المحارة الأنفية السفلية . وتحوي القناة الأنفية الدمعية . وتسمى كذلك القناة الدمعية والقناة الأنفية .

نفق العصب الوجهي **canalis nervi facialis**

نفق في العظم الصدغي للعصب الوجهي ، تبدأ من الصماخ السمعي الباطن وتجتاز من الجهة الوحشية الأمامية ظهراني لدهليز الأذن الباطنة بحوالي 2 ملي متر ، وتنعطف بدرجة حادة إلى الخلف عند ركبة النفق الوجهي ، وتسير على طول الجدار الإنسي للجوف الطبلي ، ثم تنعطف نحو الأسفل وتصل إلى ظاهر القسم الصخري من العظم الصخري عند الثقبة الإبرية الخشائية . ويسمى كذلك نفق العصب الوجهي ، ومسال فالوب أو نفق فالوب .

نفق العصب تحت اللسان **canalis nervi hypoglossi**

فتحة في الجزء الوحشي للعظم القذالي عند قاعدة اللقمة . يمر منها العصب تحت اللسان وفرع الشريان السحائي الخلفي . وتسمى كذلك النفق اللقمي الأمامي ، والنفق تحت اللساني ، والثقبة اللقمية الأمامية .

النَّفَقُ المُغَذي للعَظْم (تمر فيه أوعية) **canalis nutricius ossis**

إحدى الأقنية التفاغرية الحرة للجهاز الهافيرسي للعظم المكتنز ، والتي تحتوي على الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية والأعصاب ، وتسمى كذلك النفق المغذي والنفق الهافيرسي وحيز هافيرس .

النفق المغذي للعظم **canalis nutrisius TA**

أحد الأقنية التفاغرية الحرة في الجهاز الهافيرسي للعظم المكتنز ، والتي تحتوي على الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية والأعصاب . وتسمى كذلك النفق المغذي ، ونفق هافيرس ، وحيز هافيرس .

نَفَقُ المُسدَّة **canalis obturatorius**

(تمر فيهَ أوعية وأعصاب)

الأفقي .

النَّفَقُ الهِلاَلِيُّ الخَلْفِي **canalis semicircularis posterior TA**

(تمر فيه القناة الهلالية الغشائية الخلفية)

القسم الخلفي من الأنفاق الهلالية ، تعمل كمأوى للقنوات الهلالية خلف التيه الغشائي .

النَّفَقُ الهِلاَلِي العُلْوِيُّ **canalis semicircularis superior**

(تمر فيه القناة الهلالية الغشائية العلوية)

انظر تحت canalis semicircularis anterior .

النَّفَقُ السِّيسَائِيّ **canalis spinalis**

(=**النَّفَقُ الفِقَرِيُّ**) **(=canalis vertebralis TA)**

انظر تحت canalis vertebralis .

نَفَقُ القَوقَعَة الحَلَزونيُّ **canalis spiralis cochleae TA**

(يمر فيه عصب)

النفق الحلزوني (أنبوبة حلزونية) الذي يجري دورتين أو دورة ونصف حول عماد القوقعة ، ينقسم بواسطة الصفيحة الحلزونية إلى حيزين هما السقالة الطبلية والسقالة الدهليزية .

نَفَقُ عماد القَوقَعَة الحَلَزونيُّ **canalis spiralis modioli TA**

(يمر فيه عصب)

نفق يتبع مساق الصفيحة الحلزونية العظمية للقوقعة ، وتحتوي على العقدة الحلزونية للقسم القوقعي من العصب القوقعي الدهليزي . ويسمى كذلك نفق روزنتال .

النَّفَقُ تَحْتَ الخَيَّاطِيَّة **canalis subsartorialis**

(=**نَفَقُ الْمُقَرِّبَة**) **(=canalis adductorius)**

انظر تحت canalis adductorius .

القَنَاةُ البُطَينيَّة **canalis ventriculi TA**

(=**القَنَاةُ المَعديَّة**)

انظر تحت canalis gastricus .

النَّفَقُ الفِقَرِيُّ **canalis vertebralis TA**

(تمر فيه السحايا والنخاع)

النفق الذي تشكله الثقوب المتتابعة للفقرات التي تشمل الحبل النخاعي والسحايا . ويسمى

جويدي ، والنفق الراجع ، ونفق فيديوس .

النَّفَقُ الجَنَاحِيُّ الحَنَكِي **canalis pterygopalatinus**

انظر تحت canalis palatinus major .

النَّفَقُ الفَرْجِيُّ **canalis pudendalis TA**

(تمر فيه الأوعية والأعصاب الفرجية)

نفق في الغمد اللفافي الخاص الذي يمر من خلاله العصب والأوعية الفرجية ، ويتصل بصفة وثيقة مع اللفافة المسدة . ويسمى كذلك نفق ألكوك .

القَنَاةُ البَوَّابِيَّة **canalis pyloricus TA**

الجزء القصير الضيق من المعدة الذي يمتد من الموصل المعدي الإثنا عشرية إلى غار البواب .

نَفَقُ جَذْرِ السِّن **canalis radicis dentis TA**

القسم الجوفي اللبي من جذر السن الذي يمتد من الغرفة اللبية إلى الثقبة القمية ، قد توجد أكثر من قناة واحدة في جذر مفرد ، يشيع وجود زوج من الأقنية في الجذر الإنسي للرحى الأولى في الفك السفلي . وتسمى أيضاً القناة اللبية .

القَنَاةُ الاتِّحادية **canalis reuniens**

(بين القريبة والكييس)

انظر تحت ductus reuniens .

النَّفَقُ العَجُزِيُّ **canalis sacralis TA**

استمرار النفق الفقري ضمن العجز .

النَّفَقُ الهِلاَلِيُّ الأمامي **canalis semicircularis anterior TA**

(تمر فيه القناة الهلالية الغشائية الأمامية)

القسم الأمامي للأنفاق الهلالية العظمية ، تعمل كمأوى للقنوات الهلالية أمام التيه الغشائي ، ويسمى كذلك النفق الهلالي العلوي .

النَّفَقُ الهِلاَلِيُّ الوَحْشِيّ **canalis semicircularis lateralis TA**

(تمر فيه القناة الهلالية الغشائية الوحشية)

القسم الوحشي للأنفاق الهلالية العظمية ، تعمل كمأوى للقناة الهلالية الوحشية للتيه الغشائي ، ويسمى كذلك النفق الهلالي

مادة مضادة للجراثيم تعزل من وجبة الكانافاليا (فولة جاك) .

كانافاناز canavanase

(= أرْجيناز) (=arginase)

الأرجيناز هو إنزيم موجود بصفة أولية في الكبد ، والذي يعمل على حلمهة الأرجينين مكوناً اليوريا والأورنيثين في دورة اليوريا .

كانافانين canavanine

مضاهئ للأرجينين موجود في بذور الفصة (الفصفصة) وفولة جاك ، يستعمل في التجارب الطبية لدراسة الإنزيمات التي عادة ما تعمل على الأرجينين .

داء كانافان canavan's disease

[داء منسوب للطبيب ميرتل ماي كانافان (Myrtelle May Canavan) ، وهو طبيب أعصاب أمريكي عاش مابين 1879-1953] ، وهو التنكس الإسفنجي للجهاز العصبي المركزي .

انظر تحت degeneration .

داء كانافان ـ فان بوجائيرت ـ بيرتراند Canavan-van Bogaert-Bertrand disease

[داء منسوب للطبيب ميرتيل ماي كانافان (Myrtelle May Canavan) ، وهو طبيب أعصاب أمريكي عاش مابين 1879-1953 ، والطبيب لودو فان بوجائيرت (Ludo Van Bogaert) ، وهو طبيب أعصاب بلجيكي ولد عام 1897 ، والطبيب إيفان جورج بيرتراند (Ivan Georges Bertrand) ، وهو طبيب أعصاب فرنسي عاش مابين 1863-1965] .

التنكس الإسفنجي في الجهاز العصبي المركزي

انظر تحت degeneratien .

إسْفَنْجيّ cancellated

ما له بنيان شُبَيْكيُ الشكل .

إسْفَنْجات cancelli TA

(ف: إسْفَنْجَة) (sing.cancellus)

بنية تشريحية نسيجية

إسْفَنْجيّ (صفة للنسيج العظمي) cancellous

كذلك النفق السيسائي والنفق النخاعي والنفق العصبي .

القناة الميكعية المنقارية canalis vomerostralis

نفق يتوضع بين الميكعة (Vomer) والمنقار الوتدي .

النَّفَقُ الميكَعِيُّ الغمْديّ canalis vomerovaginalis TA

فتحَة غير ثابتة تتشكل بواسطة الحواف المفصلية لجناح الميكعة وجسم العظم الوتدي ، وتسمى كذلك النفق البلعومي القاعدي والنفق الميكعي القاعدي الوحشي والنفق الميكعي.

1 ـ استِقناء canalization

2 ـ استِنْفاق

1 ـ تشكيل قناة أو نفق طبيعي أو مرضي .

2 ـ إحداث قناة جراحية من أجل النزح .

3 ـ إعادة الاستقناء .

4 ـ في الطب النفسي : تشكيل مسالك جديدة للجهاز العصبي المركزي بوساطة الإمرار المتكرر للتدفعات العصبية .

1 ـ رأبُ القناة canaloplasty

2 ـ رأبُ النَّفق

الاستبناء التجميلي لممر ، كما في الصماخ السمعي الظاهر .

رأب القناة أو النفق canalplasty

انظر تحت canalopasty .

جدري الطيور canarypox

نمط من جدري الطيور الذي يشاهد عند الكناريات .

قنَوات canaux

(ف: قناة)

كانافاليا Canavalia

هي فولة جاك ، جنس من النباتات الهندية الغربية من فصيلة القرنيات ، كثيراً ماتستعمل كغذاء عند البشر وحيوانات المزرعة . الكانافاليا الحنجرية الشكل ، والأنواع الأخرى هي مصدر الكانافالين والكانافانين والكونكانافالين .

كانافالين (مادَّة مُضادَّة لِلجَراثِيم) canavalin

سَرَطانٌ تَنْبُوليُّ المَنْشأ **betel cancer**
(= السَّرَطَانُ الوَجْنيُّ بمَضْغ التَّنْبُوْل) **(=buyocheek cancer)**
سَرطانَة حرشفية الخلايا في الأغشية المخاطية للخد ، تشاهد في الهند والدول الآسيوية التي يوجد فيها جوز التنبول الذي غالباً مايخلط مع التبغ ، ويحتجز في الدهليز الفموي لفترات طويلة .

السَّرَطانُ الأسْوَد **black cancer**
(= الوَرَمُ الميلانينيُّ الخَبيْث) **(=malignant melanoma)**
انظرَ تحت malignant melanoma .

سَرَطانٌ ثاقب **boring cancer**

سَرَطانٌ خَيْشُوْميُّ المَنْشَأ **branchiogenous cancer**

سَرَطانُ بَاتَارْ **Butter's cancer**
سَرَطانُ الثَّنْيَة الكَبديَّة للقَولون .

السرَطانُ الوجَنيُّ بمَضْغ التَّنبُول **buyo cheek cancer**
انظر تحت betel cancer .

سَرَطانُ المُتَصَاحبَيْن **cancer a deux**
سرطان يصيبَ بصفة متواقتة أو متتابعة شخصين يعيشان معاً .

سَرَطانٌ مُضمِّر **cancer atrophicans**
(= سَرَطانٌ صَلْد) **(=scirrhous cancer)**
نمو سرطاني صلب .

خَليَّةٌ سَرَطانيَّة **cancer cell**

سَرَطانٌ كالمَشَدّ **cancer en cuirasse**
(= سَرَطانٌ درْعيّ)
انظر تحت carcinoma .

سَرَطانٌ لابد **cancer in situ**
مصطلحَ لاتيني معناه سرطان في وضعه أو مكانه الطبيعي .

سجلٌّ الأورام **cancer registry**

سَرَطانٌ خَلَويّ **cellular cancer**
(= سَرطانَةٌ لُبِّيَّة) **(=medullary carcinoma)**
انظر تحت medullary carinoma .

بنية إسفنجية الشكل أو شبيكية ، تقال بصفة رئيسية كوصف للنسيج العظمي .

إسْفنْجة **cancellus TA**
(ج:إسْفنْجات) **(pl.cancelli)**
أي بنية مرتبة كشبيكة .

سَرَطان **cancer**
المرض الورمي الذي يكون مساقه الطبيعي مميتاً . تتصف الخلايا السرطانية بالغزو والنقائل ، وبأنها كشمية (Anaplastic) بدرجة عالية بخلاف خلايا الورم الحميد . يشمل السرطان فئتين عريضتين هما الساركومة والسرطانة ، ولكن جرى العرف المعتاد على استعمال السرطانة كمرادف على الأغلب ، ولها مرادف آخر وهو الورم الخبيث .

سَرَطانٌ عُنَيبيّ **acinar cancer**
سرطان موجود بالعنيبة ، وهي الشكل الانتهائي للغدة خارجية الإفراز والتي لها شكل العنب .

سَرَطانٌ عُنَيبيّ **acinous cancer**
انظر تحت acinar cancer .

سَرَطانٌ غُدَّانيّ **adenoid cancer**
سرطان يتواجد في النسيج اللمفاوي المتواضع في البلعوم العلوي .

سَرَطانٌ سنْخيّ **alveolar cancer**
انظر تحت alveolar .

سَرَطانُ الأنيلين **aniline cancer**
سرطان في المثانة غالباً ، يحدث مابين العمال الذين يشتغلون بصبغة الأنيلين . ويسمى كذلك سرطان عمال الأصبغة .

سَرَطانٌ نَظيف **apinoid cancer**
(= سَرَطانٌ صَلْد) **(=scirrhous cancer)**
له علاقة بنمو سرطاني صلب .

سَرَطانٌ زرنيخي المَنْشأ **arsenic cancer**
سرطان يحدث نتيجة التعرض للزرنيخ .

سَرَطانٌ أَسْبسْتيُّ المَنْشأ **asbestos cancer**
الأسبستَ هو معدن مقاوم للحرارة يستخدم في المواد العازلة ، والمقاومة للحريق ، والتعرض الطويل يسبب السرطان .

(=medullary carcinoma) **(=سَرَطانةٌ لُبِّيَّة)**
انظر تحت medullary carcinoma .

endometrial cancer **سرطان بطاني رحمي**
انظر تحت carcinoma .

endothelial cancer **سَرَطانٌ بطانيّ**
(=endothelioma) **(=وَرَمٌ بِطَانِيٌّ)**
انظر تحت endothelioma .

epidermal cancer **سَرَطانٌ بَشْرَوِيّ**

epithelial cancer **سَرَطانٌ ظِهارِيّ**

glandular cancer **سَرَطَانٌ غُدِّيّ**
(=adenocarcinoma) **(=سَرَطَانَةٌ غُدِّيَّة)**
انظر تحت adenocarcinoma .

green cancer **سَرَطانٌ أَخْضَر**
ويسمى أيضاً الورم الأخضر (Chloroma) والابيضاض الأخضر (Chloroleukemia) ، والورم النقوي الأخضر . وهي حالة تتصف بتطور كتل خضراء متوضعة ومتعددة ومكونة من خلايا شاذة (الأرومات النقوية في معظم الحالات) ، ولها علاقة بسمحاق القحف والعمود الفقري والأضلاع .

hard cancer **سَرَطانٌ دِرعِيّ**
(=scirrhous cancer) **(=سَرَطانٌ صَلْد)**

kang cancer **سرطان الكانغ**
سرطان الكانغري ، سرطانة حرشفية الخلية في الفخذ أو البطن تصيب الأهالي الهنود أو الصينيين وتنسب إلى التهيج بسبب الكانغ (الفرن الساخن المصنوع من الخزف أو الفخار) ، والتي تنسب إلى الكانغري .

latent cancer **سَرَطانٌ خافٍ** (خَافِي)
سرطان يكتشف بغياب أي تظاهرات إكلينيكية خلال الفحص الخلوي .

medullary cancer **سَرَطانٌ لُبِّيّ**
انظر تحت carcinoma .

melanotic cancer **سَرَطانٌ ملاَنِيّ**
(=malignant melanoma) **(=الوَرَمُ المِلاَنِيُّ الخَبيث)**
الورم الميلانيني الخبيث .

cerebriform cancer **سَرَطانٌ دِماغِيُّ الشَّكْل**
(=medullary carcinoma) **(=سَرَطَانَةٌ لُبِّيَّة)**
انظر تحت medullary carcinoma .

chimney-sweeps' cancer **سَرَطانُ سُخامِ المَداخن**
سرطانةَ حرشفية الخلايا في جلد الصفن بسبب التسمم بالسخام ، ويسمى كذلك سرطان السخام .

chondroid cancer **سَرَطانٌ شِبْهُ غُضْروفيّ**

chromate cancer **سَرَطانُ الكرُومات**
سرطان الكرومات ، هو سرطان يحدث عند العمال المعرضين للرصاص ، حيث إنه محرض قوي لنشوء السرطان ، وعرف عنه ذلك منذ أكثر من 50 عاماً ، ويصيب سرطان الكرومات الجهاز التنفسي ، وقد تمت عدة دراسات وأبحاث حول سرطان الكرومات .

clay-pipe cancer **سَرَطانُ التَّدْخين بالغُلْيون**
سرطانة حرشفَية الخلايا في الشفة تنجم عن التهيج بسبب جذع الغليون .

colloid cancer **سرطانٌ غَرَوانيّ**
هَي السرطانةَ الموسينية .
انظر تحت mucinous carcinoma .

contact cancer **سَرَطانُ التَّماس**
سرطان يتنامى من جزءين الجسم المتلامس مع سرطان موجود مسبقاً .

cystic cancer **سَرَطانٌ كيسِيّ**

dendritic cancer **سَرَطانٌ مُتَغَصِّن**
(=papillary carcinoma) **(=سَرَطانَةٌ حُلَيمِيَّة)**
انظر تحت papillary carcinoma .

duct cancer **سَرَطانٌ قَنَوِيّ**
انظر تحت carcinoma .

dye workers' cancer **سَرَطانُ عُمَّال الأَصْباغ**
سرطان عمالَ الأصبغة وهو سرطان الأنيلين .
انظر تحت aniline cancer

encephaloid cancer **سَرَطانٌ دِماغيُّ الشَّكْل**

انظر تحت malignant melanoma .

سَرَطانُ الزُّيوت المَعْدَنيَّة **mineral oil cancer**

سرطان نتيجة اَلتعرضَ للزيوت المعدنية .

سَرَطانُ عُمَّال الغَزْل **mule-spinners cancer**

شكل من السَرطانة حرشفية الخلايا التي تصيب عـمـال الغزل الـذين يعـملـون في صناعـة غـزل القطـن . ينجم عن النقع (الإبتـلال) المستـمـر للملابس والبطن بواسطة بالزرنيخ أو القطران أو الزيوت المسرطنة ، وهو الآن سرطان نادر .

سَرَطانٌ عَديدُ المَراكز **multicentric cancer**

سرطان الرئة اللاصغير الخلايا **non-small cell lung cancer**


انظر تحت lung cancer .

سَرَطانٌ خَفيٌّ **occult cancer**

سرطان صَغير قد يظهر تظاهرات إكلينيكية في النقـائل (Metastases) القـاصـيـة قبـل أن يكون هونفسه قابلاً للاكتشاف .

سَرَطانُ عُمَّال الشَّمْع **paraffin cancer**

سـرطـانة في َالجلد توجـد عند العـمـال الذين يشتغلون في شمع البرافين .



السرطان الأسود
Black cancer

سَرَطانُ عُمَّال القَطَران **pitch-workers' cancer**

سرطانة في جَلد اَلوجَه والـعنق والصفن تشاهد عند العـمـال الذين كـثيراً ما يتعـرضـون للزفت والقار (القطران) .

سَرَطانٌ أوَّليّ **primary cancer**

التنشؤ والَتوضع الأولي للسرطان .

سَرَطانُ العاملينَ بالأشعَّة **radiologists cancer**

سرطان ناجٌ عن تعـرضَ الأطباء أو فنيي الأشـعة للإشعاع .

سَرَطانٌ رَاديْومي المَنْشأ **radium cancer**

سرطان نتيجةَ اَلتعرض للراديوم (العنصر الثامن والثمانون ، وهو عنصر معدني كيميائي نشيط إشعاعياً) .

سَرَطانٌ رُجُوعيٌّ **retrograde cancer**

سرطان ينمو فَي اتجاه معاكس للاتجاه المعتاد .

سَرَطانٌ قارض **rodent cancer**

سَرَطانُ العاملينَ بالأشـعَّة **roentgenologists cancer**

انظر تحت radiologists cancer .

سرطان ندبي **scar cancer**

سرطان يتوضع فوق الندبة .

انظر تحت carcinoma .

سرطان المثانة البلهارسي **schistosomal bladder cancer**

سرطان المثانة نتيجة الإصابة بالبلهارسيا .

سَرَطانٌ صَلْد **scirrhous cancer**

انظر تحت carcinoma .

سرطان الرئة صغير الخلايا **small cell lung cancer**

انظر تحت carcinoma .

سَرَطانُ المُدَخِّنين **smokers' cancer**

سرطان يصيب أي من المسالك البـولية التنفسية نتيجة التدخين .

سَرَطانُ رخْو **soft cancer**

انظر تحتَ medullary carcinoma .

سَـرَطانُ السُّخـام (= سَرَطانُ منظفي المَداخن) **soot cancer (=chimney sweeper's cancer)**

انظر تحت chimney sweeper's cancer .

سَرَطانُ الخَلاَيا المِغْزَليَّة **spindle cell cancer**

انظر تحت carcinoma .

سرطان المستنقعات **swamp cancer**

مـصطلح عـام لعـدة متلازمات تصيب الخيـول

cancerphobia **رُهابُ السَّرَطان**

الخوف غير المنطقي من السرطان .

cancer-ulcer **قَرْحَة سَرَطانِيَّة**

cancriform **سَرَطانِيُّ الشَّكل**

يشبه السرطان .

cancrine **كانسيرين**

له جودة التفاح البري أو السلطعون (الكابوريا) أو شبيه بهما .

cancroid **1ـ شَبِيهُ السَّرَطان**
2ـ سرطانٌ جِلدِيٌّ

1ـ يشبه السرطان .

2ـ خلايا جلدية خبيثة تظهر في الجلد .

cancrum **قارحَة**
(=canker)

انظر تحت canker .

cancrum nasi **قارحَةُ الأَنْف**

الْتِهاب الأنف الغرغريني (عند الأطفال) .

cancrum oris **قارِحَةُ الفَم**
(=noma)

التهاب الفم الغرغريني (آكلة الفم)
انظر تحت noma .

cancrum pudendi **قارِحَةُ الفَرْج**

تآكل غنغريني في الأعضاء التناسلية .
انظر تحت erosive balanitis .
انظر تحت erosive vulvitis .

candela **قَنْدِيلَة**
(وَحْدَةَ الإنارَة)

الوحدة الدولية لشدة اللمعان ، والتي تعادل سدس شدة اللمعان في السنتي متر المربع من جسم أسود مشع عند نقطة انجمادالبلاتين . وتسمى كذلك (Candle) ، القنديلة الجديدة (New Candle) ، والقنديلة المعيارية (Standard Candle) ، واختصارها (cd) .

candellia **شمع الفربيون**

شمع الفربيون هو شمع نباتي من الحور .

Candeptin **كانديبتين**

الاسم التجاري لمستحضر الكانديسيدين .

وتسبب آفات في الجلد أوالأغشية المخاطية وتقرحات ونسيج حبيبي في الرأس والجذع والأطراف السفلية .

انظر تحت cutaneous habronemiasis pythiosis

tar cancer **سَرَطانٌ قَطرَانيُّ المَنْشأ**

سرطانة حرشفية الخلايا تنجم عن التهيج الالتهابي لأدخنة القطران ، أو بسبب الأثر التهيجي للقطران على الجلد .

tubular cancer **سَرَطانٌ أُنْبوبِيّ**

انظر تحت tubular carcinoma .

ulcer cancer **سَرَطانُ القَرْحَة**

ulcerated cancer **سَرَطانٌ مُتَقَرِّح**

unicentric cancer **سَرَطانٌ وَحِيدُ المَرْكَز**

سرطان له مركز واحد .

villous duct cancer **سَرَطانُ الأَقْنِيَة الزُّغَابِيَّة**

سرطان يصيب الأقنية المغطاة بالزغب (شعر دقيق) .

canceration **تَسَرْطُن**

canceremia **وُجودُ الخَلايا السَّرَطانِيَّة في الدَّم**

cancericidal **مُبِيدُ السَّرَطان**

مخرب للخلايا الخبيثة أو السرطانية .

cancerigenic **مُسَرْطِن**

يكون الورم الخبيث .

cancerism **أَهْبَةُ التَّسَرْطُن**

الاستعداد للتكون أو التنشؤ الورمي .

cancerocidal **مُبِيدُ السَّرَطان**

مخرب للخلايا الخبيثة أو السرطانية .

cancerogenic **مُسَرْطِن**

انظر تحت cancerigenic .

cancerophobia **رُهابُ السَّرَطان**

انظر تحت cancerphobia .

cancerosis **تَسَرْطُن**

cancerostatic **كابِحُ السَّرَطان**

أي دواء أو عامل يمكنه توقيف نمو أو سير المرض السرطاني .

cancerous **سَرَطانِيّ**

له طبيعة السرطان أو متعلق به .

المبيضة اللوزيتانية **Candida lusitaniae**

نوع يسبب عداوى انتهازية عند البشر ؛ مرحلتها الجنسية الكاملة هي البوغية الدبوسية اللوزيتانية (Clvispora lusitaniae) .

المُبَيْضَةُ المَساريقيَّة **Candida mesenterica**

نوع يسبب التخمر في أحماض الفاكهة ، وتسمى كذلك السكيراء المساريقية (Saccharomyces mesentericus) .

المُبَيْضَةُ المَرَطيَّة **Candida parapsilosis**

نوع يسبب أحياناً التهاب الشغاف ، والداحس ، والتهاب الأذن الظاهرة .

المبيضة المدارية الكاذبة **Candida pseudotropicalis**

نوع يسبب أحياناً التهاب المهبل .

المُبَيْضَةُ المَدارِيَّة **Candida tropicalis**

نوع يسبب أحياناً داء المبيضات المهبلي ، التهاب السحايا ، والفطار الظفري ، والعدوى القصبية الرئوية .

المبيضة الشبيهة بالنجمة **Candida stellatoidae**

نوع يسبب أحياناً التهاب المهبل بالمبيضات أو التهاب الشغاف بالمبيضات . البعض يعدها نوعاً متفاوتاً عن المبيضات البيض .

المُبَيْضَةُ الخَمْرِيَّة **Candida vini**

نوع يوجد في السوائل المتخمرة بول المصابين بالسكري ، وتسمى كذلك السكيراء الجلدية (Saccharomyces mycoderma) .

متعلق بالمُبَيْضَّات **candidal**

متعلق بالمبيضات أو ناجم عنها .

وُجودُ المُبَيْضَّاتِ في الدَّم **candidemia**

وجود الفطور من جنس المبيضات في الدم ، وعادة مايكون بسبب التهاب الشغاف بالمبيضات أو داء المبيضات الجهازي (Systemic candidiasis) .

داءُ المُبَيْضَّات **candidiasis**

عدوى بفطر من جنس المبيضات ، وبصفة خاصة المبيضات البيض . عادة ماتكون عدوى سطحية في الجلد أو الأغشية المخاطية ، على

كانديسارتن سيليكسيتيل **candesartan cilexetil**

وهو مركب غير فعال بيولوجياً ، ومناهض لمستقبلة الأنجيوتنسين II ، والذي يستعمل في علاج فرط ضغط الدم ، يعطى فموياً .

كانديسيدين **candicidin**

(مُضادٌ حَيَوِيٌّ مبيد للفطريَّات)

مضاد حيوي مضاد للفطريات تنتجه ذرية المتسلسلة السنجابية ، وهو فعال بصفة خاصة ضد المبيضات البيض ، ويعطى كعلاج داخل المهبل في داء المبيضات المهبلي .

المُبَيْضَّة **Candida**

(جِنسٌ من الفطريَّات)

(مصطلح من اللغة اللاتينية بمعنى : الأبيض المتوهج)

المبيضة جنس من الفطريات الناقصة خميرية الشكل من فصيلة المستخفيات ، تتصف بإنتاج خلايا الخميرة ، والأفطوريات ، والأفطوريات الكاذبة والأبواغ البرعمية ، بعض أنواعها يشكل جزءاً من النبيت الطبيعي في الجلد والأغشية المخاطية عند الإنسان ولكن قد تسبب عداوى مختلفة . كانت تدعى سابقاً الطوقية ، والفطريات السبحية أو العقدية ، والفطرية البيضاوية .

المُبَيْضَةُ البَيضاء **Candida albicans**

نوع من قسم النبيت الطبيعي في الجلد والأغشية المخاطية للإنسان ، وهو أشيع سبب لداء المبيضات .

المبيضة الجرداء **Candida glabrata**

انظر تحت torulopsis glabrata .

المبيضة الجويرّموندية **Candida guilliermondii**

نوع يسبب داء المبيضات الجلدي ، وداء الفطار الظفري ، والتهاب السحايا ، والتهاب الشغاف .

المبيضة الكراوزية **Candida krusei**

نوع يتصاحب أحياناً مع داء المبيضات ، والتهاب البلعوم ، والتهاب الشغاف ، والتهاب المهبل .

الداحس المزمن .

داءُ المُبْيَضَّات الشِّغافيُّ **endocardial candidiasis**

التهاب الشغاف بالمبيضات (Candida endocarditis) .

داء المبيضات الفموي **oral candidiasis**

انظر تحت thrush .

داء المبيضات الرئوي **pulmonary candidiasis**

نمط من الالتهاب الرئوي الفطري الذي ينجم عن العدوى بنوع من المبيضات ، يشاهد بصفة خاصة عند المرضى منقوصي المناعة ، أو هؤلاء المصابين بالخباثات . ويسمى كذلك التهاب الرئة بالمبيضات .

داء المبيضات المهبلي **vaginal candidiasis**

التهاب المهبل بالمبيضات (Candida vaginitis) .

داء المبيضات الفرجي المهبلي **vulvovaginal candidiasis**

التهاب الفرج والمهبل بالمبيضات (Candida vulvovaginitis) .


طفحة المُبَيْضَّات candidid

طفح جلدي ثانوي ، وهو عبارة عن فرط التحسس لعدوى المبيضات في أي مكان من الجسم ، ويسمى كذلك الطفح المبيّضيّ (Moniliid) .

كانديدين candidin

مستضد للاختبار الجلدي ، والذي يشتق من

المريء المعدى بالمبيضة (جنس من الفطريات)
Candida infecting esophagus



داء المبيضات Candidiasis

الرغم من أنها قد تتظاهر أحياناً بالعدوى الجهازية أو التهاب الشغاف ، أو أي شكل منهم ، والذي قد يصبح وخيماً عند المرضى منقوصي المناعة .

داء المبيضات الغشائي الكاذب **acute pseudomembranous candidiasis**

انظر تحت thrush .

داء المبيضات الضموري **atropic candidiasis**

نمط من السلاق الفمى يتسم باللطخات الكوارتزية الحماموية على الحنك الرخو والصلب والمخاطية الشدقية ، وسطح اللسان الظهراني ، من مضاعفات العديد من الاضطرابات المختلفة مثل العوز الڤيتاميني ، والداء السكري ، والبدلات السنية عسيرة التلاؤم ، توجد منه أشكال حادة أومزمنة تسمى بالتهاب الفم بالبدلة السنية .

داء المبيضات القصبي الرئوي **bronchopulmonary candidiasis**

التهاب السبيل التنفسي بالمبيضات ، الناتج عن استعمار الشجرة الرغامية القصبية عند المرضى منقوصي المناعة ، أو بسبب المضادات الحيوية ، أو المصاحب للالتهاب الرئوي في نقص المناعة ، يتأرجح مابين الخفيف والوخيم والمهدد للحياة . ويسمى كذلك داء المبيضات القصبي .

داء المبيضات المخاطي الجلدي المزمن **chronic mucocutaneous candidiasis**

إحدى المجموعات المتنوعة المتسببة للعدوى بالمبيضات في الخاطية الفموية والجلد والأظفار ، والمخاطية المهبلية ، وعادة ما تكون مقاومة للعلاج ، وقد تكون موضعية أو منتشرة أو عائلية أحياناً ، وربما تتصاحب مع كبت المناعة والاعتلالات الصماوية .

داءُ المُبْيَضَّات الجلْديُّ **cutaneous candidiasis**

قد يتظاهر دَاء المَبَيْضات الجلدي كتآكلات أكزيمية الشكل في الأحياز مابين الأصابع أوبالصماغ (أي التهاب الشفة الزاوي) ، أو

عصا رباعية القوائم **quadruped cane**

انظر تحت quadripod cane .

عَصا ثُلاثيَّةُ القَوائم **tripod cane**

عصا مشابهة لرباعية القوائم ماعدا أنها تتشعب إلى ثلاثة قوائم لتحقيق قاعدة دعم مثلثة .

أشْمَط؛ شَمْطاء **canescent**

1ـ يصبح رمادياً أو أبيض

2ـ في البيولوجيا : من يحوز شعراً أو زغب (وبر) رمادي أو ضارب إلى البياض ؛ أشيب .

1ـ نابيّ (في التشريح) **canine**

2ـ كلبيّ (في تصنيف الحيوان)

1ـ متعلق بالكلب ، أو ما ينتمي إلى الكلب .

2ـ الناب السني .

البَارِزَةُ النَّابيَّةُ **canine eminence**

انظر تحت eminence .

الحُفْرَةُ النَّابيَّةُ **canine fossa**

انظر تحت fossa .

العَضَلَةُ النَّابيَّة **canine muscle**

هي العضلة الرافعة لزاوية الفم .

خُراجُ الحَيِّزِ النَّابيّ **canine space abscess**

هو خراج يتميز بالتقيح في السنخ النابي من الأسنان .

الأنْياب **canine teeth**

انظر تحت tooth .

نابيُّ الشَكل **caniniform**

أي مادة أو شكل تتشكل على هيئة الناب ، فهي نابية الشكل .

النَّابيَّة **caninus**

(=العَضَلَة الرَّافِعَة لِزاوِيةِ الفَم) **(=musculus levator anguli oris)**

أحد عضلات الفك ، مسؤولة عن حركة رفع زاوية الفم .

شَيْب **canities**

اللون الأبيض أو السنجابي المنتشر في شعر الفروة وبصفة خاصة المصحوب بالشيخوخة وكبر السن ، انظر أيضاً نصول الشعر ، الشيب الموضعي ، الشمط (وهو فقدان الصبغية من المبيضات البيض ، يستعمل في اختبار تطور النمط الآجل من فرط التحسس لمكونات المكروبات .

داءُ المُبَيَضَّات **candidosis**

انظر تحت candidiasis .

بيلة المُبَيَضَّاتِ **candiduria**

وجود أحياء المبيضات في البول .

1ـ شَمْعَة **candle**

(للإضاءة أو التسخين أو للترشيح)

2ـ قَنْدِيلَة (وحدة الإنارة)

1ـ كتلة من الشمع أو مادة مشابهة ، عادة ماتكون اسطوانية الشكل ، لها فتيلة من أجل التوهج أو تجهيز الإضاءة أو الحرارة .

2ـ كتلة اسطوانية تستعمل كمرشح في المكروبيولوجيا .

3ـ قنديلة (وحدة الإنارة) .

مُرَشِّحٌ شَمْعي **filter candle**

شمعة قدمية **foot candle**

شمعة مترية **meter candle**

تساوي لوكس (Lux) ، وهي وحدة الإضاءة في النظام الدولي.

شَمْعَةٌ جَدِيدَة **new candle**

انظر تحت candela .

شَمْعَةٌ معْيارِيَّة **standard candle**

(= قَنْدَيلَة) **(=candela)**

انظر تحت candela .

عَصا **cane**

عود ، أو غصن خشبي ، أو عصا معدنية تستعمل لدعم المشي .

عَصا سَهْلَةُ التَّصْحيح **adjustable cane**

عصا يمكن تعديل طولها بسهولة لتناسب الطول .

عَصا إنْجليزيَّة **English cane**

عكاز الساعد (Forearm Crutch) .

عَصا رُباعيَّةُ القَوائم **quadripod cane**

عصا مكيَّفة لزيادة الثبات بوساطة تشعبها إلى أربع قوائم لتحقيق قاعدة مستطيلة للدعم .

الهيدرو ، وهي قواعد فعالة .

الحشيش (القنب الهندي) **Cannabis**

جنس من الأعشاب المزهرة ، الحشيش المزروع (Cannabis sativa) هي نبات من الفصيلة القنبية تستعمل على نحو واسع في صناعة الألياف والحبال . أوراقها وأزهارها المجففة تسمى الماريجوانا ، وتحتوي رباعي هيدروكانّابينول والكانابينويدات الأخرى .

الحَشيش (القِنّب الهندي) **cannabis**

القمم الزهرية الجافة للقنب الهندي الذي يحتوي على القواعد الشمقة ، دلتا Δ^1-3 ، 4 مفروق و Δ^6-3 ، 4 مفروق رباعي هيدروكانابينول ، بالإضافة إلى الكانابينول والكانابيديول . وتصنف بين محدثات الهلوسة ، وهي المحضر الأكثر شيوعاً مثل الحشيش والماريجوانا .

التَسَمُّمُ بالحَشيش **cannabism**

التسمم بمركبات ومستحضرات الحشيش

أكلُ المِثل **annibalism**

أكْلُ الحيِّ لحيٍّ مثله .

تفاعل كانيزارو **Cannizzaro's reaction**

[تفاعل كيميائي منسوب للكيميائي ستانيسلاو كانيزارو (Stanislao Cannizzaro) ، وهو كيميائي إيطالي عاش مابين 1826-1910] ، وهو تفاعل لكشف النسج الحيوانية .

انظر تحت reaction

نظرية كانون - بارد **Cannon-Bard theory**

[نظرية منسوبة للاختصاصي الأمريكي والتر برادفورد كانّون (Walter Bradfordcannon) ، وهو اختصاصي بعلم النفس ، عاش مابين 1898-1977 والطبيب فيليب - بارد (Philip Bard) ، وهو اختصاصي علم نفس أمريكي 1871-1945] .

انظر تحت emergency theory.

حلقة كانون ، (نقطة) نظرية **Cannon's ring (point), theory**

[حلقة أو نقطة منسوبة للطبيب والتر برادفورد

الأهداب ، أو من مناطق محدودة من فروة الرأس) .

قارِحَة **canker**

1 ـ تقرح في الفم والشفتين بدرجة رئيسية .

2 ـ مرض عند الخيول في الغشاء الكيراتيني المنشأ ، في القائمة الخلفية عادة ، مع فقد وظيفة الخلايا المفرزة للقرن ونجيج نضحة مصلية في مكان الحافر المتقرن الطبيعي ، يبدأ في باطن حافر الفرس ويمتد نحو الأخمص والجدار .

3 ـ التهاب الأذن الظاهرة عند الكلب أو الهرة .

القنا (بنية تشريحية تشبه العصا) **canna**

الاسم اللاتيني الذي يعني في العربية (وربما كان الأصل عربياً) القناة ، والأصل العربي فيها قناة الرمح أو عَصَاه الذي يثبت عليه السنان ، كما يطلق على كل شكل يشبه العصا ، أو القصبة وقد قل استعماله حالياً في الطب واستبدل بعد التصغير باسم القُنَيَّةُ (Cannula) .

الظُّنْبوب **canna major**

(=tibia)

القنا أو القصبة الرئيسية ويراد بها الظنبوب (Tibia) وهو العظم الطويل الرئيسي في الساق .

الشَّظِيَّة **canna minor**

(=fibula)

القنا أو القصبة الصغرى ، وهي العظم الطويل الأصغر من الظنبوب في الساق وفي الجانب الوحشي منه .

انظر تحت fibula .

كانابيدْيُول (من مكونات الحشيش) **cannabidiol**

هو مركب ثنائي الفينول لا نفسي المفعول يعزل من الحشيش (القنب الهندي) .

كانابينويد (مركب شبيه بالكانابيديول) **cannabinoid**

أحد جواهر الحشيش (القنب الهندي) بما فى ذلك رباعي هيدرو كانابينول ، والكانابينول ، والكانابيديول .

كانابينول (من مكونات الحشيش) **cannabinol**

مقوم غير نفسي المفعول للنضحة الراتينية للحشيش (القنب الهندي) ، مشتقاتها رباعية

هو قنية منحنية تسمح بإدخال سدادة إلى التجويف الأنفي بقصد إيقاف الرعاف أو النزف .

قُنَيَّةٌ مُسْتَكْشِفَةٌ **exploring cannula**

قنية تستخدَم في استكشاف الممرات والأقنية الطبيعية في الجسم .

قُنَيَّةُ التَّسْرِيب **infusion cannula**

قنية تستخدم في تسريب السوائل في الأوعية الدموية كالأوردة .

قُنَيَّةُ الإِرْوَاء **irrigation cannula**

قنية تَستخدم في إرواء النسج المصابة بالإقفار بالسوائل المغذية ، وهي قنية برميلية بها ممرات مضاعفة ، يدخل السائل من أحد طرفيها ويخرج من الطرف الأخر فتفيد في غسل الأجواف وإرووائها .

قُنَيَّةُ لِينْدمان **Lindemann's cannula**

نوعَ منَ القنيات يستعمل في نقل الدم .

قنية أنفية **nasal cannula**

قنية تنطبق ضمن المنخرين (فتحتي الأنف) لإيتاء المعالجة بالأكسجين . وتسمى كذلك مخروط الأنف (Nasal prongs) .

قُنَيَّةُ التَّرْوِيَة **perfusion cannula**

قنية مزَدوجة لجريان السائل وانسيابه ضمن عضو و خارجه .

قُنَيَّةُ شْتراوس **Strauss cannula**

قنية معدَة لاستخدامها داخل الأوردة أو نزح السوائل .

قُنَيَّةُ تَرِنْدلنْبورْج **Trendelenburg's cannula**
(للرغامَى)

قنية تستخدم بصفة رئيسية للرغامى .

قُنَيَّةٌ بُطَينِيَّةٌ **ventricular cannula**

قنية تَصَل إلى أحد بطينات القلب أو الدماغ ، منها يسرى ويمنى ، وتستخدم لأغراض الفحوص المختبرية القلبية والتصوير الظليل . يمكن استخدام القلبية اليمنى للتغذية الوريدية الشاملة . وأما البطنية الدماغية فغالباً ما تستعمل لتخفيف الضغط عن الدماغ .


كانّون (W.B.Cannon) ، وهو أمريكي *اختصاصي بالفيزيولوجيا عاش مابين [1945-1871]* وحلقة كانون هي حلقة تستخدم كدلالة في الصورة الشعاعية للقولون المستعرض .

انظر تحت ring emergency theory .

قنيَّة **cannula**

قناة صغيرة ، أو أنبوب من أجل الغرز ضمن الوعاء الدموي ، أو القناة ، أوالجوف . خلال غرز تجويفها غالباً ما تحتل يبزل .

قُنَيَّةُ بيلْكوك **Bellocq's cannula**



Canna major (Tibia) الظنبوب

canthal **1ـ موقِيّ**

2ـ لحاظِيّ

متعلق باللحاظ أو الموق .

cantharisis **الدَّاءُ الذرَّاحيُّ**

عدوى بالخنافس كالطفيليات الجوانية في جسم الثدييات ، والتي تلي ابتلاع الأشكال اليرقية أو الكاهلة .

cantharidal **ذرَّاحِيّ**

يحتوي الذراح (الذباب الإسباني المجفف) ، أو متعلق به .

cantharidate **كانثاريدات (كيمياء)**

أي ملح للحمض الذراحي .

cantharides **الذرَّاح (الذبابُ الإسْبانِيُّ المجَفَّف)**

جسم الذرنوحة المجففة المنفطة ، والذراح جنس من الخنفساء المنقطة ، والتي تحتوي الجوهر (المادة الفعالة) السمي الفعال ، وهو الكانثاريدين . كان يطبق فيما سبق خارجياً كعامل قوي محَمِّر ومنفط ، ويعطى باطنياً (داخلياً) كمدر وكمثير للرغبة الجنسية . ويسمى كذلك الذبابة الإسبانية (Spanish Fly) .

cantharidic acid **الحمض الكانثاريديني**

حمض ثنائي القاعدة يتشكل عند انحلال الكانثاريدين في الماء .

cantharidin **كانثاريدين**

مادة بللورية مرة الطعم ، وهي لاكتون الحمض الكانثاريديني وأهم جوهر فعال للذراح ،توجد كذلك في أجسام سائر الخنافس مثل الذرنوحة (Epicauta) ، تسبب تنفط الجلد عند البشر ، إن استهلاك أجسام الخنافس الميتة الموجودة في الكلأ والتبن وسائر الطعام قد يكون مميتاً لحيوانات المزرعة .

cantharidism **التَّسَمُّمُ بالذرَّاح**

1 ـ تفاعل ارتكاس سمي عند البشر ينجم عن سوء استعمال الذراح .

2 ـ التسمم الذراحي .

Cantharis **الذرَّاح**

جنس من الخنافس ، وهي الذرنوحة (Lytta) .

washout cannula **قُنَيَّةُ الغَسيل**

قنية ملحقة بمقياس الضغط ومغروزة ضمن وعاء دموي ، لذا فإن الوصلة بين الشريان ومقياس الضغط يمكن أن تستخدم للإرواء في الملاحظات الطويلة .

cannulate **يُقنِي ؛ يُدْخِلُ القُنَيَّة**

إدخال القنية التي يحتمل أن تترك في المكان الملائم .

cannulation **إقناء؛ إدْخالُ القُنَيَّة**

عملية غرز قنية .

cannulization **إقناء ؛ إدْخالُ القُنَيَّة**

canon **قانون**

إنشاء قاعدة أو صيغة من أجل الإجراء العلمي .

canrenoate **كانرينوات**

مادَّةٌ ملحية مدرة ومَضادَّةٌ للألْدُوسْتيرون ، وأصل مركبها كانرينون .

canrenoate potassium **كانرينوات البوتاسيوم**

مدر البول الموفر للبوتاسيوم له مفعول واستخدامات مشابهة للسبيرونولاكتون .

canrenone **كانرينون**

مادَّةٌ مُضادَّةٌ لـلألْدُوسْتيرون ، وهي المستقلب الفعال لكانرينوات البوتاسيوم والسبيرونولاكتون تستعمل كمدر البول الموفر للبوتاسيوم ، تعطى فموياً .

cant **مَمِيْل**

ميلان أو منحدر أو مَيْل .

cant of mandible **مَـمِيْـلُ الفَك**

زاوية مشكَّلة من تقاطع المستوى الفكي السفلي (الركيني الفكيكي) مع مستوى السرج الأنيفي أو مستوى فرانكفورت .

الركيني : هي زاوية الفك السفلي الخارجية .

الفكيكي : هي النقطة الأكثر انخفاضاً على الخط المتوسط للفك السفلي .

canth- **1ـ سابقة بمعنى المُوْق**

2ـ سابقة بمعنى اللحَاظ

1ـ الموق : هو الزاوية الإنسية للعين .

2ـ اللحاظ : هي الزاوية الوحشية للعين .

اللِّحاظ ؛ الزَّاوِيَةُ الظَّاهِرَةُ للعَيْن **external canthus**

زاوية التقاء الجفنين الوحشية . وتسمى أيضاً (Lateral canthus) .

الموق ؛ الزَّاوِية الدَّاخليَّةُ للعَيْن **inner canthus**

الموق الأنفي ، أو الزَاوَية العينية الإنسية .

الموق ؛ الزَّاوِيَةُ الغَائِرَةُ للعَيَن **internal canthus**

زاوية التقاء الجفنين الإنسية وتسمى أيضاً (Medial canthus) .

اللِّحاظ ؛ الزَّاوية الوحشية للعين **lateral canthus**

انظر تحت external canthus .

الموق ؛ الزاوية الإنسيَّةُ للعَيْن **medial canthus**

انظر تحت internal canthus .

اللِّحاظ ؛ الزَّاوِيَةُ الخارجيَّةُ للعَيْن **outer canthus**

هي الموق الصدغي ، أو الزاوية العينية الوحشية .

كانتل **Cantil**

الاسم التجارى لمستحضر بروميد الميبنزولات (وهي مضاد للفعل الكوليني) .

رافِعة؛ عتلة **cantilever**

أداة تعتمد على نظرية الرافعة ، والتي تستخدم لرفع الأشياء الثقيلة أو الشديدة الالتصاق .

أنبوب كانتور **Cantor tube**

[أنبوب منسوب للطبيب ماير أو كانتور (Meyero O.Cantor) ، وهو طبيب أمريكي ولد عام 1907] أنبوب يستخدم لتنبيب الأمعاء .

انظر تحت tube .

خماسية كانتريلي **Cantrell's pentalogy**

[خماسية منسوبة للطبيب جيمس آر كانتريل (James R.Cantrell) ، وهو طبيب أمريكي من القرن العشرين] .

انظر تحت pentalogy .

صياحُ الديك **cantus galli**

(= تشنج الحنجرة الصريري) **(=Laryngismus stridulus)**

الذرَّاحُ المُنَقَّط **Cantharis vesicatoria**

هي الذرنوحة المنقطة .

انظر تحت lytta vesicatoria .

1ـ استِئصالُ الموق **canthectomy**

2ـ استِئصالُ اللحاظ

عملية جراحية لاستئصال اللحاظ أو الموق .

1ـ موقان **canthi (sing.canthus)**

2ـ لحاظان

1ـ مثنى أو جمع الموق .

2ـ مثنى أوجمع اللحاظ .

1ـ التِهابُ الموق **canthitis**

2 ـ التِهابُ اللحاظ

1ـ سابقة بمعنى المُوْق (الزاوية الإنسية للعين) **cantho-**

2ـ سابقة بمعنى اللحَاظ (الزاوية الوحشية للعين)

سابقة أو بادئة تظهر العلاقة مع اللحاظ أو الموق .

1ـ افتِكاكُ المُوْق **cantholysis**

2ـ تفريق اللحاظ

انقسام جراحي للموق أو اللحاظ عن العين أو الرباط الموقي .

1ـ رأبُ اللحاظ **canthoplasty**

2ـ رأبُ الموق

جراحة تجميلية للموق أو اللحاظ الإنسي أو الوحشي ، وبصفة خاصة تطلق على قطع اللحاظ الوحشي لتطويل الشق الجفني ، وتأتي كذلك بمعنى الترميم الجراحي للعيوب الموقية .

1ـ رفوُ اللحاظ **canthorrhaphy**

2ـ رفوُ الموق

الخياطة الجراحية للشق الجفني (مشق الأجفان) عند أحدى اللحاظين .

1ـ بضْعُ اللحاظ **canthotomy**

2ـ بضْعُ الموق

الانقسام الجراحي للموق الخارجي .

1ـ موق **canthus**

2ـ لحاظ

الزاوية الداخلية (الغائرة) أو الخارجية (الظاهرة) للشق بين جفني العين .

(mRNA) الأولي الناسخ في حقيقيات النواة ؛ وفي بعض الحالات ، يكون النيوكلوتيد الأول والثاني من الرنا المرسال (mRNA) ممثلان عند الوضعية 2´من ثمالة الريبوز . يحفظ (5´كاب) الرنا المرسال (mRNA) من النوكلياز الخارجية ، وكـذلك من وظائف تعرف الرنا المرسال (mRNA) من قبَل الريبوسومات .

جُسَيمٌ طَرَفِيّ **acrosomal cap**
(=في النُّطْفَة) **(=acrosome)**

الجسيم الطرفي في مقدمة الحيوان المنوي .

قَلَنْسُوَةُ الرَّأس الأَماميَّة **anterior head cap**
(= جسم طرَفي) **(= acrosome)**

هو الجسيم الطرفي للنطفة (Acrosome) ويسمى أيضاً القلنوة النووية (Nuclear cap) ، ويوجد كالقبعة على رأس النطفة ، وهو غني بالكربوهيدرات والإنزيمات الحالة لغشاء البيضة فيساعد على إيلاج النطفة فيها .

الجُزْءُ العُلْوِيّ للإثْناعَشَرِي **bishop's cap**
(=pars superior duodeni)

هو تشنج الحنجرة الصريري (Laryngismus stridulus) كما في السعال الديكي الشاهوق .

قُنَيَّة **Canula**
(=cannula)

انظر تحت cannula .

خَرُّوب **caorb**

جنس نبات من فصيلة القرنيات .

مَطَّاط **caoutchouc**


مادة صناعية مرنة تستخدم في مجالات متعددة كالعزل والفصل بين المفاصل الحركية في الآلات ، وتستخدم في صناعة الإطارات .

قَلَنْسُوَة **cap**

1 ـ غطاء واق للرأس أو لأي بنية مشابهة
2 ـ مصطلح عامي للتاج الاصطناعي للسن .

5´كاب **´5 cap**

بنية مؤلفة من ثمالة 7- ميثيل جوانوزين (m7G) الملتصقة خلفياً (5´مع 5´ مثلاً) بواسطة ارتباط ثلاثي الفسفات إلى النهاية 5´ من الرنا المرسال



أنبوب كانتور **Cantor tube**

انظر تحت patella .

قَلاَنس الكُلْيَة التَّالية **metanephric caps**

كَتلة من الأديم المتوسط الحالبي (المأرمة) ، والتي تلتصق بالحويضة الابتدائية للكلية وتوسعاتها الأمبولية .

قَلَنْسُوَةٌ نَوَوِيَّة **nuclear cap**

انظر تحت head cap .

قَلَنْسُوَةٌ فَرِيجيَّة **phrygian cap**

(في صورَةَ المَرارَة)

منظر في تصوير المرارة يظهر ثنية بين الجسم والقاع الذي يكون فيه القاع مطوياً ومثبتاً .

قلنسوة قطبية **Polar cap**

عضية أليفة للون كيسية الشكل موجودة تحت جدار البوغ في المنطقة القطبية للأوالي مكروية الأبواغ ، وتسمى كذلك المحفظة القطبية .

قَلَنْسُوَةٌ خَلْفَ النَّواة **postnuclear cap**

شريط عريض يحيط بالمنطقة التالية للجسيم الطرفي بالنواة في الحيوان المنوي .

قَلَنْسُوَةٌ لُبِّيَّة **pulp cap**

قَلَنْسُوَةُ البَوَّاب **pyloric cap**

الجزء العلوي من الإثنا عشري .

قلنسوة جذرية **root cap**

مجموعة من الخلايا الشبيهة بالكشتبان «القوب» ، والتي تشكل غطاءً حافظاً فوق قمة البارض (أي النسيج النباتي القابل للتكاثر) في ذروة جذر النبات .

قَلَنْسُوَةُ الجُمْجُمَة **skull cap**

(=القُبَّة) **(=calvaria)**

انظر تحت calvaria .

مَقدِرَة **capability**

القدرة على الأداء .

مُواسَعَة (كهرباء) **capacitance**

1 ـ خاصيَّة القدرة على تخزين شحنة كهربية .

2 ـ نسبة الشحنة المخزَّنة بالمكثف الكهربي إلى الفولطاج عبر المكثف الكهربي ، ويرمز لها بالحرف C ، وكانت تسمى سابقاً السعة ، والوحدة الدولية النظامية للمواسعة الكهربية

انظر تحت pars superior duodeni .

قَلَنْسُوَةُ زين **cap of Zinn**

في صورَة الصدر الشعاعية هو بروز في القوس الرئوية في القسم العلوي الأيسر من الظل الشعاعي للقلب . يشاهد عادة في الصور الشعاعية الخلفية الأمامية في داء القناة الشريانية السالكة ، ويمثل الشريان الرئوي المتوسع .

قِرفُ اللَّبَن **cradle cap**

(=crusta lactea)

قِشْرَةٌ مِثِّيَّةٌ عَلَى رَأْسِ الوَليد .

اَنظر تحت crusta lactea .

قَلَنْسُوَةٌ تاجيَّة (أسنان) **crown cap**

قَلَنْسُوَةُ الإِثْنَا عَشَرِي **duodenal cap**

انظر تحت ampulla .

قَلَنْسُوَةٌ مَهْبِلِيَّةٌ هولَنْدِيَّة **dutch cap**

(من وسائل منع الحَمْل)

حجاب عنق الرحم المانع للحمل ، وهو من وسائل منع الحمل .

قَلَنْسُوَةُ الميناء (أسنان) **enamel cap**

بنية قلنسوية الشكل للعضو الميناِئي ، تتطور خلال الشهر الثالث من تطور الجنين ، وتتركب من طبقة خارجية وطبقة مينائية داخلية ، توجد بين هاتين الطبقتين الخلايا الأديمية المفككة التي تكون النسيج الشبكي النجمي فيما بعد . وتسمى كذلك القلنسوة الإنتاشية (Germinal cap) .

قلنسوة إنتاشية **germinal cap**

انظر تحت enamel cap .

قلنسوة الرأس **head cap**

بنية قلنسوية الشكل مزدوجة الطبقات فوق الثلثين العلويين للجسم الطرفي في الحيوان المنوي ، والتي تتألف من حويصلة الجسيمات الطرفية (في النطفة) المنخمصة .

القلنسوة الحبرية **ink cap**

أي فطر من جنس القلنسوة المحبّرة (Coprinus) .

الرَّضَفَة **knee cap**

(=patella)

السنخي إلى الدم الشعيري الرئوي مقسوماً على مدروج الضغط المتوسط للغازات بين الغاز السنخي والدم الشعيري ، الوحدة هي ملي لتر/ دقيقة / تور [أو الملي متر الزئبقي (mm Hg)] رمزها D .

انظر تحت diffusion capacity .

السعة الحيوية القسرية **forced vital capacity**

رمزها (FVC) ، تقاس السعة الحيوية عندما يشهق المريض بأقصى سرعة وجهد .

السَّعَةُ الوَظيفيَّةُ المُتَبَقِّيَةُ **functional residual capacity**

حجم الغازات المتبقية في نهاية الزفير الهادئ الطبيعي ، رمزه (FRC) .

السَّعَةُ الحَرارِيَّة **heat capacity**

مقدار الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة لكمية نوعية من مادة بدرجة سيلزيوس واحدة . رمزها C . عند ضغط ثابت (Cp) عند حجم ثابت (Cv) .

السَّعَةُ الشَّهيقيَّة **inspiratory capacity**

حجم الغاز الذي يمكن أن يستنشق ضمن الرئتين في الشهيق الكامل ، يبدأ من السعة الثمالية الوظيفية ، ويساوي الحجم المدّي والحجم الشهيقي الاحتياطي . ورمزه (IC) .

السعة الرابطة للحديد **iron-binding capacity**

رمزها (IBC) ، والذي يعبر عن كمية الترانسفيرين في المصل (البلازما) لمريض ما ، والذي يستطيع أن يرتبط بحديد المصل (البلازما) .

السَّعَةُ التَّنَفُّسيَّةُ القُصْوَى **maximal breathing capacity**

انظر تحت maximum voluntary ventilation .

السَّعَةُ الإفْراغيَّةُ الأنْبوبيَّةُ القُصْوَى **maximal tubular excretory capacity**

انظر تحت tubular maximum .

السَّعَةُ التَّنَفُّسيَّةُ القُصْوَى **maximum breathing capacity**

انظر تحت maximum voluntary ventilation .

(SI) هي الفاراد (Farad)

مُواسَعَةٌ غشائيَّة **membrane capacitance**

المواسعة الكَهربية لغشاء خلوي ، كالمحوار أو الليفة العضلية .

القُدْرَةُ التَّلَقيحِيَّة **capacitation**

(لِلحَيَوان المَنَوي)

العملية التي يصبح فيها الحيوان المنوي قادراً على تخصيب الخلية البيضية (البيضة) بعد وصوله إلى القسم الأمبولي من الأنبوب الرحمي (البوق) .

مُكَثِّفٌ كَهْرَبائِيّ **capacitor**

جهيزة لحمل الشحنات الكهربائية وتخزينها .

السَّعَة **capacity**

1 ـ القدرة أو المقدرة على المسك أوالتثبيت أوالاستبقاء أوالاحتواء ، أوقدرة الامتصاص .

2 ـ الحجم أو الحجم الكامن لمادة (جامدة أو سائلة أو غازية) التي يمكن أن تمسك أو تحتوي .

3 ـ المواسعة .

4 ـ المقدرة الذهنية على الاستقبال والإنجاز والتحمل والفهم .

سَعَةُ التَّكَيُّف **accommodation capacity**

السَّعَةُ الرَّابِطَةُ لِلمُسْتَضَد **antigen binding capacity**

السَّعَةُ الدَّارِئَة **buffer capacity**

السعة المغلقة **closing capacity**

حجم الغازات في الرئتين في وقت غلق المسالك الهوائية خلال التنفس ، ويضاف الحجم المغلق إلى الحجم الثمالي ، وعادة مايعبر عنه كنسبة مئوية للسعة الكلية للرئة .

سَعَةُ القحف **cranial capacity**

تعبير عَن مقدار الحيز ضمن القحف .

السعة الانتشارية **diffusing capacity**

(=diffusion capacity)

مقدرة الغشاء الشعري السنخي على نقل الغاز ، والذي يعتبر انعكاس لمنطقة الغشاء السنخي الشعري ، أو رقة سمك هذا الغشاء . وهو مقدار الغاز المنقول في الدقيقة من الغاز

غيـر تحديد لزمن الزفيـر ، وهو مـساو للسـعة التنفسية و الحجم الاحتياطي الزفيري .

الكاباستات **Capastat**

الاسم التـجـاري لمسـتـحـضـر سلفـات الكابريوميسين (Capreomycin sulfate) ، وهو دواء مضاد للتدرن .

صمغ السنط **Cape gum**

يوجـد هذا الشـجـر في منطقـة رأس الرجـاء الصالح بجنوب أفريقيا .

انظر تحت gum .

كُمَّة (عِصابة قلنسُويَّة لِطرَفٍ مَبْتور) **capeline**

رباط قلنسوي الشكل للرأس أو لجدعة الطرف المبتـور . والجدعـة هي النهاية القاصيـة من الطرف المبتور .

متلازمة كابجرا **Capgras' syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب جان ماري جوزيف كابجرا (Jean Marie Joseph Capgras) ، وهو طبيب نفسي فرنسي عاش مابين 1873-1950] .

انظر تحت syndrome .

توَسُّعُ الشُّعَيرات **capillarectasia**

تمدد وتوسع في قطرات الشعيرات .

الشَّعَّاريَّة (جِنسُ ديدانٍ مَسْودة) **Capillaria**

جنس من المسودات (دورة مدورة) من فصيلة المسلكات ، طائفة المسلكات وتسمى كـذلك (Hepaticola) ، (Trichosoma) .

الشُّـعَّـاريَّةُ المُتَلَوِّيَة **Capillaria contorta**

دودة مدَورة طفيلية في الطيور المنزلية ، وتسمى كـذلك الشـعـارية الحـيـاطيـة (Trichosoma Contorum) .

الشُّعَّاريَّةُ الكَبَديَّة **Capillaria hepatica**

جنسَ طفـيَلي في كـبـد الجـرذان وعـدد من الثدييات ، سجلت قلة من العداوى بين البشر .

الشُّعَّاريَّةُ الفلبينيَّة **Capillaria philippinensis**

طفيلي فيَ أمعَاء البـشر الفيليبينيّن ، يسبب الإسهال الوخيم وسوء الامتصاص ، مع معدل وفيات عال .

داءُ الشُّعَّاريَّاتَ **capillariasis**

سَعَةُ الرِّئَة القصوى **maximum lung capacity**

السَّعَةُ الذِهْنيَّة **mental capacity**

القدرة العقلية على الاستيعاب .

السعة الحرارية المولية **molar heat capacity**

السعة الحرارية عندما يعبر عن مقدار المادة بالمولات .

السَّعَةُ التَّنَفُّسيَّة **respiratory capacity**

وتسمى أيضاً السعة الحيوية (Vital capacity) وهي أكبر حجم من الهواء يمكن استنشاقه بعد زفير قسري قوي .

السعة الحرارية النوعية **spesific heat capacity**

رمز C .

انظر تحت specific heat .

السَّعَةُ الحَراريَّة **thermal capacity**

انظر تحت heat capacity .

السَّعَةُ الحَيَويَّةُ المزَمَّنَة **timed vital capacity**

هي السعَة التنفسية مع حساب الزمن في حدوثها أثناء الشهيق والزفير .

السعة الكلية الرابطة للحديد **total iron-binding capacity**

رمزها (TIBC) ، قياس المقدار الكلي من الحديد الذي يمكن أن يرتبط بالترانسفيرين في عينة المصل ، ويعين بواسطة إشباع الترانسفيرين بالحديد ، ثم ينزع الحديد غير المرتبط بماص ويقاس الحديد في الرشاحة ، ويستخدم عند المرضى المصابين بعوز الحديد أو التحميل المفرط بالحديد .

السَّعَةُ الكُلِّيَّةُ للرِّئَة **total lung capacity**

حجم الغاز الذي تحتويه الرئتان عند النهاية القصوى للشهيق ، ورمزها (TLC) .

السَّعَةُ الاسْتِعْداليَّةُ للفيروسَ **virus neutralizing capacity**

مقدرة المصل على تثبيط الفعالية العدوائية للفيروس .

السَّعَةُ الحَيَويَّة **vital capacity**

رمزها (VC) ، وهو حجم الغازات التي يمكن أن تنفث من الرئتين بوضعية الشهيق العميق من

نمط من الأوعية الدموية الدقيقة التي تفتقر إلى الغلالة العضلية المستمرة ، وهي متوسطة في البنية والتوضع بين الشرين والشعيرة . وتسمى كذلك قادمة الشعيرة (Precapillary) ، وتالية الشرينة (Precapillary arteriole) والشرينة السابقة للشعيرة (Metarteriole) .

شُعَيراتٌ صَفْراوِيَّة **bile capillaries**

1 ـ القنيوات الصَفراوية .

2 ـ يستعمل هذا المصطلح أحياناً لتحديد القنيوات الصفراوية .

فِعْلٌ شَعْرِيّ **capillary action**

حدوث حركة المياه عبر الشعيرات أو الأنابيب الشعرية الرفيعة ، أو انجذاب الماء نحو ذرات التراب أو المسام بفعل التوتر السطحي للسائل وتسمى أيضاً (Capillarity) .

فاعليَّةٌ شَعْرِيَّة **capillary activity**

قوّة ونشاط الشعيرات والمسام في جذب السوائل وامتصاصها ، وإن نشاط هذه الفاعلية يزيد من النشاط الدوراني .

سرير الشعيرة **capillary bed**

مناطق أفتح لوناً تشير إلى الدم المؤكسج .

هَشاشَةٌ شُعَيرِيَّة **capillary fragility**

قابلية أو استعداد الشعيرات للتكسر .

أُنْبوبٌ شَعْرِيّ **capillary tube**

أنبوب صغير القطر أقل من واحد ملي متر فهو يشبه الشعرة بدقته ، ويستعمل في المختبرات لسحب عينات من الدم وتثفيلها مثلاً لحساب الهيماتوكريت .

مِقْياسُ اللُّزوجَةِ الشَّعْرِي **capillary viscometer**

مقياس للزوجة يعتمد على قانون بوازوي (Poiseuille's law) في اللزوجة الديناميكية .

شُعَيراتٌ مُسْتَمِرَّة **continuous capillaries**

أحد النمطين الرئيسين للشعيرات ، تتواجد في العضل والجلد والرئة والجهاز العصبي وأنسجة أخرى ، وتتميز ببطانة مستمرة (غير متقطعة) ، وصفيحة قاعدية مستمرة ، وخيوط ناعمة دقيقة وحويصلات احتسائية عديدة .

عدوى بالمسودات من جنس الشعاريات تصيب الطيور ، وهي من نوع الشعاريات الحياطية ، عند بعض الثدييات هي من نوع الشعارية الكبدية ، عند البشر هي من نوع الشعاريات الفيليبينية .

مُحَرِّكٌ للشُّعَيْرات **capillariomotor**

متعلق بالفعالية الوظيفية للشعيرات .

اسْتِجْهارٌ شُعَيرِيّ **capillarioscopy**

انظر تحت capillaroscopy .

الْتِهابُ الشُّعَيرات **capillaritis**

الْتهابُ الشُّعَيرات ، ويطلق عليه أيضاً (Telangiitis) .

الخاصَّة الشَّعْرِيَّة **capillarity**

الفعل الذي بواسطته يرتفع سطح السائل أو ينخفض عندما يكون هناك تماس مع سطح صلب ، كما في الأنابيب الشعرية .

اعْتِلالٌ شُعَيرِيّ **capillaropathy**

أي مرض (داء) في الشعيرات ، ويسمى كذلك داء الشعيرات .

الفَحْصُ المِجْهَرِيُّ للشُّعَيْرات **capillaroscopy**

فحص تشخيصي للشعيرات بالمجهر ، ويسمى كذلك الاستجهار الشعيري ، أو تنظير الأوعية الدقيقة ، أو تنظير الشعيرات .

1 ـ شُعَيرَة (ج: شُعَيرات) (في التشريح) **capillary TA**

2 ـ شَعْرِيّ (المختبر)

(pl. Capillaries)

1 ـ متعلق أو مشابه للشعرة .

2 ـ أي وعاء دقيق يصل الشرينات بالوُرَيْدات . وتشكل الشعيرات شبكة في جميع أقسام البدن تقريباً . تعمل جدرها كأغشية نصف نفوذة لتبادل المواد والسوائل المختلفة بين الدم والسائل النسيجي ، يوجد نمطان رئيسيان هما : الشعيرات المستمرة والشعيرات المنوفذة . وتسمى كذلك الوعاء الشعيري .

3 ـ الوعاء الشعيري اللمفاوي .

شُعَيراتٌ شِرْيانِيَّة **arterial capillaries**

شَعر (الرَّأس) **capilli**
(ف: شَعْرة) **(sing.capillus)**
الشعر المكدس على فروة الرأس .

المُشَتعَر (هَيكلٌ خَيطِيٌّ بَيْنَ الأَبْوَاغ) **capillitium**
بنية خيطية تشبك بين الأبواغ في الأجسام المثمرة لبعض الجراثيم (المخطاوات) ، والحيوانات الوحيدة الخلية (الحيوانات الفطرية الحقيقية) والفطريات (الفقعيات) .

مُحَرِكٌ للشُّعَيْرَاتِ **capillomotor**
ألياف عصبية شعرية محركة تنقل التنبيهات العصبية إلى الجهاز الليفي العضلي الحركي .

شُعَيرِيٌّ وَرِيدِيّ **capillovenous**
وعاء وريدي دقيق شعيري .

شَعْرَة **capillus**
(ج: شَعْرٌ) **(pl.capilli)**
انظر تحت capilli .

تَضَيُّقُ القُلْفَة؛ شَبَم **capistration**
(=phimosis)
الشبم هو تضيق الفوهة .
انظر تحت phimosis .

1 ـ رُؤوس (ف: رأس) **capita (sing.caput)**
2 ـ الفَرْد (في الإحصاء الحيوي)

1 ـ رئيسيّ **capital**
2 ـ متعلق برأس الفخذ
3 ـ رأسِيّ
1 ـ حدث له أهمية كبيرة ، فمثلاً يكتنف خطراً على الحياة .
2 ـ متعلق برأس الفخذ .

رأسِيُّ الشَّكل **capitate**

1 ـ أَجْرُ الطَّبِيبِ السَّنَوِيّ (في خطَةٍ صِحيَّة) **capitation**
2 ـ الأُجْرَة عَلَى الفَرْد
دفع الأجرة السنوية لطبيب أو مجموعة من الأطباء عن كل مشاركة في الخطة الصحية .

العَظمُ الكَبير **capitatum (os capitatum TA)**
العظم الرأسي الشكل .

رُؤَيسُ العَضُد **capitellum**
انظر تحت capitulum humeri .

شُعَيراتُ الكُرَيَّات الحَمْراء **erythrocytic capillaries**
شعيرات نقي العظم في الحياة المبكرة للجنين ، والتي تبدو منتجة للكريات الحمراء .

شُعَيراتٌ مُنَوفَذَة **fenestrated capillaries**
أحد النمطين الرئيسين للشعيرات ، تتواجد في المخاطية المعوية والكبيبات الكلوية والبنكرياس والغدد الصماء وأنسجة أخرى ، وتتميز بالنوافذ أو المسام الدائرية التي تخترق البطانة وقد تنغلق بوساطة حجاب رقيق جداً .

شُعَيرَةٌ كُبَيبِيَّة **glomerular capillary**
واحدة منَ شعيرات الكبيبات الكلوية .

شُعَيرَةٌ وَصْلِيَّة **junctional capillary**
شعيرة توصل بين وعائين دمويين .

شُعَيرَةٌ لِمْفِيَّة **lymph capillary**
هي الأوعية اللمفية الشعرية (Vas Lymphocapillare TA) .

شُعَيرَةٌ لِمْفِيَّة **lymphatic capillary**
انظر تحتَ lymph capillary .

شُعَيراتُ ميج **Meigs' capillaries**
(في العَضَلَة القَلْبِيَّة)
شعيرات في العضَلة القلبية .

شُعَيراتٌ إفْرازِيَّة **secretory capillaries**
قنيات بيَن الخلايا دقيقة جداً بين الخلايا تتوضع ما بين الخلايا الغدية المجاورة مثل الخلايا الجدارية المعدية ، التي تتشكل بواسطة مقاربة الأثلام على سطوح الخلايا ، وتنفتح في تجويف الغدة .

شُعَيراتٌ مُغَمَّدَة **sheathed capillaries**
انظر تحت artery .

شُعَيراتٌ جُيَيْبَانِيَّة **sinusoidal capillaries**
هي أوعية جييبانية (Vas Sinusoideum) .

شُعَيراتٌ وَرِيدِيَّة **venous capillaries**
نمط من الأوعيَة الدقيقة التي تفتقر إلى الغلالة العضلية ، وهي متوسطة البنية والتوضع بين الوُرَيْد والشعيرة . وتسمى كذلك خلف الشعيرات (Post Capillary) ، والوُرَيْد خلف الشعيرات (Post Capillary Venule) .

العـضـد التي تـتـمـفـصل مع رأس الكعـبـرة ، ويسمى كذلك الرأس الكعبري لعظم العضد .

رُؤَيس المِطْرَقَة **capitulum mallei**
(=رأسُ المِطْرَقَـة) **(=caput mallei TA)**
رأس المطرقَة .
انظر تحت caput mallei TA .

رأسُ الفَكِّ السُّفْلِي **capitulum mandibulae**

رُؤَيس العَضُد **capitulum of humerus**
نتوء بارز في النهاية الدانية للقمة الإنسية لعظم العـضـد التي تـتـمـفـصـل مع رأس الكعـبـرة ، ويسمى كذلك الرأس الكعبري لعظم العضد .

رُؤَيس عَظْم السِّنْع **capitulum ossis metacarpalis**
(=رأسُ عَظْمِ السِّنْع) **(=caput ossis metacarpalis)**
انظر تحت caput ossis metacarpalis .

رُؤَيس عَظْم المِشْط **capitulum ossis metatarsalis**
(=رأس عظم المشط) **(=Caput ossis metatarsalis)**
يسـمـى رأس عـظـم المـشـط (Caput ossis metatarsalis) ، وهي النهاية القاصية المتوسعة من عظام الأمشاط والتي تتمفصل مع السلاميات الدانية للإصبع ذاته .

رُؤَيس النَّاتِئِ اللُّقْمِي للفَكِّ السُّفْلِي **capitulum processus condyloidei mandibulae**
(=رأسُ الفَكِّ السُّفْلِي) **(=caput mandibulae)**
انظر تحت caput mandibulae .

رُؤَيس الكُعْبُرَة **capitulum radii**
(= رأسُ الكُعْبُرَة) **(=caput radii)**
انظر تحت caput radii .

رُؤَيس الرِّكاب **capitulum stapedis**
(= رأسُ الرِّكاب) **(=caput stapedis)**
انظر تحت caput stapedis .

رُؤَيس الزَّنْد **capitulum ulnae**
(= رأسُ الزَّنْد) **(=caput ulnae)**
انظر تحت caput ulnae .

تنجيد (نمط من الخياطة الجراحية) **capitonnage**
غلق جراحي لجوف كيسي بوساطة تطبيق الخياطة بأسلوب يحقق مقاربة السطوح المتقابلة .

رأسِيٌّ قدَمِيّ **capitopedal**
متعلق بالرأس والقدم .

الكابيترول **Capitrol**
الاسم التجاري لمستحضر الكلوروكسين (Chloroxine) ، وهو دواء لقشرة الشعر .

رُؤَيسات **capitula**
(ف: رُؤَيس) **(sing.capitulum)**

رُؤَيسِيّ **capitular**
متعلق برؤيس أو رأس العظم .

رُؤَيس الشَّظِيَّة **capitular fibulae**
(=رأسُ الشَّظِيَّة) **(=caput fibulae TA)**

رُؤَيس **capitulum**
(ج: رُؤَيسات) **(pl.capitula)**
1ـ رأس صغير ، أو بارزة صغيرة في العظم الذي يتمفصل العظم بواسطتها مع عظم آخر .
2ـ رؤيس العضد .
3ـ بصلي الشكل ، أو بارزة مطرافية متضخمة لجسم أو جزء منه ؛ مثل : (أ) منطقة الرأس المتحرك التي تسند أقسام الفم عند القراد والسوس ، ويسمى كذلك جسيم الفك . (ب) الهيكل الكلسي متضمن القشر أو الدرع والجسم عند صدف البحر . (ج) نهاية قرن الاستشعار عند الحشرات . (د) النهايات الدانية للرباط الخيطي في الأوالي الحيوانية المهدبة من (فصيلة مفرطات الفم) التي قد تكون بارزة أو شبيهة بالسن . (هـ) النهاية الأمامية للإبرة المحورية للأوالي الحيوانية السوطية التي تتضمن نواة الكائن الحي .

رُؤَيس الضِّلْع **capitulum costae**
(=رأسُ الضِّلْع) **(=caput costae TA)**
انظر تحت caput costae .

رُؤَيس العَضُد **capitulum humeri**
نتوء بارز في النهاية الدانية للقمة الإنسية لعظم

أشد وخامة عند مدمني الكحول ، أو عديمي الطحال ، أو المصابين بالخباثات الدموية ، كانت تسمى سابقاً عصيات (DF-2 bacillus) .

السُّخاميَّةُ اللِّثَوِيَّة Capnocytophaga gingivalis

نوعٌ مِنَ الجراثيم التي تسبب التهاب اللثة .

السُّخاميَّةُ المُغْرَوِيَّة Capnocytophaga ochraceus

مخطط ثَنَائي أكسيد الكربون capnogram

التسجيل موجي الشكل بالزمن الحقيقي لتركيز ثنائي أكسيد الكربون في الغازات التنفسية .

مخطاط ثنائي أكسيد الكربون capnograph


جهاز لرصد تركيز ثنائي أكسيد الكربون الزفري . ويتضمن حاسة (كشاف) موضوعة في دارة تنفسية أو الأنبوب الذي يحمل جزءاً من الغازات الزفرية إلى جهاز التحليل ، وكتلة مقياس الطيف أو مقياس الطيف ما تحت الحمراء ، وأجهزة لعرض الصور البصرية المستمرة (أنبوب الأشعة المهبطية) والمخططة (طابعة) .

تخطيط ثنائي أكسيد الكربون capnography

رصد تركيز ثنائي أكسيد الكربون الزفري بالتسلسل مع تقييم الحالة الفيزيولوجية للمرضى المصابين بمشكلات تنفسية حادة أو من يتلقى التهوية الآلية ، ولتحديد كفاية التهوية عند المرضى المخدرين .

تَصْويرُ الكَبِدِ الكَرْبُونِيُّ capnohepatography

التصوير الشعاعي للكبد بعد الحقن الوريدي لغاز ثنائي أكسيد الكربون .



السخامية (جنس من الجراثيم)
Capnocytophaga

كابلا Capla

الاسم التجاري لمستحضر الميبوتامات .

متلازمة كابلان Caplan's syndrome

[متلازمة منسوبة للطبيب أنتوني كابلان *(Anthony Caplan)* ، وهو طبيب بريطاني عاش مابين *1907-1976]* ، وهو سحار في مرض الروماتويد .

انظر تحت syndrome .

دخاني capneic

تقال في حالات زيادة ثنائي أكسيد الكربون في الجو ، وخاصة عند حضانة المزارع الجرثومية .

1 ـ سابقة بمعنى السُّخام capno-

2 ـ سابقة بمعنى الدُّخَان

3 ـ سابقة بمعنى ثنائِي أكسيدِ الكَرْبون

سابقة تبين المظهر القاتم أو الدخاني أوتشير لوجود ثنائي أكسيد الكربون .

السُّخاميَّة Capnocytophaga

(جنس من الجراثيم)

جنس من سلبيات الجرام ، لاهوائية بصفة اختيارية ، وهي جراثيم عودية الشكل أو مغزلية الشكل نسبة تواجدها غير مؤكدة . توجد في المقرات السوية والمرضية في جوف الفم عند الإنسان ، تتصاحب أيضاً مع الأمرض الجهازية عند الأشخاص منقوصي المناعة ، تتضمن أنواع السخامية اللثوية ، والسخامية المغيرائية (وتسمى كذلك الجرثومانيات المغيرائية) والسخامية البلغمية المنشأ .

السخامية Capnocytophaga
الكاندومورسية canimorsus

نوع من النبيت الطبيعي للفم عند الكلاب والقطط ، وعندما يتعرض الإنسان للعض بحيوان منعدي فقد تتابع العدوى وربما تصبح مميتة ، وتتميز بالتهاب الهلل ، وتجرثم الدم والتهاب السحايا القيحي ، والتهاب الشغاف والغنغرينة المحيطية ، والفرفرية الخدية ومتلازمة ووترهاوس ـ فريدريكسن (Waterhouse- Friderichsen syndrome) ، وتكون العدوى

الخيول والمواشي التي تورمت بسبب الإصابة بالورم الرطب (كيس أو جراب مليء بسائل) أو بسبب التنكس الليفي الناجم عن الضغط المطول أو الإصابات الصغيرة المتكررة .

القبعة المزدوجة **cappie**

زيادة ترقق عظام فروة الرأس في الأغنام الصغيرة والذي عادة ما ينتج عن النظام الغذائي غير الكافي .

انظر تحت double scalp .

تقبيع **capping**

1 ـ الاستعداد المسبق أو الاحتياط للتغطية الانسدادية أو الواقية .

2 ـ حركة مستضدات سطح الخلية في المنطقة الصغيرة (الرأس) على سطح الخلية المطلوبة للارتباط المتصالب للمستضدات بالأضداد النوعية .

3 ـ في الإجراءات الترميمية للأسنان يأتي بمعنى : (أ) تغطية الشرفات السنية الضعيفة بسبب التسوس بصفة فلزية واقية . (ب) مصطلح عامي يطلق على استبدال التاج لسنة طبيعية بتاج صناعي .

تَقْبيعُ اللُّبِّ المُباشِر **direct pulp capping**

(أسنان)

وضع ستار ورقي عازل لنقل الحرارة ومنع العدوى مباشرة فوق اللب ، فيكون كالقبعة له عند تحضير السن لحشوها وتلبيسها .

تَقْبيعُ اللُّبِّ غير المُباشِر **indirect pulp capping**

(أسنان)

وضع معلق هيدروكسيد الكالسيوم فوق اللب المكشوف بقصد تحريض إنتاج العاج الثانوي الواقي للب .

تَقْبيعُ اللُّب **pulp capping**

تغطية لب السن المكشوف بواسطة ضماد أو ملاط لوقاية اللب من الإصابات الإضافية ، وتحقيق بيئة للإلتئام وإجراءات الترميم . يوضع الضماد على اللب مباشرة في مقر التعرض في

مقياس ثنائي أكسيد الكربون **capnometer**

جهيزة لقياس الضغط الجزئي المدي النهائي لغاز ثنائي أكسيد الكربون .

مقايسة ثنائي أكسيد الكربون **capnometry**

تعيين الضغط الجزئي المدي النهائي لثنائي أكسيد الكربون .

مُعْتاشٌ بثنائي أكسيدِ الكَرْبون **capnophilic**

(جراثيم)

كائن حي ينمو بشكل أفضل بوجود ثنائي أكسيد الكربون ، (كالجراثيم) .

كابُوبينات **capobenate**

(دَواءٌ مُضادٌ لاضْطِرابِ النَّظْم)

كابوبينات الصوديوم (Capobenate sodium) ، وهو ملح أحادي الصوديوم لحمض الكابوبنيك (دواء موسع للأوعية) ، له فعالية مثبطة للقلب يستعمل كمضاد لاضطراب النظم .

حَمْضُ الكابُوبينيك **capobenic acid**

(دَواءٌ مُوَسِّعٌ للأوعية)

دواء موسع للأوعية يستعمل في معالجة احتشاء العضلة القلبية والوقاية منها .

طيرٌ مَخْصِيّ **capon**

طير منزلي منزوع منه الخصية لغرض التسمين والزيادة في الوزن .

يُخَصِّي الطَّير **caponize**

يخصي ذكور الطيور المنزلية بصفة خاصة .

تلاطُس (صَوتٌ في المِعدَةِ الفارِغَة) **capotement**

صوت أشبه بصوت الرش المسموع يحدث بسبب توسع المعدة .

الكابوتين **Capoten**

الاسم التجاري لمستحضر الكابتوبريل (Captopril) ، وهو دواء خافض لضغط الدم.

الكابوزيد **Capozide**

الاسم التجاري لمستحضر توليفي من الكابتوبريل والهيدروكلوروثيازيد (دواء مدر للبول) .

مكيَّس (قلنسوي الشكل، شبيه بالكوب) **capped**

يقال عن المفاصل ، وبوجه خاص في قوائم

ولها تفاعل مصلي متصالب، والتي تشمل جدري الغنم وجدري الماعز وفيروسات الداء الجلدي الأكتل (Actiomycosis) .

caprizant **مُتقافِز**

متواثب (مثل الماعز)، وهو مصطلح لم يعد يستخدم حالياً وكان يستعمل لوصف النبض القوي .

caproate **كابْرُوات (كيمياء)**

1ـ أي ملح لحمض الكابرويك (Caproic acid) .

2ـ من الأسماء المتعددة في الولايات المتحدة (USAN)، والمتفق عليها للهيكسونات (Hexanoate) .

caproic acid **حمض الكابرويك**

حمض دهني مشبع له ست ذرات كربونية، موجود في دهن الزبدة، وزيت جوز الهند، وزيت جوز النخيل، ويسمى كذلك حمض الهيكسونيك (Hexanoic acid) .

caproin **كابْرُوين (كيمياء)**

مادة كيميائية مستخرجة من دهن الماعز .

caprone **كابْرون (كيمياء)**

caproyl **كابْرُويل (كيمياء)**

جذر الأسيل لحمض الكابرويك .

caproylamine **كابْرُويلامين (كيمياء)**

مادة كيميائية مستخرجة من دهن الماعز .

caprylate **كابْريلات (كيمياء)**

أي ملح أو أستر أو شكل غير أيوني لحمض الكابريليك (Caprylic acid) .

caprylic acid **حمض الكابريليك**

حمض دهني مشبع مكون من ثمان ذرات كربونية، موجود في دهن الزبدة وزيت جوز الهند وزيت جوز النخيل، ويسمى كذلك حمض الأوكتانويك (Octanoic acid) .

caprylin **كابْريلين (كيمياء)**

مادة كيميائية مستخرجة من دهن الماعز .

capsaisin **كابسايسين**

مركب حلقي مهيج للجلد والأغشية المخاطية، حالة التقبيع المباشر، أما في حالة التقبيع غير المباشر فيوضع فوق فاصل رقيق من العاج المتبقي فوق السن، وإذا نزع هذا العاج فقد يكشف اللب السني .

caprate **كابْرات (كيمياء)**

أي ملح أو استر أو شكل غير أيوني لحمض الكابريك (Capric acid) .

capreolary **حوالِقيّ**

مُتَلَوٍّ كَحَوالِق الكَرْمَة .

capreolate **حوالِقيّ (مُتَلَوٍّ كَحَوالِق الكَرْمَة)**

capreomycin **كابْريُوميسين (دَواءٌ مُضادٌّ لِلتَّدَرُّن)**

مضاد حيوي عديد الببتيد ينتج بواسطة المتسلسلة الحوالقية، وهو فعال ضد الذراري البشرية من المتفطرات السلية، وله أربع مكونات فعالة مكروبيولوجياً .

capreomycin sulfate **سلفات الكابريوميسين**

ملح الكابريوميسين ثنائي الكبريت، الموجود كمسحوق أبيض (أو أبيض عملياً) غير بللوري، ويستعمل ككابح للسل ويعطى حقناً عضلياً .

capric acid **حمض الكابريك**

حمض دهني مشبع له عشر ذرات كربونية، موجود كمقوم لعدة دهون وزيوت .

caprillic **عَنْزِيّ**

حمض الكابرليك منسوب للماعز .

capriloquism **ثغاء**

(=egophony)

caprin **كابْرين (كيمياء)**

المادة الموجودة في الزبدة وتعطيها نكهتها، وتسمى أيضاً (Decanoin) و (Glyceryl tricaprate).

caprine **عَنْزِيّ**

1ـ متعلق بالماعز، أو مشتق من الماعز .

2ـ النورلوسين (حمض أميني) .

Capripoxvirus **الفَيروسَة الجُدَرِيَّة العَنْزِيَّة**

جنس من الفيروسات من طائفة الفيروسة الجدرية الحبلية (فصيلة الفيروسة الجدرية)،

انظر تحت capsomer .

بَضْعُ المِحفَظَة **capsotomy**
(=capsulotomy)

انظر تحت capsulotomy .

مِحفَظة **capsula TA**
(ج: مَحافِظ) **(pl.capsulae)**

مصطلح عام للبنية الغضروفية أو الدهنية أو الليفية أو الغشائية التي تغلف بنية أو عضواً أو جزءاً آخر .

محفَظَةٌ شَحْمِيَّة **capsula adiposa**

محفظة تتكون بصفة رئيسية من الدهون .

مـحفَظَةُ الكُلْيَـة الشَّحْمِيَّة **capsula adiposa renis TA**

كساء مَن الشحم يحيط بالمحفظة الليفية للكلية ، ويستمر إلى النقير مع الدهن في الجيب الكلوي . وتسمى كذلك المحفظة الدهنية للكلية (Fatty Capsule of Kidney) ، والدهن حول الكلية (Perinephric fat) .

محفُظَةُ المَفْصل الأَخْرَمِيِّ التَّرقُّوِيّ **capsula articularis cromioclavicularis TA**

غلافٌ كيسي الشَكل يحيط بتجويف المفصل الزليلي الأخرمي الترقوي ، وذلك بالاتصال مع محيط النهاية المتمفصلة للعظم ، ويتكون من غشاء ليفي وغشاء زليلي .

محفْظَةُ المَفْصل الرُّصُغِيِّ المُسْتَعْرِض **capsula articularis articulationis tarsi transversae TA**

كيس رباطي يحيط بالمفصل الرصغي المستعرض .

محْفَظَةُ المَفْصل الصُّدْغيِّ الفَكِّيّ **capsula articularis articulationis temporomandibularis TA**

كيس رباطي يحيط بالمفصل الصدغي الفكي ، وتسمى كذلك المحفظة المفصلية الفكية الصدغية .

محْفَظَةُ المَفْصل الفقْري **capsula articularis articulationum vertebrarum TA**

وهو الجوهر (المادة) اللاذع الفعال في الفليفلة (ثمر نبات من الفصيلة الباذنجانية) ، يستعمل كمكون فعال في الكريم (الرهيم) كمضاد للتهيج ومسكن موضعي .

الكابسيبون **Capsebon**

الاسم التجاري لمستعلق سلفيد الكادميوم (Cadmium sulfide) .

فليفِلَة **Capsicum**
(ثمَرُ نباتٍ من الفصيلة الباذنجانية)

جنس من النباتات من الفصيلة الباذنجانية ، تتضمن أنماطاً من الفلفل الحار مثل الفلفل الحار الأفريقي (Capsicum. frutescens) ، و (Capsicum. annumvar . conoidis) وهو فليفلة الصلصلة الحارة (التاباسكو) ، و (Capsicum annumvar. longum) وهو الفليفلة الطويل اللويزياني .

الفليفلة **capsicum**

1 ـ أي نبات من جنس الفليفلة ، وتستخدم خلاصة راتين الفليفلة الزيتي في رذ (بخاخ) الفلفل ، وتسمى كذلك الفليفلة الدغلية الطويلة .

2 ـ الثمرات الجافة لعدة أنواع من الفليفلة ، تستعمل كمهيجة وطاردة للأرياح (Carminative) .

قفيصَة (في الفيروسات) **capsid**

قشرة البروتين التي تحمي الحمض النووي في الفيروس ، تتركب من وحدات بنيوية حلزونية أو عشرونية الوجوه المتناظرة ، أو قسيمات قفيصية . وبحسب عدد الوحيدات التي تحوزها القسيمات القفيصية (Capsomers) فإنها تسمى ديمر أي مثنويات (2) ، أو مثلوثات (3) ، أو مخموسات (5) أو مسدوسات (6) .

التِهابُ مِحفَظةِ العَدَسَة **capsitis**

التهاب في محفظة العدسة البلورية .

قُسَيمٌ قفيصِيّ (في الفيروسات) **capsomer**

الوحدة المورفولوجية للقفيصة في الفيروسات

قُسَيمٌ قفيصِيّ (في الفيروسات) **capsomere**

محفظة المفصل الفهقي المحوري **capsula articularis atlantoepistrophica**


هو محفظة المفصل الفهقي المحوري الوحشي . انظر تحت capsula articularis atlantoaxialis lateralis TA .

مـحْـفَظَةُ المَفْـصل الفَهْقيِّ القَذالي **capsula articularis atlanto-occipitalis TA**

أحد الشـريطين الرباطيين المتميزين ، وفيه ترتبط النهـــاية الأولى لكـل شـــريط رباطي بالكـتلة محـفظة المفـاصل الفـقـرية : شـريط من النسيج يدمج الناتئ المفـصلي للفقـرة المجاورة ، جزء منه أبيض ليفي وجزء منه أصفر مرن .

محْفَظَةُ المَفْصل الفَهْقيِّ المحْوَرِيِّ الوَحْشي **capsula articularis atlantoaxialis lateralis TA**

كيس رباطي يحيط بالمفـصل الفَهْقيِّ المحْوَرِيِّ الوَحْشي ، ويسمى كـذلك مـحفَظة المَفـصَل الفهقي المَحوري .



Capsid Virus قفيصة الڤيروس

كيس رباطي يحيط بمفصل الكتف .

مِحْفَظَةُ مَفْصِل الفَك **capsula articularis mandibulae TA**

المحفظة المفصلية الفكية الصدغية .

انظر تحت capsula articularis articlationis temporomandibularis .

مِحْفَظَةُ مَفْصِل اليَد **capsulae articularis manus TA**

كيس رباطي مقلقل يحيط بالمفصل الكعبري الرسغي والمفاصل بين الرسغيات معاً ، وتسمى كذلك محفظة المفصل الكعبري الرسغي .

مِحْفَظَةٌ مَفْصِليَّة **capsula articularis TA**

غلاف يشبه الكيس يضم الجوف للمفصل الزليلى الملتصق بكفاف النهاية المفصلية لكل عظم مكتنف . يتألف من غشاء ليفي وغشاء زليلي . ويسمى كذلك المحفظة الزليلية أو المحفظة المفصلية .

مِحْفَظَةُ مَفْصِل العَظْم الحِمِّصي **capsula articularis ossis pisiformis TA**

كيس رباطي مقلقل رقيق يحيط بمَفْصل العَظْم الحِمِّصي (Pisiform bone) .

مِحْفَظَةُ المَفْصل الكُعْبُرِيِّ الزَّنْدِيِّ القاصي **capsula articularis radioulnaris distalis TA**

كيس رباطي مقلقل يحيط بالمفصل الزندي الكعبري القاصي (Distal radio) .

مِحْفَظَةُ المَفْصل القَصِّيِّ التَّرْقُوِي **capsula articularis sternoclavicularis TA**

كيس رباطي يحيط بالمفصل القصي الترقوي (Sternoclavicular joint) .

مِحْفَظَةُ المَفْصل القَصِّيِّ الضِّلْعي **capsula articularis sternocostalis TA**

كيس رباطي يحيط بالمفصل القصي الضلعي (Sternocostal joint) .

مِحفظةُ المَفْصل الكَاحليِّ العَقَبي **capsula articularis talocalcanea TA**

كيس رباطي مقلقل يحيط بالمَفْصَل تحت الكاحل (Subtalar joint) .

الوحشية للفهقة وترتبط النهاية الأخرى إلى حواف اللقمة القذالية .

مَحْفَظَةُ المَفْصل العَقبيِّ النَّرْدي **capsula articularis calcaneocuboidea TA**

كيس رباطي يحيط بالمفصل العقبي النردي .

مِحْفَظَةُ مَفْصِل رَأس الضِّلَعِ **capsula articularis capitis costae TA**

كيس رباطي (Ligamentous sac) يحيط بمفصل رأس الضلع .

مِحْفَظَةُ المَفْصل الرُّسُغيِّ السِّنْعيِّ لإبهَامَ اليَد **capsula articularis carpometacarpea pollicis**

كيس رباطي يحيط بالمَفْصِل الرُّسُغيِّ السِّنْعيِّ لإبهام اليَد .

مِحْفَظَةُ المَفْصل الضِّلْعيِّ المُسْتَعْرض **capsula articularis costotransversaria TA**

كيس رباطي يَحيط بالمفصل الضلعي المستعرض .

مِحْفَظَةُ مَفْصِل الوَرك **capsula articularis coxae TA**

كيسَ رباطي قوي يحيط بمفصل الورك .

مِحْفَظَةُ المَفْصل الحَلْقيِّ الطِّرْجهَالي **capsula articularis cricoarytenoidea TA**

طبَقَات ليفيةَ وطبقات زليلية تحيط المفصل الحلقي الطرجهالي (Cricoarytenoid joint) .

مِحْفَظَةُ المَفْصل الحَلْقيِّ الدَّرَقيِّ **capsula articularis cricothyroidea TA**

مِحْفَظَةُ مَفْصِل المِرْفَق **capsula articularis cubiti**

تتكون المحفظة حول تمفصل المرفق بأربطة المختلفة .

مِحْفَظَةُ مَفْصل الرُّكْبَة **capsula articularis genus TA**

كيس مقلقل ، رقيق ولكنه قوي يحيط بمفصل الركبة .

مِحْفَظَةُ مَفْصل العَضُد **capsula articularis humeri TA**

المحفظة الليفية المحيطة بالأوعية .

انظر تحت capsula fibrosa perivascularis .

المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ للدَّرَق **capsula fibrosa glandulae thyroideae TA**

غلالة من النسيج الضام الذي يلتصق بشدة بالغدة المستبطنة ، وتسمى كذلك المحفظة الغدية الدرقية .

المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ للكَبد **capsula fibrosa hepatis**

هي المحفظة الليفية المحيطة بالأوعية .

انظر تحت capsula fibrosa perivascularis .

المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ المُحيطَةُ بالوَعاء **capsula fibrosa perivascularis TA**

غمد من النسيج الضام الذي يرافق الأوعية والقنيات خلال باب الكبد . تستمر بالغلالة الليفية ، وتسمى كذلك المحفظة الليفية الكبدية ، ومحفظة الكبد الليفية ، ومحفظة جليسون ، والمحفظة الكبدية الصفراوية ، والمحفظة الجليسونية الليفية .

المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ للكُلْيَة **capsula fibrosa renis TA**

كساء لَلكلية من النسيج الضام ، ويستمر من خلال النقير ليبطن الجيب الكلوي ، ويسمى كذلك الغلالة الليفية الكلوية (Tunica fibrosa renis) .

محفظة العقدة **capsula ganglii**

محفظة النسيج الضام الصفائحي المحيطة بالعقدة العصبية ؛ والتي تتواصل مع الغلاف العصبي لجذورها العصبية المصاحبة .

محْفَظَةُ الغُدَّة الدَّرَقيَّة **capsula glandulae thyroideae**

هي المحفظة الليفية الغدية الدرقية .

انظر تحت capsle fibrosa glandulae thyroideae

محفظة كبيبية **Capsula glomeruli**

(= محفظة الكبيبة) **(=glomerular capsule)**

جدار مزدوج كوبي الشكل مغتلف بالكبيبة والذى يكون متقارب جدا بخلايا الرجلاء للطبقة الحشوية للمحفظة .

محْفَظَةُ المَفْصل الكَاحليِّ السَّاقي **capsula articularis talocruralis TA**

كيس رباطي رقيق يحيط بمفصل الكاحل ، ويسمى كذلك محفظة مفصل الكاحل .

محْفَظَةُ المَفْصل الكَاحليِّ الزَّورَقي **capsula articularis talonavicularis**

محْفَظَةٌ محيطة بالمَفْصل الكَاحليِّ الزَّورَقي (Talonavicular joint) .

محْفَظَةُ المَفْصل الظُّنْبوبيِّ الشَّظَوي **capsula articularis tibiofibularis TA**

كيس لَيفي يشمَل المَفْصل الظُّنْبوبيِّ الشَّظَوي (Tibiofibular articulation) .

محْفَظَةُ البَصلَة العَينيَّة **capsula bulbi**

(=غمْدُ المُقْلَة) **(=vagina bulbi)**

انظر تحت vagina bulbi .

التَّأمور **capsula cordis**

(=pericardium)

غلاف القلب ، وهو ما يعرف بالتأمور .

المحْفَظَةُ الظَّاهرَة **capsula externa TA**

(=external capsule)

طبقة رقيقة من المادة البيضاء تفصل بين الجزء الوحشي من النواة العدسية الشكل (البطامة) عن العائق (في الدماغ) .

المحْفَظَةُ الظَّاهرَةُ للنَّواة العَدَسيَّة **capsula externa nuclei lentiformuis**

(=المَحْفَظَةُ الظَّاهرَة) **(=capsula externa)**

طبقة رقيقة من المادة البيضاء تفصل بين الجزء الوحشي من النواة العدسية الشكل (البطامة) عن العائق (في الدماغ) .

المحُفَظَةُ القُصوى **capsula extrema TA**

مادة بيضاء بين العائق وقشر الجزيرة (في الدماغ) .

المحْفَظَةُ اللِّيفيَّة **capsula fibrosa**

محفظة تتضمن عناصر ليفية بصفة رئيسية .

المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ للكبَد (لجليسون) **capsula fibrosa (Glissoni)**

(=capsula fibrosa hepatis)

ألياف النطيقة الهدبية . وتسمى كذلك المحفظة البلورية (Crystalline capsule) .

محْفَظَةُ الطِّحال **capsula lienis TA**
ويسمى أيضاً (Tunica fibrosa splenis) و (Tunica fibrosa) ، وهي المحفظة الليفية للطحال ، وتحتوي على الكولاجين والألياف المرنة مع ألياف عضلية ملساء .

محفظة العقدة اللمفية **capsula nodi lymphatici**
(=capsula nodi lymphoidei)
الطبقة الخارجية للعقدة اللمفية ، والتي تتركب بدرجة رئيسية من ألياف الكولاجين مع قليل من الأرومات الليفية والألياف المرنة .

محْفَظَةُ النَّواة المُسَنَّنَة **capsula nuclei dentati**
طبقة تتشكل من الألياف التي تمر من النواة المسننة وإليها .

محفظة البنكرياس **capsula pancreatis**
غمد رقيق من النسيج الهللي الذي يكسو البنكرياس (ولكنه لا يشكل محفظة مؤكدة) ، تمتد الحواجز منه إلى الغدة وتقسمها إلى فصيصات .

محفظة البروستاتة **capsula prostatica**
محفظة ليفية مرنة تحيط بالبروستاتة وتحتوي ضفيرة وريدية ممتدة .

محْفَظَةُ الطِّحال المَصْلِيَّة **capsula serosa lienis**

مَحفظة الطحال **capsula splenis**
غلالة الطحال الليفية المرنة . وتسمى كذلك الغلالة الليفية الطحالية .

محْفَظَةُ اللَّوزَة **capsula tonsillaris TA**
محفظة ليفية تغطي السطح الجانبي للوزات الحنكية وتفرقها عن النسج الضامة المستبطنة .

مَحافظُ المَفاصل الرُّسُغِيَّة السِّنَعِيَّة **capsulae articulares carpometacarpeae TA**
أكياس رَباطية تحيط بالمفاصل الرسغية السنعية ، وتستمر بالمحافظ المفصلية بين الرسغيات .

مَحافظُ مَفاصل أصابع اليَد **capsulae articulares digitorum manus**

محْفَظَةٌ كُبَيبيَّة **capsula glomeruli TA**
توسع كروي مزدوج الإحاطة يشكل بداية النبيب الناقل للبول في الكلية ويحيط بالكبيبات ، ويتألف من طبقة داخلية أو حشوية (الظهارة المحفظة) ، ومن طبقة خارجية أو جدارية (الظهارة الكبيبية) . وتسمى كذلك محفظة بومان ، ومحفظة مالبيجي ، ومحفظة مولر .

المحْفَظَةُ الغائرة **capsula interna TA**
كتلة مروحيَة الشكل من ألياف بيضاء تفصل بين النواة العدسية الشكل من الوحشي عن رأس النواة الذيلية وعن المهاد الظهراني ، وتفصله من الإنسي عن النواة الذيلية ، تتألف من طرف أمامي وركبة وطرف خلفي . يتألف من ثلاثة أقسام هي المهادي العدسي وتحت العدسي وخلف العدسة . ووظفية المحفظة الداخلية حمل الألياف المبتعدة عن القشرة (الصادرة) من القشر الدماغي . ويبقى دورها الفعلي في نقل الألياف الواردة إلى القشر غير أكيد .

المحْفَظَةُ الغائرةُ للنُّواة العَدَسيَّة **capsula interna nuclei lentiformis**
(=المحْفَظَةُ الغَائرَة) **(=capsula interna)**
كتلةَ مروحية الشَكل من ألياف بيضاء تفصل بين النواة العدسية الشكل من الوحشي عن رأس النواة الذيلية وعن المهاد الظهراني ، وتفصله من الإنسي عن النواة الذيلية ، تتألف من طرف أمامي وركبة وطرف خلفي يتألف من ثلاثة أقسام هي المهادي العدسي وتحت العدسي وخلف العدسة . وظيفة المحفظة الداخلية حمل الألياف المبتعدة عن القشرة (الصادرة) من القشر الدماغي . ويبقى دورها المضبوط في نقل الألياف الواردة إلى القشر غير أكيد .
انظر تحت capsula interna .

محْفَظَةُ النَّواة العَدَسيَّة **capsula lentis TA**
غلاف عدسَي يغطيَ عدسة العين ، وينصهر مع

انظر تحت internal capsule .

انظر تحت external capsule .

مَحفظتا الكُلْيَة (الشحمية والليفية) **capsulae renis**

انظر تحت capsule adipose renis .

انظر تحت capsule fibrosa renis .

مَحافِظ **capsulae**

(ف: مِحْفظة) **(pl.capsula)**

مَحْفظِيّ **capsular**

متعلق بالمحفظة .

كَبْسَلَة (حِفظ الدَّواء في كبسولة) **capsulation**

حِفْظُ الدَّواء في كبسولة .

1ـ كَبَسولة (مستحضر دوائي) **capsule (pl. capsules)**

2ـ مِحْفَظة (تشريح)

1ـ بنية تحوي شيئاً ما بداخلها كحاوية لمادة ملائمة (ذوابة ، صلبة أو رخوة) لتضمين جرعة من الدواء .

2ـ بنية تشريحية تتضمن عضواً أو جزءاً من البدن .

انظر تحت capsula .

المَحافظُ الكُظْرِيَّة الإِضَافِيَّة **accessory adrenal capsules**

تسَمى الغدد الكظرية الإضافية (Glandulae suprarenales accessoriae) ، و (Accessory suprarenal glands) ، وهي جزيرات من النسج الكظرية المفصولة وتوجد حول الغدة الكظرية الرئيسية فوق الكلية ، أو فوق البربخ .

المَحافظُ الكُظْرِيَّة الإِضَافِيَّة **accessory suprarenal capsules**

تسَمى أيضاً الغدد الكظرية الإضافية (Glandulae suprarenales accessoriae) ، والمحافظ الكظرية الإضافية (Accessory adrenal capsules) .

المِحْفَظَةُ السَّمْعِيَّة **acoustic capsule**

وتسمى محفظة الأذن (Otic capsule) ، وتوجد في المنطقة السمعية الجنينية وهي غضروفية والتي تتطور فيما بعد لدى الفقاريات المتقدمة

هي المحافظ المفصلية لما بين سلاميات اليد .

مَحافظُ مَفاصل أصَابع القَدَم **capsulae articulares digitorum pedis**

هي المحافظ المفصلية لما بين سلاميات القدم .

مَحافظُ المَفاصل بَيْنَ السِّنْعِيَّة **capsulae articulares intermetacarpeae TA**

أكياس رباطية تحيط بالمفاصل بين السنعية ، وتستمر بالمحافظ المفصلية الرسغية السنعية .

مَحافظُ المَفاصل بَيْنَ المُشْطيَّة **capsulae articulares intermetatarseae TA**

هي المحافظ التي تحيط بالمفاصل الأربعة بين قواعد العظام المشطية .

مَحافظُ المَفاصل بَيْنَ أصَابع اليَد **capsulae articulares interphalangearum manus TA**

أكياس رباطية غير كاملة تحيط بالمفاصل بين السلامية في اليد ، وتسمى كذلك المحافظ المفصلية بين سلاميات اليد .

مَحافظُ المَفاصل بَيْنَ أصَابع القَدَم **capsulae articulares interphalangearum pedis TA**

المحافظ التي تحيط بالمفاصل بين السلامية لأصابع القدم ، وتسمى كذلك محافظُ المَفاصل بَيْنَ أصَابع القَدَم .

مَحافظُ المَفاصل السِّنْعِيَّة السُّلامِيَّة **capsulae articulares metacarpophalangeae TA**

أكياس رباطية تحيط بالمفاصل السنعية السلامية .

مَحافظُ المَفاصل المُشْطِيَّة السُّلامِيَّة **capsulae articulares metatarsophalangeae TA**

خمس محافظ مفصلية تحيط بالمفاصل المشطية السلامية .

مَحافظةُ المَفْصل الرُّصْغِيِّ المُشْطِي **capsulae articulares tarsometatarseae TA**

ثلاثة مفاصل تحيط بالمفاصل بين الأمشاط والعظام إسفينية الشكل .

مَحفظتا النَّواة العَدَسِيَّة (الظاهِرَة والغائرة) **capsulae nuclei lentiformis**

(في الديدان الشريطية) .

capsule of ganglion — **محفظة العقدة**

انظر تحت capsula ganglii .

capsule of glomerulus — **مِحْفَظَةُ الكُبَيبَة**

جدار مزدوج كوبي الشكل مغلف بالكبيبة والذي يكون متقارب جداً بخلايا الطبقة الحشوية للمحفظة .

capsule of heart — **التَّأمور**

(=pericardium)

انظر تحت pericardium .

capsule of lens — **محفَظَةُ العَدَسَة**

capsule of lymph node — **مَحفظة العقدة اللمفية**

capsule of pancreas — **محفظة البنكرياس**

capsule of prostate — **محفظة البروستاتة**

capsule of radiocarpal joint — **محفظة المفصل الكعبري الرسغي**

capsule of spleen — **محفظة الطحال**

capsule of subtalar joint — **محفظة المفصل تحت الكاحل**

capsules of the brain — **المَحافظُ الدِّمَاغيَّة**

cartilage capsule — **مِحْفَظَةُ الغُضْرَوف**

منطقة قعدية (Basophilic zone) من مطرس الغضروف ، والتي تتجاور مع الجوبة (Lacuna) ، وخلايا الغضروف المجاورة .

central capsule — **المحفظة المركزية**

بنية تشاهد في العديد من الحيوانات الأوالي من عمارة (Super class) شعاعيات القدم مثل (Radiolarians) ، التي تدخل في القشرة النووية المركزية للهيولى ، والتي تحاط بغشاء مثقب للسماح بالتواصل مع الغشاء الخارجي (المغمدة) (Calymma) .

Crosby capsule — **كَبْسولَةُ كروُسْبي**

(للحصول على خَزْعَة معَويَّة)

أداة تستعمل للحصول على مادة معوية من أجل الخزعة . تتألف من محفظة اسطوانية تحوي سكيناً ذات رفاص (Spring) منشط ، وتثار بالمص (Suction) .

إلى جهاز سمعي عظمي .

adherent capsule — **محفظَةٌ مُلْتَصِقَة**

بنية التكسية التي لا تفترق بسهولة عن العضو أو المادة التي تحتويها .

adipose capsule — **مِحْفَظَةٌ شَحْميَّة**

محفظة مؤلفة من الدهن بدرجة كبيرة .

adrenal capsule — **المحْفَظَةُ الكُظْرِيَّة**

(=glandula suprarenalis TA) — (= الغُدَّةُ الكُظْرِيَّة)

انظر تحت glandula suprarenalis .

amalgam capsule — **مِحْفَظَةُ المُلْغَم**

محفظة حفظ مواد الحشوات السنية .

articular capsule — **مِحْفَظَةٌ مَفْصليَّة**

انظر تحت capsula articularis .

auditory capsule — **المحْفَظَةُ السَّمْعيَّة**

المحفظة الغضروفية عند الجنين التي تتطور إلى التيه العظمي في الأذن الداخلية .

bacterial capsule — **مِحْفَظَةٌ جُرْثوميَّة**

غلاف من الهلامة يحيط بالخلية الجرثومية ، عادة ما يكون من عديد السكاريد ، وأحياناً من عديد الببتيدات ، وهذا الغلاف يتصاحب مع فوعة الجرثوم الممرض .

biopsy capsule — **كَبْسولَةٌ خازِعَة**

جهيزة يمكن أن تمر إلى داخل الأمعاء بغرض تأمين نماذج من المخاطية للفحص المجهري .

Bonnet's capsule — **مِحْفَظَةُ بونيه**

(=vagina bulbi) — (=غِمْدُ المُقْلَة)

انظر تحت vagina bulbi .

Bowman's capsule — **مِحْفَظَةُ بومان**

(=capsula glomeruli) — (=مِحْفَظَةُ الكُبَيبَة)

محفظة غشائية رفيعة محاطة بغشاء ثنائي الطبقات ، وهذه المحفظة تحيط بكبيبة الكليون في الفقاريات .


brood capsules — **مَحافظ الحَضْن**

(=مِحْفَظَةُ الكيسَة العُداريَّة)

الارتسامات المحفظية للغشاء الداخلي للكيسات العدارية ، والتي تبزغ منها الرؤوس (Scoleces)

crystalline capsule **مَحْفَظَةُ البِلَّورَة**
(=capsula lentis) **(= مَحْفَظَةُ العَدَسَة)**
انظر تحت capsula lentis .

decavitamin capsule **كَبْسولَةُ الڤيتامينات العَشَرَة**
محفظة تحتوي على عشرة ڤيتامينات ، وتستخدم كمعيضات لعوز الڤيتامينات .



Capsule of heart (Pericardium) **التأمـور**

dental capsule **المحـفَظَةُ السِّنِّيـة**
(=periodontium TA) **(= دواعم السن)**
يراد بها دواعم السن (Periodontium) ، وهي النسج الرباطية التي تحيط بالسن ضمن السنخ وتثبته بشكل جيد .

enteric capsule **كَبْسولَةٌ معَوِيَّة**
المحفظة الدَوائيَة التي تستطيع المرور من المعدة دون أن تتأثر بالحمض المعدي وتنفتح ضمن الأمعاء ليتم امتصاص موادها الدوائية .

external capsule **المَحْفَظَةُ الظَّاهِرَةُ**
انظر تحت capsula externa .

extreme capsule **المَحْفَظَةُ القُصْوَى**
انظر تحت capsula extrema .

fatty capsule of kidney **مَحْفَظَةُ الكُلْيَة الدُّهْنِيَّة**
المحفظة الشحمية للكلية .
انظر تحت capsula adiposa renis .

fibrous articular capsule **مَحْفَظَةٌ مَفْصلِيَّةٌ لِيفيَّة**

fibrous capsule **محفظة ليفية**
انظر تحت capsula fibrosa .

fibrous capsule of corpora cavernosa of penis **المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ للجسْم الكَهْفيّ للقَضيب**
هي الغلالة البيضاء للجسم الكهفي .
انظر تحت tunica albuginea corporum cavernosorum .

fibrous capsule of graafian follicle **المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ لجُرَيب جراف**
الغلالة الظاهرة للقراب الجريبي .
انظر تحت tunica externa thecae folliculi .

fibrous capsule of kidney **المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ للكُلْيَة**
انظر تحت capsula fibrosa renis .

fibrous capsule of liver **المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ للكَبِد**
المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ حول الوعائية .

fibrous capsule of spleen **المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ للطِّحال**
انظر تحت capsula splenis .

fibrous capsule of testis **المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ للخُصْيَة**
هي الغلالة البيضاء في الخصية .
انظر تحت tunica albuginea testis .

fibrous capsule of thyroid gland **المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ للدَّرَق**
هي المحفظة الليفية للغدية الدرقية .
انظر تحت capsula fibrosa glandulae thyroideae .

formalized capsule **كَبْسولَةٌ مُعامَلَةٌ بالفُورْمالين**
في الكيمياء : معالجة المحفظة بالفورمالين أو الفورمول بقصد التثبيت والتطهير .

Gerota's capsule **مَحْفَظَةُ جيروتا**
(=fascia renalis) **(=اللُّفافَةُ الكُلْوِيَّةُ)**
اللُّفافَةُ الكُلْوِيَّة .

المحْفَظَةُ البَصَرِيَّة (في الجَنين) **optic capsule**
بنية مضغية ، والتي تتطور منها الصلبة العينية .

محْفَظَةُ الأُذُن (الدَّاخليَّة) **otic capsule**
عنصر هيكلي يشمَلَ آلية الأذن الداخلية في المضغة البشرية ، ويتطور كغضروف في عدة مراكز عظمية ويصبح عظماً كاملاً ومتكاملاً في الأسبوع الثالث والعشرين من عمر الجنين .

المحْفَظَةُ الحَوضيَّةُ البرُوستاتيِّة (=اللِّفافَةُ البرُوسْتاتيَّة) **pelvioprostatic capsule (=fasciae prostatae)**
انظر تحت fasciae prostatae .

المحْفَظَةُ حَولَ الكُلْيَة (=محْفَظَةُ الكُلْيَة الشَّحْميَّة) **perinephric capsule (=capsula adiposa renis)**
هي المحفظة الشحمية للكلية ، أو المحفظة الليفية للكلية .
انظر تحت capsula adiposa renis .
انظر تحت capsula fibrosa renis .

المحْفَظَةُ المُحيطَةُ بالأُذُن (في الجَنين) **periotic capsule**
نسيج يحيط بكيس الأذن عند الجنين .

المحفظة الدهنية حول الكلية **perirenal fat capsule**
انظر تحت capsula adipose renis .

المحفظة القطبية **polar capsule**
1 ـ إحدى الحويصلات ذي الجدار الثخين ، والتي تشاهد في بعض أبواغ الأوالي الحيوانية وتحتوي خيطاً قطبياً .
2 ـ قلنسوة .
انظر تحت cap .

كَبْسولَةٌ لاسلْكيَّة **radiotelemetering capsule**
راديو ناقل صَغير مغلف في كبسولة بحجم كبسولة الدواء الاعتيادي ، ويمكن بلعها أو غرزها بطريقة أخرى في الجسم كي تعطي معلومات حول حالة الضغط أو الحرارة أو الباهاء في عضو ما . وتسمى كذلك الحبة

محْفَظَةُ جليسون **Glisson's capsule**
1 ـ المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ حَولَ الوعائيَّة .
2 ـ المحْفَظَةُ الكَبَديَّةُ اللِّيفيَّة .
انظر تحت capsula fibrosa perivascularis .

محْفَظَةُ الكُبَيبَة **glomerular capsule**
انظر تحت capsula glomeruli .

المحْفَظَةُ الكَبَديَّةُ الصَّفْراويَّة (=المحْفَظَةُ اللِّيفيَّةُ حَولَ الوعائيَّة) **hepatobiliary capsule (=capsula fibrosa perivascularis)**

كَبْسولَةُ الڤيتامينات السِّتَّة **hexavitamin capsule**
محفظة دوائية تحتوي على ستة ڤيتامينات ، ويتم المعالجة بها كمعالجة معيضة للعوز الڤيتاميني بهذه الڤيتامينات .

المحْفَظَةُ الغائرَةُ **internal capsule**
انظر تحت capsula interna .

محْفَظَةٌ مَفْصليَّة **joint capsule (=capsula articularis)**
انظر تحت capsula articularis .

محْفَظَةُ العَدَسَة **lenticular capsule**
المحفظة المحيطة بعدسة العين .

محْفَظَةُ مالْبيجي (= محْفَظَةُ الكُبَيبَة) **malpighian capsule (=capsula glomeruli)**
هي محْفَظَةُ الكُبَيبَة .
انظر تحت capsula glomeruli .

محْفَظَةُ مُولِّر (=محْفَظَةُ الكُبَيبَة) **Muller capsule (=capsula glomeruli)**
انظر تحت capsula glomeruli .

محْفَظَةُ مولِّر ـ ماليبجي (=محْفَظَةُ الكُبَيبَة) **mullerian malpighian capsule (=capsula glomeruli)**
انظر تحت capsula glomeruli .

محْفَظَةٌ أَنْفيَّة **nasal capsule**

المحْفَظَةُ العَينيَّة (=غمْدُ المُقْلَة) **ocular capsule (=vagina bulbi)**
انظر تحت vagina bulbi .

المفصل أو محفظة العدسة ، ويسمى كذلك نزع المحفظة (Decapsulation) .

استئصال محفظة الكلية **renal capsulectomy**

نزع محفظة الكليَة

التهاب المحفظة **capsulitis**

التهاب في محفظة مثل ، محفظة العدسة أو المفصل أو الكبد أو التيه .

التهاب المحفظة اللاصق **adhesive capsulitis**

التهاب لاصق بين المحفظة المفصلية والغضروف المفصلي المحيطي في الكتف مع طمس الجراب تحت الدالية ، ومن أعراضه ألم بالكتف وبدايته المتدرجة ، مع زيادة الألم وبعد ذلك التيبس المفصلي وتحدد الحركة . ويسمى كذلك التهاب الجراب اللاصق (Adhesive bursitis) والكتف المتجمدة (Frozen sholder) .

التهاب محفظة الكبد **hepatic capsulitis**

اَلتهاب حوائط الكبَد (Perihepatitis)

محفظي عدسي **capsulolenticular**

متعلق بعدسة العين أو بمحفظتها .

ورم محفظي **capsuloma**

الورم الذي يصيب النسيج المحفظي .

رأب المحفظة **capsuloplasty**

عملية رأب لمحفظة المفصل .

رفو المحفظة **capsulorrhaphy**

خياطة المحفظة وبصفة خاصة المحفظة المفصلية .

تمزق المحفظة **capsulorrhexis**

صنع مزقة دائرية متصلة في المحفظة الأمامية أثناء جراحة الساد (Cataract) لتسمح بإظهار نواة العدسة أو استحلاب العدسة (Phacoemulsification) .

مبضع المحفظة (العدسية) **capsulotome**

أداة قاطعة تستعمل لقطع محافظ عدسة العين .

بضع المحفظة **capsulotomy**

عملية شق (بضع) محفظة ، كمحفظة العدسة أو الكلية أو المفصل .

بضع محفظة الكلية **renal capsulotomy**

شق (بضع) محفظة الكلية .

الراديوية (كبسولة القياس عن بعد لبيان الكميات الكهربية) .

محفظة الكلية **renal capsule**

انظر تحت capsula adiposa renis .

انظر تحت capsula fibrosa renis .

المحفظة المنوية **seminal capsule**

يراد بها مخزن النطاف وهي الحويصلة المنوية (Vesicula seminalis) التي تصب فيها محتويات البربخ والأسهر من نواتج الخصيتين من النطاف ، وتتقبض عند القذف .

المحفظة المصلية للطحال **serous capsule of spleen**

هي الغلالة المصلية الطحالية .

انظر تحت tunica serosa splenis .

الكظر **suprarenal capsule**

انظر تحت glandula suprarenalis .

محفظة زليلية **synovial capsule**

هي المحفظة المفصلية .

انظر تحت capsula articularis

كبسولة لاسلكية **telemetric capsule**

راديو ناقل صغير مغلف في كبسولة بحجم كبسولة الدواء الاعتيادي ، ويمكن بلعها أو غرزها بطريقة معينة في الجسم كي تعطي معلومات حول حالة الضغط أو الحرارة أو الباهاء في عضو ما . وتسمى كذلك الحبة الراديوية(كبسولة القياس عن بعد) .

محفظة تينون **Tenon's capsule**

(=غمد المقلة) **(=vagina bulbi)**

محفظة اللوزة **tonsillar capsule**

انظر تحت capsula tonsillaris .

كبسولات الفيتامين B الثلاثية **triasyn B capsules**

كبسولات تحتوي على الثيامين والريبوفلافين والنيكوتيناميد ، تستعمل كمكمل في علاج العوز الفيتاميني .

استئصال المحفظة **capsulectomy**

استئصال المحفظة ، وبصفة خاصة محفظة

captive insurance company — **شَركةُ تأمينٍ قابِضَة**

أحد أنماط شركات التأمين التي تفرض في نظامها دفع المشترك مبلغ معين من المال مقابل التأمين الصحي .

captodiame hydrochloride — **كابتوديام هيدروكلوريد**

انظر تحت captodiamine .

captodiamine — **كابْتودْيامين (دَواءٌ مُهدئ)**

كابتوديامين هيدروكلوريد ، وهو مهدئ ومرخ عضلي يستعمل كمهدئ . ويسمى أيضاً كابتوديام هيدروكلوريد .

captopril — **كابْتوبْريل (دَواءٌ خافِضٌ لِضَغْطِ الدَم)**

مثبط للإنزيم المحول للأنجيوتنسين والذي يستخدم في معالجة فرط ضغط الدم وفشل القلب الاحتقاني .

captor — **لاقِطة**

أداة اللقط أو الالتقاط والتحسس للإشارة ، أو الشخص الذي يقبض على شيء بالقوة أو كهدية .

capture — **1ـ لَقط 2ـ اِلتِقاط**

2ـ أن تمسك ، أو أن تسيطر على شيء ، أو أن تستولي على شيء .

2ـ التحام نواة ذرية مع جسيم دوين الذرة ، مما يسبب عادة كتلة لا مستقرة .

atrial capture — **التقاط أذيني**

زوال استقطاب الأذينات كاستجابة لمنبه في مكان ما بالقلب أو من ناظمة صناعية .

electron capture — **التقاط الإلكترون**

نوع من التلاشي المشع الذي تلتقط فيه النواة الإلكترون المداري مع إصدار النترينو (Neutrino) والأشعة المميزة .

ventricular capture — **الالتقاط البطيني**

زوال استقطاب البطينات كاستجابة لدفعة ناشئة إما من المنطقة فوق البطينية أو من ناظمة صناعية .

capuride — **كابُوريد**

استخدم سابقاً كمنوم .

caput TA (pl.capita) — **1ـ الرَّأسُ 2ـ رأس (ج:رؤوس)**

1ـ الرأس : النهاية العلوية للجسم ، والمتضمنة على القحف ، وتحتوي على المخ ، وأعضاء الحس المتخصصة وأول أعضاء الجهاز الهضمي (الفم) .

2ـ مصطلح عام للتعبير عن التوسع أو النهاية الرئيسية لعضو أو جزء .

caput angulare musculi quadrati labii superioris — **رأسُ زاويَة العَضَلَة الرُباعِيَّة الشَّفَويَّة العُلْويَّة**

(= العَضَلَةُ الرَّافعَةُ للشَّفَة العُلْويَّة وَجَناح الأَنْف)

انظر تحت musculus levator labii superioris alaeque nasi .

caput breve musculi bicipitis brachii TA — **الرَّأسُ القَصيرُ لذات الرَّأسَين العَضُديَّة**

ينشأ الرَّأسُ القَصيرُ لذات الرَّأسَين العَضُديَّة من قمة الناتئ الغرابي . ويسمى كذلك الرأس الإنسي لذات الرَّأسَين العَضُديَّة والرأس القصير للعضلة الغرابَية الكعبرية ، والغرابية الكعبرية .

caput breve musculi bicipitis femoris TA — **الرَّأسُ القَصيرُ لذات الرَّأسَين الفَخْذيَّة**

ينشأ الرَّأسُ القَصيرُ لذات الرَّأسَين الفَخْذيَّة من الخط الخشن الفخذي .

caput cornus dorsalis medullae spinalis TA — **رَأسُ القَرْن الظَّهْرانيِّ للنُّخاع**

caput cornus posterioris medullae spinalis TA — **رَأسُ القَرْن الخَلْفيِّ للنُّخاع**

القسم البيضوي أو مغزلي الشكل من القرن الظهراني للمادة السنجابية في الحبل النخاعي بين القسم المتضيق (العنق) وقمة القرن ، ويسمى كذلك الرأس القرني الظهراني النخاعي الشوكي ، أو رأس القرن الظهراني للنخاع الشوكي .

اللقيمة الأنسية لعظم العضد .

رَأسُ عَظْمِ العَضُد **caput humeri TA**

النهاية الدانية لعظم العضد التي تتمفصل مع الجوف الحقاني للكتف ، ويسمى كذلك الرأس العضدي .

الرَّأسُ العَضُديُّ الزَّنْدِيُّ للعَضَلَةِ السَّطْحِيَّةِ المُثْنِيَةِ للأَصابع **caput humero-ulnare musculi flexoris digitorum superficialis TA**

ينشأ الرَّأسُ العَضُديُّ الزَّنْدِيُّ لـلعضَلَة السَّطْحيَّة المُثْنِيَـة للأصابع مَن اللقيـمة الوحـشيـة لعظَمَ العَضَدَ ومن النّاتيء الإكليلاني للزند . ويسمى كذلك الرأس العضدي للعضلة السطحية المثنية للأصابع .

رَأسُ العَضَلَةِ تَحْتَ الحَجاجِيَّةِ المُرَبَّعَةِ للشَّفَةِ العُلْوِيَّةِ (=العَضَلَةُ الرَّافعةُ للشَّفَةِ العُلْوِيَّة) **caput infraorbitale musculi quadrati labii superioris (=musculus levator labii superioris)**

الرَّأسُ الوَحْشَيُّ لعَضَلَةِ السَّاق **caput laterale musculi gastrocnemii TA**

ينشأ الرَّأسُ الوَحْشيُّ لعَضَلَة السَّاق من اللقمة الوحشية والسطح الخلفي لعَظم الفخذ ، ومن محفظة مفصل الركبة ، ويسمى أيضاً (Lateral gastrocemius muscle) .

الرَّأسُ الوَحْشِيُّ لثُلاثِيَّةِ الرُّؤوسِ العَضُدِيَّة **caput laterale musculi tricipitis brachii TA**

ينشأ الرَّأسُ الوَحْشيُّ لثُلاثيَّة الرُّؤوس العَضُديَّة من السطح الخلفي لعظم العَضد ، ومن الحافة الوحشية لعظم العضد والحاجز الوحشي بين العضلات ، ويسمى كذلك الرأس الكبير ، أو الرأس الثاني لثُلاثيَّة الرُّؤوس العَضُديَّة ، ويسمى أيضاً العضَلة المرفقية القصيرة أو الوحشية (Lateral or short anconeus muscle).

رَأسُ الطِّحال **caput lienis**

النهاية الخلفية للطحال .

الرَّأسُ الطَّويلُ لذاتِ الرَّأسَيْنِ العَضُدِيَّة **caput longum musculi bicipitis brachii TA**

رَأسُ الضِّلْع **caput costae TA**

النهاية الخلفية للضلع التي تتمفصل مع جسم الفقرة ، ويسمى كذلك رؤيس الضلع .

الْتِواءُ الرَّأس **caput distortum**
(=صَعَر) **(=torticollis)**

حالة التواء الرأس باتجاه ناحية واحدة بشكل مستمر ، وغالباً ما تتصاحب مع تشنج عضلي مؤلم .

رَأسُ البَرْبَخ **caput epididymidis TA**

القسم العلوي من البربخ ، والذي يوجد فيه الوصلات المستقيمة والملفوفة للقنوات الصادرة عن الخصية ، ويسمى كذلك كرة البربخ الكبيرة (Globus major epididymidis) .

رَأسُ عَظْمِ الفَخذ **caput femoris TA**

القسم الرئيسي أو جدل عظم الفخذ .

رَأسُ الشَّظِيَّة **caput fibulae TA**

الطرف الداني للشظية ، ويسمى كذلك رؤيس الشظية (Capitulum costae) .

الأُكَيْمَةُ المَنَوِيَّة **caput gallinaginis (=colliculus seminalis TA)**

الأُكَيْمَةُ المَنَوِيَّة هي الجزء البارز للعرف الإحليلي ، وفيه فتحة القريبة البروستاتية وعلى الجانب الآخر هناك فوهات القنوات الدافقة .

رَأسُ عَظْمِ العَضُد **caput humerale**

انظر تحت capitulum hemeri .

الرَّأسُ العَضُدِيُّ للعَضَلَةِ الزَّنْدِيَّةِ المُثْنِيَةِ للرُّسْغ **caput humerale musculi flexoris carpi ulnaris TA**

ينشأ الرَّأسُ العَضُديُّ للعَضَلَة الزَّنْديَّة المُثْنيَة للرُّسْغ من اللقيمة الإنسيةَ لعظم العضد .

الرَّأسُ العَضُدِيُّ للعَضَلَةِ الصَّاعِدَةِ المُثْنِيَةِ للأَصابع **caput humerale musculi flexoris digitorum sublimis**

الرَّأسُ العَضُدِيُّ للعَضَلَةِ الكابَّةِ المُدَوَّرَة **caput humerale musculi pronatoris teretis TA**

ينشأ الرَّأسُ العَضُديُّ للعَضَلَة الكابَّة المُدَوَّرَة من

. or short head of triceps brachii muscle)

رأسُ المدوسَة **caput medusae**

(أوردَة سرية متوسعة حول سرة الوليد)

أوردة جلدية متوسعة حول السرة ، تشاهد بصفة رئيسية عند الولدان والمرضى الذين يعانون من تشمع الكبد ، وتسمى بهذا الاسم لأن الأوردة تشبه الغرغونة ، وهي إحدى أخوات ثلاث في الميثولوجيا الإغريقية ، ومكسوّات الرؤوس بالأفاعي بدلاً من الشعر . وتسمى المدوسة كذلك دوالي السرة (Cirsomphalos) .

الرأس السنعي **caput metacarpale**

انظر تحت caput ossis metacarpi .

الرأس المشطي **caput metatarsale**

انظر تحت caput ossis metatarsi .

رأسُ العَضَلَة **caput musculi TA**

نهاية العضلة والتي عندها ترتكز (تتصل) بالعظم ، أو بنية ثابتة أخرى (المنشأ) .

رأسٌ بشكْل الأَلْيَتَين **caput natiforme**

(في الرَّخَد)

الاسم القديم للرأس المربع (Caput quadratum)

رأسُ النَّواة المُذَنَّبَة **caput nuclei caudati TA**

القسم الأمامي والأكبر للنواة المذنبة الذي ينتفخ ضمن القرن الأمامي للبطين الوحشي .

الرَّأسُ المائل لُمَقَرِّبَة إبْهَام القَدَمَ **caput obliquum musculi adductoris hallucis TA**

ينشأ الرَّأسُ المائلُ لُمَقَرِّبَة إبْهام القَدَم من قواعد الأمشاط الثانيَ والثالثَ والرابع ، ومن غمد العضلة الشظوية الطويلة . ويسمى أيضاً الرأس الطويل أو الكبير للعضلة المقربة للإبهام .

الرَّأسُ المائلُ لُمَقَرِّبَة إبْهام اليَد **caput obliquum musculi adductoris pollicis TA**

ينشأ الرَّأسُ المائلُ لُمَقَرِّبَة إبْهَام اليَد من العظمين المنحرفي ، والرأسي الشكل ، ومن قاعدة العظم السنعي الثاني .

رأسُ عَظْم الفَخذ **caput ossis femoris TA**

ينشأ الرَّأسُ الطَّويلُ لذات الرَّأسَين العَضُديَّة من الحافة العلوية للجوف الحقاني ، ويسمى أيضاً الرباط داخل المفصل لمفصل العضد (Interticular ligament of articulation of humerus) .

الرَّأسُ الطَّويلُ لذات الرَّأسَين الفَخْذيَّة **caput longum musculi bicipitis femoris TA**

ينشأ الرَّأسُ الطَّويلُ لذات الرَّأسَين الفَخْذيَّة من الأحدوبة أو الحدبة الإسكية .

الرَّأسُ الطَّويلُ لثُلاثيَّة الرُّؤوس العَضُديَّة **caput longum musculi tricipitis brachii TA**

ينشأ الرَّأسُ الطَّويلُ لثُلاثيَّة الرُّؤوس العَضُديَّة من الحديبة تحت الجوف الحقاني للكتف . ويسمى أيضاً الرأس الأول أو الرأس الأوسط أو الرأس الكتفي لثُلاثيَّة الرُّؤوس العَضُديَّة .

رأسُ المطْرَقَة **caput mallei TA**

الجزء العلوي من المطرقة ، والذي يتضمن السطح (وجيه السندان) الذي يتمفصل مع السندان . ويسمى أيضاً رؤيس المطرقة (Capitulum mallei) .

رأسُ الفَكِّ السُّفْليّ **caput mandibulae TA**

السطح المفصليّ للناتئ شبه اللقمي للفك السفلي ، ويسمى أيضاً رأس الناتئ شبه اللقمي للفك السفلي .

الرَّأسُ الإنْسيّ لعَضَلَة السَّاق **caput mediale musculi gastrocnemii TA**

ينشأ الرَّأسُ الإنْسيُّ لعَضَلَة السَّاق من اللقمة الإنسية لعظم الفخذ ومحفظة مفصل الركبة ؛ وتسمى أيضا عضلة الساق الوحشية .

الرَّأسُ الإنْسيُّ لثُلاثيَّة الرُّؤوس العَضُديَّة **caput mediale musculi tricipitis brachii TA**

ينشأ الرَّأسُ الإنْسيُّ لثُلاثيَّة الرُّؤوس العَضُديَّة من السطح الخَلفي لعظم العضد تحت التلم الكعبري ، والحافة الإنسية لعظم العضد والحاجز الإنسي بين العضلات . ويسمى كذلك العضلة المرفقية الإنسية ، والرأس العميق أو الرأس القصير لثلاثية الرؤوس العضدية (Deep

كتلة قرصية تشكل النهاية اليمنى المتوسعة للبنكرياس الواقعة في ثنية الإثنا عشري .

حَشَفَةُ القَضيب **caput penis**
(=glans penis)

انظر تحت glans penis .

رأسُ سُلامَى **caput phalangis**
إصْبَع اليَد **digitorum manus TA**

النهايَة العظمية المفصلية لرأس أي سلامى من سلاميات اليد .

رأسُ سُلامَى **caput phalangis**
إصْبَع القَدَم **digitorum pedis TA**

الطرفَ المفصَلي القاصي لكل من مشطي القدم الأوسط والداني .

هو رأس عظم الفخذ كروي الشكل المتمفصل مع حق العظم الوركي مشكلاً المفصل الوركي الفخذي على شكل نموذج الكرة الحق .


رأسُ عَظْم **caput ossis**
السِّنْع **metacarpalis TA**

النهاية القاصية للعظم السنعي ، والتي تتمفصل مع القاعدة للإصبع الداني ، ويسمى أيضاً الرأس السنعي .

رأسُ عَظْم المِشْط **caput ossis metatarsalis TA**

الطرف القاصي لعظم المشط ، والتي تتمفصل مع القاعدة للإصبع . ويسمى كذلك الرأس المشطي .

رأسُ البَنْكرْياس **caput pancreatis TA**



Caput of Ossicula auditus رؤوس العظيمات السمعية

ينصهر مع الرأس الخلفي أوالمنعكس ويستمر للأسفل ضمن بطن العضلة ، ويسمى أيضاً الرأس الأمامي للعضلة المستقيمة الفخذية .

caput reflexum musculi recti femoris TA **الرأس المنعكس للعضلة المستقيمة الفخذية**

ينشأ الرأس المنعكس للعضلة المستقيمة الفخذية من التلم فوق حافة الحق ، والذي ينصهر مع الرأس المستقيم أوالرأس الأمامي ويستمر للأسفل ضمن بطن العضلة ، ويسمى أيضاً الرأس الخلفي للعضلة المستقيمة الفخذية .

caput stapedis TA **رأسُ الرِّكاب**

الجزء الذي يتمفصل مع السندان ، ويسمى كذلك الرؤيس الركابي (Capitulum stapedis) .

caput succedaneum **الحَدَبَةُ المَصْلِيَّةُ الدَّمَوِيَّة**

(وذمة في فَروة رأسَ الوليد)

وذمة تحدث في فروة الجنين وتحتها أثناء الولادة .

caput tali TA **رأسُ الكاحل**

النهاية الأمامية المدورة للكاحل .

caput transversum musculi adductoris hallucis TA **الرَّأسُ المُسْتَعْرِضُ لمُقَرِّبَة إبْهام القَدَم**

ينشأ الرَّأسُ المُسْتَعْرِضُ لعضلة مُقَرِّبَة إبْهام القدم من المفصل المشطي السلامى الثالث والرابع والخامس لأصابع القدم .

caput transversum musculiadductoris pollicis TA **الرَّأسُ المُسْتَعْرِضُ لمُقَرِّبَة إبْهام اليَد**

ينشأ الرأس المستعرض لمقربة إبهام اليد من الثلثين الخلفيين للسطح الأمامي من عظم السنع .

caput ulnae TA **رأسُ الزَّنْد**

السطح المفصلي للطرف القاصي للزند ، ويسمى كذلك الرؤيس الزندي (Capitulum ulnae) .

caput phalangis manus **الرأس السلامي لأصابع اليد**

(=head of phalanx of hand)

السطح المفصلي القاصي لكل من السلاميات الدانية والوسطى لأصابع اليد .

caput phalangis pedis **الرأس السلامي لأصابع القدم**

(=head of phalanx of foot)

الطرف المفصلي القاصي لكل من السلاميات الدانية والوسطى لأصابع القدم .

caput planum **رأسٌ مُسَطَّح**

الرأس المسطح ، والذي يحدث في التهاب العظم والغضروف المشوه اليفعي .

caput progeneum **فَقَم**

(=prognathism)

انظر تحت prognathism .

caput quadratum **رأسٌ مُرَبَّع (في الرَّخَد)**

تشوه في الرأس يشاهد في الرخد حيث تتكون النواتئ في العظم الجبهي والعظمين الجداريين مكونة ارتفاعات مفصولة بانخفاضات تشير إلى خطوط الدروز القحفية (Cranial sutures) .

caput radiale musculi flexoris digitorum superficialis TA **الرَّأسُ الكُعْبُرِيُّ لمُثْنِيَة الأصابع السَّطْحِيَّة**

ينشأ الرَّأسُ الكُعْبُرِيُّ لمُثْنيَة الأصابع السَّطْحيَّة من الخط المائل والحَافَة الأمَامِية لعظَمِ الكعبرة .

caput radii TA **رأسُ الكُعْبُرَة**

القرص على النهاية الدانية للكعبرة ، والتي تتمفصل مع رؤيس عظم العضد والثلمة الكعبرية لعظم الزند ، ويسمى أيضاً الرؤيس الكعبري ، والرأس الكعبري (Caput radiale) .

انظر تحت caput radiale .

caput rectum musculi recti femoris TA **الرأس المستقيم للعضلة المستقيمة الفخذية**

ينشأ الرأس المستقيمة للعضلة المستقيمة الفخذية من الشوكة الحرقفية الأمامية السفلية ، والذي

للكولينيات . يستعمل كمضاد للسعال ، ويعطى فموياً .

هيدرو كلوريد الكارامفين **caramiphen hydrochloride**

هو استر للكارامفين ، لقاعدته آثار مناهضة للكولينيات ، يستعمل بصفة رئيسية لمعالجة داء باركنسون ، ويعطى فموياً .

قيراط **carat**

1ـ مقياس لدقة الذهب ، يتكون الذهب الصافي من 24 قيراطاً .

2ـ وحدة وزن الأحجار الكريمة ، يتكون من 205.5 ملجرام ، أو ثلاثة وسدس حبات ترويسية .

الدَّاءُ العُلَّيقِيُّ **Carate (=pinta)**

ويسمى الداء البقعي والعليقي (Pinta) ، وهو مرض جلدي ينتشر في المناطق الأمريكية المدارية ويبدو أنه خاص بإصابة العرق الأسود . وعامله المسبب الملتويات ، واللولبية البقعية (Treponema carateum) .

كَراويا **caraway**

(الثمار المجففة لنبات يستعمل في تطييب الطعام)

1ـ كاروم كارفي (Carum carvi) .

2ـ الفاكهة الناضجة المجففة للكاروم كارفي ؛ الميركارباس السمراء لها طعم و رائحة عطريان أروماتيان ، وتستعمل كعامل منكّه .

كارباسيفيم **carbacephem**

أي من صنف المضادات الحيوية البيتا لاكتام (β- Lactam) الشديدة القرابة إلى السيفالوسبورين (Cephalosporins) ، لها مجموعة ميثيلينية تعوض عن ذرة الكبريت في نواة الحمض 7- أمينوسيفالوسبورانيك ، الكارباسيفيم من الناحية الكيميائية أشد ثباتاً من السيفالوسبورين .

كَرْباكول (مادة ناهِضَة للكولينيَّات) **carbachol**

ناهضة كولينية الفعل ، وهو كلوريد الكارباميل كولين الذي لا يهدرج بوساطة الأسيتيل كولين

الرَّأسُ الزَّنْديُّ للعَضَلَة الزَّنْديَّة المُثْنِيَة للرُّسْغ **caput ulnare musculi flexoris carpi ulnaris TA**

ينشأ الرَّأسُ الزَّنْديُّ للعَضَلَة الزَّنْديَّة المُثْنِيَة للرُّسُغ من الزج (Olecranon) ، والقَسم المجَاور للَزند .

الرَّأسُ الزَّنْديُّ للكَابَّة المُدَوَّرَة **caput ulnare musculi pronatoris teretis TA**

ينشأ الرَّأسُ الزَّنْديُّ للكَابَّة المُدَوَّرَة من الناتئ الإكليلاني للزندَ ، ويسمَى كذلك الرأس الإكليلاني للعضلة الكابة المدورة .

الرَّأسُ الوَجْنيُّ لرافعَة الشَّفَة العُلْيا **caput zygomaticum musculi quadrati labii superioris**

الرَّأسَ الوجنيَ للعضلة المربعة للشفة العلوية ، والعضلة الوجنية الصغيرة (Musculus Zygomaticus minor) .

شرفة كارابيلي (علامة، حديبة) **Carabelli cusp (sing, tubercle)**

[شرفة أو علامة منسوبة للطبيب جورج كارابيلي (Georg Carabelli) ، وهو طبيب أسنان هنغاري عاش في فيينا ، مابين 1787-1842] .

انظر تحت cusp .

الكارافات **Carafate**

الاسم التجاري لمستحضر السوكرالفات (Sucralfate) .

كاراميل (سُكَّر مُحَروق) **caramel**

محلول مركز ينتج من تسخين السكر أو الجلوكوز ، حتى زوال الطعم الحلو ، وإنتاج كتلة بنية قاتمة متجانسة . يستعمل كعامل ملون في الصيدلة والأغذية .

كارامْفين **caramiphen**

(دواءٌ مناهض للكولينيات)

مناهض للكولينيات وله مفعول مشابه للأتروبين ولكنه أضعف منه .

إيديسيلات الكارامفين **caramiphen edisylate**

هو إيثان ثنائي سلفونات الكارامفين ، وهو استر للكارامفين ، للقاعدة منه آثار مناهضة

(Carbhemoglobin) ، والكاربوهيموجلوبين (Carbohemoglobin) .

كرباموبل **carbamoyl**

الجذر الأسيلي لحمض الكرباميك . ويسمى أيضا كرباميل .

الكرباموبل أسبارتات **carbamoylaspartate**

أسبارتات مرتبطة بالنهاية الأمينية لجزء الكرباموبل ، وهو المركب الوسطي من التخليق البيولوجي للبيريميدين .

الكرباموبلة **carbamoylation**

نقل جزء من الكرباموبل إلى مجموعة الأمينو لمركب متقبل (متلقي) (Acceptor) .

مخلقة فسفات الكاربامويل (الأمونيا) **carbamoyl-phosphate synthase (ammonia)**

إنزيم من صنف الليجاز (إنزيم رابط) ، والذي يحفز تخليق فسفات الكرباموبل من الأمونيا وثنائي أكسيد الكربون ، وهي الخطوة الملتزمة الأولى في حلقة اليوريا ، يحدث التفاعل بصفة سائدة في المتقدرات الكبدية ، ويتطلب N- أسيتيل جلوتامات كعامل مساعد ، وحلمهة جزيئين من ثلاثي فسفات الأدينوزين (ATP) ، ونقص الفعالية الإنزيمية وهي خلة صبغية جسدية متنحية تسبب عوز مخلقة فسفات الكرباموبل .

مخلقة فسفات الكرباموبل (حلمهة-الجلوتامين) **carbamoyl-phosphate synthase (glutamine-hydrolyzing)**

نشاط إنزيمي للبروتين الثلاثي الوظائف (CAD) ، وهو ليجاز (الإنزيم الرابط) الذي يحفز تشكيل فسفات الكرباموبل كخطوة أولى للتخليق البيولوجي للبيريميدين النيوكليوتيدي ، الجلوتامين العصاري الخلوي معط للنتروجين في هذا التفاعل ، ويتثبط بوساطة (UTP) .

مُخلقة فسْفات الكَرْبامُويل (إنزيم) **carbamoyl phosphate synthetase**

إستيراز أو الكولين إستيراز الكاذبة ، يستعمل كمقبض للحدقة وخافض للضغط ضمن مقلة العين في معالجة الزرق ومتابعة جراحة الساد .

كَرْبادُوكس (دَواءٌ بيطري) **carbadox**

مضاد جراثيمي يستعمل في الطب البيطري .

الكاربامات **carbamate**

1 ـ أي استر لحمض الكارباميك .

2 ـ أي مجموعة من مبيدات الحشرات ومبيدات الطفيليات التي تفعل كمثبطة للكولينستيراز ، والتعرض الشديد لبعضها قد يسبب التسمم الكارباماتي عند البشر أو الدواجن .

كَرْبامازيبين (دَواءٌ مُضادٌ لِلاخْتِلاجِ ومُسَكِّن) **carbamazepine**

مضاد الاختلاج ، ومضاد الألم العصبي ، يستعمل لمعالجة الألم المصاحب «لألم العصب الثلاثي التوائم» ، وفي معالجة تظاهرات الصرع من النوبات التوترية الرمعية ، والنوبات الجزئية ، ويعطى فموياً .

الحمض الكربامي **carbamic acid**

مركب ، (H_2NCOOH) ، يوجد فقط بشكل أملاح أو أسترات (كاربامات) أو أميدات (كارباميدات) ومشتقات مختلفة . [الكاربامويل هو جذوره الأسيلية H_2NCO] .

البيروكسيد الكربامي **carbamic peroxide**

مركب متساوي الجزيئات من اليوريا وبيروكسيد الهيدروجين ، يستعمل موضعياً كعامل ملين للصملاخ (Cerumen) وكمنظف ومطهر سني ، وكعامل مبيض ، وكمضاد للالتهاب .

كَرْباميد (= اليوريا) **carbamide (=urea)**

انظر تحت urea .

كَرْبامينُوهيمُوجلوبين **carbaminohemoglobin**

توليفة كيميائية من ثنائي أكسيد الكربون والهيموجلوبين (CO_2HHB) ، وهوأحد الأشكال التي يوجد فيها ثنائي أكسيد الكربون في الدم ، ويسمى كذلك الكاربهيموجلوبين

1 ـ مُخَلِّقَةُ فُسْفات الكَرْباموْيل (الأمونيا) ويرمز لها (CPS I) .
2 ـ مُخَلِّقَةُ فُسْفات الكَرْباموْيل (محلمهة الجلوتامين) يرمز لها (CPS II) .

carbamoyl phosphate synthetase deficiency — **عَوَزُ مُخَلِّقَةِ فُسْفات الكَرْباموْيل**

اعتلال حمضميني وراثي جيني ناجم عن عوزُ مُخَلِّقَة فُسْفات الكَرْبامُويل (الأمونيا) ، ويتميز بأعراضَ تتضمَن فرط أمونيا الدم الواضح من دون بيلة حمض الأوروتيك ، وعدم تحمل البروتين ، واضطرابات عصبية ، ربما تظهر الأعراض عند الولدان أو تظهر فيما بعد عند الرضع ، ولها درجات متفاوتة في الوخامة ، وتكتب أيضاً عوز (CPS I) .

carbamoyltransferase — **ناقِلَة الكَرْباموْيل (إنزيم)**

مصطلح يستعمل في تسمية بعض الإنزيمات تحت تحت صنف ناقلَةُ الكَرْبامْويل و ناقلة الكربوكسيل لتظهر أنها تحفز وتنقل مجموعة الكربامويل من المركب المعطي إلى المركب المتلقي ، وتسمى كذلك ناقلة الكربامويلاز .

carbamyl (=carbamoyl) — **كربامِيل (= كَرْباموْيل)**

انظر تحت carbamoyl .

carbamylation — **تجزئة الكربامِيلة**

انظر تحت carbamoylation .

carbamylcholine chloride — **كلوريد الكربامِيل كولين**

انظر تحت carbachol .

carbantel — **كارْبانْتيل**

دَواءٌ مُضادٌّ للدِّيدان .

carbaril — **كاربارِيل**

مركب للكربامات له نشاط مثبط للكولنيستراز ، يستعمل كمبيد حشري ومبيد للطفيليات في شكل الشامبو والدهون (Lotions) للبشر والحيوانات المنزلية . يمكن أن يسبب التعرض المفرط تسمماً خفيفاً بالكارابامات . ويسمى كذلك الكرباريل .

carbarsone — **كَرْبارْسون (دَواءٌ لِداءِ المُشَعَّرات)**

مركب زرنيخي عضوي خماسي التكافؤ يستعمل كمضاد أميبي في معالجة داء الأميبات المعوي ، يعطى فموياً أو بحقنة شرجية احتباسية ، ولقد حلت مكانه بصفة واسعة عوامل أخرى بسبب سميته .

carbaryl — **كَرْبارِيل (مُبيدٌ لِلحَشَراتِ والطُّفَيلِيَّات)**

انظر تحت carbaril .

carbaspirin — **كَرْباسْبيرين**

دَواءٌ مُسكِّنٌ وَمُضادٌّ للحُمَّى .

carbazide — **كَرْبازيد (كيمياء)**

مشتق من اليوريا ، وهو ثنائي كربوهيدرازيد $[CO (NHNH_2)_2]$ ، وفيه تبدل مجموعتا الأميد في اليوريا بالثمالات الهيدرازينية .

carbazochrome — **كَرْبازُوكْرومْ (دَواءٌ مُرْقِئ)**

منه كَرْبازُوكْرُومْ ساليسيلات ، وهومعقد من الأدرينوكروم مع شبيه الأحادي الكربازون مع ساليسيلات الصوديوم ، والذي يستعمل كمرقئ لمكافحة النزف الشعيري ولمنع النفوذية الشعيرية ، يعطى فموياً وحقناً عضلياً .

carbazocine — **كَرْبازوسِين**

دَواءٌ مُسكِّن .

carbazotate — **كربازوتات**

أي ملح لحمض البكريك ؛ أي البيكرات .

Carbcaine — **الكرباكايين**

الاسم التجاري لمستحضر هيدروكلوريد ميبيفاكايين .

carbenicillin — **كَرْبَنيسِيلين (مُضادٌّ حَيَوِيّ)**

بنسلين جزئي التخليق ، فعال ضد الجراثيم السلبية الجرام والإيجابية الجرام ، مثل الذراري الحساسة من الزوائفة الزنجارية ، وأجناس من المتقلبة لإيجابية الإيندول ، وعدة ذراري من الإشريكية القولونية ، والمستدمية النزلية ، وتثبط كذلك نمو بعض المراضات لإيجابية الجرام ، ويسمى أيضاً كارفيسللين (Carfecillin) .

carbencillin disodium — **كربنيسيلّين ثنائي الصوديوم**

كارْبيثيل **carbethyl**

دَواءٌ مُسكِّن .

كَرْبهيمُوجلوبين **carbhemoglobin**

انظر تحت carbaminohemoglobin .

كَرْبيد (كيمياء) **carbide**

مركب الكربون بالاتحاد مع عنصر أو جذر .

كربيد فلزي (معدني) **metallic carbide**

مركب كربوني مع معدن انتقالي ، كما في (Fe3C) حيث يميز عن ملح مشابه للكربيد مثل (CaC2) .

كَرْبيدُوبا (دَواءٌ مُضادٌ لِلبارْكِنْسُونيَّة) **carbidopa**

مثبط لنزع الكربوكسيل من الليفودوبا المستطرف إلى الدوبامين ، والذى لا يدخل إلى الجهاز العصبي المركزي . وعندما يعطى مع الليفودوبا ، فإن الكربيدوبا ينتج تركيزات دماغية أعلى من الدوبامين بجرعات أقل من الليفودوبا ، ولذا فإنه ينقص التأثيرات الجانبية والتي تشاهد مع الجرعات الأعلى . يستعمل فموياً بالتزامن مع الليفودوبا كعامل مضاد للباركنسونية ، ويستعمل في معالجة متلازمة ليش ـ نيهان (Lesch-Nyhan syndrome) ومتلازمة جيل دو لا توريت (Gilles de la Tourette syndrome) .

كَرْبيمازول (دَواءٌ لِفَرْط الدَّرَقيَّة) **carbimazole**

مثبط لتخليق الهرمون الدرقي ، يعطى فموياً في معالجة فرط الدرقية .

كَرْبينول (كيمياء) **carbinol**

1 ـ ميثانول .

2 ـ كحول أروماتى (عطرى) أو دهنى يتكون من استبدال واحد ، أو اثنين ، أو ثلاثة من المجموعات الهيدروكربونية بالهيدروجين في الميثانول .

أسيتيل ميثيل الكربينول **acetylmethyl carbinol**

مصاوغ كيتوني للألدول (قاعدة ألدهيدية) $(CH_3.CHOH.CO.CH_3)$ ، ويتكون من الجلوكوز (سكر العنب) بواسطة جراثيم معينة

ملح الكربنسيلين ثنائي الصوديوم ، له نشاط القاعدة نفسها ، يعطى حقناً عضلياً أو وريدياً في العداوى الجهازية الوخيمة وإنتان الدم ، وعدوى المسالك البولية التناسلية ، والعدوى البولية ، والعداوى التنفسية الحادة والمزمنة ، وعداوى الأنسجة الرخوة .

كربنيسلّين إيندانيل صوديوم **carbenicillin indanyl sodium**

ملح الصوديوم من إستر إيندانيل الكربينسيلّين ثنائي الصوديوم ، له أفعال القاعدة نفسها ، يعطى فموياً لمعالجة العداوى العلوية والسفلية في المسالك البولية الناجمة عن الذراري الحساسة ، من أنواع الزوائفة ، وأنواع المتقلبة ، والإشريكية القولونية ، والأمعائية ، والمكورة المعوية . ويسمى كذلك كرينداسيلّين الصوديوم (Carindacillin sodium) .

كَرْبَنيسلِّين فينيل صوديَوم **carbenicillin phenyl sodium**

ملح الصوديوم من إستر كَرْبَنيسلِّين ثنائي الصوديوم ، الذي يستعمل لنفَس غايات كَرْبَنيسلِّين إيندانيل صوديوم ، ويسمى كذلك كرفيسلّين الصوديوم (Carfecillin sodium) .

كَرْبَنيسلِّين بوتاسيوم **carbenicillin potassium**

ملح البوتاسيوم للكربنيسلّين .

كَرْبَنيسلِّين صوديوم **carbenicillin sodium**

انظر تحت carbencillin disodium .

كَرْبينوكسُولون (دَواءٌ للقرْحَة) **carbenoxolone**

كَرْبينُوكْسُولُون الصوديوم ، هو مشتق من خلاصة العرقسوس له مفعول واضح مضاد للالتهاب ونشاط مشابه لـلألدوستيرون ، يستعمل في معالجة القرحة المعدية .

كربيتابنتين (دَواءٌ مُضادٌ لِلسُّعال) **carbetapentane**

عامل مضاد للسعال له نشاط خفيف مضاد للإفراز مشابه للأتروبين ، يستعمل في معالجة السعال المصاحب لعدوى السبل التنفسية العلوية ، يعطى فموياً ، ويتوفر في شكل ستيرات الكربيتابنتين ، وتانات الكربيتابنتين .

عـامل حـال للمـيـوسين ، يعطى فـمـوياً وبالاستنشاق في معالجة الاضطرابات التنفسية التي تتصف بالإنتاج المفرط للمخاط اللزج .

carbodiimide **فحم ثنائي الإيميد**

مـشـتق من اليـوريا ، وهو مـركـب صـيـغـتـه (NH:C:NH) .

carbogaseous **مُشَبَّعٌ بثنائي أكسيد الكَرْبون**

مشحون بغاز ثنائي أكسيد الكربون .

carbogen **كَرْبُوجين**

(مَزيجُ الأكسِجين وَثنائي أكسيدِ الكَرْبون)

مـزيج من الأكـسـجين ثنائي أكـسـيـد الكربون (5٪) .

carbohemia **فَرْطُ ثنائي أكسيد الكَرْبون في الدَّم**

زيادة عيـار غاز ثنائي أكسيـد الكربون في الدم عن مـقـادير ضـغطه الجـزئي في الدم الشـرياني عادة . ويسمى أيضاً (Carbonemia) .

carbohemoglobin **كربوهيموجلوبين**

(=carbamino-hemoglobin) **(=كَرْبامينوهيمُوجلوبين)**

انظر تحت carbaminohemoglobin .

carbohydrase **كَرْبُوهيدْراز (إنزيم)**

اسم قـليل الاسـتـعـمـال في الـوقت الحـاضـر للإنـزيمات التي تـعـمل علـى إمـاهة السكـريات (الكربوهيدرات) .

carbohydrate **الكَرْبوهيدْرات؛ السُّكَّرِيَّات**

أي صنف من الألدهيدات أوالكيتونات المشتقة من الكحولات متعددة الهيـدروكسيل ، وبصفة خـاصـة خمـاسيـة الهيـدروكـسيل والكحـولات السـداسية . وسـميت كذلك لأن الـهيـدروجين والأكسجين عادة ما يوجدان بالنسبة التي تشكل المـاء (نسـبـة تواجـدهـمـا في المـاء) Cn(H2O)n ؛ أهـم مـا تـشمله السكريات الصـغيـرة والنشـويات الكبيرة (الجليكوجين ، والسلولوز والصمغ) .

reserve carbohydrates **الكربوهيدرات المدخرة (الاحتياطية)**

التي تكتشف في مزرعة المرق للجراثيم بتفاعل فوجس ـ بروسكاور (يستخدم لتمييز الجراثيم الأمعائية عن غيرها) .

dimethyl carbinol **ثنائي ميثيل الكاربينول**

الكحول الإيزوبروبيلي .

carbinoxamine **كَرْبينُوكسامين**

(دَواءٌ مُضادٌ لِلهِستامين)

مشتق إيثانولاميني له خصائص مهدئة ومضادة للموسكارين ومضادة للهيستامين H_1 .

carbinoxamine maleate **كَـرْبينُو كْـسـامين ماليات**

ملح مـاليـات الكَرْبينُوكْسامين ، يسـتـعـمل كمضاد هيستاميني ، ويعطى فموياً .

Carbo **فحْم**

(=charcoal)

هو كربون محضر بالاحتراق غير الكامل .

انظر تحت charcoal .

carbo activatus **فَحْمٌ مُنَشَّط**

انظر تحت activated charcoal .

carbo animalis **فَحْمٌ حَيَوانيّ**

نوع مـحـضـر من العظام والمواد الحـيـوانـيـة ، ويستخدم كعامل مزيل للون .

carbo animalis purificatus **فَحْمٌ حَيَوانيٌّ مُنَقَّى**

carbo lingi **فَحْمٌ خَشَبَيّ**

هـو الفحَـم الـذي نحصـل عليـه مـن الخشـب كـمـصـدر نبـاتـي علـى خـلاف الـفـحـم الحجري .

Carbocaine **كربوكاين**

الاسم التـجـارى لمسـتـحـضـر هيـدروكـلوريد ميبفاكايين (بنج موضعي) .

carbocholine **كربوكولين**

انظر تحت carbachol .

carbocyclic **كَرْبُونِيٌّ حلَقِيّ (كيمياء)**

له أو مـرتبـط بسلسلة مغـلقـة أو تشكيل حـلقـة ، والتي تتضـمن ذرات الكـربون فقط . تقـال في المركبات الكيميائية .

carbocysteine **كَرْبُوسِيستَيْين (دَواءٌ حالٌّ لِلبَلغَم)**

كـربوهيـدرات ممكن تخـزينهـا في النبـات أو الحـيـوان في شكل أوزان جـزيئـيـة عـاليـة ، ومـركـبـات ممكن حلمـهـتـهـا مـثل النـشـا أو الجليكوجين .

بيلة سُكَّريَّة ؛ بيلة كَرْبوهيدْراتيَّة **carbohydraturia**

زيد الكربوهيدرات في البول .

مُولِّدُ السُكَّريَّات **carbohydrogenic**

منتج للسكريات .

1 ـ يُكَرْبِل **carbolate**

2 ـ فينولاتٌ

1 ـ يعامل بالفينول .

2 ـ أن تشحن بحمض الكربوليك .

كَرْبولُ فوكسين (مُلوِّنٌ للجَراثيم) **carbolfuchsin**

انظر تحت stains methods .

حَمْضُ الكَرْبُوليك **carbolic acid**

(=الفينُول) **(=phenol)**

اسم متداول للفينول . (يقال اسم متداول في التـسـمـيـة الكيـمـيـائيـة عندما لا يتـوافق مع التركيب) .

تَسَمُّمٌ فينوليّ **carbolism**

(=phenol poisoning)

انظر تحت phenol poisoning .

يُعالِجُ بالفينول **carbolize**

بيلة فينوليَّة **carboluria**

وجود الفينول في البول .

كَرْبُول زايلين **carbolxylene**

مـزيج مكون من جـزء واحـد من حـامض الكَرْبُوليك مع ثلاثة أجـــزاء من الزَايلين ، يستعمل كوسط مروق للمقاطع المجهرية .

كَرْبُومِير (عامِلٌ مُسْتَحْلِب) **carbomer**

بلمـر (مكثـور) حـمض الأكـريليك ، والمرتبط بالتصـالب مع عامل متعدد الوظيفة . يستعمل كـعـامل اسـتـحـلابي ، وكـعـامل مـعلِّق في المستحضرات الصيدلانية .

الكَرْبون (العنصر السادس) **carbon**

1 ـ عنصـر رباعي لامـعدني يـوجد بشكل نقي تمامـاً في الماس ، ونقـيـاً تقـريبـاً في الفـحـم ، والجـرافيت والأنتـراسـيت ، رمـزه C ؛ عدده الذري 6 ، وزنه الذري 12.011 . النظيـــرين المستقرين الموجودين بصفة طبيعية هما : ^{12}C (98.89٪) ، و^{13}C (1.11٪) .

2 ـ مـسرى كـهـربي يصنع من فـحم الصـدف (المحار) والذي يضمن الأدوية فيه .

الكربون 11 **carbon 11**

النظيـر المشع لـلكربون ، كـتلتـه الذرية (11) ، العمر النصفي (20.39 دقيقة) ، يتلاشى بواسطة انبعاث البـوزيترون ، وبطاقة (0.961 ميجا ڤولط إلكتروني) ، ويسـتـعـمل كـقـائفة (Tracer) في التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني .

الكربون 14 **carbon14**

نظير مـشع للكربون ، الكتلة الذرية 14 ، والعمر النصفي (5730 سنة) ، يتلاشى بواسطة انبعاث أشعة بيتا بطاقة (0.156 ميجا ڤولط إلكتروني) ، ويسـتـعـمل كـقـائفـة في السـرطان والبـحـث الاستقلابي .

ثنائي أُكْسيد الكَرْبُون **carbon dioxide**

1 ـ غاز لا لَون له ولا رائحة ، رمزه CO_2 ، ينشأ من أكسدة الكربون ، يتشكل في النسج ويطرح بواسطة الرئتين ، يسـاعد ثنائي أكسيد الكربون والكربـونات في المحـافظة على التـعـادليـة في أنسجة البدن وسوائله . يستعمل ثنائي أكسيد الكربون الصلـب (ثلج ثنائي أكسيد الكربون ، الجليد الجاف) كمحدث للخشارة (Escharotic) ولتخريب عدة آفات جلدية .

2 ـ يسـتـعـمل اسـتنشـاقـاً كـمنبـه للتنفس في مسـتـحـضـر لا يقل فـيـه تركـيـز ثنائي أكسـيـد الكربون عن نسبة(99٪) من الحجم .

ثنائي سلفيد الكربون **carbon disulfide**

سـائل سـام لالون له قابل للاشتعـال ، (CS_2) ، يستعمل كمذيب ، وكحافظ للفواكه ، ولغايات صناعية مختلفة ، الاستنشاق المفرط لدخانه يسبب التسمم بثنائي سلفيد الكربون .

أحادي أكسيد الكربون **carbon monoxide**

غـاز سـام لالـون له ، رمـزه (CO) ، يتـشـكل

كَرْبونات **carbonate**

أي ملح لحمض الكربونيك .

كربونات نازعة الماء **carbonate dehydratase**

(إنزيم)

إنزيم من صنف اللياز ، والذي يحفز الموازنة بين ثنائي أكسيد الكربون المذاب وحمض الكربونيك ، وهو الذي يعجل حركة ثنائي أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الدم ثم إلى الهواء السنخي ، كما إنه بروتين يحتوي على زنك يوجد في خلايا النبيب الكلوي وخلايا الدم الحمراء .ويسمى أيضاً الأنهيداز الكربونية .

فَرْطُ ثنائي أكسيد الكَرْبون في الدَّم **carbonemia**

انظر تحت carbohemia .

حَمْضُ الكَرْبُونيك **carbonic acid**

تركيبه الكيميائي (H_2CO_3) ، التي توجد في الموازنة الكيميائية مع ثنائي أكسيد الكربون المذاب في الماء . والأشكال المفككة (المتفارقة) هي الكربونات الثنائية (HCO_3) ، وأيونات الكربونات (CO_3^{2-}) ، والأنواع السائدة في الدم هي (HCO_3) وثنائي أكسيد الكربون الذائب بنسبة تقريبية هي (1/20) يُحفز تحول ثنائي أكسيد الكربون إلى حمض الكربونيك بواسطة إنزيم الأنهيداز الكربونية .

الأنهيداز الكربونية **carbonic anhydrase**

كربونات نازعة الماء (Carbonate dehydratase) .

1ـ فَحُّمٌ **carbonization**

2ـ تفحيم

التفحم تعني التحويل إلى كربون أو فحم ، أو وضع طبقة من الكربون على سطح ورقة للاستفادة منها في كتابة عدة نسخ من الكتابة الأولى (الطباعة) .

يُفحم **carbonize**

أن يفحم أو أو ينقلب إلى الفحم .

بيلة كَرْبونيَّة **carbonuria**

وجود ثنائي أكسيد الكربون ، أو مركبات الكربون الأخرى في البول .

باحتراق الكربون أو الوقود العضوي مع إمداد ضئيل من الأكسجين ، يسبب الاختناق الناجم بالاتحاد اللاعكوس مع هيموجلوبين الدم .

أُحاديُّ أُكْسيد الكَرْبُون 11 **carbon monoxide C11**

أحاديُّ أُكْسيد الكَرْبُون ، والذي فيه جزء من جزيئاته موسومة ^{11}C ؛ يستعمل في وسم كريات الدم الحمراء لقياس حجم الدم .

أوكسي سلفيد الكربون **carbon oxysulfide**

غاز لالون له ، رمزه (COS) ، بالاتحاد مع الهواء يشكل مزيجاً متفجراً .

فولاذٌ كَرْبونيّ **carbon steel**

معدن الفولاذ والذي نحصل عليه بإضافة الكربون للحديد .



CO_2 Cycle دورة ثنائي أكسيد الكربون

رباعي كلوريد الكَرْبون **carbon tetrachloride**

سائل متطاير صاف ، لا لون له ، CCL_4 ، يستعمل كمذيب في المستحضرات الصيدلانية ، وإن استنشاق أبخرته يمكن أن يثبط نشاط الجهاز العصبي المركزي ، ويسبب تنكساً في الكبد والكلية ، ويسمى كذلك بيركلور ميثان ، ورباعي كلور ميثان .

كَرْبونٌ مُشعّ **radioactive carbon**

انظر تحت carbon 11 .

قرص مصنوع من كربيد السيليكون .

رأسٌ ساموريّ **Carborundum point**

رأس من كَربيد السيليكون .

دولابٌ ساموريّ **Carborundum wheel**

دولاب من كربيدَ السيليكون .

الكربوواكس **Carbowax**

الاسم التجاري لسلسلة بولي إيثيلين الجليكول ، تستعمل في تركيب سواغات (مركبات) المراهم الذوابة في الماء .

كَرْبُوكسي هيمُوجلوبين **carboxyhemoglobin**

الهيمُوجلُوبين الذي فيه ترتبط مقرات ارتباط الأكسجين مع أحادي أكسيد الكربون بألفة تفوق مئتي مرة ألفة ارتباط الهيموجلوبين بالأكسجين .

فرْط كَرْبُوكسِي هيمُوجلوبين الدَّم **carboxyhemoglobinemia**

وجود الكَرْبُوكْسي هيمُوجلُوبين في الدَّم بنسبة كبيرة ، والذيَ يؤدي إلى التسمم بأحادي أكسيد الكربون .

جاما كربوكسي جلوتامات **γ-carboxyglutamate**

هو ملح أو شكل تفارقي لحمض جاما كربوكسي جلوتاميك .

حمض الجاما كربوكسي جلوتامات **γ-carboxyglutamate acid**

هو حمض أميني موجود في البروثرومبين النشط بيولوجيا ، وفي البروتينات العظمية غير الكولاجينية ، والذي يتشكل في الكبد بوجود ڤيتامين K بواسطة إضافة زمرة الكربوكسيل لثمالة الحمض الجلوتامي .

كَرْبُوكسيل **carboxyl**

جذر أحادي التكافؤ (-COOH) ، موجود في الأحماض العضوية والتي يصطلح عليها بأنها أحماض كربوكسيلية .

كَرْبُوكسِيلاز (إنزيم) **carboxylase**

الإنزيم الذي يحفز إضافة جزئ ثنائي أكسيد الكربون إلى مركب آخر لتشكيل مجموعة الكربوكسيل . وتتضمن الكربوكسيلاز بعض

كَرْبونيل **carbonyl**

مجموعة ثنائية التكافؤ (CbO) ، موجودة في مركبات مثل الألدهيدات ، والكيتونات ، وحمض الكربوكسيليك ، والإسترات .

كاربوبلاتين **carboplatin**

مركب متناسق البلاتين له آليات أفعال مثل تلك التي يمتلكها السيسبلاتين (دواء مضاد للأورام) ، على الرغم من أن معدل نشاطه أقل ، مجال سميته مختلف . يستعمل في معالجة السرطانة المبيضية الحروف للعلاج الكيميائي المعياري أو المريضات اللاتي لا يمكن علاجهن بأمان بالسيسبلاتين ، ويستعمل كذلك بصفة تجريبية في معالجة سرطان الرئة صغير الخلايا ولا صغير الخلايا ، وفي المعالجة التجريبية لسرطانات الرأس والعنق والخصية والأورام المنوية . ويعطى وريدياً .

كَرْبُوبْرُوسْت **carboprost**

(أحدُ البْرُوستاجلاندينات)

مضاهيء تخليقي للدينوبروست (مضاهيء 15-ميثيل) ، أحد البروستاجلاندينات من النمط F ، يستعمل كمعجل للولادة ، ولإنهاء الحمل والإجهاض الفائت . يعطى عضلياً .

ميثيل كَرْبوبْروُسْت **carboprost methyl**

الإستر الميثيلي للكَرْبُوبْرُوسْت ، يملك نفس فاعلية واستعمالات الكَرْبُوبْرُوسْت كقاعدة ، يعطى كتحاميل مهبلية أو كجهيزات داخل المهبل .

تروميثامين كَربوبْرُوسْت **carboprost tromethamine**

مركب الكَرْبُوبْرُوسْت المعجل للولادة ، مع 2-أمينو -2- (هيدروكسي ميثيل) ـ 1، 3 بروبانيديول (1:1) .

ساموِر **Carborundum**

(مُركّبٌ يَلي الماسَ في القساوة) (أسنان)

الاسم التجاري لمستحضر من كربيد السيليكون .

قُرصٌ ساموريّ **Carborundum disc**

الكاربوكسيليك .

كَرْسَلَة (إضافة زمرة كربوكسيل) **carboxylation**

إضافة مجموعة الكربوكسيل ، مثل إضافة الكربوكسيل إلى البيروفات لتشكل أوكسالوآستيات (Oxaloacetate) .

إسْتيراز الكَرْبُوكسيل (إنزيم) **Carboxylesterase**

إنزيم من صنف الهيدرولاز ، والذي يحفز انشطار رابطة الإستر في الإستر الكربوكسيلي ليكون الكحول والحمض الكربوكسيلي ، وهو ذو نوعية واسعة ، وعادة ما يعمل على السلاسل الحمضية القصيرة المتصلة بالكحولات أحادية الهيدروجين وكذلك يحلم الاسترات لڤيتامين A .

ناقِلَة الكَرْبُوكسِيل (إنزيم) **carboxyltransferase**

مصطلح يستعمل في تسميات بعض الإنزيمات من تحت ـ تحت صنف ناقلَةُ الكَرْبامْويل وناقلة الكربوكسيل ، ليبين أنهَا تحفز نقل مجموعة الكربوكسيل من المركب المعطي إلى المركب المتلقي . وتسمى كذلك ناقلة الكربوكسيلاز (Transcarboxylase) .

كَرْبُوكسِي لِيَّاز (إنزيم) **carboxy-lyase**

أي إنزيم في تحت ـ تحت صنف الإنزيمات من صنف اللياز ، والتي تحفز الإضافة غير المحلمهة ، أو نزع مجموعة الكربوكسيل من مركب أو إليه ، وتتضمن الكربوكسيلازات ونازعات الكربوكسيلازات .

كَرْبُوكسِي ميثيل سلولوز (صيدلة) **carboxymethylcellulose**

الملح الصوديومي لبولي كربوكسي ميثيل أيثر السلولوزي ، يستعمل كعامل معلق ، وفي سواغات الأقراص ، وكعامل مزيد للزوجة في المستحضرات الصيدلانية ، ويعطى فموياً كمسهل .

كَرْبُوكسِي ميوجلوبين **carboxymyoglobin**

يتشكل هذا المركب عند تعرض الميوجلوبين لأحادي أكسيد الكربون ، مع تكون رابطة تساهمية مع الأكسجين وبلا تغيير في شحنة

مجموعة الكربوكسي لياز ، واللیجاز ، وهما إنزيمات رابطة ، وهي عادة بروتينات البيوتينيل التي تشطر ثلاثي فسفات الأدينوزين (ATP) لتوجيه التفاعل .

كربوكسيلاز الحمض الأميني **amino acid carboxylase**

إنزيم في العديد من الجراثيم يحفز نزع ثنائي أكسيد الكربون من الأحماض الأمينية لإنتاج الأمينات .

عوز الكربوكسيلاز المتعدد **multiple carboxylase deficiency**

اعتلال حمضميني موروث يمكن تصحيحة بالمعالجة بالبيوتين ، وينجم عن عوز مخلقة الهولوكربوكسيلاز ، أوعوز البيوتينيداز ، مما يسبب عوزاً في فاعلية الكربوكسيلازات التي تحتوي البيوتين كربوكسيلاز أسيتيل التميم A ، وكذلك كربوكسيلاز ميثيل كروتونويل ـCoA ، وكذلك كربوكسيلاز بربيونيل CoA ـ ، وكذلك كربوكسيلاز البيروفات . ويتميز هذا المرض بالأحماض الكيتونية الاستقلابية وبيلة الحمض العضوي ، وفرط أمونيا الدم ، تظاهرات متنوعة لصعوبة التنفس ، ونقص التوتر ، والنوبات ، والرنح ، والحاصات (فقد الشعر الموضع) والثعلبة ، والطفح الجلدي ، وتأخر التطور . يحتوي البول على الأحماض العضوية لكل عوز كربوكسيلازي فردي ، وبصفة خاصة حمض 3- هيدروكسي الإيزوفاليريك . ينجم الشكل الوليدي عن عوز مخلقة الهولوكربوكسيلاز ، وهو على مايبدو خلة كروموسومية جسدية متنحية ، وغالباً ما يبدأ مبكراً ، وسرعان ماقد يترقى إلى السبات ، ينجم الشكل اليَفَعي عن عوز البيوتينيداز ، وهي خلة كروموسومية جسدية متنحية ، وتتميز كذلك بالصمم الحسي العصبي والضمور البصري .

كاربوكسيلات **carboxylate**

أى ملح ، أو إستر ، أو قاعدة متقارنة لحمض

carbuncular **جَمْرِيّ**

مشابه للجمرة أو من طبيعتها .

carbunculoid **جَمْرَانِيّ؛ شَبِيهُ الجَمْرَةِ**

carbunculosis **دَاءُ الجَمْرَات**

حالة تتميز بتطور الجمرات .

carbutamide **كَرْبُوتاميد (دَوَاءٌ خَافِضٌ لِلسُّكَّر)**

مركب من السلفونيل يوريا يستعمل كخافض لسكر الدم في النمط الثاني من الداء السكري ، يعطى فموياً .

carbuterol **كَرْبُوتيرُول (دَوَاءٌ مُوَسِّعٌ لِلقَصَبَات)**

مركب أدرينالي الفعل ، يستعمل كموسع للقصبات ، ويعطى استنشاقاً .

carcass **فطيسَة**

جسم ميت ، ويطلق بصفة عامة على الأجسام الميتة غير البشرية .

Carcassonne's ligament, **رباط كاركاسّونّ ،**
perineal ligament **الرباط العجاني**

[رباط منسوب للطبيب برنارد جودوريك كاركاسّونّ (Bernard Gauderic) ، وهو جراح فرنسي من القرن الثامن عشر] ، وهو الرباط العاني البروستاتي ، والرباط المستعرض للعجان انظر تحت ligamentum puboprostaticum .

carcinemia **وجود الخلايا السرطانية في الدم**

انظر تحت canceremia .

carcino- **سابقة بمعنى السَّرَطان**

سابقة تعني العلاقة مع السرطان .

carcinoembryonic **سَرَطانٌ مُضْغِيّ**

يحدث في السرطانية وفي النسيج الجنيني .
انظر تحت antigen .

carcinogen **مُسَرْطِن**

أي مادة مولدة السرطان ، وغالباً ما يحدث التمييز بين المسرطنات التخلقية المتوالية ، والمسرطنات السامة للجينات .

epigenetic carcinogen **المسرطن التخلقي المتوالي**

العامل الذي بنفسه لا يخرب الدنا (الحمض الريبي النووي منزوع الأكسجين) (DNA) ،

حالة الحديدوز .

carboxypeptidase **كَرْبُوكسِي بِبْتيداز (إنزيم)**

أي من الببتيداز الخارجية ، والتي تحفز الانشطار الحلمهي لرابطة الببتيد الانتهائية أو قبل الأخيرة عند النهاية المطرافية -C في الببتيد أو عديد الببتيد .

carboxypeptidase A **كربوكسي ببتيداز A (إنزيم)**

إنزيم من صنف الهيدرولاز ، والذي يحفز التشطر من عديد الأمينوببتيداز في الثمالات الحمضية الطرفية -C لأحماض غير الأرجنيين ، الليسين أو البرولين . إنه إنزيم فلزي مرتبط بالزنك والموجود في العصارة البنكرياسية .

carboxypeptidase B **كربوكسي ببتيداز B (إنزيم)**

إنزيم من صنف الهيدرولاز ، والذي يحفز التشطر للثمالات الانتهائية -C للأرجنيين أو الليسين من عديد الببتيدات . إنه إنزيم فلزي مرتبط بالزنك والموجود في العصارة البنكرياسية .

Lysosomal carboxypeptidase B **كربوكسي ببتيداز B الحال**

إنزيم الكربوكسي ببتيداز نمط ـ السيستئين .

carbromal **كَرْبرُومال (دَوَاءٌ مُهَدِّئ)**

مهدئ ، وله فاعلية ضعيفة منومة ، يعطى فموياً .

carbuncle **الجَمْرَة**

عدوى ناخرة في الجلد والنسيج تحت الجلد ، تتألف من عنقود من الدمامل ، وعادة ماتنجم عن العنقوديات الذهبية مع تشكل عدة جيوب نازحة .

malignant carbuncle **الجَمْرَةُ الخَبيثَة**

انظر تحت cutaneous anthrax .

renal carbuncle **الجمرة الكلوية**

تقيح كتلي متموضع في المتن الكلوي بسبب النقائل الجرثومية ، يتلو العدوى الكلوية أو الجلطة الدموية الوعائية المتموضعة .

تحَلُّلُ السَّرَطان **carcinolysis**

تخريب الخلية السرطانية عن طريق الأرواء بعامل مضاد للورم من خلال الوعاء الدموي لجزء من الجسم الذي يحدث فيها النمو السرطاني .

حالٌّ للسَّرَطان **carcinolytic**

متعلق بانحلال السرطان ، أو يتميز بانحلال السرطان ، أو مسبب لانحلال السرطان .

سَرَطانَة **carcinoma**

نمو جديد خبيث ينشأ من الخلايا الظهارية ، ويميل للارتشاح في الأنسجة المحيطة ويسبب النقائل .

سَرَطانَةٌ عُنَيبيَّة **acinar carcinoma**

ورم خبيث بَطيء النمو يتميز بالخلايا العنيبية المرتبة في شكل بنيات شبيهة بغدة صغيرة ، عادة ماتوجد في البنكرياس والغدد اللعابية وخاصة عند الإناث ، وتسمى أيضاً ورم الخلية العنيبية ، والسرطانة الغدية العنيبية .

سَرَطانَةٌ عُنَيبيَّة **acinous carcinoma**

ورم خبيث بَطيء النمو يتميز بالخلايا العنيبية المرتبة في شكل بنيات شبيهة بغدة صغيرة ، عادة ماتوجد في البنكرياس والغدد اللعابية وخاصة عند الإناث ، وتسمى أيضاً ورم الخلية العنيبية ، والسرطانة الغدية العنيبية .

سَرَطانَةٌ تَسَفُّعيَّة **actinic carcinoma**

السرطانة الناجِمة عن السفع الجلدي الشمسي (التعرض المؤذي للشمس) .

سَرَطانَةٌ غُدِّيَّةٌ كيسيَّة **adenocystic carcinoma**

انظر تحت adenoid cystic carcinoma .

سَرَطانَةٌ غُدَّانيَّةٌ كيسيَّة **adenoid cystic carcinoma**

سرَطانة تتميز بالأشرطة أو الاسطوانات في السدى المخاطي أو الهياليني ؛ المفصولة أو المحاطة بأعشاش أو حبال من الخلايا الظهارية الصغيرة ، تبدو كواحدة أو أكثر من ثلاثة طرازات هي : الطراز مصفوي الشكل ، أو الأنبوبي ، أو المصمت . مقرها العادي هو الغدد

ولكن يسبب تبدلات مثل الخلل الهرموني أو كبت المناعة أو الإصابات النسيجية المزمنة التي تؤهب بدورها للسرطان .

المسرطن السام للجينات **genotoxic carcinogen**

المسرطن الذي يتفاعل بشكل مباشر مع الحمض الريبي النووي منزوع الأكسجين (DNA) ، أو مع الجزيئات الكبيرة التي تتفاعل بعد ذلك مع الحمض الريبي النووي منزوع الأكسجين (DNA) .

التَسَرْطن **carcinogenesis**

إنتاج السرطانة .

مُسَرْطِن **carcinogenic**

1 ـ منتج للسرطان .

2 ـ متعلق بالمسرطن .

السَّرْطنَة **carcinogenicity**

القدرة ، أو الميل لإنتاج السرطانة ، أو كيفية كونها مسرطنة .

سَرَطاويّ **carcinoid**

ورم أصفر محدد التكوين ينشأ من الخلايا المعوية أليفة الكروم ، وعادة من الأمعاء الدقيقة ، والزائدة الدودية ، والمعدة أو القولون ، وأقل من ذلك شيوعاً القصبات . يستعمل هذا المصطلح في بعض الأحيان وحده للدلالة على الورم المعدي المعوي (ويسمى كذلك ورم أليفات الفضة) . ويسمى كذلك الورم السرطاوي .

انظر تحت carcinoid syndrome .

السرطاوي القصبي **bronchial carcinoid**

الورم السرطاوي في القصبات ، انظر مصطلح «الورم» .

طِبُّ السَّرَطان **carcinology**

الفرع من الطب والمختص بدراسة السرطان .

حالَةٌ سَرَطانِيَّة **carcinolysin**

خميرة مشتقة من نوع من الصنبر الصيني تسمى (هايسنج) (Haisung) ، تعطى تحت الجلد أو عضلياً من أجل السرطان .

نمط من الورم الأرومي الميناني الذي تحدث فيه استحالة خبيثة ظهارية ، وفيه لا تشبه الآفات النقيلية الورم الأولي من الناحية الهيستولوجية ، وبالعكس فهي غالباً تشبه سرطانة الخلايا الحرشفية .

السرطانة الأمبولية **ampullary carcinoma**

مجموعة صغيرة من السرطانات المحيطة بالأمبولة ، والتي تشمل الأورام الناشئة مباشرة بجوار مصرة أودي .

سَرَطانَةٌ دَرَقِيَّةٌ كَشَمِيَّة **anaplastic thyroid carcinoma**

نمط مَن السرطانة الغدية الدرقية مع خلايا غير نموذجية من أنماط وطرازات متفاوتة ؛ ربما تكون صامتة لعدة سنوات ولكنها تصبح بعد ذلك خبيثة بدرجة عالية وتغزو موضعياً . تصيب بصفة رئيسية المسنين وخاصة من النساء . وتسمى كذلك السرطانة الكشمية في الغدة الدرقية ، والسرطانة اللامتمايزة في الغدة الدرقية .



Bronchial carcinoid السرطاوي القصبي

سَرَطانَةُ الأنيلين **aniline carcinoma**

السرطانة المُفْتَرَزَة **apocrine carcinoma**

1 ـ سرطانة الغدة الإفرازية .

2 ـ خباثة نادرة في الثدي مع طراز نمو نبيبي أو اللعابية ، ولكنها تشبه من الناحية الهيستولوجية الأورام التي تظهر في مكان آخر ، وهي خبيثة وعدوانية ولكنها بطيئة النمو ، تنتشر بالارتشاح إلى مجرى الدم والأحياز المحيطة بالأعصاب . وتسمى كذلك السرطانة الغدية الكيسية ، والسرطانة المصفوية الشكل ، و الورم الاسطواني الخلايا .

ملاحظة : هناك عدة أورام ليس لها علاقة بهذا الورم قد تمتلك طرازاً كيسياً غدانياً أو اسطوانياً مثل الورم الأرومي الميناني .

سرطانة الخلايا الحرشفية الغدانية **adenoid squamous cell carcinoma**

هو ورم الشائكي الغدي .

سَرَطانَةٌ غُدِّيَّةٌ حَرْشَفِيَّةٌ **adenosquamous carcinoma**

1 ـ ورمٌ شائكي غدي

2 ـ فئة متنوعة من السرطانات قصبية المنشأ مع مناطق من التمايز الغدي والحرشفي والخلوي الكبير ، يمكن أن يكون تضمين الورم بهذه الفئات أو غيرها من الفئات الأكثر نوعية للسرطانة القصبية المنشأ غير مؤكد منه .

سرطانة الملحقات **adnexal carcinoma**

سرطانة تنشأ من الملحقات الجلدية أو تشكل بنية مشابهة لها ، وبصفة خاصة الغدد العرقية والزهمية .

السرطانة المنتجة للألدوستيرون **aldosterone- producing carcinoma**

شكل خبيث نادر من الورم الألدوستيروني ، وهو أكبر من الورم الغدي المنتج للألدوستيرون .

سَرَطانَةٌ سِنْخِيَّة **alveolar carcinoma**

انظر تحت bronchioalveolar carcinoma .

سَرَطانَةُ الخَلاَيا السِّنْخِيَّة **alveolar cell carcinoma**

انظر تحَت bronchioalveolar carcinoma .

السرطانة الأرومية المينائية **ameloblastic carcinoma**

سرطانة الخلايا القاعدية العقيدية التقرحية **basal cell carcinoma, nodulo-ulcerative**
أشيع أشكال سرطانة الخلايا القاعدية ، عادة ما تحدث في الوجه كعقيدة واحدة أو متعددة ، صغيرة شمعية ، مع حواف مدورة تحيط بانخساف مركزي ربما يكون متقرحاً أو جلبوياً أو نازفاً . ربما ينتشر إلى الجوانب ، أو يغزو في العمق .

سرطانة الخلايا القاعدية ، المصطبغة **basal cell carcinoma , pigmented**
شكل من أشكال سرطانة الخلايا القاعدية تحتوي الآفات فيه على أصبغة بنية أو سوداء ، كثيراً ما يتصاحب مع الابتلاع الطويل الأمد للزرنيخ ، ينمو ببطء ويحدث على الأغلب عند الأفراد ذوي البشرة الداكنة .

سرطانة الخلايا القاعدية ، المصلبة **basal cell carcinoma, sclerosing**
سرطانة الخلايا القاعدية الشبيهة بالقشيعة (القشيعة هي تصلب الجلد المحدد) .

سرطانة الخلايا القاعدية ، السطحية **basal cell carcinoma , superficial**
يحدث هذا الشكل عادة على الجذع كلويحة واحدة أو لويحات متعددة متحسفة أومتفلسة ، وتكون حمامية ، ومنتشرة ببطء ، وسطحية ، وذات حواف مرتفعة خيطية الشكل ، كثيراً ما تتصاحب مع التعرض الطويل الأمد للزرنيخ .

سـرطانَةُ الخَـلاَيا شبْه القاعديَّة **basaloid carcinoma**
1 ـ مصطلح غير نوعي (غير محدد) يستعمل للإحالة لأي من السرطانات العديدة التى تشبه سرطانة الخلايا القاعدية .
2 ـ سرطانة نادرة فى الشرج ذات خلايا انتقالية ، تشبه السرطانة القاعدية الخلايا فى الجلد . وتسمى أيضاً السرطانة الشرجية مذرقية المنشأ .

سَرَطانَةُ الخَلاَيا القاعديَّة الحَرْشَفيَّة **basosquamous cell carcinoma**
عنيبي ، وإفرازات مُفْتَرَزَة .

سَرَطانَةُ الخَلاَيا القاعديَّة **basal cell carcinoma**
أشيع أشكال السرطَانات الجلدية ، يتألف من ورم ظهاري في الجلد يبدأ من تمايز ورمي للخلايا القاعدية ، وقلما ينتقل ولكنه عدواني ويغزو موضعياً . وعادة مايوجد كعقيدة لؤلؤية صغيرة واحدة أو متعددة ، أو صفيحات مع انخساف مركزي على الوجه عند الكهول المسنين ، وبصفة خاصة في المناطق المتعرضة للشمس عند الأشخاص ذوي البشرة فاتحة اللون ، تنقسم هذه السرطانة إلى العديد من النميطات المتنوعة اعتماداً على أسس إكلينيكية وهيستولوجية ، ومن أشهر أنواعها الفرعية : السرطانة العقيدية التقرحية ، والقشيعية ، والكيسية ، والسطحية .

سرطانة الخلايا القاعدية ، السنخية **basal cell carcinoma, alveolar**
انظر تحت cystic basal cell carcinoma .

سرطانة الخلايا القاعدية ، الزؤانية **basal cell carcinoma, comedo**
شكل تكون فيه لب كتلة الخلايا القاعدية متنخرة .

سرطانة الخلايا القاعدية ، الكيسية **basal cell carcinoma, cystic**
نميط غير شائع يحدث كآفة كيسية تتشكل بتنكس مركزي وتتميز بصفة هيستولوجية بالسدى المتوذم المحفوف بالخلايا الورمية .

سـرطانة الخـلايا القاعدية ، الشبيهة بالقشيعة **basal cell carcinoma, morphea-like**
عادة ما يحدث هذا الشكل في الوجه والعنق كآفات ندبية عاجية متوسعة الشعيرات مع حواف صعبة التحديد ، تتميز من الناحية الهيستولوجية بطيقان الخلايا القاعدية المحاطة بسدى هياليني كثيف ، وعادة ما تنتشر جانبياً .

سرطانة الخلايا القاعدية ، متعددة المراكز **basal cell carcinoma, multicentric**
انظر تحت superfacial basal cell carcinoma .

سَرَطانَةُ الخَلاَيا القاعديَّة **carcinoma basocellulare**

سَرَطانَةٌ ثاقبَة **carcinoma cuniculatum**

سَرَطانَةُ الجِلْد **carcinoma cutaneum**

سَرَطانَةٌ صَلْدَة **carcinoma durum (=scirrhous carcinoma)**

وتسمى (Scirrhous carcinoma) وهي سرطانة قاسية جداً ذو منشأ ليفي تنتج من تفاعل النسيج المتني وبوجود الظهارة المفرطة التصنع .

سَرَطانَةٌ درْعيَّة **carcinoma en cuirasse**

تتظاهر هَذه السرطانة الجلدية بالثخانة والجساوة فوق مناطق واسعة من الصدر ، وكثيراً ما تكون نتيجة للنقائل من آفة أولية من الثدي ، ويسمى كذلك السرطان الدرعي .

سَرَطانَةٌ ظهاريَّةٌ غُدَّانيَّة **carcinoma epitheliale adenoides**

السرَطانة الناشئة على حساب الخلايا الظهارية شبه الغدية .

السرطانة خارج الورم المختلط **carcinoma ex mixed tumor**

سرطانة خارج الورم الغدي المتعدد الأشكال .

سرطانة الورم الغدي متعدد الأشكال **carcinoma ex pleomorphic adenoma**

نمط من الورم الغدي الخبيث المتعدد الأشكال الذي يحدث في الغدد اللعابية للبالغين الكبار في العادة ، مع نقائل من المكون الظهاري الخبيث فقط ، يستعمل هذا المصطلح أحيانا بأسلوب مترادف مع الورم المختلط الخبيث .

سَرَطانَةٌ ليفيَّة **carcinoma fibrosum**

سَرَطانَةٌ عَمْلاَقَةُ الخَلاَيا **carcinoma gigantocellulare**

سَرَطانَةٌ لابدَة **carcinoma in situ**

كيان تنشؤي تكون فيه الخلايا الورمية محصورة بظهارة الأصل ، بلا غزو للأغشية القاعدية ، يفترض أن تكون إمكانية نمو الغزو اللاحق عالية . من أنواعها السرطانة اللابدة داخل القنوات ، والسرطانة الفصيصية اللابدة .

سرطانة تمتلك من الناحية الهيستولوجية كلاً من العناصر القاعدية والحرشفية .

سرطانة الأقنية الصفراوية **bile duct carcinoma**

1 ـ سرطانة القنيات الصفراوية .

2 ـ سرطانة خلايا الأقنية الصفراوية .

سرطانة الأقنية الصفراوية ، خارج الكبد **bile duct carcinoma , extrahepatic**

انظر تحت cholangiocellular carcinoma .

سرطانة الأقنية الصفراوية ، داخل الكبد **bile duct carcinoma , intrahepatic**

انظر تحت cholangiocarcinoma .

السرطانة البلهارسية **bilharzial carcinoma**

انظر تحت schistosomal bladder carcinoma .

سَرَطانَةٌ قَصَبيَّةٌ سنْخيَّة **bronchioalveolar carcinoma**

انظر تحت bronchiolar carcinoma .

سَرَطانَةٌ قَصَبيَّة **bronchiolar carcinoma**

نمط مختلف عن السرطانة الغدية في الرئة ، له خلايا ظهارية مكعبية أو عمودية تبطن الحاجز السنخي وبارزة ضمن الأحياز السنخية في التشكيلات الحليمية المفرعة ، وتسمى كذلك السرطانة السنخية ، أو سرطانة الخلية السنخية ، أو السرطانة الغدية ، أو الورم السرطاني القصبي أو السرطانة السنخية القصبية أو السرطانة القصبية السنخية الغدية .

سَرَطانَةٌ قَصَبيَّةٌ المَنْشَأ **bronchogenic carcinoma**

مجموعة كبيرة من سرطانات الرئة ، والتي تنشأ من ظهارة الشجرة القصبية . تتميز بوجود أربعة أنماط أولية : السرطانة الغدية للرئة ، سرطانة الخلية الكبيرة ، سرطانة الخلية الصغيرة ، السرطانة حرشفية الخلايا .

سَرَطانَةُ نَدْبَةِ الحَرْق **burn scar carcinoma**

السرطانة الناجمة عن ندبة حرق .

سَرَطانَةٌ غُدِّيَّة **carcinoma adenomatosum (=adenocarcinoma)**

انظر تحت adenocarcinoma .

(=medullary carcinoma)

انظر تحت medullary carcinoma .

سَرَطانَةٌ موسينيَّة **carcinoma muciparum**

انظر تحت mucinous carcinoma .

سَرَطانَةُ الخَلايَا المُخاطيَّة **carcinoma mucocellulare**

انظر تحَت krukenberg's tumor .

سَرَطانَةٌ مُتَنَكِّسَةَ مُخاطِيّاً **carcinoma myxomatodes**

سرطانَة كولويدية ، توجد فيها تحولات مخاطية في المتن الليفي الخلوي .

سَرَطانَةُ قشْرَة الكُظْر **carcinoma of adrenal cortex**

ورم خبيث في قشر الكظر يسبب اضطرابات صماوية مثل متلازمة كوشينج والمتلازمة الكظرية التناسلية .

سَرَطانَةٌ عَظْميَّة **carcinoma ossificans**

(=osteoid carcinoma)

سرطانة يوجد فيها حؤول عظمي أو عظماني وتسمى كذلك السرطانة السابقة للغزو .

سَرَطانَةٌ عَدَسيَّة **carcinoma lenticulare**

(في الجلد)

أحد أنماط سرطانات الجلد المتلونة باللون البني والمدورة بحيث تأخذ شكل العدسة الصغيرة وتسمى أيضاً (Lenticular carcinoma) .

سَرَطانَةٌ نُخاعيَّة **carcinoma medullare**

(=medullary carcinoma)

سرطانة تتكون بصفة رئيسية من عناصر ظهارية ومن سدى قليل أو من غير سدى ، مقراتها الشائعة في الثدي والغدة الدرقية ، وتسمى كذلك السرطان الرخو ، أو السرطان الشبيه بالدماغ أو السرطان النخاعي ، أو السرطان المصفوي الشكل ، أو السرطانة الإسفنجية .

سَرَطانَةٌ ملانينية **carcinoma melanodes**

(= وَرَمُ ملانيٌّ خَبيْثٌ) **(=malignant melanoma)**

انظَر تحت malignant melanoma .

سَرَطانَةٌ نُخاعيَّة **carcinoma molle**



Carcinoma in situ سرطانة لابدة

الصفراوية ، وتتركب من الخلايا الورمية المشابهة للخلايا الظهارية للقنيات الصفراوية والمرتبة كحبال مؤلفة من طبقتين من الخلايا حول جوف دقيق . وتسمى كذلك سرطانة الأقنية الصفراوية ، وسرطانةالأقنية الصفراوية خارج الكبد ، وسرطانة القنيات الصفراوية .

سَرَطانَةٌ مَشيمائيَّة **chorionic carcinoma**

انظر تحت choriocarcinoma .

سرطانة الضفيرة المشيموية **choroid plexus carcinoma**

ورم كشمي عدواني يتجلى بالاستحالات الخبيثة في الورم الحليمي الضفيري المشيموي .

سرطانة الخلايا الصافية **clear cell carcinoma**

1 ـ انظر تحت adenocarcinoma .

2 ـ انظر تحت renal cell carcinoma .

سرطان الشرج المذرقي المنشأ **cloacogenic anal carcinoma**

انظر تحت basaloid carcinoma .

سَرَطانَةٌ غَرَوانيَّة **colloid carcinoma**

انظر تحت mucinous carcinoma .

سَرَطانَةٌ زُؤانيَّة **comedo carcinoma**

انظر تحت comedocarcinoma .

سَرَطانَةُ جِسْمِ الرَّحِم **corpus carcinoma**

انظر تحت uterine corpus carcinoma .

السرطانة المنتجة للكورتيزول **cortisol-producing carcinoma**

نمط من السرطانات الموجودة في قشر الكظر ، والتي تفرز الكورتيزول ، وتسبب متلازمة كوشينج .

سَرَطانَةٌ مصفَوِيَّة (= سَرَطانَةٌ غُدّانيَّةٌ كيسيَّة) **cribriform carcinoma (=adenoid cystic carcinoma)**

1 ـ سَرَطانَةٌ غُدّانيَّةٌ كيسيَّة .

2 ـ سَرَطانَةٌ غُدّانيَّةٌ كَيسيَّة في الأقنية الناقلة للبن ، وهي أحد نميطات السرطانة القنوية اللابدة ، وتمتلك العديد من الأورام طرز مشتركة مصفوية الشكل وحليمية صغيرة .

في السدى (Stroma) .

سَرَطانَةُ الصَّفَن **carcinoma scroti**

سَرَطانَةٌ بَسيطَة **carcinoma simplex**

سرطانة غيرمتمايزة .

سَرَطانَةٌ إسْفَنْجيَّة (=سَرَطانَةٌ نُخاعيَّة) **carcinoma spongiosum (=medullary carcinoma)**

انظر تحت medullary carcinoma .

سَرَطانَةٌ مُتَوَسِّعَةُ الشُّعَيرات **carcinoma telangiectaticum**

سرطانة بها كثير من الأوعية الدموية ، ويحدث فيها فرط توسع في الشعيرات الدموية . وتسمى أيضاً (Carcinoma telangiectodes) .

سَرَطانَةٌ مُتَوَسِّعَةُ الشُّعَيرات **carcinoma telangiectodes**

انظر carcinoma telangiectaticum .

سَرَطانَةٌ عُجْرِيَّة (= سرطانة صلدة) **carcinoma tuberosum (= scirrhous carcinoma)**

وتسمى أيضاً (Tuberous carcinoma) ، (Fibro-carcinoma) ، (Scirrhous carcinoma) ، (Carcinoma tuberosum) ، (Desmoplastic carcinoma) وهي سرطانة ذات بنية شديدة القساوة نتيجة التفاعل الليفي الشديد تجاه الخلايا والعوامل المسرطنة .

سَرَطانَةٌ زُغابيَّة **carcinoma villosum**

سرطانة تترتب فيها الخلايا بطراز زغابي ، كإسقاط حليمي يتغطى بالظهارة الورمية ، عادة ماتشاهد في السبيل المعدي المعوي .

سَرَطانَةٌ دماغيَّةُ الشَّكْل (=سَرَطانَةٌ نُخاعيَّة) **cerebriform carcinoma (=medullary carcinoma)**

انظر تحت medullary carcinoma .

سَرَطانَةُ خَلايا الأَقْنِيَة الصَّفْراوِيَّة **cholangiocellular carcinoma**

سرطانة خلوية كبدية نادرة تنشأ من القنيات

سَرَطانَةٌ دماغيَّةُ الشَّكْلِ (=سَرَطانَةٌ نُخاعيَّة) **encephaloid carcinoma (=medullary carcinoma)**

انظر تحت medulary carcinoma .

سرطانة بطانة الرحم **endometerial carcinoma**

سرطانة في بطانة جسم الرحم ، وهي إحدى أشيع السرطانات في طب النساء ، تصيب النساء ما بعد سن الإياس ، العرض الشائع فيها هو النزف المهبلي الشاذ ، تتضمن أنماطاً تتراوح مابين الشكل الخبيث الموضعي الارتشاح إلى الشكل النقيلي

سَرَطانَةٌ شَبيهَةٌ ببطانَةِ الرَّحم **endometrioid carcinoma**

سَرطانَة تتميَز بطراز غدي شبيه ببطانة الرحم ، تحدث في قاع الرحم والمبيضين .

انظر تحت adenocarcinoma .

سَرَطانَةٌ بَشَرانيَّة **epidermoid carcinoma**

انظر تحت squamous cell carcinoma .

سَرَطانَةٌ نابتَة **exophytic carcinoma**

تنشؤ ظهَاري خبيث مع نمو خارجي يشبه الثؤلول أو الورم الحليمي .

السرطانة الصفاحية الليفية **fibrolamellare carcinoma**

سرطانة نادرة في الخلية الكبدية ، وتوجد فيها كتلة وحيدة ، ولاتوجد بينات على التشمع أو على سيادتها الذكرية ، تتميز من الناحية الهيستولوجية بالخلايا الكبدية اليوزينية المضلعة التي تحتوي على المتقدرات المتورمة ، والأجسام الهيولية والأجسام الهيالينية وتمتلك النويات البارزة ، تحاط الخلايا بسدى من الشرائط الكولاجينية المتوازية الرقيقة . وتسمى كذلك الورم الكبدي الصفاحي الليفي .

سَرَطانَةٌ جُرَيبيَّة **follicular carcinoma**

سرطانة درقَية تتألف من جدار أو جريبات ظهارية ضعيفة التمايز بدون أي تشكلات حليمية بحيث يصعب تفريقها عن الأورام

انظر تحت adenoid cystic carcinoma .

سَرَطانَةٌ أُسْطُوانيَّةُ الخَلايَا **cylindrical carcinoma**

السرطانة الأسطوانية ، هي السرطانة التي تكون الخلايا فيه أسطوانية الشكل أو شبه أسطوانية .

سَرَطانَةٌ أُسْطُوانيَّةُ الخَلايَا **cylindrical cell carcinoma**

السرطانة التي تكون فيها الخلايا أسطوانية الشكل أو شبه أسطوانية .

سَرَطانَةٌ صَلْدَة **desmoplastic carcinoma (=scirrhous carcinoma)**

انظر تحت carcinoma tuberosum .

سَرَطانَةٌ قَنَويَّة **duct carcinoma**

سرطانة في قناة مثل البنكرياس أو الثدي .

السرطانة القنوية اللابدة **ductal carcinoma in situ (DCIS)**

إحدى المجموعات واسعة الطيف للسرطانات اللابدة في القنوات المفرزة للبن ، وهي نميطات متميزة من الناحية الهيستولوجية و تتضمن السرطانة الزؤانية ، والسرطانة المصفوية الشكل ، والسرطانة الحليمية الصغيرة ، ولكن العديد من الأورام تشمل أكثر من نمط ، وتسمى كذلك السرطانة داخل القنوات .

السرطانة القنوية في البروستاتة **ductal carcinoma of the prostate**

انظر تحت adenocarcinoma .

السرطانة الناتحة **eccrine carcinoma**

سرطانة الغدد العرقية الناتحة .

سَرَطانَةٌ مُضْغيَّة **embryonal carcinoma**

ورم خبيث جداً في الخلية الإنتاشية ، وهي الشكل البدائي من السرطانات ، يرجح أنها مشتقة من الخلية المضغية البدائية ؛ قد توجد كشكل نقي أو كجزء من الورم المختلط في الخلية المنتشة . ولها مظهر هيستولوجي شبيه بالورم الكيسي المحي توجد عند الإناث بعمر 15 عاماً ، أما عند الذكور فإن غالبية المرضى من المراهقين أو الأكبر عمراً .

سَرَطانَةُ مَطْرِس الشَّعْرة **hair-matrix carcinoma**
(= سـرطانة قاعـدية الخلايا) **(=basal cell carcinoma)**

هي سـرطانة الخـلايا القـاعـدية (Basal cell carcinoma) ، وتسـمى أيضـاً (Basal cell epithelioma) ، وهي بطيئة النمو موضعية الانتشار ويندر أن تكون ورماً انتقالياً ، وتنشأ على حساب الخلايا القاعدية للظهارة الجلدية أو بصلة الشعرة .

انظر تحت basal cell epithelioma .

سَـرَطانَةُ الخَـلايا الكَبِـديَّة **hepatocellular carcinoma**

سـرطانَة أولية في الخلية الكبدية ، تتضمن الأعراض : ضخامة الكبد ، والألم البطني ، وفقد الوزن ، واليرقان ، وتدمي الصفاق ومختلف أعراض وجود كتلة في البطن ، وهو ورم نادر في شمال أمريكا وغرب أوروبا ولكنه أحد أشيع الخباثات في أجزاء من جنوب الصحراء الأفريقية وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا ومناطق أخرى . يتصاحب بدرجة شديدة مع وجود العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B ، ومن المؤكد أنه يتصاحب ـ ولكن بدرجة أقل ـ مع بعض أنماط التشمع والعدوى بفيروس التهاب الكبد C . وتسمى كذلك الورم الكبدي ، والورم الكبدي الخبيث ، والسرطانة الكبدية .

سَرَطانَةُ خَلاَيا هورْثله (الدَّرَقِيّة) **Hurthle cell carcinoma**

الورمَ الخبيث فَي خَلاَيا هورْثله بالغدة الدرقية .

سَرَطانَةُ الخَلايا الكُلْوِيَّة **hypernephroid carcinoma**
(=renal cell carcinoma)

انظر تحت renal cell carcinoma .

سَرَطانَةٌ طِفْلِيَّةٌ جَنينيَّة **infantile embryonal carcinoma**

انظرَ تحت yolk sac tumor .

الحليمية .

السرطانة الجريبية في الغدة الدرقية **follicular carcinoma of the thyroid gland**

نمط من سرطانة الغدة الدرقية مع عدة جريبات ، على الرغم من وجود مناطق بلا جريبات ، وهي أشيع عند الإناث وأخبث من السرطانة الحليمية في الغدة الدرقية . وتسمى كذلك السرطانة الدرقية الجريبية .

سَرَطانَةٌ كَمْئيَّة **fungating carcinoma**

سرطانة تشبه منظر الكمأة أو الفطور الدعامية بشكلها .

سرطانة معدية **gastric carcinoma**

انظر تحت adenocarcinoma .

سَرَطانَةٌ هُلاَمِيَّةُ الشَّكْل **gelatiniform carcinoma**

انظر تحت mucinous carcinoma .

سَرَطانَةٌ هُلاَمِيَّة **gelatinous carcinoma**

انظر تحت mucinous carcinoma .

سَرَطانَةٌ عِمْلاَقَةُ الخَلاَيا **giant cell carcinoma**

ورم ظهاري شديد الخباثة ضعيف التمايز ، يتألف من العديد من خلايا ورمية كبيرة جداً متعددة النواة ، كما يحدث في الرئة .

سرطنة الخلية العملاقة بالغدة الدرقية **giant cell carcinoma of thyroid gland**

نمط من السرطانة الكشمية للغدة الدرقية, تحتوى على العديد من الخلايا العملاقة بعضها متعددة النوى .

سَرَطانَةٌ غُدِّيَّة **glandular carcinoma**

انظر تحت adenocarcinoma .

سَرَطانَةُ الخَلاَيا الكَأْسِيَّة **goblet cell carcinoma**

سرطانة تنشأ على حَساب الخلايا المخاطية التي تأخذ شكل الكأس عندما يتراكم المخاط ضمنها .

سَرَطانَةُ الخَلاَيا الحُبَيبيَّة **granulosa cell carcinoma**

ورم الخلية الحبيبية الذي يخضع للاستحالة الخبيثة .

انظر تحت carcinoma lenticulare .

السرطانة السحائية الرقيقة **leptomeningeal carcinoma**

انظر تحت meningeal carcinoma .

سَرَطَانَةٌ شَحْمِيَّة **lipomatous carcinoma**

سرطانة تنشأ على حساب النسيج الشحمي أينما كان .

السرطانة الفصيصية **lobular carcinoma**

1 ـ السرطانة القنوية الانتهائية

2 ـ انظر تحت lobular carcinoma in situ .

السرطانة الفصيصية اللابدة **lobular carcinoma in situ (LCIS)**

نمط من التنشؤ ماقبل السرطان ، يوجد في فصيصات الغدد الثديية ، وعادة ماتكون صغيرة وواسعة الانتشار ، ولذا فإنها غير مجسوسة بالفحص الجسمي ، ولايمكن استعرافها إلا بالفحص المجهري ، تترقى ببطء ، وأحياناً تتطور إلى سرطانة فصيصية غازية بعد (10-15) سنة من أول اكتشاف لها . وتسمى كذلك التنشؤ الفصيصي .

السرطانة الفصيصية الارتشاحية **lobular carcinoma , infiltrating**

انظر تحت invasive lobular carcinoma .

السرطانة الفصيصية الغازية **lobular carcinoma invasive**

نمط غازي من سرطانة الثدي تتميز بالنمو الخطي في السدى المكون للنسيج الليفي حول الأجزاء الانتهائية من فصيصات الغدد الثديية ، تتطور معظم الحالات من السرطانة الفصيصية اللابدة . وتسمى كذلك السرطانة الفصيصية الارتشاحية .

سَرَطَانَةٌ لَمْفِيَّةٌ ظهارِيَّةٌ **lymphoepithelial carcinoma**

انظر تحت lymphoepithelioma .

سَرَطَانَةٌ نُخاعيَّة **medullary carcinoma**

سَرَطَانَةٌ تتكون غالباً من عناصر ظهارية مع سدى قليلة . من الأماكن التي تتواجد بها هذه

السرطانة الإلتهابية للثدي **inflammatory carcinoma of the breast**

سرطانة عالية الخباثة تصيب الثدي ، تتجلى بتبدل لون الجلد للقرنفلي أو الأحمرار مع إيلام ووذمة ، وسرعة في تضخم الثدي ، عادة ما تغزو الأوعية اللمفاوية الجلدية .

السرطانة داخل القناة **intraductal carcinoma**

1 ـ أي سرطانة في ظهارة القناة .

2 ـ السرطانة القنوية اللابدة .

سَرَطَانَةٌ داخل البَشَرَة **intraepidermal carcinoma**

سرطَانة محصورة ضمن البشرة والطبقة القاعدية للبشرة غير مخترقة من الخلايا المتكاثرة ، مثل داء بوين (Bowen's disease) .

سَرَطَانَةٌ داخل الظِّهارَة **intraepithelial carcinoma**

(=سَرَطَانَةٌ لابدَة) **(=carcinoma in situ)**

انظر تحت carcinoma in situ .

السرطانة المضغية اليفعية **juvenile embryonal carcinoma**

انظر تحت yalk sac tumour .

سَرَطَانَةٌ كرومبيشر **Krompecher's carcinoma**

(=قَرْحَةٌ قارضَة) **(=rodent ulcer)**

هي شكل متقرح بطيء النمو من الخلايا القاعدية وتتوضع عادة في الوجه .

سَرَطَانَةٌ خلايا كولشيتسكي **Kulchitzky-cell carcinoma**

(سَرَطَانَةٌ معوِيَّةٌ قولونيَّة)

ورم سرطاوَيَ في الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة .

سَرَطَانَةٌ ضَخْمَةُ الخَلاَيا **large-cell carcinoma**

ورم الخلايا الكبيرة الحجم غير المتمايزة (الكشمية) قصبي المنشأ ، قد يكون ضرباً من السرطانة الحرشفية الخلايا في الرئة التي تخضع لفقد التمايز الإضافي .

سَرَطَانَةٌ عَدَسِيَّة (في الجلد) **lenticular carcinoma**

انظر تحت basosquamous cell carcinoma .

السرطانة الحليمية الدقيقة **micropapillary carcinoma**

نمط من السرطانة القنوية اللابدة التي تتميز بطراز منتظم من الحليمات البصلية الصغيرة ، تشترك مع عدة أورام بالحليمات الصغيرة والطراز المصفوي الشكل .

سَرَطانَةٌ موسينيَّة **mucinous carcinoma**

سرطانة غدية مفرَزة للمخاط بمقادير معتد بها ، وتسمى كذلك السرطان الغرواني أو السرطانة الهلامية أو السرطانة الغدية أو السرطانة المخاطية .

سَرَطانَةٌ مُخاطيَّةٌ بَشْرَويَّة **mucoepidermoid carcinoma**

سَرَطانَةٌ مُخاطيَّة **mucosum carcinoma (=mucous carcinoma)**

انظر تحت mucious carcinoma .

سَرَطانَةٌ أَنْفيَّةٌ بُلْعوميَّة **nasopharyngeal carcinoma**

ورم خبيث ينشأ من الظهارة المبطنة للحيز وراء الأنف (البلعوم الأنفي) ، ويحدث بتواتر عال عند الأشخاص من أصل صيني ، قد تكون فيروسات ايبشتاين ـ بار متورطة كعامل مسبب .

السرطانة العصبية الصماوية في الجلد **neuroendocrine carcinoma of the skin**

انظر تحت merkel cell carcinoma .

السرطانة اللاارتشاحية **noninfiltrating carcinoma**

انظر تحت carcinoma in situ.

السرطانة اللاصغيرة الخلايا ، سرطانة الرئة اللاصغيرة الخلايا **non-small cell carcinoma , non-small cell lung carcinoma (NSCLC)**

مصطلح عام يشمل جميع سرطانات الرئة ماعدا السرطانة الصغيرة الخلايا ، ويتضمن السرطانة الغدية في الرئة ، وسرطانة الخلية السرطانة الثدي والغدة الدرقية .

سرطانة الغدة الدرقية **medullary carcinoma of thyroid gland**

نمط من سرطانة الغدة الدرقية التي تحتوي ترسبات نشوانية وخلايا مجاورة للجريب وتفرز الكالسيتونين . تحدث بشكلين : كروموسومي جسدي سائد كمكون من التنشؤ الصماوي العديد من النمط الثاني أو الثالث ، وتحدث كذلك بشكل غير مألوف .

سَرَطانَةٌ ميلانينية (=وَرَمٌ ميلانيني خَبيْثٌ) **melanotic carcinoma (=malignant melanoma)**

انظَر تحت malignant melanoma .

السرطانة السحائية **meningeal carcinoma**

ارتشاح سرطاني في السحايا وخاصة الأم الحنون والمشيمية . ربما تكون أولية أو ثانوية للنقائل ـ بصفة خاصة ـ من سرطانة الرئة الصغيرة الخلايا أو سرطان الثدي . وتسمى كذلك السرطانة السحائية الرقيقة ، أو الداء السرطاني المنتشر السحائي (السراط السحائي) ، أو السراط السحائي الرقيق .


سرطانة خلايا ميركل **Mercel cell carcinoma**

ورم جلدي أو تحت الجلدي خبيث سريع النمو ، يحدث في الأماكن المتعرضة لأشعة الشمس في الأعمار المتوسطة أو الأكبر سناً ، ويحتوي ترابيق تفاغرية غير منتظمة وحبيبات كثيفة صغيرة نموذجية من خلايا ميركل . وما تزال خلايا الأصل قيد النقاش . وتسمى هذه السرطانة أيضاً سرطانة الجلد التربيقية وسرطانة الجلد العصبية الغدية ، وكذلك ورم خلية ميركل .

سَرَطانَةٌ نَقيليَّة **metastatic carcinoma**

السرطانة الثانوية المتنقلة من سرطانة بدئية في مكان آخر غير الذي توجد فيه أصلاً .

سرطانة الخلايا متبدلة النمط **metatypical cell carcinoma**



Mercel cell carcinoma سرطانة خلايا ميركل

السرطان الدرقي الحليمي .

السـرطانة حول الأمبولية **periampullary carcinoma**

سرطانة تنشأ من الأماكن المجاورة لأمبولة فاتر (Ampulla of Vater) .

سَرَطانَةٌ حَولَ الأوعية البَابيَّة **periportal carcinoma**

السرطانة المحيطَة بالأوعية البابية .

سَرَطانَةٌ مُتَعَدِّدَةُ الأشْكال **pleomorphic carcinoma**

سرطانة ذات أشكال متعددة ومنها الشحمية (Pleomorphic lipoma) ومنها الغـدية (Pleomorphic adenoma) ، والتي توجـد في الغدد اللعابية .

انظر تحت pleomorphic adenoma .

سَرَطانَةٌ سَليلاَنيَّة **polypoid carcinoma**

سرطانة تنموَ على شكل يشبه منظر السليلة (Polyp) .

سَرَطانَةٌ قَبْلَ الغَزْو **preinvasive carcinoma**

هي سرطانة لابدة .

انظر تحت carcinoma in situ .

سَرَطانَةُ الخَلاَيا الشَّائكَة **prickle cell carcinoma**

انظر تحت squamous cell carcinoma .

الكبيرة ، والسرطانة الحرشفية الخلايا ، وتسمى كذلك سرطان الرئة اللاصغير الخلية .

سَرَطانَةُ الخَلاَيا الشُّوفانيَّة **oat cell carcinoma**

شكل من السرطانة الصَغيرة الخلايا التي تكون فيها الخلايا مدورة أو متطاولة وأكبر بقليل من الخلايا اللمفية ، ولها هيولى قليلة ومكتلة قليلاً .

سَرَطانَةٌ خَفيَّة **occult carcinoma**

سَرَطانَةٌ عَظْميَّة **osteoid carcinoma**

سرطانة يوجَد فيها حؤول عظمي أو عظماني في السدى (Stroma) .

سرطانة باجت **Paget's carcinoma**

انظر تحت Paget's disease .

سَرَطانَةٌ حُلَيميَّة **papillary carcinoma**

سرطانة يوجَد فيها قمعول حليمي ، والقمعول هو نتوء شاذ .

سرطانة الغدة الدرقية الحليمية **papillary carcinoma of thyroid gland**

أشيع سرطانات الغدة الدرقية ، غالباً ما يحدث قبل الأربعين من العمر وهو أشيع عند النساء من الذكور ، وعادة مايمتلك عناصر حليمية وجريبية ، ينمو ببطء وربما يبقى متموضعاً لسنوات عديدة ، ويسمى كذلك

البلهارسية .

سَرَطانَةٌ أَنْفِيَّة **schneiderian carcinoma**
تنشؤ (ورَم) في مخاطية الأنف والجيوب المجاورة للأنف .

سَرَطانَةٌ صَلْدَة **scirrhous carcinoma**
سرطانة ذات بنية قاسية بسبب تشكل نسيج ضام كثيف في السدى (الستروما) ، وتسمى كذلك السرطانة الليفية ، والسرطان الصلد .

السرطانة الزهمية **sebaceous carcinoma**
سرطانة الغدد الزهمية ، عادة ما توجد كعقيدة صلدة صفراء بطيئة النمو فى الجفن .

سَرَطانَةٌ مُنْبَذِرَة **seeding carcinoma**
السرطانة الانتقالية التي تبذر خلاياها في المناطق البعيدة عنها كزرع عبر الدم .

سَرَطانَةٌ خَتْمِيَّةُ الخَلاَيا **signet-ring cell carcinoma**
ورم خبيث جداً مفرز للمخاط ، تكون فيه الخلايا المفرزة للمخاط كشمية ومدورة . وذات نواة مزاحة إلى جانب واحد بوساطة كرية مخاطية في الهيولى .

سَرَطانَةٌ صَغيرَةُ الخَلاَيا **small-cell carcinoma**
شكل شائع وخبيث جداً من السرطانات القصبية المنشأ في جدار القصبات الكبيرة ، يحدث بصفة رئيسيةعند الأشخاص في الأعمار المتوسطة مع تاريخ سابق من التدخين ، وتكون حساسة للأشعة ، ولها خلايا بيضوية صغيرة غير متمايزة أليفة للهيماتوكسيلين بشدة ، تشيع النقائل إلى النقير (Hilum) ، والعقد اللمفاوية المنصفية . وتسمى كذلك سرطان الرئة الصغير الخلايا .

سَرَطانَةٌ كُرَوِيَّةُ الخَلاَيا **spheroidal cell carcinoma**
سرطانة ذات خلايا مدورة الشكل .

سَرَطانَةٌ مِغْزَلِيَّةُ الخَلاَيا **spindle cell carcinoma**
سرطانة عادة ماتكون من نمط الخلية الحرشفية ، تتميز بنماء مغزلي الشكل للخلايا المتكاثرة بسرعة .

سرطانة أولية داخل العظم **primary intraosseous carcinoma**
خباثة ظهارية سنية المنشأ نادرة ، تتواجد عادة بالفك العلوي والسفلي خاصة عند الذكور البالغين ، ويعتقد أنها تنشأ من بقايا ظهارية سنية المنشأ .

سَرَطانَةُ الإِشْعاع **radiation carcinoma**
السرطانة التي تنشأ نتيجة التعرض للأشعة .

سَرَطانَةُ الخَلاَيا الكُلْوِيَّة **renal cell carcinoma of kidney**
سرطانة المتن الكلوي ، عادة ماتحدث في الأعمار المتوسطة أو بعدها ، وتتركب من خلايا نبيبية بترتيب متغير . تعتمد الأعراض على امتداد الغزو . وتسمى كذلك السرطانة الغدية الكلوية ، والسرطانة الغدية في الكلية والسرطانة الكظرانية ، والورم الكلوي الكظراني ، السرطانة ذات الخلايا الصافية ، وكذلك ورم جرافيتز .

سَرَطانَةُ الخَلاَيا الشُّوفانِيَّة **reserve cell carcinoma (=oat cell carcinoma)**
هي سرطانة الخلايا الصغيرة ، وهي شديدة الخباثة وقصبية المنشأ ، وتتألف من خلايا بيضية صغيرة مع هيولى قليلة جداً وتحدث بنسبة ثلث سرطانات الرئة .

سرطانة ندبية **scar carcinoma**
سرطانة تصاحب التندب ، وعادة ما تكون سرطانة الغدة فى الرئة ؛ وقد تسبق الندبة السرطانة أو تكون استجابة تليفية لها ، وتسمى كذلك السرطانة الندبية .

السرطانة البلهارسية المثانية **schistosomal bladder carcinoma**
سرطانة في الجدار المثاني ، وعادة ماتكون سرطانة الخلايا الحرشفية ، تنجم عن العدوى المزمنة والتهيج بسبب البلهارسيا الدموية (Schistosoma haematobium) ، وتسمى كذلك سرطان المثانة البلهارسي ، والسرطانة

يحدث في الغدد اللعابية الصغيرة وبصفة خاصة في الحنك .

السرطانة الدرقية الكشمية **thyroid carcinoma , anaplastic**

انظر تحت anaplastic carcinoma of thyroid gland .

السرطانة الدرقية الجريبية **thyroid carcinoma , follicular**

انظر تحت follicular carcinoma of thyroid gland .

السرطانة الدرقية اللبية **thyroid carcinoma , medullary**

انظر تحت medullary carcinoma of thyroid gland .

السرطانة الدرقية الحليمية **thyroid carcinoma, papillary**

انظر تحت papillary carcinoma of thyroid gland .

سَرَطانَةٌ تَرْبيقيَّة **trabecular carcinoma**

انظر تحت merkel cell carcinoma .

سَرَطانَةُ الخَلاَيا الانْتقاليَّة **transitional cell carcinoma**

ورَم خَبيث ينشأ من النمط الانتقالي للظهارة المطبقة (Stratified epithelium) ، عادة مايصيب المثانة.

سَرَطانَةٌ عُجَرِيَّة **tuberous carcinoma**

السرطانة التي تأخذ شكلاً مدوراً حدبياً قاسياً .

السرطانة الأنبوبية **tubular carcinoma**

1ـ السرطانة الغدية التي تترتب فيها الخلايا بشكل أنبوبي ، وتسمى كذلك السرطان الأنبوبي .

2ـ نمط من سرطان الثدي الذي تكون فيه البنيات الشبيهة بالغدة متشكلة ومخترقة للسدى ، وعادة ماتتطور من سرطانة أنبوبية مبكرة لابدة ونادراً ما تنتقل .

سرطانة الغدة الدرقية اللامتمايزة **undifferentiated carcinoma of thyroid gland**

سَرَطانَةُ الخَلاَيا الحَرْشَفيَّة **squamous carcinoma**

(=squamous cell carcinoma)

1ـ سرطانة تتنامى من الظهارة الحرشفية ، لها خلايا مكعبية وتتميز بالتقرن ، وغالباً مع الاحتفاظ بالجسور مابين الخلايا . مبدئيا فهى متوضعة وسطحية وربما تغزو الآفة وتنتقل فيما بعد .

2ـ عادة مايوجد الشكل الذي يحدث في الجلد في المناطق المتعرضة للشمس ، أو الآفات الموجودة قبل سابق .

3ـ هي أشيع أنماط السرطانات القصبية المنشأ في الرئة ، وتتشكل بصفة عامة من الكتل السليلية الشكل أو اللاطئة التي تسد السبل الهوائية القصبية . عادة ماتحدث عند الأفراد من الأعمار المتوسطة مع تاريخ سابق من التدخين . ثمة غزو متواتر عبر الأوعية الدموية واللمفية مع نقائل إلى العقد اللمفية الناحية ومقرات أخرى ، وتسمى كذلك سرطانة الورم البشرواني و سرطانة الخلايا الشائكة .

سَرَطانَةٌ مُرَبَّطَة (في القَولون) **string carcinoma**

سَرَطانَةٌ مَخْلَوِيَّة **syncytial carcinoma**

السرطانة التي تنشأ على حساب الخلايا الخلالية .

سَرَطانَةٌ مَسْخيَّة **teratoid carcinoma**

هي الورم المَسْخي في الخصية ، والورم المسخي (Teratoma) ، أو (Teratoid tumor) ، هو المتألف من نسج ورمية لاتوجد عادة في منطقة نشوئه ، وأكثر ما تحدث في المبيض وتكون فيه حميدة وتحتوي على كيسة جلدانية ، بينما تكون في الخصية خبيثة ، ومن غير الشائع وجودها في مناطق أخرى .

سرطانة القناة الانتهائية **terminal duct carcinoma**

تنشؤ خبيث يغزو موضعياً ، يكون بطيء النمو . يتكون من عناصر قنوية وظهارية عضلية ،

السرطانة المنتشرة في عدة أعضاء وبشكل دخني شعاعياً ، أي منتشر غير متكتل.

1 ـ سَرَطانِيّ — **carcinomatous**
2 ـ شَبِيهُ السَّرَطان
متعلق بالسرطان أو من طبيعة سرطانية .

أُلفةُ النُّسُجِ السَّرَطانِيَّة — **carcinophilia**
حالة ميل العوامل التي تنجذب للنسج السرطانية ، وتفيد في معالجتها .

أليفُ النُّسُجِ السَّرَطانِيَّة — **carcinophilic**
صفة العوامل التي تتجه أو تميل إلى الاتجاه نحو النسج السرطانية .

1 ـ رُهابُ السَّرَطان — **carcinophobia**
مريض يهاب من السرطان .

ساركومة سَرَطانِيَّة — **carcinosarcoma**
ورم خبيث يتكون من أنسجة سرطانية وساركومية .

الساركومة السرطانية المضغية — **embryonal carcinosarcoma**
انظر تحت wilms' tumor .

داءٌ سَرَطانِيٌّ مُنْتَشِرٌ؛ سُراط — **carcinosis**
ويسمى أيضاً (Carcinomatosis) ، وهي حالة تتصف بالانتثار والانتشار الواسع للورم الخبيث بحيث يصيب عدة أعضاء أو نسج بسرعة .

داءٌ سَرَطانيٌّ مُنْتَشِرٌ في الجَنَبَة — **carcinosis pleurae**
انتشار الورم الواسع في غشاء الجنبة .

داءٌ سَرَطانيٌّ مُنْتَشِرٌ دُخْنِيّ — **miliary carcinosis**
انتشار واسع مع شكل شعاعي دخني .

داءٌ سَرَطانيٌّ مُنْتَشِرٌ في الرِّئَة — **pulmonary carcinosis**
سُراط واسع الانتشار في الرئة أو الرئتين .

كابِحُ السَّرَطان — **carcinostatic**
يميل إلى توقيف النمو السرطاني .

سَرَطانِيّ — **carcinous**
صفة لكل ما يتعلق أو ينسب للسرطان .

بطاقة — **card**
الورقة التي تحتوي على المعلومات المرشدة

انظر تحت anaplastic carcinoma of thyroid gland .

سرطانة جسم الرحم — **uterine corpus carcinoma**
سرطانة في جسم الرحم عادة ماتكون سرطانة بطانية ، وهي أحد أشيع السرطانات في الطب النسائي ، تتراوح في الخباثة مابين الغزو الموضعي والنقائل . وتسمى أيضا سرطانة جسم الرحم .

سَرَطانَةٌ ثُؤْلولِيَّة — **verrucous carcinoma**
1 ـ نوع من السرطانة الحرشفية الخلايا التي تميل إلى المخاطية الشدقية ، ولكنها تؤثر أيضاً على الأنسجة الفموية الرخوة وتؤثر على الحنجرة ، تنمو بشكل بطيء وتكون غازية نوعاً ما ، ولها تنشؤ خارجي التنبت ، ولها مظهران حليمي وثؤلوي .
2 ـ ورم بوشكيه لوفينشتاين (Buschkel - lowenstein tumor) ، ولقد سمي كذلك لأنه مشابه بصفة هيستولوجية للآفات الفموية .

سرطانة زغابية — **villous carcinoma**
سرطانة ترتب فيها الخلايا كطراز زغابي به بروزات حليمية ، والتي تغطى بظهارة ورمية ، عادة توجد في السبيل الهضمي .

سَرَطانات — **carcinomata**
جمع سرطانة .

شَبِيهُ السَّرَطانة — **carcinomatoid**

رُهابُ السَّرَطان — **carcinomatophobia**

داءٌ سَرَطانِيٌّ مُنْتَشِرٌ؛ سُراط — **carcinomatosis**
حالة من الانتشار الواسع للسرطان في كل مكان من الجسم ، ويسمى كذلك بالسراط .

السراط السحائي الرقيق — **leptomeningeal carcinomatosis**

داء سرطاني منتشر سحائي — **meningeal carcinomatosis**
انظر تحت carcinoma .

داءٌ سَرَطانيٌّ مُنْتَشِرٌ دُخْنِيّ — **miliary carcinomatosis**

وسابقاً كطاردة للأرياح .

نوفوبيوسين (دواء) **cardelmycin (=novobiocin)**

انظر تحت novobiocin .

الكاردين **Cardene**

الاسم التجاري لمستحضر هيدروكلوريد النيكارديبين (Nicardipine hydrochloride) .

بتر كاردين **Carden's amputation**

[بتر منسوب للطبيب هنري دوجلاس كاردين (Henry Douglas Carden) ، وهو جراح إنجليزي مات عام 1872] .

انظر تحت amputation .

1 ـ سابقة بمعنى القلب **cardi-**

2 ـ سابقة بمعنى الفؤاد (في المعدة)

سابقة لها علاقة بالقلب أو الفتحة الفؤادية للمعدة **cardi(o)**

فؤاد **cardia**

جزء المعدة المجاور مباشرة ومحيط بالفتحة الفؤادية للمريء ، ويتميز بوجود الغدد الفؤادية ونقص الخلايا الحمضية (الجدارية) وخلايا البيبسين (الرئيسية) . ويسمى الجزء الفؤادي للمعدة .

فُؤادُ المَعِدَة **cardia of stomach**

ويسمى أيضاً (Cardia ventriculi) ، و (Gastric cardia) ، و(Pars cardiaca ventriculi) ، والفؤاد مصرة تفصل بين المريء والمعدة وتمنع بانقباضها الطبيعي من رجوع مفرزات المعدة إلى المريء ، وفي حال ارتخائها بسبب حموضة المعدة الزائدة مثلاً يحدث قلس محتويات المعدة إلى المريء .

فُؤادُ المَعِدَة **cardia ventriculi**

انظر تحت cardia of stomach .

1 ـ قلبيّ **cardiac**

2 ـ فؤاديّ

1 ـ متعلق بالقلب .

2 ـ دواء ترميمي أو منعش للقلب .

3 ـ شخص مصاب باضطراب قلبي .


للحالة التي تسجل في المعلومات المتعلقة بصاحب البطاقة ، وللبطاقات أغراض كثيرة ، كبطاقة الفحص ، وبطاقة التسجيل والمراجعات .

بطاقَةُ الفَحْص **examination card**

الورقة التي تدون عليها معلومات التاريخ المرضي والفحص الشامل للمريض ويسجل عليها نتائج الفحص الإكلينيكي والمختبري عادة والتشخيص المبدئي والنهائي .

بطاقَةُ التَّسْجيل **record card**

البطاقة التي يحتفظ بها مكتب السجلات ، والتي تتضمن عادة رقم خاص بالمريض ورقم سجله في المستشفى .



السراطِ السحائي الرقيق
leptomeningeal carcinomatosis

1 ـ سابقة بمعنى القلب **card-**

2 ـ سابقة بمعنى الفؤاد (في المعدة)

سابقة مصطلحية تشير إلى مدخل المريء إلى المعدة أو القلب .

حَبُّ الهال **cardamom**

1 ـ نبات الهال .

2 ـ أياً من النباتات الأخرى المختلفة ذات القرابة الوثيقة التي تشبه محاصيلها البذرية نبات الهال

3 ـ البذور الناضجة المجففة لحب الهال أو النباتات ذات القرابة ، تستعمل كعامل منكّه ،

1ـ ألَمٌ قلبيّ cardialgia

2ـ حرْقة الفؤاد

مُنَبهٌ للقلب cardiant

صفة المادة أو العامل المنبه للقلب .

وَهَنٌ قلبَيُّ المَنْشأ cardiasthenia

(= وهن دوراني عصبي) (= neurocirculatory asthenia)

ويسمى الوهن الدوراني العصبي (Neurocirculatory asthenia) ، وهو حالة وهط دوراني من منشأ ضعف التنبيه العصبي.

رَبْوٌ قلبيّ cardiasthma

تشخيص إكلينيكي للربو كسماع الأزير القصبي وتطاول زمن الزفير ولكن السبب فشل قلبي وليس تحسسي قصبي .

توسُّعُ القلب cardiectasis

مُستأصلُ القلب (حيوان اختباري) cardiectomized

استِئْصالُ الفؤاد cardiectomy

استئصال القسم الفؤادي للمعدة .

الكارديلات Cardilate

الاسم التجاري لمستحضر إيري ثري تيل رباعي النيترات (Erythrityl tetranitrate) .

رَئيسِيّ cardinal

ذو أهمية أولية أو أهمية فائقة .

سابقة بمعنى القلب cardio-

(= the heart)

(=سابقة بمعنى الفؤاد في المعدة) (=ostium cardiacum)

بادئة أو لاحقة تظهر الصلة مع :

1ـ القلب .

2ـ مع القسم أو الفتحة الفؤادية للمعدة .

كارديو تك Cardio Tec

الاسم التجاري لمستحضر التكنشيوم (Tc99m) التيبوروكسيم .

مُسَرِعُ القلب؛ مُعَجلُ القلب cardioaccelerator

1ـ معجل لعمل القلب .

2ـ العامل الذي يسرع فعل القلب .

فعَّالٌ فِي القلب cardioactive

4ـ متعلق بالفتحة بين المريء والقسم المعدي المجاور مباشرة لهذه الفتحة والذي يحيط بها (الجزء الفؤادي للمعدة) .

تَوَقُّفُ القَلْب cardiac arrest

توقف القلب عن الانقباض ، ويبدي تخطيط القلب خط السواء دون أي فعالية كهربائية.

مُمَرِّضَةُ الرِّعايَة القَلْبيَّة cardiac care nurse

الممرضة المتخصصة بتقديم الرعاية التمريضية لمرضى القلب والعناية القلبية المركزة .

وَحْدَةُ الرِّعايَة القَلْبيَّة cardiac care unit

وحدة متخصصة بتقديم العناية الفائقة لمرضى القلب في الحالات الخطرة التي تهدد الحياة ، وهي مجهزة بجميع الاحتياجات اللازمة لدعم الحياة واستقرار الحالة من ناظمة قلبية وجهاز نازع الرجفان وأجهزة تقديم التنفس الاصطناعي وتحت الضغط .

شُعْبَةُ قَثْطَرَة القَلْب cardiac catheterization service

قسم قلبي مختبري مجهز بكل لوازم تأمين القثطرة القلبية والوعائية القلبية بحيث تتم دراسة حالة القلب وتصوير أوعيته وتركيب الشبكات الوعائية (الدماعات) .

تقْنيٌّ إنقاذ القَلْب cardiac rescue technician

الممرض المدرب أو المتخصص في تقديم خدمات الانقاذ القلبي وتأمين شروط الحياة من طرق تنفسية مفتوحة والتنفس والجريان الدموي لسائر أنحاء الجسم .

وَحْدَةُ التَّرَصُّد القلبيِّ cardiac surveillance unit

(= وحدة العناية القلبية) (= cardic care unit)

هي وحدة العناية القلبية المركزة وتسمى (cardiac care unit) وفيها تقدم وسائل الدعم القلبي وإعادة النظم الطبيعي ودعم الحياة الأساسية .

فؤادِيّ cardial

صفة لكل ما يتعلق بالفؤاد المريئي المعدي .

استرخاء أو قصور في فعل معصرة الفتحة الفؤادية للمعدة .

مُحَرِّكٌ للقلب **cardiocinetic**
(=cardiokinetic)

قلبيٌّ دَوَرانِيّ **cardiocirculatory**
صفة لكل ما له علاقة بالقلب والدوران في آن واحد .

تشمُّعٌ كَبِدِيٌّ قلبيُّ المَنْشَأ **cardiocirrhosis**
تشمع في الكبد والناتج عن أسباب قلبية .

خلية قلبية **cardiocyte**

قلبيٌّ حِجابيّ **cardiodiaphragmatic**
صفة لكل ما له علاقة بالقلب والحجاب الفاصل بين البطن والصدر في آن واحد .

توسع القلب **cardiodilation**
الاسم القديم لشكل طليعة هرمون أذيني ببتيدي مدر للصوديوم (Atrial natriuretic peptide) .

مُوَسِّعَةُ الفؤاد (أداة أو شمعة) **cardiodilator**
أداة لتوسيع الجزء المعدي الفؤادي في تشنج الفؤاد أو تضيقه .

توسيعُ الفؤاد **cardiodiosis**
توسيع النهاية الفؤادية للمعدة .

الديناميكا القلبيَّة **cardiodynamics**
علم الحركات والقوى المكتنفة في فعل القلب .

أَلَمُ القلب **cardiodynia**

فؤاديٌّ مَرِيئيّ **cardioesophageal**
متعلق بفؤاد المعدة وبالمري ، كالمعصرة أو الوصلة الفؤادية المريئية .

تخلُّقُ القلب **cardiogenesis**
تطور القلب عند الجنين .

قلبيُّ المَنْشَأ **cardiogenic**
1 ـ ينشأ في القلب ، بسبب الوظائف السوية أو الشاذة في القلب .
2 ـ متعلق بتخلق القلب .

مُخَطَّطُ القلب **cardiogram**
اقتفاء أو مرتسم الحدث القلبي بواسطة أدوات مخطاط القلب .

له تأثير إيجابي على القلب .

تخديرُ القلب **cardioanesthesia**
حقن الزيلوكائين أو أشباهه لتخدير العضلة القلبية ومنعها من إصدار التنبيهات الإضافية التي تسبب الضربات المبتسرة .

تصْويرُ القلبِ و الأوعِيَة **cardioangiography**
(=angiocardiography)

طِبُّ القلبِ و الأوعِيَة **cardioangiology**
التخصص الطبي الذي يتعامل معُ القَلْبِ والأوعيَة الدموية .

قلبيٌّ أورطَي **cardioaortic**
صفة لكل ما له علاقة بالقلب والأورطي في آن واحد .

قلبيٌّ شِرْيانيّ **cardioarterial**
صفة لكل ما له علاقة بالقلب والشرايين .

مُنَشِّط القلب **cardio-augmentor**
صفة العامل المنشط للقلب والداعم والمحرض له .

الجراثيم القلبية **cardiobacterium**
جنس من الجراثيم ، سلبية الجرام ،لاهوائية اختيارياً ، تخمرية ، وعصية الشكل ، وهي قسم من النبيت الطبيعي في الأنف والحلق ، وتعزل من الدم أيضاً .

الجراثيم القلبية البشرية **cardiobacterium hominis**
أنواع تكوِّن جزءاً من النبيت الطبيعي في الأنف والبلعوم ، وأحد العوامل المسببة لالتهاب الشغاف .

صورةُ القلبِ الطَوريَّة **cardiocairograph**
طريقة يمكن بواسطتها إجراء صورة القلب الشعاعية في أي طور مختار من الدورة القلبية .

انْفِتاقٌ قلبيّ (خلال الحجاب أو الجرح) **cardiocele**
انفتاق القلب من خلال شق في الحجاب أو من خلال جرح .

بَزْلُ القلب **cardiocentesis**
البزل أو الشق الجراحي للقلب .

ارْتِخاءُ الفؤاد **cardiochalasias**

وتفسير تخطيط اتجاهات كهربية القلب .

قلبيٌّ كَبِدِيّ **cardiohepatic**

متعلق بالقلب والكبد .

تضخُّمُ القلبِ والكبِد **cardiohepatomegaly**

هو تَضَخُّمٌ يحدث في القَلْب والكَبِد .

قلبيُّ الشَّكل **cardioid**

مثل القلب ، أو شبيه بالقلب .

مُثَبِط للقلب **cardioinhibitor**

العامل الذي يقيد (يكبح) عمل القلب .

مُثَبِط قلبيّ **cardioinhibitory**

مقيد أو مثبط لحركات القلب .

مُحرِكٌ للقلب **cardiokinetic**

1ـ منبه لفعل القلب .

2ـ العامل الذي ينبه فعل القلب .

متعلق بتخطيطِ تَموُّج القلب **cardiokymographic**

تخطيط تموُّج القلب **cardiokymography**

تسجيل حركة القلب بوساطة مخطاط تموج القلب الكهربائي .

كارديوليبين **cardiolipin**

3,1 ـ ثنائي فسفاتيديل جليسيرول ، وهو شحمي فسفوري بصورة أساسية في الأغشية الداخلية للمتقدرات (الميتوكوندريا) ، أو في الأغشية البلازمية للجراثيم . الكارْديُوليبين هو المكون المستضدي الرئيسي في المستضدات من نمط فاسرمان المستعملة في الاختبارات المصلية غير اللولبية للزهري (الأفرنجي) .

الكارديوليت **Cardiolite**

الاسم التجاري لعتيدة (Kit) مستحضر التكنشيوم (Tc99m sestamibi) .

طبيبُ القلب **cardiologist**

طبيب حاذق في تشخيص أمراض القلب ومعالجتها والوقاية منها .

طِبُّ القلب **cardiology**

فرع من الطب المتخصص في دراسة القلب ووظائفه .

طب القلب الباضع **invasive cardiology**

مُخَطَّطُ قمَّة القَلْب **apex cardiogram**

مُخَطَّطُ القَلْب المَريئيُّ **esophageal cardiogram**

اقتفاء تقلصات الأذين الأيسر المسجل بواسطة تسجيل النبضات من المريء .

مُخَطَطُ القَلْب السَّلْبيُّ **negative cardiogram**

يبدو أنه تعبير قديم للموجات التي ترتسم دون خط السواء كالموجة q و S و T في بعض الاتجاهات .

مُخَطَّطُ القَلْب البَرْكيُّ **precordial cardiogram**

مخطط حركة القلب .

مُخَطَّطُ القَلْب الاتِّجاهيُّ **vector cardiogram**

مِخطاط القلب **cardiograph**

أداة مصممة لتسجيل بعض من عناصر ضربات القلب .

متعلق بتخطيط القلب **cardiographic**

تخطيط القلب **cardiography**

طريقة تخطيطية تسجل بشكل بياني بعض الجوانب الفيزيائية أو الوظيفية للقلب . منها أيضاً تخطيط قمة القلب ، تخطيط تموج القلب ، تخطيط صدى القلب ، تخطيط كهربية القلب ، تخطيط أصوات القلب ، تخطيط القلب البعادي أو تخطيط القلب عن بعد ، تخطيط القلب الاتجاهي .

تَخْطيطُ قمَّة القَلْب **apex cardiography**

رصد تَخَطيطي لحركة قمة القلب ومدى ارتطامها بجدار الصدر . فهذا المخطط يرصد حركات الصدر الارتدادية نتيجة ضربه بقمة القلب ، ويشبه المخطط منحنى الضغط البطيني .

تَخْطيطُ القَلْب الفَوْقَ ـ صَوْتي **ultrasonic cardiography**

انظر تحت echocardiography .

تَخْطيطُ القَلْب الاتِّجاهيُّ **vector cardiography**

تخطيط ترسيمي فراغي يبين اتجاهات مرور التيار الكهربائي في ألياف الطرق العصبية الناقلة لها ضمن القلب وعلاقتها بارتسام التخطيط القلبي الكهربائي ، وذلك من خلال رسم عرى كهربائية تمثل ذلك المرور . وقد يراد به دراسة

قِياسُ قوَّةِ القَلب **cardiometry**

تقدير حجم القلب وقوة فعله .

حَرَكِيَّة القلب **cardiomotility**

دراسة حركات القلب ، وحركية القلب .

تنكُسُ القلبِ الشَّحْمِيُّ **cardiomyoliposis**

تنكس دهني في عضلة القلب .

اعْتِلالُ عَضَلةِ القلب **cardiomyopathy**

1 ـ مصطلح تشخيصي عام يحدد الداء الأولي غير الالتهابي لعضلة القلب ، ويغلب أن يكون السبب غير معروف أو مجهولاً ، وليس نتيجة لمرض تأموري أو بسبب فرط ضغط الدم أو الإقفار أو بسبب خلقي أو صمامي . وعادة مايقسم إلى اعتلال عضلة القلب المتوسع أو الضخامي أو المقيد .

2 ـ في تسمية منظمة الصحة العالمية (WHO) ، هي ـ فقط ـ الاضطرابات التي تكتنف فيها العملية الباثولوجية (المرضية) عضلة القلب لوحدها ، والتي يكون السبب فيها مجهولاً ، وليست جزءاً من الداء الذي يصيب أعضاء أخرى . ويسمى كذلك اعتلال العضلة القلبية الأولي .

اعْتِلالُ عَضَلَةِ القَلْب الكُحوليُّ المَنْشَأ **alcoholic cardiomyopathy**

اعتلال متوسع في عضلة القلب ، يحدث عند المرضى أصحاب التاريخ المرضي المزمن بمعاقرة الكحول ، يعتقد أنه ينجم عن أثر سمي مباشر للكحول أو مستقلباته .

اعْتِلالُ عَضَلَةِ القَلْب لَدى شاربيَ البيرة **beer-drinker's cardiomyopathy**

حثل وتوسع قلبي ينجم عن الاستهلاك المفرط للبيرة ، قد يكون بسبب إضافة الكوبالت إلى البيرة في أثناء التصنيع في بعض الحالات .

اعْتِلالُ عَضَلَةِ القَلْب الاحْتِقانيُّ **congestive cardiomyopathy**

انظر تحت dilat .

النظرية والتطبيق في التشخيص والإجراءات العلاجية القلبية التي تكتنف الدخول إلى القلب أو الدوران المركزي ، مثل القثطرة القلبية ، ورأب الأوعية التاجية ، والدراسات الفيزيولوجية الكهربائية .

شُعْبَةُ طِبِّ القَلْب **cardiology service**

القسم المَسؤول عن قبول مرضى القلب وتقديم الرعاية القلبية لهم من تشخيص وعلاج .

افتِكاكُ القلب **cardiolysis**

عملية تحرير القلب والتأمور في مرض التهاب التأمور والمنصف الالتصاقي ، وتجرى بواسطة قص الأضلاع والقص فوق منطقة التأمور .

تليُّنُ القلب **cardiomalacia**

رخاوة مرضية في المادة العضلية للقلب .

تضَخُّمُ القلب **cardiomegalia**

انظر تحت cardiomegaly .

تَضَخُّمُ القَلْب الجليكوجينيُّ المُتَحَدِّد **cardiomegalia glycogenica circumscripta**

ضخامة القلب .

تَضَخُّمُ القَلْب الجليكوجينيُّ المُنْتَشِر **cardiomegalia glycogenica diffusa**

مرض أو داء تخزين الجليكوجين من النمط الثاني .

انظر تحت glycogen storage disease, type II .

تضَخُّمُ القلب **cardiomegaly**

تَضَخُّمٌ في عضلة القَلْب .

انظر تحت hypertrophy .

تَضَخُّمُ القَلْب الجليكوجينيُّ **glycogenic cardiomegaly**

ضخامة العضلة القلبية لوجود اضطرابات تتعلق بالاستقلاب الجليكوجيني كداء اختزان الجليكوجين .

الدَّاءُ الميلانيني القلبيُّ **cardiomelanosis**

تملن القلب ، وهو الانتاج المفرط للميلانين في الجلد أو الأنسجة الأخرى .

مِقياسُ قوَّةِ القلب **cardiometer**

أداة تستعمل لتقدير حجم القلب وقوة فعله .

اعْتلالُ عَضَلَةِ القَلْب العدَوائي **infectious cardiomyopathy**
مرض مزمن في العضلة القلبية يتلو العدوى .

اعْتلالُ عَضَلَةِ القَلْب الارْتشاحيُّ **infiltrative cardiomyopathy**
اعتلالَ العضَلة القلبية المقيد ، والذي يتميز بترسب مواد شاذة في النسج القلبية ، كما يحصل في الداء النشواني وداء ترسب الأصبغة الدموية وغيرهما .

اعْتلالُ عَضَلَةِ القَلْب الإقفاري **ischemic cardiomyopathy**
فشل في القلب مع توسع بطيني أيسر ناجم عن آفة قلبية إقفارية ، ولا يتماشى هذا مع التعريف المحدد لاعتلال عضلة القلب .

اعْتلالُ عَضلَةِ القَلْب النَّاجِمُ عن اعْتلالَ الكُلْية **nephropathic cardiomyopathy**
اعتلالَ العضلَة القلبيَة الناجَم عن اعتلال الكلية وفشلها المسبب لارتفاع اليوريا بالدم والذي يسبب تسمم لعضلة القلب .

اعْتلالُ عَضلَةِ القَلْب المسدِّ **obliterative cardiomyopathy**
انظر تحت restrictive cardiomyoathy .

اعْتلالُ عَضلَةِ القَلْب الانسدادي الضخامي **obstructive hypertrophic cardiomyopathy**
انظر تحت obstructive hypertrophic cardiomyopathy .

اعْتلالُ عَضلَةِ القَلْب في الفَتْرَةِ المُحيطَة بالولادَة **peripartum cardiomyopathy**
(في الشهر الأخير من الحمل أو الأشهر الأولى بعد الولادة)
ضخامة قلبية وفشل قلبي احتقاني لسبب مجهول ، وغالباً ما يبدأ في الشهر الأخير من الحمل أو الأشهر الأولى بعد الولادة .

اعْتلالُ عَضلَةِ القَلْب التَّالي للولادَة **postpartum cardiomyopathy**
(في الأشهر الأولى التالية للولادة)

اعْتلالُ عَضلَةِ القَلْب التوسعي **dilated cardiomyopathy**
متلازمة من التوسع البطيني والخلل الوظيفي في التقلصية الانقباضية مع فشل القلب الاحتقاني على الأغلب ، ويكون المساق مترقياً على الأغلب ، أما المآل أو الإنذار فيكون سيئاً ، يعتقد أنه قد يكون كتعبير عن الضرر في العضلة القلبية الذي تسببه مختلف العوامل مثل الكحول والحمل وفرط الضغط الجهازي أو بعض العداوى .

اعْتلالُ عَضلَةِ القَلْب الدُّهْنيُّ **fatty cardiomyopathy**
اعتلال العضَلة القلبية بسبب ارتفاع نسبة الدهون في الدم وإحداث التصلبات العصيدية وفرط ضغط الدم ما يسبب ضخامة العضلة القلبية .

اعْتلالُ عَضلَةِ القَلْب النَّاجِمُ عن ارْتفاع الضَّغْط **hypertensive cardiomyopathy**
اعتلال العضلة القلبية وضخامتها بسبب فرط ضغط الدم وزيادة إجهاد العضلة القلبية .

اعْتلالُ عَضلَةِ القَلْب الضخَامي **hypertrophic cardiomyopathy (HCM)**
اعتلال في عضلة القلب قد يكون موروثاً بصفة كرموسومية جسدية سائدة ، يتسم بالضخامة البطينية وخاصة في البطين الأيسر ، وغالباً ما يكتنف الحاجز بين البطينين ، وخلل في الوظيفة الانبساطية ، والتي تتظاهر كضعف في الامتلاء البطيني .

اعْتلالُ عَضلَةِ القَلْب الضخَامي الانسدادي **hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM)**
شكل من الضخامة القلبية الاعتلالية التي تتوضع في الحاجز بين البطينين وتسبب التداخل الانسدادي في التدفق البطيني الأيسر .

اعْتلالُ عَضلَةِ القَلْب المجهول السبَب **idiopathic cardiomyopathy**
انظر تحت primary cardiomyopathy .

شق عضلات المريء والفؤاد بطريقة هيلر — **Heller's cardiomyotomy**

انظر تحت esophagocrdiomyotomy .

كارديونيتريـن — **cardionatrin**

الاسم المشكال للببتيد الأذيني المدر للصوديوم .

نَخْرُ القلب — **cardionecrosis**

تنخر نسيجي خلوي في عضلة القلب لأسباب كيميائية أو إنزيمية ، أو تسممية ، أو لنقص حاد في الأكسجة .

الجِهازُ المُوصِلُ القلبيُّ — **Cardionector**
(= systema conducens cordis)

مصطلح يستعمل أحيانـاً للدلالة إلى جهاز التوصيل الكهربائي في القلب المسؤول عن نقل التنبيه القلبي من العقدة الجيبية إلى ألياف العضلة القلبية لحثها على الانقباض . ويسمى أيضاً (Systema conducens cordis) ، و (Conducting system of heart) .

قلبيٌّ كلويّ — **cardionephric**

متعلق بالقلب والكلية .

قلبيٌّ عَصَبيّ — **cardioneural**

متعلق بالقلب والجهاز العصبي .

عُصابٌ قلبيّ — **cardioneurosis**

ويسمى أيضاً (Cardiac neurosis) ، وهو حالة عصبية من القلق النفسي العام يصاب بها المريض سببها حالة القلب والشك والخوف من توقفه عند الشعور بالخفقان أو ألم الصدر ولو كانت من مصادر غير قلبية .

تثبيتُ الثَّرْب بالقلب — **cardio-omentopexy**

عملية جراحية قديمة تهدف إلى تروية القلب عن طريق ربط الثرب به .

مَلاريا قلبيَّة — **cardiopaludism**

عدم انتظام عمل القلب بسبب إصابته بالملاريا .

عَليلُ القلْب — **cardiopath**

صفة المصاب بعلة قلبية .

اعْتِلالُ القلب — **cardiopathia**

حالة إصابة القلب بعلة ما .

اعتلال عضلة القلب في الفترة المحيطة بالولادة .

اعْتلالُ عَضَلَة القَلْب الأَوَّلِيّ — **primary cardiomyopathy**

انظر تحت cardiomyopathy .

اعْتـلالُ عَضَلَة القَلْب المُقَيِّد — **restrictive cardiomyopathy**

الشكل الذي تكون فيه الجدر البطينية صلبة بدرجة مفرطة ، ولهذا السبب يتعرقل الامتلاء البطيني ، ويتسم هذا الاعتلال بوظيفة القلب الانبساطية الشاذة مع الوظيفة الانقباضية السوية .

اعتلال عضلة القلب في البطين الأيمن — **right ventricular cardiomyopathy**

اعتلال عضلة القلب في الجانب الأيمن منه ، والتي تحدث بصفة سائدة عند الذكور صغار السن ، ويتميز بتوسع البطين الأيمن ويحل مكانه العضلات ـ بصفة جزئية أو شاملة ـ نسيج ليفي أو شحمي ، ويتميز أيضاً بالخفقان والغشي والموت المفاجئ أحياناً .

اعْتلالُ عَضَلَة القَلْب الثَّانَوِيّ — **secondary cardiomyopathy**

أي شكل ينجم عن اضطراب قلبي وعائي آخر (فرط الضغط الشرياني مثلاً) ، أو يكون أحد مظاهر المرض الجهازي (داء الساركويد مثلاً) .

اعْتلالُ عَضَلَة القَلْب السُّمِّيّ — **toxic cardiomyopathy**

الاعتلال الذي ينجم عن العامل المسبب للضرر السمي في عضلة القلب مثل الكحول ، والعديد من العوامل المضادة للأورام والكاتيكولامين وسم الأفاعي وبعض المعادن .

اعْتـلالُ عَضَلَة القَلْب الصِّمامِيّ — **valvular cardiomyopathy**

تثبيت عَضَلَةِ القلبَ — **cardiomyopexy**

شَقُّ عَضَلات المريء والفؤاد — **cardiomyotomy**
(=esophagocardiomyotomy)

انظر تحت esophagocardiomyotomy .

cardiopathic **متعلق باعتِلال القلب**

متعلق باعتلال القلب أو يلاحظ فيه .

cardiopathy **اعتِلالُ القلب**

اضطراب أو مرض في القلب .

infarctoid **اعْتلالُ القَلْب**
cardiopathy **الاحْتشائيُّ الشَّكْل**

حالة قلبيّة ذات أعراض مشابهة لاحتشاء العضلة القلبية .


cardiopericardiopexy **تثبيتُ القلبِ بالتأمور**

عملية لمعالجة التهاب التأمور الالتصاقي ، استعملت قديماً لزيادة تدفق الدم للقلب .

cardiopericarditis **التِهابُ القلب و التَّأمور**

cardiophobia **رُهابُ المَرَض القلبيّ**

الخوف الشديد غير الرشيد من المرض القلبي .



شق عضلات المريء و الفؤاد بطريقة هيلر
Heller's cardiomyotomy

cardioplasty **رَأبُ الفؤاد**

رأب المعدة والمريء .

cardioplegia **1ـ شَللُ القلب**
2ـ شلُّ القلب

توقف في تقلص العضلة القلبية ، مثلما يحدث بسبب استعمال مركبات كيميائية أو بسبب البرد (شلل القلب بالبرد) في إنجاز الجراحة على القلب .

cardioplegic **1ـ متعلق بشَلَل القلب**
2ـ متعلق بشَل القلب

cardiopneumatic **قلبيّ تنفُّسيّ**

متعلق بالقلب والتنفس .

cardiopneumograph **مِخطاطٌ قلبيّ تنفُّسِيّ**

جهاز تخطيط كهربائية القلب مع حركات التنفس .

cardiopneumonopexy **تثبيتُ القلبِ بالرئة**

عملية استخدمت سابقاً لتوفير تروية دموية رادفة للعضلة القلبية عبر وصل القلب بالرئة اليسرى بطرق مختلفة بما في ذلك إحداث التصاقات وعائية باستخدام مهيجات كيميائية أو ميكانيكية سحجية .

cardioprotectant **محصنٌ للقلب**

1ـ مضاد للفعل التسممي القلبي .
2ـ عامل يعاكس تسمم القلب .

cardioprotective **محصن القلب**

محصن القلب ، حاصن القلب .

cardioptosia **تدَلي القلب**

cardioptosis **تدَلي القلب**

انزياح القلب نحو الأسفل .

cardiopulmonary **قلبيّ رئويّ**

متعلق بالقلب والرئة .

cardiopulmonary bypass **المجازة القلبية الرئوية**

(في جراحة القلب المفتوح) ، وفيها يدخل الدم المسحوب من الوريدين الأجوفين ، وذلك دون المرور في القلب والرئتين من خلال المكساج والمضخة حيث يعاد إلى الأورطي .

cardiopulmonary **الإنْعاشُ القَلْبيُّ**
resuscitation **الرِّئَويّ**

ويختصر (CPR) ، وهو إجراءات الإنعاش القلبية الرئوية بتمسيد القلب وتقديم التنفس من فم لفم أو جهاز الأمبو عند توقف القلب الفجائي وكذلك التنفس .

cardiopuncture **بَزْلُ القلب**

ويسمى (Cardiocentesis) ، وهو شق أو وخز جراحي يخترق القلب لأغراض علاجية أو

من الزمن .

مُعالجة قلبيَّة cardiotherapy

معالجة أمراض القلب .

تسمُّمٌ دَرَقِيٌّ قلبيّ cardiothyrotoxicosis

فرط الدرقية مع الاكتناف القلبي .

جهازُ مُراقَبَةِ قلب الجَنين cardiotocograph

جهاز يستعمل لمُراقَبَة قَلْب الجَنين .

مُراقَبَة قلب الجَنين cardiotocography

مراقبة سرعة قلب الجنين أثناء الولادة ، ويستخدم في اختبار التقلص الإجهادي ، واختبار التقلص اللاإجهادي .

مُراقَبَة قلب الجَنين cardiotokography

انظر تحت cardiotocography .

1ـ بَضْعُ الفؤاد cardiotomy

2ـ بَضْعُ القَلْب

1ـ شق (بضع) جراحي للقلب لإصلاح العيوب القلبية .

2ـ شق (بضع) في النهاية الفؤادية للمعدة أو فوهة الفؤاد .

مُقوي القلب cardiotonic

1ـ له أثرمقو للقلب .

2ـ العامل الَّذي له أثر مقو على القلب .

مَسْحُ أصَمِيَّةِ القلب cardiotopometry

(قياس مساحة أصمية القلب)

قياس المساحة الأصمية السطحية للقلب بقرع الصدر .

سامٌ للقلب cardiotoxic

يمتلك تأثيرات سامة ومؤذية على القلب .

سمية قلبية cardiotoxicity

كيفية كونها سامة للقلب .

قلبيٌّ صِمامِيّ cardiovalvular

متعلق بصمامات القلب .

التِهابُ القَلْبِ و الصمامات cardiovalvulitis

مِبْضَعُ صِمام القلب cardiovalvulotome

أداة لإنجاز بضع (بضع) في صمام القلب .

بَضْعُ صِمام القلب cardiovalvulotomy

عملية شق صمام القلب ، أو استئصال قسم

تشخيصية.

فؤاديٌّ بَوَّابيّ cardiopyloric

متعلق بالفؤاد والبواب .

الكارديوكوين Cardioquin

الاسم التجاري لمستحضر الكينيدين عديد الجالاكتورونات (Quinidine polygalacturonate) .

قلبيٌّ كلويّ cardiorenal

متعلق بالقلب والكلية .

قلبي تنفسي cardiorespiratory

رَفوُ القلب cardiorrhaphy

عملية خياطة عضلة القلب .

تمزّق القلب cardiorrhexis

تصلُّب القلب cardiosclerosis

جساوة ليفية في القلب .

مِنْظارُ باطِن القلب cardioscope

أداة لرؤية القلب من الداخل .

قلبيُّ الانتِقاء؛ مُنتَق للقلب cardioselective

(مُنتَقي للقلب)

له نشاط في النسيج القلبي أكثر من باقي الأنسجة .

تشنُّجُ الفؤاد cardiospasm

تعذر الارتخاء في المريء .

انظر تحت achalasia .

مُخَطَّطُ القلبِ والنَّبْض cardiosphygmogram

رسم تخطيطي ينتج تخطيط القلب والنبض معاً .

مخطاط القلب والنَّبْض cardiosphygmograph

جهاز يقوم برسم القلب والنبض معاً .

تثبيت القلب بالطحال cardiosplenopexy

خياطة متن الطحال إلى السطح المعوي من القلب ، وهي طريقة استخدمت سابقاً لإعادة تروية العضلة القلبية .

مِقياسُ سُرْعَةِ القلب cardiotachometer

أداة تستعمل لقياس سرعة دقات القلب .

قِياسُ سُرْعَةِ القلب cardiotachometry

تسجيل متواصل لسرعة القلب لفترات طويلة

البيكورناوية التي تسبب التهاب الدماغ والنخاع والعضلة القلبية وتتضمن مجموعتين :

1 ـ مجموعة فيروسات التهاب الدماغ وعضلة القلب (EMC) .

2 ـ مجموعة فيروسات التهاب الدماغ والنخاع الجرذي .

carditis **التِهابُ القَلْب**

Lyme carditis **التهاب القلب في داء لايم**

اكتناف قلبي بداء لايم ، وهو التهاب عابر بصفة عامة ، وعادة ما يتظاهر بدرجة ما من الإحصار الأذيني البطيني ، ربما يحدث تسرع القلب البطيني والخلل الوظيفي البطيني الأيسر .

rheumatic carditis **الْتِهابُ القَلْب الرُّوماتِزميّ**

اكتناف قلبي بالحمى الروماتزمية ، والذي قد يتظاهر بفشل القلب الاحتقاني عندما يكون وخيماً ، وكذلك بالضخامة المترقية في القلب ، والتهاب التأمور ، وعند تسمع القلب هناك نفخات معتد بها بسبب خلل الوظيفة الصمامي .

streptococcal carditis **الْتِهابُ القَلْب بَالعِقْدِيَّات**

التِهَاب في القلب يحدث كنتيجة لالتهاب الحلق بالعقديات .

verrucous carditis **الْتِهابُ القَلْب الثُّؤْلولِيّ**

اَلتهاب الشغاف اللاجرثومي ، والذي يتسم بسلسلة متواصلة من النوابت الشبيهة بالثؤلول بقرب خط انغلاق شرفات الصمامات المترالية وثلاثية الشرف ، يشاهد في الذئبة الحمامية ، ويتصاحب أحياناً مع تصلب الجلد ، والفرفرية الخثارية وسائر أمراض الكولاجين .

Cardizem **الكارديزيم**

الاسم التجاري لمستحضر هيدروكلوريد ديلتيازيم (Diltiazem hydrochloride) ، وهو دواء للذبحة الصدرية وكذلك خافض لضغط الدم.

Cardura **الكارديورا**

منه ، وتجرى لتفريج التضيق الصمامي.

cardiovascular **قلبيٌّ وعائيّ**

متعلق بالقلب والأوعية الدموية .

cardiovascular disease **مَرَضٌ قَلْبيٌّ وعائيّ**

المرض القلبي الناجم عن سوء إرواء عضلة القلب بسبب علة في الأوعية التاجية القلبية المسؤولة عن ذلك .

cardiovascular technician **تقْنيُّ الأمْراض القَلْبِيَّة الوعائِيَّة**

الشَخْص المتَخصص بتقديم الرعاية الطبية القلبية الوعائية للمصابين بهذه الأمراض .

cardiovascular-renal **وعائيٌّ قلبيٌّ كُلويّ**

متعلق بالقلب والأوعية الدموية والكلية .

cardiovasology **طِبُّ القلبِ والأوعِيَة**

الفرع من الطب الذي يعنى بالأمراض القلبية الوعائية كالإقفار القلبي والاحتشاء القلبي وكيفية تدبيرها ومعالجتها .

cardioversion **تقويمُ نظم القلب (بالصَّدْمَةِ الكَهْرَبائِيَّة)**

استعادة النظم القلبي الطبيعي بالصدمة الكهربائية .

cardioverter **مُقومُ نظم القلب**

نمط من المكثفات الكهربائية ، والتي تفرغ الطاقة المخزنة في مكثف كهربائي بواسطة المحارضة (المحاثة الكهربائية) ، وتولد صدمة كهربائية مباشرة تستعيد النظم الطبيعي للقلب .

automatic implantable cardioverter-defibrillator **مقوم نظم القلب التلقائي القابل للانغراس ـ مزيل الرجفان**

جهيزة قابلة للانغراس تكشف تسرع القلب البطيني المستمر أو الرجفان ، وتنهيه بواسطة توليد صدمة مباشرة أو صدمات على العضلة القلبية .

Cardiovirus **فيروس قلبي**

فيروسات مثل فيروس التهاب الدماغ وعضل القلب (Encephalomyocarditis virus; EMC) ، وهو جنس من الفيروسات من الفصيلة

مُقَدَّمُ الرِّعايَة **care provider**

ويسمى أيضاً (Caregiver) ، وهو الشخص المؤهل لتقديم الخدمات الاجتماعية عموماً والصحية خصوصاً للأشخاص الذي يحتاجونها ، ويقدمها بشكل خاص في المنزل . ويجب تفريقه عن الناظر أو المشرف أو المربي (Caretaker) .

رِعايَةُ صِحَّةِ المُجْتَمَع **community health care**

الرعاية الصحية المقدمة لعموم المجتمع ، وتنظر إليه كوحدة شخصية متكاملة ، وهدفها تقوية روابط المجتمع ضمن بيئة صحية سليمة . وتدخل فيه صحة الأسرة لأنها اللبنة الأساسية في المجتمع .

رِعايَةٌ شامِلَة **comprehensive care**

الخدماتَ الصحية الشاملة لجميع متطلبات الفرد والأسرة والمجتمع .

رِعايَةٌ مُسْتَمِرَّة **continuous care**

الاسم التجاري لمستحضر الدوكسازوسين ميزيلات (Doxazosin mesylate) .

1 ـ رِعايَة **care**

2 ـ عِنايَة

مجموعة الخدمات المقدمة بواسطة أفراد المهن الصحية والتي هدفها منفعة المريض . وتسمى أيضاً معالجة (Treatment) .

رِعايَةٌ جَوَّالَة **ambulatory care**


الرعاية المتنقلة ضمن سيارات الإسعاف .

رِعايَةٌ سابِقَةٌ للوِلادَة **antenatal care**

الرعاية التي تقدم للحامل وجنينها قبل ولادتها له .

خُطَّةُ الرِّعايَة **care plan**

خطة تمريضية توضع بعد تقييم المريض ووضع التشخيصات التمريضية والطبية له ، ويقوم فيها مقدمو الرعاية بالتنفيذ ومراقبة تطور وتحسن الحالة .



الْتِهابُ القَلْبِ الرُّوماتزميّ **Rheumatic carditis**

رعايَةٌ صحيَّةٌ مَنْزِلِيَّة **home health care**

الرعاية التي تقدم للمريض في منزله .

رعايَةُ المَرِيْض الدَّاخِليّ **inpatient care**

رعاية تقدم للمريض بعد الادخال للمستشفى وإقامته فيها لتلقي العلاج المناسب .

رعايَةٌ مُرَكَّزَة **intensive care**

انظر تحت unit .

رعايَةٌ مَدِيدَة **long term care**

الرعاية التي تقدم للمرضى ذوي الأمراض المزمنة ولفترة طويلة جداً .

رعايَةٌ تَمْرِيضيَّة **nursing care**

الرعاية التي يقدمها الممرضون لتنفيذ الخطط التمريضية الموضوعة حسب التشخيصات التمريضية والطبية .

رعايَةُ العِيادَة الخارجيَّة **outpatient care**

الرعاية التي تقدم للمرضى الخارجيين الذين يراجعون العيادات دون دخول المستشفى .

عناية ملطفة **palliative care**

عناية مخصصة لتلطيف وتخفيف الألم والضائقة النفسية التي يصاحبها المرض الأصلي ، ولكن دون محاولة الشفاء من المرض الأصلي .

رعايَةٌ تالِيَةٌ للوِلادَة **postnatal care**

الرعاية التي تقدم للمرأة بعد الولادة بما فيها التوعية الصحية حول الرضاعة الطبيعية وأهميتها ، وحول كيفية اهتمامها بوليدها .

الرِّعايَةُ الصِّحِّيَّةُ الأَوَّلِيَّة **primary health care**

الرعاية التي يتلقاها المريض عند أول تعامل مع نظام الرعاية الصحية ، وعادة ماتتضمن تنسيق الرعاية واستمرارها طوال الوقت .

رعايَةُ المَرِيض المُتَرَقِّيَة **progressive patient care**

رعايَةٌ إقاميَّة **residential care**

الرعاية المقدمة للمرضى المقيمين في المستشفى .

العناية التنفسية **respiratory care**

1 ـ تقديم الرعاية الصحية المهنية للمرضى المصابين باضطرابات قلبية رئوية تحت إشراف

عدم انقطاع الرعاية واستمرارها بشكل مجدول حسب الخطة التمريضية الموضوعة .

العناية التاجية **coronary care**

انظر تحت unit .

الرعاية الحرجة **critical care**

رعايَةٌ وِصائيَّة (طب نفسي) **custodial care**

الرعاية التي تهدف إلى حماية الأشخاص كالمسنين ، والتي لا تحتاج عادة إلى مهارات ذات إجازة علمية أو ترخيص علمي ، كالمساعدة في النشاطات اليومية كالاستحمام والارتداء والإطعام والمساعدة على الحركة والتفاعل .

رعايَةُ الطَّوارئ **emergency care**

مداخلة تمريضية من تصنيف المداخلات التمريضية (NIC) ، والتي تقوم على توفير وسائل إنقاذ الحياة وتأمين سلامتها في الظروف والحالات المهددة للحياة .

رعايَةٌ مَدِيدَة **extended care**

متابعة لخطة تمريضية بعد انقطاع مقدم الرعاية لسبب مرضي أو إجازة خاصة إدارية . وقد تكون هذه الرعاية قصيرة الأمد أو طويلة الأمد حسب المرض الأصلي ، وقد تتم في المنزل ، أو بعد نقل المريض إلى بيوت الرعاية الصحية المديدة .

رعايَةُ العائلَة **family care**

الرعاية المقدمة للأسرة لاستعادة الروابط الأسرية المفككة ، أو في حالة وجود مريض في الأسرة .

رعايَةٌ تَرْبَوِيَّة **foster care**

الرعاية التي تقدم لشخص دون وجود علاقة نسب أو تبني ، وإنما هي خدمة تشبه خدمة الأبوين الحقيقيين دون ربط قانوني بين الراعي والمقدم له الرعاية . وتسمى أيضاً الرِّعايَةُ التَّنْمَوِيَّةُ .

رعايَةٌ صَحِّيَّة **health care**

الرعاية التمريضية الصحية التي تقدم للمريض سواء كان فرداً أو أسرة أو مجتمعاً في أي مكان مناسب لتقديمها .

شجر الببايا ، هو جنس من النباتات المثمرة ، وهو مصدر ثمر يدعى البابايا وكذلك هو مصدر لإنزيم البابايين ، والذي يستخدم في علاجات عسر الهضم .

تينيُّ الشَّكل **caricous**

يشبه التين ، أو شكل مشابه للتين .

تسوُّس **caries**

1 ـ نخر أو موت جزئي في سن أو عظم ، بحيث يصبح رخواً ومتبدل اللون وسميماً (مثقباً) ، ينتج التهاباً مزمناً في السمحاق والنسج المحيطة بالعظم ، ويشكل خراجات باردة مملوءة بسوائل نتنة جبنية شبيهة بالقيح ، والتي تنقب من خلال الأجزاء الرخوة حتى تنفتح إلى الخارج بواسطة جيب أو ناسور .

2 ـ تسوس سني .

تَسَوُّسٌ مُتَوَقِّف **arrested caries**

التسوس المتوقف النمو والمسيطر عليه . لكنه قد يترك علامات لونية .

تَسَوُّسٌ رَاجِع **backward caries**

(= **تَسَوُّسٌ داخليّ**) **(=internal caries)**

تسوس سني متَقَدم نحو الخلف من الموصل العاجي الميناني إلى الميناء ، ويسمى كذلك التسوس الداخلي .

تَسَوُّسٌ كَمْئِيّ (في العظام) **caries fungosa**

نخر وتسوس عظميَ يأخذ شكل كمئي (يشبه فطر المشروم أو الفطر الدعامي) ، ويشاهد في العظام .

تَسَوُّسٌ رَطْب **caries humida**

وتسمى أيضاً (Moist caries) ، وهو النخر السريع الحاد .

تَسَوُّسٌ جافّ **caries sicca**

انظر تحت dry caries .

الاسْتِعْدادُ للتَّسَوُّس **caries susceptibility**

وجود تهيئة واستعداد لحدوث التسوس ، كتناول الكثير من الحلوى دون غسل الفم والتخلص من السكريات .

تَسَوُّسٌ سُلِّيّ **caries tuberculosa**

من الأطباء ، وكذلك التقييم التشخيصي ، والعلاج ، والرصد ، والتأهيل .

2 ـ مصطلح عام لنمط من الرعاية الطبية المقدمة من أعضاء هذه المهنة ، يسمى كل من التعريف الأول والثاني المعالجة التنفسية .

3 ـ التشخيص والاستعمال العلاجي للغازات الطبية وأجهزة إعطائها ، وأنظمة الرصد البيئي ، والرطوبة ، والأدوية ، والدعم التنفسي ، والنزح القصبي الرئوي ، والتأهيل التنفسي ، والإنعاش القلبي الرئوي ، والتدبير العلاجي للسبل الهوائية . وتسمى كذلك المعالجة الإنشاقية والمعالجة التنفسية .

الرِّعايَةُ الصِّحِّيَّةُ الثَّانَوِيَّة **secondary health care**

المعالجة التي يقدمها المتخصصون للمرضى المحالين إليهم من قبل مقدمي الرعاية الصحية الأولية .

رِعايَةٌ تَمْرِيضِيَّةٌ حاذِقَة **skilled nursing care**

الرعاية التمريضية عالية الدقة والمهارات ، ويقوم بها فريق تمريضي عالي المستوى العلمي والتدريبي .

رِعايَةٌ داعِمَة **supportive care**

الرعاية الإضافية التي تردف الرعاية التمريضية الأساسية .

الرِّعايَةُ الصِّحِّيَّةُ الثَّالِثيَّة **tertiary health care**

المعالجة المقدمة في مركز الرعاية الصحية من اختصاصيين ذوي تدريب عال وبطرق متقدمة .

مُقدمُ الرعايَة **caregiver**

انظر تحت care provider .

كارْفِيسِلين (مُضادٌ حَيَوِيّ) **carfecillin**

هو كربنيسيلين فينيل الصوديوم (Carbenicillin phenyl sodium) ، ويستخدم كمضاد حيوي .

كارْفِنْتانيل **carfentanil**

دواء مسكن ومخدر .

دُبَّاء **Carica**

جنس من الأشجار من فصيلة زهرة الآلام ، متوطن في المناطق المدارية في الأمريكيتين ، والرباء البابايا (Carica papaya) ، هي البابايا أو

تسوس في السن يمتد إلى الجانب عند الموصل العاجي المينائي .

تَسَوُّسٌ نَخْرِيّ **necrotic caries**

مرض تصاب فيه قطع العظم بأجواف متقيحة .

تسوس وهدي **pit caries**

تسوس سني ينشأ في الوهدات والشقوق ، وعادة في السطوح الإطباقية للأرحاء والضواحك ، أو في السطوح اللسانية لقواطع الفك العلوي ، تحدث بشكل نموذجي كحفرة عميقة لها نقطة دخول ضيقة .

تَسَوُّسٌ أَوَّلِيّ **primary caries**

تسوس سني تتكون فيه الآفة من هجمة أولية على سطح السن .

تَسَوُّسٌ سِنِّيٌّ دان **proximal dental caries**

التسوس السني القريب من سن مجاور .

تسوس منتشر **rampant caries**

تسوس سني منتشر أو متفش .

تَسَوُّسٌ سِنِّيٌّ راجع **recurrent dental caries**

التسوس السني المتكرر أو الناكس .

تَسَوُّسٌ ثانَوِيّ **secondary caries**

التسوس الميناني الذي يبدأ في الوصل العاجي الميناني نتيجة انتشار جانبي سريع لانحلال سني بدئي أو أولي .

تَسَوُّسٌ سِنِّيٌّ شَيخوخِيّ **senile dental caries**

النخر الذي يحدث لدى الشيوخ ، وكبار السن ، ويحدث في المناطق الدانية من الأسنان ويصيب الملاط السني أيضاً .

تَسَوُّسُ النُّخاع **spinal caries**

التهاب العظم السلي (الدرني) في فقرة أو الغضاريف بين الفقرات .

جُؤْجُؤ (ج: جآجِئ) **carina (pl.carinae)**

حرف أو بنيان شبيه بالحرف ، وفي التشريح هو الغضروف الواقع عند نقطة انقسام الرغامى إلى قصبتين . والجؤجؤ هو اجتماع عظام الصدر من الأمام والذي يشبه صدر السفينة .

جُؤْجُؤُ القَبْو **carina fornicis**

حرف تحت سطح القبو (Fornix) .

إصابة العظم بالنخر نتيجة إصابته بسل العظم .

تَسَوُّسٌ مِلاَطِيّ **cemental caries**

تسوس سني يكتنف ملاط السن .

تَسَوُّسٌ مَرْكَزِيّ **central caries**

خراجات مزمنة داخل العظم .

تَسَوُّسٌ سِنِّيّ **dental caries**

تخريب متموضع في النسج المتكلسة ، يبدأ من سطح السن بإزالة الكلس من ميناء الأسنان ، ثم يتبعه تحلل إنزيمي للبنى العضوية ، مما يؤدي لتشكل الحفر التي إذا تركت بلا مراقبة اخترقت الميناء والعاج وقد تصل إلى اللب ، ثمة عدة نظريات سببية ، ولقد صنفها بلاك في خمس مجموعات على أسس من تشابه العلاج المطلوب ، وقد يضاف لها مجموعة سادسة أحياناً . ويسمى التسوس السني أيضاً النخر السني (Tooth decay) .

تسوس سني منتشر **dental caries, rampant**

تسوس سني يكتنف عدة أسنان ، يظهر فجأة ، وغالباً مايترقى بسرعة .

تسوس سني ثانوي **dental caries, secondary**

تسوس سني يحدث حول حواف الحشوة وماتحتها .

تَسَوُّسٌ عاجِيّ **dentinal caries**

تسوس سني ينتشر على طول الموصل العاجي الميناني ويكتنف القنيات العاجية ، ويصل إلى اللب في النهاية .

تَسَوُّسٌ جافّ **dry caries**

شكل من التسوس الدرني في النهايات المفصلية للعظام .

تَسَوُّسٌ مينائِيّ **enamel caries**

تسوس سني يكتنف ميناء السن .

تَسَوُّسٌ وَشيك **incipient caries**

تهديد بحدوث التسوس لوجود عوامله ومقوماته.

تَسَوُّسٌ داخِلِيّ **internal caries**

انظر تحت backward caries .

تَسَوُّسٌ جانِبِيّ **lateral caries**

نماء التسوس أو تطوره .

cariogenic — **مُسَوِّس**

يؤدي إلى إنتاج التسوس .

cariogenicity — **تَسَوُّسِيَّة**

كيفية التوصل إلى إنتاج التسوس .

cariology — **1ـ عِلْمُ تَسَوُّس الأَسْنان**
2ـ عِلْمُ النَّوَى الخَلَوِيَّة

دراسة التسوس والوقاية منه .

cariosity — **تَسْوِيس**

كيفية كونه مسوساً أو تسوسياً .

carious — **1ـ تَسَوُّسِيّ**
2ـ مُسَوَّس

مصاب بالتسوس ، أو من طبيعة تسوسية .

initial carious — **تَسَوُّس بَدْئِي**

carisoprodol — **كارِيزُوبْرُودُول**
(دَواءٌ يُرْخِي العَضَلاتِ الهَيْكَلِيَّة)

مرخ عضلي هيكلي ذو فعل مركزي يستخدم للتدبير العلاجي والأعراضي للاضطرابات العضلية الهيكلية المؤلمة الحادة ، يعطى فموياً ويسمى كذلك إيزوبروبيل ميبروبامات (Isopropyl meprobamate) .

Carlens' tube — **أنبوب كارلينز**

[أنبوب منسوب للطبيب إيريك كارلينز (Eric Carlens) ، وهو طبيب سويدي ولد عام 1908] وهي نوع بدئي من الأنبوب داخل القصبة.

Carleton's spots — **بقع كارلتون**

[بقع منسوبة للطبيب بوك كارلتون (Bukk G. Carleton) ، وهو طبيب أمريكي عاش مابين 1856-1914] ، وهي بقع في عظام المصاب بالسيلان .

carmalum — **كارْمالاَم**

مُلَوِّنٌ مُؤَلَّفٌ مِنَ القِرْمِز والشَّبِّ والماء .

Carman-Kirklin sign — **علامة كارمان-كيركلين**
(meniscus sign) — **(علامة الهلالة)**

[علامة منسوبة للطبيب روسّل دانييل كارمان (Russell Daniel Carman) ، وهو طبيب أمريكي عاش مابين (1875-1926) ، والطبيب

carina nasi — **جُؤْجُؤُ الأَنْف**

التبارز الأنفي العظمي الذي يقسم التجويف الأنفي إلى قسمين ، ويرتكز عليه الحاجز الغضروفي الأنفي .

carina of trachea — **جُؤْجُؤُ الرُّغامَى**

بروز لأخفض غضروف رغامي ، يشكل حرفاً هلالياً بارزاً يشغل بصفة أمامية خلفية فتحتي القصبتين .

carina tracheae TA — **جُؤْجُؤُ الرُّغامَى**

بروز لأخفض غضروف رغامي ، يشكل حرفاً هلالياً بارزاً يشغل بصفة أمامية خلفية فتحتي القصبتين .

carina urethralis vaginae TA — **الجُؤْجُؤُ الإِحْلِيلِيُّ لِلْمَهْبِل**

عمود من الغضون (Rugae) في الجزء الأسفل من الجدار الأمامي للمهبل ، تحت الإحليل مباشرة .

انظر تحت carina urethralis vaginae .

urethral carina of vagina — **الجُؤْجُؤُ الإِحْلِيلِيُّ لِلْمَهْبِل**

عمود مَن الغضون (Rugae) في الجزء الأسفل من الجدار الأمامي للمهبل ، تحت الإحليل مباشرة .

انظر تحت carina urethralis vaginae .

carinae (sing.carina) — **جَآجِئ (ف:جُؤْجُؤ)**

جمع جؤجؤ .

انظر تحت carina .

carinate — **جُؤْجُؤِيّ**

يشبه صدر السفينة ، له بروز يشبه صدر السفينة (الجؤجؤ) .

carination — **تجأْجُؤ (أخذ شكل الجؤجؤ)**

carindacillin sodium — **كاريندَاسيلِين صوديوم**

هو كربنيسيلين إندانيل الصوديوم ، والذي يستخدم كمضاد حيوي في علاج التهابات السبيل البولي العلوي والسفلي .

cario- — **سابقة بمعنى التَّسَوُّس**

cariogenesis — **تَسَوُّس**

قرمز شنايدر **Schneider's carmine**

محلول مشبع بالقرمز في حمض الأسيتيك المركز .

الحمض القرمزي **carminic acid**

حمض أروماتي ، وهو المكون الأساسي لصبغة القرمز .

أليفُ القِرْمِز **carminophil**

1 ـ سهل التلون بالقرمز .

2 ـ خلية أوعنصر يأخذ اللون بسهولة من القرمز .

3 ـ مُفرزة البرولاكتين (وهي خلية نخامية) .

قِرْمِز **carminum**

مُلَوِّنٌ نسيجي .

انظر تحت carmine .

كارْمُوسْتين (دواءٌ مُضادٌ للأورام) **carmustine**

عامل مؤلكل سام للخلايا من مجموعة النتروزويوريا (Nitrosourea) ، يستعمل في الأصل كمضاد ورمي ، وضد الورم الدماغي ، والورم النقيي المتعدد ، والسرطانة القولونية المستقيمية ، وداء هودجكين ، واللمفومات اللاهودجكينية ، ويعطى بالحقن الوريدي ويسمى ثنائي الكلوروإيثيل نتروزويوريا (Bischlore thylnitrosourea; BCNU) .

قاطع (السنُّ القاطِعَةُ لِلَحْم) **carnassial**

1 ـ مجهر للقطع والتمزيق .

2 ـ السِّنُّ القاطِعَةُ للَّحْم .

شمع كرنوبة **carnauba wax**

الكوبرنيكية الشمعية (جنس من النخيل) ، هو مصدر شمع الكرنوبة .

لحْمِيّ **carneous**

يعطى احساس ومنظر اللحم الطري (Fleshy) .

علامة كارنيت **Carnett' s sign**

[علامة منسوبة للطبيب جي بي كارنيت (G.B.Carnett) ، وهو طبيب أمريكي عاش في القرن العشرين] لتحديد موضع العضو المصاب .

انظر تحت sign .

بيرل رايموند كيركلين (Byrl Raymond Kir Klin) ، وهو أمريكي اختصاصي بالأشعة عاش مابين (1888-1957)] وهي علامة الهلالة (علامة شعاعية) في القرحة الهضمية .

علامة كارمان **Carman's sign (=meniscus sign)**

[علامة منسوبة للطبيب راسّيل دانيل كارمان (Russell Daniel Carman) ، وهو طبيب أمريكي عاش مابين 1875-1926] وهي علامة شعاعية لسرطان المعدة يطلق عليها علامة الهلالة .

كارْمانْتادين **carmantadine**

دواء مضاد للباركنسونية .

طاردُ الأرْياح **carminative**

1 ـ مفرج لتطبل البطن .

2 ـ دواء يفرج تطبل البطن ويخفف الألم .

قِرْمِز **carmine**

مادة ملونة حمراء مشتقة من دودة القرمز بإضافة الشب ، وتستعمل كصبغة هيستولوجية .

قِرمزُ الألَيزارين **alizarin carmine**

هو أحمر الأليزارين .

انظر تحت alizarinred .

القرمز النيلي **indigo carmine**

هو ثنائي سلفونات الإنديجوتين الصوديوم .

انظر تحت indigotindisulfonate sodium .



Cariogenesis تَسَوُّس

قرمز الليثيوم **lithium carmine**

ملون حيوي للبلاعم (Macrophges) .

الناقل للبالميتيل .

عوز ناقلة البالميتويل الكارنيتين **carnitine palmityltransferase deficiency**

اضطراب في استقلاب الشحم إذ يتبدل فيه الإنزيم إلى منظم شاذ ، مما يسبب وجعاً عضلياً وقابليةً للتعب وبيلة ميوجلوبينية ، ولكن لاتراكم الشحوم ، وذلك في أعقاب تمارين طويلة وخاصة في البرد أوبعد الصيام . وهو خلة كروموسومية جسدية متنحية ذات نفاذية مختزلة عند الإناث .

الكارنيتور **Carnitor**

الاسم التجاري لمستحضر الليفوكارنيتين .

اللَّواحِم **Carnivora**

(رتبة الحيوانات المتغذية على اللحم)

رتبة من الثدييات اللاحمة (آكلة اللحوم) بصفة أساسية ، ولها أسنان مكيفة لأكل اللحم ، ومعدة بسيطة ، وأمعاء قصيرة وتتضمن فصيلة الكلاب وفصيلة القطط ، والدببة ، والفقميات ، والراقونيات .

لاحِم **carnivore**

حيوان يأكل اللحم . وبصفة خاصة أعضاء رتبة اللواحم .

لاحِم **carnivorous**

يأكل اللحم أو يتقوت من اللحم .

كارْنوزيناز (إنزيم) **carnosinase**

ديبتيداز (الببتيداز الثنائية) هيس X (X-His dipeptidase) .

عوز الكارنوزيناز المصلية **serum carnosinase deficiency**

اعتلال حمضميني في استقلاب الكارنوزين ، وهو علة كروموسومية جسدية متنحية ، ينجم عن عوز النظير الإنزيمي المصلي للببتيداز الثنائية هيس -X ، وتتميز بالإفراغ البولي للكارنوزين وتراكم الهوموكارنوزين في السائل الدماغي الشوكي وربما يسبب النوبة الرمعية العضلية ، والتأخر العقلي الوخيم ، والشُناج أي فرط التوتر التشنجي .

معقد كارني **Carney' s complex**

(متلازمة، ثالوث) (syndrome, triad)

[معقد منسوب للطبيب جي أ كارني (J.A.Carnett) ، وهو طبيب أمريكي من القرن العشرين] ، هو معقد مكون من مجموعة من الأعراض الجسدية السائدة ، والتي هي عبارة عن ورم مخاطي بالأنسجة الرخوة ، تصبغ جلدي منقط ، أورام بالغدة الكظرية والنخامية ، والخصية ، والورم الشفاني للأعصاب الطرفية .

انظر تحت complex .

كارْنيدازول (دَواءٌ مُضادٌ لِلأوالي) **carnidazole**

تلحُّم **carnification**

تبدل في النسيج ، كنسيج الرئة إلى مادة لحمية .

كارْنيتين (حمض أميني) **carnitine**

مشتق من البيتائين (منشط لاستقلاب الشحوم) الموجود في العضلات الهيكلية والكبد ، والذي يلزم للأكسدة البيتائية المتقدرية للأحماض الدهنية ، يحمل مجموعة الأسيل (الأحماض الدهنية) عبر غشاء المتقدرة إلى المطرس ، حيث يتحول إلى تميم الإنزيم A قبل الأكسدة . ولقد استعمل كعامل استقصاء درقي وكعامل مضاد للذبحة .

ناقلة أسيل الكارنيتين **carnitine acyltransferase**

انظر تحت carnitineo-palmitoyltransferase .

ناقلة بالميتويل O- الكارنيتين **carnitine O-palmitoyltransferase**

أحد أصناف الإنزيمات الناقلة الذي يحفز النقل بين تميم الإنزيم A والكارنيتين من السلسلة الطويلة للأحماض الدهنية ، والكارنيتين الناقل للبالميتويل I ينقل الحمض الدهني إلى الكارنيتين ، ثم يمكن لأسيل الكارنيتين أن ينتقل إلى غشاء المتقدرة الداخلي ، وينقل الحمض الدهني مرة في المطرس من الكارنيتين إلى تميم الإنزيم A بواسطة الكارنيتين الناقل للبالميتويل II ؛ ناتج تميم الإنزيم A هو ركيزة من أجل الأكسدة ، عوز الإنزيم سبب لعيب تأكسد الأحماض الدهنية ، ويكتب كذلك الكارنيتين

ومغرزها في أوتار العاطفة الطويلة للأصابع .

carob **خَرُّوب (نبات من الفصيلة القرنية)**

1 ـ الأثيبية القرنية (Ceratonia siliqua) .

2 ـ وجبة مسحوقة بدرجة متقنة من الثمار الناضجة الجافة للأثيبية القرنية ، تحتوي بروتينات ألبومينية ، وكربوهيدرات ، ومقادير ضئيلة من الدهن والألياف غير الناضجة ، وتستعمل في المستحضرات الصيدلانية كمادة ممتزة ومطرية في معالجة الإسهال . ويسمى كذلك الخروبيَّة وفولة الخروب .

Caroli' s disease **داء كارولي**

[داء منسوب للطبيب جاك كارولي (Jacques Caroli) ، وهو طبيب فرنسي ولد عام 1902] .

انظر تحت disease .

carota (=carrot) **جَزَر**

يسمى أيضاً (Carrot) ، وهو نبات الجزر الغذائي نفسه كنبات من الفصيلة الخيمية ، والغني بمادة الكاروتين التي تتحول إلى الفيتامين A .

b-caroten 15,15´ dioxygenase **بيتا كاروتين 15، 15´- دي أكسيجيناز**

إنزيم من الصنف المؤكسد المختزل ، والذي يحفز الأكسدة الانشطارية للبيتا كاروتين في الأمعاء .

carotenase **كاروتيناز (إنزيم)**

إنزيم تركيبه (beta-carotene 15, 15´-dioxygenase) فهي تقوم بعملية ربط ذرتي أكسجين للكاروتين .

carotene **كاروتين**

(مادة في الجزر؛ طليعة الفيتامين A)

واحد من أربعة أصبغة تصاوغية للكاروتين (α–β–γ–δ) ، ألوانها من البنفسجي إلى الأحمر المصفر ثم الأصفر . يوجد في العديد من الخضروات الصفراء وذات الأوراق الخضراء القاتمة (ومثال ذلك : الملفوف ، القتة ، اللفت ، الجزر ، البطاطا الحلوة ، القرع) ، والثمار الصفراء (ومثال ذلك : المشمش ، الخوخ ، البرتقال ، الشمام أي البطيخ الأصفر) ، وتكون ذوابة في الدهن ، وهي هيدروكربونات أليفاتية

carnosine **كارْنوزين**

ببتيد ثنائي مكون من البيتا آلانين والهيستيدين ، يوجد عند البشر في العضل الهيكلي والدماغ وبصفة خاصة في السبيل الشمي الأولي . وربما يؤدي دوراً كناقل عصبي .

carnosinemia **وُجودُ الكارْنوزين فِي الدَّم**

1 ـ تراكم الكارنوزين في الدم .

2 ـ الاسم القديم لعوز الكارنوزيناز المصلية .

carnosinuria **بيلَةٌ كارْنوزينيَّة**

الإفراغ البولي لمستويات عالية من الكارنوزين ، كما يحدث بعد ابتلاع اللحم أو الطير أو عوز الكارنوزيناز المصلية .

carnosity **بارِزَةٌ لَحْمِيَّة**

أي نتوء شاذ (قمعول) لحمي .

carnutine **كارْنوتين**

تومائين في العضلات .

caro **عَضَل**

مصطلح لاتيني الأصل فيه مصطلح (Carnis) والجمع فيه (Carnes) ويعبر عن الجزء اللحمي الشحمي من الجسم دون العظم .

caro quadrata manus (= muscles palmaris brevis) **العَضَلَةُ المُرَبَّعَةُ لليَد (= العضلة الراحية القصيرة)**

وتسمى أيضاً (Musculus palmaris brevis) ، و (Short palmar muscle) ومنشؤها في الجانب الزندي من القسم المركزي للسفاق ومغرزها في جلد الجانب الراحي لليد وعملها تجعيد الجلد على الجانب الإنسي من الراحة ويعصبها العصب الزندي .

caro quadrata sylvii (= musculus quadratus plantae) **عَضَلَةُ سيلفيوس المُرَبَّعَة (= العضلة الرباعية الأخمصية)**

وتسمى أيضاً (Musculus quadratus plantae) ، و (Musculus pronator pedis) ، (Plantar quadrate muscle) ، و (Quadrate muscle of : sole) والتي تنشأ برأسين من الحافتين الوحشية والإنسية للسطح السفلي من عظم العقب .

المصـدر الرئيـسي لـلفـيتـامين A في القـوت الطبيعي .

وُجودُ الكاروتين في الدَّم؛كاروتينيميَّة **carotenosis (=carotenemia)**

اللون الأصفر في الجلد الذى يحدث في فرط الكاروتين في الدم ، أكثـر المناطق تصـبغـاً هي الراحتان والأخـمصـان والمناطق خلف الأذنين ، بينما تبقى صلبة العين بيضاء .

ذهولي **carotic**

مـتـعلق بـالشـريان السـبـاتي أو أي من النسج السباتية وترادف كلمة (Carotid) كما يستعمل أيضاً كصفة متعلقة بحالة الذهول (Stuper) التي تخف فيـها استجابة الشخص للمنبهات المحيطة .

سُباتِيٌّ طَبْلِيّ **caroticotympanic**

متعلق بالنفق السباتي والطبل .

سباتي فقري **caroticovertebral**

متعلق بالشريان السباتي والشرايين الفقرية ، أو يصيب الشريان السباتي والشرايين الفقرية

السُّباتِيُّ **carotid**

متـعلق بالشـريان الرئيسي في العنق (الـشـريان السباتي الأصلي)

الشِّرْيانُ السُّباتِيُّ **carotid artery**

يســـمى أيضـــاً (Common carotid artery) ، (Arteria carotis communis) وهـو شــــريان رئيـسي ينشـأ عن قـوس الأورطي في الجـهـة اليسرى ، وأما الأيمن فيتفرع عن الجذع العضدي الرأسي (اللا اسم له سابقاً) ، ويتفرع كل منهما فوق مـستوى الغـضروف الدرقي إلى فـرعين أحدهما ظاهر ، والأخرى غائرة .

النَّفَقُ السُّباتِيُّ **carotid canal**

تسمى أيضَاً (Canalis caroticus) ، وهي قناة تمر من خـلال الصـخـرة في العظم الصـدغي من سطحها السفلي نحـو الأعلى والإنسي والأمام باتجاه الذروة المزقة وهي تنقل الشريان السباتي الباطن والضفائر الوريدية والأعصاب الذاتية .

العَصَبُ السُّباتِيُّ **carotid nerve**

غير مشبعة تنقلب إلى الفيتامين A في الحيوان بواسطة إنزيم في جدار المعى والكبد . البيتا كاروتين هو الطليعة الرئيسية للفيتامين A عند البشـر على الرغم من أنه اقل امـتـصـاصـاً من الريتينول .

بيتا كاروتين **beta carotene**

1 ـ المصاوغ بيتا للكاروتين عادة مايكتب بيتا كاروتين أو ب ـ كاروتين .

2 ـ يعطى مسـتـحضـر بيتا كـاروتين فـمـوياً للتخفيف من وخامة التحسس الضوئي عند المرضى المصـابين بالبـروتوبرفـيـرية المكونة للحمر .

وُجودُ الكاروتين في الدَّم **carotenemia**

فرط الكاروتين في الدم .

تَلَوُّنُ الجلد بالكاروتين **carotenoderma**

تلون الجلد بلون أصـفر مـحـمـر شاحـب يقلد اليَرَقان في حالات ارتفاع مقدار الكاروتين في الدم . ويسمى أيضاً (Carotenodermia) .

تَلَوُّنُ الجلد بالكاروتين **carotenodermia**

انظر تحت carotenoderma .

شِبْهُ كاروتيني **carotenoid**

1 ـ أي مـجـمـوعـة من الأصـبـغـة ذات اللون الأصفر إلى الأحمر الداكن ، تتألف من الناحية الكيـميـائية من أربعة تيربينات هيدروكـربونية (عديدات الإيزوبرين الهيدروكـربونية) ، تتخلق شبيهات الكاروتين في بدائيات النواة والنباتات الأعلى ، وتتركـز في الدهن الحـيـواني عندما تؤكل (إذ تدعى الصبـاغ الذواب في الشـحـم) وأمـــثلة ذلك هي البـــيـــتـــاكـــاروتين ، والكريبتوزانتين ، والليكوبين ، والزانثوفيل (في الأوراق الصفراء) .

2 ـ يتسم باللون الأصفر .

طلائع الفيتامين A **provitamin A**

الشبيهة بالكاروتين **carotenoid**

مـواد شـبـيـه بالكاروتين وبصـفـة خـاصـة الكاروتينات ، والكريبتـوزانتين التي يمكن أن تتحـول إلى الفـيتـامين A في الجـسـم ، وهي

تكتب (Carotene) ، (Carotin) ، (Carrotene) وهي مادة برتقالية اللون أو حمراء ، وتعتبر طليعة الفيتامين A وتوجد بشكل رئيسي في جذور الجزر .

وُجُودُ الكاروتين في الدَّم **carotinemia**

تسمى أيضاً (Carotenemia) ، (Carotenaemia) وهي حالة فرط زانثين الدم (Xanthemia) ووجود الكاروتين في الدم خاصة بمقادير عالية التي قد تسبب تصبغ الجلد بلون أصفر محمر شاحب يشبه حالة اليَرَقان .

الداء الكاروتيني **carotinosis**

تلون الجلد بلون أصفر محمر شاحب يشبه لون الصفراء عند ارتفاع البيليروبين في الدم ، وينجم عن الزيادة المفرطة في مقادير الكاروتين في الدم وتكون الرّاحتان والأخمصان والمناطق خلف الأذنين أشد ما يكون تلوناً ولكن تبقى صلبةُ العين بيضاء وتكتب (Carotinosis) .

إيلامُ السُّباتِي **carotodynia**

خَرُّوب **carouba**

نبات من الفصيلة القرنية .

انظر تحت carob .

كاروكسازون **caroxazone**

دَواءٌ مُضادٌّ للاكْتِئاب .

لاحقة بمعنى ثمَرَة **carp**

الجسم الثمري للفطور .

انظر تحت ascocarp .

انظر تحت basidocarp .

1ـ سابقة بمعنى ثمَرٌ فطَريٌّ **carp-**

2ـ سابقة بمعنى الرُّسُغ

سابقة طليعية في مقدمة المصطلح يمكن أن تدل على معنى الرسغ في الطب ، أو ما يتعلق بالفطر أو الثمر في المجالات الأخرى .

رُسُغِيّ **carpal**

متعلق بالرسغ أو بالمعصم ، أو من الرسغ أو من المعصم .

عَظْمٌ رُسُغِيّ **carpale**

هي في الواقع مجموعة من الأعصاب التي تعصب العصبين السباتي الظاهر والباطن على شكل ضفائر عصبية تمتد من فوق العقدة العنقية ، العقدة العنقية العلوية . ولذلك منه العصب السباتي الظاهري والعصب السباتي الباطني .

الغِمْدُ السُّباتِيّ **carotid sheath**


وَيسمى أيضاً (Vagina carotica) ، وهو نسيج ليفي يغلف الشريان السباتي والوريد الوداجي الباطن والعصب المبهم في الجانبين . وتستمر مع طبقات اللفافة الرقبية .

إغْماءُ الجَيب السُّباتي **carotid sinus syncope**

الإغماء الناجم عن ضغط الجيب السباتي ، لأنه يسبب تنبيهاً مبهمياً .

خُرَّاجُ الحَيِّز السُّباتيّ **carotid space abscess**

خراج قيحي ينتشر في منطقة الأفضية ما بين الشريانين السباتيين .



Carotid artery الشَّرْيانُ السُّباتِيُّ

إيلامُ السُّباتِي **carotidynia**

ألم رقبي نوائبي عادة مايكون وحيد الجانب مع مضض على طول الشريان السباتي الأصلي .

كاروتيناز (إنزيم) **carotinase**

كاروتين **carotine**

المثامرة (جنسٌ منَ السُّوس) Carpoglyphus

جنس من السوس من فصيلة الحلميات ، بعض الأجناس تحتشر داخل الثمار الجافة ، وتسبب التهاب الجلد عند متداولي هذه الثمار .

المُثامرةُ الزَّبيبيَّة Carpoglyphus passularum

وتسمى (Carpoglyphus lactis) ، وهي من نوع السوس الحلماوي (Acarine mite) ، والتي تسبب التهاب الجلد لدى الحصادين والمتعاملين مع الفواكة الجافة والتمر المتعفن والتراب أو الطين.

المِثْمار carpogonium

(العضو التكاثري الأنثوي في الفطريَّات)

1ـ العضو التكاثري الأنثوي في (القنيديات الزقية) لأعضاء رتبة الفقَّاوات ، من الفُطْريَّات .

2ـ العضو التكاثري الأنثوي في أي من الطحالب المختلفة .

3ـ القنيديات الزقية .

رُسْغِيٌّ سِنْعِيّ carpometacarpal

متعلق بالرسغ والسنع .

رُسْغِيٌّ قدَميّ carpopedal

متعلق أو يصيب الرسغ والقدم مثل التشنج الرسغي القدمي .

رُسْغِيٌّ سُلاميّ carpophalangeal

متعلق بالرسغ والسلاميات .

تدَلي الرُّسْغ carpoptosis

بَوغ مِثْماريّ carpospore

بوغ ضعفاني (ثنائي) في الطحالب الحمراء الذي ينتج بوغ رباعي بالإنتاش .

كارْبروفين carprofen

دَواءٌ مُضادٌّ للالْتهاب .

عملية كاربو، رأب الأنف Carpue's operation , rhinoplasty

[عملية جراحية منسوبة للطبيب جوزيف كونستانتين كاربو (Joseph Constantine Carpue) ، وهو جراح إنجليزي عاش مابين 1764-1846] .

انظر تحت rhinoplasty .

الكاربول Carpule

كرْبامات carpamate

إسترات حمض الكرباميك .

كاربازوات carpazotate

أي ملح لحمض البيكريك ، بيكرات .

استِئْصالُ الرُّسْغ (الجزْئيُّ أو الكليُّ) carpectomy

استئصال العظم الرسغي .

خِباء (في النبات) carpel

أحد المدقات الخلوية (Pistil) (المدقة أو الوزيم هما عضو التأنيث في الزهرة) ، أو أحد الأعضاء المؤلفة لمركب المدقة أو وعاء البذرة .

متلازمة كاربنتر Carpenter's syndrome

[متلازمة منسوبة للطبيب جورج كاربنتر (George Carpenter) ، وهو طبيب بريطاني عاش مابين 1859-1910] ، وهي تسنم الرأس وارتفاق الأصابع العنشي من النمط II .

كارفينازين ماليات carphenasine maleate

عامل فينوثيازيني مضاد للذهان يستعمل في معالجة التفاعلات الفصامية الحادة أو المزمنة للمرضى في المستشفيات ، ويعطى فموياً .

كارْفينازين carphenazine

دَواءٌ مُضادٌّ للفُصام .

نَتفُ الدثار carphologia

حركات لاإرادية أثناء الحمى .

نَتفُ الدثار carphology

(حركات لاإرادية أثناء الحمى)

حركات متواصلة في اليدين كأنها تحاول القبض (الإمساك) على حواصب متطايرة في الهواء أو كأن المريض يفتش على غطائه أو عن شيء ضائع .

التِهابُ الرُّسْغ carpitis

التهاب في الأغشية الزليلية لركبة الحصان (المفصل الرسغي) مع انتفاخ وألم وعرج ، ويسمى كذلك الركبة المتفرقعة .

carpo-

1ـ سابقة بمعنى ثمَرٌ فطريٌّ

2ـ سابقة بمعنى الرُّسُغ

رُسْغِيٌّ رُسْغِيّ carpocarpal

متعلق بجزئين من الرسغ ، وبصفة خاصة المفاصل بين عظام الرسغ .

الاسم التجاري لعبوة زجاجية مسدودة بالمطاط تحتوي محلول المخدر الموضعي، تلائم محققة خاصة للحقن تحت الجلد .

carpus — **رُسْغ (ج: أرْساغ)**

1 ـ الرسغ، المعصم : المفصل بين الذراع واليد، يتشكل من ثمانية عظام .

2 ـ منطقة من اليد بين الساعد والسنع .

3 ـ جزء من القائمة الأمامية لرباعيات الأقدام التي تتطابق مع الجزء نفسه عند البشر .

carpus curvus (=Madelung's deformity) — **تَقَوُّس الرُسْغ (=تشوه ماديلنج)**

انظر تحت madelung's deformity .

انظر تحت deformity .

carrageen — **كارّاجين**

1 ـ أشنة أيسلندة المتجعدة (Chondrus crispus) .

2 ـ أشنة أيسلندة (Chondrus) .

carrageenan — **الكارّاجينان**

(كارّاجين قرية في جنوب شرق أيرلندة)، أما الكارّاجينان فهو مشتق استخلاصي غرواني من بعض الطحالب البحرية الحمراء مثل أجناس أشنة أيسلندة، والايكيما (Eucheuma)، وجيجارتنا (Gigartina) ويتكون من مزيج من أملاح المغنيزيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم للحمض الكبريتي للجالاكتوز الذي يحتوي السكاكر العديدة . ويستعمل بصفة رئيسية كعامل معلق في الغذاء والأدوية ومستحضرات التجميل ويسمى كذلك الكارّاجينين .

carrageenin — **الكاراجيينين**

انظر تحت carrageenan .

carragheen — **الكارّاجين**

1 ـ أشنة أيسلندة كريسبس المجعدة .

2 ـ أشنة أيسلندة .

carragheenan — **الكارّاجينان**

انظر تحت carrageenan .

carragheenin — **الكارّاجينين**

انظر تحت carrageenan .

carrefour (= decussation) — **تصالب**

يسمى أيضاً (Decussation)، وفي اللاتينية (Decussatio)، وهو مكان تقاطع أي ألياف عصبية ضمن الجهاز العصبي في اتجاهين متعاكسين، كتصالبات الحزم الهرمية والألياف البصرية .

Carrel — **كاريل**

[الطبيب ألكسيس كاريل جراح من الولايات المتحدة من أصل فرنسي عاش مابين (1873-1944)]؛ حائز على جائزة نوبل في الطب والفيزيولوجيا عام 1912 عن أعماله في (رفو) الأوعية الدموية، ونقل الدم، وزرع الأعضاء .

Carrel-dakin fluid, treatment — **سائل كاريل ـ داكان، معالجة**

[معالجة منسوبة للطبيب ألكسيس كاريل (A.Carrel)، هنري دريسدال داكان (Henry Drysdale Dakin)، وهو صيدلاني من الولايات المتحدة من أصل إنجليزي عاش مابين 1880-1952] وهو محلول هيبوكلوريت الصوديوم المخفف .

carrel's method, treatment — **طريقة كاريل، معالجة**

[طريقة ومعالجة منسوبة للطبيب ألكس كاريل (A. Carrel)] .

انظر تحت method .

انظر تحت treatment .

carrier — **حامِل (ج: حَمَلَة)**

1 ـ أداة أو جهاز لحمل شيء ما .

2 ـ فرد يؤوي أحياء نوعية ممرضة من غير أعراض ظاهرة ولكنه قادر على نقل العدوى، إن حالة هذا الفرد يشار إليها كحالة الحامل .


3 ـ مادة كميائية تقبل إلكتروناً واحداً أو أكثر ثم تعطيه لمادة أخرى (أن تكون مختزلة ومن ثم

5ـ مادة تنقل نظيراً مشعاً أو واسماً آخر ، كما في دراسة التقفي . نظير ثانوي ممزوج مع نظير خاص ويشار إليه أيضاً كحامل .

6ـ بروتين ناقل يرتبط بحامل لمادة نوعية ، وبوجه خاص إحدى ناقلات المادة عبر الغشاء الخلوي .

7ـ في المناعة : المادة الجزيئية الكبيرة التي يقترن تصبح متأكسدة) ، وتسمى كذلك حاملة الإلكترون .

4ـ في الوراثة : فرد متغاير الزيجوت لجين متنحي ، ولذا لايعبر عن النمط الظاهري المتنحي ولكن يمكن أن ينقلها إلى النسل . أما النساء فهن فقط اللواتي يستطعن نقل الخلة المتنحية المرتبطة بالكروموسوم X .



مرواء كاريل لتعقيم الجروح الملوثة بالجراثيم : **Carrel Irrigator for Sterilizing Infected wounds**

طريقة كاريل **Carrel's method**

تنتقل الملاريا .

حاملُ الجين **gene carrier**
منَ يكونَ لديه جين مرضي وحيد بينما يكون مقابله سليم والخلل الوراثي من النوع المتنحي ، فلا تظهر أعراض المرض عليه ، كحامل جين الناعور .

حاملُ العَدْوَى الصَّحيح **healthy carrier**
الحَامل للعوامل المرضية العدوائية ولا يصاب بالمرض ، لقوة مناعته .

حاملُ النَّاعور **hemophilia carrier**
منَ يرث جين الناعور من أحد أبويه ، وهو عادة أنثى لأنه محمول على الكروموسوم X ، ويكون الجين المقابل على الكروموسوم المقابل سليم ، وأما الذكور فتظهر لديهم إصابة الناعور لعدم وجود جين سليم ينتج العامل الثامن .

حاملُ حضَانَة العَدْوَى **incubation carrier**
حَامل اَلعوامَل العدوائية في فترة حضانتها من الإصابة ، وهي الفترة التي لا تظهر فيها أعراض المرض بينما تكون عوامله قابلة للانتشار ، كالزكام أو الحصبة أو الحميراء في فترة الحضانة .

حاملُ العَدْوَى المُتَقَطِّع **intermittent carrier**
منَ يصاب بالعدوى بشكل متقطع ومتكرر ولا تظهر أعراض المرض عليه .

محشاء قناة الجذر **lentulo paste carrier**
انظر تحت lentulo .

حاملُ الرَّبْطَة **ligature carrier**
منَ توجد لديه ربطة سلكية ، كربطات الأسنان السلكية .

حامل العجينة **paste carrier**
انظر تحت lentulo .

حاملُ العَدْوَى المُؤَقَّت **temporary carrier**
منَ يمر بفترة وجيزة وهو يحمل العوامل العدوائية ثم تزول عنه نهائياً ولا تظهر عليه أعراض المرض .

حاملُ العَدْوَى بالبَول **urinary carrier**
منَ يحمل العوامل اَلعدوائية في جهازه البولي بها الناشب من أجل إنتاج الاستجابة المناعية ضد الناشب ، من ثم الرد المناعي .

حاملٌ فَاعلٌ **active carrier**
الحَامل اَلذي يمكنه نقل العدوى بوجود مخرج للعوامل المعدية .

حاملُ المُلْغَم (أسنان) **amalgam carrier**
أداَة لحمل الملغم الطازج الممزوج إلى الحفرة المحضرة .

حاملُ العَدْوَى المُزْمن **chronic carrier**
حَامل العدوى خَلال فترة طويلة دون أن يكتشف ولم يعالج.

حاملُ العَدْوَى المُقْتَفَل (غَيرُ مُعْد) **losed carrier**
الحَامل للعدوى أو العوامل اَلعدوائية ولكن ليس لها مخرج ، كالسل الحشوي .

حاملُ العَدْوَى المُخالط **contact carrier**
حَامل للعوامل العَدوائية ولا تظهر أعراض المرض عليه ويخالط الناس ويتماس معهم .

حاملُ العَدْوَى النَّاقه **convalescent carrier**
حَامل العوامل اَلمعدية ولم تشف منه تماماً ووصل إلى مرحلة النقاهة .

حاملُ الإلكْترون **electron carrier**
انظر تحَت carrier .

حاملُ العَدْوَى بالأَمْعَاء **enteric carrier**
حَامل العوامل المرضية المعدية بعد إصابته بها في الأمعاء . أو تكون من العوامل المرضية المعوية ولكن لم تظهر أعراضها عليه فهو يطرحها مع برازه .

حاملُ الرُّقاقَة **foil carrier**
انظرَ تحت passer .

حاملُ العَدْوَى بالمَرَارَة **gallbladder carrier**
حَامل العوامل المعدية في مرارته بعد إصابته بمرض تصيب عوامله الإمراضية المرارة وتستقر بها كالحمى التيفية .

حاملُ عرْسيَّات الملاريا **gametocyte carrier**
فيَ الملاَرياَ : شَخص لديه عرسيات الملاريا في مجرى دمه ، ولذا فهو قادر على نقل العدوى للناموس أو البعوض والتي تتغذى عليه وبذلك

داخلي المنشأ ، يعطى فموياً لمعالجة فرط الضغط الشرياني والذبحة الصدرية ، ويطبق موضعياً على الملتحمة لمعالجة الزرق .

Carthamus **الكارثاموس**

جنس من الأعشاب من الفصيلة المركبة ، متوطنة في أوربا وآسيا ، لها أزهار ذات ألوان ساطعة المركبة الملونة هي العصفر ، وهي مصدر زيت العصفر .

cartilage **غُضْرُوف (ج:غَضاريف)**

نسيج ضام ليفي متخصص ، يشكل معظم الهيكل المؤقت عند الجنين ، ويتحقق به نموذج لنماء أغلب العظام ، ويؤلف قسماً هاماً من آلية النمو في الكائن الحي ، يوجد بأنماط مختلفة ، أكثرها أهمية الغضاريف الهيالينية والغضاريف المرنة والغضاريف الليفية . ويستعمل مصطلح غضروف أيضاً بصفة عامة للدلالة على كتلة من هذا النسيج في مقر خاص من الجسم .

انظر تحت cartilago .

accessory cartilages of nose **غَضاريفُ الأَنْف الإضافيَّة**

انظر تحت cartilagines nasals accessoriae .

alar cartilage, greater **الغضروف الجناحي الكبير**

انظر تحت cartilage alalaris major .

alar cartilages, lesser **الغضاريف الجناحية الصغيرة**

انظر تحت cartilage cricoidea .

annular cartilage (=cartilago cricoidea) **الغُضْروفُ الحَلَقيُّ (= الغُضْروفُ الحلْقيّ)**

انظر تحت cartilago cricoidea .

aortic cartilage **الغُضْروفُ الأورطي**

الغضروف الضلعي الثاني في الجانب الأيمن .

arthrodial cartilage (=articular cartilage) **غُـضْـروفٌ مَـفْـصلـيّ**

انظر تحت articular cartilage .

articular cartilage **غُضْروفٌ مَفْصليّ**

ويطرحها مع البول دون أن تظهر الأعراض عليه .

carrier-free **خِلْوٌ مِنَ الحامِل (صفة للنظائر المشعة)**

مصطلح يبين أن النظير المشع لعنصر هو من الشكل النقي ، أساسياً غير مخفف بوساطة حامل النظير الثابت .

carrion's disease **داء كاريون**

[داء منسوب للطبيب دانييل كارّيون (Daniel.A Carrion) عاش مابين 1850-1885 ، وهو طبيب عاش في بيرو ، وقد لقح نفسه ثم مات بالداء] .

انظر تحت bartonellosis .

carrot **جَزَر (نبات من الفصيلة الخيمية)**

1 ـ شعبة الجزر (Daucus carota) .

2 ـ جذور صفراء أو برتقالية لنبات (Daucus carota) ، وهو طعام غني بالفيتامين A ، وبذوره مدرة للبول ومنبهة .

carrotene **كاروتين**

انظر تحت carotine .

cart **عَرَبَة**

أداة نقل ذات عجلات لحمل المرضى ، أو التجهيزات ، أو الإمدادات ، أو المعدات في المستشفى .

crash cart (=resuscitation cart) **عَرَبَةُ الإنْعاش**

انظر تحت resuscitation cart .

dressing cart **عَرَبَةُ التَّضْميد**

عربة تحتوي جميع الإمدادات والمعدات الضرورية ؛ التي ربما تكون ضرورية لتغيير الضمادات للمرضى الجرحى أو المصابين .

resuscitation cart **عَرَبَةُ الإنْعاش**

عربة تحتوي جميع المعدات الضرورية للمبادرة بالإنعاش الإسعافي .

cartazolate **كارْتازولات**

دَواء مضادٌ للاكْتئاب .

carteolol **كارْتيلول (دواءٌ مُناهِضٌ للأدرينيَّات)**

عامل محصر للأدرينيات بيتا ، وله نشاط ودي

cartilage of nasal septum **غُضْروفُ الحَاجز الأَنْفيّ ؛ غُضْروفُ الوَتيَرة**

cartilages of nose **غَضاريفُ الأَنْف**

cartilagines nasales **غضاريف الأنف**

cellular cartilage **غُضْروفٌ خَلَويّ**

ضرب من الغَضاريف يتركب بأكمله تقريباً من الخلايا مع قليل من مادة خلالية ، ويسمى أيضا (Parenchymatous cartilage) .

ciliary cartilages **الغَضاريفُ الهَدَبيَّة**

انظر تحت palpebral cartilages .

circoid cartilage **الغضروف الحلقي**

انظر تحت cartilage cricoidea .

circumferential cartilage **غُضْروفٌ كِفَافيّ**

انظر تحت labrum glenoidale .

conchal cartilage **غُضْروفٌ مَحاريّ**

قسم من الغضرَوف الأذني الموجود في المحارة .

condylar cartilage **الغُضْروفُ اللُّقْميّ**

الغضروف المفَصلي الذي يوجد في المفاصل اللقمية الشكل والتي تأخذ نموذج الحق والكرة .

connecting cartilage **غُضْروفٌ اتِّصاليّ**

غضروف اتصَالي في سطوح المفاصل الثابتة ، ويسمى أيضاً (Interosseous cartilage) .

corniculate cartilage **الغُضْروفُ القُرَينيّ**

انظر تحت cartilago corniculata .

costal cartilage **غُضْروفٌ ضِلْعيّ**

انظر تحت cartilago costalis .

costal cartilage, interarticular, **الغضروف الضلعي بين المفاصل**

انظر تحت ligamentum sternocostale intraarticulare .

cricoid cartilage **الغُضْروفُ الحَلْقيّ**

انظر تحت cartilago cricoidea .

cuneiform cartilage **الغُضْروفُ الإسْفينيّ**

انظر تحت cartilago cuneiformis .

dentinal cartilage **غُضْروفٌ عاجيّ**

المادة المتبقية بعد ذوبان أملاح الجير للعاج في الحمض .

طبقة رقيقة من الغضروف الهيالِيني على الأغلب ، تتوضع على السطح المفصلي للعظم في المفاصل الزلالية وتسمى أيضاً (Cartilago articularis) ، (arthrodial cartilag) ، (Investing cartilage) ، (diarthrodial cartilage) .

arytenoid cartilage **الغُضْروفُ الطِّرْجهاليّ**

انظر تحت cartilage arytenoidea .

auricular cartilage **غُضْروفُ الأُذُن**

ويسمى أيضاً (cartilage of auricle) هو الصحيفة الداخلية للغضروف المرن الموجود في صيوان الأذن الظاهرة .

انظر تحت cartilago auricularis

basal cartilage **الغُضْروفُ القاعديّ**

(= basal plate) **(= الصفيحة القَاعدية)**

هو غشاء ليفي يستر الثقبة الممزقة في الدماغ وتسمى أيضاً (Basal plate) ، (Basilar cartilage) ، (Fibrocartilago basalis) .

basilar cartilage **الغُضْروفُ القاعديّ**

انظر تحت basal cartilage .

branchial cartilage **غُضْروفٌ خَيْشُوميّ**

أحد أعواد الغضرَوف في الأقواس الخيشومية في الجنين ، ويسمى أيضاً (Pharyngeal cartilage) .

calcified cartilage **غُضْروفٌ مُتكَلِّس**

الغضروف الذي تترسب فيه حبيبات فسفات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم من المادة الخلالية .

cariniform cartilage **الغُضْروفُ الجُؤْجُؤيّ الشَّكْل**


استطالة غضروفية في النهاية الأمامية لعظم القص عند الحصان .

cartilage of acoustic meatus **غُضْروفُ صِماخ السَّمْع**

انظر تحت cartilago meatus acustici .

cartilage of auditory tube **غُضْروفُ النَّفير السَّمْعيّ**

cartilage of auricle **غُضْروفُ الأُذُن**



Alar Cartilages (Greater & Lesser) الغضاريف الجناحية (الكبيرة والصغيرة)

المستحصل عليه من الأجنة ، ويفيد في الدرسات المختبرية الخلوية الخاصة بزراعة النسج وتركيب الخلايا .

الغُضْروفُ الحَنْجَرِيّ (= الرَّهابَة) **ensiform cartilage (=processusxiphoideus)**

انظر تحت processus xiphoideus .

غَضاريفُ الأَنْف الإضافيَّة **epactal cartilages**

هي صفيحاتَ غضروَفية صغيرة تتوضع في المسافات بين الجناح الكبير للأنف والغضاريف الأنفية الجانبية وتسمى أيضاً (Cartilagines nasales accessoriae) ، (Accessory nasal cartilages) ، (Sesamoid cartilages of nose) .

غُضْروفُ لسان المزْمار **epiglottic cartilage**

انظر تحتَ cartilago epiglottica .

غُضْروفٌ مُشاشيّ **epiphyseal cartilage**

انظر تحت cartilago epiphysialis.

غُضْروفٌ مَفْصِليّ **diarthrodial cartilage (=articular cartilage)**

انظر تحت articular cartilage .

غُضْروفُ ظاهِر الغرْبالي **ectethmoidal cartilage**

الغَضروف المتعلق بالمنطقة الظاهرية من العظم الغربالي (المصفاوي) في أعلى الأنف .

غُضْروفٌ مارن **elastic cartilage**

مادة أكثر عتَامة ومرونة وتمططاً من الغضروف الهياليني ، وتتميز بالإضافة إلى ذلك باللون الأصفر ، تخترق مادتها الخلوية من جميع الاتجاهات بألياف متفرعة كثيرة تعطي جميع التفاعلات مع المطاط ، ويسمى أيضاً (Yellow cartilage) ، Reticular cartilage .

غُضْروفٌ مُضْغي **embryonic cartilage**

يسمى أيضاً (Fetal cartilage) ، وهو الغضروف

الجزء الأمامي من جناح الأنف . ويسمى أيضاً (Cartilago alaris major) .

غُضْروفُ النُّمو **growth cartilage**
الغضروف القابل للنمو فيزيد من طول العظم الطويل وأشده في فترة المراهقة عادة بتأثير هرمون النمو والهرمونات الجنسية ، ومثاله منطقة الاتصال بين جدل العظم الفخذي ومشاشته .

الغُضْروفُ الحَنْجَري **guttural cartilage**
هو أحد زوجي الغضروفين الحنجريين الهرميين التي تتمفصل مع صفيحة الغضروف الحلقي ، ويعطي وصلات للقسم الخلفي من أربطة الحبال الصوتية ذات العلاقة به والعضلات المختلفة ويسمى أيضاً (Cartilago arytenoidea) ، و (Arytenoid cartilage) ، و (triquetrous cartilage) .

الغضروف الهياليني **hyaline cartilage**
مادة مرنة وفي بعض الأحيان مطاطة نصفً شفافة بلون غميم مزرق ، تتكون من مادة خلالية تحتوى لفيفات قاعدية وبها أجواف توجد فيها الخلايا الغضروفية . ويسمى أيضاً (Chondroid) .

الغُضْروفُ السُّفْلِي للأَنْف **inferior cartilage of nose**
انظر تحت cartilago alaris major .

الغُضْروفُ اللامُسَمَّى (= الغُضْروفُ الحلْقي) **innominate cartilage (= cartilago cricoidea)**
انظر تحت cartilago cricoidea .

الغُضْروفُ بَيْنَ المَفْصل (=الرِّباطُ الخَلْفي الطُّولاني) (=قُرْصٌ داخل المَفْصل) **interarticular cartilage (=ligamentum longitudinale posterius) (=an interarticular disk)**
انظر تحت ligamentum longitudinale posterius .

الغُضْروفُ فَوقَ القَصِّ **episternal cartilage**
مرحلة جنينية من تكوين العظام والأطراف تلتحم فيها القضبان اليمينية واليسارية من القص رأسياً لتكون الغضروف فوق القص .

غضروف يوستاكيوس (=غضروف النفير السمعي) **eustachian cartilage (=cartilago tubae auditivae)**
انظر تحت cartilage tubae auditivae .

الغُضْروفُ الهلالِيُّ الظَّاهِرُ لمَفْصِل الرُّكْبَة **external semilunar cartilage of knee joint**
هو نسيج غضروفي ليفي يوجد على السطح الخارجي الوحشي من السطح المفصلي للظنبوب مع الركبة ويسمى أيضاً (Meniscus lateralis) ، و (External semilunar fibrocartilage) ، و (lateral meniscus) .

الغَضاريفُ المِنْجَلِيَّة **falciform cartilages**
انظر تحت meniscus lateralis articulations genus .
انظر تحت meniscus medialis articulations genus .

غُضْروفٌ جَنيني **fetal cartilage**
انظر تحت embryonic cartilage .

القوس الغضروفية الأولى **first arch cartilage**
انظر تحت Meckel's cartilage .

غُضْروفٌ عائم **floating cartilage**
قطعة مفصولة عن الغضروف ، عادة ماتكون من السطح المفصلي للقمة الأنسية لعظم الفخذ ، ولكنها قد تكون من الرضفة أو اللقمة الوحشية لعظم الفخذ .

غُضْروفٌ لثَوي **gingival cartilage**
هو نسيج يغطي المسكن الذي يحتوي السن المنطمرة .

الغُضْروفُ الجَناحيُّ الكَبير **greater alar cartilage**
هو أحد زوجي الغضاريف التي تشكل ذروة الأنف ، وله ساق إنسية تمتد للحاجز الأنفي ملتقية من الساق المقابلة وساق وحشية تشكل

غُضْروفٌ مَفْصليّ **investing cartilage (=articular cartilage)**
انظر تحت articular cartilage .

غُضْروفُ جاكُوبْسُون **Jacobson's cartilage**
الغُضْروفُ المِيكَعِيُّ الأَنْفيُّ) **(=cartiglago vomeronasalis)**
انَظر تحت cartilago vomeronasalis .

الغُـضـروفُ الحَنْجَـري بحسب لُوشكا **laryngeal cartilag of Luschka**
(=الغُضْروفُ السِّمْسَمانيُّ للحبْل الصوْتي) **(= cartilago sesamoidea ligamenti vocalis)**
انَـظـر تحـت cartilage sesmoidea ligamenti vocalis .

الغَضاريفُ الحَنْجَريَّة **laryngeal cartilages**
انـظر تحـت cartilagines ، articulalationes la-ryngeales .

الغُضْروفُ الوَحْشِيُّ للأَنْف **lateral cartilage of nose**
انظر تحت cartilage nasi lateralis .

الغضاريف الوحشية **lateral cartilages**
الغضـاريف من نهاية السلامى الثالثة إلى عقب الحافر ، وذلك عند الخيول .

الغُضْروفُ الجَناحيُّ الصَّغير **lesser alar cartilage**
هو الغضـروف الأصغر من غضـاريف الجناح الأنفي الغضروفي ، ويقع في الخلف والأسفل وراء الغضروف الكبير .

غُضْروفُ لُوشْكا **Luschka's cartilage**
(= الغُضْـروفُ السمسماني للحبْل الصَّوتي) **(=cartilago sesamoidea ligamenti vocalis**
انـظر تحـت cartilage sesamoidea ligamenti vocalis .

غُضْروفُ الفَكِّ السُّفْليّ (في الجنين) **mandibular cartilage**
هو غضروف ميكل .

الغُضْروفُ بَيْنَ مَفاصل الأَضلاع داخل مفصَل الرَّأس الصَّغير للضِّلَع **interarticula cartilage of little head of rib**
الرباط الداخلي المفصلي لرأس الضلع .

الغُضْروفُ الضِّلْعيُّ بَيْنَ المَفَاصل **interarticular costal cartilage**
هو الغـضـروَفَ الذي يمثل امـتـداد الضـلـع حتى عظم القص الـذي يرتكز عليه . ويسـمى أيضاً الرِّبـاطُ القَــصِّيُّ الـضِّلْعيُّ بَيْنَ المَفَــاصل (Ligamentum sternocostale intraarticulare) .

الغُضْروفُ الهلاَلي الغَائرُ لَمِفْصل الرُّكْبَة **internal semilunar cartilage join knee of**
يرتبط هذا الغضروف بالحافة الإنسية العلوية من تمفصل الظنبوب مع الركبة . ويسمى أيضاً Fal-ciform cartilage) ، fi-) (Internal semilunar brocartilage of knee joint) ، Medial menis-cus) .

الغُضْروفُ بَيْنَ العظام (= غُضْروفٌ اتِّصاليّ) **interosseous cartilage (=connecting cartilage)**
انظر تحَت connecting cartilage .

الغُضْروفُ داخلَ العظم الوَتديَ **intersphenoid cartilage**
غضروف ينَمَو بين عظام العظم الوتدي ليسمح له بالنـمو متناسباً مع نمو الدماغ خـلال السنة الأولى من العــمــر ، فــإذا توقف نمو هـذه الغضـاريف بين قطع العظام القـحـفـية يحـدث الانغلاق البـاكر لهذه العظام والمفاصل القحفية فتسبب ضمور الدماغ .

الغَضاريفُ بَيْنَ الفقَرات **intervertebral cartilages**
انظر تحَت disci intervertebrales .

الغُضْروفُ دَاخلَ الدَّرَقيّ (في الجنين) **intrathyroid cartilage**
غضـروف يربط بين أجنحة الغضـروف الدرقي في الحياة المبكرة .

الغضروف الأنفي العلوي **nasal cartilage, superior**
انظر تحت cartilago nasi laterails .

الغضروف الأنفي العلوي الوحشي **nasal cartilage, upper lateral**
انظر تحت cartilage nasi laterails .

غَضاريفُ الأَنْف **nasal cartilages**
انظر تحت cartilagines nasi .

غَضاريفُ الأَنْفِ الإضافيَّة **nasal cartilages accessory**
1 ـ غَضَاريفُ الأَنْف الإضافيَّة .
2 ـ الغضاريف الجناحَيةَ الصَغيرة .

غُضْروفٌ مَفْصِليّ **obducent cartilage (=articular cartilage)**
انظر تحت articular cartilage .

غُضْروفٌ مُعَظِّم (= غُضْروفٌ مُؤَقَّت) **ossifying cartilage (=temporar cartilage)**
انظر تحت temporary cartilage .

غَضاريفُ الجَفْن **palpebral cartilages**
هيكل غضروفي ثابت يعطي الشكل للجفنين .
انظر تحت tarsus superior palpebrae .
انظر تحت tarsus inferior palpebrae .

الغُضْروفان الُمجاوِران للحَبْل (في الجَنَين) **parachordal cartilages**
غضروفان على جانبي القسم القذالي للقردود (Notochord) عند الجنين .

الغُضْروفُ الُمجاوِرُ لـلأَنْف **paranasal cartilage**
يسمى أيضاً (Paries lateralis nasi) .

الغُضْروفُ الُمجاوِرُ للحَاجز **paraseptal cartilage**
هو شرَيط غضروفي ضيق يتوضع بين الحافة السفلية لغضروف الحاجز الأنفي والميكعة ويسمى أيضاً (Cartilago vomeronasalis) ، (Jacobson's cartilage) ، (Vomerine cartilage) ، (Vomeronasal cartilage) .

انظر تحت Meckel's cartilage .

غُضْروفُ الصِّماخِ السَّمْعي **meatal cartilage**
انظر تحَت cartilago meatus acustici .

غُضْروفُ ميكل (= غُضْروفُ الفَكِّ السفلي) (في الجنين) **Meckel's cartilage (=mandibular cartilage)**
عارضة غضروفية (عند الجنين) يتحول فيها اللب المتوسطة للناتئ الفكي من القوس الفكي الأول ، منها أو من غمدها ، ويتطور الرباط الوتدي الفكي والرباط الكعبي الأمامي والمطرقة والسندان . ويسمى أيضاً (First arch cartilage) ، (Mandibular cartilage) ، (Tympano-mandibular cartilge) ، (Meckel's cord) .

غُضْروفُ بَاطِنِ الغرْبالي **mesethmoid cartilage**
القَسمَ الإنسي من القاعدة القحفية الأمامية ، ويتكون في قسم منه من الغضروف قبل الإسفيني . ويبقى غضروفياً حتى بعد الولادة وله دور كبير في مورفولوجيا الوجه .

الغَضاريفُ الصَّغيرَة **minor cartilages**
هي الغضاريف الأنفية الإضافية (Cartilagines nasales accessoriae) .

الغُضْروفُ الُمسْتَدِقُّ الطَّرَف (= الناتئ الرهباوي) **mucronate cartilage (=processus xiphoideus)**

الغضروف الأنفي السفلي **nasal cartilage inferior**
هو الغضروف الأنفي السفلي الوحشي .
انظر تحت cartilago alaris major .

الغضروف الأنفي الوحشي **nasal cartilage, lateral**
انظر تحت cartilage nasi lateralis .

الغضروف الأنفي الوحشي السفلي **nasal cartilage, lower lateral**
انظر تحت cartilage alaris major .

اللامي . وتسـمى أيضـاً (Second arch cartilages) .

غُضْروفٌ شَبَكِيّ (= غُضْروفٌ مارن) **reticular cartilage (=elastic cartilage)**

انظر تحت elastic cartilage .

غُضْروفُ سانتوريني (= الغُضْروفُ القُرَيْنِيّ) **Santorini's cartilage (=cartilago cornu culata)**

انظر تحت cartilage corniculata .

الغُضْروفُ التُّرْسِيُّ الشَّكْل **scutiform cartilage**

هو أكبر غـضرَوف في الحنجـرة ويتـشكل من صفيحتين رباعيتا الأضلاع تقريباً ، يرتبطا أمامياً بزاوية بين 90-120 درجة وتشكل بذلك البروز الحنجري المعروف بتفاحة آدم ، ويسمى أيضاً (Cartilago thyroidea) ، (Thyroid cartilage) .

الأقواس الغضروفية الثانية **second arch cartilage**

انظر تحت Reichert's cartilages .

الغضروف الهلالي الظاهر لمفصل الركبة **semilunar cartilage of knee joint , external**

هذا الغـضـروف هو الهـلالة الوحشـية لمفـصل الركبة .

الغضروف الهلالي الغائر لمفصل الركبة **semilunar cartilage of knee joint , internal**

هذا الغـضـروف هوالهـلالة الإنسـية لمفـصل الركبة .

غُضْروفُ الحَاجز الأَنْفيّ ؛ غُضْروفُ الوَتيرَة **septal cartilage of nose**

انظر تحت cartilage septi nasi .

غُضْروفُ الحَنْجَرَة السِّمْسمانيُّ **sesamoid cartilage of larynx**

انـظر تحـت cartilago sesamoidea ligamenti vocalis .

الغُضْروفُ السِّمْسمانيُّ للرِّبَاط الصَّوتيّ **sesamoid cartilage of vocal ligament**

انـظر تحـت cartilago sesamoidea ligamenti vocalis .

غُضْروفٌ مَتْنِيّ **parenchymatous cartilage**

انظر تحت cellular cartilage .

الغُضْروفُ حَولَ الأُذُن **periotic cartilage**

هو كتلة بيضة فوق سَطح القحف الغضروفي الجنيني المغمد للأذن الداخلية .

غُضْروفٌ دائم **permanent cartilage**

هو الغضروف الذي لا يتحول عظماً بطبيعته .

غضروف بلعومي **pharyngeal cartilage**

انظر تحت brancheal cartilage .

الغُضْروفُ الحلْقيُّ الطِّرْجهاليّ الخَلْفيّ **posterio cricoarytenoid cartilage**

الغضـروف الموجـود في المنطقة الخلفيـة من الغضـروفين الحلقي والطرجـهالي في بعض الحيوانات .

غُضـروفٌ طَليـعيّ (= غُضْروفٌ مؤقَّت) **precursory cartilage (=temporary cartilage)**

انظر تحت temporary cartilage .

الغُضْروفُ الرِّئَويُّ **pulmonary cartilage**

الغـضـروف الضلعي الثـالث على الجـانب الأيسر .

الغُـضْـروفُ الهَـرَميّ **pyramidal cartilage**

هو أحـد زوجين غَـضـروفـيين هرمـيين من الغضاريف الحنجرية ، ويتمفصل مع صفيحة الغضروف الحلقي ويعطي ارتباطات مع القسم الخلفي من الرباط الصـوتي ذي العـلاقـة مع عضلات الحنجرة ويسمى أيضاً (cartilago ary-tenoidea) ، (Arytenoid cartilage) ، (Trique-trous cartilage) .

الغضروف الرباعي **quadrilateral cartilage**

الغضروف الوحشي للأنف .

انظر تحت cartilage nasai lateralis .

غَضاريفُ رايخيرْت **Reichert's cartilages**

[غضاريف منسوبة لرايخيرت (Reichert)] ، وهي عوارض غضروفية في الجانب الوحشي للطبلة المضغية التي يتطور منها الناتئ الإبري ، والأربطة الإبرية اللامية والقرون الصغيرة للعظم

sesamoid cartilages of nose **غَضاريفُ الأَنْفِ السِّمْسمانيَّة**

1 ـ الغَضارِيف الأنفية الإضافية .

2 ـ الغضاريف الجناحية الصغيرة .

sigmoid cartilages **الغَضاريفُ السِّينِيَّة**

انـظـر تحـت meniscus lateralis articulation genus .

انـظـر تحـت meniscus medialis articulation genus .

slipping rib cartilages **غَضاريفُ ضِلْعِيَّةٌ مُنْزَلِقَة**

ضعف وتقلقل وتشوه في الغضاريف الضلعية ، مما ينتج عنه أعراض مؤلمة .

sphenobasilar cartilage **الغُضْروفُ الوَتَدِيُّ القاعدِيّ**

الغـضَـرُوف المرتبط بالعظم الوتدي والنتـوء القـاعدي من العظم القـذالي . ويسـمى أيضـاً (Spheno-occipital cartilage) .

spheno-occipital cartilage **الغُضْـروفُ الوَتَدِيُّ القَذالي**

انظر تحت sphenobasilar cartilage .

sternal cartilage (=cartilago costalis) **الغُضْروفُ القَصِّيّ (= الغُضْروفُ الضِّلْعيّ)**

انظر تحت cartilage costalis .

stratified cartilage (=fibrocartilage) **غُضْروفٌ مُطَبَّق (=غُضْروفٌ لِيفيّ)**

انظر تحت fibrocartilage .

subvomerine cartilage (=cartilago vomeronasalis) **الغُضْرُوفُ تَحْتَ الميْكَعَة (=الغُضْرُوفُ الميكَعيُّ الأَنْفيّ)**

انظر تحت cartilago vomeronasalis .

supra-arytenoid cartilage (=cartilago corniculata) **الغُضْـروفُ فَوقَ الطِّرْجهاليّ (=الغُضْروفُ القُرَينيّ)**

انظر تحت cartilage corniculata .

suprascapular cartilage **الغُضْروفُ فَوقَ الكَتِف**

غـضَـرَوف يوجـد في الزنار الكتـفي بشكل واضح في الطيور .

tarsal cartilages **غَضاريفُ الجَفْن**

انظر تحت palpebral cartilages .

temporary cartilage **غُضْروفٌ مُؤَقَّت**

هو أي غـضـروف يستـعـاض بالعظم ، أو أي غضروف مقدر له أن يستعاض بالعظم بصفة طبيعية ، ويسمى أيضاً (Ossifying cartilage) ، (Precursory cartilage) .

tendon cartilage **غُضْروفٌ وَتَرِيّ**

شكل من الغَـضـروف الجنيني الذي تلتـحـم بوساطته الأوتار مع العظام .

thyroid cartilage **الغُضْروفُ الدَّرَقِيّ**

انظر تحت cartilago thyroidea .

tip cartilage **غضروف مستدق**

انظر تحت cartilago alaris major .

tracheal cartilage **غُضْروفٌ رُغاميّ**

انظر تحت cartilagines tracheales .

triangular cartilage of nose **الغُضْروفُ المُثَلَّثِيُّ الأَنْفيّ**

انظر تحت cartilage nasi lateralis .

triquetral cartilage (=cartilago arytenoidea) **الغُضْروفُ المُثَلَّثُ الزَّوايا (=الغُضْروفُ الطِّرْجهاليّ)**

1 ـ الغُضْرُوفُ الطِّرْجهاليُّ .

2 ـ القرص المفصلي للمَفصل الكعبري الزندي القاصي .

triradiate cartilage **الغُضْروفُ الثُّلاثيُّ الشُّعَب**

غضـروف يوجَد في المفصل الوركي الفـخذي في التجويف الحقي .

انظر تحت cartilago triticea .

triticeal cartilage (=cartilago triticea) **الغُضْروفُ القَمْحيّ**

انظر تحت cartilago triticea .

انظر تحت elastic cartilage .

كارْتيلاجين **cartilagin**

(بروتين الغضروف)

بروتين موجود في الغضروف ، يتحول بوسطة الغليان إلى الكوندرين ، ويسمى كذلك مولد الكوندرين .

غَضاريف **cartilagines**

(ف: غُضْروف) (sing. cartilago)

جمع غضروف .

انظر تحت cartilago .

تغضْرُف **cartilaginification**

مصطلح يعني التحول إلى غضروف .

غُضْروفِيُّ الشَّكل **cartilaginiform**

مشابه للغضروف ، ويسمى كذلك «شبيه الغضروف» .

شَبِيْهُ الغُضْرُوْفِ **cartilaginoid**

انظر تحت cartilaginiform .

غُضْروفِيّ **cartilaginous**

يتكون من الغضروف أو من طبيعة غضروفية .

غُضْروف **cartilago**

(ج: غَضاريف) (pl.cartilagines)

تسمية تشريحية عامة لكتلة من النسيج الضام الليفى المتخصص في مقر خاص في الجسم .

الغَضاريفُ الجَناحيَّةُ الصَّغيرَة **cartilagines alares minores TA**

غضاريف صغيرة مختلفة تتوضع من النسيج الليفي لجناحي الأنف الخلفيين إلى الغضروفين الجناحيين الكبيرين . وتسمى أيضاً (accessory cartilages of nose) ، (Sesamoid cartilages) .

الغضاريف والمفاصل الحنجرية **cartilagines et articulationes laryngeales**

تتضمن غضاريف الحنجرة الغضروف الحلقي والدرقي واللسان المزماري ، وزوج لكل من الغضاريف الطرجهالية والقرينية والإسفينية بالإضافة إلى المفاصل فيما بينها .

الغضاريفُ المِنْجَلِيَّة **cartilagines falcatae**

(الغَضاريفُ الهَلاَليَّةُ لِمَفْصل الرُّكْبَة)

غُضْروفُ النَّفير **tubal cartilage**

انظر تحت cartilago tubae auditivae .

الغُضْروفُ الطَّبْليُّ الفكِّيُّ السُّفْليّ **tympanomandibular cartilage**

انظر تحت Meckel's cartilage .

غُضْروفٌ اتِّحاديّ **uniting cartilage**

هو الغضروف الذي يمثل وصلاً بين عظمين كالوصل بين الشعبتين العانيتين . ويسمى الغضروف الاتصالي (Connecting cartilage) ، (Interosseous cartilage) .

الغضروف العلوى الوحشي **upper lateral cartilage**

انظر تحت cartilago nasi lateralis .

الغُضْروفُ الميكَعيُّ **vomerine cartilage**

شريط غضروفي ضيق يتوضع بين الحاجز الأنفي وعظم الميكعة ، ويسمى أيضاً (Vomeronasal cartilage) .

الغُضْروفُ الميكَعيُّ الأَنْفيّ **vomeronasal cartilage**

انظر تحت cartilago vomeronaslis .

غُضْروفُ فايتبريخت **Weitbrecht's cartilage**

(=القُرْصُ المَفْصليُّ للمَفْصل الأخْرَمِيِّ التَّرقُوي) **(=discus articularis articulationis acromioclavicularis)**

انظر تحت discus articularis articulationis acromioclavicularis .

غُضْروفُ ريزبيرغ **Wrisberg's cartilage**

(=الغُضْروفُ الإسْفينيُّ) **(=cartilago cuneiformis)**

انظر تحت cartilago cuneiformis .

الغُضْروفُ الخَنْجَريّ **xiphoid cartilage**


انظر تحت processus xiphoideus .

الغُضْروفُ بشكْل Y **Y cartilage**

غضروف بشكل الحرف (Y) فى الحُقّ ، ويصل بين المفصل الحرقفي والإسك والعانة .

الغُضْروفُ الأَصْفَر **yellow cartilage**

(=غُضْروفٌ مَرِن) **(=elastic cartilage)**



Thyroid cartilage **الغُضْروفُ الدَّرَقِيُّ**

انظر تحت cartilagines alares minors .

انظر تحت cartilagines septinasi .

انظر تحت cartilagines vomeronasalis .

الغـضـاريف الأنفيـة **cartilagines nasi**
الإضافية **accessoriae**
غـضـروف صـغيـر أو أكثـر في كل جـانب من الأنف بين الغــضــروف الجناحي الكبــيــر والغـضـروف الأنفي الوحـشي ، وتسمى أيـضاً (Accessory or sesamoid cartilages of nose) .

غَضاريفُ الأَنْف **cartilagines nasi TA**
الغضاريف الأنفية .

غَضاريفُ الأَنْف **cartilagines sesamoideae**
السِّمْسمانيَّة **nasi**
غضاريَف صَغيرة جداً مرنة إضافية توجد مع

انظر تحت meniscus lateralis articulationis genus .

انظر تحت meniscus medialis artriculationis genus .

غَضاريفُ **cartilagines**
الحَنْجَرَة **laryngeales TA**
انظر تحت cartilagines et articulations laryngeales .

غَضاريفُ الأَنْف **cartilagines nasales**
الإضافيَّة **accessoriae TA**
انظر تحت cartilagines nasi accessoriae .

الغضاريف الأنفية **cartilagines nasi**
انظر تحت cartilagines nasi lateralis .
انظر تحت cartilagines alaris major .

بوساطتها النهاية البطنية للضلع مع القص في حالة الأضلاع الحقيقية ، أو إلى الأضلاع العلوية المجاورة في حالة الأضلاع العلوية الكاذبة .
انظر تحت sternal cartilage .

الغُضْروفُ الحلْقيُّ **cartilago cricoidea TA**
غضروف حلَقيّ الشكل يشكل القسم السفلي والخلفي من الحنجرة ، ويسمى أيضاً (Annular or innominate cartilage) .

الغُضْروفُ الإسْفينيّ **cartilago cuneiformis**
زوج من الغَضاريَف ، واحد على كل جانب من الثنية الطرجهالية اللسان مزمارية . ويسمى كذلك الغضروف الريزبرغي .
انظر تحت Wrisberg's cartilage .

الغُضْروفُ الخَنْجريّ **cartilago ensiformis (=processus xiphoideus)**
انظر تحت processs xiphoideus .

غُضْروفُ لسان المزْمار **cartilago epiglottica TA**
صفيحة من الغضروف التي تؤلف القسم المركزي للسان المزمار .

غُضْروفٌ مُشاشيّ **cartilago epiphysialis TA**
قرص أو صفيحة من الغضروف تتوضع مابين المشاشة وجدل (Shaft) العظم في خلال مرحلة النمو ، ويزداد طول العظم بوساطة نموها . وتسمى أيضاً (Epiphyseal disk or plate and growth disk or plate) .

غُضْروفُ جاكوبسون (=الغُضْروفُ الميْكَعيُّ الأنْفيّ) **cartilago Jacobsoni (=cartilago vomeronasalis)**

غُضْرَوفُ صِماخِ السَّمْع **cartilago meatus acustici TA**
غضروف شكله كالترفة (الترفة : مسقاة يشرب بها) ، وهو القسم الغضروفي لصماخ السمع الظاهر . ويسمى أيضاً (Meatal cartilage) .

الغُضْروفُ الوَحْشِيُّ للأنْف **cartilago nasi lateralis TA**

غضاريف جناح الأنف قد لا توجد لدى جميع الناس .

غَضاريفُ الرُّغامَى **cartilagines tracheales TA**
الغضاريف الرغامية : من 16-20 حلقة غير كاملة ، والتي تتماسك مع بعضها بغشاء ليفي مطاطي قوى ، تؤلف جدار الرغامى ، وتسمى كذلك الحلقات الرغامية .

الغُضْروفُ الجَناحيُّ الكَبير **cartilago alaris major TA**
غضروفان منحنيان رقيقان ، يقع كل واحد منهما على جانب من قمة الأنف ، يمتلك كل منهما ساقاً وحشية وساقاً أنسية ، ويسمى كذلك الغضروف السفلي للأنف ، أو الغضروف السفلي الوحشي للأنف ، أو غضروف الذروة .

غُضْروفٌ مَفْصليّ **cartilago articularis TA**
طبقة رقيقة منَ الغضروف الهياليني في العادة ، على السطح المفصلي للعظم في المفاصل الزليلية . ويسمى أيضاً غضروف سطح المفصل ، الغضروف المغطى ، وغضروف التكسية .

الغُضْروفُ الطِّرْجهاليُّ **cartilago arytenoidea TA**
واحد مَن زَوج من الغضاريف الشبيهة بالأبريق في مؤخرة الحنجرة فوق الحافة العلوية للغضروف الحلقي ، ويسمى كذلك الغضروف المثلث الزوايا والغضروف الطرجهالى .

غُضْروفُ الأُذُن **cartilago auriculae TA**
انظر تحت auricular cartilage .

الغُضْروفُ القُرَيْنيّ (=السَّانْتُورينيُّ) **cartilago corniculata (=Santorini)**
عقيدة غضروفية صغيرة عند قمة كل من الغضروفين الطرجهاليين . ويسمى أيضاً (Santorini's and supra-arytenoid cartilage) ، (Corniculum and corpus santorianum) .

غُضْروفٌ ضِلْعيّ **cartilago costalis TA**
عارضة منَ الغضروف الهياليني التي ترتبط

الغُضْروفُ المُثَلَّثُ الزَّوايا **cartilago triquetra**
هو الغضروف الطرجهالي (Cartilago arytenoidea).
انظر تحت guttural cartilage.

الغُضْرُوفُ القَمْحيُّ **cartilago triticea TA**
غضروف صغَير في الرباط الدرقي اللامي ، ويسمى أيضاً (Corpusculum triticeum and corpus triticeum).

غُضْروفُ النَّفيرِ السَّمْعيِّ **cartilago tubae auditoriae TA**
غضروَف على السطح السفلي الإنسي للعظم الصدغي يدعم جدران القسم الغضروفي لنفير السمع ، ويسمى أيضاً (Tubal or eustachian cartilage and cartilage tubae auditoriae).

الغُضْروفُ الميكَعيُّ الأَنْفيّ (=الجَاكوبسونيّ) **cartilago vomeronasalis (=Jacobsoni)**
غضروفان شريطيان طولانيان ضيقان ، يتمددان على جانبي القسم الأمامي من الحافة السفلية للحاجز الغضروفي ، ويسمى أيضاً (Jacobson's or subvomerine cartilage).

غُضْروفُ ريزبيرغ **cartilago Wrisbergi**
هو غضروَف عصوي مرن صغير يوجد في الثنية الطرجهالية المزمارية فوق الغضروف القريني الشكل . ويسمى أيضاً (Cuneiform cartilage) ، (Morgagni's cartilage) ، (Morgagni's tubercle) ، (Wrisberg's cartilage).

مُوَجه للغُضْروف **cartilagotropic**
له ألفة للغضروف .

كارترِدج ؛ خرطوشة **cartridge**
مخزن حفظ الأشياء يقوم بتلقيمها للجهاز المرتبط به ، كمخزن أفلام الأشعة أو ورق الطابعات أو مخزن طلقات الرصاص في البندقية .

الكارترول **Cartrol**
العلامة التجارية لمستحضر هيدروكلوريد كارتيلول .

زوج من الغضاريف المثلثة الزوايا الممتدة إلى الوحشي من الحاجز الغضروفي لكل من جانبي الأنف ، ويلتصق من الأعلى بعظم الأنف والناتئ الجبهي للفك العلوي ، ويسمى أيضاً (Superior lateral or upper lateral cartilage and triangular cartilage of nose).

غُضْروفُ سانتوريني (=الغُضْروفُ القُرَينيُّ) **cartilago santorini (=cartilago corniculata)**
عقيدة غضروفية صغيرة عند قمة كل من الغضروفين الطرجهاليين .

غُضْروفُ الوَتيرَة **cartilago septi nasi TA**
غضروف الحاجز الأنفي ، غضروف هياليني يشكل هيكلاً للجزء الغضروفي للحاجز الأنفي يتجاور وينصهر بدرجة جزئية مع الغضروفين الأنفيين الوحشيين . ويسمى أيضاً (Septal cartilage of nose and quadrilateral cartilage).

غُضْروفٌ سِمْسمانيّ **cartilago sesamoidea**
أي عقيدة غَضرَوفَية صغيرة مرنة توجد أحياناً لدى بعض الناس مضافة للغضاريف الأساسية .

غُضْروفُ الحَنْجَرَة السِّمْسمانيّ **cartilago sesamoidea laryngis**
هي غضَاريف عقيدية صغيرة مرنة توجد على الحافة الجانبية (الوحشية) للغضروف الطرجهالي . ويسمى أيضاً (Sesamoid cartilage of larynx) وغضروف لوشكا (Luschka cartilage).

الغُضْرَوفُ السِّمْسمانيُّ للحَبْل الصَّوتي **cartilago sesamoidea ligamenti vocalis TA**
غضروَف صغَير يوجد ضمن الحبال الصوتية أحياناً ، ويسمى أيضاً (Laryngeal cartilage of luschka and luschka's cartilage).

الغُضْروفُ الدَّرَقيّ **cartilago thyroidea TA**
أكبر غضاريف الحنجرة ، له صفائحتان خلفيتان عريضتان مباعدتان وزوج من القرون علوي وسفلي يمتدان من الحواف الخلفية للصفائح .

Cartwright blood group — **الزمرة الدموية كارترايت**

من اسم المستلفت الأول الملاحظ عام 1956 .
انظر تحت Yt blood group .

carubicin hydrochloride — **كاروبيسين هيدروكلوريد**

أنثراسيكلين ، وهو مضاد حيوي معزول من المادورية القرمزية (جنس من الجراثيم) . له نشاط مضاد للأورام ولقد استخدم تجريبياً في معالجة ابيضاض الدم الحاد وبعض الأورام الصلدة .

Carukia — **كاروكيا**

جنس من قناديل البحر (Carukia barnesi Southcott) وهي الأنواع الأسترالية التي تسبب لسعتها متلازمة إيروكانجي (Irukandji syndrome) .
انظر تحت irukandji syndrome .

Carum — **كاروم**

جنس من النباتات من فصيلة الأومبليفيرا (Umbelliferae) ، وهي أنواع من الكراويا الواطنة في أوروبا والشرق الأوسط وقلب آسيا ، والكراويا من الثمار المجففة لنبات يستعمل في تطبيب الطعام .

caruncle — **لحيمة**

انظر تحت caruncula .

amniotic caruncles — **لُحيماتٌ سَلَويَّة**

تناميات ظهارية سلوية توجد أحياناً على المغرز المشيمي للحبل السري أو الطية السلوية أو طية شولتز ، الذي يحمل القناة المحية .

hymenal caruncles — **لُحيماتُ البكارة**

انظر تحت caruncula hymenales .

lacrimal caruncle — **لُحيمةٌ دَمْعيَّة**

انظر تحت caruncula lacrimalis .

major caruncle of Santorini (=papilla duodeni major) — **لُحيمةُ سانتوريني الكَبيرَة (=الحُلَيمَةُ الإِثْناعَشَرِيَّة الكَبيرَة)**

morgagnian caruncle (=lobus medius prostatae) — **لُحيمَةُ مورجاني (= فَصُّ البْروسْتاتَة الوَسْطاني)**

myrtiform caruncles (=carunculae hymenales) — **اللُّحَيماتُ الآسيَّةُ الشكْل (=لُحيماتُ البكارَة)**

salivary caruncle — **اللُّحَيمَةُ اللُّعابيَّة**

هي منطقة تحت اللسان وعلى جانبي لجام اللسان في سطحه السفلي تنفتح فيها فوهة تفريغ اللعاب من الغدتين اللعابيتين تحت اللسان . وتسمى أيضاً (Sublingual caruncle)

sublingual caruncle — **اللُّحَيمَةُ تَحْتَ اللِّسان**

انظر تحت caruncula sublingualis .

urethral caruncle — **اللُّحَيمَةُ الإِحْليليَّة**

نمو أحمرَ صغَير عميق سليلي الشكل على الغشاء المخاطي للصماخ البولي عند الإناث .

caruncula TA (pl.carunculae) — **لحيمَة (ج: لحيمات)**

بارزة لحمية صغيرة إما أن تكون طبيعية أو شاذة .

caruncula lacrimalis TA — **اللُّحَيمَةُ الدَّمْعيَّة**

البارزة الحمراءَ في الزاوية الإنسية للعين .

caruncula salivaris (=caruncula sublingualis) — **اللُّحَيمَةُ اللُّعابيَّة (=اللُّحَيمَةُ تَحْتَ اللِّسان)**

انظر تحَت caruncula sublingualis .

caruncula sublingualis TA — **اللُّحَيمَةُ تَحْتَ اللِّسان**

بارزة عَلى كل جانب من لجام اللسان ، عند قمتها فتحات القناة تحت اللسانية الكبيرة والقناة الفكية ، وتسمى أيضاً (Caruncula salivaris) .

carunculae hymenales TA — **لُحيماتُ البكارَة**

carunculae myrtiformes (=carunculae hymenales) — **اللُّحَيْمَاتُ الآسيَّةُ الشَّكْل (=لُحيماتُ البكارَة)**

يتلون بسهولة بصبغات الثيازينامّونيوم .

caryo- **سابقة بمعنى النَّواة**
(=karyo-)

سابقة للدلالة على العلاقة مع النواة .

Caryophanon **الكاريوفانون**

جنس من الجراثيم التي لم يؤكد نسبها ، تتضمن عديمات الأبواغ الإيجابية الجرام ، وهي كائنات حية تشبه العيدان وتوجد في روث البقر .

Carysomyia **الذبابة الذهبية**

انظر تحت chrysomyia .

carzenide **كارْزينيد**

دواء يثبط إنزيم الأنهيدراز الكربونية .


Casal's necklace (collar) **قلادة كوزال (طوق)**

قلادة [منسوبة للطبيب كاسبار كازال *(Gasper casal* ، وهو طبيب إسباني عاش مابين *(1679-1759)*] .

انظر تحت necklace.

casanthranol **كاسانثرانول (دواءٌ مُسَهِّل)**

مزيج منقى من جليكوزيدات الأنثرانول المشتقة من الكسكارة المباركة ، يستعمل كمسهل تماسي .



اللُّحَيمَةُ تَحْتَ اللِّسانِ
Caruncula sublingualis

carunculae **لحُيمات**
(sing.caruncula) **(ف: لحُيمَة)**

جمع لحيمة .

caruncular **لحُيميّ**

صفة تعبر عن ما هو منسوب إلى اللحيمة أو اللحيمات .

Carus' curve (circle) **منحنى كاروس (حلقة)**

[منحنى منسوب للطبيب كارل جوستاف كاروس (Karl Gustav Carus) ، وهو طبيب مولد ألماني عاش مابين 1789-1869] .

انظر تحت curve .

Carvallo's sign **علامة كارفالو**

[علامة منسوبة للطبيب جي إم ريفيرو كارفالّو (J.M. Rivero Caravallo) ، وهو طبيب متخصص بالقلب ، مكسيكي عاش في القرن العشرين] .

انظر تحت sign .

carver **مِنْحات**

سكين أو أداة أخرى تستعمل من أجل النحت والتشكيل لشيء بوساطة القطع ، ومنها مايستعمل لتشكيل السن الصناعي وكذلك للحشوات السنية .

amalgam carver **مِنْحاتُ المُلْغَم**

أداة نحت أو حك الملغم يستعملها طبيب الأسنان في تضبيط شكل حشوات الملغم وإزالة الزائد منها .

wax carver **مِنْحاتُ الشَّمْع**

أداة نحت الشمع .

carving **نَحْت**

عملية النحت .

carvone **كارْفون (مركب كيتوني طيار)**

تربين كيتوني موجود في عدة زيوت طيارة ، مثل زيت الكراوية ، وزيت الشبث (بقلة من التوابل) ، وزيت ورق النعناع .

carychrome **صبوغ النواة (عصبون)**

انظر تحت karyochrome .

caryiophil **أليف النواة**

البدلةالسنية أوالقولبة أو ماشابه .

حالَةٌ حَدِّيَّة **borderline case**

حالة من المرض الذي تتشابه فيه الأعراض مع الحالة المعترف بها ولكنها ليست من نمطها .

مُعالجَةُ الحالَة **case management**

تقديم كافة التدابير والمعالجات للحالة المرضية

تَجَمُّعاتُ الحالات **case mix**

وتكتب أيضاً (Casemix) وهي مجموعة المرضى المصنفة حسب نظام المجموعات المعتمدة على التشخيص (Diagnosis Related Groups) بقصد حساب تكلفة كل مجموعة في المستشفيات المتعاقدة مع شركة الضمان الصحي المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية .

مَنْسَبُ تَجَمُّعات الحالات **case mix index**

يمثل معدل مَجموعات المرضى المتعلقة بالتشخيص والمقيمة بحسب جميع أحجام شركة ضمان المديكير المستشفوية . ويمكن استعمالها لتضبيط معدل تكلفة المريض الواحد أو اليوم الواحد في مستشفى معين بالنسبة لمعدل التكلفة المضبط في المستشفيات الأخرى بقسمة معدل التكلفة ويرمز للمصطلح (CMI) .

شدَّةُ تَجَمُّعات الحالات **case mix severity**

تَخلف المجموَعات بحسب التشخيص في تكاليفها بحسب شدة مرضها وما يتطلبة من مدة مكوث في المستشفى ، والوارد اللازم توفيره لتدبير ذلك المرض ، فمجموعة احتشاء العضلة القلبية مثلاً أكبر شدة من مجموعة التهاب الطرق التنفسية العلوية الحاد .

نظامُ تَجَمُّعات الحالات **case mix system**

وضعته شركة ضمان المديكير ، وقد أسس كنظام لدعم القرار الواسع فيما يتعلق بفعالية التخطيط والإدارة في مجال الخط الإنتاجي . وهو نظام يساعد على حساب احتياجات المستشفيات حسب المعلومات المتعلقة بشدة تجمعات المرضى فيها ويرمز للمصطلح (CMS) .

كاسكابل **cascabel**

الحريش هو جنس من الحيّات ، وهي الحية الصلالة السامة ، توجد في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى .

شلاّل **cascade**

سلسلة من المراحل أو الخطوات (كما في عملية فيزيولوجية) ، التي حالما تبدأ تظل مستمرة حتى الخطوة النهائية ، وبافتراض أن كل خطوة تقوى بالخطوة التي تسبقها ، وأحياناً بأثر تراكمي .

شلال التخثر **coagulation cascade**

سلسلة من الخطوات تبدأ بتنشيط سبل داخلية أو خارجية للتخثر أو أحد السبل البديلة ذات العلاقة والتي تواصل في السبيل المشترك للتخثر لتكوين الجلطة الفبرينية ، كل خطوة مكتنفة بتنشيط إنزيمي ، الإنزيم النشط يحفز تنشيط الخطوة التالية .

شَلاَّلُ الإلكتْرُونات **electron cascade**

هو تأكيَدَ إمرار الإلكترونات من كامنة سلبية واسعة (مختزلة) إلى كامنة إيجابية (مؤكسدة) .

الكَسْكارة (لحاء نباتي) **cascara**

لحاء .

الكَسْكارَةُ المُرَّة **cascara amarga**

شجرة أمريكية مدارية ، وهي معدِّلة ومقوية .

الكَسْكارَةُ المُباركَة **cascara sagrada**

اللحاء المجفف لنبق بيرشيانا ، يستعمل كمسهل ، جواهره المسهلة هي الأنثراكينونات الجليكوزيدية مثل الإيمودين والباربالوين ، ويسمى كذلك لحاء عنب الدب ، ولحاء بيرشيانا ، واللحاء الفارسي ، ولحاء القرانيا .

1ـ حالة **case**

2 ـ علبة

1 ـ حالة خاصة للمرض مثل حالة ابيضاض الدم ، وتستعمل أحياناً بطريقة يجانبها الصواب لتدل على مريض مصاب بمرض .

2 ـ مصطلح يستعمل أحياناً بطريقة غير صائبة في طب الأسنان ليدل على الحوجلة أو

كازياز **casease**

إنزيم حالٌّ للبروتين وإنزيم تجبين وإماهة . وهو يوجد في كثير من الجراثيم .

تَجَبُّن **caseation**

1 ـ ترسب الكازيين .

2 ـ التنخر الذي يصبح فيه النسيج رخواً وجافاً وكتلة سهلة التفتت مشابهة للجبن ، وعادة ماتنجم عن العدوى بالمتفطرات ، ويسمى أيضاً (Cheesy necrosis) .

سِجِلُّ الحالاَت **casebook**

الكتاب الذي يدخل فيه الطبيب الحالات المسجلة .

كازين (بروتين في اللبن) **casein**

هو فسفوبروتين ، والبروتين الرئيسي في اللبن ، ويعتبر قاعدة الروب والجبن . يترسب من اللبن كمادة غير بللورية بيضاء بوساطة حموض مخففة ، ويعاد ذوبانه بإضافة القلويات أوزيد الحموض . يؤثر الرينّين (وسائر الأنزيمات الجلطة للحليب) على حلمهة الكازين إلى باراكازين ذواب ، الذي يتحول بوجود شوارد الكالسيوم إلى روب غير ذواب (الباراكازين غير الذواب أو باراكازينات الكالسيوم) . عادة مايضاف الكازين بأشكاله الملحية الكلسية أو الصودية أو البوتاسيومية إلى المكونات الأخرى للقوت لزيادة محتواه البروتيني .

ملاحظة : يسمى الكازين في بريطانيا مولد الكازين ، أما الباراكازين فيسمى كازين .

كازين ـ كالسيوم **casein-calcium**

انظر تحت calcium caseinate .

كازين ـ صوديوم **casein-sodium**

مستحضر غذائي للكازين وهيدروكسيد الصوديوم .

كازينات **caseinate**

1 ـ أي ملح كازيني .

2 ـ توليفة من الكازين وأحد المعادن .

مُوَلِّدُ الكازين **caseinogen**

التسمية البريطانية للكازين .

سجلُّ الحالاَت **case record**

اَلسَّجل الذي تدون فيه الحالات ، ويتضمن تشخيص المرض والعمليات التي أجريت للمريض والفحوص المختبرية والشعاعية والمداواة حتى خروج المريض من المستشفى .

تَحْويلُ الحالاَت **case shifting**

نقل الحالة من قسم إلى آخر أو من مستشفى لآخر ، وهي تتطلب تكاليف إضافية .

مُلَخَّصُ الحالَة المَرَضيَّة **case summary**

تقرير يلخصَ تشخيَص الحالة وما يتطلبه ذلك من فحوص ومعالجات .

حالَةٌ وِصائيَّة **custodial case**

الحالَة التيَ تحتاج إلى حكم قضائي بتحديد مجال رعايتها ، وأكثرها تتعلق برعاية المسنين .

حالَةٌ دالَّة **index case**

1 ـ حالة المريض الأصلي (المستلفت) التي تحرض على دراسة أعضاء العائلة لتقصي العوامل الوراثية الممكنة المسببة لتجلي الحالة .

2 ـ في وبائيات الأمراض المُعدية : هي الحالة الأولى من مرض ما ، كمقابلة للحالات اللاحقة .

عُلْبَةُ العَدَسات **trial case**

صندوق يحتوي العدسات الكروية المقعرة والمحدبة ، والعدسات الاسطوانية المقعرة والمحدبة ، المرتبة كأزواج . ويحتوي إطار النظارات كذلك ، ومختلف الجهيزات الأخرى المستعملة لاختبار (الرؤية) الإبصار .

كَشْفُ الحالاَت **case finding**

تحديد المشكلات الحديثة أو الكامنة المحتملة بأعمال الملاحظات الدقيقة والشمولية العامة حول الناس .

تاريخُ الحالَة **case history**

(السَّوابق المَرَضية للحالة)

المعطيات المتجمعة التي تهم فرداً ما وعائلته وبيئته وتتضمن التاريخ الطبي والمعلومات الأخرى التي ربما تكون مفيدة في تحليل حالته وتشخيصها ، أو من أجل الغايات التعليمية .

السيانيد ، الذي يُزال في أثناء المعالجة ، وإذا أكل نيئاً فيسبب التسمم السيانيدي عند البشر والحيوانات المنزلية أو الداجنة . ويسمى كذلك المانيوك (Manioc) .

Casselberry's position **وضعية كاسلبيري**

[وضعية منسوبة للطبيب وليام إيفانز كاسليري (William Evans Casselberry) ، وهو طبيب *أمريكي مختص بأمراض الحنجرة ، عاش مابين 1916-1858]* ، وهي وضعية انكبابية .

انظر تحت position .

casserian **كاسيريو**

[مسمى لجوليو كاسيريو (Giulio Casserio) ، *مثل يافوخ كاسيريو وهو اليافوخ الخشائي]* .

Casser' s **كاسّر**

(Casserio's, Casserius') **(كاسّيريو، كاسيريوس)**

fontanelle, ligament **يافوخ، رباط،**

muscle **عضلة**

[يافوخ أو عضلة منسوبة للطبيب جوليو كاسيريو (Giulio Casserio) ، وهو مشرح *إيطالي عاش مابين 1616-1552]* وهو اليافوخ الخشائي ، أو رباط المطرقة الوحشي ، و الرباط الكعبي الامامي .

انظر تحت fontanelle .

انظر تحت ligament .

انظر تحت musche .

cassette **عُلَيْبَة؛كاسيت**

(باللغة الفرنسية وتعني علبة صغيرة)

1 ـ علبة لاينفذ منها الضوء لفلم أشعة X (الأشعة السينية) ، وتحتوي على دريئة مشددة التألق في الأمام والخلف بحيث يوضع الفلم بينهما . وعادة ماتكون مدعومة بالرصاص لمنع التشتت الارتدادي .

2 ـ مخزن لفلم أو لشريط مغناطيسي .

Cassia **سَنَا (جنس نبات من الفصيلة القرنية)**

السنا جنس من الأشجار المدارية والشجيرات والأعشاب ، والتي تنتمي للفصيلة القرنية .

Cassia acutifolia **السنا شوكية الأوراق**

caseinogenate **كازينوجينات**

(=casein) **(=كازين)**

الشكل الملحي لمولد الكازين .

caseogenous **كازينوجينِيّ**

منتج للتجبن ، تحويل إلى الجبن (كازين) .

caseous **جُبْنِيّ**

مشابه للجبن أو الروب ؛ جبنى .

caseous abscess **خُراجٌ جُبْنيّ**

خراج يحتوي على مواد متجبنة القوام صلبة أو نصف صلبة وبيضاء اللون ، وأكثر ما يشاهد في الإصابات السلية .

caseum **جُبْن**

حطام (بقايا) خلوي بقوام مثل الجبن ، يتولد كنتيجة للتجبن .

caseworm **المشوكة**

(=echinococcus) **(دودة من الشريطيات)**

انظر تحت echinococcus .

Casodex **الكازوديكس**

الاسم التجاري لمستحضر البيكالوتاميد (Bicalutamide) ، وهو مضاد أندروجيني يستخدم في علاج السرطانة البروستاتية .

Casoni's intradermal test **اختبار كازوني**

(reaction) **داخل الأدمة (تفاعل)**

[اختبار منسوب للطبيب توماسو كازوني (Tommaso Casoni) ، وهو طبيب إيطالي عاش *مابين (1880-1933)]* وهو اختبار جلدي داخل الأدمة لتشخيص الكيسة العدارية .

انظر تحت test .

cassava **كُسَّافة (نبات ذو جذور نشوية)**

1 ـ شجيرة من جنس المانيهوت (Manihot) ، وخاصة المنهوط الإسكولنتي (الصالح للأكل) ، وهو جنس بنات استوائي من الفصيلة الفربيونية .

2 ـ مادة نشوية من جذور المانيهوت تستعمل في العديد من المناطق المدارية كحساء أو شوربة وفي الخبز والتبيوكة وأطعمة أخرى ، بالإضافة إلى الغراء تحتوي الجذور على هيدروجين

أُسْطُوانَةٌ دَمَوِيَّة **blood cast**

اسطوانة بولية تحمل الخلايا الدموية على سطحها .

قالَبٌ مُعَلَّب (أسنان) **boxed cast**

في طب الأسنان : يشير هذا المصطلح إلى القالب المحاط بعلبة .

أُسْطُوانَةٌ عَرِيضَة **broad cast**

في فحص البول المرضي يمكن أن تشاهد أسطوانات عريضة الشكل .

أسطوانة قصبية (شعبية) **bronchial cast**

سدادة أسطوانية صلبة أو نصف صلبة تسد القصبة وأحياناً تنطرد منها .

أُسْطُوانَةُ الغَيبَوبَة **coma cast**

(في فحص بول المصابين بالغيبوبة)

اسطوانة بولية مكونة من حبيبات شديدة الأنكسار ، يقال إنها تشير إلى حدوث السبات السكري (الغيبوبة) ، وتسمى كذلك اسطوانة كولتس .

أُسْطُوانَةٌ ساقطيَّة **decidual cast**

كتلة من الغَشَاء الساقط المتنخر أو المتنكس التي تفرز من الرحم في وقت تمزق الحمل المتنبذ .

قالَبٌ سِنِّيّ **dental cast**

إصلاح إيجابي للقوس الفكية العلوية أو السفلية بشكل جزئي ، ويضع بواسطة الطبقة .

قالَبٌ تَشْخيصيّ **diagnostic cast**

إصلاح إيجابي لأقواس فكية علوية و/ أو فكية سفلية عادة مايصنع من الجبس . ويستعمل للدراسة والتخطيط العلاجي . ويسمى كذلك القلب السابق للقلع والقالب السابق للعملية وقالب الدراسة .

أُسْطُوانَةٌ ظِهارِيَّة **epithelial cast**

أسطوانة بَوليَة مؤلفة من خلايا ظهارية كلوية عمودية أو من خلايا مدورة .

أُسْطُوانَةٌ كـاذِبَة **false cast**

(=pseudocast)

أُسْطُوانَةٌ دُهْنِيَّة **fatty cast**

أي اسطوانةَ مكونة من مواد محملة بحبيبات

أنواع من الشجر والمتوطنة واطنة في أفريقيا ، والتي تزرع في الهند ، وهي مصدر سنا الأسكندرية .

السنا ضيقة الأوراق **Cassia angustifolia**

أنواع من الشجر والمتوطن في البلاد العربية وهي مصدر السنا الهندي أو السنا التاميلية (Tinnevelly senna) .

السنا منفرجة الأوراق **Cassia obtusifolia**

انظر تحت cassia occidentalis .

السنا الغربية **Cassia occidentalis**

سنا القهوة ، وهو نوع من السنا غالباً ماتكون بذوره موجودة كملوث في علف الذرة أو فول الصويا ، عندما تؤكل بدرجة مفرطة من قبل الحيوانات الداجنة فإنها تسبب تنكساً عضلياً يمكن أن يؤدي إلى اعتلال مميت في عضلة القلب .

1ـ أسْطوانة (في فحص البول) **cast**

2ـ جَبِيرَة

3ـ قالب (أسنان)

1ـ إنتاج مادة جامدة من حيز محصور كعضو مجوف مثل النبيبات الكلوية والقصيبات ، وتتشكل هذه المادة من بروتينات مفرغة وتنطرح من الجسم .

2ـ إنتاج مضبوط لمادة أو جزء ، يصنع من البلاستيك الذي يؤخذ من طبعة أو نموذج .

3ـ تكوين شيء من قالب .

4ـ تضميد صلب مقولب للجسم عندما يكون مطاوعاً ثم يتصلب عندما يجف ليعطي دعماً ثابتاً .

5ـ إصلاح إيجابي للقوس الفكية العلوية أو السفلية بصفة كاملة أو جزئية ، يصنع بواسطة الطبعة . ويسمى كذلك النموذج السني أو القالب السني .

6ـ حَوَلٌ (Strabismus) .

أُسْطُوانَةٌ جُرْثومِيَّة **bacterial cast**

اسطوانة بوليةَ مكونة من الجراثيم ، أو تحتوي عدداً كبيراً من الجراثيم .

أُسْطُوانَةٌ كولتس **Kulz's cast**
(=أُسْطُوانَةُ الغَيبوبَة) **(=coma cast)**
انظر تحت coma cast .

أُسْطُوانَةُ الكُرَيَّات البيض **leukocyte cast**
اسطوانة هيالينيّة تَتَضمن الكريات البيض ، وتسمى كذلك الأسطوانة القيحية .

قالَبٌ رَئيسيّ **master cast**
نسخة مَن البنى الفموية ، تتضمن اسطح الأسنان المحضرة ، ومناطق الحروف المتبقية والأجزاء الأخرى للقوس السنية ، تنتج من الطبعة التي ستصنع منها البدلة .

أُسْطُوانَةٌ مُخاطيَّة **mucous cast**

أُسْطُوانَةٌ حَولَ الشَّعْرَة **peripilar keratin cast**
(=أسطوانة الشعرة) **(= hair cast)**
ويسمى أسطوانة الشعرة (Hair cast) ، وهي أسطوانات تحتوي على قشور كيراتينية تلتصق بفروة الشعر ولكن يمكن قلعها فتنزلق على جدل الشعرة وتشاهد في حالات التهاب جلد الفروة التقشري ونخالية الرأس والصدفية والتهاب الجلد الدهني .

أُسْطُواناتٌ مُصْطَبَغَة **pigmented cast**
أسطوانات بوليَة غالباً ما تصطبغ بالهيموجلوبين في البيلات الدموية أو التهاب الكبد والكلية .

جَبيرَةٌ جِبْسيَّة **plaster of Paris cast**
جبيرة تَستخدم في تجبير العظام وتعتمد على مادة كلسية كبريتية توجد بكثرة قرب باريس وسميت باسمها . ومن خصائصها أنها تصبح قاسية بعد ترطيبها بالماء وجفافها .

قالَبٌ سابقٌ للقَلْع **preextraction cast**
(= قالَبٌ تَشْخيصيّ) **(=diagnostic cast)**
انظر تحت diagnostic cast .

قالَبٌ سابقٌ للعَمَليَّة **preoperative cast**
(=قالَبٌ تَشْخيصَيّ) **(=diagnostic cast)**
انظر تحت diagnostic cast .

أُسْطُوانَةٌ قَيحيَّة **pus cast**
انظر تحت leukocyte cast .

من الدهن وتشير إلى التخرب النبيبي الكلوي ، لكون الدهن مشتقاً من الخلايا النبيبية .

أُسْطُوانَةٌ فِبْرينيَّة **fibrinous cast**
اسطوانة مشَابهة للاسطوانة الشمعية ، ولكنها تمتلك لوناً أصفر مميزاً مثل شمع العسل ، غالباً ماتشاهد في التهاب الكلية الحاد .

قالَبٌ فَكّيٌّ ثابتٌ **gnathostatic cast**
قالب للأسنَان المشطوبة (غير موجود) ، كي يكون السطح الإطباقي في وضعيته السوية في الفم عندما يوضع القالب على سطح مستوي ، يستعمل في التشخيص التقويمي السني .

أُسْطُوانَةٌ حُبَيبيَّة **granular cast**
أسطوانة بوليَة قاتمة اللون من مادة حبيبية أو شبيهة بالخلية ، وهي شكل متنكس من الأسطوانة الهيالينة أو الشمعية .


أُسْطُوانَةُ الشَّعْرَة **hair cast**
1 ـ بازهر شعري (Trichobezoar) في المعدة والأمعاء) .
2 ـ اضطراب في الشعر يتصف بوجود بنى نبيبية تقرنية قابلة للحركة حرة لماعة بيضاء منعزلة ، تقيس حوالي(3-5) ملي متر طولاً وتحاط بأجدال شعرية من (1-3) سنتي متر من سطح الفروة ، والتي تتشكل من الاحتباس والتوسف للقطع الداخلية لأغماد جذور الشعر . وربما تشتبه بالصئبان .

أُسْطُوانَةٌ مُعَلَّقَة **hanging cast**
أسطوانة تطبق على الساعد في كسر الذراع الذي يصيب جدل العضد ، ويعلق بواسطة معلاق متحلق (ملفوق) حول العنق .

أُسْطُوانَةٌ هيموجلُوبينيَّة **hemoglobin cast**
أسطوانة حبيبية قاتمة غير منتظمة مؤلفة من جسيمات دموية حمر متفتتة .

أُسْطُوانَةٌ هَيَالينيَّة **hyaline cast**
اسطوانة بَوليَة شفافة تقريباً مؤلفة من بروتين متجانس ولكنه شديد التفتت .

قالَبُ التَّكْسيَة **investment cast**
انظر تحت refractory cast .



Leukocyte cast أُسْطُوانَةُ الكُرَيَّاتِ البِيض

أُسْطُوانَةٌ كاذِبَة **spurious tube cast**

اسطوانة نبيبَية كاذبة ، أو أسطوانية الشكل .

قالَبٌ جِبْسِيّ **stone cast**

مادة جَبسَية قاسية جداً لا مسام بين مكوناتها تشبه بقساوتها حصى الصوان وتصنع منها الجبائر القاسية أو القوالب السنية الاصطناعية .

قالَبٌ للدِّراسَة **study cast**

(=قالَبٌ تَشْخيصيّ) **(=diagnostic cast)**

انظر تحت diagnostic cast .

أُسْطُوانَةٌ حَقيْقيَّةٌ **tube cast**

(=أُسْطُوانَةٌ بَوليَّة) **(=urinary cast)**

انظر تحت urinry cast .

أُسْطُوانَةٌ يوراتيَّة **urate cast**

تراكم اليوراتَ على شريد من الفيبرين أو غيره . (الشريد : شريط طويل ورفيع ، وجمعه شرائد) .

أُسْطُوانَةٌ بَوليَّة **urinary cast**

أُسْطُوانَةُ الكُرَيَّات الحُمْر **red cell cast**

اسطوانة هيالينيةَ تتضمن الكريات الحمر في داخلها .

قالَبٌ حَرون **refractory cast**

(=قالَبُ التَّكْسيَة) **(=investment cast)**

قالب يصنع منَ مواد مقاومة للحرارة بحيث تقاوم درجات الحرارة العالية من غير تفسخ ، والذي عندما يستعمل في القولبة السنية الجزئية يتمدد ليعاوض الانكماش المعدني ، ويسمى كذلك قالب التكسية .

أُسْطُوانَةٌ بَوليَّة **renal cast**

(=urinary cast)

انظر تحت urinary cast .

أُسْطُوانَةٌ حَلَزونيَّة **spiral cast**

أسطوانة بولية لها شكل حلزوني أو ملفوف .

أُسْطُوانَةٌ كاذِبَة **spurious cast**

اسطوانة نبيبَية كاذبة ، أو أسطوانية الشكل .

مسبوك ، مصبوب في طبعة أوقالب .
2 ـ فن تشكيل الأشياء مثل صناعة الحشوة السنية المعدنية أو الطبيقة .
3 ـ حشوة سنية معدنية أو طبيقة مصنوعة بواسطة هذه العملية .
4 ـ حشوة سنية معدنية مصنوعة لتلائم الحفرة المحضرة وتنطمرأو تكسو داخل الحفرة مع وسط ملاطي .

وَتَدُ القَوْلَبَة **casting sprue**

نظام يستعمل في مختبرات طب الأسنان لإحكام الإغلاق بحيث يمكن استخدام الحجرات ذات الحرارة العالية جداً أو التبريد الشديد أو الحجرات المتحركة ذات الضغط العالي بكل أمان .

هَزَّازُ القَولَبَة **casting vibrator**

جهاز هزاز لتحريك المواد ومزجها في القوالب .

القولبة النابذة **centrifugal casting**

استعمال قوة النبذ للتسبب بجريان المادة البلاستيكية ضمن طبعة أو قالب ، وهي عملية شائعة الاستعمال في القولبة السنية .

قَوْلَبَةٌ خَلائِيَّة **vacuum casting**

صب مادَة بلاستيكية في طبعة أو قالب تحت شروط الضغط الجوي المنخفض ، تخضع نهاية القالب الدانية للوتد إلى الخلاء (الفراغ) ؛ للسماح للضغط الجوي أن يقوي قولبة المادة ضمن القالب .

1 ـ يَخْصِي **castrate**

2 ـ خِصِيّ

1 ـ الحرمان من الغدد التناسلية مما يفقد الفرد القدرة على التناسل أو الإنجاب . ويسمى الخصي لذكور البشر والحيوان ، ويسمى الضهي لإناث الحيوانات ، واستئصال المبيضين لإناث البشر (إذا كان ثنائي الجانب) ، ويسمى التحييد أو استئصال الغدد التناسلية أو فقد الخواص الجنسية في الطب البيطري .
2 ـ شخص استؤصلت غدده التناسلية مثل أسطوانة مؤلفة من بروتينات هلامية (Gelled) مترسبة من النبيبات الكلوية ومتقولبة بحسب التجويف النبيبي ، تنفصل قطع منها وتنزل مع البول ، ولها أنماط مختلفة الأنواع ، وتتضمن الحبيبية ، والهيالينية ، والظهارية ، وتسمى كذلك الأسطوانات الكلوية ، والأنبوبية والبولية .

أُسْطُوانَةٌ شَمْعِيَّة **waxy cast**

أسطوانة بوليّة مكونة من مادة نشوانية شديدة الانكسار .

كَسْتَنَة **Castanea**

(جنس شجر من الفصيلة البلوطية)

الكستناء جنس شجر من الفصيلة البلوطية ، [Castanea .denata (Marsh). Borkh] ، وهي الكستناء الأمريكية التي تمتلك جوزات صالحة للأكل ، يحتوي خشبها وأوراقها حمض التانّيك ، ولقد استعملت كمادة قابضة ، وفي علاج الشاهوق أي السعال الديكي ، أوراقها وبراعمها ربما تكون سامة للمواشي إذا ما استهلكت بكميات كبيرة .

عَرَض كاستيلاني ـ لو **Castellani-Low symptom**

[عرض منسوب للطبيب آلدو كاستيلاني (Aldo castellani) وهو طبيب إيطالي ، والطبيب جورج كارمكايل لو (George Carmichael) . وهو طبيب بريطاني عاش مابين 1872-1952] ، وهو ارتعاش اللسان في مرض النوم .
انظر تحت symptom .

التهاب القصبات بحسب كاستيلاني (مرض)، دهان **Castellani's bronchitis (disease), paint**

[التهاب منسوب للطبيب ماركيز آلدو كاستيلاني (Marquis Aldo Castellani) ، وهو طبيب إيطالي عاش مابين 1879-1971] ، وهو «التهاب القصبات بالملتويات» .
انظر تحت bronchitis .

قولبَة **casting**

1 ـ أي شيء مشكل بوساطة تصليب مادة بلاستيكية ، مثل منتج جبسي أو معدن

2 ـ في القوات المسلحة : شخص مفقود من وحدته بسبب الموت أو المرض أو الإصابة أو الأسر أو لأن مكانه مجهول أو لأسباب أخرى .

casuistics **دراسةُ الإصابات**

تسجيل حالات المرض ودراسة أسبابها .

cat **هر (الهريات فصيلة من اللواحم)**

أي عضو من فصيلة الهريات (الأسود ، النمور ، السنانير والقطط البرية ، وغيرها) ، وخاصة القطط الأليفة المنزلية (Felis catus) .

cata- **1 ـ سابقة بمعنى الانخفاض**

2 ـ سابقة بمعنى الرُجُوْع

سابقة بمعنى أخفض ، أسفل ، تحت ، مقابل ، سوية مع ، جداً . انظر الكلمات المبدوءة بمقطع (kata) .

catabasial **جُمْجُمَة مُنْخَفِضَة القُوَيعِدة**

تقال عن بعض الجماجم التي لها قويعدة أخفض من الأخيري (الأخيري هي نقطة وسط حافة الثقبة العظمي للقذال) .

catabasis **تراجُعُ المَرَض**

مرحلة انحطاط (تراجع) المرض .

catabatic **متعلق بتراجُع المَرَض**

متعلق بانحطاط المرض ؛ الهدوء .

catabiosis **تراجُعُ الحَيَوِيَّة**

الشيخوخة الطبيعية للخلايا .

catabiotic **متعلق بتراجُع الحَيَوِيَّة**

1 ـ متعلق بتراجع الحيوية أو متصف بها .

2 ـ تبديد إنجاز الوظيفة أو استهلاكها ، تقال عن الطاقة المكتسبة من القوت (الطعام) .

catabolic **تقويضِيّ**

متعلق بالتقويض أو من طبيعته .

catabolin **مُقَيِّضَة**

وتسمى أيضاً (Catabolite) أي ناتج التقويض .

catabolism **تقويض**

أي عملية هدم استقلابية ، التي تحول الكائنات الحية بواسطتها المواد إلى مركبات إخراجية .

antibody catabolism **تَقْويضُ الضد**

تنكس سريع (العمر النصف المختصر)

الخصي عند البشر ، أما الحيوان فيسمى حيوان مخصي . (تستعمل في اللغة الإنجليزية كلمات مختلفة تلائم الحصان المخصي أو الثور المخصي) .

castration **اِستِئصالُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة؛ خِصاء**

1 ـ نزع الغدد التناسلية ؛ استئصال المبيضين أو استئصال الخصيتين (في الجانبين) .

2 ـ تخريب الغدد التناسلية بالإشعاع مثلاً .

female castration **اسْتِئْصَالُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة لِلأُنْثَى**

استئصال المبيض ثنائي الجانب في الإناث .

male castration **اسْتِئْصَالُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة لِلذَكَر**

استئصال الخصيتين ثنائي الجانب ، ويسمى كذلك الخصاء .

parasitic castration **اسْتِئْصَالُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة الطُّفَيْلِيُّ المَنْشَأ**

التخلص من الخصية أو المبيض لدى الأطفال قبل البلوغ (قديماً) بتعريضها للإصابة بالطفيليات التي تخربها ، أو هو نوع من الخصاء بالطفيليات بدل الاستئصال الجراحي .

radiologic castration **اسْتِئْصَالُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة بالأَشِعَّة**

القضاء على الغدد التناسلية بتعريضها للأشعة التي تخربها ، ولذا فهو خصاء بالأشعة .

castroid **شِبْهُ الخَصِيّ**

(=eunuchoid)

casual **1 ـ متعلق بحادثة**

2 ـ متعلق بإصابة

صفة تشير إلى حدث يحدث بشكل عارضي غير مقصود ، أو الإصابة الناجمة عن حدث طارئ .

casualty **1 ـ إصابَة**

2 ـ مُصاب

1 ـ حادث ، جرح عارض ، موت أو عجز بسبب حادث ، وكذلك شخص مصاب أو مقتول .

الأوب أو التقهقر .

catagenetic **تراجُعِيّ**

متعلق بالتراجع .

catagmatic **جابر (دامل للعظم المكسور)**

يمتلك القدرة على دمج العظم المكسور .

catahymia **تراجع المزاج**

وجود عناصر لاشعورية (فاقدة للوعي) بدرجة كافية لشحن العاطفة والوجدان لإنتاج التأثيرات على الوعي .

catalase **كاتالاز (إنزيم)**

إنزيم هيمو بروتيني من صنف المؤكسدة المختزلة ، والتي تحفز تحويل بيروكسيد الهيدروجين إلى الماء والأكسجين مما يحفظ الخلايا . يوجد تقريباً في الخلايا الحيوانية جميعها ماعدا بضعة جراثيم لاهوائية إجبارياً . عوز هذا الإنزيم هو خلة كروموسومية جسدية متنحية تسبب انعدام الكاتالاز ، ويكون العرض الظاهر في هذا المرض زيادة معدل حدوث التهابات دواعم السن ، وهو ليس مرض خطير

catalatic **كاتالازيّ**

صفة التفاعل التفككي كتفاعل تفكك بيروكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين بفعل إنزيم الكاتالاز أو البيروكسيداز .

catalepsy **الجُمْدَة (طب نفسي)**

المحافظة على وضعية ثابتة للجسم لفترة غير محدودة ، وتشاهد في الحالات الوخيمة من الفصام الجامودي ، ويستعمل هذا المصطلح أحياناً ليشير إلى المرونة الشمعية (وهي من أعراض الفصام الجامودي) .

cataleptic **جُمْدِيّ**

1 ـ متعلق ، أو متصف ، أو مستخرج من الجمدة .

2 ـ الشخص المصاب بالجمدة .

cataleptiform **جُمْدِيُّ الشَّكل**

مشابه للجمدة

cataleptoid **جُمْدِيُّ الشَّكل**

انظر تحت cataleptiform .

للجاماجلوبولين الغريبة عن الجسم .

catabolite **مَقيْضَة**

ما ينتج عن التقويض ، أو معرض للتقويض .

catabolize **يُقوض**

يخضع للتقويض .

catachronobiology **البيولوجيا الزَّمانيَّة التَّقويضيَّة**

دراسة التأثيرات التغيرية المتأثرة بعامل الزمن والواقعة على نظام الأحياء والحياة .

catacrotic **مُثلَّمُ هابطةِ النَّبْض**

1 ـ متعلق بالطرف النازل لمرتسم النبض .

2 ـ تقال عن الطرف النازل من مرتسم النبض المثلم . أي يمتلك شكلان موجيان .

catacrotism **تثلُّمُ هابطةِ النَّبْض**

شذوذ في النبض المبين بظهور موجة صغيرة إضافية ، أو ثلمة في الطرف النازل في مرتسم النبض .

catadicrotic **متعلق بالتَّثلُّم الثُّنائِي لهَابطةِ النَّبْض**

يمتلك شكلان موجيان في الطرف النازل من مرتسم النبض .

انظر تحت pulse .

catadicrotism **التَّثلُّمُ الثُّنائِيُّ لهابطةِ النَّبْض**

وجود نبض من نوع التَّثَلُّمُ الثُّنائيُّ لهَابِطَةِ النَّبْض .

catadidymus (=katadidymus) **مُلتَحِمُ الأسْفَل (مسخ)**

انظر تحت katadidymus .

catadioptric **انعِكاسيٌّ انكِساريّ**

ضوء منعكس ومنحرف في الوقت نفسه .

catagelophobia **رُهابُ الاستِهْزاء**

الخوف المرضي الشديد لدى المصاب من أن يستهزئ به أحد من الناس أو الرفاق .

catagen **فترَةُ التَّراجُع (للشَّعْرة)**

جزء قصير من دورة نمو الشعرة التي يتوقف فيها النمو (طور التنامي) ، وتبدأ الراحة (الطور الانتهائي) .

catagenesis **تراجُع**

معجّل .

حَفَّازٌ سَلْبِيّ **negative catalyst**

الحفاز الذي يؤخر سرعة التفاعل .

تحفيزيّ **catalytic**

مسبب أو متعلق بأثر مبدل ؛ يسبب التحفيز .

حفّاز **catalyzator**

يُحفز **catalyze**

يسبب التحفيز أو ينتجه .

حفّاز **catalyzer**

الحَيض **Catamenia**

(=katamenia)

الإفراز الشهري للدم من رحم المرأة غير الحامل من سن البلوغ وحتى سن الإياس .

انظر تحت menses .

حيضيّ **catamenial**

مُحرِضُ الحَيض **catamenogenic**

مأبون **catamite**

الولد ذو السن الأصغر في علاقة جنسية مماثلة بين الذكور ، كالطفل الذي له علاقة جنسية برجل بالغ يمارس الجنس معه لواطاً .

مُتابَعَة بَعْدَ الإخْراج **catamnesis**

ثرثرة **catalogia**

(=verbigeration)

ثرثرة هذيانية .

انظر تحت verbigeration .

تحفيز **catalysis**

زيادة سرعة التفاعل الكيميائي أو العملية المنتجة بوجود المادة التي لاتستهلك في العملية أو التفاعل الكيميائي الخالص . أما التحفيز السلبي فيشير إلى الإبطاء أو التثبيط في التفاعل الكيميائي أو العملية بوجود مادة كهذه .

تَحْفيزٌ تَماسِّيّ **contact catalysis**

(= تَحْفيزٌ مُتَغاير) **(=heterogenous catalysis)**


تحفيز متغاير ، وهو تحفيز منتج بواسطة القوة الممتزة للسطوح المتماسة ، وعلى سبيل المثال التحفيز الناجم عن البلاتينيوم الغرواني .

تَحْفيزٌ سَطْحيّ **surface catalysis**

التحفيز الذي تمتص فيه المواد المتفاعلة إلى سطح الحفاز وتتفاعل هناك .

حفّاز **catalyst**

أي مادة تأتي بالتحفيز ، ويسمى كذلك



تفاعل الكاتالاز **Catalase reaction**

تطبيق خارجي لمادة لينة ، غالباً ماتكون دوائية .

لَبْخَةٌ كاولينيَّة **kaolin cataplasm**

لبخة محضرة من الكاولين وحمض البوريك والجليسيرين . وتسمى لذلك لبخة كاولينية .

لَبْخَةٌ لينة **cataplasma**

تطبيق خارجي لمادة دوائية لينة .

لَبْخَةٌ خَميريَّة **cataplasma fermenti**

لبخة تحتوي على الخميرة .

لَبْخَةٌ كاولينيَّة **cataplasma kaolini**

انظر تحت kaolin cataplasm .

1 ـ جُمْدِيّ **cataplectic**

2 ـ متعلق بالوَنَى الانفعالي

1 ـ متعلق بالوَنَى الانْفعاليّ أومتعلق بالجمدة .

2 ـ المجيء بصفة مفاجَئة وَساحقة .

1 ـ الجُمْدَة **cataplexis**

2 ـ وَنَى انفِعالي

1 ـ الجُمْدَة **cataplexy**

2 ـ وَنَى انفِعالي

حالة من الهجمات المفاجئة للضعف العضلي ونقص التوتر ، التي تنبه بالمنبهات الانفعالية مثل الخوف والغضب والفرح والمفاجأة . غالباً ماتتصاحب مع النوم الانتيابي (التغفيق) .

الناتئ الانخفاضي **catapophysis**

استطالة أو بروز لعظم أو مادة دماغية .

الكاتابرس **Catapres**

الاسم التجاري لمستحضر هيدروكلوريد الكلونيدين (Clonidine hydrochloride) ، وهو مضاد لفرط ضغط الدم ، مركزي الفعل ويعطى فموياً أو رقعة بطريق الأدمة .

ساد؛ كاتاراكت **cataract**

بمعنى شلاّل أو مَسقط ماء (Waterfall) ، أو شَعْريّة التّحصين (Portcullis) ، وهي شَعْريّة حديَدية يُحمى بها مدخل الحصن . وهاتان الكلمتان لهما علاقة بمعنى الكلمة اليونانية (Katarrakt) أو الكلمة اللاتينية (Cataracta) ربما بسبب العتامة البصرية الناجمة عن كل من شلال الماء أو شعرية التحصين ، وهذه العتامة

1 ـ المتابعة الطبية أو التاريخ المرضي النفسي لمريض بعد إخراجه من المستشفى أو انتهاء المعالجة .

2 ـ قصة المريض في مستهل العلة الطبية أو النفسية .

متعلق بالمتابَعَة بَعْدَ الإخْراج **catamnestic**

مَسْحوق الجُروح **catapasm**

مسحوق غباري يطبق على سطح الجرح .

تكراريَّة اللَّفظ **cataphasia**

ثرثرة هذيانية .

انظر تحت verbigeration .

وَسَنٌ مُتقطع **cataphora**

حالة وسن أو شبه لا وعي مفصولة بدرجات من الوعي الجزئي .

رَحلانٌ مَهْبِطِي **cataphoresis**

إمرار الجسيمات المشحونة نحو القطب السالب (المهبط) في الرحلان الكهربي .

متعلق بالرَّحلان المَهْبِطِي **cataphoretic**

احْوِلالٌ سُفْلِيٌّ دائِم **cataphoria**

دوران سفلي دائم للمحور البصري (محور الرؤية) لكل من العينين بعد إزالة المنبهات الاندماجية البصرية .

1 ـ وَسَنِيٌّ مُتقطع **cataphoric**

2 ـ متعلق بالرَّحلان المَهْبِطِي

انظر تحت cataphoretic .

انهِيارُ مُقاوَمَةِ العَدْوَى **cataphylaxis**

انهيار الدفاع الطبيعي للبدن (للجسم) ضد العدوى .

تَدَنٍّ (تدني) **cataplasia**

وتسمى أيضاً (Retrograde metamorphosis) ، (Retrogression) ، و(Retromorphosis) ، (Cataplasis) ، وهي حالة تنكس وعودة بالنسج والخلايا إلى مراحل جنينية مبكرة بدل من تطورها إلى مراحل نضجية متقدمة ومتمايزة .

تَدَنٍّ (تدني) **cataplasis**

انظر تحت cataplasia .

لَبْخَة **cataplasm**

أو المراهقين .

سادٌّ تلْويّ **after-cataract**

سادَ مَحفظي ناكس (راجع) ، وهو أي غشاء في المنطقة الحدقية بعد إجراء استخراج العدسة أو امتصاص العدسة .

سادٌّ أَرَجيّ **allergic cataract**

الساد العَيني الذي يحدث لأسباب تحسسية أرجية .

ساد البيلة الحمضمينية **aminoaciduria cataract**

ثخانة محفظية تحدث في البيلة الحمضمينية ، وبيلة الهوموسيستين ، والمتلازمة العينية المخية مشابهة لما يحصل في الساد أو بعض أنواعه .


الساد هو عتامة كاملة أو جزئية في العدسة العينية أو عليها ، أو في محفظة العدسة العينية أو عليها ، ما يسبب ضعف الرؤية أو العمى ، يصنف الساد بحسب المورفولوجيا (الشكل ، الحجم ، الموضع) أو السببيات (سبب الحدوث أو وقته) .

سادٌّ مُلْتَصق **adherent cataract**

الساد العينيَ الملتصق بالقزحية نتيجة التهابها ، فيصبح نزعه أكثر صعوبة في العمل الجراحي .

سادٌّ اليُفْعان **adolescent cataract**

الساد العيني المبكر الذي يحدث لدى اليافعين



Cataract الساد ؛ الكاتاراكت

الخلفيـة الدمـوية ، وتماس الدم مع العـدسـة العينية . فهو ليس بساد حقيقي بل ساد لمجرى الضـوء بسبب الجلطة الدموية أمام العـدسـة . ويسمى أيضاً (Sanguineous cataract) .

سادٌّ أزْرَق **blue cataract**

1 ـ عتمة ثمائية مدورة صغيرة بيضاء المنظر أوزرقاء أو سمراء ، تشيع في محيط القشر وتتحرك أحياناً ضمن المنطقة المحورية للعدسة ، ونادراً تؤثر على الرؤية ، ويسمى كذلك الساد المنقط .

2 ـ الساد التاجي .

سادٌّ أزْرَق نُقْطيّ **blue dot cataract**

1 ـ عتمة ثمائية مدورة صغيرة بيضاء المنظر أوزرقاء أو سمراء ، تشيع في محيط القشر وتتحرك أحياناً ضمن المنطقة المحورية للعدسة ، ونادراً تؤثر على الرؤية ، ويسمى كذلك الساد المنقط .

2 ـ الساد التاجي .

سادٌّ عَظْميّ **bony cataract**

تعبير قديم وُجد وصفه في عملية ساد أجريت عام (1827) ، ووصف الطبيب الساد بأنه عظمي ضاغط على الحدقة ويسبب الألم العيني ، ويبدو أن العدسة كانت قاسية ومتكلسة . وتسمى أيضاً (Cataract ossea) .

سادُّ صانعي القَوارير **Bottlemakers' cataract**

سادٌّ أسْمَرَ **brown cataract**

ساد أسود ، أو ساد شيخوخي يبدو كعتامة بنية .

سادٌّ أسْمَر **brunescent cataract**

ساد أسود ، أو ساد شيخوخي يبدو كعتامة بنية .

سادٌّ كِلْسيّ **calcareous cataract**

ترسّبَ مَلحي كلسي حثلي في المنطقة القشرية من العدسة وتحت المحفظة .

سادٌّ محْفَظيّ **capsular cataract**

ثخـانة محفظية موجودة في الساد الحراري والمتلازمة العينية المخية الكلوية .

سادُّ القُطْب الأمامي **anterior polar cataract**

(= سادٌّ قُطْبيٌّ أمَاميّ)

كثافة عتمية تحتَ المحفظة الأمامية للعدسة ، وتحدث غالباً لأسباب وراثية ويتوضع الجين المصاب على الذراع القصيرة من الكروموسوم (17) في الموضع (14) وينتقل بصفة جسدية سائدة .

سادٌّ هَرَميٌّ أماميّ **anterior pyramidal cataract**

أحد أنماط السَّاد القطبي الأمامي لكنه يأخذ شكل الهرم وذروته باتجاه القرنية ، وقد يسقط في الغرفة الأمامية ليصبح كالجسم الغريب فيه .

سادٌّ مُتَشَجِّر **arborescent cataract**

الساد الذي يبدو متشعباً كأغصان الشجرة . انظر أيضاً الساد الأسود (Black cataract) .

سادٌّ جافُّ الغلاَف **aridosiliculose cataract**

ساد يتصفَ بضمور العدسة وجفافها مع ترسبات كلسية في المحفظة ويسمى أيضاً (Aridosiliquate cataract) .

سادٌّ جافُّ الغلاَف **aridosiliquate cataract**

انظر تحت aridosiliculose cataract .

سادٌّ تأتُّبيّ **atopic cataract**

ساد يَحدث في العقد الثالث أو مابعده عند المصابين بالتهابات الجلد التأتبية طويلة الأجل .

سادٌّ محْوَريٌّ مِغْزَليّ **axial fusiform cataract**

سادَ قطبيَ خَلفيَ أمامي ينتمي إلى العتامات خيطية الشكل ، والتي تمتد بطريقة محورية من خلال العدسة ، ويسمى كذلك الساد المغزلي .

سادٌّ أسْوَد **black cataract**

عتامة سوداء أو قاتمة اللون تحدث في الساد التصلبي النووي الشيخوخي ، ويسمى (Cataracta nigra) ، (Cataracta brunescens) ، وهو الساد المتشجر بلون بني غامق داكن مع قساوة في العدسة .

سادٌّ دَمَويّ **blood cataract**

انسداد الَضوء الذي يحدث في نزف الغرفة

معروفة السبب ، عادة ما يكون الساد الخلقي مصحوباً بنقص وزن الوليد وشذوذات الجهاز العصبي المركزي ، والتأخر العقلي والاختلاجات والشلل الدماغي .

2 ـ الساد النمائي .

سادٌّ رَضِّيّ **contusion cataract**

ساد ينجم عن صدمة أو رض على المقلة .

سادٌّ مَرْجانيُّ الشَّكْل **coralliform cataract**

عتامة نمائية درزية شعاعية تتمحور أمامياً وخارجياً من العدسة وتنتهي في الأمبولة خلف المحفظة .

سادٌّ تَاجيٌّ **coronary cataract**

1 ـ عتامة بيضاء منقطة أو قشرية الشكل حول محيط العدسة وتشكل تاجاً أو حلقة ، ينتقل الساد التاجي بالوراثة السائدة وربما يستعلن أو يتجلى عند 25٪ من السكان عموماً .

2 ـ ساد أزرق .

سادٌّ قِشْرِيّ **cortical cataract**

1 ـ عتامة نمائية منقطة شائعة في القشر وتتجلى في معظم العدسات ، يكون الساد إما أزرق أو أبيض ، ويزداد العدد مع العمر ولكن قلّما يؤثر على الرؤية .

2 ـ ساد إسفيني .

ساد إسفيني **cuneiform cataract**

أشيع أنواع الساد الشيخوخي ، يتألف من عتامات بيضاء إسفينية الشكل منتشرة مثل برامق العجلة حول محيط القشر .

سادٌّ قِمْعِيّ **cupuliform cataract**

عتامة قشرية خلفية تحت المحفظة ، تشاهد فيها كيسات أو حبيبات بنية صحنية الشكل ، تتوضع في المركز ولذا فإنها تضعف الرؤية بصورة واضحة وبسرعة كبيرة ، يحدث الساد القمعي مابين الستين والثمانين من العمر ، ولكن المنظر المبكر ربما يكون خلة موروثة .

سادٌّ كيسيّ **cystic cataract**

ساد يحدث في الرضوض العينية القريبة تتكثف فيه المحفظة وتبقى العدسة المركزية لينة أو

سادٌّ مِحْفَظِيٌّ عَدَسِيّ **capsulolenticular cataract**

في هذا النمط من الساد تصاب العدسة ومحفظتها بالكثافات العتمية .

ساد الخداج **cataracts of prematurity**

عنقود من الفجوات مجهولة السبب في الدروز الشبيهة بحرف Y في العدسة عند الوليد الخديج أو المبتسر ، وهي حالة غالباً ما تختفي في خلال شهر .

سادٌّ مَرْكَزِيّ **central cataract**

ساد عينيّ يحدث في مرحلة جنينية باكرة جداً ويحدث بصفة وراثية سائدة ، ويكون على شكل كثافة مركزية في العدسة وفي الجهتين لكنه في الغالب لا يؤثر على الرؤية لصغر حجمه .

سادٌّ أَزْرَق **cerulean cataract**

انظر تحت blue cataract .

سادٌّ مَشيمَوِيّ **choroidal cataract**

ساد يحدث بسبب مرض مشيمي عيني ويبدأ مركزياً نووياً بلون بني .

سادٌّ تامّ **complete cataract**

سادٌّ مَصْحوبٌ بمُضَاعَفَات **complicated cataract**

انظر تحت secondary cataract .

سادُّ الارْتجاج **concussion cataract**

سادٌّ خِلْقِيّ **congenital cataract**

1 ـ إحدى العتامات المختلفة التي تتجلى عند الولادة وعادة ما تكون ثنائية الجانب ، قد تكون معتدلة أو وخيمة ، وربما تضعف الرؤية أو لا تضعفها ، وذلك يعتمد على الحجم والموضع والكثافة . بعضها موروث ، وعادة مايكون السبب كروموسومياً جسدياً سائداً . ويحدث بعضها بسبب العدوى ضمن الرحم ، أو الانسمام المحدث بالأدوية أو الإشعاع المؤين ، أو الرضوح ، أو الخداج والابتسار ، أو الاضطرابات الكروموسومية والصماوية والاستقلابية والجهازية . ونسبة كبيرة غير

الرؤية ، ويسمى كذلك الساد المركزي الذروري .

ساد جنيني السبب **embryopathic cataract**
عتامة خلقية ناجمة عن عدوى داخل الرحم ، مثل الحصبة الألمانية والزهرى وداء المقوسات .

ساد تطوري **evolutionary cataract**
انظر تحت developmental cataract

سادٌّ شِبْهُ لِيْفيٍّ **fibroid cataract**
وصفَ نَسَيجي للساد بحيث يصبح متليف اللب أو النواة .


سادٌّ مائع **fluid cataract**
السادَ العيني المتكثف في المحفظة مع بقاء النواة مائعة .

سادٌّ بُؤْريّ **focal cataract**
الساد العَيني غير المعمم وقد يكون صغيراً ، ولا يؤثر على الرؤية .

سادٌّ مغْزَلِيُّ الشَّكْل **fusiform cataract**
وصفَ شَكلي للساد العيني بحيث يأخذ شكلاً مغزلياً وهو محوري التوضع .

ساد جالاكتوزي **galactosemic cataract**
ساد يشيع حدوثه عند الأطفال المصابين بالجالاكتوزيمية ، تبدو العتمات كقطيرات الزيت ، ويكون الساد ثنائي الجانب ونطيقياً أو نووياً .

سادٌّ عامّ **general cataract**
الساد العيني الشامل للمحفظة واللب (العدسة بذاتها) ويسمى أيضاً (Mixed cataract) .



Cerulean cataract سادٌّ أَزْرَق

تأخذ لوناً بنياً ، على اختلاف وصف الكحالين (أطباء العيون) لهذه الإصابة .

جلدي المنشأ **dermatogenic cataract**
ساد مرافق لالتهاب الجلد .
انظر تحت syndermatotic cataract .

ساد نمائي **developmental cataract**
عتامة صغيرة شائعة موجودة عند الشباب كنتيجة لعيب خلقي ، مثل الوراثة أو سوء التغذية أو الانسمام أو الالتهابات ، يزداد عدد المصابين بالساد النمائي مع العمر ولكنه نادراً ما يضعف الرؤية . ويسمى كذلك الساد التطوري .

سادٌّ سُكَّرِيُّ المَنْشَأ **diabetic cataract**
عتامة نادَرة تشبه الندف الثلجية ، عادة ماتكون ثنائية الجانب ، تصيب القشرة الأمامية والخلفية عند الشباب المصاب بالسكري ، وأحياناً يمكن أن تتراجع عندما ينضبط السكر في الدم ، ولكن في معظم الحالات يترقى بسرعة نحو الساد الناضج .

سادٌّ جافُّ القِشْرَة **dry-shelled cataract**
انظر تحت siliculose cataract .

ساد مضاعف **duplication cataract**
عتامة قشرية قرصية الشكل تتشكل من طبقات تحت محفظة الساد مع مناطق صافية بين الطبقات .

سادٌّ كَهْرَبِيُّ المَنْشَأ **electric cataract**
ساد يحدَث بعد الصدمة الكهربية وخاصة على الرأس ، ربما يتشكل ساد أمامي تحت المحفظة ، ويتطور في بضعة أيام من الصدمة الوخيمة ، وهي عتامات بطيئة النمو أو مستقرة ربما تعقب صدمة ليست على الرأس .

سادُّ النَّواة الجَنينيَّة **embryonal nuclear cataract**
عتامةَ محصورة بالنواة الجنينية للعدسة ، وهي خلة جسدية كروموسومية سائدة ، وغالباً ماتكون ثنائية الجانب ، ولها منظر الذرور (الغبار) (يشبه بالطحين) ، ونادراً ما تؤثر على

سادٌّ زُجاجَويّ **hyaloid cataract**
كثافة تحدَث في القسم الخلفي من المحفظة أو تحتها وتتفاوت بحجمها بين النقطية إلى اللوحة الكبيرة ، وهو لا يعيق الرؤية عادة ، وقد تتحسن بتوسيع الحدقة وقد توجد أوعية في اللوحة المتكثفة ، وكثيراً ما يوجد هذا النمط من الساد عند الحيوانات .

سادٌّ فائقُ النُّضْج **hypermature cataract**
سادَ مع تورم ، ولبني القشر ، ينجم عن الانحلال الذاتي لليفات عدسة الساد الناضج .

ساد نقص كالسيوم الدم **hypocalcemic cataract**
عتامة منقطة وأحياناً زرقاء ، تبدأ ماتحت المحفظة وتصبح صفاحية ، تحدث في التكزز الطفولي أوقصور الدريقات أو الرخد .

سادٌّ غَيرُ ناضج **immature cataract**
ساد وشيك ، أو ساد غير كامل ، تكون العدسة فقط ذات عتامة قليلة ، والقشر صاف .

سادٌّ وَشيك **incipient cataract**
الساد الذي يكتشف في بدايته إكلينيكياً قبل اكتماله .

سادٌّ طفْليّ **infantile cataract**
السادَ الّذي يظهر في الطفولة وقد يكون وراثياً أو مكتسباً .

سادٌّ مُنْتَبِجٌ **intumescent cataract**
السادَ الناضج المترقي ، والذي تصبح العدسة فيه متورمة من الأثر التناضحي لبروتين العدسة المتنكس ، مما قد يؤدي إلى الزرق (الحاد) مغلق الزاوية .

سادٌّ إشْعاعيّ **irradiation cataract**
السَاد الذيَ يتشكل بسبب تعرض العين للإشعاع .

سَادٌّ يَفَعيّ **juvenile cataract**
ساد يحدَث عند الأطفال مادون التاسعة من العمر ، وعادة مايكون مثل هذا الساد من النوع الخلقي أو الرضحي .

سادٌّ لَبَنِيّ **lacteal cataract**

سادٌّ نافخي الزُّجاج **Glassblowers' cataract**
انظر تحت heat cataract .

سادٌّ زَرَقيّ **glaucomatous cataract**
عتامة تحت المحفظة الأمامية تتلو (تعقب) الهجمة الحادة للزرق .

سادٌّ سِنْجابيّ **gray cataract**
وصفَ السَاد العيني بأنه ذو لون سنجابي ، وهو في الحقيقة ساد شيخي ناضج .

سادٌّ أخْضَر **green cataract**
لون الحدقة العينية بالفحص يبدو بلون أخضر . وقد ذكر هذا الوصف في القرنين السادس عشر والثامن عشر على أسس تشريحية مرضية . في الحالات التي يحدث فيها نزف في الغرفة الخلفية وتصطبغ العدسة بالدم فتعطي اللون الأخضر أحياناً في بعض الفحوص الضوئية .

سادٌّ كُتْلَويّ **grumous cataract**
اسم قديَم يطلق على الكثافة في مسار الضوء عبر القرنية بسبب النزف مثلاً في الخلط المائي أو الزجاجي ، فهو ليس ساداً حقيقياً . أي يماثل (Blood cataract) .

سادٌّ صُلْب **hard cataract**
وصف مبني على قساوة العدسة المتصلبة .

الساد الحراري **heat cataract**
عتامة خلفية تحت المحفظة بسبب التعرض المزمن للإشعاعات تحت الحمراء .

سادُّ الأشعَة الحَراريَّة **heat-ray cataract**
وصف مَبَني علَى سبب الساد وهو التعرض العيني للأشعة الحرارية .

سادٌّ السِّيّاج **hedger's cataract**
كثافة قرنية بسبب رضح ثاقب لها ، وأكثر ما يحدث لدى الحدائقيين الذين يقلمون الأغصان فيصابون بهذه الرضوض فهو ساد النظر غير حقيقي ، أي يصيب القرنية وليس العدسة .

سادٌّ مُغايرُ اللَّون **heterochromic cataract**
ساد ثانوَي ، قشري خلفي مصحوب بأعراض التهاب الجسم الهدبي متغاير اللون (المخيَّف) ، غالباً مايكون نقص الرؤية هو العرض الأول .

العدسة .

سادٌّ نَفْتالينيّ **naphthalenic cataract**

ساد يحدَث بالتعرض للنفتالين أو ابتلاعه .

سادٌّ نَوَويّ **nuclear cataract**

1 ـ سادَ مضغي نووي .

2 ـ ساد تصلبي نووي شيخوخي .

ساد العوز التغذوي **nutitional deficiency cataract**

عتامة تحت المحفظة تشاهد عند المرضى المصابين بالقهم أو فقد الشهية العصابي وعند الكحوليين .

سادٌّ مِهْنيّ **occupational cataract**

السادَ النَاجم عن طبيعة المهنة كأن تكون مسببة للتعرض الوامض للضوء كلحام المعادن ، أو مسببة لاحتمالات الرضوح .

سادٌّ فائقُ النُّضْج **overripe cataract**

انظر تحت hypermature .

سادٌّ جُزْئيّ **partial cataract**

سادٌّ مَرَضيّ **pathological cataract**

السادُ النَاجم عن بعض الأمراض كالداء السكري ، أو ارتفاع اليوريا في الفشل الكلوي .

سادٌّ مُحيطٌ بالنَّواة **perinuclear cataract**

ساد يحَدث فيه التكثف حول النواة العدسية .

سادٌّ مُحيطيّ **peripheral cataract**

ساد يحدَث فيه التكثف محيطياً بعيداً عن المركز .

ساد قطبي **polar cataract**

عتامة تحت المحفظة خلفية أو أمامية ، عادة ماتكون قرصية الشكل ، والساد الأمامي هو الأشيع ، وينقص الساد الخلفي من حدة البصر على الأغلب .

سادٌّ قُطْبيٌّ خَلْفيّ **posterior polar cataract**

السادَ الذي يَتوضع في القطب الخلفي من العدسة ويكون بسبب ضمور الشريان الهيالويدي .

ساد تال للالتهاب **postinflammatory cataract**

ساد ثانَوي ناجم عن الالتهاب .

ساد شيخي ناضج جداً يأخذ اللون الأبيض الحليبي بالفحص ، وكذلك حال لون لبه الحليبي اللون . ويسمى أيضاً (Milky cataract) .

سادٌّ صفاحيّ **lamellar cataract**

عتامةَ متَراكزة عريضة أو ضيقة ، وعادة ما تتألف من نقط بيضاء ذرورية (غبارية) . تؤثر في صفيحة واحدة أو نطيقة من عدسة صافية . وهذا الساد هو أشيع أنماط الساد الخلقي ، وتتضمن الأسباب نقص كالسيوم الدم ، ونقص سكر الدم ، والجلاكتوزيمية ، والحصبة الألمانية (الحميراء) . ويسمى كذلك الساد النطيقي .

سادٌّ عَدَسي **lenticular cataract**

كثافة تَشاهد في العدسة البلورية وليس في المحفظة .

سادٌّ بَرْقيّ **lightning cataract**

السادَ الَذي يحدث لدى تعرض المصاب لضوء البرق أو أي ضوء خاطف قوي .

سادٌّ ناضج **mature cataract**

السادَ الَذي ينتج التورم والعتامة في العدسة كلها ، حيث إن معظم مايستأصل من الساد هو من النوع غير الناضج .

سادٌّ غشائيّ **membranous cataract**

سادَ مَشكل من محفظة مسطحة منخمصة مع قشر قليل أو من غير قشر أو ظهارة .

ساد استقلابي (أيضي) **metabolic cataract**

عتامة نتيجة اختلال غدي (صمائي) ، أو اختلال كيميائي حيوى .

سادٌّ لَبَنيّ **milky cataract**

انظر تحت lacteal cataract .

سادٌّ مُخْتَلَط **mixed cataract**

(= ساد عام) **(= general cataract)**

ويسمى أيضاً (General cataract) وهي كثافة عدسية تشاهد في المحفظة والعدسة بذاتها معاً .

سادٌّ مورْجانيّ **morgagnian cataract**

ساد ناضجَ يصبح فيه معظم القشر معتماً ومائعاً ، ولذا تتحرك النواة بحرية ضمن

عتامة نادرة جداً ، وتكون النواة غائبة في هذا الساد ، وتبقى فقط بقاوة العدسة الكعكية (حلقية) الشكل .

سادٌّ ناضج **ripe cataract**

انظر تحت mature cataract .

ساد الحصبة الألمانية **rubella cataract**

ساد نووي خلقي ينجم عن الحصبة الوالدية (التي تصيب الأم في الأثلوث الأول من الحمل) .

سـادٌّ دَمَـوِيّ **sanguineous cataract**

انظر تحتَ blood cataract .

سادٌّ ثانَوِيّ **secondary cataract**

ساد يكون عادة خلفي تحت المحفظة ، وثانوي لبعض الحالات الأخرى كمرض (وخاصة التهاب القزحية والجسم الهدبي) ، أو تنكس (مثل الزرق المزمن و انفصال الشبكية) ، أو جراحة (وخاصة الزرق الراشح وإعادة اتصال الشبكية) ، ويسمى كذلك الساد المعقد ، أو الساد المصحوب بالمضاعفات .

سادٌّ تَثَفُّلِيّ **sedimentary cataract**

يسمىَ أيضاً (Morgagni's cataract) ويرادف أيضاً (Sedimentary cataract) ، وهو ساد مفرط النضج تتكثف فيه النواة ضمن المحفظة وتتحرك حسب الثقالة الأرضية .

سادٌّ شَيَخوخيّ **senile cataract**

أشيع أنواع الساد ، وهو غير مؤلم وسببه مجهول . يتطور من غير أي اضطراب رضحي أو خلقي أو عيني أو مجموعي ، يتصاحب الساد الشيخوخي منفرداً مع التشيخ ، تكون بعض درجات الساد طبيعية عند الأشخاص فوق الخمسين من العمر ، معظم الأشكال في المنطقة القشرية للعدسة ، ولكن بعض الأشكال في المنطقة النووية ، وقليل منها في منطقة ماتحت المحفظة .

الساد التصلبي النووي الشيخوخي **senile nuclear sclerotic cataract**

زيادة في تصلب النواة مع عتامة ذات منظر

سادٌّ تالٍ للولادَة **postnatal cataract**

الساد الذيَ يحدث بعد الولادة لسبب رضحي أو ولادي .

ساد سابق للشيخوخة **presenile cataract**

ساد شيخوخي تحت المحفظة عند شخص مادون الأربعين من العمر .

سادٌّ أوَّليّ **primary cataract**

ساد يَتطور بذاته وبصفة مستقلة عن أي مرض آخر .

سادٌّ مُتَرَقٍّ **progressive cataract**

الساد الذي يتزايد باستمرار مع مرور الزمن كالساد الشيخوخي .

سادٌّ مُطَوِّعي الحَديد **puddlers' cataract**

ساد مهنيَ رضي أو رضحي منتشر بين مطاوعي الحديد .

سادٌّ مُنَقَّط **punctate cataract**

1ـ ساد أزرق .

2ـ ساد تاجي .

انظر تحت blue cataract .

انظر تحت coronary cataract .

سادٌّ هَرَميّ **pyramidal cataract**

ساد قطَبي أمامي شبه مخروطي ، بحيث تشير قمته إلى الأمام .

سادٌّ إشْعاعيّ **radiation cataract**

عتَامة تحَت المحفظة ناجمة عن الإشعاع المؤين مثل أشعة X (الأشعة السينية) ، وأشعة جاما والنيترونات ، وتنتج عن الإشعاع غير المؤين مثل الأشعة تحت الحمراء (الحرارة) ، والموجات فوق البنفسجية ، والموجات المكروية ، والإشعاع الليزري .

سـادٌّ مُطَبَّق **reduplication cataract**

نمط من الساد الخلقي الأمامي القطبي ، وفيه منطقتان من الكثافة إحداهما في منطقة المحفظة والأخرى في القشرة مع وجود طبقة رائقة من المادة العدسية بينهما .

الساد الخلقي الحلقي الشكل **ringoform congenital cataract**

يسمى أيضاً (Sutural cataract) ، هو ساد خلقي بكثافة عدسية مع توزعات محيطية على شكل الخياطة بنموذج الحرف Y ، وتبدلات تنكسية في المحفظة .

سَادٌّ تَحْتَ المِحْفَظَة **subcapsular cataract**

أي عتامة تحت المحفظة الخلفية أو الأمامية للعدسة .

سادٌّ بشكْل عَبَّاد الشَّمْس **sunflower cataract**

عتامة محَفظيَّة أمامية حمراء ساطعة اللون ، ذات طراز كعباد الشمس ، تحدث عند المرضى المصابين بداء ويلسون وفرط النحاس في الدم ، ولها أثر ضئيل على الرؤية ، وتصفو بعد المعالجة بالبنيسيلامين .

الساد فوق النواة **supranuclear cataract**

عتامة في عمق قشرة العدسة فوق النواة تماماً .

سادٌّ دَرْزِيّ **sutural cataract**

عتامةَ خلقية في العدسة تصيب الدروز ذات الشكل Y للغشاء الجنيني ، ولاتؤثر عادة على الرؤية .

ساد جلدي المنشأ **syndermatotic cataract**

ساد موروث ، عادة ماتكون العتامة ثنائية الجانب مصحوبة مع مرض جلدي وتحدث عند الشباب ، ويسمى كذلك الساد جلدي المنشأ .

الساد الحراري **thermal cataract**

سادٌّ شامل **total cataract**

عتامة في ليفات العدسة كلها ، ويسمى كذلك الساد الكامل .

سادٌّ سُمِّيّ **toxic cataract**

عتامة بسبب التعرض لدواء أومادة سمية أخرى ، مثل مقبضات الحدقة ومضاداتها ، والستيرويدات القشرية ، والمعادن والمركبات النيتروجينية ، أو بدائل الهيدرو كربون .

سادٌّ رَضْحيّ **traumatic cataract**

ساد ينجَم عن رضح على العين ، سواء حدث الساد بعدها مباشرة (بسبب انثقاب المحفظة على سبيل المثال) أم بعد سنين لاحقة (بسبب ارتجاج العدسة من غير تمزق للمحفظة) .

أسمر أو أسود ، وتصبح العدسة غير مرنة وغير قادرة على الملائمة أو التكيف ، وعادة ماتكون العتامة ثنائية الجانب ، وتبدأ مابين الخمسين والستين من العمر ، وتترقى ببطء .

سادٌّ جافٌّ الغلاَف **siliculose cataract**

ويسمى (Siliquose cataract) ، (Dry-shelled cataract) ، (Aridosiliculose cataract) ، (Aridosiliquose cataract) ، هو ساد يحدث فيه ضمور وامتصاص اللب البلوري للعدسة مع تكثف وقساوة في المحفظة مع ترسبات كلسية فيها .

سادٌّ جافٌّ الغلاَف **siliquose cataract**

انظر تحت siliculose cataract .

سادٌّ النُّدَف الثَّلْجيَّة **snowflake cataract**

أشيع أنماطَ السَاد السكري شيوعاً ، له مظهر العتامات القشرية الرمادية أو البيضاء الضاربة إلى الزرقة بمعنى أنه عبارة عن عتامات قشرية ذو لون سنجابى (رمادى) أو أبيض ضارب إلى الزرقة .

انظر تحت snowstorm cataract .

سادٌّ العاصفَة الثَّلْجيَّة **snowstorm cataract**

أشيع أنماطَ السَاد السكري ، له مظهر العتامات القشرية الرمادية أو البيضاء الضاربة إلى الزرقة .

سادٌّ حَلَقَة سُومَرينْج **Soemmering's ring cataract**

انظر تحت ring .

سادٌّ لَيِّن **soft cataract**

ساد ذو نواة عدسية لينة لم تتصلب ولكنها كثيفة بلون حليبي ، وتشاهد لدى الأطفال في سن المراهقة واليافعين ، ولذلك تكون العدسة لينة .

سادٌّ مغْزَليّ **spindle cataract**

انظر تحت axial fusiform cataract .

سادٌّ ثابت **stationary cataract**

كثافَات عدسية تبقى ثابتة لا تزداد أو تتطور خلال فترة طويلة من الزمن .

سادٌّ نَجْميّ **stellate cataract**

العدسة البلورية ، وتحدث بعد البلوغ وتأخذ العتامات شكلاً مضربياً متجهة نحو المركز . وتسمى أيضاً الساد التاجي (Coronary cataract) ، وهي تنتقل وراثياً بصفة جسدية سائدة .

سادٌّ كَهْرَبِيُّ المَنْشَأ **cataracta electrica**
هي حالةّ الساد المرتجف .
انظر تحت tremulous cataract .

سادٌّ التصاقيٌّ غشائيٌّ **cataracta membranacea accreta**
حَالةَ التصاق الجدار الأمامي بالجدار الخلفي من المحفظة مع ذوبان العدسة ، فتأخذ شكل الشريط الغشائي .

سادٌّ التهاب الجلْد العَصَبيُّ المَنْشَأ **cataracta neurodermatica**
الساد المَرافق لالتهاب الجلد التأتبي .

سادٌّ أَسْوَد **cataracta nigra**
انظر تحت black cataract .

سادٌّ عَظْميّ **cataracta ossea**
قد يعنيَ تعظم العدسات الزائفة أو حالة تندب مع تكلس في العدسة العينية الحقيقية .

سادٌّ مرافقٌ لالتهاب الجلْد **cataracta syndermotica**
ساد عَدَسيّ يَرافق أمراض الجلد العامة ، ويسمى أيضاً الساد جلدي المنشأ (Dermatogenous cataract) .

مُوَلِّدٌ للسَّاد **cataractogenic**
الميل لتحريض أو تشكيل الساد .

قَدْحُ السَّاد **Cataractopiesis (=couhing)**
ويسمى (Couching) ، وهي عملية قديمة تعتمد على إزاحة الساد كلها عن طريق مجرى الضوء ودفعها بدبوس عادة إلى الخلط الزجاجي .

متعلق أو مصاب بالسَّادّ **cataractous**
من طبيعة الساد أو مصاب بالساد .

قَطْرَمُ الهر (أوراق وناميات ذروية نباتية طبية) **cataria**
أوراق وقمم نبات قطرم الهر ، وهو نعناع بري

سادٌّ مُرْتَجِف **tremulous cataract**
ساد يتحرَك مع العدسة والقزحية بحركة العين ويسمى أيضاً (Vacillating cataract) ، وكذلك (Cataracta electrica) .

سادٌّ نُطَيقيّ **zonular cataract**
هو السادَ الصفاحي .
انظر تحت lamellar cataract .

سادّ؛ كاتاراكت **cataracta**
انظر تحت cataract .

سادٌّ مُلْتَصِق **cataracta accreta**
ساد تلتصقَ فيه محفظة العدسة بالقزحية نتيجة التهابها . ويسمى أيضاً (Adherent cataract) .

سادٌّ جافُّ الغلاف **cataracta aridosiliquata**
انظر تحت siliculose cataract .

سادٌّ أسْمَر **cataracta brunescens**
انظر تحت brown cataract .

سادٌّ أزْرَق **cataracta caerulea**
ويسمى الساد الأزرق النقطي (Blue dot cataract) ، وهو شذوذ في تطور العدسة العينية ويشاهد عند البالغين . بالنظر إلى العدسة من خلال الإنارة المنحرفة تظهر فيها نقاط زرقاء ـ بيضاء .

السَّاد المركزي الذروري **cataracta centralis pulverluenta**
هو الساد النووي المضغي .
انظر تحت embryonal nuclear cataract .

سادٌّ مَصْحوبٌ بمُضاعَفات **cataracta complicata**
هو الساد الثانوي .
انظر تحت secondary cataract .

سادٌّ خلْقيٌّ غشائيٌّ **cataracta congenita membranacea**
حَالةَ خلقية تذوب فيها العدسة وتنطبق فيها جدر المحفظة على نفسها بما يشبه الشريط الأبيض الغشائي .

سادٌّ تاجيٌّ **cataracta coronaria**
كثافاتَ عتمية مرتبة بشكل التاج أو الحلقة حول

التهاب ضخامي في غشاء الأنف المخاطي يترافق بالرشح الغزير ، على العكس من النزلة الضمورية المتميزة بضمور الغشاء المخاطي .

نَزْلَةُ لاينيك **Laennec's catarrh**

شكل من التهابات القصبات الربوي أو التحسسي .

النزلة الخبيثة في الماشية **malignant catarrh of cattle**

هي الحمى النزلية الخبيثة في الماشية .

انظر تحت matignant catarrhal fever .

نزلة الرأس الخبيثة **malignant head catarrh**

الحمى النزلية الخبيثة في الماشية .

انظر تحت malignant catarrhal fever .

نَزْلَةٌ خَلْفَ أَنْفيَّة **postnasal catarrh**

(= الْتِهابٌ أَنْفيٌّ بُلْعوميٌّ مُزْمِنٌ) **(=chronic rhinopharyngitis)**

نَزْلَةٌ روسيَّة **Russian catarrh**

(= النزلَة الوافدة) **(=influenza)**

انفلونزا اشتهرت بالنزلة الروسية لأنها انتشرت في ذلك الوقت في روسيا .

نَزْلَةٌ جَيبيَّة **sinus catarrh**

اضطراب في العقد اللمفاوية يتميز بتوسع الجيوب المصحوب ببعض التكاثر في الخلايا الساحلية (Littoral cells) ، والتي تصاب بالتورم وتنفصل بنفسها عن جدران الجيوب لتتوضع بصفة حرة في التجويف (اللمعة) .

نَزْلَةٌ رَبيعيَّة **spring catarrh**

النزلة الوافدة أوالنزلة التي تنتشر في فصل الربيع .

نَزْلَةٌ خانقَة **suffocative catarrh**

(= الربو) **(=asthma)**

انظر تحت asthma .

نَزْلَةٌ رَبيعيَّة **vernal catarrh**

انظر تحت conjunctivitis .

نَزْلِيّ catarrhal

من طبيعة النزلة أو متعلق بها .

تحبه القطط ، يستعمل كطارد للأرياح وكمنبه عصبي لطيف .

نَزْلَة catarrh

التهاب في الأغشية المخاطية وخاصة في المسالك الهوائية في الرأس والحلق مع تجيج مخاطي سالك .

نَزْلَةٌ ضُموريَّة **atrophic catarrh**

حالة التهاب غشاء الأنف الضموري المترافق برشح مخاطي منه ، على عكس حالة التهاب الأنف الضخامي .

نَزْلَةٌ خَريفيَّة **autumnal catarrh**

(= حمى الكلأ) **(=hay frver)**

وتسمى حمى الكلأ (Hay fever) ، (Rhinitis nervosa) ، (Bostock's catarrh) ، وهي حالة تحسسية نزلية تظهر على شكل رشح في فصل الخريف خاصة عند الحصادين بسبب رائحة القمح أو القش . وقد تظهر حالة الرشح عند تعرض غشاء الأنف المخاطي لأي مادة يتحسس لها كغبار الطلع .

نَزْلَةٌ بوستوك **Bostock's catarrh**

(= حمى الكلأ) **(=hay frver)**

انظر تحت autumnal catarrh .

النزلة البقرية الخبيثة **bovine malignant catarrh**

تسمى الحمى النزلية الخبيثة .

انظر تحت malignant catarrhal fever .

نَزْلَةٌ وَبائيَّة **epidemic catarrh**

وتسمى النزلة الوافدة (Influenza) ، أو (Gripp) ، وعاملها فيروسي وبائي للنزلة الوافدة وقد كشف منه النمط A و B وتظهر أعراضها على شكل حمى ألم بالعظام .

نَزْلَةٌ فروجار **Fruehjahr catarrh**

(= التهاب الملتحمة الربيعي) **(= vernal conjunctivitis)**

وتسمى التهاب الملتحمة الربيعي (Vernal conjunctivitis) ، وهو التهاب ملتحمي تحسسي يظهر في الربيع .

نَزْلَةٌ ضَخاميَّة **hypertrophic catarrh**

متعلق بانخفاض المزاج ، وهو وجود عناصر في اللاوعي لها تأثير كافلانتاج تأثير على الوعي .

جامود (شكل من الفصام) **catatonia**

مجموعة واسعة من الشذوذات الحركية ، يُكتنف معظمها تحت فرط النشاط أو النشاط المنخفض ، توجد بصفة أساسية في الفصام الجامودي أو في اضطرابات أخرى ، وتتضمن الجمدة ، والإثارة الجامودية ، والذهول الجامودي ، والصمل الجامودي ، والتموضع العجيب (الغريب) ، والتصنع غير الاعتيادي ، والنمطية ، والمرونة الشمعية ، والسلبية .

جامودِيّ **catatoniac**

صفة منسوبة لمرض الجامود ، وهو نوع من الفصام .

جامودِيّ **catatonic**

1 ـ متعلق بالجامود أو بالفصام الجامودي .

2 ـ فرد مصاب بالجامود أو بالفصام الجامودي .

جامود **catatony**

متلازمة من الاضطرابات الحركية تشاهد في نمط من الفصام . تتصف بفترات من الصمل الفيزيائي (الجسدي) والسلبية أو الاستثارة والدهشة .

ثلاثِيُّ التَّثَلُّم لهابطةِ النَّبْض **catatricrotic**

يمتلك ثلاث موجات على الطرف النازل من مرتسم النبض .

انظر تحت pulse .

التَّثَلُّمُ الثُّلاثيُّ لهابطة النَّبْض **catatricrotism**

وجود نبض ثُلاثيُّ التَّثَلُّم لهابطَة النَّبْض .

احْوِلالٌ سُفْلِيٌّ تَرْكيزِيّ **catatropia**

مِنْطقة استِجْماع **catchment area**

(= منطقة الخدمة الطبية) **(= service area)**

هي منطقة تقديم الخدمات الطبية .

كاتيكين (مادة قابضة) **catechin**

هي الجوهر (الأساس) القابض البلّوري في الكاد الهندي (خلاصة نبات السنط) ، ويسمى كذلك كاتيكول ، أو حمض الكاتيكويك .

كاتيكول **catechol**

الْتِهابُ الفَمِ النَّزْلِيُّ **catarrhal stomatitis**

اَلتهاب الغشاءَ الفموي وجفافه بعد الإصابة بالنزلة الوافدة .

سُفْلِيَّاتُ المَنْخِرَين (فصيلة مِنَ القِرَدَة) **Catarrhina**

(=Cercopithecoidea)

انظر تحت Cercopithecoidea .

سُفْلِيُّ المَنْخِرَين **catarrhine**

1 ـ متعلق بطائفة سفليات المنخرين .

2 ـ يتميز بالمنخرين اللذين ينغلقان معاً ومباشرة إلى الأسفل .

مُثبط **catastaltic**

1 ـ مثبط ، مقيد .

2 ـ العامل الذي يميل إلى تقييد أي عملية أو فحصها (اختبارها) .

تمْديد **catastasis**

العودة إلى الحالة الطبيعية أو المكان الطبيعي . كما يحدث في رد الخلع أو الكسر بعد التمديد بحيث يعود كل مكون من مكونات العضو إلى مكانه ووضعه الطبيعي .

كارثة **catastrophe**

المصيبة الشديدة الوقع ذات الأثر النفسي العميق ، وفي المجال المسرحي تمثل ذروة العمل الدرامي المتصاعد الذي يسبق الكارثة في الدراما التقليدية .

كارثِيّ **catastrophic**

صفة منسوبة لكل ما له علاقة بالكارثة .

مَرَضٌ مُسَبَّبٌ لكَارِثَة **catastrophic illness**

مرض ينتشر بشدة بحيث يسبب كارثة كبيرة ، أو أنه يمثل خطورة كبيرة مهددة للحياة أو عضو مهم تسبب خسارته كارثة نفسية كبيرة على الفرد .

تَأْمينٌ ضدَّ الكَوارِث **catastrophic insurance**

مجال مَن التأمين تضمن فيه الشركة تعويض خسارة الأفراد في حالة الكوارث .

مِقياسُ الحَرارَةِ التَّنازُلِيُّ **catathermometer**

انظر تحت katathermometer .

متعلق بانخفاض المزاج **catathymic**

الكاد الهندي الأسود **black catechu**

انظر تحت catechu .

الكاد الهندي الشاحب **pale catechu**

الجمبير ، وهو الفوفل الهندي .

انظر تحت gambir .

حمض الكاتيكويك **catechuic acid**

انظر تحت catechin .

مِنْحَة فِئَوِيَّة **categorical grant**

مكافأة تتحدد بحسب الفئات .

فِئَة **category**

مجموعة ذات صفات محددة .

فِئَةُ التَّشْخيص الأَوْحَد **single-diagnosis category**

مجموعة تشترك في تشخيص وحيد غير مختلط بتشخيصات أخرى .

التَوَتُرِيَّة الكَهْرَبائِيَّة المَهْبِطِيَّة (للعصب) **catelectrotonus**

زيادة هيوجية عصب أو عضلة قرب المهبط خلال إمرار تيار كهربي .

الجرثومة المتسلسلة **Catenabacterium**

في الأنظمة القديمة للتصنيف ، هي جنس من الجراثيم من فصيلة الملبنات ، تتكون من كائنات حية عودية الشكل ، إيجابية الجرام لاهوائية غير بويغية ، هذه الكائنات الحية هي الآن مصنفة في أجناس الجُرثمة (Eubacterium) وهي جنس من فصيلة البربيونيات) ، والملبنات (Lactobacillus) .

مُتَسَلْسِل **catenated**

الاتصال بسلسلة من الروابط أو تشكيل سلسلة روابط .

تَسَلْسُلِيّ؛ مُسَلْسَل **catenating**

يشكل قسماً من سلسلة أو معقد من الأعراض .

سِلْسِلِيُّ التَّرْتِيْب **catenoid**

1 ـ يشبه السلسلة .

2 ـ مرتب كسلسلة .

سِلْسِلِيُّ التَّرْتِيْب **catenulate**

1 ـ كاتيكين (Catechin) .

2 ـ بيروكاتيكول (Pyrocatechol) .

ناقل ميثيل o كاتيكول (إنزيم ناقل) **catechol O-methyltransferase**

إنزيم من الصنف الناقل الذي يحفز نقل زمرة الميثيل من s- أدينوزيل ميثيونين إلى الكاتيكول أو الكاتيكول أمين مثل الدوبا ، أو الدوبامين ، أو الإيبينفرين أو النورإيبينفرين . يوجد هذا الإنزيم في الهيولى وخاصة في الكلية والكبد والجهاز العصبي المركزي .

أكسيداز الكاتيكول (إنزيم) **catechol oxidase**

أحد أصناف مجموعة الإنزيمات المؤكسدة المختزلة التي تحفز أكسدة الكاتيكولامينات إلى 1 ، 2 بنزوكوينونات . وهي بروتينات تحتوي على النحاس ، والتي تعمل أيضاً على احلال الكاتيكولات ، وربما تحفز تفاعل الأوكسيجيناز الأحادية لأحادي الفينول . تتضمن هذه المجموعة الإنزيمات التي تسمى كذلك أكسيداز ثنائي الفينول ، وأكسيداز البولي فينول استناداً إلى ركائزها .

كاتيكولامين **catecholamine**

أحد مجموعة الأمينات بيولوجية المنشأ التي تمتلك مفعولاً محاكياً للودي . القسم الأروماتي لهذا الجزيء هو الكاتيكول ، والقسم الأليفاتي هو الأمين ، ومثال ذلك الدوبامين ، والنورإيبينفرين ، والإيبينفرين .

كاتيكولامينيّ (الفعل) **catecholaminergic**

يتنشط بوساطة الكاتيكولامينات ، أو يفرزها .

الكادُ الهندِيّ (خلاصة نبات السَّنْط) **catechu**

1 ـ خلاصة قوية قابضة من الجلْب (وهو خشب القلب الصّلب في جذع الشجرة) الخاص بالسنط ، ومكوناته الرئيسية هي الكاتيكين ، والكويرسيتين وحمض الكاتيكوتانّيك . وكان يستعمل سابقاً كعامل مضاد للإسهال . ويسمى كذلك الكاد الهندي الأسود .

2 ـ الجمبير والفوفل الهندي .

caterpillar — **اليسروع**

يرقة لحشرة من رتبة حرشفيات الأجنحة . بعضها له شعرات تسبب التهاب الجلد الحشري عند البشر .

catgut — **خَيطٌ جراحِيٌّ (قابلٌ للامْتِصاص)؛ قصَّابَة**

خَيطٌ جراحيٌّ قابل للامتصاص .

chromic catgut — **خَيطٌ جَراحَيٌّ كروميّ**

انظر تحت chromic gut .

chromicized catgut — **خَيطٌ جراحيٌّ كروميّ**

انظر تحت chromic gut .

formaldehyde catgut — **خَيطٌ جراحيٌّ فورمالدهيدَي**

خيط جراحي قصابي مغموس في محلول من الفورمالدهيد بقصد تعقيمه .

iodine catgut — **خَيطٌ جراحيٌّ يوديّ**

(= I.K.I catgut) — **(= خيَط جَراحيَ I.K.I)**

خيط جراحي قصابي مغموس باليود بقصد التطهير .

iodochromic catgut — **خَيطٌ جراحيٌّ يُوديٌّ كروميّ**

خيطَ قصابي معالج بالكروم ومشبع باليود للتعقيم أو التطهير .

silverized catgut — **خَيطٌ جراحيٌّ مُفَضَّض**

خيط قَصابيَ جراحي معالج بالفضة .

cath- — **سابقة بمعنى الهُبُوط**

طليعة مصطلح تعني الهبوط .

Catha — **قات (نباتٌ من الفصيلة الحرابية)**

جنس من الأشجار والشجيرات دائمة الخضرة من الفصيلة الحرابية ، متوطنة في شرق أفريقيا (Catha. edulis Forsk) هي نوع تحتوي أوراقه على منبه للجهاز العصبي المركزي هو النورإفيدرين الأيمن الكاذب الميمن وتمضغ أو تصنع ضمن الشاي .

cathaeresis — **1ـ ضَعْفٌ دَوائِيُّ المَنْشأ**

2ـ فِعْلٌ ضَعيف

catharometer — **مِقياسُ فِقدان الحرارَة**

أداة تقيس الموصلية الحرارية للهواء بواسطة معدل فقدان الحرارة من سلك البلاتينيوم المسخن .

catharsis — **1ـ تَنْفِيْسٌ (عن العواطف)**

2ـ إسْهالٌ شَديدٌ

1 ـ إسهال .

2 ـ في الطب النفسي : إطلاق الأفكار والمعتقدات والمادة الكبوتة من اللاوعي ، ويكون ذلك مصحوباً بالاستجابة العاطفية والانفعالية والتفريج .

cathartic — **مُسْهِل**

(=purgative) — **(=شديد)**

1ـ مسبب لتفريغ الأمعاء .

2ـ العامل الذي يسبب تفريغ الأمعاء بزيادة الكتلة مثلاً أو تنبيه الفعل التمعجي ، ويسمى كذلك المفرغ والمسهل .

3ـ يتنج التنفيس العاطفي أو الانفعالي .

bulk cathartic — **مُسْهِلٌ كُتَليّ**

المسَهل الّذي ينبه تفريغ الأمعاء بوساطة زيادة كتلة البراز .

lubricant cathartic — **مُسْهِلٌ مُزَلِّق**

المسَهل الذي يفعل ذلك بواسطة تطرية البراز وإنقاص الاحتكاك بين البراز والجدار المعوي .

saline cathartic — **مُسْهِلٌ مِلْحيّ**

المسَهلَ الّذي يزيد كمية السوائل في المحتوى المعوي بواسطة احتباس الماء بالقوى التناضحية ، وبأسلوب غير مباشر بزيادة النشاط الحركي .

stimulant cathartic — **مُسْهِلٌ مُنَبِّه**

المسهَل الذي يزيد بصفة مباشرة النشاط الحركي للسبيل المعوي .

cathect — **تَرْكيزٌ فِكريّ**

عملية التركيز الفكري على موضوع معين .

cathectic — **متعلق بالتَّرْكيز الفِكري**

متعلق بالتركيز الفكري .

cathemoglobin — **كاتِهيموجلوبين**

مادة تنتج بواسطة أكسدة الهيموكروم ، وتتألف من أكسدة الهيم والجلوبين المتمسِّخ .

الكاتيبسين L **cathepsin L**

بتيداز السيستين الداخلية للجسيمات الحالة ، تتصل بصفة بنيوية بالبابايين .

1 ـ ضَعْفٌ دَوائِيُّ المَنْشأ **catheresis**

2 ـ فِعْلٌ ضَعيف

1 ـ مُضْعِف **catheretic**

2 ـ كاوٍ ضَعِيف (كاوي ضَعِيف)

قِثْطار (ج: قثاطير) **catheter (pl: catheters)**

1 ـ أداة جراحية أنبوبية مرنة تغرز في جوف من الجسم لسحب سائل أو إدخاله .

2 ـ قثطار بولي .

3 ـ قثطار يغرز في البطن .

قِثْطارٌ بَلُّوطيُّ الرَّأس **acorn-tipped catheter**

قثطار يستعمل في تصوير الحالب والحويضة لغلق الفوهة الحالبية ومنع القلس من الحالب خلال متابعة حقن الوسط الظليل .

قثطار أمبلاتز التاجي **Amplatz coronary catheter**

قثطار متشكل كالحرف J للتصوير الوعائي ، يستعمل كبديل عن قثطار جودكينز التاجي في التصوير الشرياني التاجي .

قِثْطارُ التَّصْوير الوعائي **angiographic catheter**

قثطار يحقن من خلالها الوسط التبايني لإظهار الجهاز الوعائي لعضو ، وقد يكون لها نهاية متشكلة لتسهيل التموضع النوعي (كالأوعية التاجية أو الكلوية) من مقر الدخول البعادي ، ربما تسمى الأنماط المختلفة بحسب مقر الدخول والغاية ، مثل الفخذي الكلوي ، والعضدي التاجي .

قِثْطارٌ مُزَوًّى **angulated catheter**

قثطار ذو رأس منحن يشكل زاوية مع جسمه .

قثطار استئصال الشريان **atheroctomy catheter**

قثطار يحتوي قاطعةً مدورة وغرفة لجمع الحطام (الفضلات) ، يستعمل في استئصال العصيدة واستئصال باطنة الشريان ، ويغرز تحت الجلد بتوجيه من التصوير الشعاعي .



Chromic catgut خَيطٌ جِراحِي كرومِيّ

كاتِيبْسين (إنزيم حال للخلايا) **cathepsin**

أحد الإنزيمات العديدة من صنف الهيدرولاز التي تحفز حلمهة الروابط الببتيدية . معظم الكاتيبسين هي ببتيداز الجسيمات الحالة الداخلية ذات الباهاء الحامضية المثلى .

الكاتيبسين B **cathepsin B**

ببتيداز السيستين الداخلية ولها نوعية مشابهة للبابايين ، وتوجد بصفة سائدة في الجسيمات الحالة .

الكاتيبسين B1 **cathepsinB1**

انظر تحت cathepsin B.

الكاتيبسين B2 **cathepsin B2**

هو كربوكسي ببتيداز ـ نمط السيستين .

الكاتيبسينC **cathepsin C**

ثنائي ببتيديل ببتيداز I .

الكاتيبسين D **cathepsin D**

ببتيداز داخلية أسبارتية من صنف الهيدرولاز ، ذات نوعية مشابهة ولكن أضيق من البيبسين A ، يكون الإنزيم بالفعالية القصوى في الباهاء الحمضية ويوجد في الجسيمات الحالة .

الكاتيبسين G **cathepsin G**

ببتيداز السيرين الداخلية ، ذات نوعية مشابهة للكيموتريبسين ، وتوجد في الجسيمات الحالة للكريات البيضاء المفصصة النوى .

الكاتيبسين H **cathepsin H**

ببتيداز السيستين الداخلية التي تحفز أيضاً نزع الأحماض الأمينية من النهاية N للببتيدات ذات المطراف N للببتيدات ذات النهاية الحرة ، وتتجلى في الجسيمات الحالة لمعظم أنسجة الثدييات .

العينات الدموية والضغط داخل القلب ، ولتشخيص الشذوذات القلبية وفي المداخلات الدوائية .

مكرفون قلبي قثطاري **cardiac catheter-microphone**

انظر تحت phonocatheter .

قثطار كاستيو **castillo catheter**

قثطار قلبي مشابه لقثطار أمبلاتز في الشكل والاستعمال ولكنه أقصر ويدخل عبر الشريان العضدي .

قِثْطارٌ إحْليليٌّ مُسْتَقِرّ **catheter a demeure**

قَثْطَارٌ ذو عَطْفَتَين **catheter bicoude**

قثطار ذو حنيتين أو عقفتين .

انظر تحت bicoudate catheter .

قِثْطارٌ ذو عَطْفَة **catheter coudé**

قثطار أكوع .

قِثْطارٌ وَريديٌّ مَرْكَزيّ **central venous catheter**

قثطار يدخل عبر وريد كبير ، مثل الوريد الوداجي أو تحت الترقوة إلى الوريد الأجوف العلوي أو الأذين الأيمن لإعطاء السوائل بالحقن (كما في فرط التغذية) ، أو لإعطاء الأدوية ، أو لقياس الضغط الوريدي المركزي .

قثطار ذو نهاية مغلقة ثاقبة **closed end-hole catheter**

قثطار يعوزه ثقب في رأسه ، ويستعمل للحقن السريع لحجوم واسعة من محلول التباين .

قِثْطارٌ مَخْروطي **conical catheter**

قثطار حالبي ذو رأس مخروطي الشكل مصمم لتوسيع التجويف .

قثطار كورناند **Cournand catheter**

قثطار قلبي ذو ثقب انتهائي مفرد (وحيد) ، عادة مايستعمل في قياس الضغط بالجانب الأيمن للقلب .

قِثْطارُ بيزِّيه **de Pezzer catheter**

قِثْطارٌ إحليلي مُسْتَقِرٌ بذاته بَصَليُّ الرَّأس .

قَثْطَار ديلي **Delee catheter**

قثطار يستعمل لمص العقي والحطام (البقايا)

قِثْطارٌ بَالُونِيٌّ **balloon catheter**

قثطار جهزت ذروته ببالون قابل للنفخ مما يساعد على تثبيت القثطار في المكان المخصص ، يستعمل لتوسيع تجويف وعاء ، مثل بالون رأب الوعاء ، الأنماط الشائعة هي قثطار جرونتزج البالوني ، وقثطار سوان ـ جانز .

قِثْطارٌ ذو عَطْفَتَين **bicoudate catheter**

قثطار أكوع ذو التوائين .

قِثْطارُ بُوزْمان ـ فريتْش **Bozeman-Fritsch catheter**

هو قثطار رحمي مزدوج المسالك (Double-current uterine catheter) ، ويسمى أيضاً قثطار بوزمان (Bozeman's catheter) .

قِثْطارُ بوزمان (= قثطار رحمي ذو مجريين) **Bozeman's catheter (= double-current uterine catheter)**

انظر تحت Bozeman-Fritsch catheter .

قثطارُ براش (= قِثْطارٌ بَصَليُّ الرَّأس) **Braasch bulb catheter (=bulb-tipped catheter)**

قثطار حالبي بصلي الرأس يستعمل للتوسيع وتعيين القطر الداخلي للحالب .

قثطار بروكينبرو عبر الحاجز **Brockenbrough transseptal catheter**

قثطار قلبي متخصص ذو إبرة فولاذية داخلية منحنية ، والتي يمكن أن تثقب الحاجز بين الأذينين ، ويستعمل لقثطرة البطين الأيسر عندما لايمكن عبور الصمام الأورطي في المقاربة بالطريق الراجع .

قثطار بروفياك **Broviac catheter**

نمط من القثاطير الوريدية المركزية المشابهة لقثطار هيكمان ولكن تجويفها أصغر .

قِثْطارٌ قَلْبيّ **cardiac catheter**

قثطار طويل نحيف عادة ما يكون مصمماً بشكل خاص للإمرار من خلال وعاء دموي محيطي (طرفي) ، إلى حجرات القلب بواسطة المراقبة الشعاعية ، ويستعمل للحصول على

قـثطار إحـليلي ذو حنيـة حـادة تـشبـه المنقـار ، يستـعـمل بصـفـة رئيـسية في حـالات تضـخم البروستـاتة ، ويسمى كـذلك قـثطار ذو عطفة (Catheter coude) .

قثطار المسرى الكهربي **electrode catheter**
قثطار قلبي يحتوي على مسرى كهربي واحد أو أكثـر ، ربما يستـعـمل لقـياس خبـب القلب أو لتوليد صدمات قلبية عالية الطاقة .

قثطار ذو نهاية ثاقبة **end-hole catheter**
قثطار قلبي ذو ثقب في ذروته ، والذي ربما يمرر من خـلاله سلك المرشـدة أو يراقب الضـغط عبره .

قثْطارُ النَّفير **eustachian catheter**
أداة لنفخ نفيـر يوستـاكيـوس من أجل معـالجة أمراض الأذن الوسطى .


السلوي من البلعوم الأنفي والبلعوم الفموي عند الوليد .

قثطار استئصال العصيـدة الاتجاهي **directional atherectomy catheter**
نمط من قثطار استئصال العصيدة الذي يمكن إزاحـة اتجاهه لنزع (كشط) لويحة عـصيـدية إضافية .

قثْطارٌ ذُو مَجْرَيَين **double-current catheter**
قـثطار يمتلك قناتين ، تستـعـمل قناة للحـقن وأخرى لشفط السائل . ويسمى كذلك « قثطار ذو مسلكين» .

قثْطارُ درُو ـ سمايث **Drew-Smythe catheter**
أداة تستعمل للبَثْق الصناعي للأغشية السلوية لتحريض الولادة .

قثْطارٌ أكْوَع **elbowed catheter**



Cardiac catheter **القثطار القلبي**

الشرياني التاجي ، له نهاية ثاقبة لإيواء سلك المرشدة أو مراقبة الضغط بالإضافة إلى جوانب مثقوبة للحقن السريع لحجوم واسعة من مادة التباين .

Gouley's catheter **قِثْطارُ جولي**

(قِثْطارٌ مَعْدِنيٌّ مُخَدَّد)

أداة معدنية منحنية صلبة متلمة في سطحها السفلي ، ولذا يمكن أن تمر بوساطة دليل من خلال التضيق الإحليلي .

Gruentzig balloon catheter **قثطارجرونتزيج البالوني**

قثطار بالوني مرن له سلك مرشدة قصير مثبت على الذروة ، يستعمل من أجل توسيع التضيقات الشريانية ، يصنع البالون من بلاستيك منخفض المطاوعة للتقليل من خطر التمزق الشرياني .

Hikman catheter **قثطار هيكمان**

نمط من القثطار الوريدي المركزي تستعمل للإعطاء الطويل الأجل للمواد بطريق الجهاز الوريدي ، مثل المضادات الحيوية والتغذية الوريدية الشاملة والعوامل الدوائية الكيميائية ، ويمكن أن تستعمل للإعطاء المستمر أو المتقطع وقد يكون لها تجويف مفرد أو تجويف مزدوج .

indwelling catheter **قِثْطارٌ مَستَقِرّ**

قثطار إحليَلي مستقر بوضعية الإحليل .

intracardiac catheter **قِثْطارٌ قَلْبيّ**

قثطار يَستخدم في الدراسات التي تتم داخل القلب . ويسمى أيضاً (Cardiac catheter) .

Itard's catheter **قِثْطارُ إيتارْد (النفيري)**

[يسمى أيضاً قثطار يوستاكيوس (Eustachian catheter) صممها جين ماري جاسبرد إيتارد ، وهو طبيب فرنسي 1774-1838] لاستعمالها في تقصي نفير يوستاكيوس في الأذن .

Judkins coronary catheter **قثطار جودكينز التاجي**

قثطار للتصوير الوعائي مشكَّل كحرف J يستعمل في التصوير الشرياني التاجي لتتبع

faucial catheter **قِثْطارٌ حَلْقيٌّ**

قثطار يمر بطريق الحلق .

female catheter **قِثْطارٌ أُنْثَوِيّ**

قثطار إحليلي قصير من أجل الإمرار في إحليل المرأة .

filiform-tipped catheters **قَثاطيرُ خَيطِيَّةُ الرُّؤوس**

قثطار يستعمل لتوسيع التضيق الإحليلي المحكم ولتجاوز الانسدادات الناجمة عن تزوي الحالب أو حصيات الحالب .

flexible catheter **قِثْطارٌ مَرِن**

قثطار لَين مرن يمكن تمريره بمسالك منحنية غير مستقيمة .

fluid-filled catheter **قثطار ملء السوائل**

قثطار داخل الوعاء الدموي والموصول بواسطة أنبوب مملوء بسائل ملحي إلى ترجام (Ttransducer) ضغط خارجي ، يستعمل لقياس الضغط داخل الوعاء .

Fogarty catheter **قِثْطارُ فُوجارْتي**

(قِثْطارُ بالونَيٌّ لاسْتِئْصال الصُّمات منَ الأَوعيَة)

نمط من القَثاطير البَالونية الرأس لاستئصال الصمات والخثرات من الأوعية الدموية .

Foley catheter **قِثْطارُ فُولي**

(=قِثْطارٌ بالونيٌّ مَثانيٌّ مُستَقِرّ)

قثطار الإكنان (المستقر) الإحَليلي الذي يحجز في المثانة بوساطة بالون ينفخ بالهواء أو بسائل .

Fritsch's catheter **قِثْطارُ فريتْش**

قثطار رحمي ذو مسلكين (Double current uterine catheter) .

انظر تحت Bozeman-Fritsch catheter .

Garceau catheter (=conical catheter) **قِثْطارُ جارْسُو (= قِثْطارٌ مَخروطيّ)**

انظر تحت conical catheter .

Gensini coronary catheter **قثطار جينسيني التاجي**

قثطار غير مشكَّل يستعمل في التصوير

قـثطار غـيـر مـشكَّل يـسـتـعـمـل في التـصـويـر الشرياني التاجي ، له نهاية مغلقة وثقوب جانبية متعددة من أجل الحقن السريع لحجوم واسعة من مادة التباين .

قثْطارُ أُودْمان ليدن **Odman-Ledin catheter**

قثطار منسوب إلى أودمان ليدن ، وهو قثطار من البولي إيثيلين .

قثْطارٌ زَيتونيُّ الرَّأس **olive-tip catheter**

قثطار حالبي ذو رأس شبيه بالزيتونة يستعمل لتوسيع الفتحة الحالبية المتضيقة ، وتستعمل القياسات الكبيرة منه لتوسيع التضيقات الإحليلية أو لمعايرة قطر مثل هذه التضيقات .

قثْطارٌ ظَليل **opaque catheter**

قـثطار ظليل لكي يسـهـل إظهـاره بالتـصـويـر الشعاعي .

قثْطارٌ فَمَوي بُلْعوميّ **oropharyngeal catheter**

قثطار الإنظام **pacing catheter**

قثطار قلبي يحتوى مسرى كهربي أو أكثر على أسلاك الإنظام ، يستعمل كمركز قياسى قلبي مؤقت .

قثْطارُ بيتْزر **Pezzer's catheter**

(قثْطارٌ مُسْتَقرٌّ بَصَليُّ الرَّأس)

قثْطارٌ مُسْتَقرٌّ بَصَليُّ الرَّأس .

قثْطار فيليبَ **Phillips'catheter**

(قثطار إحليلي ذو دليل نسيجي)

قثطار إحليلي ذو دليل (مرشد) محبوك خيطي الشكل .

قثطار مضفور **pigatil catheter**

قثطارللتصوير الوعائي ينتهي بذروة مجعدة (ملفوفة) باحكام تشبه ذيل الخنزير .

قثطار مشكَّل **preformed catheter**

قثطار مسبق التشكيل ومصمم لمتطلبات تشغيل ومناورات خاصة قليلة ، ولكنه عادة ماتكون محصورة بوظيفة مفردة .

قثْطارُ بروستاتي **prostatic catheter**

قـثطار إحليلي له ذروة قـصـيـرة ذات زاوية من أجل المرور عبر البروستاتة المتضخمة .

مـادة التبـاين ، عن طريق أحد الشـرايين التـاجية عبـر الفخذي بطريق الجلد ، يتركب من البولي أوريثـان أو البـولي إيثـيلين ، وله سلك نحـيف مضـفـور من جـدرانه ، والقـثطار الأيمن والأيسـر مصـاغـة بأسلوب نوعي من أجل الاسـتـعـمـال الخاص بكل شريان تاجي .

قثطار جودكينز المضفور لتصوير البطين الأيسر **Judkins pigtail left ventriculography catheter**

قثطار متخصص مضفور يستعمل لتصوير البطين الأيسر .

انظر تحت judkins coronary catheter .

القثطار التاجي الأيسر **left coronary catheter**

قثطار مصـمم للتصوير الشرياني التاجي من أجل الشريان التاجي الأيسر .

قثطارٌ ثُلاثيُّ المَفاصل **lobster-tail catheter**

قثطار يشبه ذنب الإربيان ، وله ثلاثة مفاصل .

قثْطارُ ماليكُو **Malecot catheter**

(قثطار متعدد الأجنحة لمثانة المرأة)

قـثطار ثنائي الأجنحـة أو رباعي الأجنحة لمثانة المرأة .

قثطار مقياس الضغط الرأسي **manometer-tipped catheter**

قـثطار على ذروته ترجـام ضـغط صـغـيـر ، يستعمل لقياس الضغط داخل القلب أو داخل الوعاء .

قثْطارُ مرْسييه **Mercier's catheter**

قثطار منسوب لمرسييه وهو قثطار لين معقوف الرأس .

قثطار متعدد الأغراض **multipurpose catheter**

1 ـ قثطار له وظائف أو تطبيقات مختلفة .

2 ـ قـثطار من أجل التـصـوير الشرياني التـاجي يمكن تشكيله واستعماله لكل شريان تاجي .

قثْطارُ نيلاتُون **Nélaton's catheter**

(قثطار مَطّاطي لَيِّن)

نمط من القثطار الإحليلي المرن المطاطي .

قثطار NIH **NIH catheter**

spiral-tip catheter **قثْطارٌ لَولبيُّ الرَّأس**
َ قثطار ذوَ رأس خيطي الشكل بعيد عن المركز .

Squire's catheter **قثْطارُ سكْوايِر**
َ قثْطارٌ مَرِنٌ مُتَعَدِّدُ القَطْع .

Swan-Ganz catheter **قثْطارُ سوان جانْتس**
َ (قثطار مرن نفاخيٌّ وعديد الرؤوس لقياس ضغط الدم)
قثطار قلبي طري موجه بانسياب وسهولة ، له بالون عند الذروة لقياس الضغط الشرياني الرئوي ، يدخل إلى الجهاز الوعائي (بطريق الوريد تحت الترقوة أو الوريد الوداجي الغائر أو الوريد الباسليقي) ، ويوجه بواسطة انسياب الدم في الوريد الأجوف العلوي والأذين الأيمن والبطين الأيمن إلى الشريان الرئوي .

Tenchoff catheter **قثْطارُ تنخُوف**
(= Tenckhoff catheter)
(قثطار صفاقي مستقر في الديال الصفاقي)
أحد الأنماط المختلفة للقثطار الشائعة الاستعمال في الديال الصفاقي ، يتألف من أنبوب مطاطي سيليكوني مرن ذو نهاية وفتحات جانبية تحمل كفة (Cuff) لبادية داكرونية أو كفتان خارج الصفاق مما يساعد على تحقيق سدادة محكمة أمام الجراثيم .

thermodilution catheter **قثطار التخفيف الحراري**
قثطار يستعمل للتخفيف الحراري من أجل تطبيق مشعر (Indicator) سائل بارد ضمن الجهاز القلبي الوعائي .

toposcopic catheter **قثطار موضعي النطاق**
قثطار مصغَّر يمكن إمراره من خلال أوعية ضيقة متعرجة لتفريغ علاج كيميائي في ورم دماغي بأسلوب مباشر .

tracheal catheter **قثْطارُ الرُّغامَى**
َ قثطار مصمم لدخول الرغامى ، ونزع المخاط من الرغامى بتطبيق المصِّ .

transluminal endarterectomy catheter **قثْطار استئصال باطنة الشريان عبر التجويف**

railway catheter **قثْطارٌ مُوَسِّعٌ خَيطيُّ الرَّأس**
يسمى أيضاً القَثطار كذنب الجرذ (Rat-tail catheter) ، وهو قثطار خيطي الشكل دقيق الرأس ويتوسع نحو القاعدة ، ويشبه ذنب الفأر أو الجرذ ويستعمل للتوسيع .

rat-tail catheter **قثْطارٌ شَبيهٌ بذَنَب الجُرَذ**
َ انظر تحت railway catheter .

right coronary catheter **القثطار التاجي الأيمن**
قثطار مصمم من أجل التصوير الشرياني للشريان التاجي الأيمن .

Robinson catheter **قثْطارُ رُوبنْسُون**
َ (قثطار مَستقيم عديد الفتحات)
قثطار إحليلي مستقيم له مابين (2-6) فتحات ليسمح بالنزح وتصريف السائل ، وهو مفيد بصفة خاصة في حالات وجود الجلطات الدموية التي ربما تسد إحدى الفتحات أو أكثر .

Schrotter's catheter **قثْطارُ شرُوتَر**
َ قثطار مطاطيٌّ مُوَسِّعٌ للحَنْجَرَة .

self-retaining catheter **قثْطارٌ ذاتيُّ التَّثْبيت**
َ قثطار مَثاني مصمم ليكون مثبتاً في المثانة والإحليل .

sigmoid catheter **قثْطارٌ سينيُّ الشَّكْل**

Skene's catheter **قثْطارُ سكِين**
قثْطارٌ زُجاجيٌّ مُسْتَبْقَى .

snare catheter **قثَطار سنار**
قثطار مَصمم لنزع شدف القثطار داخل القلب والموضوعة بصورة علاجية المنشأ .

soft catheter **قثْطارٌ لَيِّن**
َ قثطار من مواد لينة يمكن إدخاله في الطرق المتعرجة .

sones coronary catheter **قثطار سونز التاجي**
قثطار محبوك من البولي أوريثان أو الداكرون ، يستعمل في التصوير الشرياني التاجي لإقناء مادة التباين واستخراجها من الشرايين التاجية بطريق الشريان العضدي . وهو قثطار غير مشكَّل وقد يستعمل لمهمات أو إجراءات مختلفة .

والتخطيط للإجراءات الجراحية ، وتعيين المعالجة الملائمة وتنفيذها وتقييمها .

قَثْطَرَةُ النَّفير **eustachian catheterization**

الدخول إلى نفير يوستاكيوس (النفير) ، وحدث ذلك منذ عام 1871 بقصد حقن الماء وبعض الأبخرة في المعالجة الأذنية لانسداده .

قَثْطَرَةُ الوَرِيد الكَبِدي **hepatic vein catheterization**

إمرَارَ قثطار قلبي من خلال وريد في الذراع والأذين الأيمن والوريد الأجوف السفلي والوريد الكبدي ثم إلى وُرَيد كبدي صغير من أجل تسجيل الضغط الوريدي داخل الكبد .

قَثْطَرَةُ الحَنْجَرَة **laryngeal catheterization**

إدخال قثطار ضمن الحنجرة بقصد رشف السوائل أو ضخ الغازات .

قَثْطَرَةُ الإِحْلِيل الرَّاجِعَة **retrourethral catheterization**

إمرار قثطار من خلال الإحليل بحيث يدخل في البداية عبر شق في المثانة ومن ثم يمر عبر الفتحة الباطنة للإحليل .

قَثْطَرَةٌ فَوقَ العانَة **suprapubic catheterization**

قَثْطَرَةٌ عَبْرَ الحاجز **transseptal catheterization**

إمرار قثطار قلبي من خلال الأذين الأيمن واجتياز (عبور) الحاجز مابين الأذينين إلى الأذين الأيسر ، ويستعمل في حالات انسداد الصمام وفي بعض التقنيات الجراحية مثل رأب الصمام الترالي بالبالون .

يُقَثطِر **catheterize**

إدخال قثطار من خلال جوف في البدن ، وعادة ماتستعمل للدلالة على إمرار القثطار إلى داخل المثانة لنزح البول .

حامِلُ القَثاطير **catheterostat**

ممسك لاحتواء و تعقيم القثاطير .

مُفَسِّر المَقاييس **cathetometer**

(أداة تسهل قراءة نتائج القياس)

أداة تساعد على قراءة قياس الحرارة والسحاحات ومختلف المعدات .

نمط من قثطار استئصال العصيدة التي لها نافذة مخروطية قاطعة ، وتغرز ضمن تجويف الوعاء ، ويجمع الحطام (البقايا) بقارورة خلائية خاصة (Vacuum) .

قثطار عبر الرغامى **transtracheal catheter**

قثطار الأكسجين عبر الرغامى ، وفيه يغرز القثطار عبر الرغامى من خلال فغر الرغامى عند المرضى الذين لايستطيعون تحمل الأنبوب الفموي أو الأنفي .

قثْطارٌ ذُو مَجْرَيَيْن **two-way catheter**

انظر تحت double-lumen catheter .

قثْطارٌ حالبيّ **ureteric catheter**

قثطار يغرزَ ضمن الحالب ومن خلال كل من الإحليل أو المثانة أو بالطريق الخلفي للكلية .

قثطار إحليلي **urethral catheter**

قثطار يغرز من خلال الإحليل إلى داخل المثانة .

قثْطارٌ بُطَينيّ **ventricular catheter**

قثطار يصل بين البطينات الدماغية والوريد الوداجي أو غيره من الأوردة لتخفيف الضغط ضمن البطينات بالدماغ .

قثْطارٌ مُفَقَّر **vertebrated catheter**

قثطار مصنوع من مقاطع صغيرة متلائمة مع بعضها بحيث تكون مرنة .

قثْطارٌ صَفَّاريُّ الرَّأس **whistle-tip catheter**

قثطار إحليلي ذو فتحة طرفية وفتحة جانبية .

قثْطارٌ مُجَنَّح **winged catheter**

قثطار إحليلي له بروزات جناحية الشكل في النهاية كي يحتجز في المثانة .

قثطرة **catheterization**

1 ـ غرز قثطار .

2 ـ استعمال قثطار .

قَثْطَرَةُ القَلْب **cardiac catheterization**

إمرار قثطار صغير من خلال وريد في الذراع أو الساق أو العنق ومن ثم إلى القلب ، مما يجيز أخذ عينات دموية وتعيين الضغط داخل القلب ، واكتشاف الشذوذات القلبية ،

cathexis **تَرْكِيزٌ فكريّ**

في الطب النفسي هو الاستثمار الواعي أو اللاواعي للطاقة النفسية لشخص أو لفكرة أو أي مَعْلَق آخر .

cathisophobia **تَعَذُّرُ الجُلوس**

(=akathisia)

انظر تحت akathisia .

cathodal **مَهْبِطِيّ**

يسمى أيضاً (Cathodic) ، وهي صفة منسوبة لكل ما له علاقة بالمهبط الكهربائي .

cathode **مَهْبط**

1 ـ في الخلية الكهربية الكيميائية ، هو المسرى الكهربي الذي يحدث الاختزال فيه . وعلى سبيل المثال المسرى الكهربي السلبي في خلية كهرلية أو بطارية التخزين والمسرى الكهربي الإيجابي في الخلية الفولطانية التي تولد الكهرباء .

2 ـ المسرى الكهربي السلبي للجهيزات كالأنابيب الإلكترونية ، وأنابيب أشعة X (الأشعة السينية) ، وخلايا الرحلان .

cathode ray tube **أُنْبوبُ الأَشعَّة المَهْبِطيَّة**

أنبوب التصوير الشعاعي الذي يطلق االأشعة X بقصد التصوير والتأثير على الأفلام الحساسة للأشعة .

cathodic **مَهْبِطِيّ**

متعلق أو منبثق من مهبط .

Catholicon **دَواءٌ شامِل**

(=panacea)

ويسمى (Panacea) ، وهو الدواء الشامل الذي يصلح لمعالجة أمراض متعددة واسعة .

catholyte **كَهْرَلٌ مَهْبِطِيّ**


قسم من الكهرل والذي يجاور المهبط .

Cathomycin **الكاثوميسين**

الاسم التجاري لمستحضرات النوفوبيوسين (Novobiocin) .

cation **هابطة؛ كاتيون**

(pl: Cations) (ج: هَوابِط؛ كاتيونات)



Cathetometer مُقسر المَقَايِيْس

أيون يحمل شحنة موجبة نظراً لعوزه إلى الإلكترونات . تهاجر الكاتيونات في الخلية الكهرلية نحو المهبط المشحون سلبياً .

cationic **كاتيونِيّ؛ هابطِيّ**

متعلق بالكاتيون (الهابطة) أو يحتويها .

cationogen **مُوَلِّدُ الكاتيونات؛ مُوَلِّدُ الهَوابِط**

المركب الذي يصبح هابطة أو كاتيوناً أو الذي يحرر هابطة أو كاتيوناً في الجسم .

Cativi **الداءُ العُلَيقيُّ**

(=pinta)

cauda corporis striati ذَنَبُ الجِسْمِ الْمُخَطَّط
(= cauda nuclei caudati) (= ذنبَ النَواة المذنبة)
يسمى ذَنَبُ النَّواة الْمُذَنَّبَة (Cauda nuclei caudati) وكذلك (Tail of caudate nucleus) ، وهو القسم الخلفي المتطاول الممتد من النواة المذنبة التي توازي الجسم والقرن الخلفي من البطين الجانبي .

cauda epididymidis TA ذَنَبُ البَرْبَخ
القسم السفلي للبربخ حيث تستمر القناة البربخية مع الأسهر (القناة الناقلة للمنى) . ويسمى كذلك كرة البربخ الصغيرة .

cauda equina TA ذَنَبُ الفَرَس
مجموعة من الجذور النخاعية المنحدرة من القسم السفلي للحبل النخاعي ، وتحتل النفق الفقري تحت الحبل النخاعي ، منظرها يشبه ذنب الفرس . (ذنب الفرس : ينحدر من الخروط النخاعي للحبل النخاعي) .

cauda helicis TA ذَنَبُ حتار الأُذُن
نهاية الحَافَة الخلفية لغضروف حتار الأذن (حافة الأذن الظاهرة) .

cauda lienis ذَنَبُ الطِّحَال
القسم التشريحي الضيق من الطحال الذي يشبه الذنب .

cauda nuclei caudati TA ذَنَبُ النُّواة الْمُذَنَّبَة
قسم من النواة المذنبة الذي يستدق من الجسم وينحني حول سقف القرن السفلي للبطين الوحشي ويمتد باتجاه المنقار بقدرالنواة اللوزية .

cauda pancreatis TA ذَنَبُ البَنْكِرْياس
النهاية اليسرى للبنكرياس ، وعادة ماتكون على تماس مع المنظر الإنسي للطحال ووصلة القولون المعترض والنازل .

caudad ذنبيًّا (باتجاهِ الذَّنَب)
مباشرة نحو الذيل ، أو النهاية السفلية للجذع ، وعكس « منقارياً» ، ويسمى كذلك منقارياً ذنبياً ، أو من الرأس إلى الذنب .

caudae أذناب

يسمى أيضاً (Penta) ، و (Yawz) ، وهو داء مداري تسببه اللولَبيَّة الرقيقة (Treponema pertenue) التي تدخل تحت الجلد ، ويتميز الداء بتورمات وتقرحات تقشرية حبيبية على الأطراف والوجه ، وأهم الأعراض الحمى والألم والحكة مع ظهور التورمات ذات القشور الصفراء .

catlin مِبْتَر (سِكِينٌ ذات حَدَّين)
سكين طويلة مستقيمة مستدقة حادة ذات حدين تستعمل في البتر .

catling مِبْتَر (سِكِينٌ ذات حَدَّين)
انظر تحت catlin .

catnip نعناع بري « تحبه القطط »
انظر تحت nepeta cataria .

catodont سُفْلِيُّ الأَسْنان السَّوِيَّة
حالة تكون الأسنان السفلية فيها فقط طبيعية .

catoptric مِرآتِيّ
متعلق بصورة منعكسة ، أو ضوء منعكس .

catoptrics مَبْحَثُ المَرايا
فرع من الفيزياء يعالج الضوء المنعكس .

catoptroscope مِنْظارٌ انعِكاسِيّ
أداة لفحص الأشياء بواسطة الضوء المنعكس .

catotropia حَوَلٌ سُفْلِيٌّ مُسْتَقِرّ
انحراف إحدى العينين للأسفل عند تثبيت الأخرى ، كما تعني أيضاً الاحولال السفلي لإحدى العينين أو كلتيهما .

cauda TA ذنب
(pl.caudae) (ج: أذناب)
ذيل ، أو زائدة ذيلية الشكل . وهو مصطلح عام في التسمية التشريحية لبنية مشابهة لزائدة ذيلية الشكل .

cauda cerebelli ذَنَبُ الْمُخَيخ
(= vermis cerebelli) (= دودة المخيخ)
تسمى أيضاً (Vermis cerebelli) ، وهي الدودة المخيخية ، التي تمثل الجزء المركزي من المخيخ بين نصفي كرتيه ، وخلف البصلة والحدبة من الدماغ الخلفي .

قطعة من سلى الرأس التي تغلف رأس الطفل عند الولادة . وتسمى كذلك الماسكة والنقاب .

Caulobacter **العُنَيقاء (جِنسُ جَراثيم)**

جنس من الجراثيم ذات الزاوئد التي توجد في التربة والماء العذب الذي يحتوي مواد عضوية ، وتشبه العود أو المغزل أو الخلايا الضمانية التي تنتج بصورة نمطية سويقة تمتد من أحد الأقطاب ، وتتكاثر بواسطة الانشطار اللامتناظر ، هذا النوع النمط هو العنيقاء الضمانية .

Caulobacter vibrioides **العُنَيقاءُ الضَّمَّانيَّة**

تسمى أيضاً (Caulobacter crescentus) وتعتبر من الجراثيم السالبة الجرام .

Caulococcus **المستَعنَقة**

جنس من الجراثيم وجدت في عينات من الطين والرمال .

cauloplegia **شَلَلُ القضيب**

ارتخاء القضيب بسبب شلل عصبه الناعظ .

caumesthesia **كوماسيزيا**

حالة يحس فيها المريض بحرارة حارقة في وسط حراري منخفض .

causal **سَبَبِيّ**

متعلق بسبب ، أو موجه أمامه سبب .

causalgia **حُراق**

ألم حارق غالباً ما يكون مصحوباً بتغيرات اغتذائية جلدية ، وينجم عن إصابة في العصب المحيطي ، وخاصة العصب الناصف .

causation **تَسْبيب**

فعل السبب ، أو هو العلاقة بين العامل المسبب والأثر الناتج عنه ، أي هو الفعل الذي يقوم به العامل المسبب لإحداث الأثر المعهود إنتاجه عندما يؤثر على شيء .

causative **مُسَبِب**

فعال أو مسؤول كسبب أو كعامل .

Cause **سَبَب**

(pl: causes) (ج: أسْباب)

ما يجلب أي حالة أو ينتج أي أثر .

(sing.cauda) (ف:ذنب)

انظر تحت cauda .

caudal **ذَنَبِيّ**

1 ـ متعلق بذنب أو بذيل .

2 ـ في علم الجنين وعلم التشريح غير البشري تدل على وضعية أكثر نحو الذنب أو الذيل .

caudalis TA **ذَنَبِيّ**

caudalward **مُتَّجِهٌ نَحْوَ الذَّنَب**

Caudata **المذنبات**

رتبة من البرمائيات تتضمن السمندل .

انظر تحت salamanders .

caudate **مُذَنَّب**

كل ما يمتلك ذيلاً .

caudatolenticular **مُذَنَّبِيٌّ عَدَسِيّ**

متعلق بالذنب والنواة العدسية في المخطط .

caudatum **النَّواةُ المُذَنَّبَة**

تسمى أيضاً (Nucleus caudatus) ، وهي كتلة منحنية منغلقة من المادة الرمادية العصبية ذات منطقة أمامية ثخينة هي الرأس الذي يتبارز في القرن الأمامي من البطين الجانبي وقسم يمتد على طول جسم قاع البطين ويسمى الجسم ، وجزء رقيق متطاول منحن هو الذنب الذي ينحدر إلى الأسفل .

caudectomy **استِئْصالُ الذَّنَب**

الاستئصال الجراحي لقسم من الذيل أو كله ، ومصطلح استئصال الذنب في الحيوان (Dock) .

caudex **ذُنَيب**

caudex cerebri **السُّوَيقَةُ الدِّمَاغِيَّة**

(= pedunculus cerebri)

تسمى أيضاً (Pedunculus cerebri) ، وهي عنق ضيق يربط بين الدماغ الأمامي والدماغ الخلفي .

caudocephalad **ذَنَبِيّاً رَأسِيّاً**

1 ـ يتقدم باتجاه من الذيل نحو الرأس .

2 ـ رأسياً (باتجاه الرأس) .

3 ـ من الاتجاهين الرأسي والذنبي معاً .

caul **سَلَى الرَّأس**

أي سبب لا يسبق مباشرة ولا يولد حالة نوعية .
ويسمى أيضاً سبب ثانوي أو قصائي أو مؤهب .

سَبَبٌ ثانَوِيّ **secondary cause**
السبب الّذي يكون إضافياً أو تكميلياً للسبب الأولي .

سَبَبٌ نَوعِيّ **specific cause**
السبب الّذي ينتج أثراً خاصاً أو نوعياً .

سَبَبٌ قصَائِيٌّ **ultimate cause**
(= سَبَبٌ مُؤَرِّث) **(=precipitating cause)**
العامل المبكر والوثيق بالزمن ، والذي يشارك في توليد نتيجة نوعية .

سَبَبٌ دَفين **underlying cause**
سبب كامن أو مستبطن غير ظاهر .

كاوٍ (كاوي) caustic

1 ـ حارق أو أكال ، مخرب للأنسجة الحية .
2 ـ له مذاق حارق .
3 ـ محدث للخشارة أو عامل أكال . ويسمى كذلك كاوي .

الكاوي اليودي **Churchiill's**
المنسوب لتشرشل **iodine caustic**
محلول كاوٍ من اليودين ويوديد البوتاسيوم في الماء .

الكاوي المنسوب لفيلهوس **Filhos's caustic**
خمسة أجزاء من هيدروكسيد البوتاسيوم مع جزء واحد من أكسيد الكالسيوم .

الكاوي المنسوب للأندولفي **Landolfi's caustic**
مركب يحتوي كلوريدات الأنتيموان و البرومين والذهب والزنك .

الكاوي المنسوب للوغول **Lugol's caustic**
جزء من اليودين وجزء من يوديد البوتاسيوم ينحلان في جزئين من الماء .

الكاوي الفضي **lunar caustic**
نترات الفضة القاسية .

الكاوي المخفف **mitigated caustic**
نترات الفضة المخففة بنترات البوتاسيوم .

الكاوي المنسوب لبلونكيه **Plunket's caustic**
معجون كاوٍ مصنوع من 60 جزءاً من الزرنيخ ،

سَبَبُ العَمَل **cause of action**
مسبب العمل والدافع إليه .

سبب الوفاة **cause of death**
إصابة أو مرض مسؤول عن الموت .

سَبَبٌ بِنْيَوِيّ **constitutional cause**
السببَ الّذي ينفذ من خلال الجسم ولا ينحصر في مقر نوعي ولكنه يكون جهازياً أو يمتلك أسساً وراثية .

سَبَبٌ مُشارِك **contributory cause**
سبب إضافي للسبب الأصلي .

سَبَبٌ بيئيّ **ecologic cause**
سبب مصدره البيئة أو الوسط المحيط .

سَبَبٌ مُثير **exciting cause**
السبب الذي يقود مباشرة إلى حالة نوعية.

سبب مثير **exciting cause**
السبب الذي يؤدي بصورة مباشرة إلى حالة نوعية .

سَبَبٌ خارجيّ **external cause**
أي سببَ يَحدث من خارج العضو وليس من داخلها كالبيئة المحيطة بالعضو .

سَبَبٌ مُباشر **immediate cause**
السببَ الذي يكون فعالاً في بداية الأثر النوعي ، ويسمى كذلك السبب المؤرث .

سَبَبٌ موضعيّ **local cause**
السبب الّذي لايكون عاماً ولا بنيوياً ، ولكنه ينحصر في مقر توليد الأثر .

سَبَبٌ مُؤَرِّث **precipitating cause**
انظر تحت immediate cause .

سَبَبٌ مُؤَهِّب **predisposing cause**
أي شيء يجعل الشخص أكثر تعرضاً لحالة نوعية من غير أن ينتجها في الواقع .

سَبَبٌ أوّليّ **primary cause**
السبب الرئيسي المشارك في توليد نتيجة نوعية .

سَبَبٌ قَريب **proximate cause**
(= سَبَبٌ مُباشر) **(=immediate cause)**
السبب الذي يسَبق الأثر وينتجه مباشرة .

سَبَبٌ بَعيد **remote cause**

كَيٌّ كَهْرَبِيّ **electric cautery**
(= كَيٌّ غلفاني) **(=galvanic cautery)**
انظر تحت galvanic cautery .

كَيٌّ غازِيّ **gas cautery**
الكي بَوساطة وسائل خاصة تتحكم بنفث الغازات الحارقة .

مِكْواةُ بَاكْلاَن **Paquelin's cautery**
مكواة على شكل قبضة مجوفة في رأسها ثقب يخرج منه الحرارة .

كَيٌّ نُقْطِيّ **point cautery**
مكواة ذات رأس إبري وتحقق كياً صغير المساحة يعبر عنه بأنه نقطي ، فتساعد على رقء نزوف الأوعية الصغيرة جداً وتخثيرها . وتسمى أيضاً (Punctate cautery) .

كَيٌّ احْتِمالِيّ **potential cautery**
كي بوساطة محدث للخشارة من دون تطبيق الحرارة . ويسمى كذلك الكي الافتراضي .

كَيٌّ نُقْطِيّ **punctate cautery**
انظر تحت point cautery .

كَيٌّ شَمْسِيّ **solar cautery**
الكي باستخدام العدسات ذات الحارق التي يمكن تجميع أشعة الشمس في محرقها وتركيز الحرق على المكان المراد كيه . ويسمى أيضاً (Sun cautery) .

كَيٌّ بحسب سوتار **Souttar's cautery**
الكي البخاري .
انظر تحت steam cautery .

كَيٌّ بُخارِيّ **steam cautery**
طريقة مَن الكي الرطب الذي لا تتجاوز حرارته 100 درجة لأنها درجة غليان الماء ، وتستخدم في الكي العلاجي للأغشية المخاطية مثل كي الطلاوة ، والتهابات القرنية .

كَيٌّ شَمْسِيّ **sun cautery**
انظر تحت solar cautery .

كَيٌّ حَرارِيّ **thermo cautery**
استخدام الحرارة في الكي سواء كانت جافة أو رطبة .

و100 جزء من الكبريت ، و480 جزء لكل من الحوذان اللاذع (جنس من النباتات العشبية) والحوذان الفلامولي .

الكاوي المنسوب لروسّيلو **Rousselot's caustic**
محلول كاو مؤلف من سلفيد الزئبق الأحمر واسفنج محترِّق وثلاثي أكسيد الزرنيخ .

الكاوي الفييناوي **vienna caustic**
البوتاس الكاوي (هيدروكسيد البوتاسيوم) والجير .

الكاوي الزنكي **zinc caustic**
مزيج من جزء واحد من كلوريد الزنك وثلاثة أجزاء من الفلور .

يَستكوي **causticize**

مِكواة **cauter**
جهاز الكي سواء بالحرارة أو الكهرباء .

كاوٍ (كاوي) **cauterant**

كيّ **cauterization**
تخريب نسيج بوساطة أداة ساخنة أو تيار كهربي ، أو مادة كاوية ، أو بعض العوامل الأخرى . ويسمى كذلك كي .

يَكوي **cauterize**
الفعل الذي ينتج عنه عملية الكي .

1ـ كيّ **cautery**
2ـ مِكواة
1ـ مادة كاوية أو أداة ساخنة تستعمل في الكي .
2ـ كي .

كَيٌّ فِعْلِيّ **actual cautery**
تطبيق عامل يحرق النسيج بصورة فعلية .

مِكْواةٌ زِرِّيَّة **button cautery**
مكواة مجهزة بأزرار للتحكم بعملها .

1ـ كَيٌّ كِيمْيائِيٌّ **chemical cautery**
2ـ مِكْواةٌ كِيمْيائِيَّة

1ـ كَيٌّ بَارِدٌ **cold cautery**
2ـ مِكْواةٌ بَارِدَةٌ

مِكْوَاةُ كوريجان **Corrigan's cautery**
هي مكواة زرية (Button cautery) ، من أنماط أدواة الكي المجهزة بأزار للتحكم بعملها .

virtual cautery **كَيٌّ افتراضيٌّ**
(=potential cautery) **(= كَيٌّ احْتماليّ)**
انظر تحت potential cautery .

Ziegler cautery **كَيٌّ زيجلر**
طريقة مَن الكي تستعمل لمعالجة شتر الجفن الخارجي .

cava **1ـ جَوْف (ف: أجْوَف)**
2ـ الوَرِيْدُ الأجْوَفُ

caval **متعلق بالوريد الأجْوَف**
مـتعلـق بالوريد الأجْـوَف . ويسـمى كـذلك وريدى أجوفى .

cavascope **مِنْظارُ الجَوف**
أداة من أجل إضاءة جوف وفحصه .

cave **كَهْف**
cave of septum pellucidum **جـوف الحـاجـز الشفاف**
Meckel's cave **جوف ميكل**
انظر تحت cavum trigeminale .
triginimal cave **جوف ثلاثي التوائم**
انظر تحت cavum trigeminale .

caveola **كُهَيْف**
انغلاف أو انخساف أو وهدة صغيرة ، مثل أي وهدات دقيقة أو انغلافات في الغشاء الخلوي المتشكل أثناء الاحتساء ، الذي ينغلق ثم ينقرص ليشكل حويصلات صغيرة حرة مملوءة بالسائل (الجسيمات الاحتسائية) في الهيولى . ويسمى كـذلك الكـهيـف داخل الخلية ، وحـويصلة الغشاء البلازمي .

Caverject **كافرجيكت**
الاسم التـجارى لمسـتـحضـر آلبـروسـتـاديل (Alprostadil) ، وهو داء موسع للأوعية .

Cavern **كَهْف**
(pl: caverns) **(ج: كهوف)**
caverns of corpora cavernosa of penis **كُهوفُ الجِسْمَيْن الكَهْفيَّيْن للقَضيب**
انظر تحت cavernae corporum cavernosorum penis .

caverns of corpus spongiosum **كُهوفُ الجِسْمِ الإسْفَنْجي**
انظر تحت cavernae corporis spongiosis .

Scanabel's caverns **كهوف سكانابل**
ضمور العصب البصري الزرقي المنشأ مع ارتفاع ضغط باطن العين (الضغط داخل المقلة) .

caverna TA **كَهْف**
(pl.cavernae) **(ج: كهوف)**
cavernae corporis spongiosi TA **كُهوفُ الجِسْمِ الإسْفَنْجي**
أحَياز قابلة للتمدد ضمن الجسم الإسفنجي للقـضـيب ، وهي التي تمتلئ بالدم وتصبح متوسعة بالنعوظ .
cavernae corporum cavernosorum penis TA **كُهوفُ الجِسْمَيْن الكَهْفيَّيْن للقَضيب**
أحـيـاز قـابلة للتـوسع ضـمن كـهـوف الجـسم الكـهـفي للقـضـيب ، وهي التي تمتلئ بالدم وتصبح متوسعة بالنعوظ .

cavernioquy **صَوْتٌ هَمْسِيٌّ كَهْفِيّ**

cavernitis **الْتِهابُ الجِسْمِ الكَهْفِيّ (للقضيب)**
الْتـهـابُ الجِـسْمِ الكَهْفِيّ أو الجسم الإسـفنجي للقَضيب .
fibrous cavernitis **الالْتِهابُ اللِّيفيُّ للجِسْمِ الكَهْفيّ (للقضيب)**
داء بَيروني (صَلابة الجسم الكهفي) .
انظر تحت peyronie's disease .

cavernoma **وَرَمٌ كَهْفِيّ**
ورم خلقي غير وراثي يوجد في الدماغ والنخاع ويسـمى (cavernous haemangioma) وبعكس الشذوذات الشريانية الوريدية يكون الجريان فيه ضعيفاً نسبياً .

cavernosal **متعلق بالجسم الكهفي**

cavernoscope **مِنْظارُ التَّجْويف**
أداة تستخدم لمناظرة أي جوف ، مثل الأداة التي تغرز في الحيز الوربى ضمن الجوف الجنبي .

cavernoscopy **تَنْظيرُ التَّجْويف**

كابياء (جِنْسُ حَيَوانٍ مِنَ القوارض) **Cavia**

جنس من القوارض الأمريكية الجنوبية من فصيلة الكابياء ، القبيعة (Cavia cobaya) هي الخنزير الغيني .

قُبَيعَة **Cavia cobaya**

أحد أنواع حيوانات المختبرات التي تشبه الأرنب ، وهو الخنزير الغيني .

كافيار **caviar**

اسم لبعض منتجات الأسماك الغنية بالهرمونات الجنسية وخاصة بيوضها ومنها ما هو بلون أسود ومنها الكافيار الأحمر .

الوَتَدِيُّ **cavilla**

يسمى أيضاً (Os sphenoidale) ، (Sphenoid bone) من العظام غير منتظمة الشكل ، ويوجد في قاعدة الدماغ . ويوصف بأنه موجود في مركز الجسم وله جناحان صغيران وكبيران .

1ـ ذو أجْواف **cavitary**
2ـ جَوفِيّ (حيوان)

1 ـ يتصف بوجود جوف أو أجواف .


2 ـ أي حيوان طفيلي جواني له حيز بدني أو قناة هضمية .

جَوف **cavitas TA**
(ج: أجْواف) **(pl.cavitates)**

حيز مجوَّف أو انخفاض أو انخساف ضمن الجسم .

جَوفُ البَطْن **cavitas abdominalis**

انظر تحت cavitas abdominis TA .



Cavernae of penis كهوف القضيب

معاينة جوف بمساعدة منظار التجويف .

التِهابُ الجِسْمِ الكَهْفِي **cavernositis**
(=cavernitis)

انظر تحت cavernitis .

التصوير الشعاعي للجسم الكهفي **cavernosography**

الإظهار الشعاعي للجسم الكهفي للقضيب .

التصوير الشعاعي للجسم الكهفي بالتسريب الديناميكي **dynamic infusion cavernosography**

التصوير الشعاعي للجسم الكهفي والجملة الوعائية المصاحبة له والذي يتبع تسريب وسط التباين أو محلول ملحي ضمن الجسم الكهفي مباشرة ، ويستعمل هذا الأسلوب لتحري التسرب (الارتشاح) الوريدي .

قياس ضغط الجسم الكهفي **cavernosometry**

قياس الضغط الوعائي للجسم الكهفي .

قياس ضغط الجسم الكهفي بالتسريب الديناميكي **dynamic infusion cavernosometry**

التمثيل المخططي للضغط الوعائي في داخل الجسم الكهفي كوظيفة للحجم المتسرب .

فغْرُ التَّجْويف **cavernostomy**

شق جراحي ضمن جوف .

كَهْفِيّ **cavernous**

1ـ يحتوي كهوفاً أو أحيازاً مجوفة .

2ـ تقال عن بعض الأصوات التسمعية منخفضة النغمة لأن لها حجرة رجع صدى تكهفي .

الجَيبُ الكَهْفِيّ **cavernous sinus**

أحد كهفيَن في قاعدة القحف ضمن العظم الوتدي خلف الحجاجين وينزح إليهما الدم من الدماغ والعينين والأنف والفك العلوي قبل أن يغادر القحف عبر الموصلات الوريدية الوداجية الباطنة ، والأوردة الوجهية ، ويمر الشِّريَان السباتي الباطن في كل جهة عبر جُدُر الجيب ومعه العصب .

القسم الأصغر من الجوف الحنجري الممتد من المشق تحت المزمار إلى المشق الدهليزي .

جَوفُ الحَنْجَرَة **cavitas laryngis TA**

الحيز المشمول بجدران الحنجرة .

جَــوفُ النِّقي **cavitas medullaris**

حيـز في جَدل العظم الطويل يحتـوي النقي . ويسمى كذلك قناة النقي وحيز النقي .

جَوفُ الأنْف **cavitas nasi TA**

القسم الذي يمتد من المنخرين إلى البلعوم من ممرات الجهاز التنفسي ، وينقسم بواسطة الحاجز الأنفي إلى نصفين أيمن وأيسر ، قاعه هو الحنك الصلب أي الحنك العظمي الذي يفـصله عن جوف الفم ، وتحتوي جدرانه الوحشية على المحارات والصماخات الأنفية .

الجَوفُ العَظْميُّ للأنْف **cavitas nasi osseum TA**

يسـمى أيضـاً (Bony nasal cavity) ، وهو في الحقيقة تجويفان على جانبي الحاجز الأنفي ومبطنان بالغشاء المخاطي التنفسي ويمتدان من المنخرين في أمام وأسفل الأنف إلى المنعر (قمع الأنف) (Choana) في الخلف . ويتـصـلان بالجيوب الأنفية الموجودة تحت المحارات (ثلاث في كل جانب) .

الجوف الظاهر للفم **cavitas oris externa**

جَوفُ الفَم **cavitas oris TA**

جوف الفم والبنى المصاحبة التي تتضمن الخد ، والحنك ، والمخاطية الفموية ، والغدد التي تنفتح أقنيتها ضمن الجوف ، والأسنان ، واللسان .

الجَوفُ المَخْصوصُ للفَم **cavitas oris propria TA**

قسم الجوف الفموي في باطن الأسنان .

جَوفُ الحَوض **cavitas pelvis TA**

الحيـز ضمن جدران الحوض ، والذي يشكل القسم السفلي والصغير من الجوف البطني الحوضي .

جَوفُ التَّامور **cavitas pericardialis TA**

الحيـز الكامن بين الطبقة الجدارية والطبقة

الجوف البطني **cavitas abdominis TA**

هو الجوف الجسمي الذي يتوضع أسفل الحجاب الحاجز وأعلى الحوض ، يشكل القسم العلوي والرئيسى للجوف البطني الحوضي .

الجوف البطني والحوضي **cavitas abdominis et pelvis**

هو الحيز ضمن الجذع بين الحجاب الحاجز والحد السفلي للحوض الصغير ، وينقسم إلى الجوف البطني والجوف الحوضي .

جَوفُ المَفْصل **cavitas articularis TA**

حيز دقيق في المفصل الزليلي ، محاط بواسطة الغشاء الزليلي والغضاريف المفصلية .

جَوفُ المَحارَة **cavitas conchae**

القسم السفلي من محارة الأذن التي تؤدي إلى الصماخ السمعي الظاهر ، وتسمى كذلك الحفرة اللامسماة في الأذن .

جَوفُ التَّاج (السِّنِّيِّ) **cavitas coronalis TA**

الحجرة اللبية هي قسم من الجوف السني المتوضع في تاج السن ويحتله لب السن .

جَوفُ القِحْف **cavitas cranii TA**

الحيز المَشمول بعظام القحف .

جَوفُ السِّن **cavitas dentis TA**

الجوف الطبيعي من القسم المركزي للسن الذي يحتله لب السن ، والذي ينقسم إلى الحجرة اللبية وجذر السن . ويسمى كذلك جوف العصب وجوف اللب .

الجَوفُ فَوقَ الجَافِيَة **cavitas epiduralis TA**

الجَوفُ الحُقَّانيّ **cavitas glenoidalis TA**

انخفاض في الزاوية الوحشية للكتف من أجل التمفصل مع عظم العضد . ويسمى كذلك حفرة الكتف الحُقانية .

الجَوفُ تَحْتَ المِزْمار **cavitas infraglottica TA**

القسم الأكثر سَفليةً من جوف الحنجرة ، ويمتد من مشق المزمار في الأعلى إلى جوف الرغامى من الأسفل . ويسمى كذلك تحت المزمار .

الجوف الحنجري المتوسط **cavitas laryngea intermedia**

الحيز المتسطح ضمن الرحم ، ويتواصل من كل جانب عند القرن بالقنوات الرحمية ، ومن الأسفل مع المهبل.

أجْواف **cavitates**
(ف: جَوف) (sing.cavitas)

1ـ جَوْف **cavitation**
2ـ تكَهُّفٌ

1ـ تشكل أجواف مرضية كما في التدرن الرئوي .
2ـ جوف مرضي .

التِهابُ الوَرِيْدِ الأجْوَف **cavitis**
انظر تحت celophlebitis .

1ـ جَوف (ج: أجْوافٌ) **cavity**
2ـ حُفْرَة (أسنان)

1ـ حيز أجوف أو مكان مجوَّف ضمن الجسم أو أعضائه ، وقد يكون طبيعياً ، ويسمى الجوف في التسمية التشريحية ، أو يكون مرضياً ، ويسمى التكهف . وله أسماء عديدة منها (Pocket) ، (Pouch) ، (Recess) ، ويسمى أيضاً (Cave) ، (Cavern) ، (Cavum) .
2ـ آفة أو منطقة متخربة في السن تنتج بسبب التسوس السني . وتصنف إلى بسيطة ومركبة أو معقدة بحسب عدد السطوح المكتنفة .
3ـ حفرة سنية مهيأة .
انظر تحت prepared cavity

جَوفُ البَطْن **abdominal cavity**
انظر تحت cavitas abdominis .

الجوف البطني الحوضي **abdominopelvic cavity**
انظر تحت cavitas abdominis et plevis .

أجْوافُ الامْتصاص (في العظاَم) **absorption cavities**
أجوافَ في العظم المكتنز المتنامي بسبب التآكل بناقضة العظم ، وعادة مايحدث في المناطق التي يبدأ بها أولاً .

جَوفُ السِّقاء **allantoic cavity**
يسمى أيضاً (The lumen of the allantois) ،

الحشوية (النِّخاب) من التأمور المصلي .

جَوفُ الصِّفاق **cavitas peritonealis TA**
حيز كامن من الشعيرات الرقيقة بين الصفاق الحشوي والصفاق الجداري ، والذي يكون بصورة طبيعية خالياً إلا من سائل مصلي رقيق مما يحفظ الأسطح ندية . ويسمى كذلك الجوف الصفاقي الأكبر .

جَوفُ البُلْعوم **cavitas pharyngis TA**
الحيز المشمول بواسطة جدران البلعوم .

جَوفُ الجَنْبَة **cavitas pleuralis TA**
الحيز الكامن بين الجنبة الحشوية والجنبة الجدارية ، ويسمى كذلك الحيز الجنبي .

الجوف اللبي **cavitas pulparis**
بديل لجوف السن .

جَوفُ الحاجز الشَّفَّاف **cavitas septi pellucidi TA**

الجَوفُ تَحت العَنْكَبوتيَّة (=الحَيِّزُ تَحْتَ العَنْكَبوتيَّة) **cavitas subarachnoidea (=subarachnoid space)**
انظر تحت subarachnoid space .

جَوفُ الصَّدْر **cavitas thoracia TA**
القسم من جوف البدن المتوضع بين العنق والحجاب الحاجز ، ويسمى كذلك الصدر .

الجوف الثلاثي التوائم **cavitas trigeminale, cavitas trigeminalis**

الجَوفُ الطَّبْليُّ **cavitas tympanica TA**
القسم الأكبر من الأذن الوسطى ، والمؤلف من جوف ضيق مملوء بالهواء في العظم الصدغي ، والذي يحتوى العظيمات السمعية ، ويتواصل مع الخلايا الخشائية الهوائية وغار الخشاء عن طريق المدخل ومع البلعوم الأنفي عن طريق نفير السمع . يُعد الأذن الوسطى والجوف الطبلي في السابق كمترادفين . ويسمى كذلك الطبل .

جَوفُ الرَّحم **cavitas uteri TA**

ويحتوي العضيات المهدبة المركبة ويؤدي إلى معقد بلعومي خلوي مثغري . ويسمى أيضاً جوف الفم .

زاويةُ الحُفْرَة (السنية) **cavity angle**

الزَاوية المتكَونة والتي تشكلها الحفرة السنية مع سطح السن ، وتسمى حسب الجدارين المكونين لها .

تَصْنيفُ الحُفَر (السنية) **cavity classification**

تقسيم الحفر السنية إلى أصناف بحسب الحجم أو السطح السني الذي تصيبه كالسطح الشدقي أو اللساني أو بين الأسنان ، ومنها تصنيف بحسب عدد مرات النكس ، تصنيف الآفة التسوسية حسب أسطح السن التي تصيبها ، وهناك ، ترقيم عددي لأنواع الحفرة حسب التقسيم الذي قدمه بلاك (G.V.Black) .

تَصْميمُ الحُفْرَة **cavity design**

تخطيط شكل الحفرة .

قاعُ الحُفْرَة **cavity floor**

السطح المقابل لفوهة الحفرة ، والمحضر لتستقر عليه الحشو ، لحماية لب السن من الإشارة الحرارية ، أو الإثارة الكيميائية أو الرضح .

الزَّاويَةُ الخَطِّيَّةُ للحُفْرَة (السِّنِّيَّة) **cavity line angle**

ما يبطنَ الحفرة من مواد حافظة .

مُبَطِّنُ الحُفْرَة (السِّنِّيَّة) **cavity liner**

مادة توضعَ داخل الحفرة المحضرة قبل إدخال الحشوة النهائية . الغرض منها سد الأنابيب العاجية لحماية السن من مادة الحشو ، ويوضع على جدران السن المحضر لسد نهايات النبيبات العاجية لحمايتها من من التهيج أو الإثارة .

تَبْطينُ الحُفْرَة **cavity lining**

عملية وضع المادة المبطنة لجوف الحفرة وجدرانها ، وذلك لعزل السن عن التهيج الحراري أو الكيميائي .

جَوفُ المَحارَة **cavity of concha**

يسمى أيضاً (Cavum conchae) ، وهو الجزء الأكبر والأدنى ، وفي أسفل ساق حتار الأذن ، وهو تجويف جنيني يظهر و يختفي ليشكل الحبل السري.

أَجْوافٌ سِنْخيَّة **alveolar cavities**

انظر تحتَ dental alveoli .

الجَوفُ السَّلَويُّ **amniotic cavity**

كيس مغلقَ بين المضغة والسلى ، ويحتوي السائل السلوي .

جَوفُ المَنْصف الأمامي **anterior mediastinal cavity**

الجوف الصدري الواقع خلف القص .

جَوفُ المَفْصل **articular cavity**

انظر تحت cavitas articularis .

جَوفُ باير **Baer's cavity**

جوف انشطاري تحت أديم الأريمة (الغشاء المنتش) (Blastoderm) .

أَجْوافُ البَدَن **body cavities**

هي الأجواف الجسدية التي تحتوي على الأعضاء ، وتقسم في البدء إلى قسمين أمامي بطني وخلفي ظهري . فأما البطني فيضم تجويف الصدر في الأعلى وفيه القلب والرئتين بشكل أساسي ، والتجويف البطني الذي يحتوي على الأحشاء الهضمية والكبد والطحال والكليتين ، وأعضاء الحوض .

الجَوفُ العَظْميُّ للأَنْف **bony cavity of nose**

انظر تحت cavitas nasi osseum .

الجَوفُ العَظْميُّ للأَنْف **bony nasal cavity**

انظر تحت cavitas nasi osseum .

1 ـ حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ شِدْقيَّةٌ **buccal cavity**
2 ـ الجَوفُ الشِّدْقيُّ

1 ـ ذلك القسمَ من جوف الفم المحدد من أحد جانبيه بالأسنان واللثة (الحروف السنية المتبقية) ، ومن الجانب الآخر بالخدود .

2 ـ آفة تسوسية تبدأ في السطح الشدقي لأحد الأسنان الخلفية .

3 ـ جوف الفم .

4 ـ حجرة أمام الفم تشاهد في الأوالي الحيوانية المهدبة العليا ، وتبدو كتقرض أو جيب ،

في الأنسجة المعيبة عند الوهاد والشقوق على الأسطح الإطباقية للضواحك والأرحاء ، وثلثي السطح الإطباقي من الأسطح الشدقية للأرحاء والسطح اللساني للقواطع العلوية ، وأحياناً السطح اللساني للأرحاء العلوية .

حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ من الصِّنْفَ الثَّاني **class II cavity**

حفرة السطح الداني من الأسنان الخلفية ، أو حفر في الأسطح الملاصقة للضواحك والأرحاء .

حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ منَ الصِّنْفَ الثَّالث **class III cavity**

حفرة السطح الوحيدة التي تصيب السطوح الدانية من الأسنان الأمامية وهي حفر في الأسطح المتلاحقة للقواطع والأنياب ، دون أن تشمل الحد القاطع . أي لا تحتاج لإزالة أو حشو الزاوية القاطعة .

حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ منَ الصنفَ الرَابع **class IV cavity**

الحفر التي تصيب السطوح الدانية والزاوية القاطعية للأسنان الأمامية ، وتحتاج لإزالة الزاوية القاطعة .

حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ منَ الصِّنْفَ الخَامس **class V cavity**

الحفر التي تصيب السطح من الثلث اللثوي الشفوي أو الشدقي أو اللساني ، للسن ، غير حفر الوهاد .

حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ مَنَ الصِّنْفَ السَّادس **class VI cavity**

الحفر النخرية الشاذة في مناطق غير مألوفة كالحروف القاطعية للأسنان الأمامية والذرى التاجية للأسنان الخلفية .

جَوفُ انْشطاريّ **cleavage cavity (=blastocoele)**

هو جَوفُ الأُرَيمَة .

انظر تحت blastocoele .

الجَوفُ العامُّ **coelomic cavity**

ويشكل الدهليز الذي يمر إلى الصماخ السمعي الخارجي .

جَوفُ البُلْعوم **cavity of pharynx**

يسمى أيضاً (Cavitas pharyngis) ، (Cavum pharyngis) ، ويتألف من قسم أنفي يمتد في الأمام مع التجويف الأنفي وتنفتح فيه فتحات الأنابيب الأنفية ، وأما القسم الفموي فيقع خلف الفم ويؤدي القسم الحنجري إلى دهليز البلعوم ثم المريء .

جوف الحاجز الشفاف **cavity of septum pellucidum**

انظر تحت cavitas septi pellucidi .

جَوفُ المَهْبل **cavity of vagina**

المر الممتَد من فوهة المهبل الظاهرة (الخارجية) إلى عنق الرحم المتدلي ضمن هذا التجويف .

الزَّاوِيَةُ النُّقْطيَّةُ للحُفْرَةَ السِّنِّيَّة **cavity point angle**

في طب الاسنان هي الزاوية النقطية والمتكونة عند نقطة التقاء ثلاثة سطوح من السن ، أو ثلاثة جدران من التجويف السني وهو المقصود في هذا المصطلح .

خَتْمُ الحُفْرَة **cavity seal**

سَدُّ قُنَيَّات الحُفْرَة السِّنِّيَّة بمواد تحفظها وتمنع تسرب الجراثيم لها .

تَنْظيفُ الحُفْرَة السِّنِّيَّة **cavity toilet**

عمليات تنظيف الحفرة السنية التي يقوم بها طبيب الأسنان باستخدام المجرفة أو إروائها ورشها بالماء ثم تجفيفها بالهواء المضغوط .

جُدْرانُ الحُفْرَة السِّنِّيَّة **cavity walls**

الجدران المحيطة بالحفرة السنية ، والتي تحدد معالم الحفرة المحضرة في السن ، ويسمى حسب سطح السن المواجه له : مثل الإنسي ، الوحشي ، الشدقي ، اللساني ، اللبي ، المحوري ، اللثوي ، الشفوي .

حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ منَ الصِّنْفَ الأَوَّل **class I cavity**

حفرة أو شق على سطح واحد ، وهي حفر تبدأ

حُفْرَةٌ شبيهَةٌ بذَنَب الحَمام **dovetail cavity**
حفرة واسعة في المناطق القاصية وضيقة في القاعدة بما يشبه منظر ذنب الحمام .

الجَوفُ المُحيْطُ بالجَافيَة **epidural cavity**
انظر تحت spatium epidurale .

الجَوفُ الثَّرْبيّ **epiploic cavity**
ويسمى أيضاً الجراب الثربي (Bursa omentalis) ، وهو الجوف الصفاقي الأصغر وهو جزء معزول من الجوف الثربي يقع في الجانب الظهري من المعدة ، ويمتد رأسياً إلى الكبد والحجاب وخلفياً (ذنبياً) إلى الثرب الكبير . وينفتح على الجوف الصفاقي العام في الفتحة الثربية .

حُفْرَةٌ سِنّيَّةٌ تآكُليَّةٌ **erosion cavity**
حفرة سحجية تآكلية بسبب التخريش الميكانيكي أو الكيميائي .

الجَوفُ الفَمَويُّ الظَّاهر **external oral cavity**
يسمى أيضاً (Cavum oris externum) ، وهو جوف الفم ابتداءً من الشفتين حتى حدود شراع الحنك ، ويتلوه الجوف الفموي البلعومي خلف شراع الحنك .

جَوفُ الحَلْق **faucial cavity**
الجوف الفموي البلعومي الذي يمر عبره الطعام إلى المريء بعملية البلع .

أَجْوافٌ متَلَيِّفَة **fibrotic cavities**
أجواف مركبة في الرئة مكونة من نسيج حبيبي محاط بنسيج ندبي ، كالتليف الرئوي مجهول السبب أو التدرن ، ربما يكون هو المصدر الذي ينتشر منه المرض إلى القطع الرئوية المختلفة في التدرن .

حُفْرَةٌ سِنّيَّةٌ مُشَقَّقَة **fissure cavity**
آفة تسوسية تبدأ في شق سني .

الجَوفُ البَطْنيُّ الوعائيّ (في الرخويات) **gastrovascular cavity**
جوف البطن عند الرخويات الذي ينفتح إلى الخارج عند نهاية واحدة لتشكل الفم . ويسمى كذلك المعى البدائي .

يسمى (coelom) ، وهو الجوف الواقع بين الأديم الحشوي والجسدي لدى الجنين . كما يمكن استخدامه للدلالة على التجويف العام عند البالغ .

حُفْرَةٌ سِنّيَّةٌ مُعقَّدَة **complex cavity**
1 ـ آفة تسوسية تكتنف ثلاثة سطوح أو أكثر لأحد الأسنان .
2 ـ حفرة سنية محضرة تشتمل على ثلاثة أسطح أو أكثر من السن مثال : السطح الوحشي والإطباقي والإنسي .

حُفْرَةٌ سِنّيَّةٌ مُركَّبَة **compound cavity**
(=complex cavity)
1 ـ آفة تسوسية تكتنف سطحين من أحد الأسنان .
2 ـ حفرة تشمل سطحين أو أكثر من التاج الإكلينيكي ، أية حفرة سوداء وحشية إطباقية أو حفرة إنسية إطباقية .

الجَوفُ الحُقّيّ **cotyloid cavity**
(= الحُقّ) **(=acetabulum)**
انظر تحت acetabulum .

جَوفُ القحْف **cranial cavity**

حُفْرَةٌ سِنّيَّةٌ عَميقَة **deep cavity**
في طب الأسنان هي الحفرة التي تتجاوز الميناء أو سطح الجذر وتمتد لأعماق السن وقد تصل إلى اللب أو الأقنية السنية .

1 ـ حُفْرَةٌ سِنّيَّةٌ **dental cavity**
2 ـ جَوفُ السِّنّ
1 ـ انظر تحت cavity .
2 ـ انظر تحت cavitas dentis .

حُفْرَةٌ سِنّيَّةٌ وَحْشيَّة **distal cavity**
آفة تسوسية تبدأ في السطح الوحشي (القاصي) للسن .

حُفْرَةٌ سِنّيَّةٌ إطْباقيَّةٌ وَحْشيَّةٌ **distocclusal cavity**
الحفرة الواقعة في السطح الإطباقي الوحشي للسن ، وتتعلق هذه الحفرة بالزاوية الخطية الواقعة بين الجدران الإطباقية الدانية للحفرة السنية .

انظر تحت cavitas laryngealis intermedia .

laryngopharyngeal cavity **الجَـوفُ الحَنْجَـرِيُّ البُلْعومِيّ**

انظر تحَتَ pars laryngea pharyngis .

lesser peritoneal cavity **الجَـوفُ الصِّـفـاقِيُّ الأَصْغَر**

القسم المفصول من التجويف الصفاقي خلف المعدة ، ويسمى أيضاً الجراب الشربي (Bursa omentalis) ، (Epiploic cavity) .

lesser sigmoid cavity of ulna **الجَوفُ السِّينِيُّ الصَّغيرُ للزَّنْد**

ويسمى أيضاً الثلمة الكعبرية الصغرى للزند (Incisura radialis ulnae) ، وهي مسافة بين رأس الزند ورأس الكعبرة .

lingual cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ لِسَانِيَّة**

آفة تسَوسيَة تَبدأ على السطح اللساني لأحد الأسنان .

lymph cavities **الأَجْوَافُ اللِّمْفِيَّة**

الأحياز اللمَفية الأكبر وصهاريج البدن (الجسم) .

marrow cavity **جَوفُ النِّقْي**

انظر تحت cavitas medullaris .

mastoid cavity **جَوفُ الخُشَّاء**

(=antrum mastoideum) **(=غارُ الخُشَّاء)**

Meckel’s cavity **جَوف ميكل**

يسمى أيضاً جوف ثلاثي التوائم (Cavitas trigeminalis ، (Cavum trigeminale) ، وهو شق في الطبقة السحائية من الجافية في الحفرة القحفية الوسطى قرب ذروة الصخرة من العظم الصدغي وهي تغلق جذور العصب ثلاثي التوائم وعقدته .

mediastinal cavity, anterior **جوف المنصف الأمامي**

انظر تحت mediastinum anterius .

mediastinal cavity, middel **جـوف المنصف الأوسط**

انظر تحت mediastinum medium .

gingival cavity **حُفْرَةٌ لِثَوِيَّة**

حفرةَ النَخر السني في المنطقة الأقرب للثة من التاج السني .

glandular cavity **جَـوفٌ غُـدِّيّ**

كيس مجوف يتشكل من انغلاف الغمد الظهاري في الغدة المتنامية عديدة الخلايا .

glenoid cavity **جَـوفٌ حُقّـانِيّ**

انظر تحت cavitas glenoidalis .

greater peritoneal cavity **الجَوفُ الصِّفَاقِيُّ الأَكْبَر**

القسم الداخلي من الكيس الصفاقي ويسمى أيضاً (Cavitas peritonealis TA) ، (Cavum peritonei) ويمثل الحيز الكبير بين الجدار البطني والطبقات الحشوية .

head cavity **جَوفٌ رأسِيّ**

(في الفَقَارِيَّات الدُّنْيا)

الجسيدات المعدَلة في الفقاريات السفلية ، التي تنشأ منها عضلات العين الخارجية .

hemal cavity **الجَوفُ العامُّ الدَّمَوِيُّ**

(في اللافقاريات)

انظر تحت hemocoelom .

incisal cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ قاطِعِيَّة**

آفة تسَوسيَة تَبدأ في السطح القاطعي لسن أمامية .

infraglottic cavity **الجَوفُ تَحْتَ المِزْمار**

انظر تحت cavitas infraglottica .

ischiorectal cavity (=fossa ischiorectalis TA) **الجَوفُ الإِسْكِيُّ المُسْتَقِيمِيّ (=الحُفْرَةُ الإِسْكِيَّةُ المُسْتَقِيمِيَّة)**

labial cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ شَفَوِيَّة**

آفة تسَوسيَة تَبدأ في السطح الشفوي لأحد الأسنان الأمامية .

laryngeal cavity **جَوفُ الحَنْجَرَة**

انظر تحت cavitas laryngis .

laryngeal cavity, intermediate **جوف الحنجرة المتوسط**

occlusal cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ إِطْبَاقِيَّةٌ**

آفة تسَوسيَة تبَدأ على السطح الإطباقي للسن الخلفي .

oral cavity **جَوفُ الفَم**

تجويف الفم ضمن حدود الشفتين ، ويضم الأسنان والبنى الداعمة للأسنان ، واللسان وداخل الخدين حتى الحنجرة واللوزتين ، وفي مسميات الهيئة الدولية للتوحيد القياسي والمعايرة أعطى للحفرة الفموية ككل الزمر 00 ، ومنطقة الفك العلوي الرمز 01 ، ومنطقة الفك السفلي الرمز 02 .

oral cavity, external **جوف الفم الظاهر**

انظر تحت vestibulum oris .

oral cavity, proper **جوف الفم المخصوص**

الجوف المخصوص للفم .

انظر تحت cavitas oris propria .

orbital cavity **جَوفُ الحَجاج**

انظر تحت orbita .

palatal cavity **جَوفٌ حَنَكِيّ**

القبة التي تمثل سقف الفم .

pectoral cavity **جَوفُ الصَّدْر**

انظر تحت cavitas thoracis .

pelvic cavity **جَوفُ الحَوض**

انظر تحت cavitas pelvis .

pericardial cavity **جَوفُ التَّامور**

انظر تحت cavitas pericardialis .

peritoneal cavity **جَوفُ الصِّفاق**

انظر تحت cavitas peritonealis .

peritoneal cavity, lesser **جوف الصفاق الصغير**

انظر تحت bursa omentalis .

pharyngeal cavity **جَوفُ البُلْعوم**

انظر تحت cavitas pharyngis .

pharyngolaryngea cavity **الجَوفُ البُلْعوميُّ الحَنْجَرِيُّ**

انظر تحت pars laryngea pharyngis .

pharyngonasal cavity **الجَوفُ البُلْعوميُّ الأَنْفيُّ**

mediastinal cavity, posterior **جوف المنصف الخلفي**

انظر تحت mediastinum posterius .

mediastinal cavity, superior **جوف المنصف العلوي**

انظر تحت medistinum superius .

medullary cavity **جَوفُ النِّقْي**

انظر تحت cavitas medullaris .

mesial cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ إِنْسِيَّةٌ**

آفة تسَوسيَة تبدأ في السطح الإنسي لأحد الأسنان .

mesiobuccal cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ شِدْقِيَّةٌ إِنْسِيَّة**

الحفرة التي تقع على سَطح السن المقابل للشدق وأقرب للأمام باتجاه فوهة الفم .

mesiocclusodistal cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ إِطْبَاقِيَّةٌ إِنْسِيَّةٌ وَحْشِيَّةٌ**

الحَفرة السَنية في جهة الإطباق الإنسية (الأمامية) من الجهة الخلفية المواجهة لجوف الفم (البلعوم) .

mesiogingival cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ لِثَوِيَّةٌ إِنْسِيَّة (عُنُقِيَّة)**

حفرَة سنية في المنطقة اللثوية الأمامية من السن .

mesioincisal cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ قاطعية إِنْسِيَّة**

حفرة في الأسَنان القاطعية الأمامية من السطح الأمامي الأقرب للخط المتوسط .

mesiolabial cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ شَفَوِيَّة إِنْسِيَّة**

حفرَة سنية في السَطوح المقابلة للشفتين (الأمامية) .

mesio-occlusal cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ إِطْبَاقِيَّةٌ إِنْسِيَّة**

حَفرَة سنية في السطح الإطباقي الأمامي .

nasal cavity **جَوفُ الأَنْف**

انظر تحت cavitas nasi .

nerve cavity (=cavitas dentis TA) **جَوفُ العَصَب (=جَوفُ السِّن)**

انظر تحت cavitas dentis .

انظر تحت pars nasalis pharyngis .

pharyngo-oral cavity **الجَـوفُ البُلْعـومِيُّ الفَمَوِيّ**

انظر تحت pars oralis pharyngis .

pit cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ وَهْدِيَّة**

انظر تحت pit caries .

pleural cavity **جَـوفُ الجَنْبَـة**


انظر تحت cavitas pleuralis .

pleuroperitoneal cavity **الجَوفُ الجَنْبِيُّ الصِّفَاقِيّ**

الجوف العام المؤقت في المضغة والذي سينقسم فيما بعد بالحجاب الحاجز المتنامي ليصبح الجوف الصفاقي وجوف الجنبة .

popliteal cavity (=fossa poplitea) **الجَوفُ المَأْبِضيّ (=الحُفْرَةُ المَأْبِضيَّة)**

انظر تحت fossa poplitea .



Oral cavity جَوفُ الفَم

posterior mediastinal cavity **جوف المَنْصف الخَلْفي**

prepared cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ مُهَيَّأَة**

الحفرة التي تنتج في سن لدعم امتلاء المادة وتثبيتها وحماية بنية السن بعد نزع النسج المتسوسة جميعها .

proper oral cavity **الجَوفُ الفَمَوِيُّ المَخْصوص**

يسمى أيضاً (Cavum oris proprium) ، وهو جوف الفم الذي تحيط به الأسنان والذي يجمع فيه الشخص الطعام ليقذفها اللسان إلى المريء .

proximal cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ دانيَة**

آفة تسوسية تبدأ في السطح الداني لأحد الأسنان .

pulp cavity (=cavitas dentis) **جَوفٌ لُبِّيّ (=جَوفُ السِّن)**

انظر تحت cavitas dentis .

rectoischiadic cavity (=fossa ischiorectalis) **الجَوفُ الإسْكيُّ المُسْتَقيميّ (=الحُفْرَةُ الإسْكيَّةُ المُسْتَقيميَّة)**

الحُفْرَةُ الإسْكيَّةُ الشرجية .

انظر تحت fossa ischioan

resorption cavity **كهف الارتشاف**

المنطقة التي تنقبها ناقضات العظم في عملية التقلب العظمي .

Retzius's cavity (=spatium retropubicum) **جَوفُ ريتْزيوس (=الحَيِّزُ خَلْفَ العانة)**

Rosenmuller's cavity (=recessus pharyngeus) **جَوفُ روزنميلَّر (=الرَّدْبُ البُلْعوميّ)**

segmentation cavity (=blastocoele) **جَوفُ التَّقَطُّع (=جَوفُ الأَرِيمَة)**

serous cavity **جَوفٌ مَصْليّ**

الجوف العام ، كمثل الجوف المشمول بالتأمور أو الجنبة أو الصفاق ، ولا يتواصل إلى خارج البدن ، ويكون مبطناً بالأغشية التي تفرز السائل المصلي .

shallow cavity **حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ ضَحْلَة**

sigmoid cavity of radius (=incisura ulnaris radii) **الجَوفُ السِّينيُّ للكُعْبُرَة (=الثُّلْمَةُ الزَّنْدِيَّة للكُعْبُرَة)**

sigmoid cavity of ulna, greater **الجَـوف السـيني الكبير للزند**

هي الثلمة البكرية للزند .

انظر تحت incisura trochlearis ulnae .

الجَـوفُ الطَّبْليُّ **tympanic cavity**
انظر تحت cavitas tympanica .

جَوفُ الرَّحم **uterine cavity**
انظر تحت cavitas uteri .

جَوفٌ حَشَوِيّ **visceral cavity**
أحـد أجـواف البـدن التي تحـتـوي الأعـضـاء الداخليـة مـثل جـوف البطن وجـوف الصـدر وجـوف الحـوض . ويسـمى أيضـاً (Splanchnic cavity) .

جَوفُ الزُّجاجيَّة **vitreal cavity**
في العين ، هَو التـجـويف الذي يضم الخلط الزجاجي العيني في كرة العين خلف العدسة .

حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ واسعة **wide cavity**
وصفَ للحفرةَ السنية الواسعة الفوهة .

الجَوفُ المُحِّيُّ **yolk cavity**
الحيز بين القرص المضغي ومح البيضة النامية عند بعض الحيوانات .

cavogram **صورةُ الوَريدِ الأجْوَف**
تصوير وعائي لأحد الوريدين الأجوفين العلوي أو السفلي أو كليهما .

cavography **تَصْويرُ الوَريدِ الأجْوَف**
(=venacavography)

cavosurface **سَطحُ الحُفْرَةِ السنيَّة**
مـصطلح يشـيـر إلى التـقـاء جدار الحـفـرة مع السطح الخارجي للسن .

زاوِيَةُ سَطْحِ الحُفْرَةُ السِّنِّيَّة **cavosurface angle**
الزَاوية المحـصـورة بين جـدار التـجـويف السني وسطح السن الذي حفر فيه .

cavovalgus **حَنَفٌ خَمَصِيٌّ رَوَحِيّ**
(=talipes cavovalgus)

cavovarus **حنف خمصي أفحج**
انظر تحت talipes .

cavum TA (pl.cava) **جَوف** (ج:أجْواف)
(=cavitas TA)

نمط لأحد الأجواف .

جَوفُ البَطْن **cavum abdominis**
يسـمى أيضـاً (Cavitas abdominalis) ،

الجوف السيني **sigmoid cavity**
الصغير للزند **of ulna, lesser**
هي الثلمة الكعبرية للزند .
انظر تحت incisura radialis ulnae .

حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ بَسيطَة **simple cavity**
الآفة التَسوسية التي تكتنف سطحاً سنياً واحداً عندما تهيأ ، وتصمم بحسب السطح المكتنف كأن تكون شـدقيةً أو إنسية أو قـاصية أو شـفوية أو لسانية أو قاطعية أو إطباقية .

الجَوْفُ الجَسَدَيّ **somatic cavity**
(في الجَنين)
القسم داخل الجنين من الجوف العام .

جَوفُ الجُسَيدَة **somite cavity**
(=الجَوفُ العَضَلَيُّ) **(=myocoele)**

جَوفٌ حَشَوِيّ **splanchnic cavity**
انظر تحت visceral cavity .

الجَوفُ تَحْتَ العَنْكَبوتيَّة **subarachnoid cavity**
انظر تحت spatium subarachnoideum .

الجَوفُ تَحْتَ الجافيَة **subdural cavity**
انظر تحت spatium subdurale .

أَجْوافٌ عاليَةُ التَّوتُّر **tension cavities**
(في الرِّئتَيْن)
أجواف الرئة التي يكون فيها ضغط الهواء أكبر من الضغط الجوي ، كما في استرواح الصدر الضاغط . يظهر الجوف عالي التوتر بالصورة الشعاعية كعيوب كروية كبيرة ذات جدران رقيقة تشير إلى التفاعل الالتهابي في القصبات التي تنزح الجوف ، أو تشير إلى التضيق الجزئي بسبب التليف حول القصبة .

جَوفُ الصَّدْر **thoracic cavity**
انظر تحت cavitas thoracis .

جَوفُ الثُّلاثيِّ التَّوائم **trigeminal cavity**
انظر تحت cavum trigeminale .

جَـوفٌ سُلِّيٌّ **tuberculous cavity**
الكهف السلي الذي يتكون نتـيـجـة التنخـر النسـيـجي الجـبني السلي ، ثم طرح الأنسـجـة المتنخرة خارج الكهف عبر القصبات .

وتحته .

جَوفُ الحَنْجَرَة **cavum laryngis TA**

ويسمى أيضاً (Cavitas laryngis) ، (Cavity of larynx) ، وهو الجوف الممتد من الحنجرة للأعلى حتى مستوى الثنيات الطرجهالية اللسان المزمارية ، وهي مدخل الحنجرة وإلى الأسفل من خلال المشق المزماري إلى الحيز داخل المزماري .

جَوفُ ميكل **cavum meckelii**

يسمى أيضاً (Cavum trigeminale) .

انظر تحت Meckel's cavity .

جَوفُ المَنْصِفِ الأماميُّ **cavum mediastinale anterius**

يسمى أيضاً (Mediastinum anterius) ، وهو القسم المنصفي خلف القص والمشتمل على نسج هوائية وأوعية لمفية ويمتد حتى تأمور القلب ويحده في الجانبين الجنبة الرئوية .

جَوفُ المَنْصِفِ الخَلْفيُّ **cavum mediastinale posterius**

يسمى أيضاً (Posterior mediastinum) ، وهو القسم الخلفي من المنصف الذي يحده خلفياً العمود الفقري ومن الأمام التأمور ومن الجانبين الغشاء الجنبي للرئتين ، ويضم الأورطي النازل والمريء والأجوفين وجزء من الوريد الفرد والقناة الصدرية اللمفاوية والأوردة العلوية الوربية .

جَوفُ النِّقْي **cavum medullare ossium TA**

هو لب العظم الإسفنجي الذي يتجمع فيه نقي العظم .

جَوفُ الأَنْف **cavum nasi TA**

التجويف الأنفي المقسوم بالحاجز الأنفي إلى قسمين يمرر الهواء بطرق متعرجة في جانبيه الوحشيين بقصد تلطيفه وترطيبه وتنقيته بما فيه من غشاء مخاطي واسع مع الشعر في مدخله ، ويحتوي في سقفه على الأعصاب الشمية .

الجَوفُ العَظْميُّ للأَنْف **cavum nasi osseum TA**

(Abdominal cavity) ، وهو الحيز البطني الذي تحيط به الجدر البطنية ويحده من الأعلى عضلة الحجاب ومن الأسفل عضلات الحوض . ويحتوي على أحشاء البطن من الجهاز الهضمي والكلوي البولي والتناسلي والكبد والطحال وغدتي الكبد والبنكرياس .

الجَوفُ تَحْتَ العَنْكَبوتيَّة **cavum arachnoideale**

هو الحيزَ تحت الجافية من الأغشية السحائية (Subdural space) ، ويحتوي على السائل النخاعي .

جَوفُ المَفْصِل **cavum articulare TA**

الجوف الذي تحيط به المحفظة المفصلية من حوله ، والسطوح المفصلية العظمية من الجهتين الأخريتين . ويحتوي على السائل المفصلي المزلق والمسهل لحركة المفصل .

جَوفُ المَحارَة **cavum conchalis TA**

جَوفُ التَّاج **cavum coronale**

يسمى (Cavitas coronalis) ، (Crown cavity) ، وهو الحيز ضمن التاج السني الممتد مع القناة الجذرية .

جَوفُ السِّن **cavum dentis**

يسمى أيضاً (Cavitas dentis) ، (Pulp cavity) ، أي التجويف اللبي ، وهو الحجرة المركزية التي تضم التجويف التاجي والقنوات الجذرية ويحتوي على اللب السني الليفي الوعائي ومحاط محيطياً بالرومات السنية .

جَوفُ دوجلاس **cavum douglasi**

يسمى أيضاً اللجف المستقيمي الرحمي (Excavatio-rectouterina) ، (Douglas'cul-de-sac) ، (Douglas' pouch) ، (Rectoute rine pouch) ، (Rectovaginouterine pouch) ، وهو الجيب المتكون من انثناء الصفاق ما بين الرحم والمستقيم .

الجَوفُ فَوقَ الجافيَة **cavum epidurale**

الجَوفُ تَحْتَ المِزْمار **cavum infraglotticum**

الحيز الواقع بيَن لسَان المزمار والحنجرة خلفه

الصفاقي الأمامي المحدد بالحيز المحصور بين الطبقتين الجدارية والحشوية من الصفاق .

جَوفُ البُلْعوم **cavum pharyngis TA**

انظر تحت cavity of pharynx .

جَوفُ الجَنْبَة **cavum pleurae TA**

الجوف المحدد بالطبقتين الحشوية والجدارية من الجنبة المحيطة بالرئتين ، وفيها سائل رقيق لزج يؤمن الحركة السهلة للجهاز التنفسي أثناء الشهيق والزفير .

جوف أم القبو **cavum psalterii**

هو بطين فيرجا (البطين السادس) .

انظر تحت verga's ventricle .

جَوفُ اللُّبّ **cavum pulpae**

يسمى أيضاً جوف السن (Cavum dentis) ، وهو الجوف الذي يحتوي على لب السن داخله .

الجَوْفُ الإسْكيُّ المُسْتَقيميّ **cavum rectoischiadicum TA**

(= الحُفْرَةُ الإسْكيَّةُ المُسْتَقيميَّة)

انظر تحت fossa ischiorectalis TA .

جَوفُ ريتز **cavum retzii**

يسمى أيضاً الحيز خلف العانة (Spatium retro-pubicum) ، (Retropubic space) ، (Retzius' cavity) ، (Retzius' space) ، وهي منطقة رخوة تحتوي على نسيج ضام وتقع بين العانة والمثانة بلفافتها .

جَوفُ الحاجز الشَّفَّاف **cavum septi pellucidi TA**

الفلح الناصف بين صفيحتين للحاجز الشفاف ، ويسمى كذلك البطين الكاذب ، وبطين دونكان (طيات الصفاف المغطي للرحم) ، والبطين الخامس ، وبطين سلفيوس ، وبطين فيوسانس .

جَوفُ حاجز الدِّماغ الانْتِهائي **cavum septi telencephali**

الجَوفُ تَحْتَ العَنْكَبوتِيَّة **cavum subarachnoideum TA**

الجدران العظمية التي تحيط بالتجويف الأنفي من جميع الجهات وتتبطن بالغشاء المخاطي الأنفي لتأمين الرطوبة والتصفية وتلطيف الهواء البارد أو الساخن ، ويشتمل ضمنه على الجيوب الفكية في الجانبين والجبهية في الأعلى مع الصفيحة الغربالية التي تمرر الأعصاب الشمية .

الجَوفُ الظَّاهِرُ للفَم **cavum oris externum**

(= دهْليزُ الفَم) **(=vestibulum oris)**

انظر تحت vestibulum oris .

جَوفُ الفَم **cavum oris TA**

الجوف المحدود بالجدار الشدقي في الجانبين والشفتين من الأمام والبلعوم من الخلف ، ويحتوي ضمنه على الأسنان واللسان واللوزتين والغدد اللعابية .

الجَوفُ المخصوصُ للفَم **cavum oris proprium**

انظر تحت proper oral cavity .

جَوفُ الصَّدْر **cavum pectoris**

يسمى أيضاً (Cavum thoraci) ، وهو الجوف العلوي الكبير من الجذع المحاط بالأضلاع ، ويحتوي على أهم الأعضاء الحيوية وهما القلب والرئتان . والأوعية الدموية الكبيرة والأعصاب الكبيرة العابرة إلى البطن .

جَوفُ الحَوض **cavum pelvis TA**

هو التجويف السفلي من الجذع والمحاط بالعظام الحوضية لحماية أحشائه المكونة من الجهاز التناسلي خاصة عند المرأة كما يحتوي على المثانة من الجهاز البولي ، والمستقيم من الجهاز الهضمي .

جَوفُ التَّامور **cavum pericardii TA**

الجوف المحيط بالقلب والمملوء بسائل لزج لحماية القلب وتأمين حركته الميكانيكية السهلة .

جَوفُ الصِّفاق **cavum peritonaei**

يسمى أيضاً (Cavitas peritonealis) ، (Cavum peritonei) ، (Greater peritoneal cavity) ، (Peritoneal cavity) ، والمقصود به الكيس

انظر تحت talipes .

cavy **قُبَيْعَة (جِنسُ حَيَوانٍ مِنَ القَوارِض)**

هو الخنزير الغيني .

Caytine **كايتين**

الاسم التجاري لمستحضر بروتوكيلول هيدروكلوريد (Protokylol hydrochloride) وهو دواء موسع للقصبات .

Cb1 **Cb1**

هو الكوبالامين (Cobalamin) ، ضرب من خلل الاستعمال داخل الخلية للكوبالامين (الفيتامين B_{12}) وتخليق أشكاله من تميم الإنزيم ، والتي تعطي Cb1A-Cb1G .

Cd **رمز الكادميوم (كد ؛ Cd)**
(=Cadmium)

1 ـ الرمز الكيميائي لعنصر الكادميوم .

2 ـ مختصر ذنبي أو عجزي أو ذو علاقة بالعمود الفقري .

ceasmic **مصاب باستِدامَةِ الشُّقوقِ الجَنينِيَّة**

وصف لحالة للإصابة باستدامة الشقوق الجنينية بعد الولادة .

cebocephalus **قِرْدِيُّ الرَّأس**

وصف لحالة جنين قردي الرأس (Cebocephaly) .

cebocephaly **قِرْدِيَّةُ الرَّأس**

تشوه خلقي للرأس ، يتميز برأس قردي الشكل يكون فيه غياب الأنف ، وتقارب تجويفي الحاجبين (العينين) ، مما يعطي مظهراً يشبه القرد .

cecal **1 ـ أَعْوَرِيّ**
2 ـ مُغْلَقُ النِّهايَة

1 ـ ينتهي بممر مغلق .

2 ـ متعلق بالأعور (أعوري)

cecectomy **اسْتِئْصالُ الأَعْوَر**

استئصال الأعور عن طريق الجراحة .

cecitis **الْتِهابُ الأَعْوَر**

من أنواع التهاب الأعور .

انظر تحت typhlitis .

انظر تحت spatium subarachnoideum .

cavum subdurale **الجَوفُ تَحْتَ الجافيَة**

يسمى أيضاً (Spatium subdurale) ، (Subdural cavity) ، (Subdural space) ، وهو مسافة ضيقة جداً تقع بين الجافية والعنكبوتية . وتحتوي على سائل رقيق مرطب لتلك الطبقتين السحائيتين المذكورتين .

cavum thoracis **جَوفُ الصَّدْر**

انظر cavum pectoris .

cavum trigeminale TA **جَوفُ الثُّلاثِيِّ التَّوائم**

اندلاق أو تجيب خارجي صغير للأم الجافية ، والتي تحيط بعقدة العصب الثلاثي التوائم وانقساماته عند نهاية القسم الصخري للعظم الصدغي ، وتحتوي عقدة العصب الثلاثي التوائم . ويسمى كذلك حيز ميكل .

cavum tympani TA **الجَوفُ الطَّبْلِيُّ**

يسمى أيضاً (Cavitas tympanica) ، (Cavity of middle ear) ، (Cavum tympani) ، (Tympanic cavity) ، (Tympanum) ، وهو حجرة هوائية في العظم الصدغي تحتوي على العظيمات السمعية ، ومبطن بغشاء مخاطي ويمتد بالأنبوب السمعي من الأمام والغار الطبلي والخلايا الهوائية من الخلف .

cavum uteri TA **جَوفُ الرَّحِم**

يسمى أيضاً (Cavitas uteri) ، (Uterine cavity) ، (Cavity of uterus) ، وهو الحيز الممتد داخل الرحم من القناة العنقية الرحمية إلى فوهتي القناتين الناقلتين للبيوض .

cavum vergae **جَوفُ فيرجا**

يسمى أيضاً البطين السادس (Sixth ventricle) ، (Cavum psalterii) ، وهو حيز شقي أفقي غير ثابت يقع بين الثلث الأول الخلفي من الجسم الشاحب وصوار القبو ويظهر نتيجة فشل هاتين الصفيحتين من الالتحام أثناء المرحلة الجنينية .

cavus **حَنَفٌ خَمَصِيّ**
(=talipes cavus)

عملية استئصال أو بضع الأعور .

الأعْوَر **cecum**

الجزء الأول من القولون ، وهو بشكل جيب متسع يلي اللفائفي ، ويخرج منه الزائدة الدودية .

الأعْوَرُ القُبَيْبيُّ للقَنَاة القَوقَعيَّة **cecum cupulare ductus cochlearis TA**

تسمى أيضاً (Cupular cecum of cochlear duct) ، وهي نهاية القناة القوقعية العلوية وسميت أعورية لأنها مغلقة النهاية .

أعْوَرُ مُتَحَرِّك **cecum mobile**

تحرك غير طبيعي (شاذ) للأعور و الجزء الأدنى من القولون الصاعد بسبب التدوير (الاستدارة) غير الكامل أو نتيجة تثبيت الأعور الخاطئ في التطور الجنيني .

الأعْوَرُ الدِّهْليزيُّ للقَنَاة القَوقَعيَّة **cecum vestibulare ductus cochlearis TA**

القناة القوقعَية السفلية وسميت أعورية لأنها مغلقة النهاية . تسمى أيضاً (vestibular cecum of cochlear duct) .

الأعْوَرُ القُبَيْبيُّ للقَنَاة القَوقَعيَّة **cupular cecum of cochlear duct**

انظر تحت cecum cupulare ductus cochlearis .

الأعْوَرُ الكَبديّ **hepatic cecum**

يسمى أيضاً البرعم الكبدي ، وهو البرعم الذي ينمو باتجاه الأمام ضمن الوريقة المتوسطة في المرحلة الجنينية ، ويسمى الحجاب المعترض .

أعْوَرُ مُرْتَفِع **high cecum**

أعور يوجد في موقع أعلى من وضعه الطبيعي داخل البطن .

أعْوَرُ مُتَحَرِّك **mobile cecum**

تحرك غير طبيعي للأعور نتيجة للتدوير غير الكامل أو لتثبيت الأعور بشكل خاطئ أثناء نمو الجنين .

الأعْوَرُ الدِّهْليزيُّ للقَنَاة القَوقَعيَّة **vestibular cecum of cochlear duct**

قيلة أعْوَريَّة **cecocele**

فتق يحوي جزء من الأعور .

متعلق بالبُقعَتيْن العَمْيَاءِ و المَرْكزيَّة **cecocentral (=centrocecal)**

انظر تحت centrocecal .

أعْوَريّ قولونيّ **cecocolic**

وصف يتعلق بالأعور و القولون معاً .

الأعْوَرُ القولونيّ **cecocolon**

الأعور والقولون ينظر إليهما كوحدة واحدة .

تثبيتُ الأعْوَرِ و القولون **cecocolopexy**

عملية جراحية لتثبيت الأعور والقولون الصاعد بجدار البطن .

مُفاغرَة أعْوَريَّة قولونيَّة **cecocolostomy**

عملية جراحية لمفاغرة (اتصال) الأعور والقولون .

تثبيتُ الأعْوَر **cecofixation**

عملية جراحية تجري لتثبيت الأعور ؛ لإصلاح فرط حركيته .

انظر تحت cecopexy .

مُفاغرَة أعْوَريَّة لفائِفيَّة **cecoileostomy (=ileocecostomy)**

عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين الأعور واللفائفي .

تثبيتُ الأعْوَر **cecopexy**

عملية تثبيت أو تعليق الأعور لإصلاح فرط حركيته ، وتسمى أيضاً (Cecofixation) .

تثنِيَةُ الأعْوَر **cecoplication**

ثني جدار الأعور لإصلاح هبوط أو اتساع فيه .

رَفْوُ الأعْوَر **cecorrhaphy**

رتق وإصلاح الأعور .

مُفاغرَة أعْوَريَّة سِيْنِيَّة **cecosigmoidostomy**

تكوين فتحة اصطناعية بين الأعور والقولون السيني الذي يتم في العادة عن طريق الجراحة .

فَغْرُ الأعْوَر **cecostomy**

إجراء مفاغرة أو ناصور بالأعور كما تسمى كذلك الفتحة المكونة بهذا الاجراء الجراحي .

بضع الأعْوَر **cecotomy**

مضاهئ جزئي التخليق للمضاد الحيوي الطبيعي السيفالوسبورين ، وهو فعال ضد مجال واسع من الجراثيم موجبة و سالبة الجرام .

سيفورانيد (مُضادٌ حَيَوِيّ) **ceforanide**

مضاد حيوي من السيفالوسبورين جزئي التخليق وله فاعلية واستخدامات مشابهة للسيفامندول ، ويعطي عن طريق العضل والوريد .

سيفوتاكسيم (مُضادٌ حَيَوِيّ) **cefotaxime**

سيفالوسبورين جزئي التخليق واسع الفعالية ، فعال ضد الكثير من المكروبات التي اصبحت مقاومة للبنسلين والسيفالوسبورين والأمينوجليكوزيد .

سيفوكسيتين (مُضادٌ حَيَوِيّ) **cefoxitin**

مضاد حيوي من السيفالوسبورين ، يشتق من السيفاميسين ويعتبر من الجيل الثاني للسيفالوسبورين ، وهو فعال ضد مدى واسع من الجراثيم موجبة و سالبة الجرام ولديهم مقاومة شديدة من بيتا ـ لاكتاماز .

سابقة بمعنى الجَوْف **cel-**

سابقة ترتبط ببعض الأشياء المجوفة .

المُتَوسِّطة **celarium**
(=mesothelium)

هو التبطين (البطانة) الظهاري للجنبة والصفاق والتأمور ، والمستمد من الطبقة السطحية للأديم المتوسط الجنيني .

انظر تحت mesothelium .

المِعى البِدائيُّ **celenteron**
(=archenteron) **(=الجَوفُ المَعِديُّ الوِعائيُّ)**
(=gastrovascular cavity)

المعي البدائي ، والتجاويف المعدية الوعائية .

بَطْنِيٌّ **celiac**

انظر تحت abdominal .

اِستِئْصالُ عضوٍ بَطنِي **celiectomy**

أي استئصال جراحي لأحد الأجزاء البطنية .

سابقة بمعنى البَطْن **celio-**

كلمة مركبة ذو علاقة بالبطن .

انظر تحت ductus vestibulare cecum cochleari .

السيديسيَّة **Cedecea**

(جِنسُ جَراثيمٍ مِنَ الأمْعائِيَّات)

فصيلة من الجراثيم سالبة الجرام لاهوائية . وهي جراثيم عصوية من عائلة الجراثيم المعوية ، والتي يتم فصلها من العينات الإكلينيكية من الجهاز التنفسي البشرى ، من الممكن أن تكون ممرضات انتهازية وتؤدي إلى أمراض محتملة .

السِّيديسِيَّةُ الدَّافسِيَّة **Cedecea davisae**

جراثيمَ عصويةَ مَن عائلة الجراثيم المعوية والتي يتم عزلها من العينات الإكلينيكية للجهاز التنفسي ، وهي جراثيم انتهازية قد تؤدي إلى أمراض محتملة .

سيفاكلور (مُضادٌ حَيَوِيّ) **cefaclor**

الجيل الثاني من السيفالوسبورين جزئي التخليق ، وهو فعال ضد نطاق واسع من الجراثيم موجبة وسالبة الجرام ، ويستخدم لعلاج التهابات المسالك البولية والجهاز التنفسي والجلد والأنسجة الرخوة ويعطي عن طريق الفم

سيفادْرُوكسيل (مُضادٌ حَيَوِيّ) **cefadroxil**

سيفالوسبورين جزئي التخليق ، وهو المضادات الحيوية .

سيفامَنْدُول (مُضادٌ حَيَوِيّ) **cefamandole**

مضاد حيوي من السيفالوسبرين جزئي التخليق ، وهو ملح أحادي الصوديوم من السيفامندول .

سيفابارُول (مُضادٌ حَيَوِيّ) **cefaparole**

مضاد حيوي من السيفالوسبورين جزئي التخليق .

سيفاتريزين (مُضادٌ حَيَوِيّ) **cefatrizine**

مضاد حيوي من السيفالوسبورين جزئي التخليق .

سيفازافلور (مُضادٌ حَيَوِيّ) **cefazaflur**

مضاد حيوي من السيفالوسبورين جزئي التخليق .

سيفازولين (مُضادٌ حَيَوِيّ) **cefazolin**

للصفاق .

celiomyomectomy **استئصالُ الورَمِ العَضَليّ الرَّحِمِي بطريقِ البَطن**

استئصال الورم العضلي الرحمي عبر جدار البطن .

celiomyomotomy **بَضْعُ العَضَلِ بطريقِ البَطن**

بضع في عضو عضلي أو ورم عن طريق البطن .

celiomyositis **التِهابُ عَضَلاتِ البَطن**

celioparacentesis **بَزْلُ البَطن**

بزل بطني (بزل التجويف الصفاقي) (Abdominocentesis) .

celiopathy **اعتِلالٌ بَطنِيّ**

celiocentesis **بَزْلُ البَطن**

سحب سائل من تجويف البطن (بزل الصفاق) (Abdominocentesis) .

celiocolpotomy **فتحُ البَطنِ بطريقِ المَهْبِل**

بضع وفتح البطن عن طريق المهبل .

celiogastrotomy بَضْعُ المَعِدَة بطَريقِ البَطْن

بضع وفتحَ التجويفَ المعَدي عبر جدار البطن .


celiohysterectomy **1ـ استِئصالُ الرَّحِم بطريقِ البَطن**

2ـ استِئصالُ الرَّحِمِ القيصَرِيّ

استئصال الرحم عبر جدار البطن .

celioma **وَرَمٌ بَطنِيّ**

ورم بطني خاصة ورم الطبقة الوسطى



Cecum الأعور

خَلِيَّةٌ مُفْرِزَةٌ للحَمْض **acid cell**
(=خَلِيَّةٌ جِدارِيَّة) **(=parietal cell)**
انظر تحت parietal cells .
خَلِيَّةٌ حَمضَة **acidophilic cell**
خَلِيَّةٌ عُنَيبِيَّة **acinar cell**
أيَ من الخلايا المبطنة للعنيبية ، ينطبق على الخلايا المفرزة لمولد الإنزيم في عنيبات البنكرياس .
خَلِيَّةٌ عُنَيبِيَّة **acinous cell**
أيَ من خَلايا المبطنة للعنية (توسع كيسي صغير في نهاية قنية أو مجرى صغير) ، خاصة ينطبق على الخلايا المفرزة لمولد الإنزيم في العنيبات في البنكرياس .
خَلِيَّةٌ شَعرِيَّةٌ سَمْعِيَّة **acoustic hair cell**
(في عضَو كورتِي)
أي من الخلايا ذات الأهداب والتي تعمل كمستقبلات حسية في أعضاء السمع ، وتسمى أيضاً (Auditory cell) .
خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّة **adipose cell**
هَي خلية دَهنية .
خَلاَيا الغلالَة البَرَّانِيَّة **adventitial cells**
انظر تحت pericyte .
خَلاَيا نابِرَة الأَنْف **agger nasi cells**
هي خلايا الجزء الأمامي للعرف الغربالي وتكوّن الجزء المُهوَّى من العظام الدمعية .
خَلِيَّةٌ لاحُبَيبِيَّة **agranular cell**
هَي خلايا لا وجود للتحبب بها .
خَلِيَّةٌ هَوائِيَّة (في الرئة) **air cell**
1 ـ أي حجيرة جسمية ضغيرة مملوء بالهواء ، مثل الحويصلات في الرئتين .
2 ـ فجوة تحوى هواء ومحاطة بجدر جسمية ، عادة أحد عظام الرأس كالخلايا الغربالية الهوائية ، والخلايا الخشائية الهوائية ، أو الخلايا الأنبوبية الهوائية .
خَلِيَّةٌ أَلْبومِينِيَّة **albuminous cell**
(= خَلِيَّةٌ أَلْفا)
خَلاَيا أَلْفائِيَّة **alpha cells**

مرض واعتلال بطني .
تقيُّحٌ بَطنِي **celiopyosis**
وجود تقيح بالتجويف البطني .
رَفْوُ البَطن **celiorrhaphy**
انظر تحت laparorrhaphy .
استِئْصالُ البُوقِ بطريقِ البَطن **celiosalpingectomy**
الاستئصال الجراحي للبوق عن طريق البطن .
بَضْعُ البُوْقِ بطريقِ البَطن **celiosalpingotomy**
البضع الجراحي للبوق عن طريق البطن .
مِنْظارُ البَطن **celioscope**
أداة لتنظير البطن عن طريق دائرة مرئية مغلقة .
انظر تحت laparoscope .
تَنْظيرُ البَطن **celioscopy**
تنظير التجويف البطني باستخدام دائرة مرئية مغلقة .
انظر تحت laparoscopy .
فَتحُ البَطن **celiotomy**
هو عملية فتح البطن ، ويطلق عليها أيضاً (Laparatomy) ، (Peritoneotomy) .
فَتْحُ البَطْن بطَريق المَهْبِل **vaginal celiotomy**
بضع التجَويف البَطنيَ عَن طريق المهبل .
فَتْحُ البَطْن بطَريق الجِدار **ventral celiotomy**
فتح واستكشاف البطن عن طريق جدار البطن .
التِهابٌ بَطنِيّ **celitis**
أي التهاب يحدث في البطن .
خَلِيَّة (ج:خَلايا) **cell**
1 ـ أي كتلة صغيرة تكوّن نسيج منظم ، تتكون من نواة محاطة بسائل هيولي يحوي العضيات المختلفة داخل الخلية بواسطة الغشاء البلازمي ، والخلية هي الوحدة التركيبة والوظيفة الأساسية للكائن الحي .
2 ـ فضاء صغير غالباً مغلق .
خَلاَيا إضافِيَّة **accessory cells**
نوع من انواع الكريات الدموية البيضاء أو البلعوميات ، والتي تتعاون مع الخلايا اللمفاوية نوع T و B في تخليق رد الفعل المناعي .

خَلَايَا أَمِيبِيَّةُ الشَّكْل **ameboid cell**
أي خلية لها القدرة على تغيير شكلها وتتحرك في محيطها ، تسمى أيضاً (Migratory cells) ، (Wandering cells) ، (Amebocyte) ، (Plano-cyte) .

خَلَايَا مُزْدَوِجَةُ التَّلَوُّن **amphophilic cells**
الخلايا التي تصطبغ بسرعة بالأصباغ الحامضية أو القاعدية ، تسمى أيضاً (Amphophil) ، (Amphocrpmatophil) ، (Amphochromophil) ، (Amphocyte) .

خَلِيَّةٌ كَشَمِيَّة **anaplastic cell**
هي خلية سرطانية .

خَلِيَّةٌ آنيتْشكوف **Anichkov's cell**
(=Anitschkow's cell)
(في الروماتزم القلبي ضمن أجسام آشوف) مجموعة من البلعم السريع التغير يوجد في أجسام آشوف ، عند حدوث الإصابات الالتهابية بالقلب تميز الحمى الروماتزمية ، وتحوي نوايا دائرية أو بيضاوية مع شريط كروماتيني اسطواني مركزي يشبه حشرة اليسروع ، وتسمى أيضاً (Anihkov's mono-cyte) ، (Cardiac histocyte) ، (Caterpillar cell) .

خَلِيَّةٌ مُقَدِّمَةٌ لِلمُسْتَضِد **antigen presenting cell**
مجموعةٌ من الخلايا متفرعة الشكل تظهر في النخاع العظمي ، وتهاجر لمواقع أخرى بالجسم ، وتظهر ارتجاع للمستضدات على سطوحها عند التعرض للخلايا اللمفاوية ، وبذلك تحوي رد فعل مناعي ، والمجموعة تشمل خلايا شجرية جريبية ، خلايا بين إصبعية ، خلايا حجابية ، وخلايا لانجرهانز .

خَلِيَّةٌ مُتَفَاعِلَةٌ مَعَ المُسْتَضَد **antigen reactive cell**
1 ـ اللمفاويات التائية تتكاثر بسرعة استجابة لوجود المستضد .
2 ـ الخلايا ذات الحساسية للمستضدات .

1 ـ إحدى الخلايا الطرفية في جزر البنكرياس التي تفرز السوماتوستاتين والجلوكاجون .
2 ـ انظر تحت acidophil cell .

خَلِيَّةٌ سِنْخِيَّة **alveolar cell**
أيّ خليَّة بجدار الحويصلات الرئوية ، والمصطلح عادة ما يكون بالخلايا الظهارية السنخية (النمط I والنمط II من الخلايا السنخية) والبلاعم السنخية وتسمى أيضاً (Pneumocyte) ، (Pneumonocyte) .

خَلَايَا سِنْخِيَّةٌ مِنَ النَّمَط الأَوَّل **alveolar cells type I**
الخلايا المسطحة من النسيج الظهاري السنحي . وتتميز عن طريق الهيولي شديد التضعيف حيث تتباعد الجسيمات ، وتسمى أيضاً (Squamous alveolar cells) ، (membranous pneumocyte) .

خَلَايَا سِنْخِيَّةٌ مِنَ النَّمَط الثَّاني **alveolar cells type II**
الخلايا المتعددة الشكل للغشاء الظهاري السنخي الرئوي ، والتي تفرز الفاعل بالسطح (Surfactant) وتتميز بوفرة الهيولي الذي يحوي العديد من الأجسام متعددة الرقائق الغنية بالدهون . وتسمى أيضاً (Granular pneumocytes and great or large alveolar cells) .

خَلَايَا آلْزهايمر **Alzheimer's cells**
(خلايا نجمَية عرطلة في الأمراض الدماغية)
1 ـ خلايا نجمية عملاقة بنواة واضحة توجد بالمخ في حالات الضمور الكبدي مزدوجة التحدب .
2 ـ هي خلايا نجمية ضامرة .
انظر تحت asrocytes

خَلَايَا عَدِيمَةُ المِحْوار **amacrine cells**
خمس أنواعٍ من الأعصاب الشبكية والتي تبدو ناقصة للمحور العصبي الكبير ، ولها زوائد تشبه الزوائد الشجرية وتسمى أيضاً (A cells) .

خَلاَيا أَلِيفَةُ الفضَّة **argyrophilic cells**

خلايا معوية أليفة الكروم تحتاج للتعرض لمادة مختزلة قبل تفاعل حبيباتها مع الفضة ، وتوجد في الغدد الفجوية والبوابية م بين صفائح طبقة الغشاء القاعدي والخلايا المولدة للإنزيم .

انظر تحت argentaffin cells .

خَلاَيا آرْياس ـ ستيلا **Arias-Stella cells**

(في بطانة الرحم في الحمل المتنبذ)

خلايا في الغشاء الظهاري لبطانة الرحم لها نواة كبيرة شديدة الصبغة ، وهي خلايا تبدو وتظهر كثيرة الإفراز وتترافق مع الأنسجة المشيمية خارج الرحم .

خَلِيَّةٌ شَبَكِيَّةُ الصِّبْغَة **arkyochrome cell**

مَنظر مجهري تظهر فيه شبكة صباغية ضمن الخلية الحمراء قبل نضجها تماماً ، وقد تشاهد في الدم المحيطي بنسبة 1-2٪ وتزداد في حالات النزوف .

خَلاَيا آرْماني ـ ايبشْتاين **Armanni-Ebstein cells**

(خلايا كثيرة الحويصلات بفرط الجليكوجين)

خلايا ظهارية متحوصلة في الخلايا المستقيمة القريبة للأنابيب الكلوية ، تحوي ترسبات من الجلوكاجون .

انظر تحت lesion .

خَلاَيا آشوف **Aschoff's cells**

(في الحمى الروماتزمية)

[منسوب للطبيب كارل آلبرت لودفيج آشوف (Karl Albert Ludwing Aschoff) باثولوجي ألماني عاش ما بين 1866-1942] ، وهي خلايا آنيشكوف خاصة تكون على هيئة خلايا عملاقة متعددة النواة .

الخَلاَيا السَّمْعيَّة **auditory cells**

انظر تحت acoustic hair cell .

خَلاَيا بَالونيَّة **balloon cells**

(في العدوى الڤيروسية)

خلايا ضامرة تتضخم بشكل غير عادي ويكون

انظر تحت antigen-sensitive cells .

الخَلاَيا المُتَقابِلَةُ الأَقْطاب **antipodal cells**

مجموعة الأربعة خلايا في المراحل المبكرة للجنين .

خَلاَيا مُفْتَرَزَة **apocrine cells**

انظر تحت apocrine .

1 ـ عَصَبُونٌ لاتَغَصُّنِيّ **apolar cell**

2 ـ خَلِيَّةٌ لاقُطْبِيَّة ؛ عَصَبُونٌ لاقُطْبِيٌّ

عصبون بدون زوائد أو أقطاب .

خَلاَيا أَبُوديَّة **APUD cells**

(=خلاياَ قابطة ونازعة لكربوكسيل الطلائع الأمينية) **(=amine precursor uptake and decarboxylation cells)**

هي مجموعة خلايا لها القدرة على الانتشار ، والعديد ينشأ في الصفيحة العصبية ، والتي تشترك في بعض الخصائص الكيميائية الخلوية وخصائص البناء المتقدم وتوجد مبعثرة في الجسم ، وأنواعها تشمل الخلايا الصبغية وخلايا الجملة الأليفة للكروم والمهاد ، والغدة النخامية ، والغدة الدرقية ، والغدة الجار درقية ، والرئتين ، والجهاز الهضمي والبنكرياس . وتقوم بتركيز طلائع الأحماض الأمينية لبعض الأمينات ، وتنزع منهم مجموعة الكربوكسيل لتكوين الأمينات والتي تعمل كمنظمات وكموصلات عصبية . وتنتج مواد مثل الأدرينالين والنورأدرينالين ، والدوبامين ، والسيروتونين ، والإنكيفالين ، والسوماتوستاتين ، ونوروتنسين (هو ناقل عصبي موسع للأوعية) ، والمادة (أ) والتي قد يؤثر فعلها على مجموعة الخلايا المجاورة القريبة أو الخلايا البعيدة ، وبالتالي تعمل كهرمونات موضعية أو جهازية .

خَلاَيا أَلِيفَةُ الفضَّة **argentaffin cells**

خلايا معوَية أليفة الكروم والتي تصطبغ بسهولة مع الكروم وأملاح الفضة ، وتوجد في الأجزاء القاعدية لغدد الجهاز الهضمي .

انظر تحت argentaffinoma .

الجزئية لقشرة المخيخ ، لها زوائد شجرية تمتد خارجياً خلال تلك الطبقة .
تسمى أيضاً (Bergmann's glia) .

berry cell **خَـلاَيا بشَكل التُّـوْت**

خلية بلازمَية شاذة تحتوي على أجسام موط (Mott bodies) وهي أجسام في هيولى الخلايا البلازمية في الوم النقوي المتعدد ، أو أجسام رسل في البلازماويات ، تظهر هذه مجموعة من الأجسام في الورم النقيي المتعدد وفي المخ في المراحل المتأخرة في داء المثقبيات الأفريقي ، تسمى أيضاً (Morular cell) ، (Grape Mott) ، (Berry cell) .

Betz's cells **خَلاَيا بيتْز**

(خلاَيا هرمية ضخمة في قشرة المخ)
خلايا العقد الهرمية الكبرى ، توجد في الطبقة الداخية الهرمية لقشرة المخيخ تسمى أيضا (Giant pyramidal cells) .

Bevan-Lewis cells **خلاَيا بيفان لويس**

تسمى أيضاً (Betz cells) هي خلايا هرمية ضخمة في التلفيف قبل المركزي من القشرة الدماغية الحركية .

bichromate cell **خلاَيا ثُنَائيَّةُ الكرومات**

تسمى أيضاً (Dichromate cell) هو اسم قديم لخلايا أولية تسمى الآن الخلايا الكرومية لأنها تستعمل حمض الكروميك لنزع الاستقطاب ، وكان يحضر هذا الحمض بتحميض محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم ، ولقد أصبح هذا النوع من الخلايا من الماضي التاريخي .

binucleate cell **خَلِيَّـةٌ ثُنائيَّـةُ النَّواة**

خَلايا ذاتَ نواتين .

bipolar cell **خَلِيَّةٌ ثُنائيَّةُ القُطْب**

خَلية عَصبية ذات نتوئين .

bipolar retinal cells **خَلاَيا الشَّبَكيَّة الثُّنائيَّةُ القُطْب**

أنواعَ مختلفة من العصبونات ثنائية القطب وهو العصبون في الرباط الرأسي للشبكية وهي مشابهة للعقد النخاعية .

الهيولي شحيح شاحب اللون صاف تقريباً ، كتلك التي ترى في حويصلات الهربس النطاقي أو الحماق .

band cell **خَلِيَّةٌ مَأْطورَة**

خَلية نخاعية متأخرة التحول ، والتي يكون فيها النواة على شكل شريط مقوس أو ملتوي ولم يكتسب الشكل النمطي متعدد الفصوص للخلايا الناضجة العدلة متعددة النوى وتسمى أيضاً (Band form) ، (Rod neutrophil) ، (Neutrophil) .

basal cell **خَلِيَّةٌ قاعديَّة**

اَلاسم يَنطَبق على الخلايا القرنية التي توجد في الطبقة القاعدية للأدمة ، تسمى أيضاً (Foot cells) .

basal granular cell **خَلِيَّةٌ قاعديَّةٌ حُبَيبيَّة**

انَظر تحَتَ enteroendocrine cells .

basilar cell **خَلِيَّةٌ قاعديَّة**

(=basal cell)

انظر تحت basal cell .

basket cell **خَلِيَّةٌ بشكْل السَّلَّة**

1 ـ خلايا قشرةَ المخيخ والتي يعطي محورها فرش من الليفات لتكوين عيش يشبه السلة ، والتي فيها يستقر جسم خلايا بوركينيي .
2 ـ انظر تحت myoepithelial cell .

basophilic cell **خَلِيَّةٌ قَعدَة**

battery cell **خَلِيَّةٌ بَطَّاريَّة**

الَخلية الكَهربائية (الغلفانية) .

beaker cell **خَلِيَّةٌ كَأسيَّة**

(=goblet cell)

انظر تحت goblet cell .

Beale's ganglion cells **خَلاَيا بيل العقْديَّة**

(خلايا لاودِّيَةَ قلبية)
خلايا ذات قطبين بناتئ واحد ملتوي على الخلية الأخرى ، وتوجد في العقد القلبية .

Bergmann's cells **خَلاَيا بيرْغمان**

(خلايا دبقية في المخيخ)
خلايا دماغية توجد بصفة خاصة في الطبقة

انظر تحت visual cells .

خَلَايَا مُنْتَبِجَة **bladder cells**

(في أصَابع الجَنين)

خلايا متورِّمَة في أدمة نهاية أصابع اليد والرجل للأجنة . وتسمى أيضاً (Zander's cells) .

خَلِيَّةٌ أرومِيَّة **blast cell**

فِي نظرِيَّة وحدة السلائف (في منشأ الخلايا الدموية) تكون تلك الخلايا أقل تمايزاً ، وتكون خلية دموية شاملة الوسع (Totipotentia blood cell) بدون التزام لتتابع معين تتفرع منها كل خلايا الدم ، وهي تسبق الخلية الجذعية وتسمى أيضاً (Blast, hemotoblast, hematocyotblast, hemoblast and hemocytoblast) .

خَلِيَّةٌ نَجْمِيَّةٌ شَحْمِيَّة **bloated cell**

(= خَلِيَّةٌ مُشَبَّكَة) **(=gitter cell)**

(خلية دبقية محَمَّلة بالشحم)

هي خلية دبقية صغيرة كروية ومنتفخة الشكل أو متورمة بسبب ابتلاعها حطام الخلايا المدمرة مرضيا في الجهاز العصبي المركزي ، تسمى أيضاً (Compound granule cells) ، (Compound granular corpuscle) .

خَلَايَا الدَّم ؛ كُرَيَّاتُ الدَّم **blood cells**

أحد عناصر الدم كاملة التكوين ، مثل الكريات البيضاء ، أو الكريات الحمراء ، أو الصفيحات الدموية . تسمى أيضاً (Blood corpuscle) ، (Hemacyte) ، (Hematocyte) ، (Hemocyte) .

خَلِيَّةٌ جَسَدِيَّة **body cell**

(=somatic cell)

انظر تحت somatic cell .

خَلِيَّةٌ عَظْمِيَّة **bone cell**

خَلية ذاتَ نواة تشغل الجوبة العظمية ، تسمى أيضاً (Osseous Cell) ، (Bone corpuscle) .

1 ـ خَلَايَا جدارِيَّة (في المعدة) **border cells**

2 ـ خَلَايَا هَامِشِيَّةٌ (في عضو كورتي)

1 ـ صف من الخلايا العمودية الداعمة التي تبطن أو تحدد الحافة الداخلية لعضو كورتي .

انظر تحت parietal cell .

خَلَايَا بُوتْشِر **Bottcher's cells**

(في قوقعَة الأذن)

مجموعة صغيرة من الخلايا كثيرة السطوح متداخلة بين خلايا كلاوديوس (هي خلايا القوقعة السمعية) والغشاء القاعدي لقوقعة الأذن .

خَلَايَا قَصِيرَةُ التَّغَصُّنات **breviradiate cells**

خلايا دبقية لها نواتيء قصيرة .

خَلَايَا هَلْبَاء **bristle cells**

(خلايا شعرية في قوقعة الأذن)

هي خلايا شعرية مترابطة مع العصب القوقعي .

خَلِيَّةٌ قَصَبِيَّة **bronchic cell**

خَلِيَّةٌ حاضِنَة **brood cell**

(= خَلِيَّةٌ أُمّ) **(=mother cell)**

انظر تحت mother cell .

كُرَيَّةٌ حَمْرَاءُ شائكَة **burr cell**

(=echinocyte)

كريات الدم الحمراء الشويكية والتي لها بروزات صغيرة متعددة ومتساوية التباعد في محيط الخلية ، ملاحظ في الآزوتيمية ، سرطان المعدة ، والقرح الهضمية النزفية ، وتسمى أيضاً . (Burr Erythrocyte) ، (Crenocyte and echinocyte) ، (Crenated erythrocyte) .

خَلَايَا C **C cells**

1 ـ انظر تحت parafollicular cells .

2 ـ نوع من الخلايا التي تفتقر بالحبيبات ، توجد بشكل خاص في جزر البنكرياس في الخنزير الغيني .

3 ـ انظر تحت chromophobe cells .

خَلِيَّة كاجال (في القَشْرَة المُخِّيَّة) **Cajal cell**

1 ـ انظر تحت astrocyte .

2 ـ إحدى الخلايا الدبقية العصبية المرتبة أفقياً في الطبقة الجزيئية لقشرة المخ ، تسمى أيضاً (Horizontal cell of Cajal) .

خَلِيَّةٌ كَأْسِيَّة **caliciform cell**

(=goblet cell)

(ذات جُوَيفات منغمدة)
خلايا ظهارية ذات زغيبات دقيقة رأسية شخينة تحوي حزم من الألياف تمتد للأسفل في الهيولى وبنيبات غير منتظمة ، تمر كانغلاف من السطح الرأسي بين الزغيبات الدقيقة . توجد أحياناً في الأمعاء الدقيقة السبيل التنفسي ويعتقد أنها تعمل كمستقبلة كيميائية .

تَجَدُّدُ الخَلِيَّة **cell renewal**

خَلاَيا كُورتي **cells of Corti**
(في القوقعة السمعية)
نوع من الخلايا السمعية .

خَلاَيا جيانُوزي **cells of Giannuzzi**
(خلايا هلالِّية مصلية في الغدد المختلطة)
خلايا خيانوزي وهي خلايا هلالية مصلية في الغدد المختلطة .

خَلاَيا مولَر **cells of Muller**
(خلايا دبقية طويلة)
خلايا ألياف مولر الجذرية .

خَلاَيا فانْ جيهُوخْتن **cells of van Gehuchten**
(عصبونات جولجي من النمط الثاني)
نوع من الخلايا العصبية .

خَلاَيا مَرْكَزِيَّة **central cells**
هي الخلاياَ الرئيسية .

خَلاَيا عُنَيبِيَّةٌ مَرْكَزِيَّة **centroacinar cells**
بدايات جَهاز قنوات داخل الفصص للبنكرياس داخل عنبات البنكرياس .

خَلِيَّةٌ كَأْسِيَّة **chalice cell**
(=goblet cell)
انظر تحت goblet cell .

خَلاَيا رَئِيسِيَّة **chief cells**
1 ـ خـلايا ظهـارية ، إمـا أن تكون عـمـودية أو مكعبة والتي تبطن الأجزاء السفلية من الغدد المعدية وتفرز الببسين ، وتسمى أيضاً (Centrel cells) ، (Zymogenic cells) ، (Peptic Cells) .
2 ـ انظر تحت pinealocyte

انظر تحت goblet cell .

خَلِيَّةٌ جَمَلِيَّة **cameloid cell**
(=خَلِيَّةٌ إهْلِيلَجِيَّة) **(=elliptocyte)**
(من كريَات الدَم الحمراء)
انظر تحت elliptocyte .

خَلِيَّةٌ محفَظِيَّة **capsule cell**
انظر تحت satellite cell .

خَلاَيا غُضْروفيَّة **cartilage cells**
خلايا منغرسَة في الجوبة الغضروفية ، تسمى أيضاً (Chondrocyte) .


خَلاَيا مُصْطَبِغَةُ النَّواة **caryochrome cells**
خلايا تتميزَ بأن النواة مصبوغة .

خَلاَيا كاسْبرسون مِنَ النَّمَط B **Caspersson type B cells**
(خلايا غَنيَة بالرّنا)
خلايا غنية بالرنا ، (الحمض النووي الريبي) ونسبياً بالدنا (الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين) .

خَلاَيا اسْتِئْصَالُ الغُدَد الجِنْسِيَّة **castration cells**
(في النخامى)
خلايا فجوية قعدة والتي تنشأ في الغدة النخامية الأمامية بعد عملية الاستئصال .

خَلاَيا مُذَنَّبَة **caudate cells**
خلايا دبقية عصبية بمادة الدماغ السنخابية لها العديد من امتدادات انسيابية مثل ذنب المذنب .

خَلاَيا مُسْتَجْوِفَة **caveolated cells**



Bloated cell خلايا نجمية شحمية

. hypophysis)

خَلَايَا كارِهَةُ اللَّون **chromophobic cells**

انظر تحتَ chromophopbe .

خَلِيَّةٌ مُهَدَّبَة **ciliated cell**

هَي أية خلية لها أهداب .

خَلَايَا كلارا **Clara cells**

(خلايا غير مهدبة في القصيبات)

خلايا بدون أهداب توجد في الغشاء الظهاري للقصبات التنفسية والطرفية .

خَلَايَا كلارْك **Clarke's cells**

(في الجزء الصدري من النخاع)

خلايا مصبوغة بفقرات الصدر في الحبل النخاعي .

خَلَايَا كلاوديوس **Claudius cells**

(في القوقعة السمعية)

خلايا مكعبة توجد في قاع القلم الحلزوني الظاهر الاخدود اللولبي خارج عضو كورتي .

خَلَايَا صافيَة **clear cells**

خلايا تظهَر فيها الهيولى فارغ .

خَلَايَا شَطورَة **cleavable cells**

(= قُسَيْمٌ أَرُوْمِيٌّ) **(=blastomere)**

انظر تحت cleavage cells .

خَلَايَا تَشَطُّرِيَّة **cleavage cells**

(=قُسَيْمٌ أَرُوْمِيٌّ) **(=blastomere)**

أي من الخلاياَ مشتقة من اللاقحة بالانقسام الفتيلي .

خَلَايَا مُكتَّلَة **clump cells**

هي خلايا مستديرة غليظة مصبوغة ترى في العضلة العاصرة لقزحية العين .

خَلَايَا قَوقَعيِّة **cochlear cells**

نوع من أنوَاع الخلايا السمعية .

خَلِيَّةٌ عَمُودِيَّة **columnar cell**

خَلايا ظهارية ممتدة .

خَلَايَا مُذَنَّبَة **cometal cells**

(=caudate cells)

خَلَايَا صوارِيَّة **commissural cells**

خلايا متغايرة الأجزاء .

3ـ أكثر الخلايا وفرة في الغدد الجار درقية وتكون خلايا ظهارية متعددة الأضلاع ، غنية بالجليكوجين ، ولها هيولي حبيبي ونواة حويصلية ، وتنظم في صفيحات أو حبال . وفي بعض الأحيان تكون مقسمة بين الخلايا العديدة الأكثر وضوحاً والتي لها هيولى واضح ، ونواة كبيرة ، وبعض الحبيبات ، والخلايا المظلمة والتي لها هيولى ، ونواة صغيرة مظلمة ، وبعض الحبيبات الدقيقة ، وتوجد أيضاً أشكال متوسطة ، وتسمى أيضاً (Principal cells) .

4ـ الخلايا أليفة الكروم الرئيسية للمستقتمات كل منها محاط بخلايا داعمة .

5ـ انظر تحت chromophobe cells .

خَلَايَا أَليفَةُ الكروم **chromaffin cells**

نوع من خلايا (APUD) والتي تصطبغ بسرعة بأملاح الكروم ، وتأخذ حبيبات بلازما الخلية اللون البني المميز . توجد بخاصة في خلايا لب الكظر ، ومستقتمات الكبة العصعصية ، والكبة السباتية ، على طول الأعصاب الودية ، وبالأعضاء المختلفة ، وتحوي حبيبات ألفية الكروم .

انظر تحت enterochromaffin cells .

انظر تحت argentoffin cells .

وتسمى أيضاً (Pheochrome cells) ، (Pheochromocytes) .

خَلَايَا أَليفَةُ الكرُوم **chromophilic cells**

خلية لها خاصية تجميع الكروم .

خَلَايَا كارِهَةُ اللَّون **chromophobe cells**

خلايا صَغيرة خفيفة الصبغة ذات هيولى قليل ، توجد غالباً على هيئة عناقيد في وسط حبال الخلية في النخامية الغدية وكان يعتقد أن هيولى تلك الخلايا غير حبيبي ، ولكن الحبيبات المعروفة الآن هي حبيبات صغيرة ومتفرقة أو متناثرة . وهذه الخلايا في الأورام الغدية كارهة اللون أو الأورام الغدية عديمة الخلايا . تسمى أيضاً (Chief cells) ، (Gamma cells of

خَلِيَّةٌ مصفَوِيَّة **cribrate cell**

الخليةَ التيَ جدارها مثقوب بثقوب تشبه الغربال .

خَلاَيا كروك **Crooke's cells**

(خلايا قعدة في النخامية الأمامية)

هي الوجهة القشرية النخامية التي ترى في التنكس الزجاجي لكروك .

خَلِيَّةٌ مُكَعَّبَة **cuboid cell**

هَي خلية ظهارية يكون فيها القطر المستعرض والعمودي متساويان .

خَلاَيا كَاسْتَر **Custer cells**

(في العقدة اللمفية)

خلايا بزوائد بروتوبلازمية دقيقة وطويلة تحل محل الأنسجة اللمفاوية للعقد اللمفية في أمراض النسيج البطاني الشبكي .

خَلِيَّةٌ أُسْطُوانيَّة **cylindric cell**

انَظر تحت columnar cell .

خَلِيَّةٌ تائيَّةٌ سامَّةٌ للخَلاَيا **cytotoxic T cell**

انَظر تحَت cytotoxic T lymphocytes .

خَلاَيا D **D cells**

(=خَلاَيا دلْتا) **(=delta cells)**

انظر تحت detta cell .

خَلِيَّةٌ مُعْتِمَة **dark cell**

خَلِيَّةٌ بنْتَ **daughter cell**

أيَ خلية تتكون بانقسام خلية أم .

خَلاَيا داڤيدوف **Davidoff's cells**

(في خبايا ليبركون المعوية)

انظر تحت paneth's cells .

خَلاَيا ساقطيَّة **decidual cells**

خلايا بطَانَة الرحم والتي تتحور وتتخصص خلال الحمل .

خَلاَيا دايترز **Deiters' cells**

1 ـ في عَضو كورتي في الأذن

2 ـ خلية دبقية عصبية

الخلايا الإصبعية الخارجية لعضو كورتي .

خَلاَيَا دلْتا **delta cells**

1 ـ أحد أنواع خلايا جزر البنكرياس التي تفرز

انظر تحت heteromeral cells .

خَلاَيا مُلْتَزِمَة (لمفاوية) **committed cells**

خلايا لمفيَة والتي بعد التصاقها بالمستضد تجبر لاتباع مسار واحد ومستقل للتطور ، وتنشأ في نقي العظم من الخلايا الجذعية متعددة الكوامن وهم أنفسهم يكونون طلائع لخلايا الدم المختلفة .

خَلاَيا الحُبَيبات المُعَقَّدَة **compound granule cells**

(=خَلاَيا دبْقيَّةٌ صَغيرَة) **(=microglia)**

انظر تحت gitter cell .

خَلاَيا مَخْروطيَّة **cone cells**

خلايا مخروطَية .

انظر تحت retinal cone .

خَلِيَّةٌ مُلْتَحمِيَّة **conjunctival cell**

لَلمكوناتَ الليفية .

خَلاَيا النَّسيج الضَّام **connective tissue cells**

اسم عام للعَناصر الخلوية للمكونات الليفية وغير الليفية للأشكال المختلفة للنسيج الضام .

خَلاَيا اللِّيف القَلوص **contractile fibre cells**

الخلايا المغَزلية الشكل التي تحتوي على نواة وتتجمع في حزم لتكون العضلات غير المخططة أو العضلات الملساء .

خَلِيَّةٌ قَرْنَوِيَّة **corneal cell**

خَلايا الأنسجة الضامة المحورة والتي تشغل كل مساحة القرنية .

خَلِيَّةٌ المُوَجِّه القشْري **corticotropic cell**

انَظر تحت corticotroph .

حُجَيرَةُ العَد **counting cell**

انظر تحت hemacytometer .

خَلِيَّةٌ غطائيَّة **cover cell**

أيَ خلَيةَ تغطي أو تحمي أخرى ، خاصة أي خلايا ظهارية للطبقة الخارجية لبراعم الذوق (التذوق) وتسمى أيضاً (Incasing cell) ، (Encasing cell) .

خَلاَيا هلاَليَّة **crescent cells**

أهلة غيانوزي .

للمساعدة أو مثبطة قاتلة .

خَلِيَّةٌ كَهْرِكيميائيَّة **electrochemical cell**
جَهاز مكون من نَصفي خليتين كلاً منهما يحوي كل نصف على محلول موضوع به قطب موصل بجسر ملحي أو غشاء شبه منفذ .

خَلِيَّةُ القُوَّة المُحَرِّكَة الكَهْرَبائِيَّة **electromotive force cell**

خَلايا ابْتدَائيَّة **elementary cells**
انظر تحَت embryonic cell .

خَلِيَّةٌ جَنينيَّةٌ أرومِيَّة **embryoblastic cell**
خَلايا جَنينية فيَ بداية تطور الجنين وتخصصه إلى أعضاء وأجهزة .

خَلايا مُضْغيَّة **embryonic cells**
مجموعةَ من الخلايا التي تتكون عند بداية نشأة الجنين وتسمى أيضاً (Blastomere) .

خَلِيَّةٌ مُهاجرَة **emigrated cell**
نوَع من أنوَاع كريات الدم البيضاء تخترق جدار الوعاء الدموي ، وهي في الأنسجة المجاورة .

خَلِيَّةٌ مينائيَّة **enamel cell**
انَظر تحَت ameloblast .

خَلِيَّةٌ غطائيَّة **encasing cell**
(=cover cell)

خَلِيَّةٌ انْتهائيَّة **end cell**

خَلِيَّةٌ معَويَّةٌ صَمَّاويَّة **endocrine cells of gut**
انظر تحت enteroendocrine cells .

خَلِيَّةٌ بطانيَّة **endothelial cells**
خَلايا جَبلية كبيرة ترى كثيراً في أمراض الأعضاء المكونة للدم ، ويعتقد البعض بأنها تخرج من الخلايا المبطنة للأوعية الدموية والأوعية اللمفية .

خَلايا شبْهُ بطَانيَّة **endothelioid cells**

خَلِيَّةٌ معَويَّةٌ أَلِيفَةُ الكرَوم **enterochromaffin cell**
مجموعة من الخلايا الصماوية المعوية التي يتم صبغ حبيباتها بأملاح الفضة والكروم ، وهي مقرات لتصنيع وتخزين السيروتونين ، واستناداً السوماتوستاتين .
2ـ انظر تحت gonadotroph .

خَلايا هلاَليَّة **demilune cells**
انظر تحَت crescents of gianuzz .

خَلايا تَغَصُّنِيَّة **dendritic cells**
1ـ مجموعَة متغايرة من العقد اللمفية غير البلعمية ، والتي متضمنة الخلايا التغصنية الجريبية بالمركز الانتاشية ، خلايا في القشرة العمقية والخلايا الحجابية للمف الوارد والجيوب اللمفية ، ولها كلها شكل غير منتظم ولها نواتئ متشعبة عديدة وغصيبات خلوية غير واضحة .
2ـ انظر تحت follicular dentritic cells .

خَلِيَّةٌ عاجيَّة **dentin cell**
انَظر تحَت odontoblast .

خَلايا قُبِّيَّة **dome cells**
الخلايا الكبيرة التي تكون الغشاء الظهاري للجنين .

خَلايا دوروثي ريد **Dorothy Reed cells**
(في داء هوَدجكين)
انظر تحت Reed - Sternberg cells .

خَلايا داوني (لمفاوية لانموذجية) **Downey cells**
خلايا لمفيَة لا نمطية من ثلاثة أنماط توجد ثابتة في حالات كثرة الوحيدات العدوائية (زيادة في الكريات البيض وحيدة النواة في الدم المحيض) . النمط الأول عبارة عن خلايا كاملة النمو مع نواة على شكل كلية أو مفصصة مع هيولى محوصل قاعدي رغوي ، النمط الثاني خلايا تحوي أنوية خلوية هيولية أقل تحوصلاً وأقل هيولى قاعدي كمي ، النمط الثالث لها خضاب ونواة واحدة أو اثنتين .

خَلايا غُباريَّة **dust cells**
انظر تحَت alveolar macrophage .

خَلِيَّةٌ مُسْتَفْعلَة **effector cell**
1ـ الخلية التي تصبح نشطة استجابة للإثارة .
2ـ تعرّف في علم المناعة بأنها خلية لمفاوية متمايزة تحمل جزء من الاستجابة المناعية مثل انتاج الضد ، إنتاج اللمفوكين ، أو وظيفة

الدهن ، تسمى أيضاً (Adipose cell) ، (Adipocyte) ، (Lipocyte) .

خَلَايا الكَبد الخازنَةُ للدُّهْن **fat-storing cells of liver**

خلايا نجمية مجمعة للدهن توجد في مواضع حول الجيوب الكبدية .

خَلِيَّةٌ دُهْنِيَّةُ الحُبيبات **fatty granule cell**

انظر تحت gitter cell .

خَلِيَّةٌ خَميرِيَّة **ferment cell**

خَلِيَّـةُ فيـرَّاتا **Ferrata's cell**

(= أرومَةٌ مُنْسِجَةٌ دَمَوِيَّة) **(=hemohistioblast)**

اسمَ قديم للخلايا الأرومية .

خَلِيَّةٌ ليفيَّة **fiber cell**

أيّ خَليَة طولية أو خطية .

خَلِيَّةٌ سَوطيَّة **flagellate cell**

أيّ خلية لَها سوط ، عادة ما يكون متحرك .

خَلَايا لَهَبيَّة **flame cells**

خَلِيَّةٌ قاعيَّة **floor cells**

(إحدىَ خلايا قاع قوس كورتي)

خَلَايا رَغْويَّة **foam cells**

1 ـ خليةَ منسجة غير سوية ، لها شكل فجوي ، بشكل غـريب بسبب وجود مركبات دهنية معقدة ترى في أمراض التخزين مثل الورم الأصفر وحالات أخرى محددة .

2 ـ أنماط خاصة من هذه الخلايا توجد في الورم الأصفر وتسمى أيضاً (Xanthoma cell) .

انظر تحت mikylicz's cells .

خَلَايا جُرَيبيَّة **follicle cells**

خلايا توجَد في النسيج الظهاري للجريب مثل خلايا جريب الدراق وجراب المبيض ، تسمى أيضاً (Epithelial Cells) ، (Follicular) .

خَلَايا جُرَيبيَّة **follicular cells**

انظر تحت follicle cells .

خَلَايا جُرَيبيَّةٌ ظهاريَّة **follicular epithelial cells**

انظر تحت follicle cells .

خَلَايا قدَميَّة **foot cells**

على تفاعلهم مع الفضة تقسم هذه الخلايا إلى تلك التي تختزل الفضة بدون سابق معالجة ، وأيضاً تلك التي تحتاج لتعريضها لمادة مختزلة قبل تفاعلها مع الفضة .

خَلَايا البطانَة العَصَبيَّة **ependymal cells**

خلايا اَبتدائيَة وتسمَى أيضاً (Ependymocytes) .

خَلَايا بَشْرَوِيَّة **epidermic cells**

خلايا البشَرة .

خَلَايا ظهاريَّة **epithelial cells**

الخلايا التي تغطي سطح الجسم وتبطن تجاويفه .

خَلَايا شَبيْهةٌ بالظِّهَاريَّة **epithelioid cells**

1 ـ خلاياً كبيرة متعددة السطوح منشأها من النسيج الضام .

2 ـ خلايا شديدة البلعمة ، والبلعمة المحورة ، كما أنها تشبه الخلايا الظهارية ، لها أنوية باهتة كبيرة حويصلية ، بهيولى وفير وواضح ، وتلك هي علامات الالتهاب الحبيبي ، وقد تتجمع لتكون خلايا عملاقة متعددة الأنوية .

3 ـ انظر تحت pinealocytes .

خَلَايا شَبِيْهَةٌ بالكُرَيَّات الحُمْر **erythroid cells**

خلاياً دموية من سَلسلة الكريات الدموية الحمراء .

خَلَايا غرْباليَّة **ethmoidal cells**

1 ـ جيوبَ غربالية .

2 ـ أي من الخلايا الهوائية الغربالية .

انظر تحت sinus ethmoidales anteriores,medii, and posteriores .

خَلِيَّةٌ حَقيقيَّةُ النَّواة **eukaryotic cell**

خَلية بنواةَ حقيقية .

انظر تحت eukaryote .

خَلِيَّةٌ حُزْميَّة **faggot cell**


خَلِيَّةٌ دُهْنيَّة **fat cell**

خَلية مَن النسيج الضام تتخصص لتصنيع وتخزين الدهون ، هذه الخلايا تنتفخ بحبيبات ثلاثي الجليسريد ، تبدو النواة مماَلة إلى أحد الأركان والهيولى يرى كخط رفيع حول قطرة

(= **خلايا سرتولي**) (في الخصية)
1 ـ خلايا قاعدية .
2 ـ خلايا سرتولي .

foreign body giant cells — **خلايا الجسم الغريب العملاقة**
خلايا ضخمة تشبه خلايا لانجهانز الضخمة ، لها أنوية متجمعة على شكل نجمة موزعة بشكل غير منتظم في الهيولى ، تتكون باتحاد وارتباط البلاعم ، مع انقسام داخلي نادر للنواة ، وتلك الخصائص تميِّز الالتهابات الناتجة عن التلقيح أو الانغراس بمواد خارجية مقاومة للتدرك في الأدمة أو النسيج تحت الجلد .

formative cell — **خَلِيَّةٌ تَشْكِيلِيَّة**
خَلية من مَجموع الخلايا الداخلية للجنين ، خلية بلاستولية مهيئة لتكوين جزء من الجنين وتختلف عن خلية الصانعة التغذية (أي من الأجسام الحبيبية الشكل الجبلية التي توجد في الهيولي الخلوية) .



Foot cells خلايا قدمية

Foulis cells — **خلايا فُولي**
(خلايا ظهارية منوّاة تشاهد في الكيسات المبيضية الخبيثة)

free cells — **خلايا حُرَّة**

Fuller cell — **خَلِيَّةُ فُولَر**
(خلايا كهربائية تعتمد على الزنك والنحاس)

fusiform cell — **خَلِيَّةٌ مغزَلِيَّة**
انظر تحت spindle cell .

G cells — **خلايا G**
(في بواب المعدة وأعلى الأمعاء)
خلايا محببة أليفة الكروم معوية في الغشاء المخاطي لبواب المعدة وهي مصدر (الجاسترين) .

gametoid cells — **خلايا شبيهة بالأعْراس**
خلايا سرطانية تشبه خلايا التكاثر .

gamma cells of hypophysis (=chromophobic cells) — **خلايا جامَّا نُخاميَّة (=خلايا كارهَةٌ للَّون)**
انظر تحت chromophobic cells .

ganglion cell — **خَلِيَّةٌ عُقْدِيَّة**
1 ـ نوع من الخلايا العصبية الكبيرة تميز العقد العصبية وتسمى أيضاً (Gangliocyte) .
2 ـ أي من خلايا الشبكية ، وهي العصبيات الثالثة والأخيرة في الوصل الرأسي للشبكية ، وهي تناظر الوصلات التحويلية في الحبل النخاعي وجذع المخ . وهناك على الأقل ستة أنماط من الخلايا العقدية تم تقسيمها حسب الشكل الشجيري .
انظر تحت visual cone .

Gaucher's cell — **خَلِيَّةُ جوشيه**
(منسجات مملوءة بالشحميات السكرية في داء جوشيه)
خلايا كبيرة خاصة تميز مرض جوشيه بنواة واحدة أو أكثر ، تقع متطرفة وسط الخلية وبخيوط رفيعة متموجة وكيراسينية تجري

انظر تحت Betz' cells .

خَلَايَا جيرْكَه **Gierke's cells**
(في المادة الهلامية للنخاع)
عـصـبـونات جـولجي من الـنمط الثـاني وهي عصبونات صغيرة ، عميقة الصبغة ، تمثل الخلايا الرئيسية لمادة رولاندو الهلامية .

خَلِيَّةٌ مُشَبَّكَة **gitter cell**
(=خلية دبقية محمَّلة بالشحم) **(=microglia)**
خلايا دبقية صغيرة كروية ومتورمة أو منتفخة تشكل جزء من بنية الغمد المغلف لجملة العين المركزية بعد أن تكون قد التهمت حطام الخلايا المدمرة مرضياً في الجهاز العصبي المركزي ، تسـمى أيضـاً (Compound granule cells) ، (Compound granule corpuscle) .

خَلِيَّةٌ غُدِّيَّة **glandular cell**

خَلَايَا غـلاَي **Gley's cells**
(= خَلَايا لايديغ) **(=Leyding cells)**
خـلايا غـدية كـبـيـرة في النسيـج الخـلالي في الخصية .

خَلَايَا دِبْقِيَّة **glial cells**
انظر تَحْتَ neuroglial cells .

خَلَايَا بَرَّاقَة **glitter cells**
كريات بيضاء متعددة الأشكال النووية تصطبغ بلون أزرق شـاحـب مع صـبغ بنفـسـجي الحنطيان ، وتحتوي على حبيبات في الهيولى تظهر حركة براونية ، قد يشير وجودها في البول إلى التهاب الكلية والحويضة .

خَلَايَا كُبَيبِيَّة **glomerular cells**
انظر تحتَ glomus cell .

خَلَايَا كُبِّيَّة **glomus cells**
1 ـ أي من الخلايا شبه الظهارية الخاصة الكبيرة التوسط (النمط I) من الجسم السباتي تحتوي على هيولى غزير وحبيبات كثيفة الكترونية مرتبطة بالغشاء ، وتملك نواتئ شجرية قليلة ، وهي مزودة بغزارة بنهايات عصبية وتحيط بها خلايا دون حبيبات هيولية (النمط II) ، تسمى موازية للمحور الطويل للخلية ، تمنح الهيولى الأزرق المعـتم أو الرمـادي الشكل المتـجـعـد للنسيج الورقي .

خَلِيةُ جيغنْباوَر **Gegenbaur's cell**
(= أرومَة عظمية) **(=osteoblast)**
هي خلية بانية العظم وهي خلية مكوِّنة للعظم ، تنشأ مع الأرومة الليفية من النسيج المتوسطي ، ومع نضجها تنتج العظم .

خَلَايَا مُنْتَشَةٌ **germ cells**
(=خَلَايَا جِنْسِيَّة) **(=sexual cells)**
خلايا الكائن الحي المسؤولة عن إنتاج النوع ، مثل البويضة والحيوان المنوي وأطوارهم غير الناضجة ، وتسمى أيضاً (Sexual cells) ، (Sex cells) ، (Initial cells) .

خَلِيَّةُ مُنْتَشَة **germinal cell**
خَلية قادَرة على الانقسام والتمايز .

خَلِيَّةٌ شَبَحِيَّة **ghost cell**
1 ـ خلية منزوعة النواة متقرنة ذات مركز ظلي غير مصبوغ حيث كانت النواة ، وتسمى أيضاً (Shadow cell) .
2 ـ كرية حمراء متحللة أو متجزئة بدون هيموجلوبين ، تسمى أيضاً (Erythroclast) ، (Shadow cell) .

خَلِيَّةٌ عِمْلاَقَة **giant cell**
1 ـ أيَ خلية كبيرة جداً ، مثل النواء (Mega) في نقي العظم .
2 ـ أي من البلعمات الكبيرة متعددة النواة والمعدلة ، التي قد تتكون بالتحام الخلايا شبه الظهارية أو بالانقسام النووي دون انقسام الهيولى في الوحيدة (نوع من الكريات البيضاء) ، مثل تلك المميزة للالتهابات الحبيبية (خلايا لانجهانز المارِدة) وتلك التي تتكون حول الأجسام الغريبة الكبيرة (الأجسام الغريبة المارِدة) .
3 ـ أي خلية ورمية كبيرة جداً .

خَلَايَا هَرَمِيَّةٌ عِمْلاَقَة **giant pyramidal cells**

2 ـ خلايا عصبية صغيرة بدون محوار ، والتي توجد أجسامها في الطبقة الحبيبية في البصلة الشمية ، تملك عدة تغصنات تشتبك للخلايا التاجية والمعنقدة والتي من المحتمل أن تعمل في التخميد .

خَلاَيا الطَّبَقَة المُحبَّبة (لقشر الكظَر) **granulosa cells**

خلايا تحيط بالجريبات المبيضة الحويصلية وتشكل الطبقات الحبيبية والركمة المبيضية ، وتتحول بعد الإباضة إلى خلايا لوتينية .

خَلاَيا الطَّبَقَة المُحبَّبَة اللُّوتينيَّة (للجسَم الأصَفر) **granulosa-lutein cells**

(خلايا لوتين محببة) : خلايا لوتينية في الجسم الأصفر مشتقة من خلايا حبيبية .

خَلِيَّةٌ بشَكْل التُّوتَة **grape cell (=berry cell)**

انظر تحت mott cell .

خَلِيةُ جرينيت **Grenet cell**

خَلاَيا ذَوقيَّة **gustatory cells**

انظر تحتَ taste cells .

خَلِيَّةٌ حَلَقِيَّةُ التَّلَوُّن **gyrochrome cell**

خَلاَيا مُشْعَّرَة **hair cells**

خلايا ظهارية عصبية مع نواتئ شبيهة بالشعر (أهداب متحركة أو ساكنة ، أو معاً) توجد في عنصر كورتي ، العُرف الأمبولي والقريبة وكُيْس الأذن الداخلية ، تستقبل الخلايا الشعرية ألياف صادرة وواردة للعصب القوقعي (عضو كورتي) أو العصب الدهليزي .

انظرتحت acoustic hair cell .

خَلِيَّةٌ مُشْعِّرَة **hairy cell**

نمَط من الكريات البيضاء غير السوية ربما سلالة من اللمفاوية (B) ، توجد في الدم في الابيضاض المشعَّر الخلايا ، تملك زغابات هيولية غير منظمة عديدة تمنحها مظهر سوطي أو شعري ، ونواة مستديرة أو بيضاوية ، وهيولى رمادي ـ أزرق ، كروماتين نووي معتدل

أيضاً (Glomerular cells) .

انظر تحت glomus caroticum .

2 ـ أي من خلايا العضلات الملساء المحورة ذات نواة متحدة وهيولى شاحب الصبغة وحافات غير مميزة تحيط بالجزء الشرياني للمفاغرة الشريانية الوريدية للعقدة الكبية ، غني التعصيب بألياف الجهاز العصبي المستقل .

خَلاَيا كَأسيَّة **goblet cells**

غدة مخَاطية وحيدة الخلية توجد في ظهارة مختلف الأغشية المخاطية ، خاصة تلك التي توجد في المسالك التنفسية والأمعاء . تتجمع قطيرات مولد الموسين في الجزء العلوي في الخلية وتتمدد الخلية ، بينما تكون النهاية القاعدية نحيفة ، وتتخذ الخلية شكل القدح ، تسمى أيضاً (Calciform cell) ، (Chalice cell)

انظر تحت ptyocrinous .

خَلاَيا جولجي (عصبونَات هرمية في قشرة المخ) **Golgi's cells**

عصبون جولجي النمط الأول I أو النمط الثاني II .

انظر تحت neuron .

خَلِيَّةٌ مُوَجِّهَةٌ للغُدُد التَّناسُلِيَّة **gonadotropic cell**

خلايا مفرزة لمحفزات الغدد التناسلية .

خَلاَيا غُورْماغتيغ (=خَلاَيا مُجاورةٌ للكُبَيبَة) **Goormaghtigh cells (=juxtaglomerular cells)**

انظر تحت lacis cells .

خَلِيَّةٌ مُحَبَّبَة **granular cell**

الاسم المستعمل لوصف الخلايا الكيراتينية بالطبقة الحبيبية للأدمة ، حين تصبح مسسطحة معينة الشكل وتحوي مجموعة كثيفة من حبيبات داكنة الصبغة متعددة الأحجام ، قبل أن تموت وتتقشر .

خَلاَيا حُبَيبيَّة **granule cells**

1 ـ خلاياً نجمية شديدة الصغر توجد غالباً في الطبقات الحبيبية في قشرة المخ والمخيخ .

خَلِيَّةٌ خُوذِيَّة **helmet cell**

انْظر تحتَ schitocyte .

خَلِيةٌ مُساعفَة **helper cell**

اللمفاويات التائية المتمايزة ، التي يكون تعاونها (مساعدتها) مطلوب لإنتاج الأضداد ضد معظم المستضدات يتطلب تنشيط خلايا B معرفة محددات المستضد ضد الضد النوعي المولد بواسطة مستقبلات المستضد على الخلية B ، ومعرفة البعض الآخر من المحددة المستضدية بواسطة مستقبلات المستضد على الخلية المساعدة ، وتمر إشارة من الخلية المساعدة إلى الخلية B وربما تحتاج إلى اتصال مباشر بين الخلية والأخرى ، تتميز الخلايا الفأرية المساعدة بالمستضد Ly ، وتتميز الخلايا المساعدة البشرية بالمستضد CD4 .

انظر تحت lymphocyte .

خَلِيَّةٌ مُكَوِّنَةٌ للدَّم **hemopoietic cell**

خَلَايا هِنْلي (في الكلية) **Henle's cells**

خلايا أنابيب هنلي في الكلية .

خَلَايا هِنْسن **Hensen's cells**

(في عَضَو كورتي في قوقعة الأذن)

خلايا داعمة طويلة ، مرتبة في صفوف مجاورة للصف الأخير في الخلايا السلامية الخارجية ، وتشكل الحدود الخارجية لعضو كورتي .

خَلَايا كَبديَّة **hepatic cells**

الخلايا المتعددة السطوح التي تشكل مادة عنبية الكبد ، تسمى أيضاً (Liver cells) .

خَلَايا صَوارِيَّة **heteromeral cells**

(=commissural cells)

خلايا عصبية من المادة السنجابية في الحبل النخاعي والتي تنتقل عملياتها المحورية إلى المادة البيضاء في الجانب المقابل ، تسمى أيضاً (Commissural cells) .

خَلِيَّةُ هيل **Hill's cell**

خَلَايا نَقيريَّة (في المَبِيض) **hilus cells**

مجموعة شبيهة بالظهارية تترافق على نحو وثيق مع الفجوات الوعائية والألياف العصبية التكتل ، ونويات صغيرة ودقيقة أو غير ملحوظة . تسمى أيضاً (Tricholukocyte) .

خَلَايا هامَر شِبْهُ العَضَلِيَّة **Hammar's myoid cells**

انظر تحت myoid cells .

خَلِيَّةُ هارْجريفز **Hargrave's cell**

(= خلية الذَّئْبَة الحُمَامِيَّة) **(=LE cell)**

خَلَايا المَرَض القَلْبي **heart-disease cells**

بلاعم تحتوي على حبيبات من الحديد ، توجد في الأسناخ والقشع (البلغم) لدى مرضى فشل القلب الاحتقاني .

خَلَايا الفَشَل القَلْبي **heart-failure cells**

انظر تحت heart -disease cells .

خَلَايا الآفَة القَلْبيَّة **heart-lesion cells**

انظر تحتَ heart-disease cells .

خَلَايا مُزْدَوِجَةُ التَّفَرُّع **hecatomeral cells**

(خلايا ذاتَ قسيمات مجزأة إلى اثنين) ، خلايا المادة السنجابية للحبل النخاعي في الحبل الشوكي ، والتي تعمل عملياتها الاسطوانية المحورية على تقسيم وإرسال فرع واحد داخل المادة البيضاء على الجانب نفسه في الحبل النخاعي والآخر داخل الأعمدة الأمامية الوحشية في الجانب الآخر .

خَلَايا شائكَة **heckle cell**

(=prickle cell)

انظر تحت prickle cell .

خَلَايا هايدنْهاين **Heidenhain's cells**

(الخلايا الأصلية والجدارية في بطانة المعدة)

1 ـ انظر تحت chief's cell .

2 ـ انظر تحت parietal cells .

خَلَايا هيلا **HeLa cells**

(سُلالَةٌ منَ الخَلَايا الوَرَمِيَّة)

خلايا أول سلالة سرطانية مستنبتة مستمرة ، تخلفت عن ورم سرطاني عنقي بشري ، تستعمل في دراسة العمليات الحيوية ، والتي تشمل الفيروسات ، عند المستوى الخلوي .

خلايا هُورْتله **Hurthle cells**
(في الغدة الدرقية)
انظر تحت Askanazy cells .

خلايا فائقةُ التَّلَوُّن **hyperchromatic cells**
خلية تتميز بأنها ملونة بكثافة أكثر مما يكون معهوداً في نمطها (مفرطة الصبغة) .

خلايا مؤهّلةٌ مَناعياً **immunologically competent cells**
انظر تحت immunocyte .

خلايا مُغلِّفة **incasing cells**
(للخلايا الذوقية اللسانية)
انظر تحت cover cell .

خليَّةٌ غيرُ مُتَميِّزَة **indifferent cell**
خلية لا تملك تركيب مميز أو التي لا تكون جزء أساسي في النسيج الموجود فيه .

خليَّةٌ إلتهابيَّة **inflammatory cell**
خليةَ (العدلة ، البلعم . .إلخ) تشارك في الاستجابة الالتهابية للمادة الغريبة .

خلايا بَدْئيَّة **initial cells**
انظر تحت germ cell .

خليَّةٌ دَمْجيَّة **integrator cell**
انظر تحت intrneuron .

خلايا مُقْحَمَة **intercalary cells**
تركيبات نبوتية الشكل داكنة بين الخلايا الأخرى (إفرازية وغير إفرازية) في بطانة البوق ، والتي تكون مفرغة من الخلايا الإفرازية ، تسمى أيضاً (Peg cells) .

خلايا مُقْحَمَة **intercalated cells**
خلايا داكنة اللون في النبيبات الكلوية الجامعة المسؤولة عن حموضة البول .

خلايا بَينَ الشُّعَيرات **intercapillary cells**
انظر تحت mesangial cells .

خلايا بَينَ السُّنَيْنات السَّمْعيَّة **interdental cells**
خلايا توجد في الحوف الحلزوني بين الأسنان والتي تفرز الغشاء السقفي في القناة (القوقعية) .

خلايا بَينَ الجُرَيبات **interfollicular cells**
عديمة الميالين في نقير المبيض والمبيض الإنسي المجاور .

خلايا هُودْجكين **Hodgkin's cells**
انظر تحت reed-Sternberg cells .

خلايا هُوفْباوَر **Hofbauer cells**
(في المشيمة)
خلايا كروية كبيرة مليئة بالفجوات والنوى الكروية الكبيرة ، والتي توجد في لُبّ النسيج الضام في الزغابة المشيمائية في المشيمة ، وربما تكون خلايا بلعمية .

خلايا التَّنْميط المِثْلي **homozygous typing cells**
الزيجوت المتماثلة الألائل معلومة النوعية لمستضدات الكريات البيض النوع D ، وتستخدم أنماط رعائل الزيجوت المتماثلة الألائل لكل أنواع مستضدات الكريات البيض البشرية النوع D المعلومة لتحديد نمط المستضد للكريات البيض البشرية لخلايا مجهولة باستخدام تفاعلات اللمفاويات المختلطة أحادية الاتجاه .

خلايا أُفُقيَّة **horizontal cells**
عصبون شبكي ، هناك نمطان ووظائفهما غير واضحة . تملك كل خلية جسم متعدد الأقطاب من طبقة النواة الداخلية ومحوار عصبي واحد طويل وعدة محاور قصيرة . تعمل كافة المحاور العصبية كمحاور وتغصنات عصبية معاً ، تمتد وتتفرع بطول طبقة النواة الداخلية ، تتشابك المحاور العصبية الطويلة من الطبقة الخارجية الضفيرية الشكل مع العنيقات والكُريوات معاً ، وتتصل المحاور القصيرة إما مع العنيقات أو الكُريوات تسمى أيضاً (H cells) .

خلايا قَرْنيَّة الشَّكْل **horn cells**
1 ـ خلايا ظهارية فقدت الهيولى الخاص بها ، لها حوافي حادة ، وتبدو متقرنة الشكل .
2 ـ أي خلية عقدية في قرون الحبل النخاعي .

خلايا هُورْتيغا **Hortega cells**
(= خلايا دبقية صَغيْرَة) **(=microglial cells)**
انظر تحت microglial cell .

خلايا عضلية ملساء متخصصة ، تقع في الغلالة الوسطانية في الشريانات الكبيبية الواردة ، وتحتوى على حبيبات إفرازية . وهي المكون البنيوي الرئيسي المسؤول عن إطلاق الرينين ، وتلعب دور رئيسي في التنظيم الذاتي الكلوي .

خَلاَيا K (خَلاَيا فاتِكَة) **K cells (=Killer cells)**

1 ـ خلايا فاتكة : وهي خلايا لمفية صغيرة بدون واصمات سطحية (T) أو (B) ، وتتعرف خلايا (K) على ضد الجلوبين المناعي (G) (IgG) الذي يغطي الخلية المستهدفة عن طريق مستقبلات القطعة (Fc) «وهي مستقبلات للمعقدات الضدية المستضدية» ويكون انحلال الخلية المستهدفة خارج الخلية ، ويتطلب تماس مباشر بين الخلية والخلية ، وبدون اكتناف للمتممة .

2 ـ خلايا تقع في الغالب في النطاق الأوسط في الأغشية المخاطية الإثنى عشرية والصمائية التي تخلق عديد الببتيد المثبط المعدي .

خَلاَيا مُلَوِّنَةُ النَّواة **karyochrome cells**

انظر تحت karyochrome .

خَلاَيا فاتِكَة **killer cells**

1 ـ انظرَ تحت K cells .

2 ـ انظر تحت lymphocyte .

انظر تحت cytotoxic T lymphocyte .

خَلاَيا كُولْشيتْسكي **Kulchitsky's cells**

(= خلايا مُتَفَضِّضَة) **(=argentaffin cells)**

(في خبايا ليبركون في الأمعاء)

خلايا أليفة الفضة تقع بين الخلايا التي تبطن غدد ليبركون في الأمعاء .

خَلاَيا كُوبْفَر (في الكبد) **Kupffer's cells**

خلايا كبيرة نجمية أو هرمية الشكل مع نواة بيضاوية كبيرة ونواة بارزة صغيرة ، وهذه الخلايا البلعمية الكثيفة تبطن الجدران شبه الجيبية في الكبد وتشكل جزء الجملة الشبكية البطانية .

خَلاَيا L **L cells**

1 ـ خلايا من صنف (C3H) في الأرومات

انظر تحت askanazy cells .

خَلِيَّة بَيْنِيَّة **internuncial cell**

(=عَصَبونٌ بَيْنِيّ) **(=interneuron)**

خَلاَيا خلالِيَّة **interstitial cells**

1 ـ انظَر تحت leydig's cells .

2 ـ كتل من الخلايا الشبيهة بالظهارية الكبيرة ، والخلايا الحاوية للبشحم في سدى المبيض ، يعتقد أنها تملك وظيفة إفرازية ، مشتقة من القراب الغائر لجريبات المبيضية الرتقية ، وهكذا تكون في الإنسان أكثر تعدداً في السنة الأولى في الحياة حين يتطور الرتق بسرعة . وفي النساء فهي إما أن تكون غائبة أو هزيلة الظهور ، لكن في بعض الثديات الأخرى ، خاصة الأرانب ، تكون أكثر بروزاً .

انظر تحت Interstitial glands .

3 ـ خلايا ذات نواتئ هيولية وزوائد هيولية طويلة ، توجد في المناطق حول الأوعية وبين حبال الخلايا الصنوبرية الصغيرة في الجسم الصنوبري ، ويعتبرها البعض عناصر دبقية .

4 ـ خلايا مخزنة للدهون في الكبد .

الخلايا الخلالية لكاجال **Interstitial cells of cajal**

خلايا متعددة الأشكال تملك نوى بيضاوية ونواتئ هيولية طويلة ومتفرعة تتداخل مع نواتئ الخلايا المجاورة ، متفرقة بين طبقات العضلات المستديرة والطويلة في القناة المعوية المعدية وفي العضلة الملساء في المريء ، ويعتقد أنها تعمل ناظمة لنبضات القلب .

خَلِيَّةٌ مِعَوِيَّةٌ امْتِصاصِيَّة **intestinal absorptive cell**

خَلاَيا جَزِيْرِيَّة **islet cells**

خلايا جَزَيرية ، خلايا تؤلف جزيرات لانجرهانز تشمل خلايا ألفا وبيتا ودلتا وخلايا PP .

خَلِيَّةٌ يَافِعَةٌ **juvenile cell**

انظَر تحَت metamyelocyte .

الخَلاَيا المُجاورَةُ للكُبَيبَة **juxtaglomerular cells**

البلاعم ويعتقد أنها خلايا مقدمة للمستضد ، تشترك في استجابات أرجية اللمس والتفاعلات المناعية المتواسطة بالخلايا في الجلد .

خَلاَيا لانجهانْس (في المشيمة) **Langhans' cells**


1ـ خلايا ظهارية متعددة السطوح تكون الأرومة الغاذية الخلوية (طبقة لانجهانس) .

2ـ انظر تحت langhans' giant cells .

خَلاَيا لانجهانْس العِمْلاَقَة **Langhans' giant cells**

(فِيَ الأمراض الورمية الحبيبيَّة والسّل والجذام)

خلايا عملاقة ، تشبه الخلايا العملاقة للجسم الغريب ولكن تكون نواياها مرتبة في دائرة كاملة أو في شكل نعل الفرس (الحذوة) عند محيط الخلية ، تظهر على نحو مميز في الالتهابات الورمية الحبيبية ، مثلما تحدث في السل والزهري والساركويد والعداوى الفطرية العميقة .



خَلاَيا لانجهانْس العِمْلاَقَة
Langhans' giant cells

خَلاَيا كَبيرَةُ الحُبَيبات **large granule cells**

خَلِيَّةُ LE **LE cell**

(=**خَلِيَّةُ الذِّئبَة الحُمَامِيَّة**) (=**lupus erythematosus cell**)

خلية عدلة أو بلعمة كبرى بلعمت المادة النووية المتمسخة في الخلية المصابة (خلية الذئبة الليفية للفئران ، تنمو في مزارع الأنسجة لعدة سنوات ، تستعمل لقدرتها على دعم نسخ عدة أنماط من الفيروسات .

2ـ نمط من الخلايا أليفة ، ذات حبيبات هيولية كبيرة في الأغشية المخاطية في المعي العلوي ، تشبه بنيتها المستدقة بنية خلايا ألفا في جزيرات لانجرهانس ، وتفرز جليستين (جلوكاكون معوي) وتسمى أيضاً (Large granule cells) .

3ـ انظر تحت langerhans' cells .

4ـ انظر تحت langhans' cells .

5ـ خلايا عديمة الواسمات ذات خواص طبيعية أو خواص قاتلة .

خَلاَيا دَمْعِيَّةٌ غِرْباليَّة **lacrimoethmoid cells**

خلايا غِرَبالِيةَ تقعَ تحت العظم الدمعي .

الخَلِيَّةُ المَوَجِّهَةُ اللَّبَنِيَّة **lactotrophic cell**

(= **الخَلِيَّةُ المَوَجِّهَةُ للثَّدْي**) **(=mammotroph)**

خَلِيَّةٌ جَوبِيَّة **lacunar cell**

(فِي الشَكل المصلب لداء هودجكين)

صورة متغيرة في خلية ريد شتيرنبيرج ، عادة ما تحمل نواة واحدة تحيط بها هيولى وفير ، باهتة الصبغ ، مبطنة داخل غشاء خلية حاد المعالم ، تترافق في المقام الأول مع نمط التصلب العقيدي في مرض هودجين .

خَلاَيا لانْجرهانْس **Langerhans' cells**

(في البشرة الجلدية)

خلايا متفرعة نجمية ، مشتقة من الطلائع في نقي العظم ، تبدو واضحة على المجهر الضوئي وتملك صبغة داكنة ، ونواة محززة (مفرضة) ومدمجات متميزة (حبيبات بيربيك) في الهيولى ، وهي تنقصها الخيوط الموترة والجسيمات الرابطة والأجسام الميلانينية ، توجد خلايا لنجرهانس في الأساس في الطبقة الشائكة البشرية ، لكنها تظهر كذلك في الظهارة المطبقة الخلايا الأخرى . تم التعرف عليها في الرئة والعقد اللمفية والطحال والغدة التوتية . وتملك واصمات سطحية مميزة في

انظر تحت hepatic cell .

خَلِيَّةٌ سَيَّارَة **locomotive cell**

(= خَلِيَّةٌ أميبيَّةُ الشَّكْل) **(=ameboid cell)**

أي خَلية لَهَا القدرة على تغيير شكلها وتتحرك في محيطها ، وتسمى أيضاً (Migratory) ، (Amebocyte) ، (Wandering cells) .

خَلايا طَويلَةُ الغُصون **longiradiate cells**

خَلِيَّةُ الذِّئْبَة الحُمَامِيَّة **lupus erythematosus cell**

بلَعمة كبرَى تبلعَم المادة النووية المبداة في الخلية المصابة (جسم Le أو هيماتوكسيلين) ، وهي خاصية مميزة في الذئبة الحمامية ، ولكن توجد أيضاً في الاضطرابات وفي الأنسجة الضامة .

خَلايا أَصْفَرِيَّة **luteal cells**

خلايا أصفَرية ، وهي الخلايا الممتلئة باهتة الصبغة متعددة الأشكال في الجسم الأصغر ، وتشمل الخلايا اللوتينية الحبيبية والخلايا القرابية اللوتينية .

خَلايا لُوتينيَّة **lutein cells**

خَلِيَّةٌ لَمْفِيَّة **lymph cell**

(= لَمْفَاوِيَّة) **(=lymphocyte)**

انظر تحت lymphocyte .

خَـلَايا الوَرَم الغُـدِّيِّ اللِّمْفي **lymphadenoma cells**

خلايا الأورام الغدية اللمفاوية الحميدة.

الخَلِيَّةُ اللِّمْفَانِيَّة **lymphoid cell**

خلايا في الجهاز المناعي وتتفاعل نوعياً مع المستضد وتطور منتوجات خلوية نوعية ، وهي تضم اللمفاويات والخلايا البلازمية .

خَلِيَّةٌ مالْبيجي **malpighian cell**

(= خَلِيَّةٌ كيراتينيَّة) **(=keratinocyte)**

انظر تحت keratinocyte .

خَلِيَّةٌ مُوَجِّهَةٌ للثَّدْي **mammotropic cell**

الخلايا المفرزة لمحفزات الثدي .

خَلِيَّةُ مارْشان **Marchand's cell**

(= خَلِيَّةُ الغلالة البرَّانيَّة) **(=adventitial cell)**

انظر تحت pericyte .

خَلايا هامشيَّة **marginal cells**

الحمامية أو جسم أو هيماتوكسيلين) ، وهي خاصية مميزة في الذئبة الحمامية المجموعية ، ولكن توجد أيضاً في الاضطرابات المضاهية في الأنسجة الضامة .

خَلِيَّةُ لُوكْلانْشيه **Leclanché cell**

(خلية كهربية كربونية زنكية)

خَلايا لَيشْمانيَّةُ التَّلَوُّن (كريات بيضاء في الملاريا) **Leishman's chrome cells**

كريات بيضاء حبيبية قاعدية توجد في حمى الماء السوداء .

خَلِيَّةُ الجُذام **lepra cell**

هي خلية المنسجة في العقدة الجذامية والتي كانت قد تحولت بفعل عصيات جذامية إلى كيس يحوي جبلة وعصيات متحللة ، تسمى أيضاً (Virchow cell) .

خَلَايا لايديج **Leydig's cells**

(الخلية المفرزة للتستوستيرون في الخصية)

1 ـ عناقيد الخلايا الشبيهة بالظهارية تمثل النسيج الصماوي للخصية ، والتي تُفصل هرمون الأندروجين (هرمون الذكورة) مولدات الذكورة ، وفي الدرجة الأولى هرمون التستوستيرون ، تسمى أيضاً (Interstitial cells of Leydig) ، (Interstitial glands) .

خَلَايا فاتحَة **light cells**

(=الخَلَايا المُجاوِرَةُ للجُرَيْب) **(=parafollicular cells)**

(في الغدَة الدرقية)

انظر تحت parafollicular cells .

خَلَايا مُبطِّنَة **lining cells**

الخلايا التي تبطن التجاويف الجسمية .

خَلَايا ساحليَّة **littoral cells**

(=خَلَايا مُبَطِّنَة) **(=lining cells)**

خلايا مسطحة تبطن جدران التجاويف اللمفية أو الدموية . وتسمى أيضاً (Rod cell) ، (Stave cell) .

خَلَايا الكَبد **liver cells**

خَلَايا ذاكرَة (مناعيات) **memory cells**

خلايا لمفية (T) و (B) التي تتواسط الذاكرة المناعية ، يعتقد أنها تحتفظ بالمعلومات التي تسمح بمتابعة التحدي اللاحق بتفاعل مناعي فعال وأكثر سرعة في التعرضات اللاحقة للمستضدات عن تلك التعرضات السابقة .

خَلِيَّةُ مرْكِل اللَّمْسيَّة **Merkel tactile cell**

(=**هلالَةٌ لَمسيَّة**) **(=meniscus tactus)**

انظر تحت merkel cell .

خَلَايا مرْكل ـ رانْفييه **Merkel-Ranvier cells**

(= **خلية ميلانيَّة**) **(=melanocyte)**

خلايا شفافة من الطبقة القاعدية في البشرة تحتوي على حبيبات كانيكول امين وتشبه الخلايا الغلافية .

خَلِيَّةُ مرْكل **Merkel's cell**

(=meniscus tactus)

1 ـ هلالَةٌ لَمسيَّةٌ

2 ـ خَلايا فيَ بشرة الجلد تحوي الكاتيكولامين

خلية متخصصة عند أو قرب ملتقى الظهارة والجلد ، تتميز بحبيبات عديدة مرتبطة بالغشاء مع مراكز مكثفة ، وبعض الجسيمات الرابطة والخيوط الدقيقة الهيولية ، والخيوط داخل النواة المنحزمة في توازي لتشكيل زوائد قضيبية تتلاحم مع الخلايا الكيراتينية . يعتقد أنها تعمل مستقبلات لمس بالتداعي مع نهايات مسطحة شبه قرصية الشكل في الألياف العصبية (هلالات لمسية) .

خَلِيَّةُ مسْراق الكُبَيبَة **mesangial cell**

خلايا توجد في مسراق الكبيبة وهي سويقة النسيج الضام في محفظة الكبيبية في الكلية .

خَلَايا مُتوَسِّطِيَّة **mesenchymal cells**

الخلايا متعددة الإمكانات التي تكون اللحمية المتوسطة .

خَلَايا المُتوَسِّطَة **mesothelial cells**

خلايا ظهارية مسطحة ذات منشأ لحمي متوسط ، تبطن التجاويف المصلية .

انظر تحت crescents of Giannuzzi .

خَلِيَّةُ مارْييه ديفي (كهربائية) **Marié-Davy cell**

خَلِيَّةٌ نقَويَّة **marrow cell**

أي من خلايا الدم غير الناضجة التي تتطور في نقي العظم ، مثل تلك المكتنفة في تكوُّن الدم . وتسمى أيضاً (Myeloid cell) .

خَلَايا مارْتينوتي **Martinotti's cells**

(في قشرة المخ)

خلايا مغزلية الشكل ذات نواتيء محوارية في طبقات قشرة المخ ، خاصة في الطبقة المتعددة الشكل وكذلك في الطبقة الهرمية الداخلية .

خَلَايا بَدينَة **mast cells**

خلية في النسيج الضام لا تزال وظيفتها الفيزيولوجية المحددة غير معروفة ، قادرة على تطوير حبيبات هيولية قاعدية ، متبدلة التلوُّن ، تحتوي على الهستامين والهيبارين ، وفي أجناس معينة ، مثل الجرذان والفئران ، وتسمى أيضاً (Labrocyte) ، (Mastocyte) .

خَلَايا خُشَّائيَّة **mastoid cells**

انظر تحت cellulae mastoideae .

خَلَايا مَطْرسيَّة **matrix cells**

خلايا مسطحة توجد في فصوص الغدد الزهمية ، تتعرض إلى تحرير مفاجيء إلى حد ما إلى خلايا باهتة رغوية الشكل حاملة للدهن في الأسناخ .

خَلِيَّةُ ماوثنر **Mauthner's cell**

(في الدماغ الخلفي للسمك)

خلية كبيرة في الدماغ الخلفي في الأسماك والبرمائيات التي تنشأ عنها ألياف ماوثنر .

الخَلِيَّةُ الأُمُّ للأَبْواغ الضَّخْمَة **megaspore mother cell**

أي من الخلايا ثنائية الصبغات المتطورة في الأبواغ الكبروية في النباتات التي تقسم بالانقسام المنصف لتنتج أربعة خلايا فردانية (أبواغ كبروية) ، تعيش واحدة فقط منها لتصبح خلية النابتة العرسية الكبيرة أو أنثى النابتة العرسية .

إلى مختلف مناطق القشرة .

خَلِيَّةُ موزر **Mooser cell**

(في التيفوس الجُرَذي)

خلية كبيرة أحادية النواة (مصلية) مع ركتسيات متعددة في الهيولى ، تلاحظ في النضحة الالتهابية في التيفوس الفأري ، وتسمى كذلك (Neill-Mooser bodies) .

خَلِيَّةٌ تُوَيتيَّة **morular cell**

(خلايا بلازمية تحوي على جسيمات من الجلوبولينات المناعية)

انظر تحت moot cell .

خَلِيَّةٌ مُؤَشَّنَة **mossy cell**

1 ـ خلية نجمية جبلية .

2 ـ أي من الخلايا في الدبق قليل التغصن أو في الدبيقات .

خَلِيَّةٌ أُمّ **mother cell**

خَلية تنقسم لتكون خليا جديدة ، وتسمى أيضاً (Brood cell) ، (Parent cell) .

خَلِيَّةٌ حَرَكيَّة **motor cell**

انظر تحت motoneuron .

خَلِيَّةُ موط **Mott cell**

(في الورم الأنفي الصلب)

خلية بلازمية غير سوية تحتوي على أجسام موط أو أجسام رسل (في البلازماويات) ، تظهر في الورم النقيي المتعدد وفي المخ في المراحل المتأخرة في داء المثقبيات الأفريقي . وتسمى أيضاً (Berry cell) ، (Grape cell) ، (Morular cell) .

خَلايَا فَمَويَّة **mouth cells**

خلايا حرشفية مفصولة من الظهارة المبطنة للبلعوم الفموي ، توجد في القشع .

خَلايَا مُخاطيَّةٌ أَلْبُومينيَّة **mucoalbuminous cells**

انظر تحت trophochrome cells .

خَلايَا مُخاطيَّةٌ مَصْليَّة **mucoserous cells**

خَلِيَّةٌ مُخاطيَّة **mucous cell**

خلايا تفرز المخاط أو الموسين .

خَلايَا أَليفَةُ المَعادن **metallophilic cells**

خلايا يكون فيها الهيولى محب جداً للأملاح المعدنية ، وهذه خلايا تتواجد في الجملة الشبكية البطانية ، وكذلك سلسلة الخلايا ذات الصلة التي لا تكون مصطبغة انتقائياً بالصبغ الحيوي .

خَلايَا ماينرْت **Meynert's cells**

(خلايا هَرمية في قشرة المخ)

خلايا هرمية الشكل منعزلة وكبيرة في القشرة المخية ، توجد في صف واحد قرب الشق المهمازي (التلم المهمازي) ، وتسمى أيضاً (Solitary cells of Meynert) .

خَلِيَّةٌ دبقيَّةٌ صَغيرَة **microglial cell**

إحدى الخلايا البلعمية الخلالية الصغيرة في الدبيقيات ، وتسمى تحت (Microgliocyte) ، (Hortega cell) .

انظر تحت citter cell .

الخَلِيَّةُ الأُمُّ للأبْواغ الصُّغْيرَة **microspore mother cell**

أي من الخلايا ثنائية الصفات ذات النواة المتطورة الكبيرة في الأبواغ الصغيرة في النباتات التي تنقسم بالانقسام المنصف لتنتج أربعة أبواغ صغيرة فردانية .

خلايا مهاجرة **migratory cells**

انظر تحت ameboid cell .

خَلايَا ميكُوليتْس **Mikulicz's cells**

(في الورم الأنفي الصلب)

الخلايا في الورم الأنفي الصلب التي تحتوي على عصيات المرض ، وتسمى أيضاً (Foam cells) .

خَلايَا متْرَاليَّة **mitral cells**

(خلايا هَرميَّة تكوِّن إحدى طبقات البصلة الشمية)

عصبون مع أجسام هرمية تقع في بصيلة الشم ، وتكون المرحلة الثانية في المسلك إلى القشرة ، وهي تستقبل نبضات في كبيبات الشم من خلايا الشم ، وترسل النبضات عبر قنوات الشم

وطويلة ، تحوي خيوط عضلية ويعتقد أن تقلص هذه الخلايا تعمل في المساعدة في إفراز الغدد .

خَلَايَا عَضَلِيَّةٌ شِبْهُ ظِهَارِيَّة **myoepithelioid cells**

الخلايا مجاورة للكبيبة ، سميت هكذا لأنها تبدو خلايا عضلية ملساء معدلة .

خَلِيَّةٌ مُوَلِّدَةٌ للعَضَل **myogenic cell**

(= أرومَةٌ عَضَلِيَّة) **(=myoblast cell)**

الخلايا التي تتطوَّر لتنتج الخلايا العضلية .

خَلَايَا شِبْهُ عَضَلِيَّة **myoid cells**

1 ـ خلايا توجَد في القنوات الناقلة للمني لقوارض المختبر العادية ، وهي تشبه خلايا العضلة الملساء ويعتقد أنها انقباضية ومسؤولة عن الانقباض الضحل الإيقاع في القنوات الناقلة للمني في هذه الأنواع ، وتسمى أيضاً (Peritubular contractile cells) .

2 ـ خلايا عضلية مخططة توجد في التوته (غدة داخلية الإفراز موجودة أسفل العنق) الفقاريات غير الثديية ، خاصة الزواحف والطيور ، ونادراً في الثدييات وتسمى أيضاً . (Hammar's Myoid cells) .

خَلِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ للبطانَة الشِّرْيَانِيَّة **myointimal cell**

خَلية عضَلة ملَساء تَوجد فيَ باطنة الشريان .

خَلَايَا ناجوت **Nageotte's cells**

(في السائل النخاعي)

خلايا السائل المخيخي الشوكي الذي يصبح عدده متزايد كثيراً في عدة أمراض .

خَلِيَّةٌ فاتِكَةٌ طَبِيعِيَّة **natural killer cell**

انَظر تحَت NK cells .

خَلِيَّةٌ عَصَبِيَّة **nerve cell**

انَظر تحتَ neuron .

خَلَايَا نيُومان **Neumann's cells**

(كريات حمر منوَّاة في نقي العظام)

كريات دم حمراء يوجد بها نواة توجد في نقي العظم .

خَلَايَا عَصَبِيَّةٌ ظِهارِيَّة **neuroepithelial cells**

خلايا الظهارة العصبية .

خَلِيَّةٌ مُخاطِيَّةٌ عُنُقِيَّة **mucous neck cell**

خَلايا توجَد في أعناق الغدد المعوية ، وهي تملأ الفراغات بين الخلايا الجدارية وتمتلئ بحبيبات شفافة باهتة اللون .

خَلِيَّةٌ تُوَيتِيَّة **mulberry cell**

(=morular cell)

1 ـ انظر تحت mott cell .

2 ـ خلية مستديرة مع نواة مركزية المواقع وفجوات هيولية خشنة قرب الحافة الخارجية ، تتطور عند حافة الجسم الأصغر المتراجعة .

خَلِيَّةٌ عَضَلِيَّة **muscle cell**

أي خلية مَنقبضة في العضل . تكون خلايا العضلات الملساء خلايا مستطيلة في شكل مغزل تحوي نواة واحدة وليفات عضلية طولية الترتيب لخلايا عضلات القلب والعضلات الهيكلية .

انظر تحت muscle fiber .

خَلِيَّةٌ نِقَوِيَّة **myeloid cell**

انَظر تحَت marrow cell .

خَلِيَّةُ الوَرَم النِّقَوِي **myeloma cell**

خَلية توجَد فَي نقي العظم وأحياناً في الدم المحيطي وورم النقيي المتعدد ، وفي أشكالها الكشمية تكون الخلية الكبيرة وتملك هيولى ذات صبغة زرقاء غامرة دون أسحبة حول النواة ، وتملك نواة واحدة أو أكثر كبيرة على نحو معتدل ونواة محوصلة قد تكون مركزية أو لا مركزية الوضع ، وقد تحتوي على نويات . وفي الأورام الأكثر تميزاً تكون الخلية أصغر حجماً ، في ما عدا التركيب الدقيق اللون ، تشبه إلى حد كبير البلازماوية .

خَلِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ ظِهارِيَّة **myoepithelial cells**

خَلايا عضَلية ملَساء معدلة ، قابلة للانقباض في طبيعتها ، يعتقد أنها من منشأ أدمى ظاهري ، تقع حول الوحدات الإفرازية في بعض الغدد (اللعابية والثديية والعرقية والدمعية) بين خلايا الغدد والغشاء القاعدي ، وتجري بها عمليات هيولية متداخلة ومتفرعة

ـ بيك ، وتملك هيولى رغوي يحوي الشحوم ، في شكل سيفينجوميالين ، تعطي تفاعل موجب مع السودان الثالث وأصباغ الدهون الأخرى ، وتسمى أيضاً (Pick's cells) .

خلايا NK (خَلاَيا فاتكَةٌ طَبيعيَّة) **NK cells**

(=natural killer cells)

خلايا قاتلة طبيعية ، خلايا قادرة على إحداث تفاعلات مسممة للخلايا دون تحسيس مسبق ضد الهدف . وخلايا (NK) عبارة عن لمفية صغيرة دون واسمات خلايا (B) أو (T) السطحية التي تنشأ في نقي العظم .

وتستطيع أن تحلل أنواع واسعة من خلايا الأورام وأنواع الخلايا الأخرى وربما تكون هامة في المقاومة الطبيعية للأورام . ويضاعف الإنترفيرون نشاطها .

خَلاَيا نَبيلَة **noble cells**

الخلايا المتمايزة في أجهزة وأنسجة الجسم .

خَلِيَّةٌ سَوِيَّة **normal cell**

أيَ خليَة توجد طبيعياً في أي جهاز خالي من المرض .

خَلِيَّةٌ مُنَوَّاة **nucleated cell**

أيَ خلية تملك نواة .

كُرَيَّةٌ حَمْراءُ مُنَوَّاة **nucleated red blood cell**

الكريات الدموية الحمراء المنواة .

كُرَيَّةٌ حَمْراءُ مُنَوَّاة **nucleated red cell**

الكريات الدموية الحمراء المنواة .

خَلاَيا عَديْمَةُ الوَاسمَات **null cells**

(لمفاويات لاتحملَ واسمات سطحية)

(=null lymphocyts)

خلايا لمفية تنقصها واسمات السطح (T) أو (B) .

انظر تحت NK,K cells .

خَلاَيا حاضنَة **nurse cells**

(= خَلاَيا سَيرْتولي) **(=Sertoli's cells)**

انظر تحت sertoi's cell .

خَلاَيا حاضنَة **nursing cells**

(=خَلاَيا سَيرْتولي)

خَلاَيا دبْقيَّة **neuroglia cells**

خلايا النسيج الداعم في الجهاز العصبي المركزي (الدبق العصبي) ، وهذه الخلايا غير العصبية تظهر في ثلاثة أنواع : خلايا نجمية وخلايا الدبيقيات وخلايا الدبق الكبروي (الدبق قليل التغصن) .

خَلاَيا دبْقيَّة **neuroglial cells**

انظر تحت neuroglia .

خَلِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ عَضَلَيَّة **neuromuscular cell**

نوَع خلاَيا يظهرَ دائماً في الحيوانات الدنيا ، يستقبل فيها الجزء الخارجي محفزات ويكون الجزء الداخلي قابل للانقباض .

خَلِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ إِفْرازيَّة **neurosecretory cell**

أيَ خلية لها خواَص مشابهة للخلايا التي تفرز مواد نشطة بيولوجياً ، وتكون تأثيرها في موقع بعيد مثل خلايا المهاد .

انظر تحت neuroedocrine cell .

خَلِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ حسيَّة **neurosensory cell**

خَلِيَّةٌ عَدِلَة **neutrophilic cell**

هَي خليَة وخاصة كرية بيضاء ، قابلة للصبغ بأصباغ متعادلة ، وتسمى أيضاً (Neutrophil) .

خَلِيَّةٌ وَحْميَّة **nevus cell**

خَلية متعَددة الأشكال ، تحوي ميلانين ، يعتقد أنها خلية غطائية ناضجة عادية أو معدلة ، أو تكون مشتقة من خلية «شوان» أو أرومة وحمية جنينية . تظهرهذه الخلايا في مجموعات أو أعشاش في البشرة وتصل إلى الأدمة ببثق مركزي جابذ ، وهي المكون الرئيسي للخلايا الوحمية ، تسمى أيضاً (Nevocyte) .

خَلِيَّةٌ مشْكاتيَّة **niche cell**

(= خَلِيَّةٌ حَاجزيَّة) **(=septal cell)**

النوع الَثاني منَ الخلايا الهوائية .

خَلاَيا نيمان بيك **Niemann-Pick cells**

(منسجات ممتلئة بالسفينجوميالين في الطحال والنقي في داء نيمان بيك)

خلايا مستديرة أو بيضاوية أو كثيرة السطوح تظهر في نقي العظم والطحال في مرض نيمان

2 ـ أي من الخلايا المرضية أليفة الحمض الموجودة في الغدة الدرقية .

3 ـ انظر تحت Ashkanazy cells .

خَلاَيا حَمضَة **oxyphilic cells**

انظر تحتَ oxyphil cells .

كُرَيَّاتٌ حُمْرٌ بَشَرِيَّةٌ مكْدوسَة **packed human blood cells**

كريات دم حمراء بشرية مكدوسة .

كُرَيَّاتٌ حُمْرٌ مكْدوسَة (بَشَرِيَّة) **packed red blood cells (human)**

انظر تحت red blood cells .

خَلاَيا بَاجيتْ **Paget's cells**

(خلايا كشمية في بشرة الثدي في داء باجيت)

خلية كبيرة غير منتظمة الشكل ورمية كشمية مع هيولى مجوف ونواة حويصلية ما تكون مفرطة الانصباغ ، ويحيط بها منطقة شفافة ، تنتج الخلايا فرادياً أو في مجموعات صغيرة في البشرة في مرض باجيت في الثدي ومرض باجيت خارج الثدي .

خَلاَيا حَنَكيَّة **palatine cells**

الأجزاء في الخلايا الغربالية التي تمتد داخل عظم الحنك .

خَلاَيا سياجيَّة **palisade cells**

طبقةَ مكتنزة في الخلايا الاسطوانية صانعة الكلوروفيل (صافية اليَخْضور) ، تقع في طبقة الورق المتوسط ، وتكون مرتبة بحيث تكون محاورها الطويلة مكونة زوايا قائمة مع سطح جلد الورقة .

خَلاَيا بانيث **Paneth's cells**

(في قاع الخبايا المعوية)

خلايا ظهارية ضيقة هرمية أو عمودية الشكل مع نواة مستديرة أو بيضاوية قريبة من قاعدة الخلية ، توجد في قاع خبايا ليبركون ، وتحتوي على حبيبات إفرازية كبيرة ربما تحتوي على إنزيم الببتيداز . وتسمى أيضاً (Davodoff's cells) .

(خلايا في الخصية تلتصق بها أرومات النطف)

انظر تحت Sertoli's cell .

خَلاَيا شوفانيَّة **oat cells**

خلايا صغيرة مستديرة تحوي هيولى قليل ، تشبه حبوب الشوفان ، تظهر في الخلايا الصغيرة في سرطان الرئة .

خَلاَيا شوفانيَّةُ الشَّكْل **oat-shaped cells**

انظر تحت oat cell .

خَلاَيا شَمِّيَّة **olfactory cells**

مجموعة خلايا عصيبة مغزلية الشكل ، متخصصة ذات نوى كبيرة ، مبطنة بين الخلايا الظهارية في غشاء الأنف المخاطي ، تحمل النبضات من مستقبلات الشم إلى الكبيبة في بصيلة الشم . وتسمى أيضاً (Schultze's cell) .

خَلاَيا اسْتِقْبَالِيَّةٌ شَمِّيَّة **olfactory receptor cells**

انظر تحت olfactory cells .

خَلِيَّةٌ عَظْمِيَّة **osseous cell**

خَلِيَّةٌ مُوَلِّدَةٌ للعَظْم **osteogenic cell**

الخَلِيَّةُ سَلِيْفَةُ العَظْمِيَّة **osteoprogenitor cell**

خلايا لا متمايزة نسبياً توجد في أو قرب كافة سطوح العظم الحرة التي تتعرض تحت ظروف معينة للانقسام وتتحول إلى أرومات عظمية أو تلتحم لتنشأ ناقضة العظم .

خَلاَيا شَبِيهَةٌ بعَيْن البومَة **owl's eye cells**

(خلايا ظهارية كلوية غير محرشفة)

خلايا ظهارية متوسفة كلوية .

خَلاَيا مُفْرِزَةٌ للحَمْض **oxyntic cells**

(= خَلاَيا جداريَّة) **(=parietal cells)**

انظر تحت parietal cells .

خَلاَيا حَمضَة **oxyphil cells**

1 ـ خلايا أليفة الأحماض توجد مع الخلايا الرئيسية المتعددة في الغدد الدريقية ، تتزايد أعدادها مع التقدم في السن ، وتملك نوى داكنة صغيرة وهيولى حبيبي دقيق غزير ، وتحتوي على عدد كبير من المتقدرات مقارنة بالخلايا الرئيسية .

خَلَايا رَصَفيَّة **pavement cells**

تلك الخلايا المسطحة التي تؤلف الظهارة الرصيفية .

خَلَايا مُسَوَّقَة **pediculated cells**

(خلايا ذات سويقات)

خَلَايا وَتَديَّة **peg cells**

(= خَلَايا مُقْحَمَة) **(=intercalary cells)**

انظر تحت intercalary cells .

خَلَايا هَضْميَّة **peptic cells**

اسم يمنح أحياناً إلى الخلايا الرئيسية في المعدة .

الخَلَايا المُحيْطَةُ بالغار **periantral cells**

الخَلَايا المُحَيْطَةَ بالشُّعَيْرَات **pericapillary cells**

انظر تحتَ pericyte .


الخَلَايا المُحيْطَةُ بالخَلَايا **pericellular cells**

خلايا عصَبية في بصيلة الشم ذات وصلات تشابكية مع كبيبات ويعتقد أنها تعمل كخلايا مثبطة .

خَلَايا ضامَّةٌ للشُّعَيرات **perithelial cells**

(= خَلَايا الغلالَة البَرَّانيَّة) **(=adventitial cells)**

انظر تحت pericyte .



Paget's cells خلايا باجيت

الخَلَايا القَلوصَةُ المُحيْطَةَ بالنُّبَيْبَات **peritubular contractile cells**

هيَ خلايا شبه عضَلية .

الخَلَايا المُجاوِرَةُ للجُرَيب **parafollicular cells**

(في الغدة الدرقية)

خلايا بيضاوية الشكل ذات نواة غير منتظمة والكثير من الحبيبات الهيولية القهوية السوداء ، تقع في الظهارة الجريبية وفي الفراغات بين الجريبات مع الخلايا الرئيسية للجريبات الدرقية ، والتي تصنع هرمون الكالسيتونين . وهي تنشأ أثناء الحياة الجنينية من الجيبات البلعومية الخامسة وتتحد أو تندمج مع الغدة الدرقية للثديات ، ولكن تكون كتل خلايا ظهارية منفصلة (الخلايا التالية للخيشومية) في الفقاريات تحت الثديية وتسمى أيضاً (Light cells) .

الخَلَايا المُجاوِرَةُ للجسْم الأصْفَر **paraluteal cells**

انظر تحت theca-lutein cells .

الخَلَايا المُجاورَةُ للجسْم الأصْفَر **paralutein cells**

انظر تحت theca-lutein cells .

خَلَايا مَتْنيَّةٌ كَبديَّة **parenchymal hepatic cells**

انظر تحت hepatic cells .

خَلَايا مَتْنيَّةٌ كبديَّة **parenchymal liver cells**

انظر تحت hepatic cells .

خَليَّةٌ والديَّة **parent cell**

انظر تحتَ mother cell .

خَلَايا جداريَّة **parietal cells**

خلايا كروية أو هرمية الشكل كبيرة تكون مصدر حمض هيدروكلوريك المعدي وموقع لانتاج العامل الداخلي ، وتوجد متفرقة بطول الغدد المعدية ، وتكون أطرافها المستدقة مدفوعة بين الخلايا الرئيسية ، تسمى أيضاً (Acid cells) ، (Border cells) ، (Heidenenhain's cells) .

خَلَايا مَرَضيَّة **pathologic cell**

أي خلية تنتج من عملية مرضية أو تعود إلى أو تنشأ من مرض مكروبي .

الغشاء القاعدي متباعدة على نحو واسع لتكون نفق (نفق داخلي أو قناة كورتي) والتي تمتد على طول القوقعة ، تسمى كذلك نبابيت كورتي .

خَلِيَّةٌ صَنَوبَرِيَّة **pineal cell**

انْظر تحت pinealocyte .

خَلِيَّةٌ بلازمية **plasma cell**

(=plasmocyte)

خلية متمايزة انتهائياً في سلالة الخلية اللمفية البائية ، والتي تنتج الأضداد والخلايا البلازمية ، والتي تكون بيضاوية أو مستديرة امتداد مع الشبكة الهيولية الباطنة الخشنة ، وجهاز جولجي مكتمل النمو ، ونواة مستديرة لها كروماتين مغاير مميز على شكل عجلة ، وتسمى أيضاً (Plasmacyte) .

خَلايَا هَوائِيَّة **pneumatic cells**

(في عظم الصخرة)

(=air cells)

انظر تحت air cell .

خَلايَا قُطْبِيَّة **polar cells**

(= **الأَجْسامُ القُطْبِيَّة**) **(=polar bodies)**

انظر تحت polar bodies .

خَلايَا مُوَسَّدَةٌ قُطْبِيَّة **polar cushion cells**

(= **الخَلايَا المُجاوِرَةُ للكُبَيبَة**) **(=juxtaglomerular cells)**

خلايا عضلية لينة متخصصة ، تقع في الغلالة الوسطى في الشرينات الكبيبة الواردة ، وتحتوي على حبيبات إفرازية ، وتمثل المكون البنيوي الرئيسي المسؤول عن إفراز الرينين ، وتلعب دور رئيسي في التنظيم الذاتي الكلوي .

خَلايَا مُتَعَدِّدَةُ التَّلَوُّن **polychromatic cells**

كريات حمراء غير ناضجة تتلون بكل من الصبغات الحامضية والقاعدية بحيث يكون لونها مزيج من الأزرق الرمادي والقرنفلي .

خَلايَا مُتَعَدِّدَةُ التَّلَوُّن **polychromatophil cells**

انظر تحت polychromatic .

الخَلايَا المُحيْطَةَ بالأَوْعيَة **perivascular cells**

هي خلية محيطية .

انظر تحت pericyte .

خَلِيَّةٌ فَرْزَجِيَّة (خَلِيَّةٌ حَلَقِيَّة) **pessary cell**

كَرية حمراء نَاقصةَ الصباغ ، ويتواجد الهيموجلوبين بها في حافة محيطة ، وتسمى أيضاً (Pessary corpuscle) .

خَلايَا سُلامِيَّة **phalangeal cells**

خلايا داعمَة مستطيلة في عضو كورتي مع قواعد تستند على الغشاء القاعدي الملاصق للخلايا العمادية ، وتكون الخلايا الغائرة منها مرتبة في صف على السطح الداخلي للخلايا العمادية الباطنة ، وتحيط بخلايا الشعر الداخلية ، والخلايا الخارجية منها (خلايا دايترز) تدعم خلايا الشعر الخارجية .

خَلايَا مُسْتَقْتِمَة **pheochrome cells**

هي خلايا أَليفة الكروم .

انظر تحت chromaffin cells .

خَلايَا ذاتِيَّةُ التَّغَذِّيَ ضَوئِيًّا (خَلايَا نَباتِيَّةٌ خَضْراء) **photoautotrophic cells**

هي خلايا النبَات الخضراء .

خَلايَا مُسْتَقْبِلَةٌ للضَّوء **photoreceptor cells**

هي الخلية البصرية .

انظر تحت visual cells .

خَلايَا قَوقَعِيَّة **physaliferous cells**

(في الورَم الحبلي)

خلايا نووية كروية الشكل ، تحتوي على الجليكوجين أو الموسين ، والذي يجعلها تبدو ذو فجوات ، وتكون مميزة للورم الحبلي .

خَلايَا بيك **Pick's cells**

انظر تحت Niemann-pick .

خَلِيَّةٌ صباغِيَّة **pigment cell**

أَي خليَة تحتوي على حبيبات مصطبغة .

خَلِيَّةٌ عمادِيَّة **pillar cells**

خَلايا داعمة مستطيلة في صف مزدوج (خلايا عمادية داخلية وخارجية) في عضو كورتي ، تكون رؤوسها متصلة ، وتستند قواعدها على

خلايا صغيرة ، أحادية النواة في الجنين ، تنتج من الطبقة الإنتاشية الوسطى ، وتعطي خلايا جوالة للجسم .

خَلايَا مُنْتشةٌ بَدْئيَّة **primordial germ cells**
هي خليَة إنتاشيَة باكرة ، تنشأ توجد عادة خارج الغدة التناسلية ، ولكنها تغادر مبكراً خلال التطور الجنيني إلى الغدد التناسلية .

خَلايَا رَئيسيَّة **principal cells**
1 ـ انظر تحَت chief cells .
2 ـ الخلايا الأساسية للعضو ، والتي تملك وظيفة محددة عادة .
3 ـ خلايا خفيفة التلوين في النبيبات الجامعة الكلوية ، والتي تنقل الماء في استجابة للهرمون المضاد لإدرار البول والصوديوم في استجابة لهرمون الألدوستيرون .

خَلَيَّةٌ بدائيَّةُ النَّواة **prokaryotic cell**
خَلية دوَن نواة حقيقية .
انظر تحت prokaryote .

خَلَيَّةُ البرولاكتين **prolactin cell**
(= الخَلَيَّةُ المُوَجِّهَةُ الثَّدْي) **(=mammotroph)**
انظر تحَت lactotroph .

خَلايَا مسْبَاريَّة **prop cells**
(= خَلايَا بُرْكينْيي) **(=Purkinje's cells)**
عصبونات فيَ الطبقة الوسطى لقشرة المخيخ .

خَلايَا نَفْسيَّة **psychic cells**
(= خَلاَيَا قشْرَة المُخ)
خلايا في قَشرة المخ لها وظيفة نفسية .

خَلاَيَا رئَويَّةٌ ظهارَيَّة **pulmonary epithelial cells**
هيَ الخَلايا الظهارية الرئوية .
انظر تحت alveolar epithelial cells .

خَلاَيَا لُبِّيَّة (في الطّحال) **pulpar cells**
الخلايا النمطَية في مادة الطحال .

خَلايَا بُورْكينْيي **Purkinje's cells**
(عصبوناَتَ في الطبقة الوسطى لقشرة المخيخ)
1 ـ عصبونات كبيرة في قشرة المخيخ والتي لها

خَلاَيَا مُتَعَدِّدَةُ السُّطوح **polyhedral cells**
خلية تكون لها جوانب عدة في الشكل .

خَلَيَّةٌ مُتَعَدِّدَةُ البِنْيات **polyplastic cell**
خَلية تتكون منَ عناصر بنائية مختلفة ، وكذلك هي الخلية التي تمر عبر تعديلات شكلية مختلفة .

خَلَيَّةٌ عقْديَّةٌ عَديدَةُ التَّشابُكات **polysynaptic ganglion cell**

خَلَيَّةٌ تاليَةٌ للتَّفتُّل **postmitotic cell**

سَلاَئفُ الخَلايَا بيتا **pre-beta cells**
(= سَلائفُ اللِّمْفاويَّات بيتا) **(=pre beta-lymphocytes)**
السلائف المستعرفة الأولى للخلايا اللمفية البائية ، وهي خلايا كبيرة ، سريعة الانقسام ، توجد في كبد الجنين والنخاع العظمي في البالغين ، والتي ينقصها الجلوبولين المناعي السطحي ، ولكنها تحتوي جلوبولين مناعي هيولي منتشر من نوع الجلوبولين المناعي M (IgM) .

الخَلايَا السَّابقَةُ للجُرَيبات **prefollicle cells**
خلايا محَفظة للخلايا الإنتاشية في مبيض الجنين ، وتسمى أيضاً (Primitive cells) .

خَلَيَّةٌ حَمْليَّة (في النُّخاميَّة) **pregnancy cell**
خَلية كارَهة لَلون متبدَلة توجد في النخامية الغدة في المرأة الحامل .

الخَليَّةُ السَّليْفَةُ للحُبَيبيَّة **pregranulosa cell**

خَلَيَّةٌ شائكَة **prickle cell**
خَلية ذاَت نتوءات (نواتئ) متشعبة دقيقة تتصل مع خلايا مماثلة ، يستعمل الاسم كتطبيق على الخلية الكيراتينية المنقسمة الموجودة في الطبقة المنتشة للبشرة ، تسمى أيضاً (Heckle cell) .

خَلَيَّةٌ أوَّليَّة **primary cell**
خَلية القوة المحركة الكهربائية غير القابلة للعكس (غير قابلة لإعادة الشحن) .

خَلَيَّةٌ بدائيَّةٌ حُبَيبيَّة **primitive granulosa cell**

خَلَيَّةٌ بَدائيَّةٌ شبَكيَّة **primitive reticular cell**

خَلَيَّةٌ بَدائيَّةٌ جوَّالَة **primitive wandering cell**

مزدوج التلون كثير ، وتحتوي على نوويات بارزة . ويكون وجود الخلايا هو المميز النسيجي (الهيستولوجي) لمرض هودجكين . وتسمى أيضاً (Dorothy Reed cells) .

خَلاَيا رِينْشُو **Renshaw cells**
(في القسم البطني الإنسي للنخاع)
عصبونات متوسطة في المنطقة البطنية الإنسية في الحبل النخاعي ، والذي يصنع وصلات مثبطة مع العصبونات الحركية .

خَلاَيا احْتياطيَّة **reserve cells**
خلايا الطَبقَة القاعدية أو الإنتاشية في الظهارة القصبية .

خَلِيَّةٌ إقامِيَّة **residential cell**
خَلايا لا تتجول ، خاصة هي إحدى خلايا المادة المخصوصة في القرنية .

خَلِيَّةٌ مُسْتَرِيحَة **resting cell**
خَلية لا تخضع للحرائك النووية .

خَلِيَّةٌ مُسْتَرِيحَةٌ جَوَّالَة **resting wandering cell**
خَلية بلعمِية ثابتة .

خَلاَيا شَبَكِيَّة **reticular cells**
الخلايا التَي تكون الألياف الشبكية في الأنسجة الضامة ، وتلك التي تشكل الهيكل للعقد اللمفية ، ونقي العظام والطحال ، والتي تكون جزء من الجملة الشبكية البطانية ، وقد تتمايز تحت الإثارة الملائمة إلى بلاعم كبيرة .

خَلِيَّةٌ شَبَكِيَّةٌ بطانِيَّة **reticuloendothelial cell**
أيّ من الخلايا في الجملة الشبكية البطانية ، والتي تشمل العقد اللمفية ونقي العظام والطحال ، . . . إلخ . .

خَلِيَّةٌ شَبَكِيَّة **reticulum cell**
(=reticular cell)
انظر تحت reticular cell .

بَلْعَم **rhagiocrine cell**
(=macrophage)
انظر تحت macrophage .

خَلِيَّةُ رِيدَر **Rieder's cell**
(أرومة نقوية في الابيضاضات الحادة)
خلايا كمثرية الشكل في طبقة بوركينيي (الطبقة البوركينيية المخيخية) وشجرات تغصنية متفرعة والتي تعبر خلال الطبقة الخارجية (الجزيئية) تجاه السطح .
2 ـ خلايا ألياف بوركيني في القلب والتي تكون خلايا كبيرة وصافية ومكدسة مع مواصل ثغرية كثيرة بينها ، وبذلك توصل الدافعات الكهربية سريعاً .

خَلِيَّةٌ قَيحيَّة **pus cell**
كَريات بَيضاء مفصصة النواة أغلبها العدلات وتتواجد في القيح التالي للالتهاب غالباً .

خَلِيَّةٌ هَرَمِيَّة **pyramidal cell**
إحدى الخَلايا الهرمية الشكل ، متعددة الأقطاب الكبيرة في القشرة الدماغية ، تملك تغصن قمي مفرد يمتد خارجاً نحو السطح ، وتمتد عدة تغصنات نحو الداخل ، وقليل منها تكون مقلوبة ، ولذا فإن التغصن القمي يمتد ناحية الداخل . وهي تتفاوت في الحجم من صغيرة إلى خلايا بيتز الضخمة . وتسمى أيضاً (Pyramidal neuron) .

الخَلاَيا الشُّعاعِيَّةُ لُمولَّر **radial cells of Muller**
(= أَلْيافُ مُولِّر) **(=Muller's fibers)**
انظر تحت Muller's fibers .

كُرَيَّةُ الدَّمِ الحَمْراء **red blood cell**
كريات الدم الحمراء المتبقية للدم الكامل بعد إزالة كل البلازما ، تستخدم علاجياً في نقل الدم ، تسمى أيضاً (Packed Red blood cells) .

كُرَيَّةٌ حَمْراء **red cell**
انظر تحت erythroyte .

خَلاَيا رِيد (في داء هودجكين) **Reed cells**
انظر تحت Reed-sternberg cells .

خَلاَيا رِيد شتيرنبيرْج **Reed-Sternberg cells**
(في داء هودجكين)
خلايا منسجية ضخمة ، عادة ما تكون متعددة النوى ، في أغلب الأحيان تكون ثنائية النواة مع نصفي الخلية ، لتبدو مثل صور مرآة لكل واحدة منهما ، وتكون النواة محصورة داخل هيولى

2ـ خلايا معوية صماوية توجد في الغالب في الإثنا عشري ، والتي تملك حبيبات هيولى تخزن وتفرز السيكريتين . تسمى أيضاً (Small granule cells) .

خَلاَيا سالا **Sala's cells**

(في نهايات الأعصاب الحسية في التأمور)

خلايا نجمية الشكل في النسيج الضام في الألياف التي تكون نهايات العصب الحسي الكائنة في التأمور .

خَلاَيا مُوَلِّدَةٌ للعَضَل **sarcogenic cells**

خلايا تتطور إلى ألياف عضلية .

خَلاَيا ساتلَة **satellite cells**

1 ـ خلايَا دبقية والتي تتجمع مثل العنقود حول العصبون .

2ـ نوى حرة والتي تتجمع حول الخلايا في أمراض معينة .

3ـ خلايا مستطيلة والتي تترافق بشكل خاص مع ألياف العضلات ، وهي إما أن تكون مسطحة بخلاف الليف أو يشغل منخفضات ضحلة في سطحها .

خَلِيَّةٌ كاسِحَة **scavenger cell**

(=phagocyte)


الخلية التي تمتص وتزيل المنتجات المهيجة .

خَلاَيا شُولتز **Schultze's cells**

(= خَلاَيا شَمِّيَّة) **(=olfactory cells)**

تسمى أيضاً الخلايا الشمية .

انظر تحت olfactory cells .



Reticular cells خلايا شبكية

أرومة نقوية ترى في نوع من الابيضاض النقوي الحاد (ابيضاض خلايا ريدر) ، ابيضاض اللمفاويات المزمن ، وهي تملك نواة ذات تسنن عميق وواسع والتي تشير إلى فقد التزامن في النضج الهيولي والنووي ، وتسمى أيضاً (Rieder's lymphocyte) .

خَلاَيا نَبُّوتِيَّة **rod cells**

1ـ انظر تحت retinal rods .

2ـ دبيقيات تلاحظ في الأمراض المزمنة في قشرة المخ وفي الخرف الشللي ، الذي تكون فيه الخلايا موهنة بشكل ملحوظ في الشكل ، وتنحصر النواتىء الخاصة بها غالباً في النهايتين الطرفيتين .

3ـ انظر تحت littoral cells .

خَلِيَّةُ روهُون بيرد **Rohon-Beard cell**

(خلية عملاقة في نخاع بعض الفقاريات)

خلايا العقدة الضخمة في الحبل الشوكي في بعض الفقاريات .

خَلاَيا رولانْدُو **Rolando's cells**

(في المادة الهلامية في الجملة العصبية)

الخلايا العقدية في مادة رولاندو الهلامية .

خَلاَيا جَذْرِيَّة **root cells**

(في الجملَة العصبية المركزية)

عصبونات تكون محوارها من الجذور العصبية .

خَلاَيا روجيه **Rouget cells**

(=خَلاَيا حَوْلية) **(=pericyte)**

(خلايا قلوصة تحيط بالأوعية)

انظر تحت pericyte .

خَلِيَّةٌ مُدَوَّرَة **round cell**

أيّ خلية تملك شكلاً كروياً ، وخاصة اللمفاويات (Lymphocytes) .

خَلاَيا S **S cells**

(في الفص الأمامي للنخامية غنية بالكبريت والسيستين)

1ـ خلايا شبه المخاط في النخامية الغدية التي تحتوي على بروتين غني بحمض السيستئين .

خَلاَيا سيرْتولي **Sertoli's cells**

(الخلايا الحَاضنة لأرومات النطاف)

خـلايا مـسـتطيلة الشكـل في النـبـيـبـات النـاقلة للمني ، ترتـبط إليـهـا أرومة النطفـة ، وهي توفـر الدعم والحـمـاية والتـغذية إلى أن تتـحول أورمة النطفـة إلى الحي المنوي ناضـجة ، وتـسمى أيضـاً (Sustentacular cells) .

خَلاَيا جنْسيَّة **sexual cells**

(= خَلاَيَا مُنْتشَةٌ) **(=germ cells)**

انظر تحت germ cells .

خَلِيَّةٌ سيزاري **Sézary cell**

(لمفاوية تَائيَّةٌ ترتشح بالجلد في اللمفومة)

خلية وحـيَـدة النواة غيـر سـوية ، مع نواة تكون غربـالية الشكل ملتفة مفـرط الانصبـاغ ، وحـافة ضـيـقـة من الهـيـولى التي ربما تحـتـوي على فـجـوات ، تظهـر في أنواع متـفـاوتة من الخـلايا الصغيرة والكبيـرة ، وهي من الموجودات المميزة في لمفـوية الخـلايا التـائيــة الجلدية وأنواعـهــا المتفاوتة .

خَلِيَّةٌ ظلِّيَّة **shadow cell**

(= خَلِيَّةٌ شَبَحيَّة) **(=ghost cell)**

انظر تَحت ghost cell .

خَلِيَّةٌ منْجَليَّة **sickle cell**

(=كُرَيَّةٌ مَنْجَليَّة)

كـرية حـمَـراءَ تـتـشكل مـثل المنجل أو الهـلال بسـبب وجـود الهـيمـوجلوبين S ، ترى في فقر الدم المنجلي وأمراض الخلية المنجلية الأخرى .

تسمى أيضاً (Drepanocyte) .

خَلِيَّةٌ خَتْميَّة **signet-ring cell**

خَليـة تكَون الـنواة فيـهـا منضـغطة إلى إحـدى جوانبها بسبب تراكم الموسين داخل الهيولى .

انظر تحت Krukenberg's Tumor .

خَلاَيا فضيَّة **silver cells**

خَلِيَّةٌ خُصْليَّة **skein cell**

(= خَلِيَّةٌ شَبَكيَّة) **(=reticulocyte)**

انظر تَحت reticulocyte .

خَلِيَّةٌ مُهَيْكلَة **skeletogenous cell**

خَلِيَّةٌ شُفان **Schwann's cell**

(خَلية مغمدة للألياف العصبية)

أي من الخـلايا المنواة الكـبـيـرة ، والتي تغلف أغـشيـتـها الخلوية حـلزونياً مـحوار العـصبونات المحيطـية الميالـينيـة وهـي مـصـدر الميـالين . تمد خليـة شفـان المفـردة الغـمـد الميالـيني بين عقـدتي رانفيـيه .

خَلاَيا النَّسيج الدَّاعم **sclerenchyma cells**

خلايا خشبيَّة متراصَة سميكة الجدار عادة تكون ميتة ، والتي تكون النسيج الخشبي في النباتات .

خَلِيَّةٌ بَيْضاء مُقَطَّعَة **segmented cell**

خَلية محببة ناضجة تكون فيـها النواة مقسمة لفـصـوص مـحـددة ، مرتبطة بوصل خـيطيـة لتمييزها عن الخلية المأطورة .

خَلاَيا مَنَويَّة **seminal cells**

خلايا ظهَارية في النبيبات المنوية .

خَلِيَّةٌ الوَرَم المَنَوي **seminoma cell**

خَلِيَّةٌ مُحَسَّسَة **sensitized cell**

1 ـ خلية تم تفعيلهامناعياً بمستضد (مبرمج) .

2 ـ خلية مغطاة بالضـد تستعمل في اختبـارات تثبيت المتممة .

خَلِيَّةٌ حسِّيَّة **sensory cell**

انظر تحت primary sensory neuron .

خَلاَيا خافرَة **sentinel cells**

(= الخَلاَيا المُجاورَةُ للكُبَيبَة) **(=juxtaglomerular cells)**

خلايا عضلية لينة متخصصة ، تقع في الغلالة الوسطى في الشرينات الكبيبة الواردة ، وتحتوي على خـلايا إفـرازية ، وهي المكون البنيـوي الرئيسي المسؤول عن إفراز الرنين ، وتلعب دور رئيسي في التنظيم الذاتي الكلوي .

خَلِيَّةٌ حاجزيَّة **septal cell**

النَوع الثانَي من الخلايا السنخية .

خَلِيَّةٌ مَصْليَّة **serous cell**

خَلية مختَصة بإفراز سائل مائي غني بالبروتين ، مثل الخلايا الإفرازية في الغدة النكفية وتسمى أيضاً (Albuminous) .

انظر تحت acanthocyte .

خَلِيَّةٌ حَرْشَفِيَّة سَنْخِيَّة **squamous alveolar cell**

خَلِيَّةٌ حَرْشَفِيَّة **squamous cell**

خلية ظهارية قشرية الشكل مسطحة .

كُرَيَّةٌ بَيْضَاءُ مَأْطُورَة **stab cell**

(=band cell)

انظر تحت band cell .

كُرَيَّةٌ بَيْضَاءُ مَأْطورَة **staff cell**

(=band cell)

خَلاَيا نَجْمِيَّة **star cells**

خلايا بها فراغات كبيرة بالهيولى وبها جسور هيولية ترى في الورم الأورمي الميناني .

خَلاَيا مُبَطِّنَة **stave cells**

(=lining cells)

انظر تحت littoral cells .

خَلِيَّةٌ نَجْمِيَّة **stellate cell**

أيّ خلية تملك مظهر يشبه النجمة ، تملك نواتئ عديدة تمتد في اتجاهات مختلفة ، مثل خلايا «كوبفر» في الكبد ، وخلايا نجمية وحبيبية في الطبقات المتحببة في القشرة المخيخية والمخية .

خَلاَيا الكَبِد النَّجْمِيَّة **stellate cells of liver**

خَلِيَّةٌ جِذْعِيَّة **stem cell**

1 ـ أيّ خلية سلفية .

2 ـ خلية دم سلفية أو خلية أم تمثل مرحلة متأخرة قليلاً من الخلية الأرومية ، وهي تملك القدرة على التكرار والتمايز معاً ، وتملك خاصية تعدد الكوامن ، تنشأ عنها سلائف خطوط خلايا الدم المختلفة المتعددة ، مثل سليفة الخلايا الحمراء الأرومة النقوية والتي لا تستطيع تكرار نفسها ويجب أن تتمايز إلى خلايا وليدة أكثر نضوجاً ، وتسمى أيضاً (Colony-forming Unit spleen) ، (Homatopoietic stem cell) . (Pregenitor cell)

خَلاَيا شتيرنْبرْج ريد **Sternberg-Reed cells**

(في داء هودجكين)

انظر تحت Reed-Sternberg cells .

(=خَلِيَّةٌ بَانِيَةٌ للعظام) **(=osteoblast)**

انظر تحت osteoblast .

خَلاَيا صَغِيرَةُ الحُبَيْبات **small granule cells**

انظر تحت S cells .

الخَلِيَّةُ العَضَلِيَّةُ المَلْساء **smooth muscle cell**

خَلاَيا لَطْخِيَّة **smudge cells**

كرية بيضاء معطلة أو ممزقة تظهر خلال إعداد لطاخة الدم المحيطي .

خَلاَيا جَسَدِيَّة **somatic cells**

جبلة الخلية الجسدية ، وهي خلايا جسمية غير متمايزة .

خَلاَيا المُوَجِّهَة الجَسَدِيَّة **somatotropic cells**

(=somatotrophs)

انظر تحت somatotroph .

خَلِيَّةٌ نُطْفِيَّة **sperm cell**

انظر تحت spermatozoon .

خَلاَيا مُوَلِّدَةٌ للنُّطاف **spermatogenic cells**

خلية تنتج النطاف المنوية ، وتسمى أيضاً (Androgone) .

بِزْرَةُ النُّطْفَة **spermatogonial cell**

(=spermatogonium)

انظر تحت spermatogonium .

خَلاَيا وَتَدِيَّة **sphenoid cells**

انظر تحت sinus sphenoidalis .

خَلِيَّةٌ عَنْكَبوتِيَّة **spider cell**

1 ـ انظر تحت astrocyte .

2 ـ خلية تحدث في الساركومة العضلية المخططة ، ونواتها تحيط بها حافة ضيقة من الهيولى ، تقع فيما يقال عنه التجويف الواسع ، مع نواتئ تشبه الخيط تتشعب إلى جدار الخلية الخارجي .

خَلِيَّةٌ مِغْزَلِيَّة **spindle cell**

خلية في شكل المغزل ، وتسمى أيضاً (Fusiform cell) .

خَلِيَّةٌ حَشَوِيَّة **splanchnic cell**

خَلِيَّةٌ طِحالِيَّة **splenic cell**

كُرَيَّةٌ حَمْرَاءُ مِهْمازِيَّة **spur cell**

مجموعات وتتصل بحزم ألياف عصبية لاميالينية في نقير المبيض .

خَلَايا وُدِّيَّةٌ أَلِيفَةٌ للكروم **sympathochromaffin cells**

خلايا مستديرة صغيرة في الغدة الكظرية الجنينية ، وهي طليعة الخلايا الودية والنخاعية .

خَلِيَّةٌ مَخْلَوِيَّة **syncytial cell**

خَلية يتمادَى الهيولى فيها مع الخلية الملاصقة .

خَلَايا زَلِيلِيَّة **synovial cells**

أرومة ليفَية تقع بين الألياف الغضروفية في الغشاء الزليلي في المفاصل .

خَلَايا تائِيَّة **T cells**

(= لُمْفاوِيَّاتٌ تَائِيَّة) **(=T-lymphocytes)**

خلايا لمفَية نوع T .

انظر تحت lymphocyte .

خَلِيَّةٌ لَمْسِيَّة **tactile cell**

1ـ انظرَ تحت corpusculum tactus .

2ـ خلية ظهارية تحوي جسيمات لمسية .

خَلَايا شُرْغوفِيَّة **tadpole cells**

(في مشيمية عين اللواحم)

خلايا ذات ذيل هيولي طويل .

1ـ كُرَيَّةٌ حَمْراءُ هَدَفِيَّةٌ **target cell**

2ـ خَلِيَّةٌ مُسْتَهْدَفَة

1ـ كَرية حمراء رقيقة إلى درجة غير عادية تظهر عند الاصطباغ مركز داكن اللون وحلقة هيموجلوبين محيطة ، يفصلها حلقة شاحبة غير مصبوغة تحتوي على هيموجلوبين أقل ، تظهر في بعض أنواع فقر الدم الخلقي والمكتسب ، الثلاسيمية ، وبعض اعتلالات هيموجلوبين الدم ، وأمراض الكبد وخاصة اليرقان الانسدادي ، والاضطرابات الأخرى ، والحالة التالية لاستئصال الطحال . وتسمى أيضاً (Leptocyte) ، (Codocyte) ، (Mexican hat cell) .

2ـ أي خلية تتأثر انتقائياً بعامل معين مثل الهرمون أو الدواء .

خَلِيَّةٌ لاقِمَة **tart cell**

خَلَايا شتيرنْبِرْج العِمْلاَقَة **Sternberg's giant cells**

(في داء هودجكين)

انظر تحت Reed-Sternberg cells .

كُرَيَّةٌ حَمْراءُ مُرَقَّطَة **stipple cell**

كرية حمراء تحوي حبيبات مختلفة الحجم والشكل تأخذ صبغة قاعدية أو زرقاء مع تلوين رايت (يتم في طفيليات الملاريا) كما في الخلايا المحبة لكثرة القعدات المنقطة .

خَلِيَّةٌ سَدَوِيَّة **stroma cell**

خَلَايا دَاعِمَةٌ (خَلَايا سانِدَة) **supporting cells**

خلايا تعَمل على توفيَر الدعم والحماية وربما تساهم في تغذية الخلايا الرئيسية أو غيرها في أجهزة معينة ، وتوجد مثل تلك الخلايا في تيه الأذن الداخلية ، وعضو كورتي ، والظهارة الشمية ، والبرعم الذوقي ، والنبيبات الناقلة للمني (خلايا سيرتولي وهي الخلايا الحاضنة لأرومات النطاق) تسمى أيضاً (Sustentacular cells) .

خَلِيَّةٌ كابِتَة **suppressor cell**

كَريات T اللمفية المتمايزة تكبح تخليق الضد أو المناعة المتواسطة بالخلايا . ويمكن أن تنشط استجابة المستضد أو محددات اختلاف الأنماط الذاتية الموجودة على الأضداد ومستقبلات مستضد الخلية (T) و (B) ، وقد تعمل إما بكبح نشاط الخلايا المساعدة أو عن طريق تثبيط تمايز اللمفاويات المنشطة إلى خلايا مستفعلة . وتتميز الخلايا الفأرية الكابتة بوجود مستضدات Ly2 و Ly3 ، والخلايا البشرية الكابتة بوجود مستضدات T5 و T8 .

خَلَايا مُعَلِّقَة **sustentacular cells**

(خَلَايا الدَّعْم)

انظر تحت supporting cells .

خَلِيَّةٌ وُدِّيَّة **sympathetic cell**

خَلَايا تَغْذَوِيَّةٌ وُدِّيَّة **sympathicotrophic cells**

(= خَلَايا نَقيرِيَّة) **(=hilus cells)**

خلايا شبيهة ظهارية كبيرة توجد في

خَلاَيا مُوَجِّهة الدَّرَقيَّة **thyrotropic cells**

انظر تحت thyrotroph .

خَلِيَّةٌ شاملَةُ الوُسْع **totipotential cell**

خَلية جَنينية تكون قادرة على النمو في أي نوع من خلايا الجسم .

خَلِيَّةٌ لَمْسيَّة **touch cell**

1ـ انظرَ تحت corpusculum tactus .

2ـ هي خلية لمس .

خَلاَيا توتون العمْلاَقَة **Touton giant cells**

خلية مجوفة كَبيرة مع نوى عديدة تحيط بحافة محيطة من الهيولى الرغوي ، تميز أمراض مثل الورم الأصفر ، والورم الحبيبي الأصفر اليفعي ، كثرة المنسجات الإكسية .

خَلِيَّةٌ انتقاليَّة **transitional cell**

1ـ خلايا تتواجد في عملية تحول من نوع إلى آخر .

2ـ في العقد الجيبية الأذينية والعقد الأذينية البطينية ، خلايا لا متغايرة صغيرة ، بطيئة التوصيل ، داخلة بين خلايا P وخلايا بوركينيي ، ويعتقد أنها تربط النبضات المحدثة بواسطة خلايا P مع بقية عضلات القلب .

خَلاَيا مُخاطِيَّةٌ مَصليَّة **trophochrome cells**

(=mucoserous cells)

خلايا مصلية تعطي حبيباتها الإفرازية تفاعل صبغي للأغشية المخاطية مع الموسيكارمين (وهو ملوِّن) ، وتسمى أيضاً (Mucoserous cells) ، (Mucoalbuminous cells) .

الخَلاَيا الهَوائِيَّةُ للنَّفير **tubal air cells**

خَلِيَّةُ تورك **Turk's cell**

(أحد أشكال الخلايا البلازمية في أمراض الدم المختلفة)

خلية غير حبيبية ووحيدة النواة تظهر خصائص مورفولوجية في كلاً من الخلية اللمفية اللانمطية والخلية البلازمية ، تلاحظ في الدم المحيطي أثناء حالات فقر الدم الوخيم ، والعداوى المزمنة ، والتفاعلات الابيضاضية الشكل ، وتسمى أيضاً (Turk's irritation leukocyte) .

خلية البلعمة أو الخلية الشبكية البطانية وحيدة النواة والتي تحتوي على نواة مبلعمة مع تركيب نووي ثابت ، والنواة المبلعمة تتميز عن تداخلات خلية الذئبة الحمامية ، تظهر شكل كروماتين ثابت ، ويكون كروماتين أكثر كثافة ويميل إلى أن يصبح مجوف وكثيراً ما يكون أصغر من ذلك الموجود في خلية الذئبة الحمامية الحقيقية .

خَلاَيا ذَوقيَّة **taste cells**

الخلايا التي تكون في البرعم الذوقي وتملك مستقبلات ذوقية ، وبذلك تكون مكتنفة في حاسة التذوق وتتعرض للتنكس والاستعاضة كل بضعة أيام . وتسمى أيضاً (Gustatory cells) .

خَلاَيا بنَفْس الجَانب **tautomeral cells**

خلايا المادةَ السنَجابية في الحبل النخاعي الذي تمر محاوره داخل المادة البيضاء في جانب الحبل نفسه .

خَلاَيا سَقيفيَّة **tegmental cells**

خلايا تغطِّي أي بناء رقيق .

خَلاَيا وَتَريَّة **tendon cells**

خلايا نسَيجية مسطحة من النسيج الرابط تكون على شكل صفوف بين الحزمات الأولية في الأوتار .

خَلاَيا قرابيَّة **theca cells**

انظر تحتَ theca-lutein cells .

خَليةٌ لُوتينيَّةٌ قرابيَّة **theca-lutein cell**

خَلايا لوتَينيةَ مشَتقة من القراب الغائر ، وتسمى أيضاً (Paraluteal or paralutein cells) .

حُجَيرَةُ العَدِّ لتُوما ـ زايس **Thoma-Zeiss counting cell**

انظر تحت chamber .

خَلاَيا اسْتئْصال الدَّرَقيَّة **thyroidectomy cells**

دراقية مَفرطة التغذيَة ، توجد الموجهة الدرقية المتضخمة في النخامية الغدية بعد استئصال الدرقية وفي حالات العوز الوخيم لهرمونات الدرقية .

المخروطات الشبكية والنبابيت الشبكية ، كل قضيب أو نبوت يملك ناتئ محواري داخلية يتشابك مع خلايا شبكية أفقية أو ثنائية القطبية واحدة أو أكثر ، وتملك جسم خلوي في طبقة النواة الخارجية ، وتملك عملية زوائد متغصنة خارجية حساسة للضوء تمتد نحو الظهارة الصبغية . وتسمى أيضاً (Photoreceptor cell) .

انظر تحت ganglion cell .

انظر تحت cone .

انظر تحت rod .

خَلاَيا فُونْ كُوبْفر **von Kupffer's cells**

(خلايا بلعمية في الكبد)

انظر تحت kupffer's cells .

خَلاَيا جَوَّالَة **wandering cell**

انظر تحت ameboid cell .

خَلاَيا وارْثن فينكيلدَي **Warthin-Finkeldey cells**

(في المَرَاحل الباكرة من الإصابة بالحصبة)

خلايا عملاقة متعددة النويات مع مشتملات داخل النواة ، ذات أصل لمفي شبكي ، تظهر في مختلف الأجهزة بما فيها العقد اللمفية ، واللوزة ، والزائدة الدودية والغدة التوتية ، تماماً قبل أو أثناء المرحلة البادرية في الحصبة .

خَلاَيا صافيَة (في الدُرَيقات) **wasserhelle cells**

(=clear cell of parathyroid gland)

خلية صافية كالماء ، وهي خلية كبيرة صافية توجد في الغدد الدريقية ، وهذه الخلايا ذات مظهر بالوني وتكون متعددة في الورم الغدي .

خَلاَيا صافيَة (في الدُرَيقات) **water-clear cells**

خَلاَيا ويدْل **Wedl cells**

(في العَدسة المصابة بالساد)

خلايا كبيرة منتفخة (خلايا مثانية) تكونها الظهارة المحفظية في تطور الساد .

كُرَيَّةٌ دَم بَيضاء **white blood cell**

انظر تحت leukocyte .

الخَلاَيا الطَّبْلِيَّة **tympanic cells**

انظر تحت cellulae tympanicae .

الخَلاَيا السِّنْخيَّةُ منَ النَّمَط الأوَّل **type I cells**

انظر تحت alveolar cells , type I .

الخَلاَيا السِّنْخيَّةُ منَ النَّمَط الثَّاني **type II cells**

انظر تحت alveolar cells , type II .

خَلِيَّةٌ تساَنْك (في الفُقاع) **Tzanck cell**

خَلية ظهارية متنكسة تظهر بسبب انحلال الأشواك ، وتوجد خاصة في الفقاع .

الخلايا التَّاليَةُ للخَيْشُوميَّة **ultimobranchial cells**

(=الخَلاَيا المُجَاوِرَةُ للجُرَيب) **(=parafollicular cells)**

انظر تحت parafollicular cells .

خَلِيَّةٌ غَير مُمَيَّزَة **undifferentiated cell**

خَلِيَّةٌ فَجوِيَّة **vacuolated cell**

خَلية تحوي الجبلة المحتوية على فجوات .

خَلاَيا مكَوِّنَةٌ للأوعيَة **vasofactive cells**

(=vasoformative cells)

خلية منشطة لتكوين الأوعية .

خَلاَيا مكَوِّنَةٌ للأوعيَة **vasoformative cells**

انظر تحت vasofactice cells .

خَلِيَّةٌ نابتَة **vegetative cell**

خَلِيَّةٌ بُطَينيَّة **ventricular cell**

أي من الخلايا الظهارية العمودية في الأنبوب العصبي .

خَلِيَّةٌ مُشعَّرَةٌ دهليزيَّة **vestibular hair cell**

خَلاَيا فينيال **Vignal's cells**

(خلايا مَغمدة للأعصاب المحيطية)


خلايا النسيج الضام الجنيني التي تفرز الميالين وتترافق مع تكوين محوار العصب في الجنين .

خَلاَيا فيرخوف (خلية جذامية) **Virchow cells**

انظر تحت lepra cell .

خَلاَيا إبْصاريَّة **visual cells**

ذلك الجزء الظهاري العصبي مستقبل الضوء في الشبكة ، العصبونات الأول في الرباط الرأسي في الشبكية ، تتألف من نوعين من الخلايا :



Von kupffer's cells خلايا فون كوبفر

white cell **كُرَيَّةٌ بَيضاء**
انظر تحت leukocyte .

wing cells **خَلاَيَا جَناحيَّة**
خلايا في الظهارة القرنية مع سطوح أمامية محدبة وسطوح خلفية مقعرة .

xanthoma cell **خَلِيَّةُ الوَرَمِ الأَصْفَر**
(=foam cell) **(=خَلِيَّةٌ رَغْوِيَّة)**
خلايا رغوية .
انظر تحت foam cell .

Zander's cells **خَلاَيَا زاندر**
(=bladder cells) **(=خَلاَيَا مُنْتَبِجَة)**
(في أصابع الجنين)
انظر تحت bladder cell .

zygomatic cell **خَلِيَّةٌ وَجْنِيَّة**

zymogenic cells **خَلاَيَا مُفْرَزَةٌ للخَمَائر**
(=chief cells) **(= خَلاَيَا رَئِيسِيَّة)**

cella TA (pl.cellae) **خَلِيَّة (ج: خلايا)**
انظر تحت cell .

cellaburate **سيلابورات (كيمياء)**

cellae **خَلاَيا**
(sing.cella) **(ف: خَلِيَّة)**
انظر تحت cell .

cell-free **خِلوٌ مِنَ الخَلاَيا**

cellicolous **مُستوطِنُ الخَلاَيا**
سكن الخلايا .

celliferous **مُوَلِّدٌ أو حامِلٌ للخَلاَيا**

الخَلاَيَا الغِرْباليَّة **cellulae ethmoidales TA**

اسم جامع لنوع من الجيوب جنب الأنفية ، والتي توجد في مجموعات داخل العظم الغربالي وتتصل مع القمع الغربالي والفقاعة الصماخ العلوي والأعلى . وعادة ما تكون مقسمة فرعياً إلى أمامية ووسطى وخلفية ، وتسمى وفق تموضعها بالفتحات الموجهة بالصماخ الأنفي . تسمى أيضاً الجيوب الغربالية .

الخَلاَيَا الخُشَّائيَّة **cellulae mastoideae TA**

الخلايا الهوائية للناتئ الخشائي بالعظم الصدغي .

الخَلاَيَا الهَوائيَّةُ للنَّفير السَّمْعيّ **cellulae pneumaticae tubae auditivae TA**

خلايا هوائية في قاع القناة السمعية القريبة من النفق السباتي وتكون مشابهة للخلايا الهوائية للجزء الخشائي في العظم الصدغي ، وتسمى خلايا هوائية قناتية وخلايا هوائية سمعية .

الخَلاَيَا الهَوائيَّةُ للنَّفير **cellulae pneumaticae tubariae**

فراغات في التجويف الطبلي بين النتوءات العظمية من الأرضية أو الجدار الوادجي .

الخَلاَيَا الطَّبْليَّة **cellulae tympanicae**

خلايا طبلية أو مساحات في الفجوة الطبلية بين النتوءات العظمية من القاع أو الجدار الوادجي.

خَلاَيا **cellulae TA**

(ف:خلية) **(sing.cellula)**

جمع خلية .

انظر تحت cellula .

خَلَويّ **cellular**

تعود إلى ، أو تتألف من خلايا .

ملاَطٌ خَلَوِيّ **cellular cementum**

الخَلَويَّة **cellularity**

حالة النسيج أو الكتلة في ما يتعلق بعدد الخلايا المكونة (المقومة) .

سِلُولاَز (إنزيم) **cellulase**

إنزيم من فئة الهيدرولازو الذي يحفز الرابطة ينتج أو يحمل الخلايا .

خَلَويُّ الشَّكل **celliform**

انظر تحت cellulifugal .

مُبْتَعِدٌ عن الخَلِيَّة **cellifugal**

صادر من الخلية العصبية .

مُتَّجِهٌ نَحْوَ الخَلِيَّة **cellipetal**

وارد نحو الخلية العصبية .

انظر تحت cellulipetal .

سِيلُوبياز **cellobiase**

سِيلُوبيوز **cellobiose**

سِيلُوهِكسُوز **cellohexose**

سِيلُويدين **celloidin**

مستحضر مركز من البيروكسيلين (نتروسايلوز أو قطن البارود) ، يستعمل في التصوير المجهري لعينات الإسجاء لعمل قطع مقطعي .

سِيلُوفان (في الصناعات الطبية) **cellophane**

نسيج شفاف من تنكس سلولوزي ، والذي يستخدم كغشاء الديال وللعصائب والرقادة . . إلخ .

سلوز **cellose**

(= سِيلُوبيُوز) **(=cellobiose)**

ثنائي الكاريد ، يمتلك جزئين من الجلوكوز مرتبطين بالرابطة (1,4) - β وتكون الوحدة الأساسية المتكررة في السلولوز ، وتنتج من الحلمهة الجزيئية لعديد السكاريد .

سِيلُوتِترُوز **cellotetrose**

سِيلُوتريُوز **cellotriose**

خَلَويٌّ جِلدِيّ **cellucutaneous**

خَلِيَّة **cellula TA**

(ج: خلايا) **(pl.cellulae)**

1 ـ أي كتلة صغيرة تكون نسيج منظم ، وتتكون من نواة محاطة بسائل هيولى يحوي العضيات المختلفة داخل الخلية بواسطة الغشاء البلازمي ، الخلية هي الوحدة التركيبية والوظيفية الأساسية للكائن الحي .

2 ـ في علم الأنسجة ، الخلية

انظر تحت cell .

خاصة ذلك الذي تسببه المطثيات الحاطمة ، وتنتج عادة في الأنسجة المتموتة وفي الجروح الملوثة أو في الأنسجة منقوصة المناعة . ويتميز بنجيج كريه الرائحة ، وتكون غازي واسع الانتشار ، له فرقعة التصلد ، وتكون الحالة الإكلينيكية أقل حدة نسبياً مما هي في حالات الغرغرينة الغازية .

اَلْتِهابُ الهَلَل السَّالخ **dissecting cellulitis**

اَلْتهاب نسيجَي خلوي سالخ .

اَلْتِهابُ هَلَل الفَرْوَة السَّالخ **dissecting cellulitis of scalp**

التهابَ نسيجي خلوي سالخ في فروة الرأس .

انظر تحت preifolliculitis capitis abscedens et suffodiens .

اَلْتِهابُ الهَلَل الإصْبَعي **finger cellulitis**

هو الدحاس .

انظر تحت felon

اَلْتِهابُ الهَلَل الغنغرينيّ **gangrenous cellulitis**

1 ـ نخز لفافيَ .

2 ـ التهاب جلدي ناخر .

اَلْتِهابُ الهَلَل الغازيّ **gaseous cellulitis**

اَلْتِهابُ الهَلَلَ الجاسَيء **indurated cellulitis**

تَصلب جاسيءبنَي لجلد الساق السفلي ، ويكون مؤلم ومعيق للحركة أحياناً ، ويتسبب عن طريق التهاب منخفض الدرجة يترافق مع قصور وريدي مزمن (المتلازمة التالية لالتهاب الوريد) ، يظهر في أغلب الأحيان داينا من الكعب الباطن لكن يمكن أن يؤثر في مناطق أخرى وحتى في كل محيط الساق ، ويسمى أيضاً (Phlebitic Induration) .

اَلْتِهابُ الهَلَل الإسْكيّ المُسْتَقيميّ **ischiorectal cellulitis**

اَلْتِهابُ الهَلَل الحَجَاجيّ **orbital cellulitis**

اَلتهاب الهَلل الوجَهي عادة ما يكون ثانوياً لالتهاب الجيوب في الأطفال ، ويتميز بالجحوظ ، وتورم الجفون ووذمة الملتحمة ، واعتلال حركة العين ، وأحياناً قد يسبب العمى

الجليكوزيدية (1,4) - β مثلما يحدث في السلولوز في مختلف الجراثيم والفطريات والنباتات والحيوانات الدنيا ولكن لا تظهر في الحيوانات العليا .

خَلِيَّة (صغيْرَة) **cellule**

انظر تحت cellula .

خَلِيَّةٌ صافيَة **cellule claire**

انَظر تحت clear cell .

مُبيدُ الخلايا **cellulicidal**

انظر تحت cytoidal.

مُبْتَعِدٌ عن الخلِيَّة **cellulifugal**

يتجه بعيداً عن جسم الخلية .

مُتَّجِهٌ نَحْوَ الخَلِيَّة **cellulipetal**

يتجه صوب (نحو) جسم الخلية .

التِهابُ الهَلَل **cellulitis**

(التهاب النسيج الضام الرخو الخلالي)

التهاب حاد ، منتشر وغير محدد ، وذمي ، متقيح في الأنسجة تحت الجلدية العميقة والعضلات أحيانا ، وأحياناً يتكون خراج ، ويكون الجلد دافئاً ومؤلم . وعادة يتكون نتيجة لعدوى جرثومية في الجروح ، والحروق أو الآفات الجلدية الأخرى ، وخاصة المكورات السبحية أو المكورات العنقودية الهوائية ، وقد يحدث كذلك في مضيفي منقوصي المناعة أو بعد الحمرة .

ويميل الالتهاب للتمدد للفضاءات النسيجية والمسافات السطحية بسبب إفراز الجراثيم لكميات كبيرة من إنزيم الهيالورونيداز الذي يكسر عديد السكاريد كمادة أساسية ، وحالة الفرين (البلازمين) الذي يؤدي إلى تآكل الحواجز الليفية والليسيتيناز الذي يدمر غشاء الخلية .

اَلْتِهابُ الهَلَل بَاللاهَوَائيَّاتَ **anaerobic cellulitis**

انظر تحتَ clostridial anaerobic cellulitis .

اَلْتِهابُ الهَلَل بالمطَثّيَّات **clostridial cellulitis**

اَلتهاب الخَلاياَ بسبب عدوى مطثية نخزية ،

والوفاة .

periurethral cellulitis — اَلْتهابُ الهَلَل حَولَ الإحْليل

انظر تحت phlegmon .

phlegmonous cellulitis — اَلْتهابُ الهَلَلِ اَلفَلْجموني

انظر تحت phlegmon .

streptococcus cellulitis — اَلْتهابُ الهَلَل بَالعقْديَّاتِ

ulcerative cellulitis — اَلْتهابُ الهَلَل اَلتَّقَرُّحي

انظر تحت lymphangitis .

cellulofibrous — خَلَويٌّ لِيفِيّ

جزء منه خلوي والآخر جزء ليفي .

celluloid — سِيلُولويد (مركب اصطناعي)

celluloid strip — شَرِيطٌ سِيلُّولُويديّ

Cellulomonas — السلُوزيَّة (جِنسُ جَراثيم)

celluloneuritis — التِهابُ العَصَبونات

acute anterior celluloneuritis — اَلْتهابُ العَصَبوناتِ اَلأماميَّةُ الحادُّ

cellulose — سِلُولوز (مركب كربوهيدراتي نباتي)

عديد السكاريد الأكثر وفرة في الطبيعة ، هو صلب لا لون له ، غير متفرع ، وغير قابل للذوبان (لاذواب) ، أو هو بولمر طويل السلسلة ، ويتكون من (5000-3000) ثمالة من الجلوكوز مترابطة بروابط (1,4) - β ، وتكون الهيكل لمعظم التركيبات النباتية وخلايا النبات . يمكن حلمهتها بالإنزيمات إلى السيللوبيوز ثنائي السكاريد ، ويفتقر الإنسان إلى الإنزيم الضروري لتحلل السلولاز .

cellulose acetate — أسيتاتُ السِّلُّولُوز

انظر تحت cellacefate .

cellulosity — الخَلَويَّة

حالة التكوين من خلايا .

cellulotoxic — سامٌ للخَلايا

cellulous — خَلَويُّ البُنْيَة

يتألف من خلايا .

celo- — 1ـ سابقة بمعنى الجَوْف 2ـ سابقة بمعنى الوَرَم

1ـ سابقة بمعنى الجوف .

2ـ سابقة بمعنى الورم .

celology — عِلمُ الفتوق

celom (=coelom) — الجَوفُ العامُّ

انظر تحت coelom .

celomic — متعلق بالجوف العام

celophlebitis — التِهابُ الوَريدِ الأجْوَف

انظر تحت cavitis .

celoschisis — انْشِقاقُ الجَوف (مسخ)

celoscope (=celioscope) — مِنْظارُ البَطْن

انظر تحت celioscope .

celoscopy — تَنْظيرُ البَطْن

celosomia — انْفِتاقُ الأحْشاء (مسخ)

شذوذ تطوري يتميز بشق أو غياب التبارز القصي والفقري في الأحشاء .

انظر تحت thoracoceloschisis .

celosomus — مُنْفَتِقُ الأحْشاء (مسخ)

جنين يظهر انفتاق الأحشاء ، ويسمى أيضاً (Kelosomus) .

celothel (=mesothelium) — المُتوَسطة

انظر تحت mesothelium .

celothelioma (=mesothelioma) — وَرَمُ المُتوَسطة

انظر تحت mesothelioma .

celothelium (=mesothelium) — المُتوَسطة

انظر تحت mesothelium .

celotomy (=herniotomy) — بَضْعُ الفتق

Celovirus — الفيروسَة السيلويَّة

celozoic — مُسْتَوطِنَةُ الأمْعاء (من الطفيليات)

كـعـامل لاصق لـلأسنان البـديلة وحـشـو التجاويف .

ملاطٌ سنّيٌّ **dental cement**

أي منَ المواد الرابطة العـديدة التي توضع في الفم في شكل سائل سميك القوام ثم يتحول إلى كتلة صلبة ، يستعمل في عمليات ترميم وتقويم الأسنان كعوامل لاصقة ، وقواعد ومواد ترميم . وعادة ما تسمى الراتينجات والبلمرات المستعملة كمواد ترميمية عوضاً عن الملاط .

ملاطٌ سنّيٌّ مُبيدٌ للجراثيم **germicidal dental cement**

لصاق أسنان يحتوي على مادة مبيرة للجراثيم .

ملاطٌ بَينَ الخَلايا **intercellular cement**

مادة صمغية تمسك الخلايا ، خاصة الخلايا الظهارية معاً .

ملاطٌ بَينَ المَواشير **interprismatic cement**

مَلاطٌ عَضَليّ **muscle cement**

(=الدِّبْقُ العَضَليُّ) **(=myoglia)**

انظر تحت myoglia .

ملاطٌ عَصَبيّ **nerve cement**

(=الدِّبْقُ العَصَبيُّ) **(=neuroglia)**

انظر تحت neuroglia .

ملاطٌ راتينيّ **resin cement**

أحد أنظمَة البوليمرات العديدة أو نظام أحادي/ عديد البوليمر . عادة مايحتوي على جسيمات دقيقة ويستخدم كعامل غير ذائب من الطين السيني في عملية لصق وتقويم الأسنان وإعادة تثبيت السيراميك وتثبيت المعدن والصاق الجسر المعدني إلى الميناء السنية .

ملاطُ الخَتْم **sealer cement**

مَلاطٌ سيليكاتيّ **silicate cement**

لصاق اسنان شفاف وشبيه بالخزف الصيني عند اعداده واستعمل في السابق للترميم الوقتي وشبه الدائم ومنه نوعان :

1 ـ المسحوق : مزيج من السيليكات وأكسيد الألومنيوم مع فسفات الكاليسوم وفلوريد الكالسيوم .

يقطن التجاويف المعوية في الجسم ، تقال للطفيليات (Parasites) .

سُلَّم سيلزيُوس (لقياس درجة الحرارة) **Celsius scale**

[سلم منسوب للعالم أندريس سيلزيوس (Anders Celsius) ، وهو عالم فلك سويدي *1744-1701]* ، وهو سلم حراري فيه 0^{o} يساوي 273.15 كلفين و 100^{o} يساوي 373.15 كلفين ويكتب بالاختصار C أو (Cel) وفيه 0^{o} هي نقطة التجمد للماء العذب ، و 100^{o} هي نقطة الغليان في الضغط الجوي العادي (670 ملي متر زئبق) .

1 ـ إسْمَنْت **cement**

2 ـ مِلاط

1 ـ مادة تعمل على اندماج صلب بين سطحين .

2 ـ مادة حشو ، مثل فسفات الزنك ، والتي تستعمل في طب الأسنان للمساعدة في ابقاء القولبة الذهبية في السن المحضرة ولعزل لب السن من الحشوات المعدنية وغيرها .

ملاطٌ راتينيٌّ أَكْريليكيٌّ سنّيّ **acrylic resin dental cement**

1 ـ السائل : وحيد التماثر من الميثيل ميثاكريليت مع كابح ومنشط .

2 ـ المسحوق : عديد ميثيل كريليت ومادة مائلة ومادة ملونة ومنشط للبلمرة .

ملاطُ هيدروكسيد الكَالْسيُوم **calcium hydroxide cement**

لصاق هيدروكسيد الكالسيوم : لصاق أسنان يعمل على تكوين الطبقة الواقية في الأسنان الثانوية ، ويكون مفيداً بخاصة في المساعدة في شفاء لب السن ، ويستعمل لتغطية اللب ، وكقاعدة عازلة للحرارة وللوقاية من الأثر الكيميائي .

ملاطُ الكاربوكْسيلاَت **carboxylate cement**

لصاق أسنان يتكون من خلط مسحوق يتألف في الدرجة الأولي من أكسيد الزنك ومحلول مائي من حامض عديد الاكريليك ، يستعمل

تَمْليطٌ مُؤَقَّت **interim cementation**
نوع من المادة الملاطية المؤقتة يستعملها طبيب الأسنان قبل تجهيز السن بشكل نهائي .

مُلَيطة (أسنان) **cementicle**
1 ـ المادة التي تدمج أحيـانـاً حـافـات الخـلايا البطانية الحرشفية .
2 ـ جسم صغير ملاطي حرفي الرباط حول السن أو ملتصق بسطح الجذور ناتيء أو بارز في مساحة الرباط حول السن .

مُلَيطَةٌ لاصقة **adherent cementicle**
تلك المادة التي ترتبط على نحو قوي مع غطاء الأسنان العظمي .

مُلَيطَةٌ مُلْتَصِقَة **attached cementicle**
تلك المادة آلتي ترتبط على نحو قوي مع غطاء الأسنان العظمي .

مُلَيطَةٌ حُرَّة **free cementicle**
تكلس أسمنتي خلالي ، والذي يحيط بالكامل بالأنسجة الرابطة ما حول الأسنان .

مُلَيطَةٌ خلاَليَّة **interstitial cementicle**

تَوَلُّدُ المِلاط **cementification (=cementogenesis)**

سِيمَنْتين **cementin**
المادة التي تدمج أحياناً حافات الخلايا البطانية الحرشفية .

1 ـ يُمَلط
2 ـ مُمَلط **cementing**
دمج حافات الخلايا البطانية الحرشفية .

مادَّةٌ مُمَلِّطَةٌ بَيْنَ المَواشير **cementing interprismatic substance**

الْتِهابُ المِلاط **cementitis**
التهاب غطاء السن اللإسمنتي .

1 ـ سابقة بمعنى الإسْمَنْت
2 ـ سابقة بمعنى المِلاط (السنيّ) **cemento-**
صيغة جامعة تدل على العلاقة بغطاء السن العظمي .

أرومَة مِلاطِيَّة **cementoblast**
خلية كبيرة تتراوح في الشكل من مكعبة إلى

2 ـ السائل : محلول حمض الفسفوريك المدروء .

مِلاطٌ سيليكوفُسْفاتيّ **silicophosphate cement**
خليط لصاقات من السيليكات وفسفات الزنك ، استعمل في السابق كمادة حشو مؤقتة ولتقوية أربطة تقويم الأسنان ، ولصب بدائل الأسنان ، وأغلفة التيجان من البروسلين . حلت محلها اللصاقات الراتينجية والأيونومير الزجاجي .

مِلاَطُ الزِّنْك ـ يوجينول **zinc-eugenol cement**

مِلاَطُ أُكسيد الزِّنْك واليُوجينول **zinc oxide-eugenol cement**
لصاق أسنان مصنوع من خلط مسحوق أكسيد الزنك مع سائل محسن وكمية صغيرة من الماء ، ويستعمل في الترميمات المؤقتة والقواعد العازلة للحرارة والحشوات الجذرية والعوامل اللاصقة المؤقتة .

مِلاَطُ فُسْفات الزِّنْك **zinc phosphate cement**
لصاق أسنانَ مصنوع من خلط المساحيق التي تتكون بشكل رئيسي من أكسيد الزنك وأكسيد المغنزيوم كعنصر معدل مع خليط من حامض الفسفوريك والماء وأملاح معدنية . وكمعادل يستخدم في المقام الأول كعامل لاصق للبدائل الصناعية وفي الدرجة الثانية في البدائل المؤقتة وكعامل عازل للحرارة .

تَمْليط (لَصْقٌ بالمِلاط) (أسنان) **cementation**
ربط أي شيء عن طريق الإسمنت ، مثل استعمال (اللاصق) في ربط المواد الترميمية إلى السن الطبيعية . أو استعمال مادة لاصقة لربط الأربطة إلى الأسنان . أي أنها عملية تثبيت الحشوات المصبوبة والتيجان بواسطة إلصاقهم بالإسمنت ، أو أية مادة لاصقة أخرى .

تَمْليطٌ نهائيّ **final cementation**
نوع منَ المادَة الملاطية النهائية والتي يستعملها طبيب الأسنان بعد استكمال ترميم السن بشكل نهائي .

والجذور .

عَرَنٌ مِلاطِيّ **cemento-exostosis**
(= مُلَيطة) (أسنان) (=cementicle)

تراكم المادة الملاطيــة على الأسنان ، أو فـرط التعظم الملاطي .

تولُّدُ المِلاط **cementogenesis**

نمو الغطاء الملاطي على تجـويف جـذر السن . يسـمى أيضـاً تملط ، وهو عـملية تكوين الملاط بواسطة الأرومات الملاطية .

شِبْهُ مِلاطِيّ **cementoid**

الطبقة السطحية غير المتكلسة في غطاء الأسنان العظمي في مناطق الأنسجة مـا حـول الأسنان الثابتة ، هي طبقة من النسيج الملاطي الناشئ وغـير مـشـبع بالمعـدن ، ويعـتـقـد بأنه مقـاوم للامتصاص .

وَرَمٌ مِلاطِيّ **cementoma**

أي نوع من أنواع الأورام الحـمـيـدة النـاشـئـة في الغطاء المـلاطي ، وتشـمل ورم الأرومة المـلاطية والـورم الليــفي المـســمـنت ، وخـلـل التـنسـج العظمى المتورد وخلل الملاطي ما حول القمة ، وبخاصة الأخير .

اعْتِلالُ المِلاط **cementopathia**

التهاب مـا حـول السن ، والذي ينتج من مرض أو عـيـب في غطاء السن المـلاطي ، وهي حـالة شـاذة للأسنان تنتج عن تنخـر المـلاط ، ويؤدي الاعـتـلال المـلاطي إلى التهاب الأنسـجة حـول السنية واستحالة الأنسجة الداعمة السنية .

الْتِهابُ المِلاطِ والسِمْحاق **cementoperiostitis**

التـهـاب مـا حـول السن ، وهو تقـيح سنخي سني .

فَرْطُ التَّمَلُّط **cementosis**
(= فَرْطُ تَكَوُّن المِلاط) (=hypercementosis)

فرط التملط ، وترسب الملاط بكثرة على سطح الجذر .

مِلاط **cementum TA**

نسيج ضام متكلس متصلب شبيه بالعظم يغطي جـذر الأسنان من الموصل الميـنائي العـاجي إلى

حرشفية مع نواة مركزية كبيرة ونووية واحدة ، تكون نشطة في تكوين غطاء السن الأسـمنتي (تكوين الملاط) على عـاج الجـذر لسن في مرحلة النمو .

وَرَمٌ أَرُومِيٌّ مِلاطِيّ **cementoblastoma**

ورم مـلاطي حـمـيـد في منبت الأسنان ينشأ من الغطاء الإسمنتي وتظهر على شكل كتلة منتشرة مجاورة لجذور الأسنان ، والتي تتكون من خلايا ثم تتطور إلى أرومات الملاط وتحتوي على كمية قليلة من النسـيج المتكلس ، بخـاصـة ضـرس الفك الأسـفل . وعـادة لا تظهـر أعـراض على المرضى ، على الرغم من إمكانيـة حـدوث تمدد قشري وألم .

انْتِقاضُ المِلاط **cementoclasia**

تحلل وارتشـاف الغطاء الملاطي للسن يتكون عـادة كـمـضـاعـفـات للجـروح أو الحـالات المرضية .

ناقِضَةُ المِلاط **cementoclast**

هي خليـة من حـيث التكوين الكيـسي مماثلة لناقـضـة العظم ، تشـتـرك في عـملية ارتشـاف الغطاء الملاطي ، وتعـرف التـجـاويف الناتجة من الارتشـاف باسم الفـجـوة الارتشـافية . وتسـمى أيضاً (Odontoclast) كاسرة أو ماصة السن .

خَلِيَّة مِلاطِيَّة **cementocyte**

خلية متواجدة في فجوة الغطاء العظمي الخلوي للسن ، تتـراوح في الشكل من مسـتـديرة إلى بيـضــاوية إلى مـسطحـة ، وتظهــر زوائد بروتوبلازمـيـة عـديدة تمتـد من سطحـهـا الحر . تسـمى أيضـاً خلية أسمنتيـة ، وهي نتـاج من الأرومـات الملاطيـة وتظل في المـلاط حـديث التكون .

مِلاطِيٌّ عاجِيّ **cementodentinal**

متعلق بالملاط والعاج للسن .

المَوصِلُ المِينائِيُّ المِلاطِيّ **cemento-enamel junction**

ملتقى تشريحي بين الملاط على سطح الجذور وميناء التاج ، ويمثل عـلامة مميزة بين تاج السن

فَرْطُ تَنَسُّجِ المِلاَط **cementum hyperplasia**
(= فَرْطُ التَّمَلُّط)
ترسب موضعي للملاط على سطح الجذر .

ضَخَامَةُ المِلاَط **cementum hypertrophy**
(= فَرْطُ التَّمَلُّط)
ترسب موضعي للملاط على سطح الجذر .

تَمَلُّطٌ مُعاكس **cementum inostosis**
(باتجاه العَاج)
زيادة مرضية في ثخانة الملاط ، تنشأ باتجاه أو بداخل العاج .

مِلاَطٌ نَخْرِيّ **necrotic cementum**


مَلاَطٌ أَوَّلِيّ **primary cementum**
الطبقة الداخلية من الملاط عديم الخلايا ، والتي تغطى بعد ذلك بطبقة من الملاط ذي الخلايا ، وتسمى الملاط الثانوي في الجزء الزروي .

مِلاَطٌ ثانَوِيّ **secondary cementum**
هو طبقة خارجية من الملاط ذي الخلايا ، والذي الذروة ، وتبطن قمة قناة الجذر ، وتعمل أيضاً كبنية رابطة حول رباط الأسنان ، وبذلك تساعد في دعم الأسنان ، وتسمى أيضاً المادة العظمية السنية .

مِلاَطٌ عَدِيْمُ الخَلاَيَا **acellular cementum TA**
المِلاط الّذي لا يملك مكونات خلوية تغطي من ثلث إلى نصف جذر السن الملاصق للموصل الميناَئي الملاطي ، وعادة ما تتم مقابلته بطبقة ملاط خلوي ، ولا تحتوي على خلايا ملاطية .

مِلاَطٌ خَلَوِيّ **cellular cementum TA**
ذلك الغطاء العظمي الذي يغطي نصف إلى ثلثي ذروة جذر السن ، والذي يحوي خلايا ملاطية مغروزة في المطرس المتكلس ، وعادة ما تمت مقابلتها بطبقة ملاط عديم الخلايا .

عَرَنٌ مِلاطيٌّ **cementum exostosis**
(= فَرْطُ التَّمَلُّط)
ترسب موضوعي للملاط على سطح الجذر .



ورم ملاطي **Cementoma**

النَمَطُ الأصْلِيُّ المُشْتَرَك **cenotype**
النوع الأصلي ، والذي نشأت منه كل الأنواع .

الرَّقيب (طب نفسي) **censor**
مصطلح استخدمه فرويد للإشارة إلى الملكة العقلية التي تحمي الحدود بين اللاشعور وقبل الشعور ، والتي تمنع الأفكار والخوف اللاشعوري من الدخول في الشعور ما لم تكن مقنعة ، كما في الأحلام . وفي نظرية متأخرة لفرويد ، تعتبر أعمال الرقيب (إزاحة وتكيف وترميز وكبت) آليات دفاعية للأنا والأنا العليا .

رقابَة (طب نفسي) **censorship**
عمل الرقيب .

تعْداد **census**

مُتَوَسِّطُ تَعْداد المَرْضَى اليَوَمي **average daily census**

تَعْدادُ المَرْضَى المُقيْمين **boarder census**

تَعْدادُ المَرْضَى الدَّاخليِّن **inpatient census**

ألَمٌ وَخْزِيّ **centalgia**

مَرْكَز **center**
1ـ النقطة الوسطى في الجسم .
2ـ مجموعة من العصبونات في الجهاز العصبي المركزي ، والتي تختص بأداة وظيفة خاصة . ويسمى أيضاً (Area) .

مَرْكَزٌ مُعَجِّل **accelerating center**
الجزء في المركز الوعائي الحركي المشترك في تسارع القلب . يسمى أيضاً (Cardioaccelerating center) مركز مسارعة القلب .

مَرْكَزٌ سَمْعِيّ **acoustic center**
منطقة الربَط السمعي .

مَرْكَزٌ نَشيط **active center**

مَرْكَزٌ جراحيٌ جَوَّال **ambulatory surgery center**

المَراكِزُ الشَّرَجيَّةُ النُّخاعيَّة **anospinal centers**
مراكز تقلص عضلات الشرج القابضة ، لإرخائها (مركز تبرز) ، وللإنعكاس الشرجي ، وجميعها في التضخم القطني .

يغطي الملاط الأولي .

مُتَكافِئُ التَّوأمَين (مسخ) **cenadelphus**
توأمان متصلان متماثلان .

متعلق بحَرْفِ الظُنْبوب **cenemial**

قيلة دِماغيَّة لاكيسيَّة **cenencephalocele**

الحِسُّ المُشتَرَك **cenesthesia**
انظر تحت somatogenesis .

متعلق بالحِس المُشترَك **cenesthesic**

اعتِلالُ الحِس المُشتَرَك **cenesthesiopathy**
انظر تحت cenesthopathy .

متعلق بالحِس المُشترَك **cenesthetic**

اعتِلالُ الحِس المُشتَرَك **cenesthopathy**
إحساس عام بعدم الراحة والضيق والمرض ، والذي لايعود إلى أي جزء خاص في الجسم .

1ـ سابقة بمعنى الجَديْد **ceno-**
2ـ سابقة بمعنى الاشْتِراك
3ـ سابقة بمعنى التَّجْويْف

مُسْتَعْمَرَة تَشارُكِيَّة **cenobium**
مستعمرة خلايا أو كائنات مستقلة مربوطة معاً بصفة مشتركة .

خَلِيَّة مُتَنَوِيَة **cenocyte**
خلية نباتية عديدة النوى .
انظر تحت coenocyte .

مُسْتَجِدَّاتٌ تَلاؤمِيَّة **cenogenesis**
ظهور سمات جديدة في النمو . كاستجابة تكيفية للأحوال البيئية .

رُهابُ الخَلاء **cenophobia**

مُسْتَجِدَّاتُ النَّماءِ النَّفسي **cenopsychic**
ظهور حديث في النمو العقلي .

اِفْتِراغ (إفراغٌ مَرَضِيّ) **cenosis**

مُطاعِمٌ طليق **cenosite (=coinosite)**
انظر تحت coinosite .

اِفْتِراغِيّ **cenotic**

رُهابُ المُسْتَجَدَّات **cenotophobia**

سُمُّ التَّعَب **cenotoxin (=fatigue toxin)**

وكالة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة ورئاستها في أطلنطا وجورجيا ، تهتم بكافة مراحل مراقبة الأمراض المعدية والمتناقلة والمهنية ، والوقاية من الأمراض والاصابات والإعاقات . وتشمل مسئولية المركز دراسة الأوبئة ومكافحتها واكتشافها ، والعلوم المخبرية والاستقصاءات البيئية ، والتدريب على طرق مكافحة الأمراض والوقاية من الأمراض المزمنة ، والإرتقاء بالصحة والوقاية من الإصابات . كان اسمه السابق مركز الأمراض السارية (1964) ، مركز مكافحة الأمراض (1970) ومركز مكافحة الأمراض (1980) .

centers of chondrification مَرْكَزُ التَّغَضْرُف

cheirokinesthetic center مَرْكَزُ حَرَكات الكِتابَة

chiral center مَرْكَزُ اللاَّتَناظُر (في الجُزَيء)
مركز خلل التناظر في الجزيء وعادة يتكون من ذرة مع أربع مجاميع (مثلاً : كربون مع أربع روابط مفردة أو نتروجين ذو أمين رباعي) .

ciliospinal center مَرْكَزٌ هَدَبِيٌّ نُخاعِيٌّ
مركز في الأجزاء العنقية السفلى والصدرية العليا من الحبل الشوكي ، وذات علاقة بتمدد الحدقة .

community health center مَرْكَزُ صِحَّة المُجْتَمَع

community mental health center مَرْكَزُ الصِّحَّة النَّفْسِيَّة المُجْتَمَعِيَّة
مرفق لَلصحة العقلية أو مجموعة وكالات متخصصة ، والتي توفر مختلف الخدمات العلاجية النفسية لمنطقة محددة .

convergence center مَرْكَزُ التَّقارُب

coordination center مَرْكَزُ التَّنْسيق
مركز عصبي يخدم وظيفة التنسيق .

correlation center مَرْكَزُ التَّرابُط

cortical center مَرْكَزٌ قِشْرِيّ

cost center مَرْكَزُ تَقْدِيرِ التَّكْلُفَة

apneustic center مَرْكَزُ قَطْعِ التَّنَفُّس
العصبونات في جذع الدماغ ، والتي تتحكم في التنفس العادي ، وهو ليس مركز حقيقي .

appetite center مَرْكَزُ الشَّهِيَّة

auditopsychic center مَرْكَزٌ نَفْسِيٌّ سَمْعِيٌّ
(= مَرْكَزُ إدْراك المَسْموعات)
انظر تحت auditory association area .

auditory center مَرْكَزٌ سَمْعِيّ

auditory word center مَرْكَزُ إدْراك الكَلِمات المَسْموعَة

autonomic center مَرْكَزٌ مُسْتَقِلّ

brain center مَرْكَزٌ دِماغِيّ

Broca's center مَرْكَزُ بَروكا (في المخ)
انظر تحت Broca's motor speech area .

Budge's center مَرْكَزُ بودْجيه
1 ـ مركز الانتعاظ
2 ـ المركز الهدبي النخاعي
انظر تحت erection center .

bulbar respiratory center المَرْكَزُ التَّنَفُّسِيُّ البَصَلِيّ

cardiac center مَرْكَزٌ قَلْبِيّ

cardioaccelerating center مَرْكَزٌ مُعَجِّلٌ للقَلْب
انظر تحت accelerating center .

cardioinhibitory center مَرْكَزٌ مُثَبِّطٌ للقَلْب
جزء في المركز الوعائي الحركي ، والذي له تأثير مثبط على القلب من خلال العصب الحائر .
ويسمى أيضاً (Kronecker's center) .

cardiomotor center مَرْكَزٌ مُحَرِّكٌ للقَلْب

cardiovascular center مَرْكَزٌ قَلْبِيٌّ وِعائِيّ
انظر تحت vasomotor center .

cell center (=centrosome) مَرْكَزُ الخَلِيَّة
(= الجُسَيْمُ المَرْكَزِيّ)
انظر تحت centrosome .

center processing مُعالَجَةٌ مَرْكَزِيَّة

centers for disease control مَراكِزُ مُكافَحَة الأَمْراض

(Hunger center) .

مَرْكَزُ فليمنغ **Flemming center**
(= مَرْكَزٌ مُنْتِش) **(=germinal center)**
انظر تحت germinal center .

مَرْكَزٌ عُقْدِيّ **ganglionic center**

مَرْكَزٌ تَناسُلِيّ **genital center**
انظر تحت erection center .

مَرْكَزٌ تَناسُلِيٌّ نُخاعِيّ **genitospinal center**
انظر تحت erection center .

مَرْكَزُ رِعايَةِ الْمُسِنِّين **geriatric center**
مركز يُؤسَس لرعاية المسنين وتلبية متطلباتهم الصحية والنفسية والاجتماعية .

مَرْكَزٌ مُنْتِش **germinal center**
(في العَقدة اللمفية)
منطقة في مركز العقيدة اللمفاوية تحوي تكدسات من اللمفاويات المتكاثرة النشطة (الضد المكون لخلايا B) تظهر على شكل كتلة كروية محاطة بمحفظة من الخلايا المستطيلة ومغلفة جزئياً بغطاء هلالي من الخلايا اللمفية الصغيرة . تسمى أيضاً (Flemming cell) ، (Secondary nodule) .

المَرْكَزُ الْمُحَرِّكُ لِلِّسان **glossokinesthetic center**
انظر تحت motor speech area .

مَرْكَزُ الْبِيلَةِ السُّكَّرِيَّة **glycogenic center**

مَرْكَزٌ ذَوْقِيّ **gustatory center**

مَرْكَزٌ صِحِّيّ **health center**
1 ـ وكالة للصحة العامة للقيام بالعمل الصحي ولتنسيق جهود كافة الإدارات الصحية .
2 ـ مجمع تعليمي يتكون من مدرسة طبية وتحالف صحي ومهني .

مَرْكَزُ تَنْظِيمِ الْحَرارَة **heat-regulating center**
انظر تحت thermoregulatory centers .

مَرْكَزٌ اسْتِشْفائِيّ **hospital center**

مَرْكَزُ الْجُوع **hunger center**
(= مَرْكَزُ الإِطْعَام) **(=feeding center)**
انظر تحت feeding center .

مَرْكَزُ النَّوْم **hypnic center**

مَرْكَزٌ ضِلْعِيّ **costal center**
(في فقرات الجنين)

مَرْكَزُ السُّعال **coughing center**
مركز في النخاع المستطيل (البصلة) ، يقع فوق المركز التنفسي ، والذي يتحكم في عملية السعال.

مَرْكَزُ الرِّعايَةِ النَّهارِيَّة **day care center**

مَرْكَزٌ جِراحِيٌّ نَهارِيّ **day surgery center**
(=مَرْكَزٌ جَراحِيٌّ سَيَّار) **(=ambulatory surgery center)**

مَرْكَزُ التَّغَوُّط **defecation center**
انظر تحت anospinal cell .

مَرْكَزُ البَلْع **deglutition center**
مركز عصبي في النخاع المستطيل يتحكم في وظيفة البلع .

مَرْكَزٌ تَعَظُّمِ الأَسْنَان **dentary center**
مركز تعظم في الفك الأسفل يعطي منشأ الحد الأسفل والصفيحة الخارجية .

مَرْكَزٌ سائِد **dominating center**

مَرْكَزُ الدَّفْق **ejaculation center**
منعكس الدفق في الحبل النخاعي القطني الذي ينظم عملية دفق المني أثناء الإثارة الجنسية .

مَرْكَزُ تَعَظُّمِ الناتِئِ الخُشَّائي **epiotic center**
مركز التعظم الذي يكونَ الناتِئ الخُشائي .

مَرْكَزٌ مُشاشِيّ **epiphyseal center**

مَرْكَزُ الانْتِعاظ **erection center**
مركز المنعكس في الحبل النخاعي العجزي الذي ينظم انتصاب القضيب أو البظر . ويسمى أيضاً (Budge's center) ، (Genital center) .

مَرْكَزُ سَوائِيَّةِ الأَداء **eupraxic center**
(مَرْكَزُ تَنْسِيق حَرَكِيّ)
انظر تحت premotor area .

مَرْكَزُ الزَّفِير **expiratory center**

مَرْكَزٌ وَجْهِيّ **facial center**

مَرْكَزُ الإِطْعَام **feeding center**
مجموعة خلايا في الجانب للمهاد الوحشي تسبب عند إثارتها الشعور بالجوع . تسمى أيضاً

hypothalamic center مَرْكَزٌ وِطائِيّ
ideomotor center مَرْكَزٌ فِكْرِيٌّ حَرَكِيّ
inhibitory center مَرْكَزٌ مُثَبِّط
inspiratory center مَرْكَزُ الشَّهِيق
kinesthetic center مَرْكَزُ إِدْراكِ الحَرَكات
kinetic center المَرْكَزُ الحَرَكِيّ
(=centrosome) (= الجُسَيمُ المَرْكَزِيُّ)
الكرات المركزية في البيضة المخصبة .
knee jerk center مَرْكَزُ نَفْضَةِ الرُّكْبَة
Kronecker's center مَرْكَزُ كرونيكر
(=cardioinhibitory center) (= مَرْكَزٌ مُثَبِّطٌ لِلقَلْب)
أنظر تحت cardioinhibitory center .
Kupressoff's center مَرْكَزُ كوبريسوف
(=micturition center) (= مَرْكَزُ التَّبَوُّل)
مركز يتحكم في المثانة ويمنع توتر العضلة المثانية ويقع في التوسع القطني .
Lumsden's center مَرْكَزُ لومسدين
(=pneumotaxic center) (= المَرْكَزُ المُنَظِّمُ لِلتَّنَفُّس)
المركز المنظم للتنفس .
انظر تحت pneumotaxic center .
mastication center مَرْكَزُ المَضْغ
medical center مَرْكَزٌ طِبِّيّ
medullary center of cerebellum المَرْكَزُ النُّخاعِيّ لِلمُخَيخ
(=corpus medullare cerebelli) (=الجِسْمُ النُّخاعِيُّ لِلمُخَيْخ)
انظر تحت corpus medullare cerebelli .
medullary respiratory center المَرْكَزُ النُّخاعِيُّ لِلتَّنَفُّس
الجزء في المراكز التنفسية الذي يتكون في النخاع المستطيل ، ومقسم بين المجموعة التنفسية الظهرية والمجموعة التنفسية الأمامية .
micturition center مَرْكَزُ التَّبَوُّل
مركز يتحكم في المثانة ويثبط المصرة المثانية ، ويقع في التوسع أو الانتباج القطني .

motor center مَرْكَزٌ حَرَكِيّ
neighborhood health center مَرْكَزُ صِحَّةِ الجِوار
(=community health center) (= مَرْكَزُ صِحَّةِ المُجْتَمَع)
nerve center مَرْكَزٌ عَصَبِيّ
olfactory center مَرْكَزٌ شَمِّيّ
optic center مَرْكَزٌ بَصَرِيّ
تلك النقطة في العدسة ، أو مجموعة العدسات ، حيث تُجتاز كل الأشعة التي تساعد في تكوين الصورة الواحدة المحور الأساسي في العين ، حوالي 2 ملي متر خلف القرنية .
ossification center مَرْكَزُ التَّعَظُّم
انظر تحت centrum ossficationis .
pacemaker center مَرْكَزُ النَّاظِمَة
panting center مَرْكَزُ اللُّهَاث
انظر تحت polyneic center .
parenchymatous center مَرْكَزٌ مَتْنِيّ
perceptive center مَرْكَزٌ إِدْراكِيّ
phrenic center مَرْكَزُ الحِجاب
(=centrum tendineum) (= المَرْكَزُ الوَتَرِيّ)
انظر تحت centrum tendineum diaphragmatis .
plantar reflex center مَرْكَزُ المُنْعَكَس الأَخْمَصِي
pneumotaxic center مَرْكَزٌ مُنَظِّمٌ لِلتَّنَفُّس
مركز في الجزء الأعلى في جسر الدماغ ، يكبح الشهيق بانتظام وباستقلال عن العصب الحائر ، ويسمى أيضاً (Lumsden center) .
polypneic center مَرْكَزٌ مُسَرِّعٌ لِلتَّنَفُّس
مركز في الحدبة الرمادية يزيد من معدل التنفس .
psychomotor center مَرْكَزٌ حَرَكِيٌّ نَفْسِيّ
pteriotic center المَرْكَزُ الصَّخْرِيُّ الأُذُنِيُّ
مركز تعظم في الجنين والمولود يتطور منه سقيف الطبل وغطاء النفق الهلالي الوحشي (تمر فيه القناة الهلالية الغشائية الوحشية) .

مَرْكَزُ الكَلاَم speech center

مَرْكَزُ تَعَظُّم الوَتَدي sphenotic center

مركز تعظم في العظم الوتدي الجنيني .

المَرْكَزُ التَّناسُلِيُّ النُّخاعيّ spinogenital center

(= مَرْكَزُ الدَّفْق) (=ejaculatory center)

مَرْكَزُ التَّعَظُّم الباطن للفَكِّ السُّفْلِيِّ splenial center

واحدة من مراكز التعظم في الفك السفلي مكوناً جزء من الصفيحه الداخلية .

مَرْكَزُ التَّعرّق sudorific center

1 ـ مركز في الوطاء الأمامي والذي يتحكم في التعرق الغزير (Diaphoresis) .

2 ـ أي من المراكز المتعدد في البصلة أو الحبل النخاعي ، والتي تشكل تحكم لاودي في التعرق الغزير .

قِسْمُ التَّجْهيزات المَرْكَزيّ supply department center

مَـرْكَـزُ البَلْع swallowing center

انظر تحت deglutition center .

مَرْكَزُ التَّعَرُّق sweat center

انظر تحت sudorific center .

مَرْكَزُ الذوق taste center

المَرْكَزُ الوَتَريّ (للحجابَ الحاجز) tendinous center (=centrum tendineum)

مَرْكَزُ تَوليدُ الحَرارَة thermogenic center

مراكز تنظيم تحويل وتبديد الحرارة .

مَرْكَزُ تَثْبيط الحَرارَة thermoinhibitory center

مَرْكَزُ تَضْييع الحَرارَة thermolytic center

مَراكزُ تَنْظيمِ الحَرارَة thermoregulatory centers

مراكز وطائية تنظيم محافظة وتبديد الحرارة .

مَرْكَزُ تَنْظيم الحَرارَة thermotaxic center

انظر تحت thermoregulatory centers .

مَرْكَزُ العَطَش thirst center

مجموعة خلايا في الوطاء الوحشي ، والتي تسبب إثارتها إحساس بالعطش .

مَراكزُ العقاب punishment centers

مَرْكَزُ تَقَبُّض الحَدَقَة pupilloconstrictor center

مَرْكَزُ التَّفاعُل reaction center

(= مَرْكَزٌ مُنْتِش) (=germinal center)

مَرْكَزٌ اسْتِقْباليّ receptive center

مَرْكَزٌ مُسْتَقيميٌّ مَثانيّ rectovesical center

مركز المنعكس الحبلي للمستقيم والمثانة .

مَرْكَزٌ انْعكاسيّ reflex center

أي مركز في المخ أو الحبل النخاعي يتحول فيه الانطباع الحسي إلى دافع حركي .

مَراكزُ تَنَفُّسيَّة respiratory centers

سلسلة مراكز في النخاع والجسر والتي تنسق حركات التنفس ، وتشمل مركز المنظم لسرعة التنفس ومركز قطع التنفس ، والمجموعات التنفسية الظهرانية والبطنانية .

مَرْكَزُ الثَّواب reward center

مَرْكَزُ التَّدْوير rotation center

النقطة أو المحور الذي يدور حوله الجسم .

مَرْكَزٌ لُعابيّ salivary center

مَرْكَزُ الإِلْعاب salivation center

مَرْكَزُ الشَّبَع satiety center

مجموعة خلايا في الجزء البطني الإنسي للوطاء ، يكبح الرغبة للطعام عند استثارته .

المَرْكَزُ البَيضاويّ semioval center

انظر تحت centrum semioval .

مَرْكَزٌ حِسِّيّ sensory center

هي مناطق استقبال أولية .

قِسْمُ الخَدَمات المَرْكَزيّ service department center

مَراكزُ سيتْشينُوف Setchenow's centers

(مراكز تَثْبيطية في النخاع وفي الدماغ)

مَرْكَزُ السُّلوك الجِنْسي sex-behavior center

هي النواة الأمامية الإنسية للوطاء .

انظر تحت ventromedial nucleus of hypothalamus .

مَرْكَزُ العُطاس sneezing center

مَرْكَزٌ حِسِّيٌّ جَسَدِيّ somatosensory center

trophic center مَرْكَزٌ اغْتذائيّ

vascular center مَرْكَزٌ وعَائيّ

vasoconstrictor center مَرْكَزٌ مُقَبِّضٌ للأوعِيَة

مركز في البصلةَ والجسر السفلي للدماغ ، والذي يتحكم في انقباض الأوعية الدموية .

vasodilator center مَرْكَزٌ موَسِّعٌ للأوعِيَة

مركز في البصلةَ ، والذي يسبب تمدد الأوعية الدموية عن طريق كبح نشاط المركز المقبض للأوعية .

vasomotor centers مَراكِزُ مُحَرِّكَةٌ للأوعِيَة

مراكز في البصلة والجسر السفلي ، والذي ينظم قطر الأوعية الدموية ويزيد أو يخفض سرعة القلب القلوصية .

انظر تحت vasoconstrictor center .

انظر تحت vasdilator center .

vasotonic center (=cardiovascular center) مَرْكَزُ التَّوَتُّرِ الوعائِيّ (= مَرْكَزٌ قَلْبِيٌّ وعائي)

vesical center المَرْكَزُ المَثاني (مَرْكَزُ التَّبَوُّل)

انظر تحت micturition center .

vesicospinal center المَرْكَزُ المَثانيُّ النُّخاعيّ (المَرْكَزُ النُّخاعيُّ للتَّبَوُّل)

انظر تحت micturition center .

visual center مَرْكَزُ الإبْصار ؛ مَرْكَزُ الرُّؤْيَة

visual word center مَرْكَزُ إدْراك الكَلِمَات المَرْئِيَّة

visuopsychic center المَرْكَزُ الإبْصَارِيُّ النَّفْسِيّ (مَرْكَزُ إدْراك المَرْئِيَّات)

vital centers مَراكِزُ حَيَوِيَّة

vomiting center مَرْكَزُ القَيء

مركز في المنطقة المركزية السفلية في البصلة ، الذي يسبب تنبيهها القيء .

انظر تحت chemoreceptor trigger zone .

Wernicke's center مَرْكَزُ فيرنيكه (مركز الكلام في المخ)

winking center مَرْكَزُ الطَّرْف

centering مَرْكَزَة

مصطلح يستخدم في الفَحْصِ المَجْهَري .

centesimal مِئَوِيُّ التَّقسيم

مقسم إلى مئات أو معتمد على أساس تقسيمات مئوية .

centesis بَزْل

انثقاب أو بزل ، مثلما في الشفاطة أو الرشافة ، أو المبزل ، أو الإبرة .

centi- سابقة بمعنى السنتي $(=10)^{-2}$

صيغة اتحادية تدل على (1) جزء من المائة $(10)^{-2}$ من الوحدات المخصصة بالجذر الذي تتحد معه (رمزه ، C) كما في السنتي متر (cm) أو (2) مائة واحدة كما في الحربشة (حيوان من المفصليات) .

centibar سَنْتِي بار (وَحْدَة ضَغْط)

centigrade دَرَجَة مِئَوِيَّة

يتكون من أو يملك 100 تدريج (درجة أو حظوة) درجة ، تختصر بحرف C .

انظر تحت scale .

centigram سَنْتِي جرام (وَحْدَة كتلة)

centiliter سَنْتِي لِتر (وَحْدَة كيل)

واحد من جزء من مائة من اللتر $(10^{-2}L)$ ، أو ما يعادل (0.33815) من الأونصة السائلة ، تختصر cL أو c1 .

centimeter سَنْتِي متر (وَحْدَة طول)

وحدة طول تساوي واحد من جزء من المائة من المتر $(10^{-2}m)$ ، واختصارها cm .

square centimeter سَنْتِي متر مُرَبَّع

centimolar سَنْتِي موليّ (حدة قياس جزيئات في سائل)

centimorgan سَنْتِي مُورْجان (وَحْدَة قياس المسافة بين نقطتين على خَرائِطِ الكروموسومات)

واحد من جزء من المائة من المورجان (وحدة أبعاد الخريطة الكروموسومية) ، وحدة المسافة على خريطة الارتباطات المسافة على الخريطة بين التوضعات المتجاور ، يعبر عنها بسنتي مورجان ، وتكون مساوية لتواتر التأشب ، يعبر

مصطلح عام تدل على بنية موجودة مركزياً .

centralized services **خَدَمَاتٌ مُمَرْكَزَة**

centraphose **عَتَامٌ مَرْكَزِيُّ المَنْشَأ**

أي عتام أو إحساس بالظلام ، ينشأ في المراكز الإبصارية أو البصرية .

centration **وَحْدانِيَّةُ التَّرْكِيز**

عدم القدرة على الانتباه إلى أكثر من ملمح بارز واحد في وقت معين ، وهي مرحلة طبيعية في تطور الذكاء البشري .

centraxonial **مَرْكَزِيُّ المِحْوار**

عندما يكون المحوار في مركز الخط الناصيف .

centre **مَرْكَز**

(=center)

انظر تحت center .

regional training centre **مَرْكَزُ تَدْرِيبٍ إِقْلِيمِيٌّ**

WHO collaborating centre **مَرْكَزٌ مُتَعَاوِنٌ مَعَ مُنَظَّمَةِ الصِّحَّةِ العَالَمِيَّة**

centrencephalic **متعلق بمَرْكَز الدماغ**

تعود إلى أوتخص مركز الدماغ .

انظر تحت system .

centri- **سابقة بمعنى المَرْكَز**

صيغة اتحادية تدل على العلاقة بالمركز ، أو على التموضع المركزي .

centric **مَرْكَزِيّ**

1 ـ تعود إلى أو تقع عند المركز أو مركزي .

2 ـ مصطلح يستعمل أحياناً كاسم أو ترمز إلى الإطباق المركزي ، علاقة مركزية ، أو قوة مركزية .

centric occlusion **إِطْبَاقٌ مَرْكَزِيّ**

centric relation **عَلاَقَةٌ مَرْكَزِيَّة**

انظر تحت centric relation .

centriciput **ذُؤابَة (وسط هامة الرأس)**

الجـزء المركـزي في السطح العلوي للرأس ، والذي يتوضع بين القذال ومقدمة القحف .

centrifugal **نابِذ**

تحرك بعيد من المركز ، أو تحرك بعيد من قشرة المخ ، الصادر (Efferent) .

عنها في صورة نسبة مئوية . وبالنسبة للتوضعات (Loci) غير المتجاورة يمكن أن تكون مسافة على الخريطة أكبر من تواتر التأشب ، ولأن تواتر التأشب لا تكون مضافة دائماً . ورمزها cM . يسمى أيضاً (Map unit) .

centinormal **سَنْتِيٌّ نِظامِيّ**

centipede **حَرِيشَة (حَيَوانٌ مِنَ المَفْصِلِيَّات)**

أي من حيوان مفصلي (الأرجل) من صنف شفويات الأرجل .

centipoise **سَنْتِي بواز (وَحْدَةُ اللُّزوجَةِ الحَرَكِيَّة)**

واحدة في جزء من المائة من البواز (وحدة اللزوجة في السوائل) .

centiunit **سَنْتِي وَحْدَة (100/1 وحدة)**

واحد في جزء من المائة من الوحدة الاعتيادية .

centra TA **مَراكِز**

(sing.centrum) **(ف: مَرْكَز)**

انظر تحت centrum .

centrad **1 ـ سَنْتراد (قِياسُ انحِرافِ الزَّوايا)**

2 ـ مُتَّجِهٌ نَحْوَ المَرْكَز

1 ـ صوب المركز أو مركز ما ، خاصة صوب مركز الجسم .

2 ـ مقياس لزاوية الانحراف ، وتبدأ عند 0.57 درجة ، أو واحد من جزء من المائة جزء من الراديان (وحدة لقياس زوايا السطوح) ، ورمزها w ، وتسمى أيضاً (Prism degree) .

centrage **مَرْكَزَة**

الحالة التي تكون فيها مراكز السطوح الكاسرة المتعددة في العين في نفس الخط المستقيم .

central **مَرْكَزِيّ**

كلمة عامة تدل على تركيب مركزي الموقع ، وليس المستطرف (البعيد عن المركز) .

central bearing **سَنَدٌ مَرْكَزِيّ**

central service department **قِسْمُ الخَدَمَاتِ المَرْكَزِيَّة**

central service technician **تِقْنِيُّ الخَدَمَاتِ المَرْكَزِيَّة**

centralis TA **مَرْكَزِيّ**

مُرَيكِز **centriole**

أحد العضياتان الاسطوانيتان اللذان يقعان في الجسيم المركزي ويحتويان على تسع ثلاثيات من الأنيبيبات الصغيرة المصفوفة حول حافتها . يهاجر المريكز إلى الأقطاب المقابلة للخلية خلال الانقسام الخلوي ، وتعمل على تنظيم المغازل . وتكون قادرة على التضاعف المستقل والهجرة لتكوين أجسام قاعدية .

مُرَيكزٌ أماميّ **anterior centriole**

انظَر تحتَ proximal centriole .

مُرَيكزٌ قاص (قاصي) **distal centriole**

تلكَ المريكَز في الحيوان المنوي والذي بعد الهجرة إلى سطح الخلية بزوغ سوط رفيع له ، يعود إلى وضع ذنبي إلى المريكز الداني تماماً من المريكز . وتسمى أيضاً (Posterior centriole) .

مُرَيكزٌ خَلْفيّ **posterior centriole**

انظَر تحتَ distal centrioe .

مُرَيكزٌ دان (داني) **proximal centriole**

المريكز فيِّ الحيوان المنوي التي تهاجر إلى موقع منخفض في جدار الجزء الخلفي للنواة مع محوارها عند زاوية قائمة مع المحوار الرئيسي في الحيوان المنوي ، والذي يكون منه امتداد الخيط



مركز القيء **Vomiting center**

آلَةُ القَولَبَة النَّابِذَة (أسنان) **centrifugal casting machine**

تنبيذ **centrifugalization**

عملية فصل الأجزاء الخفيفة من محلول ، أو خليط ، أو معلق من الأجزاء الثقيلة بواسطة القوة النابذة .

1 ـ نباذة **centrifugate**

2 ـ يُنَبذ

مادة خاضعة للنبذ .

تنبيذ **centrifugation**

عملية فصل الأجزاء الخفيفة من محلول ، أو خليط ، أو معلق من الأجزاء الثقيلة بواسطة القوة النابذة .

تَنْبيذٌ مُتَدَرِّجُ الكَثَافَة **density gradient centrifugation**

تنبيذ فائق في السائل ، كما في محلول السيزيوم كلوريد ، والذي تتضاعف كثافته على طول القوة النابذة ، بحيث أن المادة الخاضعة للاختبار أو التحضير تتجه عن مستوى كثافة يكون مساوياً .

تَنْبيذٌ تَفْريقيّ **differential centrifugation**

التنبيذ المعتمد على معامل التثفل للمادة الخاضعة للفحص ، ويطبق على الجناسة ليشتق منها الأجزاء دوين الخلوية المتعددة .

تَنْبيذٌ إسْويّ الكَثافَة **isopyknic centrifugation**

ذلكَ الذَي يكون فيه المذيب له نفس كثافة المواد المطلوب فصلها .

تَنْبيذٌ مَناطقيّ **zonal centrifugation**

مِنبَذَة (ج: مَنابَذ) **centrifuge**

1 ـ آلة يتم بواسطتها إحداث التنبيذ .

2 ـ التعرض للتنبيذ .

مِنْبَذَةٌ يَدَوِيَّة **human centrifuge**

مَنْبَذَةٌ مجهَرِيَّة **microscope centrifuge**

منبذة عاليّة السرعة مع مجهر مندرج فيها ، والذي يسمح بفحص العينة تحت القوة النابذة .

متعلق بمَركَزِ الفصيص **centrilobular**

تعود إلى الجزء المركزي في الفصيص .

1ـ مُحرِكٌ مَركَزيُّ التَّنبيه **centrokinesia**
2ـ حرَكة مَركَزيَّة التَّنبيه

1ـ مُحرِكٌ يُنَبهُ مَركَزيًّا **centrokinetic**
2ـ متعلق بالحرَكةِ المركَزيَّةِ التَّنبي

مَركَزيُّ المَح **centrolecithal**
يمتلك مح يتموضع بشكل مركزي .
انظر تحت ovum .

متعلق بمَركَز الفصَيص **centrolobular**
انظر تحت centrilobular .

القسَيمُ المَركَزيُّ **centromere**
الجزء المتضيق في الكروموسوم والذي عنده يتحدد شق الكروموسوم ، ويتم منه لصق الكروموسوم إلى المغزل خلال انقسام الخلية . وتبعاً لموضعه ، يقال أن القسيم المركزي موسط القسيم المركزي (مركزي) ، وتحت موسط القسيم المركزي (بعيداً عن المركز) ، أو طرفي القسيم المركزي (قريب من النهاية) ، أو طرفي القسيم المركزي (عند النهاية) . لايوجد النوع الأخير في الكروموسوم البشري . وتسمى أيضاً (Kinetochore) .

متعلق بالقسَيم المَركَزي **centromeric**
تعود إلى أو تشبه القسيم المركزي .

النَّواة المَركَزيَّة **centronucleus**
انظر تحت amphinucleus .

تصَلُّبُ مَركَز العَظم **centro-osteosclerosis**
انظر تحت centrosclerosis .

ضُواءٌ مَركَزيُّ التَّنبيه **centrophose**
أي ضواء (إحساس إبصاري شخصاني) ، أو إحساس بالضوء ، والذي يبدأ في المركز الإبصاري .

جِبلَة الجُسيَم المَركَزي **centroplasm**
مادة الجسيم المركزي .

تصَلُّبُ مَركَز العَظم **centrosclerosis**
امتلاء التجويف النخاعي للعظم بالمادة العظمية

الجُسيَمُ المَركَزيُّ **centrosome**
هو مركز الخلية ، وهو عبارة عن الكرة المركزية مع المريكز .

المحوري ، ويسمى أيضاً (Anterior centriole) .

مُرَيكَزٌ حَلَقيٌ **ring centriole**
بنية حلقيَة مظلمة عند النهاية الخلفي للقطعة الوسطى من الحيوان المنوي ، وهي ليست مريكز حقيقي وتسمى أيضاً (Anulus of spermatozoon) .

جابِذ **centripetal**
يتحرك نحو المركز ، يتحرك نحو القشرة الدماغية وارد (Afferent) .

سابقة بمعنى المَركَز **centro-**

عُنَيبِيٌّ مَركَزيٌ **centroacinar**

متعلق بالبُقعَةِ المَركَزيَّة والعَمْياء **centrocecal**
تعود إلى منطقة البقعة المركزية والبقعة العمياء .
تسمى أيضاً (Cecocentral) .

شُريطِيَّة المَركَز **Centrocestus**
(جِنسٌ مِنَ الديدان المثقوبَة)
جنس من الديدان المثقوبة .

شَـريطِيَّةُ المَركَـز الشَّرَّافِيَّة **Centrocestus cuspidatus**
دودة مثقوبة توجد في الحدأة المصرية ، ومنها نوع سجل في كلاب تايوان . وربما تكون هي نفس جرية الجسم التايوانية .

حرَكة مَركَزيَّة التَّنبيه **centrocinesia**

1ـ مُحرِكٌ مَركَزيُّ التَّنبيه **centrocinetic**
2ـ متعلق بالحرَكة المَركَزيَّة التَّنبيه

خلايا مَركَزيَّة **centrocytes**
مصطلح عام يشمل كلاً من الخلايا الجرابية المركزية المشقوقة الصغيرة والكبيرة معاً .

رباط المُرَيكِزَين **centrodesmose**
الوصل بين المريكزات داخل النووية خلال الانقسام الفتيلي في بعض الأوالي . تسمى أيضاً (Centrodesmus) .
انظر تحت centrodesmus .
انظر تحت desmose .

رباط المُرَيكِزَين **centrodesmus**
انظر تحت centrodesmose .

مُؤتَلَفُ الأَسنَان **centrodontous**

centrosphere **الكرةُ المَركزيَّة**

1 ـ منطقة متخصصة من الهيولى المكثف الذي يحتوي على المريكز ، وتلعب دور هام في الانقسام الفتيلي ، وتسمى أيضاً (Cytocentrum) .

2 ـ انظر تحت centrosome .

centrostatic **متعلق بمَرْكَز الحَرَكة**

centrotherapy **مُعالجَة المَراكِز العَصَبيَّة**

centrum TA **مَرْكَز**
(pl.centra) **(ج: مَراكِز)**

1 ـ انظر تحت center .

2 ـ الجزء المركزي الكبير في جسم الفقرة ، والذي يتكون من الأجزاء القحفية والذنبية المجاورة للبضعة العظمية والتي تتعظم من مركز واحد .

centrum medianum **المَرْكَزُ النَّاصِفُ**
(=nucleus medialis **(= النَّواةُ المَهادِيَّةُ**
centralis thalami) **المَرْكَزِيَّةُ الإِنْسيَّة)**

centrum ossificationis **مَرْكَزُ التَّعَظُّم**

أي نقطة تبدأ عندها عملية التعظم التي تبدأ في العظام ، ويوجد في العظم الطويل مركز أولي لجسم العظم ، ومركز ثانوي للمشاشة (الكردوس) . تسمى أيضاً (Ossification point) .

centrum semiovale **المَرْكَزُ البَيْضاوي**

المادة البيضاء في نصفي كرة المخ والتي تأتي تحت قشرة المخ وتقع في القطاع الأفقي أعلى الجسم الثفني ، له شكل شبه بيضاوي ، يحتوي على نتوءات وألياف مصاحبة .

centrum tendineum **المَرْكَـزُ الوَتَري**
diaphragmatis **للحجاب**
(=centrum tendineum TA)

الوتر المركزي للحجاب الحاجز ، والسفاق الذي يشبه الورقة ، والذي يقع مباشرة تحت التأمور ، والذي تلتقي فيه الألياف الحجابية للغرز . يسمى أيضاً (Trefoil tendon) .

centrum tendineum TA **المَرْكَزُ الوَتَريّ**
(للحجاب)

انظر تحت centrum tendineum diaphragmatis .

centrum tendineum **المَرْكَزُ الوَتَري**
perinei TA **للعجان**

centrum vertebrae **المَرْكَزُ الفقْري**
(= corpus vertebrae TA) **(=جِسمُ الفَقْرة)**

(=primary ossification **(= المَرْكَزُ البَدْئي**
centrum TA) **للتَّكَلُّس) (جَنين)**

انظر تحت corpus perineale .

Centruroides **الشَّبْدَعَة (جِنسٌ مِنَ العَقارب)**

جنس عقارب أمريكية استوائية أو شبه استوائية ، تشمل عدة أنواع تسمى عقارب اللحاء . منه نوع مكسيكي خطير يسمى (Centruroides suffusus) .

Cenurus **مَرْأسة (يَرَقات دودةِ الرَّأساء)**
(=Coenurus)

انظر تحت coenurus .

Cenurus cerebralis **مَرْأَسَةٌ دماغيَّة**
(في الأَغنام والمواشي)

cephacetrile **سيفاسيتريل (مُضادٌ حَيَوِيّ)**

مضاد حيوي فعال ضد مجموعة واسعة من الجراثيم سالبة وموجبة الجرام .

Cephaelis **عِرقُ الذَّهَب (جِنسُ نَباتاتٍ مَداريَّة)**

جنس شجيرات وأشجار استوائية من فصيلة نبات عرق الذهب .

cephal- **سابقة بمعنى الرَّأس**

cephalad **رَأسِيًّا (باتِّجاه الرأس)**

متقدم نحو الرأس ، عكس نحو الذيل (Caudad) ، ويسمى أيضاً (Caudocephalad and craniad) .

cephalalgia **صُداع**

انظر تحت headache .

histamine cephalalgia **صُداعٌ هُستاميني**

انظر تحت cluster headache .

pharyngotympanic **صُداعٌ بُلْعومي**
cephalalgia **طَبْلي**

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ رأسِيٌّ مُشَوِّه **cephalematoma deformans**

انتفاخ في الجزء الأمامي للجمجمة بسبب فرط التعظم وتخلخل العظم وتكون فجوة في العظم .

سيفاليكسين (مُضادٌ حيَوِيّ) **cephalexin**

صُداع **cephalgia**

انظر تحت headache .

قيلة دَمَوِيَّة رأسِيَّة **cephalhematocele**

انظر تحت cephalematocele .

قيلَةُ سْترُومايِر الدَّمَوِيَّةُ الرَّأسِيَّة **Stromeyer's cephalhematocele**

(في السمحاق)

قيلة دموية تحت السمحاق تتصل بالأوردة وتصبح مملوءة بالدم خلال الزفير القوي .

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ رأسِيّ **cephalhematoma**

انظر تحت cephalematoma .

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ رأسِيٌّ مُشَوِّه **cephalhematoma deformans**

انظر تحت glossopharyngeal neuralgia .

صُداعٌ رُبْعِيّ (يُصيبُ رُبعَ الرَّأس) **quadrantal cephalalgia**

صداع يصيب ربع واحد من الرأس .

صُداع **cephalea (=cephalalgia)**

انظر تحت headache .

صُداعٌ هِياجِيّ **cephalea agitate (=cephalea gitata)**

وَذْمَةُ الرَّأس **cephaledema**


الوذمة التي تحدث في الرأس .

قيلة دَمَوِيَّة رأسِيَّة **cephalematocele**

ورم دموي تحت القحف يتصل مع واحد أو أكثر من جيوب الجافية من خلال العظم القحفي .

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ رأسِيّ **cephalematoma**

نزيف تحت سمحاقي محدود في سطح أحد عظام القحف وعادة تكون حالة حميدة ، ترى كثيراً في حديثي الولادة نتيجة رضح عظمي ، وتسمى أيضاً (Cephalohematoma) .



Centromere of the Chromosome القسيم المركزي في الكروموسوم

انظر تحت encephalocele .

قيلَةٌ رَأسِيَّةٌ حَجاجيَّة **orbital cephalocele**
بروز مَحتويات اَلقحف خلال عيب في جدار الحجاج . يسمى حسب محتوياته مثل قيلة سحائية ، قيلة دماغية . . إلخ .

بَزْلُ الرأس **cephalocentesis**
الثقب الجراحي للقحف .

الحَبْلُ الظَهْريُّ الرَّأسِيُّ **cephalochord**
الجزء الداخلي لحبل القردود الجنيني .

حَبْلِيَّاتُ الرَّأس **Cephalochordata**
(شُعَيبَة مِنَ الحَيَوانات)
شعيبة لحبلية تشبه السمكة ، أولية صغيرة التي يكون فيها الحبل القردودي ممتداً بكل طول الجسم ، وتحوي جنس الحسيكة (وهو حيوان بحري بدائي) .

كيسَةٌ رأسِيَّة **cephalocyst**
(في الديدان الشريطية)
يرقة شراطية «دودة» مثل الكيسة العدارية (المائية) .

تشَوُّهُ الرَّأس و الأصابع **cephalodactyly**
تشوه يحدث الرأس والأصابع .

مُزْدَوِجُ الوَجْه (مسخ) **cephalodiprosopus**
جنين برأس غير مكتمل جزئياً متصل بالرأس الحقيقي .

ازْدِواجُ الرَّأس (مسخ) **cephalodymia**
حالة ازدواج الرأس .

مُزْدَوِجُ الرَّأس (مسخ) **cephalodymus**
توأمان ملتصقان برأس واحد أو رأس متحد .

صُداع **cephalodynia**
انظر تحت headache .

رأسِيٌّ وَجْهِيّ **cephalofacial**

مُقَدَّمُ المِعَى (جنين) **cephalogaster**

تخلُّقُ الرَّأس **cephalogenesis**
تخلق الرأس في الجنين .

سيفالوجليسين (مُضادٌ حَيَوِيّ) **cephaloglycin**
مضاهئ جزئي التخليق للمضاد الحيوي الطبيعي سيفالوسبورين C الفعال ضد نطاق

انظر تحت cephalhematoma deformans .

أَدْرَةٌ رأسِيَّة **cephalhydrocele**
تراكم أو تجمع دموي أو مصلي تحت القحف .

أُدْرَةٌ رأسِيَّةٌ رَضْحِيَّة **cephalhydrocele traumatica**
انظر تحت traumatic meningocele .

رأسِيّ **cephalic**
1 ـ يشير إلى الرأس .
2 ـ قحفي .

مَنْسَبٌ رأسِيّ **cephalic index**
هي نسبة العرض الأقصى للرأس إلى الطول الأقصى Toox .

سيفالين **cephalin**
مركب شحمي فسفوري مشابه الليستين «مادة دهنية» ، يتواجد غالباً في المخ والنسيج العصبي .

التِهابُ الدماغ **cephalitis**
(=encephalitis)
التهاب في الدماغ .

تخلُّقُ الرَّأس **cephalization**
1 ـ تركيز أو بداية الاتجاه للنمو عند نهاية رأس الجنين .
2 ـ تطور الرأس ، تركيز الأنسجة العصبية والأعضاء في النهاية الأمامية للكائن الحي .

سابقة بمعنى الرَّأس **cephalo-**
مصطلح جامع يفيد العلاقة بالرأس .

مُنَظِّفُ الرَّأس **cephalocathartic**
مصطلح يشر إلى منظف ومطهر للرأس .

1 ـ مِنَ الرَّأس للذَّنَب **cephalocaudad**
2 ـ رأسِيّاً ذنبِيّاً (بالاتجاهين)
1 ـ التتابع من الرأس باتجاه الذيل .
2 ـ انظر تحت caudad .
3 ـ في الاتجاهين الرأسي والذيلي .

رأسِيٌّ ذنبِيّ **cephalocaudal**
إشارة للمحور الطولي للجسم ، في الاتجاه من الرأس للذيل .

قيلة رأسِيَّة **cephalocele**

جنس ذباب من فصيلة النبريات (ذبائب المواشي) .
انظر تحت oestrus .

cephalonia **جَهْضَمَة (ضخامة الرأس والدماغ)**
حالة يكون فيها الرأس كبير بشكل غير طبيعي بفرط تنسج تصلبي في المخ .

cephalo-orbital **رأسِيٌّ حَجاجِيّ**

cephalo-orbitonasal **رأسِيٌّ حَجاجِيٌّ أنفِيّ**

cephalopagus (=craniopagus) **مُتَّحِدُ القِحفَيْن (مسخ)**
انظر تحت craniopagus .

cephalopagus occipitalis **مُتَّحِدُ القَذالَيْن (مَسخ)**

cephalopagus parietalis **مُتَّحِدُ الجِدارِيَّيْن (مسخ)**

cephalopathy **اعْتِلالُ الرَّأس**
أي مرض بالرأس .

cephalopelvic **رأسِيٌّ حَوضِيّ**
يشير إلى العلاقة بين رأس الجنين وحوض الأم .

cephalopharyngeus (=musculus constrictor pharyngis superior) **الرَّأسِيَّة البُلعومِيَّة (=العَضَلَة المُضيِّقَة العُلويَّة لِلبُلعوم)**
العضلة المضيقة البلعومية العلوية .

cephaloplegia **شَلَلُ الرَّأس**
شلل العضلات حول الرأس والوجه .

Cephalopoda **رأسِيّاتُ الأَرْجُل (صِنفٌ مِنَ الرَّخَوِيّات)**
نوع من الرخويات بأذرع عضلية طويلة ، تشمل الأخطبوط الحبار وحيوان النوتي البحري .

cephalorhachidian **رأسِيٌّ سيسائِيّ**
يشير للرأس العمود السيسائي . ويسمى أيضاً (cephalorachidian) .

cephaloridine **سيفالوريدين (مُضادٌّ حَيَوِيّ)**
سيفالوسبورين جزئي التخليق من الجيل الأول ، فعال ضد مدى واسع من الجراثيم موجبة الجرام وبعض سالبة الجرام ، وله واسع من الجراثيم موجبة الجرام وسالبة الجرام ، يستعمل في علاج عداوى المسالك البولية الحادة والمزمنة الناتج عن الممرض الحساس ، ويعطى بالفم .

cephalogram **صورَةُ قِياساتِ الرَّأس**
انظر تحت cephalometric radiograph .

cephalogyric **متعلق بتَدْوير الرَّأس**
تشير إلى حركة تدوير الرأس .

cephalohematocele **قيلَةٌ دَمَوِيَّةٌ رَأسِيَّة**
انظر تحت cephalematocele .

cephalohematoma **وَرَمٌ دَمَوِيٌّ رَأسِيّ**
انظر تحت cephalematoma .

cephalomelus **طَرَفِيُّ الرَّأس (مسخ)**
جنين بطرف إضافي ينمو من الرأس .

cephalomenia **طَمْثٌ رَأسِيّ**
حيض متبذ من الرأس ، مثل النجيج الأنفي أثناء فترة الطمث ، (الحيض) .

cephalometer **مِقياسُ الرَّأس**
جهاز قياس الرأس ، جهيزة توجهية دالة لوضع الرأس في الفحص والقياس الإشعاعي .

cephalometrics **قِياسَاتُ الرَّأس**

cephalometry **قِياسَاتُ الرَّأس**
القياسات العلمية لأبعاد الرأس ، وفي طب الأسنان مجموعة من القياسات الخطية وذات الزوايا تستنتج من دراسة أفلام أشعة الرأس الجانبية والأمامية وتستخدم في تقييم النمو والتطور بالرأس والوجه على أساس الطول وتحديد طبيعة استجابة العلاج السيء في علم الأسنان .

fetal cephalometry **قِياساتُ رأسِ الجَنين**
قياسات قحف الجنين في الرحم بواسطة أفلام الأشعة أو بترجمة صدى التشعع فوق الصوتي التي يتم استقبالها من جانبي القحف .

cephalomotor **مُحَرِّكٌ للرَّأس**
تحريك الرأس ، ويشير لحركة الرأس .

Cephalomyia (=Oestrus) **النَّبْرَة (ذُبابُ المَواشي)**

الإبْرَةُ الرَّأسِيَّة **cephalostyle**
(النهايَةُ الأماميَّةُ لِلحَبْلِ الظَّهْرِي)
النهاية القحفية للقرود .

تكَزُّزٌ رأسِيٌّ **cephalotetanus**
(= تكَزُّزٌ مُخِّيٌّ) **(=cerebral tetanus)**
انظر تحت cephalic tetanus .

سيفالوتين (مُضادٌ حَيَوِيٌّ) **cephalothin**
مضاهيء شبه مصنع للمضاد الحيوي الطبيعي السيفالوسبورين C الفعال ضد نطاق واسع من الجراثيم موجبة الجرام وسالبة الجرام .

رَأسِيٌّ صَدْرِيٌّ **cephalothoracic**
يشير للرأس والصدر .

مُتَّحِدُ الرَّأسِ و الصَّدْرِ **cephalothoracopagus**
(مسخ)
تؤمان ملتصقان متحدان عند الرأس والعنق والصدر .

مُتَّحِدُ الرَّأسِ والصَّدْرِ الثُّنائيُّ الوَجْه **cephalothoracopagus disymmetros**
تؤمان ملتصقان عند الرأس والعنق والصدر ، يتحدان في خط أمامي ، يظهران سطحان أماميان متسعان وسطحان خلفيان ضيقان برأس واحد ، يظهر وجهان وكل منهما يتكون من نصفان أيمن وأيسر من مكونين مختلفين .

مُتَّحِدُ الرَّأسِ والصَّدْرِ الوَحيدُ الوَجْه **cephalothoracopagus monosymmetros**
تؤمان ملتصقان عند الرأس والعنق والصدر بوجه كامل ، مكون من نصفين أيمن وأيسر من مكونين مختلفين ، والوجه الآخر يكون فقط ضامراً .

مِبْضَعُ الرَّأس **cephalotome**
أداة تستخدم لقطع رأس الجنين .

بَضْعُ الرَّأسِ (الجَنينِي) **cephalotomy**
1 ـ قطع رأس الجنين لتسهيل الولادة .
2 ـ تشريح رأس الجنين .

مُوَجِه للنسيجِ الدماغِيّ **cephalotropic**
ذو خاصية للانجذاب للنسيج الدماغي .

هَرْسُ القِحْفِ (الجَنينِي) **cephalotrypesis**

استخدامات تشبه استخدامات صوديوم السيفالوثين . يعطي بالعضل أو الوريد . واستخدامه محدود جداً بسبب سميته للكلية .

سيفالوسْبورين (مُضادٌ حَيَوِيٌّ) **cephalosporin**
أي من المجموعات واسعة الطيف من المضادات الحيوية ذات المقاومة النسبية لإنزيم البنسليناز أصلياً تستخلص من جنس من الفطريات من المكمومات (وهو جنس فطريات ناقصة من فصيلة الطوقيات) ، كان يسمى سابقاً رأسية الأبواغ وهي ذات علاقة بالبنسلينات في بنيةوطريقة العمل ونشاطها المضاد للجراثيم يحدث نتيجة تثبيط يحدث في صورة آصرة متصالبة لوحدات الببتيدوجيكان في جدار الخلية ، والسيفالوسبورينات المتوفرة للاستخدام الطبي هي مشتقات شبه مصنعة للمضاد الحيوي الطبيعي (السيفامايسين سيفوتيتان والسيفوكستين والبيتا لاكتام ماكسولاكتام مدرجة ضمن السيفالوسبورينات لأنها ذات علاقة وثيقة الصلة بهم) .

سيفالوسْبوريناز (إنزيم) **cephalosporinase**
هو إنزيم بيتالاكتاماز الذي يشق بشكل تفضيلي .

داءُ رأسِيَّاتِ الأبْواغ **cephalosporiosis**
انظر تحت acremoniosis .

رَأسِيَّةُ الأبْواغ **Cephalosporium**
(جِنسٌ مِنَ الفطريَّات)
الاسم السابق للمكمومة .

رأسِيَّةُ الأبْواغ المِنْجَلِيَّة **Cephalosporium falciforme**

رأسِيَّةُ الأبْواغ الوَرَمِيَّةُ الحُبَيبِيَّة **Cephalosporium granulomatis**

مُثبِتُ الرَّأس **cephalostat**
جهيزة لتحديد وضع الرأس تستخدم في مبحث التصوير الشعاعي السني والتصوير الضوئي الوجهي ، ولقياسات الرأس وإجراءات أخرى تحتاج لتحديد دقيق للرأس ، انظر أيضاً (Gnathostat) .

cera flava **شَمْعٌ أَصْفَر**

انظر تحت yellow wax .

ceraceous **شَمْعِيُّ الشَّكْل**

ذو مظهر يشبه الشمع .

ceramics **خِزافة**

1ـ تشكيل وتكوين أشياء من الطين أو المواد المشابهة مثل الخزافة .

2ـ الأشياء المصنوعة من الخزف ، والتي تنتج بفعل الحرارة على الخامات الأرضية ، وفيه يمثل السليكون والسيليكات المكون الأساسي .

dental ceramics **خِزافَةُ الأَسْنان**

اَستخدام الخزف والمواد المشابهة في طب الأسنان الترميمي .

ceramidase **سيراميداز (إنزيم)**

إنزيم من صنف الهيدرولاز والذي يحفز تشطر السيراميد لتكوين السفينجوزين وأنيون الحمض الدهني ، كخطوة في تدرك الشحميات السفينجولية . ويتواجد نظير إنزيمي حامضي ، ومتعادل ، وقلوي . يسبب عوز الإنزيم الحامضي (الجسيم الحال) مرضاً ذو خلة كروموسومية جسدية متنحية ، وينتج عنه تجمع السيراميد والجانجليوزيد في داء فاربر يسمى أيضاً (Acylsphingosine deacylase) .

ceramide **سيراميد (كيمياء)**

الوحدة الأساسية للشحميات السفينجولية بها السفينجوزين أو القاعدة المرتبطة بها تلتصق بها . من خلال مجموعة أمينية لسلسلة طويلة من مجموعة الأسيل الدهنية . يتجمع السيراميد بشكل غير سوي في داء فاربر .

ceramodontics **خِزافة الأَسْنان (أسنان)**

cerasin **سيرازين (صمغ نباتي)**

cerasine **سيرازين**

صبغ آزو أحمر يستخدم في تلوين الهيولى .

Cerastes **القَرْناء (جِنْسٌ مِنَ الأفاعي)**

صنف من الثعابين السامة من فصيلة الأفعويات .

Cerastes vipera **القَرْناءُ الأَفْعُوانيّة**

cephaloxia (=torticollis) **صَعَر**

انظر تحت torticollis .

cephamycin **سيفاميسين (مُضادٌ حَيَوِيّ)**

أي من العائلات المتواجدات طبيعياً من المضادات الحيوية المضادة للجراثيم المشتقة من أجناس مختلفة من المتسلسلات (جنس من الجراثيم الشبيهة بالفطريات) أو تنتج شبه مصنعة ، وهي مقاومة للتحلل بإنزيم البيتالاكتاماز . وقد تم معرفة السيفالوميسين A ، B ، C .

cephapirin **سيفابيرين (مُضادٌ حَيَوِيّ)**

مضاهيء جزئي التخليق للمضاد الحيوي الطبيعي سيفالوسبورين C ، والذي يكون فعالاً ضد طيف واسع من الجراثيم موجبة وسالبة الجرام .

Cephidae **زَنابيرُ الحِنْطَة**

جِنْسٌ من الحَشَرات .

cephradine **سيفرادين (مُضادٌ حَيَوِيّ)**

مضاهيء جزئي التخليق للمضاد الحيوي الطبيعي سيفالوسبورين C ، والذي يكون فعالاً ضد طيف واسع من الجراثيم موجبة وسالبة الجرام . يستخدم في علاج التهابات المسالك البولية والجلد والأنسجة الرخوة بسبب مراضات حساسة ، يعطى بالفم أو بالعضل أو بالوريد .

ceptor **مُتقبل (مُسْتقبِلٌ في الجهاز العصبي)**

لاحقة تشير إلى مستقبل ، مع الجذر السابق له لتخصيص النوع .

chemical ceptor **مُتَقَبِّلٌ كيميائيّ**

contact ceptor **مُتَقَبِّلٌ بِالتَّماس**

distance ceptor **مُتَقَبِّلٌ عَنْ بُعْد ؛ مُتَقَبِّل بُعاديّ**

nerve ceptor **مُتَقَبِّلٌ عَصَبيّ**

cera **شَمْع**

انظر تحت wax .

cera alba **شَمْعٌ أَبْيَض**

انظر تحت white wax .

cerasus **كَرَز**
(جنس أشجارٍ مثمرة من الفصيلة الوردية)
انظر تحت cherry .

cerat- **1ـ سابقة بمعنى القَرْن**
2ـ سابقة بمعنى الشَّمْع

cerate **شُمَاعَة (مَرْهَمٌ شَمْعِيّ)**
(=ceratum)
مستحضر طبي للإستعمال الخارجي ، والذي يحضر بقاعدة دهنية أو شمعية أو كلتيهما ويتوسط بين المرهم واللزقة .

simple cerate **شُمَاعَةٌ بَسِيطَة**
خليط من شحم الخنزير المجوى والشمع الأبيض ذائبان معاً .

Turner's cerate **شُمَاعَةُ تيرنَر**
انظر تحت calamine ointment .

ceratectomy **قطعُ القَرْنِيَّة**
(=keratectomy)
انظر تحت keratectomy .

cerated **مُشَمَّع**
انظر تحت keratin .

ceratin **كيراتين**
(=keratin)
انظر تحت keratin .

Ceratiomyxa **المخاطيَّة المتقرنة**
(جِنسٌ مِنَ الحيَوانات الأوالِي)

ceratitis **التِهابُ القَرْنِيَّة**
(=keratitis)

Ceratium **المتقوّرنة**
(جِنسٌ مِنَ الحيَوانات الأوالِي)

cerato- **سابقة بمعنى القَرْن**
(=kerato-)

ceratocricoid **قَرْنِيٌّ حلقِيّ**
(متعلق بالقرن الخلفي للغضروف الدرقي وبالغضروف الحلقي)
انظر تحت musculus ceratocricoideus .

ceratocricoideus **القَرْنِيَّة الحلقِيَّة (عضَلة)**
انظر تحت ceratocricoid .

ceratoglossus **قَرْنِيٌّ لِسانِيّ (قسم من عضلة)**

ceratohyal **قَرْنِيٌّ لامِيّ (قسم من عضلة)**
يتعلق بالقرن الصغير للعظم اللامي .

Ceratomyxa **المخاطيَّة المتقرنة**
(جِنسٌ مِنَ الحيَوانات الأوالِي)

ceratopharyngeus **القَرْنِيَّة البُلعوميَّة (عضَلة)**
يتعلق بالقرن السفلي للغضروف الدرقي والبلعوم .
انظر تحت musculus .

Ceratophyllus **الكُرَّاش (جِنسٌ مِنَ البَراغيث)**
جنس من البراغيث ، تشتمل الآن على براغيث الطيور فقط ، وكانت تحوي براغيث الطيور وبراغيث الثدييات الصغيرة .

Ceratophyllus gallinae **الكُرَّاشُ الدَّجاجِيّ**
من الأجناس التي تصيب الدواجن والأسنان .

Ceratophyllus punjabensis **الكُرَّاشُ البِنْجابِيّ**
هو برغوث الفأر في الهند .

Ceratopogonidae **المتلاحيَة (فصيلة مِنَ الحشَرات)**
الذقطيات (فصيلة من الذباب) .

ceratum **شُمَاعَة (مَرْهَمٌ شَمْعِيّ)**
(=cerate)
مستحضر طبي للاستعمال الخارجي يحضر بقاعدة دهنية أوشمعية أو كلتيهما ، يتوسط بين المرهم واللزقة .
انظر تحت cerate .

cerberin **سِيرْبيرين**
(=cerberine)
قلواني سام من الشجرة الأسيوية (Cerbera odallam) ، وهو مقوي للقلب .

cercaria **ذانِبَة**
(pl.cercariae) (ج: ذوانِب)
(أحدُ أطوار البِلهارْسِيَّات)
المرحلة اليرقية النهائية العائمة الحرة للطفيل المثقوبة ، وتتكون من جسم وذيل . بعض هذه الذوانب تتكيس فوق النوابت المائية ، وتخترق جلد السمك أو أنسجة الحيوانات مفصلية الأرجل المائية لتكون خليفة الذانبة المتكيسة .

مُذَنَّبَةُ الأبْواغِ البَقْدونسيَّة **Cercospora apii**
(نوعٌ من الفطريَّاتٍ)

جنس من الفطريات الناقصة من صنف الفطريات الخوطية هي تسبب لفحة البقدونس (Celery blight) وقد تسبب داء الخوطاء في الإنسان .

مُذَيَّلَةُ الأبْواغِ (نوعٌ من الفطريَّاتٍ) **Cercosporalla**

أشَرَة **cercus**
(ج: أشَر) **(pl.cerci)**
(بُنْيَةٌ شَعْرِيَّةُ الشَّكل)

زائدة تشبه الهلب الصلب قرب الذيل في معظم الحشرات وبعض الحيوانات مفصلية الأرجل الأخرى ، وهي ذات وظائف مختلفة وتشمل المستقبلات الميكانيكية والجماع .

جُمْدَةٌ شَمْعِيَّة **cerea flexibilitas**
(=catalepsy)

التصلب الجسمي الذي يُرى في بعض الحالات الوخيمة من الفصام الجامودي ، الذي يحافظ فيه المريض على أي وضع يوضع فيه والأطراف تكون حركتها ثقيلة .

حُبوب **cereals**

1 ـ يشير للحبوب الصالحة للأكل .
2 ـ أي نبات من عائلة الأعشاب (نجليات) لها حبوب صالحة للأكل .
3 ـ بذور أو حبوب هذه النباتات .

مُخَيخات **cerebella**
(ف: مُخَيخ) **(sing.cerebellum)**

جمع مخيخ (Cerebellum) .

مُخَيْخِيّ **cerebellar**

تشير إلى المخيخ .

سابقة بمعنى المُخَيْخ **cerebelli-**

صادِرٌ منَ المُخَيخ؛ مُبْتَعِدٌ عن المُخَيْخ **cerebellifugal**

تميل أو تصدر من المخيخ .

واردٌ للمُخَيخ؛ مُتَّجِهٌ نَحْوَ المُخَيْخ **cerebellipetal**

واردة للمخيخ ومتجه نحو المخيخ .

التِهابُ المُخيخ **cerebellitis**

سابقة بمعنى المُخَيْخ **cerebello-**

صيغة اتحادية تعني العلاقة بالمخيخ .

تخترق ذانبة البلهارسية مباشرة جلد العائل (المضيف) النهائي بدون تكوين خليفة الذانبة .

مُبيدُ الذَّوانِب **cercaricidal**

مدمر للذوانب .

تفاعُلُ انْتِباجِ الذَّوانِب **cercarienhullenreaktion**

اختبار للبلهارسية المنسونية ، والذي تستخدم لقياس فاعلية المعالجة الكيميائية المضاد لداء البلهارسية . عندما توضع ذوانب البلهارسية المنسونية في المختبر في اتصال مع مصل القرود أو الإنسان المصاب بالبلهارسية المنسونية ، يتكون غلاف شفاف حول كل ذانبة .

أشَر **cerci**
(ف: أشَرَة) **(=sing.cercus)**
(بنى شعرية الشكل)

تطويق **cerclage**

إحاطة جزء بحلقة أو عروة ، مثل الإحاطة غير الكاملة لعنق الرحم بخيط أو ربط نهايتي كسر عظمي بحلقة معدنية أو عروة سلك .

سابقة بمعنى الذَّنَب **cerco-**

سابقة تشير لعلاقة بالذيل أو بنيان شبيه بالذيل .

الكيسانِيَّةُ المُذَنَّبَة **cercocystis**
(=cysticercoid)

انظر تحت cysticercoid .

كيسانِيَّة (آخِرُ أطوارِ الدُّودَةِ الشَّريطيَّة) **cercoid**

الطور الأخير في تطور الدودة الشريطية .

المُذَيَّلَة (جِنْسٌ منَ الحيَوانات الأوالي) **Cercomonas**


القِرْدوحِيَّات **Cercopithecoidea**
(عِمارَةٌ مِنْ رُتبَةِ الرَّئيسات)

الرئيسات عائلة (فصيلة) من الرئيسات ، تشمل قرود العالم القديم (طائفة القردوحيات) ، وبعض الأنواع منها جنس المكاك (Macaca) ، والذي يستخدم كحيوانات مختبرية .

القِرْدوح (جِنْسٌ منَ النَّسانيس) **Cercopithecus**

عضو من فصيلة القردوحيات .

البُوَيغاءُ الأديسونيَّة **Cercosphaera addisoni**
(نوعٌ من الفطريَّات)
(=Microsporum audouini)



Ceratophyllus الكُرَّاش (جِنْسٌ مِنَ البَراغيث)

المُخَيخ cerebellum TA

(ج: مُخَيخات) (pl.cerebella)

الجزء من المخ المتوسط ، والذي يشغل الحفرة القحفية الخلفية خلف جذع المخ وهو مسؤول عن توافق الحركة ، وهو كتلة مشقوقة تتكون من جسم والذي يتكون بدوره من شريط أوسط ضيق (الدودة) ، وفصين جانبين (نصفي الكرة) تتصلان بجذع المخ بثلاثة أزواج من السويقات (ذنبي ، وسطي ، منقاري) . وظيفياً ينقسم المخيخ إلى فص قحفي (أمامي) مفصول بالشق الأولي عن الفص الذنبي (الخلفي أو الأوسط) ، والذي بدوره يكون مفصول عن الفص الندفي العقيدي بالشق الظهري الجانبي (الخلفي الجانبي) .

1ـ سابقة بمعنى المخّ (نصفا الكرة المخية) cerebr-

2ـ سابقة بمعنى: الدماغ

(مجموع المخ و المخيخ و البصلة)

1ـ أمْخاخ (ف: مُخّ) cerebra

2 ـ أدمغة (ف: دماغ) (sing.cerebrum)

انظر تحت cerebrum .

صادِرٌ مِنَ المخَيخ؛ مُبْتَعِدٌ عن المخَيْخ cerebellofugal

صادر من المخيخ ومبتعد عن المخيخ .

انظر تحت cerellifugal .

1ـ مُخَيخِيٌّ بَصَلِيٌّ cerebellomedullary

2ـ مُخَيخِيٌّ نخَاعِيٌّ

مُخَيخِيٌّ زيتونِيٌّ cerebello-olivary

يوصل أو يصدر من المخيخ للجسم الزيتوني .

مُخَيخِيٌّ جِسرِيٌّ cerebellopontile

انظر تحت cerebellopontine .

مُخَيخِيٌّ جِسرِيٌّ cerebellopontine

يوصل أو يصدر من المخيخ للجسر (Pons) .

مُخَيخِيٌّ حَمْراوِيٌّ cerebellorubral

يوصل أو يصدر من المخيخ للنواة الحمراء .

مُخَيخِيٌّ حَمْراوِيٌّ نخاعِيٌّ cerebellorubrospinal

يوصل أو يصدر من المخيخ للنواة الحمراء ثم للنخاع الشوكي .

مُخَيخِيٌّ نخاعِيٌّ cerebellospinal

يوصل أو يصدر من المخيخ للنخاع الشوكي .

مُخَيخِيٌّ مِهادِيٌّ cerebellothalamic

مُخَيخِيٌّ دِهْليزِيٌّ cerebellovestibular

cerebral — 1ـ مُخيّ
2ـ دماغِيّ
له علاقة أو يتصل بالمخ .

cerebral artery	شِرْيانٌ مُخِّيّ
cerebral congestion	احْتِقانٌ دماغِيّ
cerebral cortex	قِشْرَةُ المُخ
cerebral hemisphere	نِصْفُ كُرَةِ المَخ
cerebral hemorrhage	نَزْفٌ دماغِيّ
cerebral palsy	شَلَلٌ دَمَاغِيّ
cerebral peduncle	سُوَيقَةٌ دماغِيَّة
cerebral vein	وَريدٌ مُخِّيّ

cerebration — افتِهام
النشاط الوظيفي للمخ ، والتفكير والنشاط العقلي .

unconscious cerebration	افْتِهامٌ لاشُعوريّ

cerebri- — 1ـ سَابقة بمعنى المُخّ
2ـ سابقة بمعنى الدمَاغ

cerebriform — دِماغِيُّ الشَّكل
يشبه سطح المخ .

cerebrifugal — 1ـ صادِرٌ مِنَ الدمَاغ
2ـ صادِرٌ مِنَ المُخ
تصدر من المخ أو تصل للمخ .

cerebripetal — 1ـ وارِدٌ للدمَاغ
2ـ وارِدٌ للمُخ
ترد للمخ .

cerebritis — 1ـ التِهابُ المُخ
2ـ التِهَابُ الدمَاغ

saturnine cerebritis	الْتِهابُ الدِّماغِ النَّاجِمُ عن التَّسَمُّمِ بالرَّصاص

cerebro- — 1ـ سابقة بمعنى المُخّ
2ـ سابقة بمعنى الدمَاغ
صيغة اتحادية تعني العلاقة بالمخ .

cerebrocardiac — دِمَاغِيٌّ مُخيٌّ قلْبيّ
يشير للعلاقة بالمخ والقلب .

cerebrocerebellar — مُخيٌّ مُخَيخِيّ
يشير للعلاقة بالمخ والمخيخ .

cerebrocuprein — سيريبْرُوكوبْرئين
(بروتين دماغي يشتمل على النحاس)
بروتين يحتوي على النحاس ، ويعزل من مخ الإنسان والبقر .

cerebrogalactose — سيريبْرُوجالاكتوز

cerebrogalactoside — سيريبروجالاكتوزيد
(=cerebroside) — (=سيريبْروزيد)

cerebrohyphoid — شَبيهُ نسيج الدماغ

cerebroid — شَبِيهُ الدمَاغ
يشبه مادة المخ .

cerebrology — عِلمُ الدمَاغ
مجموع المعلومات المتعلقة بتركيب ووظيفة المخ .

cerebroma — وَرَمٌ دِمَاغِيّ

cerebromacular — دِمَاغِيٌّ بُقعِيّ
انظر تحت maculocerebral .

cerebromalacia — 1ـ تَليُّنُ المخ
2ـ تَلَيُّنُ الدماغ
(=encephalomalacia)
تلين غير سوي لمادة المخ .

cerebromedullary — دِمَاغِيٌّ نُخاعِيّ
(=cerebrospinal)

cerebromeningeal — دِمَاغِيٌّ سِحائِيّ
يشير أو يتعلق بالمخ وأغشيته .

cerebromeningitis — الْتِهابُ الدمَاغ و السَّحايا
انظر تحت meningaencephalitis .

cerebron — سيريبرون
(=phrenosin) — (=فرينُوزين)

cerebro-ocular — دِمَاغِيٌّ عَيْنِيّ
يشير للمخ وللعين .

cerebropathia — اعتِلالُ الدمَاغ
انظر تحت cerebropathy .

cerebropathia psychica toxemica (=Korsakoff's psychosis)	اعْتِلالُ الدِّمَاغِ النَّفْسيُّ السُّمِّيّ (= ذُهَانُ كُورْساكُوف)

انظر تحت korsakoff's psychosis .

cerebropathy — اعتِلالُ الدمَاغ

النخاعي .

cerebrostomy **فغْرُ المخ**

عمل فتحة اصطناعية في المخ .

cerebrotendinous **1ـ دِماغِيٌّ وتَري**

2ـ مُخيٌّ وَتَري

يشير إلى المخ والأوتار .

cerebrotomy **بَضْعُ الدماغ**

انظر تحت encephalotomy .

cerebrovascular **1ـ دِماغِيٌّ وعائِيّ**

2ـ مُخيٌّ وعائِيّ

يشير إلى الأوعية الدموية المخية أو الدماغية .

cerebrum **1ـ المخّ (ج: أمْخاخ)**

(pl.cerebra) **2ـ الدماغ (ج: أدْمِغة)**

1ـ الجزء الرئيسي للمخ ، والذي يشغل الجزء العلوي من التجويف القحفي ، ونصفي الكرة ، والتي تتحد بواسطة الجسم الثفني ، ويكون الجزء الاكبر للجهاز العصبي المركزي في الإنسان ، ويتطور من الدماغ الإنتهائي للجنين (Telencephalon) ، وفي التسمية الرئيسية (الرسمية) فإن المصطلح يعتبر بديل للدماغ الإنتهائي .

2ـ يطلق المصطلح أحياناً على الدماغ المقدم (Prosencephalon) التالي للمرحلة الجنينية ، والدماغ المتوسط (Mesencephalon) معاً أو للمخ كله .

cerebrum exsiccatum **مُخٌّ مُجَفَّف**

cerecloth **ضِمادٌ مُشَمَّع**

قماش مغمور في الشمع ويتم تعقيمه ويستخدم في تضميد الجروح .

cereoli **مُوَسعاتٌ مُشَرَّبَة بالدَّواء**

جمع موسع مشرب بالدواء (Cereolus) .

cereolus **مُوَسعٌ مُشَرَّبٌ بالدَّواء**

cereous **شَمْعِيّ**

cerevisia **بيرة**

cerevisiae **متعلق بالبيرة**

cerevisiae fermentum **خَميرَةُ البيرَة**

أي اضطراب في المخ .

cerebrophysiology **1ـ فيزيولوجيا الدماغ**

2ـ فيزْيُولوجْيا المخ

cerebropontile **مُخيٌّ جِسْرِيّ**

يشير إذا كان له علاقة بالمخ والجسر .

cerebropontine **مُخيٌّ جِسْرِيّ**

cerebropsychosis **ذُهانٌ دِماغِيّ**

cerebrorachidian **دِماغِيٌّ نُخاعِيّ**

(=cerebrospinal)

انظر تحت cerebrospinal .

cerebroretinal **مُخيٌّ شَبَكِيّ**

cerebrosclerosis **تَصلُّبُ المخ**

تصلب مرضي بمادة المخ .

cerebroscope **مِنْظارُ المخ**

cerebrose **سيريبْروز**

(=galactose) **(= جالاكتوز)**

cerebroside **سيريبْرُوزيد (كيمياء)**

الشحيمات السفينجولية الذي فيها تكون المجموعة الرئيسية مرتبطة بالسيراميد ، إما جلوكوز أحادي السكاريد أو جالاكتوز . السيريبروزيد تكون متوافرة بكثرة في خلايا غشاء المخ والأنسجة العصبية ، خاصة غمد الميالين ، ولكنها توجد أيضاً في الأنسجة الأخرى .

انظر تحت glucocerebroside .

انظر تحت galactocerebroside .

cerebrosidosis **داءُ سيريبْرُوزيد**

التشحمن (تراكم الشحم في النسيج) ، والذي يكون تجمع الشحوم في الجسم غالباً ما يكون من الكيرازين مثل داء جوشيه .

cerebrosis **مَرَضٌ مُخيّ**

انظر تحت cerebropathy .

cerebrospinal **دِماغِيٌّ نُخاعِيّ**

يشير إلى المخ والحبل النخاعي ، وتسمى أيضاً (Myeloencephalic) ، (Encephalospinal) .

cerebrospinant **عِلاجُ دِماغِيٍّ نُخاعِيّ**

أي دواء أو عامل يؤثر على المخ الحبل

شَهادَةُ الحاجَة **certificate of need**

وثيقة قانونية تستعمل في بعض البلاد يستفيد منها بعض الناس لتلقي مساعدات الحكومة أو القبول في بعض البيوت التمريضية الصحية بلا أجر لحاجة الشخص إلى ذلك دون أن يتمكن من دفعه للحاجة .

شَهادَةُ الوَفاة **death certificate**

وثيقة قانونية تبين تاريخ الوفاة وسببها المباشر وغير المباشر .

شَهادَةٌ طِبِّيَّة **medical certificate**

وثيقة صَحية قانونية تتضمن معلومات صحية عن الشخص وحاجته للراحة أو تبين درجة عجزه .

إشْهاد **certification**

مصدر فعل الشهادة .

امْتِحانُ الشَّهادَة **certification examination**

اَلفحص الذي يجب على طالب الشهادة أن يتجاوزه بنجاح .

مُجاز **certified**

صفة الحاصل على الشهادة .

مُسْتَشْفَى مُجاز **certified hospital**

المستشفى المرخص بالعمل واستقبال المرضى ومعالجتهم وفق شروط الدوائر الرسمية المانحة لرخصة العمل كوزارة الصحة مثلاً .

تِقْنِيُّ التَّخْدير المُجازُ القانونَيّ **certified registered anesthetist**

الخبير التقني الحاصل على الشهادة القانونية التي تمنحه حق ممارسة العمل بتخدير المرضى في العمليات الجراحية . وهو مسجل في وزارة الصحة .

مُمَرِّضَةٌ مُجازَةٌ قانونيَّةٌ **certified registered nurse**

المرضة أو الممرض الحاصل على شهادة في التمريض ومسجل لدى الدوائر المختصة كوزارة الصحة .

تِقْنِيٌّ جراحيٌّ مُجاز **certified surgical technologist**

اليقرون (جِنسٌ مِنَ الحلزون) **Cerithidia**

جنس من القواقع حلزونية المحار من عائلة اليقرون من شعبة ستربتونيرا ، توجد في المياه المالحة في المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية .

اليَقْرونُ المُحَزَّم **Cerithidia cingulate**

نوع ياباني من القواقع والتي تمثل المضيف المتوسط الرئيسي للمثقوبة (الخيفانة الخيفاء) .

السيريوم (العنصر الثامن والخمسون) **cerium**

عنصر معدني رمزه Ce ، رقمه الذري 58 ، ووزنه الذري 140.12 .

سابقة بمعنى الشَّمْع **cero-**

سيرُويد **ceroid**

حمض شحمي ، أول ما اكتشف في الكبد المتليف للفئران المصابة بعوز الكولين ، ومن المعروف أنها توجد في بعض حالات تشمع الكبد لدى البشر .

شَحْمِيٌّ شَمْعِيّ **cerolipoid**

صفة مشتركة منسوبة للشحم والشمع معاً .

وَرَمٌ شَمْعِيّ **ceroma**

صُنْعُ النَّماذِجِ التَّشْريحيَّةِ الشَّمْعِيَّة **ceroplasty**

تشكيل نموذج تشريحي من الشمع .

سيروتين **cerotin**

واجِبُ التَّبْليغ (مَرَض) **certifiable**

قابل للتبليغ عنه ، يقال عن الأمراض العدوائية ، وفي تلك الحالة يجب التبليغ عنه لمديري الصحة العامة .

شَهادَة **certificate**

وثيقة يتضمن محتواها الشهادة لصاحبها بامتلاكه قدرة أو صفة أو ملكية لشيء محدد من الدوائر المختصة بالمضمون .

شَهادَةُ المِيلاد **birth certificate**

وثيقة تتضمن تاريخ ميلاد الشخص الذي تعطى له هذه الشهادة .

شَهادَةُ التَّأمين **certificate of insurance**

وثيقة تأمين من شركة تأمين تمنحها للمشترك بها وفق نوع التأمين الذي تضمنه له كالتأمين ضد الأخطار أو التأمين الصحي .

الصملاخ .
2ـ العامل الذي يحل الصملاخ في الصماخ السمعي الظاهر .

ceruminoma — **وَرَمُ الغُدَّةِ الصملاخِيَّة**

ورم الغدة الصملاخية .

ceruminosis — **كثرة الصمْلاخ**

كثرة أو اضطراب إفراز الصملاخ .

ceruminous — **صِمْلاخِيّ**

انظر تحت ceruminal .

ceruse — **إسْفيداج (مركب رصاصي)**

الكربونات الأساسية للرصاص ، والرصاص الأبيض ، وهو مستحضر تجميلي يستخدم حالياً .

cervic- — **1ـ سابقة بمعنى الرَّقَبَة (الناحية التشريحية بين الرأس والجسد)**
2ـ سابقة بمعنى العنق) جزء متضيق يصل بين جزئين من بنية تشريحية واحدة)

طليعة مصطلح تدل على معنى العنق أو الرقبة آو آي عنق ضيق بين توسعين .

cervical — **1ـ رَقَبِيّ**
2ـ عُنُقِيّ

1ـ يشير للعنق .
2ـ يشير للعنق أو لعنق أي عضو أو بنيان .

cervical artery — **شِرْيانٌ رَقَبِيّ**

شَريان يَتوزع في الرقبة منه الشريان الرقبي العميق (Deep cervical artery) ، ومنه الشريان الرقبي الصاعد (Ascending cervical artery) ، ومنه الشريان الرقبي السطحي (Superficial cervical artery) ، ومنه الشريان الرقبي المعترض (Transverse cervical artery) ، ولكل واحد منهم منشؤه وتفاغراته.

cervical curvature — **إنْحناءٌ رَقَبِيّ**

الانحناء الطبيعي للعمود الرقبي ، والذي يكون على شكل قوس تحدبه للأمام ، وقد تتشكل بعض الانحناءات المرضية بسبب الأمراض أو سوء الوضعية .

من يحوز على شهادة تخوله القيام ببعض الأعمال الجراحية الصغرى عادة ، كالختان مثلاً .

cerulein — **سيروليين (مادة مقبضة للمرارة)**

أميد عشاري الببتيد ، والذي يعزل من جلد الضفادع ، وهو ببتيد مضاهئ للكوليسيستوكينين والجاسترين (هرمون يفرز من المعدة) . وهو ذو إثارة قوية لإنقباض المرارة في الثدييات .

ceruloplasmin — **سيرولوبْلازمين (إنزيم)**

جلوبولين أزرق داكن ألفاح بوحدة فرعية واحدة ، به ستة ذرات من النحاس يتواجد في بلازما الدم ، وبالرغم من دراسته بشكل مكثف فإن وظيفته لا زالت غير واضحة ، ويعتقد أنه يقوم بنقل والمحافظة على مستوى النحاس في الأنسجة ويظهر نشاط مؤكسد الحديد ، وقد يؤكسد مكونات غير مشبعة أخرى ، ومستوى السيرولوبلازمين تقل في داء ويلسون ، وفي التسمية الإنزيمية يسمى مؤكسد الحديد (Ferroxidase) .

cerumen — **صِمْلاخ**

الإفراز المشابه للشمع الذي يوجد في الفتحة الخارجية للأذن ، يسمى أيضاً شمع الأذن (Ear wax) .

impacted cerumen — **صِمْلاخٌ مُنْحَشِر**

الصملاخ المتجمع الذي يكون كتلة صلبة تلتصق بالقناة الخارجية للأذن .

inspissated cerumen — **صِمْلاخٌ مُتَثَخِّن**

الصملاخ المتجمع الذي يكون كتلة صلبة تلتصق بالقناة الخارجية للأذن .

ceruminal — **صِمْلاخِيّ**

من أو يشير إلى الصملاخ .

ceruminolysis — **حَلُّ الصمْلاخ**

انحلال الصملاخ في الصماخ السمعي الظاهر .

ceruminolytic — **حالُّ الصمْلاخ**

1ـ يشير إلى أو يختص بـ أو يسرع انحلال

أعْناق — **cervices**
(ف: عُنُق) (sing.cervix)
انظر تحت cervix .

التِهابُ عُنُقِ الرَّحِم — **cervicitis**
يسمى أيضاً (Tachelitis) .

اَلْتهابُ عُنُقِ الرَّحِم اَلوَرَمِيُّ الحُبَيبي — **granulomatous cervicitis**
عدوى عنق الرحم الحبيبي والتي تشمل الدرن ، والزهري والورم الحبيبي الإربي .

اَلْتهابُ عُنُقِ الرَّحِم الرَّضْحِيُّ — **traumatic cervicitis**
التهاب عَنق الرحم اللانوعي بسبب الرضح ، أو التالي لبعض الإجراءات مثل التشعع أو الكي .

1 ـ سابقة بمعنى الرَّقَبَة — **cervico**
(الناحية التشريحية بين الرأس والجسد)
2 ـ سابقة بمعنى العنق
(جزء متضيق يصل بين جزئين من بنية تشريحية واحدة)
صيغة إتحادية للإشارة للرقبة أو عنق الرحم .

رَقَبِيٌّ أُذنيّ — **cervicoaural**

رَقَبِيٌّ أُذنيّ — **cervicoauricular**

رَقَبِيٌّ إبْطِيّ — **cervicoaxillary**
يشير للرقبة والإبط .

رَقَبِيٌّ عَضُدِيّ — **cervicobrachial**
يشير للرقبة والذراع .

حَيْدٌ (حرف) مينائيٌّ عُنُقِيٌّ — **cervical enamel ridge**
التبارُز بين الميناء السني وعنق السن .

رقاقةٌ عُنُقيَّة — **cervical foil**
رقاقة معدنية تصل إلى عنق السن ـ (في صناعة الأسنان) .

خَطٌّ عُنُقيّ — **cervical line**
خط تشَريحي غير منتظم ومتواصل يميز خط نهاية عنق التاج السني والوصل الملاطي الميناَئي .


ضَفيرةٌ رَقَبيَّة — **cervical plexus**
ضفيرَة عَصبية تتكون من التقاء الجذور العصبية الرقبية في جانبي الرقبة ، وتعصب أعلى الصدر والطرفين العلويين .

الثُّلُثُ العُنُقيّ — **cervical third**
القسم السَفلي الأقرب لعنق السن من الأقسام الأفقية الثلاثة لسطح تاج السن .

ألَمُ الرَّقَبَة — **cervicalgia**
أي ألم يصدر عن الرقبة .

1 ـ رَقَبيّ — **cervicalis TA**
2 ـ عُنُقيّ
1 ـ يشير للعنق .
2 ـ يشير للعنق أو لعنق أي عضو أو بنيان .

استِئصالُ عُنُقِ الرَّحِم — **cervicectomy**
يسمى أيضاً (Trachelectomy) .



Cerumen الصملاخ

cervicobrachialgia **أَلَمُ الرَّقَبَةِ و العَضُد**

ألم الرقبة ، والذي يشع للذراع نتيجة الضغط على الجذور العصبية للحبل النخاعي للرقبة .

cervicobuccal **عُنُقِيٌّ شِدْقِيّ(أسنان)**

(=buccocervical)

متعلق بالسطح الخذي أو الشدقي من عنق السن الخلفية أو اللثة .

انظر تحت buccocervical .

cervicocolpitis **التِهابُ العُنُق والمَهْبِل**

cervicocolpitis emphysematosa **أَلْتِهابُ العُنُق والمَهْبِل النُّفاخِيّ**

التهابَ المهبل النفاخي مع آفة شبيهة تحدث تحت المخاطية الحرشفية لعنق الرحم.

cervicodorsal **رَقَبِيٌّ ظَهْرِيّ**

تعود إلى العنق والظهر .

cervicodynia **أَلَمُ الرَّقَبَة**

ألم في الرقبة ، ويسمى أيضاً (Trachelodynia) .

cervicofacial **رَقَبِيٌّ وَجْهِيّ**

يعود إلى العنق والوجه .

cervicohumeral **رَقَبِيٌّ عَضُدِيّ**

صفة منسوبة للرقبة والعضد معاً .

cervicoincisal **عُنُقِيٌّ قاطِعِيّ (أسنان)**

cervicolabial **عُنُقِيٌّ شَفَوِيّ (أسنان)**

متعلق بالسطح الشفوي لعنق السن الأمامية أو اللثة .

cervicolingual **عُنُقِيٌّ لِسانِيّ (أسنان)**

(=linguocervical)

متعلق بالسطح اللساني من عنق السن أو اللثة .

cervicomuscular **متعلق بعَضَلاتِ الرَّقَبَة**

cervico-occipital **رَقَبِيٌّ قَذالِيّ**

يعود إلى العنق والقذال .

cervico-orbicular **رَقَبِيٌّ حَجاجِيّ**

صفة منسوبة للرقبة والحجاج معاً .

cervicoplasty **رَأْبُ الرَّقَبَة**

جراحة تقويمية في العنق .

cervicoscapular **رَقَبِيٌّ كَتِفِيّ**

تعود إلى العنق والكتف .

cervicothoracic **رَقَبِيٌّ صَدْرِيّ**

تعود إلى العنق والصدر .

cervicouterine **عُنُقِيٌّ رَحِمِيّ**

صفة منسوبة للرحم وعنق الرحم معاً .

cervicovaginal **عُنُقِيٌّ مَهْبِلِيّ**

صفة منسوبة لعنق الرحم والمهبل معاً .

cervicovaginitis **التِهابُ العُنُق والمَهْبِل**

التهاب يتضمن عنق الرحم والمهبل معاً .

cervicovesical **عُنُقِيٌّ مَثانِيّ**

cervimeter **مِقْياسُ عُنُقِ الرَّحِم**

مقياس يقيس مقدار توسع عنق الرحم أثناء تطور المخاض .

cervix TA **عُنُق**

(pl.cervices) **(ج: أَعْناق)**

1 ـ مصطلح بديل يعني العنق .

2 ـ جزء محصور في جزء من الجسم أو الجهاز .

3 ـ عنق الرحم .

4 ـ مصطلح يستعمل في التشريح السني لتعريف الملتقى بين التاج وجذر السن ، وهو عنق السن ، وهو ذلك الجزء الضيق من السن ، حيث يلتقي السن باللثة ، ويقع عند الملتقى الملاطي الميناني .

cervix columnae posterioris medullae spinalis TA **عُنُقُ العَمودِ الخَلْفِيِّ لِلنُّخاع**

ويسمى عُنُقُ القَرْنِ الظَّهْرانِيِّ لِلنُّخاع (Cervix cornus dorsalis medullae spinalis) ، وهو المنطقة الضيقة من القرن الظهراني للنخاع .

cervix cornus dorsalis medullae spinalis TA **عُنُقُ القَرْنِ الظَّهْرانِيِّ لِلنُّخاع**

انظر تحت cervix cornus posterioris medullae spinalis .

cervix dentis TA **عُنُقُ السِّن**

المنطقة المتضيقة قليلاً في اتحاد التاج والجذور أو جذور السن ، تسمى كذلك عنق سني .

cervix glandis **عُنُقُ الحَشَفَة**

(=collum glandis penis)

بَالوعَة (حُفرَة تصَريف) **cesspool**

انظر تحت cesspit .

مبيدُ الشُّراطِيَّات **cesticidal**

مبيد للشريطيات (Cestodes) .

الشُّراطِيَّات **Cestoda**

(صُنَيفٌ مِنَ الديدان المسَطَّحَة)

طائفة فرعية من الشريطيات ، والتي تضم الديدان الشريطية الحقيقية التي تملك رأس أو شريط (Scolex) ، أوقطع تحتوي على الأعضاء التناسلية ، والديدان البالغة منها تكون طفيلية داخلية في القناة الهضمية والقنوات المصاحبة في المضيفات الفقارية ، وربما تتواجد مراحلها اليرقانية في مختلف الأجهزة أو الأنسجة ، ومن الرتب الإحدى عشر ، تحتوي اثنان منها على أنواع تتطفل على الإنسان والحيوانات الأخرى ، تسمى أيضاً (Eucestoda) .

الشَّرَطاوات **Cestodaria**

(صُنَيفٌ مِنَ الديدان المسَطَّحَة)

طائفة فرعية من الديدان الشريطية ، وهي الديدان الشريطية غير المتقطعة من طائفة الشريطيات ، وتكون طفيلية داخلية في الأمعاء وجوف مختلف الأسماك البدائية ونادراً في الزواحف .

شُراطِيَّة (دودة) **cestode**

1 ـ ديدان شريطية ، أي عضو من اصناف الشريطيات أو الديدان المسطحة .

2 ـ شريطانية (دودة من الديدان المسطحة) .

داءُ الشُّراطِيَّات **cestodiasis**

إصابة بالديدان الشريطية .

عِلمُ الشُّراطِيَّات **cestodology**

الفرع من العلم الذي يختص بالدراسة العلمية للشريطيات .

شُرَيطانِيَّة **cestoid**

دودة من الديدان المسطحة يشبه الدودة الشريطية .

الشُّرَيطانِيَّات **Cestoidea**

(صِنْفٌ مِنَ الديدان المسَطَّحَة)

انظر تحت collum glandis penis .

عُنُقُ المِطْرَقَة **cervix mallei**

(=collum mallei)

تسمى أيضاً (Collum mallei) ، (Neck of malleus) ، وهم القسم المتضيق بين رأس المطرقة الأذنية وجسم المطرقة .

عُنُقُ المِحْوار **cervix of axon**

الجزء المتضيق من المحوار ، قبل بداية الغمد الميالِيني .

عُنُقُ الرَّحِم **cervix uteri TA**

وتسمى أيضاً (Neck or cervix of uterus) رقبة عنق الرحم ، وهي النهاية السفلية للرحم بين البرزخ (Isthmus) وفتحة الرحم .

عُنُقُ المَثانَة **cervix vesicae TA**

هو عنق المثانة البولية (Neck of urinary bladder) ، وهو جزء متضيق من المثانة يتكون من التقاء سطحها السفلي الجانبي قبل فتحة الإحليل .

عُنُقٌ عاجز **incompetent cervix**

ذلك النوع الميال بشكل غير طبيعي للتمدد في الأثلوث الثاني من الحمل ، والذي يتسبب في القذف المبتسر للطفل (اجهاض الثالوث الأوسط) .

عُنُقٌ مُتَطاوِل **tapiroid cervix**

هو عنق الرحم مع تطاول للشفة الأمامية بصفة خاصة .

سيريل **ceryl**

كحول مؤستر في الشموع النباتية .

القَيصَرِيَّة **cesarean**

انظر تحت section .

السيزْيوم (العنصر الخامس والخمسون) **cesium**

عنصر فلزي نادر ، أحادي التكافؤ مع الأكسيد القلوي ، العدد الذري (55) ، والوزن الذري (132.905) ، والرمز (Cs) .

بالوعَة (حُفرَة تصَريف) **cesspit**

تسمى أيضاً (Cesspool) ، وهي حفرة تصريف أو مسرب للمياه أو للقاذورات .

لتنظيف الجروح ، ومطهر ما قبل العملية ، ولمعالجة مث فروة الرأس ، وتستعمل المحاليل كذلك في تنظيف وتخزين الأدوات الجراحية ، اختصارها (CTBA) ، ويسمى أيضاً سيتريميد ، وبروميد سيتيل ثلاثي ميثيل الامونيوم .

cetyl **سيتيل**

جذر كحول أحادي التكافؤ ، وهو استرات لكحول يوجد في الشمع النباتي .

cetylpyridinium **سيتيل بيريدينيُوم**

(مُطهرٌ مَوضِعِيٌ)

مطهر كاتيوني ، يستعمل كمضاد العدوى الموضعي تحت اللسان ، أو موضعياً للجلد السليم والأغشية المخاطية ، ومادة حافظة في المستحضرات الدوائية .

cevitamic acid **حَمضُ الأسكوربِيك**

انظر تحت ascorbic acid .

Ceylancyclostoma **الانكلستوما البرازيلية**

(طفيليات)

انظر تحت ancylostoma braziliense .

ceyssatite **سيساتيت**

(مَسحوقٌ مُجففٌ لِلإكزيمة)

(منسوب لسيسات ، وهي قرية في فرنسا) ، وهو تراب أبيض من فرنسا ، مفيد على شكل مسحوق ممتز في الإكزيمة وفرط التعرق ، وفي تحضير المراهم والمعاجين الدوائية .

Cf **رمز الكاليفورنيوم (كف؛cf)**

(=californium)

انظر تحت californium .

Chabertia **الشَّابَرتِيَّة**

(جِنسٌ مِنَ الديدان)

جنس من ديدان المسودات من فصيلة ديدان الأسطوانيات ، منها الشابرتية المسببة لجدري الأغنام . وهي دودة طفيلية معوية توجد في قولون الغنم والماعز والأبقار .

Chabertia ovaris **الشَّابَرْتِيَّةُ الغَنَمِيَّة**

دودة طفيلية معوية من فصيلة الديدان الأسطوانية ، والتي توجد في قولون الغنم

طائفة ديدان شريطية تتميز بغياب الفم والقناة الهضمية وبوجود طبقة لاجلدية تغطي أجسامها ، وتتكون من طائفتين هما (Cestodaria) ، و (Cestoda) .

cetaben **سيتابين**

دَواءٌ خافضٌ لِشَحْمِيَّات الدَّم .

cetaceum **مَنِيُّ الحوت**

(=spermaceti)

انظر تحت spermaceti .

cetalkonium **سيتالكونيوم (مادّة مُنظفة)**

فاعل سطحي (بالسطح) أمونيومي رباعي ، يستعمل كمضاد للعدوى ، ومطهر موضعي .

cetanol **سيتانول**

(مادة كحولية في مني الحوت)

كحول أبيض جامد (صلب) ، من زيت النطفة المنوية ، يستعمل كمكون للمراهم والكريمات ، وتركيبه ($C_{16}H_{33}OH$) .

cetiedil **سيتيديل**

(دَواءٌ مُوَسعٌ لِلأوعيَةِ المحيطيَّة)

دواء موسع للأوعية الدموية المحيطية (الطرفية) ، تم استعماله في علاج التهاب الشريان ، ومرض رينو وزراق الأطراف (Acrocyanosis) .

cetocycline **سيتوسيكلين (مُضادٌ لِلجَراثيم)**

مضاد للجراثيم ، وملحة يسمى هيدروكلوريد السيتوسيكلين ($C_{22}H_{21}No_7.Hcl$) .

cetohexazine **سيتوهيكسازين**

Cetraria islandica **طحْلبُ إسْلنْدة**

cetrimide **سيتريميد (مطهر)**

هو بروميد السيترومونيوم (Cetrimonium bromide) .

انظر تحت cetrimonium .

cetrimonium **سِيتريمُونيُوم (مطهر ومعقم)**

مطهر ومنظف صناعي أمونيومي رباعي ، يتألف من خليط من رباعي ديكيل ثلاثي ميثيل الأمونيوم البروميد مع بروميدات الأمونيوم دوديسيل وسداسي ديكيل ثلاثي ميثيل الأمونيوم ، يستعمل موضعياً على الجلد

والماعز والأبقار .

chafe **يُهَيِّج (الجلدَ بالدَّلك)**

إثارة الجلد ، كما يحدث عند حك الطيات المتقابلة معاً .

Chagas' disease **داءُ شاجاس**

[داء منسوب للطبيب كارلوس جيشتينيو ريبيرو دي شاجاس (Carlos Justiniano Ribeiro des Chagas) ، وهو طبيب برازيلي 1879-1934] .

انظر تحت disease .

Chagasia **الشَّاجاسِيَّة (جِنسٌ مِنَ الأنوفيلات)**

هو كارلوس جيشتينيو ريبيرو دي شاجاس ، وهو جنس بعوض من قبيلة (مجموعة تصنيفية فوق الجنس وتحت الفصيلة) الأنوفيلات ـ فصيلة فرعية من طائفة الأنوفيلينات ، موطنها أمريكا الوسطى والجنوبية .

chagasic **متعلق بداء شاجاس**

تعود إلى داء شاجاس .

chagoma **وَرَمٌ شاجاسِيّ**
(تورم جلدي يتلو لدْغ البق)

عقدة حمامية تظهر خلال أيام قليلة عند موقع عضة بق رضوفي الحاملة للطفيلي الذي يسبب داء شاجاس ، قد تصبح الأوعية اللمفية التي تصرف القر المسدود بنسيج ندبي ، وتُنتج وذمة في المنطقة .

Chagres fever **حُمَّى شاجريس**

نوع من حمى الملاريا تحدث في منطقة نهر تشاجريس ، ويطلق عليها أيضاً حمى بنما .

chain **سِلسِلة**
(pl: chains) **(ج: سَلاسِل)**

تجمع الموضوعات المرتبطة معاً في شكل خطي أو نهاية مثل تشكل الذرات أو الجذور في المركبات الكيميائية ، أو تشكل الخلايا الجرثومية الفردية .

branched chain **سِلْسِلَةٌ مُتَفَرِّعَة**

سلسلة مفتوحة من الذرات ، عادة الكربون ، مع سلسلة جانبية أو أكثر متصلة بها .

closed chain **سِلْسِلَةٌ مُغْلَقَة**

عدة ذرات متصلة ببعض تتشكل في حلقة ، وقد تكون مشبعة كما في السيكلوبنتان ، أو أروماتي كما في البنزين .

food chain **سِلْسِلَةٌ طَعَامِيَّةٌ**

مَتوالية من الأحياء يتم عن طريقها انتقال الطاقة من مصدرها القصائي في النبات ، وفيها كل من هذه الأحياء يأكل سابقه ، ثم يؤكل بالذي يليه في الترتيب .

heavy chain **سِلْسِلَةٌ ثَقِيلَة**

سَلسلة من عديد الببتيد الكبيرة لجزيئات الضد ، تتواجد منها سلسلتان ثقيلتان متطابقتان (مع سلسلتان خفيفتان متطابقتان) في كل جلوبولين مناعي ، تحدد السلاسل الثقيلة رتبة الجلوبين المناعي ، ورتبته الفرعية ، تصنف كما يلي (γ ، α ، μ ، ε ، δ) وتكون السلاسل الثقيلة للأضداد على الشكل التالي IgG ، IgA ، IgM ، IgE ، IgD ، والرتبة الفرعية قد توصف برقم مثل 81 ، والسلسلة الثقيلة (IgG1) . للسلاسل الثقيلة أربعة مناطق تماثل (تنادد) تحوي 110 ثمالة حمض أميني ، ومنطقة متغيرة واحدة (V_H) ، وثلاثة مناطق ثابتة (C_H3 ، C_H2، C_H1) ، ما عدا سلاسل μ و ε ، والتي لها منطقة إضافية ثابتة (C_H4) .

انظر تحت immunoglobulin .

kappa chain **السِّلْسِلَةُ كابَّا**

نوع مَن سلسلة عديد الببتيد الخفيف لجزيئات الجلوبولين المناعي .

انظر تحت light chain .

lambda chain **السِّلْسِلَةُ لامْدا**

نوع من سلسلة عديدة الببتيد والتي تشترك معها السلسلة كابا في تكوين الجلوبولينات المناعية .

lateral chain **سِلْسِلَةٌ جانبِيَّة**

انظَر تحت side chain .

light chain **سِلْسِلَةٌ خَفِيفَة**

أي من سلاسل عديد الببتيد الصغيرة في جزيئات الضد ، تتواجد سلسلتان خفيفتان متطابقتان (مع سلسلتان ثقيلتان متطابقتان) في

تفاعلٌ سِلسِليٌّ **chain reaction**

التفاعل الذي تعتبر فيه كل خطوة أو مرحلة منه أساسية في التفاعل التالي .

بِنْيَةٌ سِلسِلِيَّة **chain structure**

وصف للمركبات ذات الطبيعية السلسلية في تتال للمكونات ، كسلسلة البروتينات الألفائية أو السلسلة كابا في الجلوبولينات المناعية .

كرْسِيٌّ **chair**

الأداة التي يرتاح عليها الإنسان جلوساً بشكل عام ، وهناك كراس خاصة في الطب ككرسي الولادة ، وكرسي طبيب الأسنان .

كُرْسِيُّ الولادَة **birthing chair**

الكَرسيَ الذي تجلس عليه الماخض بقصد تسهيل عملية ولادتها الطبيعية ، وله حمالات للطرفين السفليين لتستقر عليهما الفخذان والساقان أثناء الولادة ، وتأمين اتخاذ الوضعية الولادية بكل راحة .

كرْسِيٌّ سِنِّيٌّ **dental chair**

الكرسيَ الذي يجلس عليه المريض المصاب بمشكلة سنية لدى طبيب الأسنان ، والكراسي الحديثة مجهزة بجميع لوازم الطبيب من توربينات وقبضات وصينية لحمل المواد والأدوات السنية وتصريف المياه ، ويسمى أيضاً (Dentist chair) .

كُرْسِيُّ طَبيبِ الأَسْنان **dentist chair**

انظَر تحت dental chair .

كُرسِيٌّ سِنِّيٌّ ذُو مَنظارَين **double telescope dental chair**

كرسي خاصّ بالطب الجراحي السني والمجهز بمنظارين للتكبير .

كُرْسِيٌّ سِنِّيٌّ كَهْرَبيٌّ **electric dental chair**

كرسي طَبي سني مجهز بالأدوات الكهربائية اللازمة لتحريكه أو رفعه ، والأدوات الكهربائية اللازمة لعمل الطبيب .

كُرْسِيٌّ مُتَنَقِّل **glide about chair**

أي كرسي متنقل بعجلات وله ذراعان يمكن نزعهما أو تركيبهما .

كل موحود جلوبولين مناعي ، هناك نوعان يوصفان κ و λ ، كلاهما يتواجدان في كل رتبة من الجلوبولين المناعي (بنسبة حوالي سلسلتان κ إلى سلسلة واحدة من λ في الإنسان) . وتحتوي السلاسل الخفيفة منطقتان تماثل بها حوالي 110 ثمالة حمض أميني ، وواحدة منطقة متغايرة (V_L) ومنطقة ثابتة (C_L) . وتسمى أيضاً (Lc) .

انظر تحت immunoglobulin .

سلْسلَةٌ نَوَوِيَّة **nuclear chain**

مَصَفوفة طَولية من النوى ، والتي توجد على الألياف داخل المغزلية العضلية .

سلْسلَةٌ مَفْتوحَة **open chain**

سلسلة من الذرات والتي تتحد في خط مستقيم ، ومركبات هذه السلسلة لها علاقة بالميثان ، وتسمى أياً منها مركبات دهنية ، ومركبات أليفاتية ، ومركبات لاحلقية ، أو مركبات البرافين (Fatty, Aliphatic, Acyclic, or Paraffin Compounds) .

سلْسلَةٌ مُنَظَّمَةٌ **organization chain**

نظام تعدد المستشفيات (Multihospital system) .

سلْسلَةٌ جانبيَّة **side chain**

مَجَموعَة ذرات متصلة بسلسلة كبيرة أو بحلقة ، وتسمى أيضاً (Lateral chain) .

سلْسلَةٌ وُدِّيَّة **sympathetic chain**

الجذع الودي .

انظر تحت truncus sympathicus .



Chagoma ورم شاجاسي

بُرَدات **chalazia**
(ف: بُرَدَة) (sing.chalazion)
جمع بردة ، وهو (كيس في الجفن) .

بُرَدَة (كِيْسٌ فِي الجَفْن) **chalazion**
«كتلة صغيرة» وهي كتلة في جفن العين تنتج من الالتهاب المزمن في غدة الجفون وتظهر تفاعل ورمي حبيبي للدهن المحرر عند اخضاعه للفحص المرضي النسيجي ، تسمى أحياناً كيس جفني أو الغضروف الجفني .

تَهَدُّلُ الجِلْد **chalazodermia**
(=cutis laxa)
انظر تحت cutis laxa .

التِهابُ العَيْنِ النُّحاسِيُّ **chalcitis**
(=chalkitis)
وجود ترسبات نحاسية في الأنسجة .

كالكون **chalcone**
نوع من الأصبغة الصفراء ومن الكيتونات العطرية التي تكون النواة المركزية لكثير من المركبات البيولوجية تعرف إجمالاً باسم الكالكونات . ولها خواص مضادة للجراثيم والفطور والأورام والالتهابات .

تَنَحُّس **chalcosis**
وجود ترسبات نحاسية في الأنسجة .

تَنَحُّسُ القَرْنِيَّة **chalcosis corneae**
ترسب النحاس في القرنية مما ينتج عنه حلقة مصبوغة في الطبقات العميقة .

تَنَحُّسُ العَدَسَة **chalcosis lentis**
ترسب النحاس في العدسة على شكل زهرة عباد الشمس في داء ويلسون .

تَنَحُّسُ العَيْن **chalcosis oculi**
ترسب النحاس في العين في داء ويلسون .

سُحارٌ تُرابِيّ **chalicosis**
تغبر الرئة لدى قاطعي الحجارة بسبب استنشاق غبار الحجر ، يسمى أيضاً (Flint disease) .

رَأْبُ الصِوار **chalinoplasty**
تسمى أيضاً اختزال الشفة (Lip reduction) ، وهي تعبير عن العمليات التي يتم فيها التدخل

كُرْسِيٌّ سِنِّيٌّ عَصْرِيُّ الطِّراز **modern style dental chair**
كرسيَ يستعمل لطبيب الأسنان ، ولكنه مجهز بالعدة الكهربائية الكاملة لعمل الطبيب وإراحة المريض وتحريكه هيدروليكياً في المستويات والاتجاهات التي يرغبها الطبيب دون عناء .

كُرْسِيٌّ سِنِّيٌّ بِمِنظار وَاحِد **one telescope dental chair**
كرسيٌّ سنيٌّ جراحي مجهز بمنظار للتكبير لتسهيل الجراحات السنية الدقيقة .

كُرْسِيٌّ سِنِّيٌّ مِعْيَارِيُّ الطِّراز **standard style dental chair**
كَرسيَ سني مجهز بالأدوات الأساسية اللازمة لعمل طبيب الأسنان .

مُديرُ الخَدَمات **chairman of services**
من يقوم على إدارة الخدمات الطبية أو التمريضية وغير ذلك .

الرَّائِحَة **Chalara**
جنْسٌ منَ الفُطريات ، وتسمى عنونة الجذور السَوداَء فهي تسبب ظهور المناطق التي تنمو عليها بلون أسود .

ارْتِخاء **chalasia**
استرخاء أي فتحة في الجسم مثل العضلة العاصرة الفؤداية في البلعوم ، وهي سبب القيء لدى الرضع .

تَهَدُّلُ الجِلْد **chalastodermia**
(=cutis laxa)
تسمى أيضاً (Cutis laxa) ، (Dermatolysis) ، (Dermatomegaly) ، (Generalized elastoly-sis) ، (Pachydermatocele) وتدل على مجموعة من اضطرابات النسيج الضام حيث يصبح الجلد قليل المرونة ويتدلى مرتخياً على شكل ثنيات .

كِلازَة **chalaza**
(شريطٌ ألبومينيٌّ في بَيْض الطيور)
«كتلة» شريط حلزوني من بياض بيض يمتد من طرفي صفار بيضة الطائر إلى القشرة .

الفتيلي في خلايا ذلك النسيج والتي يكون عملها قابلاً للعكس .

كالونِي **chalonic**

متعلق بالكالون (بروتين مثبط للتفتل) .

حَديدِيّ **chalybeate**

انظر تحت ferruginous .

أفطحُ الرَّأس **chamaecephalic**

تدل على أو تميز بتفلطح الرأس (الفطح هو عرض الرأس) .

فطحُ الرَّأس **chamaecephaly**

(الفطح، عرَضُ الرَّأس)

حالة امتلاك رأس مسطح عريض ، ومنسب الرأس 70 أو أقل .

أفطحُ الوَجْه **chamaeprosopic**

متعلق أو يمتاز بطفح الوجه .

فطحُ الوَجْه **chamaeprosopy**

حالة تمتاز بإن المريض له وجه عريض ومنخفض (منسب وجهي أو أقل) .

1ـ حُجَيْرَة **chamber**

2ـ غُرْفَة

أي فضاء (فراغ) مغلق (محصور) ، أو الغار ، وفي علم التشريح : تجويف صغير محدد .

غُرْفَةٌ سَمْعِيَّة **acoustic chamber**

مكان محكم عازل للصوت يستخدم في القياسات السمعية ، وتسمى أيضا غرفة ماصة للصدى (Anechoic chamber) .

غُرْفَةُ الهَواء **air chamber**

(= **غُرْفَةُ التَّفْريج**) **(=relief chamber)**

انظر تحت vacuum chamber .

غُرْفَةُ التَّأيّن المُكافِيء للهَواء **air-equivalent ionization chamber**

في علم الأشعة ، الغرفة التي تكون مادة جدرانها والقطب الكهربائي مثل الاشعاعات المؤينة التي تنتج تأين مشابه جداً لذلك الذي يحدث في الغرفة المؤينة المفرغة من الهواء .

غُرْفَةُ دراسة المُرْتَفَعات **altitude chamber**

غرفة التخلية والتي تستخدم لتمثيل تأثيرات الجراحي على الشفتين بقصد تجميلي عادة ، وهي عملية جراحية تجميلية لزاوية الفم (الملتقى الشفوي) .

طباشير **chalk**

1ـ كربونات كالسيوم طبيعية ، وهي بقايا لابلورية (عديمة الشكل) من الكائنات البحرية مترسبة في قاع البحر ومتحللة بفعل الأحماض والحرارة ، تستعمل كعامل تلميع في طب الأسنان وكمكون في مستحضرات تنظيف الأسنان .

2ـ أي من المواد المتعددة الأخرى التي تشبه من الناحية الفيزيائية كربونات الكالسيوم .

طَباشيرُ فَرَنْسِيَّة **French chalk**

(= **طَلْق**) **(=talc)**

انظر تحت talk .

طَباشيرُ مُرَسَّبَة **precipitated chalk**

انظر تحت precipitated calcium carbonate .

طَباشيرُ مُحَضَّرَة **prepared chalk**

كربونات كالسيوم طبيعية (واطنة) خالية من معظم شوائبها عن طريق الترويق ، تستعمل مضادة للأحماض ، وفي معالجة الإسهالات وفي مستحضرات تنظيف الأسنان .

التِهابُ العَيْنِ النُّحاسِيّ **chalkitis**

التهاب نحاسي في العين بسبب حك العين بعد تعرض الأيدي للنحاس .

تحَد (تحَدي) **challenge**

1ـ اعطاء مادة كيميائية للمريض لملاحظة حدوث استجابة فيزيولوجية طبيعية .

2ـ في المناعة : تحريض المناعة بمستضدات معينة لكشف مدى استجابة الجهاز المناعي لها بإنتاج الأضداد .

3ـ اعطاء مادة كيميائية أو مستضد كي تحفز الاستجابة المناعية في شخص محسس مسبقاً .

كالون (بروتينٌ مُثبطٌ لِلتَفتُل) **chalone**

مجموعة ذات تخصص نسيجي (ليست ذات تخصص نوعي) لبروتينات مذابة في الماء ، يتم إنتاجها داخل النسيج ، وتكبح (تثبط) الانقسام

ضغط الهواء الجوي العادي ، وتستخدم لعلاج الغرغرينة الغازية والالتهابات اللاهوائية الأخرى ، أو الأحوال التي تتطلب تركيز عالي من الأكسجين ولدراسة تأثيرات الضغط والانضغاط على الحيوان والإنسان .

ionization chamber **غُرْفَةُ التَّأيُّن**

جهيزة لقياس الإشعاع المؤين عن طريق قياس تأين الغاز الموجود في الحجرة.

lethal chamber **غُرْفَةُ الإبادَة**

(للحيَوانات الصغيرة)

غرفة يمكن أن تملأ بغاز لقتل الحيوانات الصغيرة .

posterior chamber of eye **غُرْفَةُ العَين الخَلْفيَّة**

انظر تحت camera posterior bulbi .

pulp chamber **الغُرْفَةُ اللُّبِّيَّة**

(= **الجَوفُ التَّاجِيّ**)

هي حجرة في لبّ تاج السن ، محاطة بالعاج ، تحتوي على اللب السني .

انظر تحت cavitas coronalis .

relief chamber **غُرْفَةُ التَّفْريج**

جيب (ردب) في السطح القاعدي لمجموعة الأسنان الطبيعية (البدلة السينة) لقياس الأسنان لتقليل أو لإزالة الضغط أو القوة من تلك المنطقة من الفم أي أنه انخفاض في سطح قاعدة بدلة الأسنان لتقليل الضغط على منطقة معينة في الفم .

standard ionization chamber **غُرْفَةُ التَّأيُّن المعْيارِيَّة**

Storm Van Leeuwen chamber **غُرْفَةُ سْتُورْم فان لُويفن**

(خلوة مَن المستضدات للمصابين بالأرجيَّة)

غرفة يمكن الاحتفاظ بها وتكون خالية من المستضدات المنقولة بالهواء للمرضى المصابين بالحساسية (الأرجية) .

suction chamber **غُرْفَةُ المَص**

thimble ionization chamber **غُرْفَةُ التَّأيُّن الكُشْتُبانِيّ**

الارتفاع العالي والضغط الجوي المنخفض .

anechoic chamber **غُرْفَةٌ ماصَّةٌ للصَّدَى**

غرفة سمعية ، لا تصدر صدى ، تسمى أيضاً غرفة ماصة أو كتيمة للصدى (Anechoic room) .

anterior chamber of eye **غُرْفَةُ العَين الأماميَّة**

انظر تحت camera anterior bulbi .

aqueous chamber **غُرْفَةُ الخلْط المائي**

الجزء من مقلة العين الذي يكون مملوء بالخلط المائي .

انظر تحت anterior chamber of the eye .

انظر تحت posterior chamber of the eye .

cardiac chamber **غُرْفَةُ القَلْب**

هي أجواف الأذين والبطين .

chambers of eye **غُرَفُ العَين**

فراغات أو أحياز مختلفة في العين .

انظر تحت anterior chamber of the eye .

انظر تحت posterior chamber of the eye .

chambers of the heart **غُرَفُ القَلْب**

هي أجواف الأذين والطين .

انظر تحت hemacytometer .

counting chamber **حُجَيْرَةُ العَد**

هو عداد الخلايا الدموية .

decompression chamber **غُرْفَةُ خَفْض الضَّغْط**

detonating chamber **غُرْفَةُ كَتْم التَّفْجير**

diffusion chamber **غُرْفَةُ الانْتشار**

جهاز لفصل المادة عن طريق غشاء شبه منفذ .

Haldane chamber **غُرْفَةُ هُولْدين**

(لدراسة الاستقلاب الأساسي عند الحيوانات)

حجرة محكمة ضد تسريب الهواء يمكن فيها احتجاز الحيوان لإجراء اختبارات أيضية (استقلابية) ، تسمى أيضاً (Haldane apparatus) .

hyperbaric chamber **غُرْفَةُ الضَّغْط العالي**

حيز يمكن فيه رفع ضغط الهواء إلى أكثر من

انظر تحت chamaeprosopic .

chameprosopy **فطحُ الوَجْه**

صفة ـ لقصر الوجه وتعرضه .

انظر تحت chamaeprosopy .

chamfer **يَشْطف**

في تحضير التجويف خارج التاجي ، وفيه تشطيب هامشي لعمل قوس من السطح المحوري إلى سطح الحفرة السنية الخارجي .

chancre **قَرْح**

1ـ عادة ما تكون آفة الزهري الأولية وتكون غير مؤلمة والتي تحدث عند موقع دخول العدوى ، وتتجلى نموذجياً كحطاطة حمراء صغيرة أو تآكل جلبي والذي يتكسر ليصبح مستديرا أو بيضاوي ، جاسي ومرتفع قليلاً بسطح متآكل ، ينضح سائل مصلي ، ويعطي اعتلال عقدي لمفي ناجي جامد غير ممض وغير متموج (دبل) ، يشفي دون ندبة ، يدعى أيضاً قرح هنتري (Huntarian chancre) ، وقرح صلبة (Hard sore) ، وقرح حقيقي (True chancre) .

2ـ أي من الآفات الجلدية الأولية المختلفة والتي ترى عند مكان تلقيح العدوى في بعض الأمراض مثل الهربس (الحلأ) ، وداء الشعريات المبوغة ، والسل ، والتولاريمية ، وداءالمتقبيات .

chancre redux **قَرْحٌ راجِع**

إعادة ظهور القرح بعد الشفاء الجزئي نتيجة لعدم كفاية المعالجة ، ويكون مصحوب باعتلال غدي لمفي ووجود العديد من الملتويات في موضع الآفة ، تسمى أيضاً (Monorecidive chancre) .

erosive chancre **قَرْحٌ تَآكُليّ**

extragenital chancre **قَرْحٌ لاتَنَاسُليّ**

آفة جلدية نتيجة التهاب متزامن بالزهري الأولي والقرحة اللينة ، وتسمى أيضاً (Mixed sore) ، وهي قرح بعيد عن الأعضاء التناسلية الظاهرة .

fungating chancre **قَرْحٌ كَمْئيّ**

hard chancre **قَرْحٌ صُلْب**

غرفة تأين صغيرة رفيعة الجدار ، عادة ما تتكون من جدران من موادعضوية ، وتستخدم لقياس الجرعات الشعاعية .

Thoma-Zeiss counting chamber **حُجَيرَةُ عَدٍّ توماژايس (لعَدِّ كريات الدَّم)**

نوع معروف من عدادات خلايا الدم ، وتسمى أيضاً (Abbe-Zeiss counting chamber) .

tissue-equivalent ionization chamber **غُرْفَةُ التَّأَيُّن المُكافىء لِلنُّسُج**

غرفة التأين فيها الجدران والمسارى الكهربية والغاز تكون مختارة لانتاج التأين المكافىء للذي يحدث في الأنسجة في قيد البحث أو الخاضعة للدراسة .

vacuum chamber **غُرْفَةُ التَّخْلِيَة**

في طب الأسنان : انخفاض في الجزء الحنكي من بدلة الأسنان العلوية ، يكون بمثابة حجرة تفريغ الهواء ، وبذلك يساعد في ثباتها على الفك العلوي داخل الفم .

vitreous chamber **غُرْفَةُ الزُّجاجيَّة**

انظر تحت camera vitrea bulbi .

Zappert's chamber **حُجَيرَةُ زبرت (لعَدِّ كريات الدَّم)**

انظر تحت hemacytometer .

Chamberland filter **مُرَشِّحَة شامْبرلان**

مرشح خاص للتنقية من الجراثيم .

Chamberlen forceps **مِلْقط شامْبرلِين**

[ملقط منسوب للطبيب بيتر تشامبرلين (Peter Chamberlen) ، وهو طبيب ولادة إنجليزي 1560-1631] وهو ملقط للتوليد .

انظر تحت forceps .

chamecephalic **أفطحُ الرَّأس**

انظر تحت chamaecephalic .

chamecephaly **فطحُ الرَّأس**

انظر تحت chamaecephaly .

chameprosopic **أفطحُ الوَجْه**

قصير الوجه وعريض .

هي قرح هنتري .

قَرْحٌ هنتري — **hunterian chancre**

(= قَرْحٌ صُلْب) — **(=hard chancre)**

قَرْحٌ شَفَوِيٌّ — **lip chancre**

قَرْحٌ مُخْتَلَط — **mixed chancre**

آفة جلديَة نتيجة التهاب متواقت بالزهري الأولي (اللولبية الشاحبة) والقريح ، (Haemophilus ducreyi) .

قَرْحٌ راجِع — **recurrent chancre**

قَرْحٌ روليَه — **Rollet's chancre**

(=قَرْحٌ مُخْتَلَط) — **(=mixed chancre)**

قَرْحٌ لَيِّن — **soft chancre**

(= قُرَيح) — **(=chancroid)**

هو عدوى منقولة جنسياً تسبب تقرح للغدد اللمفية في الأربية .

انظر تحت chancroid .

قَرْحٌ تَلَمِيٌّ — **sulcus chancre**

قَرْحٌ حَقيقيٌّ — **true chancre**

انظر تحتَ chancre .

قَـرْحٌ سُلِّيٌّ — **tuberculous chancre**

انظر تحت primary inoculation tuberculosis

قَرْحٌ تولاريميّ — **tularemic chancre**

التولاريمية هي مرض معدي منقولة بالحيوانات خاصة الأرانب البرية والفئران والتي يسببها الباستوريلة الفرانسيسيلة ، ويتميز بقرحات وحمى وفقد في الوزن .

قَرْحِيُّ الشكل — **chancriform**

تشبه القرحة .

قُرَيح — **chancroid**

(= قَرْحٌ لَيِّن) — **(=soft chancre)**

مرض يتناقل جنسياً تسببه المستدمية الدوكرية ، تتميز بقرحة أولية مؤلمة في موضع التلقيح ، وتظهر عادة على الأعضاء التناسلية الخارجية ، وتتصاحب بالتهاب غدي لمفي ناحي (Regional) ، وتسمى أيضاً (Soft ulcer) ، (Soft sore) ، (Soft chancre) .

انظر تحت mixed chancer .

قُرَيحٌ أَكَّال — **phagedenic chancroid**

نوع يتكون عن طريق تخشر الأنسجة.

قُرَيحٌ ساعٍ (ساعي) — **serpiginous chancroid**

نوع يميل للانتشار في خطوط منحنية .

قُرَيحِيّ — **chancroidal**

تشير إلى القرح أو قرحة طرية .

قَرْحِيّ — **chancrous**

ذو طبيعة قرحية .

تَبَدُّل — **change**

تبدل وتغير أو تعديل .

تَبَدُّلُ آلزْهايمر العَصَبِيُّ اللِّيفيّ — **Alzheimer's neurofibrillary change**

تغيُّراتَ في الألياف العصبية في داء آلزهايمر .

تَبَدُّلُ آرْماني ايبشْتاين — **Armanni-Ebstein change**

تراكم الجليكوجين داخل الخلايا كما في الداء السكري .

تَبَدُّلٌ إياسيّ — **change of life**

(=climacteric change)

تَبَدُّلُ كروك رَسِل — **Crooke-Russel change**

(=Crooke change)

تنكس هياليني في حبيبات خلايا النخامية الأمامية في داء كوشينج .

انظر تحت crooke's hyalinization .

تَبَدُّلُ كروك — **Crooke's change**

(تنكس هياليني في حبيبات خلايا النخامية الأمامية في داء كوشينج)

انظر تحت crooke-russel change .

تَبَدُّلُ الأَبْعاد — **dimensional change**

تَبَدُّلٌ بالتَّخَلُّق المُتَوالي — **epigenetic change**

في البيولوجيا أي تغيرات في العضوي تحدث بسبب تغيرات خارجية أكثر منها تأثيرات جينية في فعل الجينات.

تَبَدُّلٌ دُهْنيّ — **fatty change**

تجمع غير طبيعي للدهون في الخلايا المتنية الكبدية ، والمصطلح يشمل المفاهيم القديمة التي تشمل التنكس الدهني (Fatty degeneration) ،

أَقْنِيَةٌ دَمَوِيَّة **blood channels**
مَمرات ضَيقة بجدران غير واضحة ، والتي تحتوي على دم ، والموجودة في النسيج الحبيبي الطازج .

قَناةٌ مَرْكَزيَّة **central channel**

الأَقْنِيَةُ الجَامِعَة **collector channels**

أَقْنِيَةٌ لَمفيَّة **lymph channels**
الجُيَوب اللمفية الصغرى وتكون غير منتظمة في وعند الغدد اللمفية وحول الأوعية اللمفية .

القَنَاةٌ حَولَ العَصَب **perineural channel**
قناة لمفية تحيط بجذع العصب .

القَنَاةٌ حَولَ الوِعاء **perivascular channel**

قَناةٌ إنْفاذيَّة **thoroughfare channel**
قناة بينَ نهاية الشرينات والأوردة ، وهي أكبر من الشعيرات .

إقناء **channeling**

الخَوْبَرَة (جِنسٌ مِنَ البَعوض) **Chaoborus**

والارتشاح الدهني (Fatty infiltration) .


تَبَدُّلٌ فِبْرينيّ **fibrinoid change**
(= نَخَرٌ فِبْرينيّ) **(=fibrinoid necrosis)**

تَبَدُّلٌ رَقْشيّ **harlequin color change**
(اضطراب تحراكي وعائي عابر في الولدان يتظاهر باحتقان في شق وشحوب في آخر) إحمرار مؤقت لنصف الجسم طولياً والذي يتوافق مع ابيضاض للنصف الآخر ، وهو اضطراب وعائي حركي مؤقت لدى حديثي الولادة .

تَبَدُّلٌ خَزَبيّ **hydropic change**
انظر تحتَ hydropic degeneration .

قناة **channel**
1 ـ معبر (ممر) تمر عن طريقه الأشياء ، ويسمى أيضاً (Canalis) ، (Groove) .
2 ـ انظر تحت protein channel .

Normal طبيعي	Alzheimer's آلزهايمر



Alzheimer's neurofibrillary change **تبدل آلزهايمر العصبي الليفي**

خاصَّةٌ مُتَسَلِّطَة authoritarian character

خاصَّةٌ مُرَكَّبَة compound character

خاصَّةٌ سائِدَة dominant character

خاصَّةٌ صَرْعيَّة epileptic character

الصفة الشَخصية للمصاب بالصرع أو المستعد لظهور الإصابة عنده .

خاصَّةٌ اسْتِغْلاليَّة exploitative character

خاصَّةٌ تَناسُليَّة genital character

خَواصٌّ إمْفيكيَّة IMViC characters

(في تصنيفَ القَولونيَّات وفق خواصها)

أربع صفات هامة يعتمد عليها في تصنيف الكائنات الحية من القولونيات (جراثيم سلبية الجرام) : وهي أندول ، الميثيل الأحمر ، فوجس بروسكاور (لتمييز القولونيات عن غيرها) ، والستيرات .

خَواصٌّ مَنْدليَّة mendelian characters

الخواص الَوَراثية التي حددتها قوانين مندل في انتقال الصفات الوراثية إلى الأجيال المتتالية ، والتي تبين فيما بعد أنها مسؤولية الجينات الوراثية .

خاصَّةٌ عُدْوانيَّةٌ فَمَويَّة oral aggressive character

نمط من الشخصية ينجم عن التمادي في مرحلة العض الفموية ونتيجتها ممارسة العدوانية والاستغلال .

خاصَّةٌ فَمَويَّة oral character

خاصَّةٌ زَوَرانيَّة paranoid character

صفة تصدر عن الشخصية الزورانية كالشك بالآخرين والحساسية المفرطة وكثرة الأوهام .

خاصَّةٌ جِنْسيَّةٌ أوَّليَّة primary sex character

تلك الصَفَات في الذكر أو الأنثى التي تكتنف بشكل مباشر في التناسل ، وهي غدد التناسل وملحقاتها .

خاصَّةٌ ذُهانيَّة psychotic character

خاصَّةٌ مُتَنَحِّيَة recessive character

جنس من القرسة (حشرة من ذوات الجناحين) غير الماص للدم من عائلة البعوضيات (فصيلة من خيطيان القرن) ، تسمى أيضاً الكائنة . (Corethra)

الخَوبَرَةُ البُحَيريَّة Chaoborus lacustris

قرسية البحيرَة الصافية في كاليفورنيا .

شُواش **Chaos**

هو التشوش واختلاط الأمور .

المُستوحِلة الكاروليِنيَّة (أميبة عِملاقة) **Chaos chaos (=Pelomyxa carolinensis)**

انظر تحت pelomyxa carolinensis .

قَشَب (تَشَقُّق الجِلد) **chap**

تشقق الجلد وخاصة خلال التعرض للطقس البارد .

كاهِن **chaplain**

الخِدْمَة الكَهَنوتيَّة **chaplaincy service**

مُقَشَّب (مُشَقَّق الجِلد) **chapped**

تخشن وتشقق ، أو تكون مشطورة بالبرد أو الترطيب المتكرر ، مثل الأيدي أو الشفاه المتشققة .

1ـ مَحْرَف (ج: مَحارِف) **character**

2ـ خاصَّة (ج: خَواصّ)

1ـ كيفية أو صفة لطبيعة شيء أو كائن حي .

2ـ في الورثة ، هو التعبير عن النمط الظاهري لجين أو مجموعة من الجينات .

3ـ في علم النفس ، هو مصطلح يستخدم غالباً في أبحاث وموضوعات التحليل النفسي ، وفي طريقة التعبير عن الشخصية ، وخاصة لخلة الشخصية التي تتشكل بخبرات الحياة وعمليات التطور .

انظر تحت temperament .

4ـ علامة محفورة أو مطبوعة للتعبير عن الخواص الشكلية للجين أو مجموعة من الجينات .

خاصَّةٌ مُكْتَسَبَة acquired character

تعديل غير موروث ينتج في الحيوان كنتيجة نشاطاته الخاصة أو بسبب التأثيرات البيئية .

secondary sex characters **خَواصٌ جِنْسيَّةٌ ثانَويَّةٌ**
تلكَ الصفات الخاصة بالذكر أو الأنثى والتي لا تكتنف على نحو مباشر في التناسل ، وتسمى أيضاً الإذكار (Masculinization) ، الاستئنات (Feminzation) .

sex-conditioned character **خاصَّةٌ مُتكيِّفَةٌ بالجِنْس**

sex-influenced character **خاصَّةٌ مُتأثِّرَةٌ بالجِنْس**
(=sex conditioned character) **(=خَاصَّةٌ متكيِّفَةٌ بالجِنْس)**

sex-limited character **خَاصَّةٌ مَحْصورَةٌ بالجِنْس**

sex-linked character **خاصَّةٌ مُرْتَبِطَةٌ بالجِنْس**

unit character **خاصَّةُ الوَحْدات**
(=mendelian character) **(= خاصَّةٌ مَنْدليَّة)**
الخواص الوراثيَة التي حددتها قوانين مندل في انتقال الصفات الوراثية إلى الأجيال المتتالية ، والتي تبين فيها بعد أنها مسؤولية الجينات الوراثية .

characteristic **مُمَيز**
1ـ ميزة أو خاصية .
2ـ خاصة بالفرد أو إلى كينونة أخرى .

characterology **عِلْمُ خَصائِص الشَّخصيَّة**
دراسة المميزات الشخصية .

charas **غانجا**
(=ganja)
مُسْتَحْضَرٌ مَشْروبٌ هِنْديّ
انظر تحت ganja .

charbon **الجَمْرَة الخَبيثَة**
(=anthrax)
الاسم القديم للجمرة الخبيثة .
انظر تحت anthrax .

charcoal **فَحْم**
فحم مجهز عن طريق حرق الخشب أو المواد العضوية الأخرى .

activated charcoal **فَحْمٌ مُنَشَّط**
رواسب (ثمالات) التقطير التخريبي لمختلف المواد العضوية ، والتي تعالج لزيادة قدرتها الامتزازية ، وكغرض عام تستخدم كدرياق ، وتسمى أيضاً (Carbo activatus) .

animal charcoal **فَحْمٌ حَيَوانيّ**
فحم مجهز من العظام ، يسمى أيضاً فحم حيواني ، أو أسود باريس ، أسود العظم .

medicinal charcoal **فَحْمٌ طِبيّ**

purified animal charcoal **فَحْمٌ حَيَوانيٌّ مُنَقّى**
فحم مجهز من العظام ومنقى بإزالة المواد المذابة بواسطة حمض الهيدروكلوريك الساخن والماء ، ممتز ومزيل للألوان .

charge
1ـ يَشْحَنُ
2ـ شُحْنَة
3ـ رَسْم

actual charge **الرَّسْمُ الفعْليُّ**
allowable charge **الرَّسْمُ المَسْموحُ به**
charge nurse **مُمَرِضَةٌ مَسْؤولَة**
covered charge **الرُّسومُ المُغَطَّاة**
customary charge **الرَّسْمُ الاعْتياديُّ**
daily service charge **رَسْمُ الخِدْمَةِ اليَوميَّة**
in charge **مَسْؤول**
ionic charge **شُحْنَةٌ أيونيَّة**
prevailing charge **الرَّسْمُ الشَّائع**
reasonable charge **الرَّسْمُ المُناسِب**
usual charge **الرَّسْمُ المُعْتاد**

charged **مَشْحون**
خاصية أن يكون الجسيم يحمل شحنة كهربية .

charger **شاحِنَة**

charity allowance **مُخَصَّصاتٌ خَيريَّة**

charlatan **دَجَّال**
مدعي معرفة أو مهارات لا يملكها المرء العادي ، وفي الطب يسمى أيضاً (Quack) ، وهو الشخص الذي يطبق الطب بدون أن يمتلك كفاءات أو تأهيل مناسب .

charlatanism **تدْجيل**

علي تقويم الحول .

مُخَطَّطُ هولِي (للأَسْنان) **Hawley chart**

مُخَطَّطُ الرُّؤْيَةِ القَرِيبَة **near vision chart**

مُخَطَّطُ القِراءَة **reading chart**

(لفحصَ حدة الرؤية)

مـخطط يوضح مـادة مطبـوعـة في نمط زيادة تدريجية حجمية تستخدم لقياس حدة الرؤية القريبة .

مُخَطَّطُ أَلْوان رُوَيْس **Reuss' color chart**

(لِفَحْص رُؤْيَةِ الأَلْوان)

مَـخططاتَ بـحَـروف ملونة تطبع على أرضـيـة ملونة ، والتي تسـتـخـدم لفحص رؤية الألوان ، تسمى أيضاً (Reuss' tables) .

مُخَطَّطُ سنيلين **Snellen's chart**

(لِفَحْص حدَّة الرُّؤْيَة)

مَخطط مَطبَوعَ بالأحرف الكبيرة (نمط فحص سنيلين) في تناقص حـجـمي مـتـدرج ، يتم التعرف عليها حسب المسافة التي يمكن رؤيتها طبيعياً ، تستخدم للكشف عن حدة النظر ، تسـمـى أيضـاً نمـط فـحص سنيلين (Snellen's test typ) .

charta **وَرَقة**

1ـ ورقة .

2ـ قطعـة من الـورق ، سـواء كـانت طبـيـة أو غيرها .

وَرَقَةُ الاخْتبار الزَّرْقاء **charta exploratoria caerulea**

وَرَقَةُ الاخْتبار الصَّفْراء **charta exploratoria lutea**

وَرَقَةُ الاخْتبار الحَمْراء **charta exploratoria rubra**

chartaceous **وَرَقِيّ**

(=papyraceous)

انظر تحت papyraceous .

chartula **وُرَيقة**

قطعة ورق صغير ، مثل التي تحوي جرعة دواء طبي .

ادعاء المعرفـة والمهارات والتي والتي لا يملكها الفرد ، وفي الطب ويسمى أيضاً (Quackery) .

charlatanry **تَدْجيل**

انظر تحت charlatanism .

charley horse **تَيَبُّسٌ عَضَلِيٌّ مُؤْلِم**

(تلو الإرهاق أو الرض بشكل خاص للعضلة الرباعية الرؤوس)

التـهـاب وتصلب العـضل بسـبب فـرط الجـهـد والشد ، عـادة ما تنحصـر الكلمة في اصابات العضلة الرباعية الرؤوس .

charpie **نسالة**

(=lint)

ضماد مصَّاص في الجراحة .

charring **1ـ تفحُّم**

2ـ تفحيمٌ

chart **مُخَطَط**

1ـ توضـيـح بيـاني مـبـسط لمنحنيـات بعض المتـغـيـرات ، كـالنبض والحـرارة والتنفس أو التسجيل لكل المعلومات الإكلينيكية لبعض الحالات الخاصة .

2ـ في طب الأسنان : سـجل أو رسم بيـاني أو تخطيطي لأسنان المريض وحـالـتـه السنيـة ، والبيانات المتعلقة بحالته المرضية ، وتقدم حالته الصحية والعلاج الموصوف له .

مُخَطَّطاتُ آمْزلَر **Amsler's charts**

(لِفَحْص الرُّؤْيَة)

مَجموعةَ من المخططات توضح النمط الهندسي بالأسود والأبيض مثل ، الخطوط المتوازية التي تسـتـخـدم لمعـرفـة العـيـوب في حـقـل الرؤية المركزي .

مُخَطَّطُ الشَّفَع **diplopia chart**

مُخَطَّطُ التَّعَرُّض **exposure chart**

مُخَطَّطُ المَجْرَيات **flow chart**

مـخطط لمتـابعة بعض المعلومـات سـواء كـانت إكلينيكية أو معطيات خاصة .

مُخَطَّطُ غيبور (لعلاَج الحَوَل) **Guibor's chart**

مـخطط يحـتـوي صـور لمخطط تمهيدي للتـدريب

صفيحة كربونية غالباً توضع بين فكي المريض ويطلب منه الإطباق عليها لكشف حالات خلل الإطباق اللامركزي .

lateral check-bite **صَفِيحَةُ فَحْص الإِطْباق الجَانِبيّ**

صفيحَة مَعَدة للاستعمال في فم المريض لكشف حالة الإطباق الجانبي .

protrusive check-bite **صَفِيحَةُ فَحْص الإِطْباق المُتَقَدِّم**

صفيحةٌ كشف خلل الإطباق في مستوى تقدم أحد الفكين على الآخر .

checker board **مُشَطْرَجَة**

(على شكل لوحة الشطرنج)

في علم الوراثة ، شبكة ذات هوامش (حواف) تظهر الخلايا التناسلية لكل والد (في الهوامش) ونسله المحتمل (في المربعات) ، تسمى أيضاً مربع بونيت (Punnett square) .

رسم بياني ترسم احتمالات الوراثة ، في دراسة خلة وراثية افتراضية عند عبور (تزاوج) متغاير الزيجوت مع متجانس الزيجوت الذي ينقصه الخلة (العادية) .

cheek **خَدّ**

1 ـ الشدق ويسمى أيضاً (Bucca) ، وهو الجانب الوجهي الذي يكون الجدار الجانبي للفم .

2 ـ بروز لحمي ، خاصة البروز اللحمي على جانبي الوجه بين العين والأنف والأذن والفم .

cheek bone **العَظْمُ الوَجْنِيّ**

يسمى أيضاً (Os zygomaticum) ، وهو العظم الذي يشكل أساس القسم البارز من الوجنتين ويدخل في تركيب الحجاج العيني ، ويتمفصل مع عظام : الجبهي والصدغي والفكي العلوي والوتدي .

cheek protector **واقي الخَد**

جهاز يركبه المتعرضون للرضوض كالملاكمين لحماية العظم الوجني من الكسر .

cheek retractor **مِبْعَادُ الخَد**

chasma **1 ـ فتحَة**
2 ـ تثاؤب

يسمى أيضاً (Chasmus) ويعني التثاؤب في الطب أو الجيولوجيا الفضائية ، وهي نوع من الفتحات أو الحفر في الكواكب كالحفر الموجودة في كوكب المريخ .

chasmatoplasson **جِبْلَة الخَلِيَّةِ اللامُنَوَّاة**

جبلة الخلية غير المنواة في حالة التمدد .

chasmus **1 ـ فتحَة**
2 ـ تثاؤب

انظر تحت chasma .

chaude-pisse **حُرْقَة البَول**

(كلمة فرنسية) تعني إحساس حارق أثناء التبول .

chaufage **تدْفِئَة**

يبدو أن الكلمة فرنسية ويقابلها بالإنجليزية (Heating) ، وتعني عملية التدفئة وانتشار الحرارة .

check **1 ـ فحْص؛ اخْتِبَار**
2 ـ يُدقِق
3 ـ تحقُّق

check list **قائِمَة تفقُّد**

قائمة لعرض المعطيات وعلى القارئ تفقدها والإشارة إلى ما يختاره منها .

check-bite **صَفِيحَة فحْص الإطْباق (أسنان)**

عضة تحقق أو تسجل العلاقة بين الفكين ، وتتم بإجراء طبعة بالشمع الصلب أو مركب الصوغ لتسجيل الأوضاع الإطباقية المختلفة للأسنان في الفم ، واستخدامها لتسجيل هذه الأوضاع بالنسبة للبدلات السنية على المطبق .

centric check-bite **صَفِيحَةُ فَحْص الإِطْباق المَرْكَزِي**

صفيحَة كربونية أو من الشمع الصلب غالباً توضع في فكي المريض ويطلب منه الإطباق عليها لكشف مدى سلامة الإطباق المركزي .

eccentric check-bite **صَفِيحَةُ فَحْص الإِطْباق اللامَرْكَزِي**

الڤيتامينات ، ويسمى أيضاً (Chilitis) .

الْتهابُ الشَّفَةِ السَّفْعيُّ **actinic cheilitis**

اَنتفاخ مؤلَم بالشفَتين وحدوث تقشر وندب على حافة الشفة بعد فرط التعرض لأشعة الشمس ، قد يكون حاد أو مزمن ، يسمى كذلك التهاب الشفة الشمسي .

الْتهابُ الشَّفَةِ الحادُّ **acute cheilitis**

الْتهابُ الشَّفَةِ الأَرَجيُّ **allergic cheilitis**

اَنتفاخ مؤلَم بالشفَتين وحدوث تقشر وندب وتقرح على حافة الشفة بعد فرط التعرض لأشعة الشمس ، أو التعرض للمستحضرات التجميلية المختلفة أو أي من المواد المسببة للحساسية (الأرجية) .

الْتهابُ الشَّفَةِ الزَّاويّ **angular cheilitis**

(= صُماغ) **(=perleche)**

التهاب الشفة أو الشفتين مع زاوية الفم .

الْتهابُ الشَّفَةِ الخُرَاجيّ **apostematous cheilitis**

(=cheilitis glandularis)

انظر تحت cheilitis glandularis .

الْتهابُ الشَّفَةِ السَّفْعيُّ **cheilitis actinica**

اَنتفاخ مؤلَم بالشفَتين وحدوث تقشر وندب على حافة الشفة بعد فرط التعرض لأشعة الشمس ، قد يكون حاد أو مزمن ، يسمى كذلك التهاب الشفة الشمسي .

الْتهابُ الشَّفَةِ التَّقَشُّريُّ **cheilitis exfoliativa**

تَقشر مستَمر بالشَفة بسبب التهاب الغشاء المخاطي والذي يشبه ولكنه لا يتماثل مع التهاب الجلد المتقشر .

الْتهابُ الشَّفَةِ الغُدِّيُّ **cheilitis glandularis**

مَرض نادر تَصبح فيه الشفة السفلى متضخمة وتتشقق في وقت لاحق كاشفة فتحات الغدد اللعابية الإضافية والتي تكون ملتهبة ومتمددة ، تكون الغدد فيها متضخمة وأحياناً عقدية ، وربما يصاحبها سرطان غدي في الشفة . ثمة ثلاثة أنواع : والنوع البسيط ويتميز بآفة دبوسية الرأس غير مؤلمة ومتعددة ، مع منخفضات

أداة تبعد الخد عن الأسنان لتسهيل عمل طبيب الأسنان في بعض المداخلات السنية .

داعِمُ الخَد **cheek supporter**

أَربطة بنماذج مختلفة مصممة لدعم الخدين والشفتين وغالباً ما تحيط بالرأس لتثبيتها بشكل صحيح ، وتستعمل غالباً في جراحات الفكين .

فَلَحُ الخَد ، فلج خدي **cleft cheek**

شذوذ خلقي بسبب فشل التحام بعض النواتئ الجنينية الوجهية .

رَحًى **cheek tooth**

يسمى (Dens molaris) أي السن بنموذج الرحى أو الضرس ، وهو مصطلح شامل للضواحك والأرحاء .

جُبْنِيّ **cheesy**

انظر تحت caseous .

سابقة بمعنى الشَّفَة **cheil-**

صيغة جمع تدل على علاقة بالشفة ، أو بحافة ما .

أَلَمُ الشَّفَة **cheilalgia**

كل ألم يصدر عن الشفة سواء لسبب التهابي أو تشقق الصوار ، أو ألم عصبي في الشفة .

اسْتِئْصالُ الشَّفَة **cheilectomy**

1 ـ قطع الشفة (البتر الجراحي لجزء من الشفة)

2 ـ عملية تشذيب الحافات العظمية غير المنتظمة في التجويف المفصلي الذي يعيق الحركة .

انقِلابُ الشَّفَة **cheilectropion**

انقلاب الشفة إلى الخارج .

صامغ (زاوية الفم) **cheilion**

من نقاط القياسات الرأسية وتقع في زاوية الفم والأصل اللاتيني للمصطلح (Cheilos) وتعني الشفتين .

الْتِهابُ الشَّفَة **cheilitis**

التهاب الشفة حالة شاذة للشفتين تتميز بالتهاب وتشقق للجلد ، وهناك أشكال عديدة بحسب الحالات المسببة مثل التعرض لأشعة الشمس ، والحساسية للمستحضرات التجميلية ونقص



التهاب الشفة الزاوي
Angular cheilitis

وتقرح على حافة الشفة بعد فرط التعرض لأشعة الشمس ، قد يكون حاد أو مزمن يسمى كذلك التهاب الشفة الشمسي .

سابقة بمعنى الشَّفَة **cheilo-**
سابقة مصطلحية تعني الشفة أو ما يتعلق بها .

فلحٌ شفويٌ سِنخِيّ **cheiloalveoloschisis**
يسمى أيضاً (Chiloalveoloschisis) ، هو شق مشوه يشمل الشفة والأسناخ العظمية من الفك لكنه لا يصل إلى الحنك في الأعلى .

تنظيرُ أوعيةِ الشَّفة **cheiloangioscopy**
الملاحظة المجهرية للدوران الدموي في الشفة .

سَرَطانة الشَّفة **cheilocarcinoma**
ورم ظهاري خبيث في الشفة .

فلحٌ شفويٌ فكيٌ حَنَكِيٌ خِلقِيّ **cheilognatho-palatoschisis**
سوء تشكل خلفي ، يتميز بشق في الشفة العلوية ، والناتئ السنخي العلوي والحنك شق الشفة مع فلح الحنك .

فلَحٌ وَجْهِيٌ شَفَويٌ فكيٌ خِلقِيّ **cheilognathopro-soposchisis**
شذوذ تطوري يتكون من شرم وجهي مائل يستمر داخل الشفة والفك العلوي .

فلحٌ شفويٌ فكيٌ خِلقِيّ **cheilognathoschisis**
شذوذ تطوري يتكون من شفة مشقوقة وفك مشقوق .

مركزية وقنوات متمددة ، وربما تتطور إلى إحدى الأنواع الأخرى ، والنوع السطحي القيحي (يسمى داء بيلز) ، ويتميز بانتفاخ غير مؤلم وتقشر وقرحات في الشفة ، والنوع القيحي : وهو عدوى عميقة مع إفرازات وقنوات خراجية والتي تكون ندب .

اَلْتهابُ الشَّفَة الغدِّيُّ الخُرَاجِيُّ **cheilitis glandularis apostematosa**
انظر تحت cheilitis glandularis .

اَلْتهابُ الشَّفَة الوَرَمِيُّ الحُبَيبِيُّ **cheilitis granulomatosa**
التهاب الشفَة ، والذي يتميز بورم حبيبي وتورم ، يكون أحياناً جزء في متلازمة ملكيرسون ـ روزينثول ، وتسمى أيضاً (Miescher's granulomatous cheilitis) .

اَلْتهابُ الشَّفَة التَّسَمُّمِيُّ **cheilitis venenata**
اَلتهابَ جلديَ ناتج عن التلامس مع مستحضرات التجميل المخرشة أو الكيماويات المخرشة .

اَلْتهابُ الشَّفَة الصِّوارِيُّ **commissural cheilitis**
اَلتهاب الشفَة الذي يَصيب بشكل رئيسي زوايا الفم .

اَلْتهابُ الشَّفَة القُوبائِيُّ **impetiginous cheilitis**
اَلقوباء أو الحَصف اَلذي يصيب الشفة

اَلْتهابُ الشَّفَة بأحْمَرِ الشِّفاه **lipstick cheilitis**
اَلتهاب الشَفتين بمَواد أحمر الشفاه والآلية الإمراضية غالباً تكون تحسسية أو تخريشية كيميائية .

اَلْتهابُ الشَّفَة المُتَنَقِّلُ (= صُماغ) **migrating cheilitis (=perleche)**
التهاب الشفة أو الشفتين والمتنقل إلى زاوية الفم .
انظر تحت perleche .

اَلْتهابُ الشَّفَة الفُطارِيُّ **mycotic cheilitis**

اَلْتهابُ الشَّفَة السَّفْعِيُّ **solar cheilitis (=actinic cheilitis)**
انتفاخ مؤلم بالشفتين وحدوث تقشر وندب

الرضح ، أو نقص الڤيتامين ، أو عدوى فطرية . وهو شكل من أشكال تشقق الشفة والذي يصيب زوايا الفم .
انظر تحت perleche .

cheilostomatoplasty **رأبُ الشَّفة و الفم**
ترميم تقويمي للفم والشفتين ، وإصلاح لإصابات الشفة والفم بواسطة الجراحة التجميلية .

cheilotomy **بَضْعُ الشَّفة**
استئصال جزء من الشفة ، أو قطع بالشفة .

cheimaphobia **رُهابُ البَرْد**
الخوف المرضي من البرد .

cheir- **سابقة بمعنى اليَد**
كلمة مركبة تدل على اليد .

Cheiracanthium **الخَدَرْنَق**
جِنْسٌ مِنَ العَناكِبِ السَّامَّة .

Cheiracanthus **فَكِيَّةَ الفم**
جِنْسٌ مِنَ الدِّيدان المَسْودَة ، وتسمى أيضاً (الَفغمية : Gnathostoma) ، وهو جنس من الديدان المدورة .

cheiragra **نِقْرِسُ اليَد**
النقرس الذي يصيب اليد ، وخاصة النقرس التوفي مع لوي في الأصابع .

cheiralgia **ألَمُ اليَد**

cheiralgia paresthetica **أَلَمُ اليَدِ المَذَلِيُّ**
التهاب عصب معزول الفرع السطحي من العصب الكعبري (Radial nerve) .

cheirarthritis **التِهابُ مَفاصِلِ اليَد**
التهاب مفاصل الكف والأصابع .

cheiro- **سابقة بمعنى اليَد**
صيغة جمع تدل على علاقة اليد .

cheirobrachialgia **ألَمُ الذراع واليَد**
الألم الصادر عن الذراع واليد .

cheirocinesthesia **إدْراكُ حَرَكَةِ اليَد**
الإحساس الموضوعي بحركات اليد ، خاصة في الكتابة .
انظر تحت cheirokinesthesia .

cheilognathouranoschisis **فلَحٌ شَفَويٌّ فَكِيٌّ حَنَكِيٌّ خِلقِيّ**
شذوذ تطوري يتكون من شفة مشقوقة ، وفك علوي وحنك مشقوق .

cheilognathus **عَلَم**
يسمى أيضاً (Harelip) ، أو (Cleft lip) ، وهي الشفة المشقوقة خلقياً أو شفة الأرنب .
انظر تحت cleft lip .

cheiloncus **وَرَمٌ شَفَوِيّ**
أي ورم يصيب الشفة سواء كان حميداً أم خبيثاً .

cheilopalatognathus **فلَحٌ شَفَويٌّ حَنَكِيٌّ فكيّ**
شق خلقي عميق في الناتئ النسخي العلوي يصيب الشفة والفك ويمتد حتى الحنك ويكون مصحوب بفلح الحنك .

cheilophagia **قَضْمُ الشَّفة**

cheiloplasty **عض الشفة**

cheiloplasty **رَأبُ الشَّفة**
جراحة تقويمية ترميمية للشفة بواسطة الجراحة التجميلية ، وهي عملية جراحية لإصلاح التشوه الخلقي للشفة أو التشوه الرضحي . وتسمى أيضاً ترقيع الشفة (Labioplasty) .

cheilorrhaphy **رَفْوُ الشَّفة**
عملية جراحية بخياطة الشفة ، كما في الترميم الجراحي لفلح الشفة الخلقي .

cheiloschisis (=cleft lip) **عَلَم (=شفة مشقوقة)**
سوء تشكل في الشفة ، والناتج عن نقص التحام تطوري مثال : فلح الشفة .

cheilosis **تشقق الشفة**
حالة مرضية غير التهابية في الشفتين تتميز بالتشقق والانشطار ، وغالباً ما تصاحب عوز الريبوفلافين ، وتتميز بقشب الشفة وتشققها .

angular cheilosis (=perleche) **تشقُّق الشَّفَةِ الزَّاوِيّ (= صُماغ)**
تشقق بزاوية الفم نتيجة انخفاض البعد العمودي بسبب عدم وجود أسنان ، أو

chelation **خَلْب**

الائتلاف مع معدن في مركبات يكون فيها المعدن جزء من المركب الحلقي .

chelator **خالِب**

صفة العامل الذي ينزع المعادن من الجسم ليطرحها خارج الجسم بطريق الكلية .

chelen **كلوريد الإيتيل**

هو كلوريد الإيثيل (Ethyl chloride) .

chelicera **تآشير (في المفصليّات)**

زوج من الزائد الرأسية الشبيهة بالكلابات (الكماشات) على العناكب والعقارب والعنكبوتيات الأخرى من مفصليات الأرجل مثل : العناكب والبق والعقارب ، وتعمل الزوائد الأمامية كزوائد للتغذية .

chelidon **الحُفْرَةُ المِرْفقيَّة**

(=fossa cubitalis)

cheloid **جُدْرَة (ج: جُدرات)**

تسمى أيضاً (Keloid) ، وهو نسيج ندبي عقيدي كثير التفصص وثابت على شكل فرط تصنع نسيجي خطي يتألف من حزم كولاجينية ليفية متوزعة بشكل غير منتظم . وتحدث في الأدمة والنسج تحت الجلد ويكون حدوثها عادة بعد الجراحة أو الحروق أو الرضوح وبعد الالتهابات المزمنة كالعد الكيسي .

انظر تحت keloid .

cheloma **جُدْرَة**

(=keloid)

انظر تحت cheloid .

chelonian **سُلَحْفائِيّ**

يشير أو يتعلق بالسلاحف .

chemabrasion **سَحْجٌ كيمْيائِيّ**

تدمير وتقشير سطح الأدمة والطبقة العليا من الجلد بتطبيق مادة كاوية للجلد ، تستعمل لإزالة الندبات والوشم والتحبب الصباغي ، تسمى أيضاً تقشير كيميائي(Chemexfoliation) .

انظر تحت planing .

chemanesia **فَقْدُ الذاكِرةِ العِلاجِيُّ المَنْشأ**

cheirognomy **قِراءَةُ الكَف**

نوع من التنبؤ بقراءة خطوط الكف .

cheirognostic **متعلق بإدْراكِ جِهَةِ المُنَبِه**

صفة تتعلق بإدراك تحديد جهة ومصدر المنبه .

cheirokinesthesia **إدْراكُ حَرَكَةِ اليَد**

الإحساس الموضوعي بحركات اليد ، خاصة في الكتابة .

cheirokinesthetic **متعلق بإدْراكِ حَرَكَةِ اليَد**

تعود ، أو تمييز بتحساس حركة اليد .

cheirology **التَّواصُلُ بإشاراتِ اليَد**

(=dactylology)

التخاطب بالأصابع .

انظر تحت dactylolgy .

cheiromegaly **ضَخامَةُ اليَد**

التضخم غير الطبيعي في اليدين .

cheiroplasty **رأبُ اليَد**

جراحة تقويمية في اليد .

cheiropodalgia **ألَمُ اليَدِ والقَدَم**

cheiropompholyx **تَنَفُّطُ اليَد**

(=pompholyx)

فاقوع الأيدي والأقدام ، وهو طفح حويصلي راحي أخمصي .

cheiroscope **مِنْظارُ الصُّوَرِ التَّرَسُّمِيّ**

جهاز يستعمل في تدريب رؤية العينين ، حيث يتم إسقاط صورة بغرض الاختبار وتكون معكوسة في مرآة جانب العين السليمة ، ويتم تتبعها بقلم رصاص بواسطة العين الأخرى إلى لوحة الرسم والتي توجهه يد الشخص المختبر .

cheirospasm **تَشَنُّجُ اليَد**

تشنج في عضلات اليد .

chelate **خُلابَة (ج: خلابات)**

1 ـ الاتحاد مع معدن لتكوين معقد بحيث يكون المعدن جزء من المركب الحلقي .

2 ـ بشرح أكثر تفصيلاً ، هو مركب كيميائي يُحتجز فيه الأيون المعدني ، ويرتبط بقوة داخل حلقة في الجزئي الخالب تستخدم الخلابات في العلاجات الكيميائية للتسمم بالمعادن .

الكيماوِيَّاتُ المُحْتَمَلَةُ السُّمِّيَّة **potentially toxic chemicals**

المواد الكيميائية التي يمكن أن تتسبب في حدوث التسمم بها وإيذاء المواد العضوية .

سابقة بمعنى الكيمياء **chemico-**

كِيمْيائِيٌّ حَيَوِيّ **chemicobiological**

متعلق بالناحية البيولوجية (الحيوية) والناحية الكيميائية للمادة .

كَيٌّ كِيمْيائِيّ **chemicocautery**

انظر تحت chemical cautery .

نشوءٌ بالحَث الكِيمْيائِي **chemicogenesis**

تطور ونمو الخلية (Oocyte) بواسطة التنبيه الكيميائي .

كِيمْيائِيٌّ فيزْيائِيّ **chemicophysical**

يتعلق بالكيمياء والطبيعة (الفيزياء) ، يعود إلى علم الكيمياء الطبيعية .

كِيمْيائِيٌّ فيزْيولوجِيّ **chemicophysiologic**

يتعلق بعلم وظائف الأعضاء والكيمياء .

لَمَعَانٌ كِيمْيائِيّ **chemiluminescence**

تألق ناتج من التحول المباشر للطاقة الكيميائية إلى طاقة ضوئية .

تناضُحٌ كِيمْيائِيّ **chemiosmosis**

فعل كيميائي يحدث عبر غشاء شبه منفذ .

متعلق بالتَّنَاضُح الكِيمْيائِيّ **chemiosmotic**

صفة متعلقة بعملية التناضح الكيميائي المعتمدة على فروق التركيز بين الأوساط الكيميائية .

اِنجِذابٌ كِيمْيائِيّ **chemiotaxis**

مُعالجَةٌ كِيمْيائِيَّة **chemiotherapy**

1 ـ علاج الأمراض بالأدوية الكيميائية ، التي تؤثر على الجراثيم الممرضة دون الضرر بالمريض .

2 ـ علاج الورم الخبيث بواسطة الوسائل الكيميائية .

3 ـ استعمال المركبات الكيميائية في علاج الأمراض ، مثل لحاء الخشب الكينا في علاج الملاريا .

الفَعَّالِيَّة الكِيمْيائِيَّة **chemism**

فقد الذاكرة أثناء استعمال بعض الأدوية النفسية الخاصة .

تقشيرٌ كِيمْيائِيّ **chemexfoliation**

(= سَحْجٌ كيميائيّ) **(=chemabrasion)**

انظر تحت chemabrasion .

متعلق بالطب الكِيمْيائِي **chemiatric**

(= سَحْجٌ كيميائيّ) **(=iatrochemical)**

انظر تحت iatrochemical .

الطبُّ الكِيمْيائِيُّ **chemiatry**

(=iatrochemistry)

انظر تحت iatrochemistry .

كِيمْيائِيّ **chemical**

1 ـ أية مادة نوعية ، يكون تركيبها وخصائصها وتفاعلها معروفاً .

2 ـ صفة منسوبة لكل ما يتعلق بالكيمياء .

تَحْلِيلٌ كِيمْيائِيّ **chemical analysis**

التحليلَ المختَبَري ، والذي يستعمل لمقايسة مادة كيميائية موجودة كتحليل سكر الدم .

1 ـ كَيٌّ كِيمْيائِيّ **chemical cautery**

2 ـ مِكْواةٌ كِيمَيَائِيَّة

أداةَ تستعملَ المَوَاد الكيميائية كنترات الفضة في الكي ، كما يستعمل المصطلح بمعنى القيام بعملية الكي الكيميائي باستعمال مادة كيميائية كاوية .

اعْتِمادٌ عَلَى الكِيمَاوِيَّات **chemical dependency**

نوع من الإدمان على المواد الكيميائية .

شُعْبَةُ الاعْتِماد عَلَى الكِيَماوِيَّات **chemical dependency service**

القسم المتخصص بشؤون الاعتماد على تناول المواد الكيميائية .

الباثولوجيا الكيميائية **chemical pathology**

العلم الذي يبحث في العلل وآلياتها الإمراضية الإكلينيكية من الناحية الكيميائية .

مَوَادٌ كيميائية؛ كيمياويات **chemicals**

صيغة تستعمل لتشمل كل ما يتعلق بالمواد الكيميائية .

الأسنان .

الكيمْياءُ البيئيَّة **ecological chemistry**

دَراسات تلك المركبات الكيميائية المصنعة من النباتات ، ولا تخدم أي غرض أيضي ولكن بسبب تأثيرها السام على الحشرات والحيوانات العليا ، فقد تؤثر في مجتمع التفاعل بين النباتات والحيوانات .

الكيمْياءُ الطِّبِّيَّةُ الشَّرْعيَّة **forensic chemistry**

استعمال المعرفة والعلوم الكيميائية في حل المشاكل القانونية .

الكيمْياءُ الهيستولوجيَّة **histologic chemistry**

التبدلات والعلاقاتَ الكيميائية في علم النسج أو الهيستولوجيا .

الكيمْياءُ الصِّناعيَّة **industrial chemistry**

انظر تحت applied chemistry .

الكيمْياءُ اللاعُضْويَّة **inorganic chemistry**

فَرع علم الكيمياء الذي يتعامل مع المركبات التي لا تتواجد في عالم النبات والحيوان ، ويسمى أيضاً الكيمياء المعدنية (Mineral chemistry) .

الكيمْياءُ الطِّبِّيَّة **medical chemistry**

الكيمياء حيوية وعلاقتها بالطب .

الكيمْياءُ الاسْتِقْلابِيَّة **metabolic chemistry**

(= الكيمْياءُ الحَيَوِيَّة) **(=biochemistry)**

انظر تحت biochemistry .

الكيمْياءُ المَعْدنيَّة **mineral chemistry**

(= الكيمْياءُ اللاَّعُضْوِيَّة) **(=inorganic chemistry)**

انظر تحت inorganic chemistry .

الكيمْياءُ العُضْويَّة **organic chemistry**

فَرع الكيمياء الذي يدرس المركبات التي تحوي الكربون .

الكيمْياء الصَّيدلانيَّة **pharmaceutical chemistry**

الكيمياءَ التي تتعامل مع تكوين وتحضير المواد المستعملة في علاج المريض أو الدراسات التشخيصية .

1 ـ النشاط الكيميائي .

2 ـ خاصية كيميائية علاقة كيميائية .

امْتِزازٌ كِيمْيائِيّ **chemisorption**

الامتزاز أو الامتصاص للغاز أو السائل فوق سطح مادة صلبة ، مما يغير من خواصها الجزيئية ، وذلك عكس الامتزاز الفيزيائي ، الذي يتميز بقوى فاندرفالس ضعيفة (Van der waals forces) .

1 ـ كِيمْيائِيٌّ (مختص بالكيمياء) **chemist**

2 ـ صَيدَلِيّ (في بريطانيا)

1 ـ شخص بارع في علم الكيمياء

2 ـ (في بريطانيا) الشخص الدارس لعلوم الصيدلة .

الكِيمْياء **chemistry**

العلم الذي يدرس العناصر والعلاقات الذرية للمادة ، والتركيب ، ولمختلف المركبات في العناصر ، وتحليل تحولات المواد المختلفة .

الكيمْياءُ التَّحْليليَّة **analytical chemistry**

الكيمياء التي تعتمد على تحليل العناصر المختلفة المكونة للمركب .

الكيمْياءُ التَّطْبيقيَّة **applied chemistry**

تَطبيق الكيمياء في الصناعة والفنون ومجالات الحياة الأخرى ، وتسمى أيضاً (Industrial chemistry) .

الكيمْياءُ الحَيَوِيَّة ؛ الكيمْياءُ البيولوجية **biological chemistry**

تِقْنِيٌّ كيمْيائيّ **chemistry technologist**

المتدرب الخبير الذي يعمل في المختبرات الكيميائية .

الكيمْياءُ الإكلينيكية **clinical chemistry**

بحث الكيميائيات لتفسير الظواهر الإكلينيكية وما يحدث من تفاعلات واستقلابات كيميائية أثناء حدوثها داخل الجسم .

الكيمْياءُ الغَرَوانيَّة **colloid chemistry**

كيمياء تعالج طَبيعة وتكوين الغروانيات .

كيمْياءُ الأَسْنان **dental chemistry**

متعلقات بالتطبيقات الكيميائية في طب

للطاقـة ، تطلق أيضـاً على بعض الجـراثيم الحيوانات الأوالي (شعبة المملكة الحيوانية) .

chemobiotic **مُضادٌ حيَوِيٌّ كِيمْيائِيٌ**

(مركب من مضاد حيوي ودواء كيميائي)

توليفـة من العـوامل العـلاجيـة الكيـميـائيـة والمضادات الحـيوية ، ومثال ذلك : مـركبات السلفوناميد مع البنسلين .

chemocarcinogenesis **تَسَرْطُنٌ كِيمْيائِي**

التسـرطن الـذي يحـدث بفـعل تـأثيـر المواد الكيميائية كتأثير القطران المسرطن على الجلد .

chemocautery **كَيٌّ كِيمْيائِيٌ**

تدمير الأنسجة باستعمال مادة كيميائية كاوية ، ويسمى أيضاً (Chemical cautery) .

chemocephalia **فَطَحُ الرَّأس**

(مَنْسِبُ الرأس يقل عن 70)

تسطح الرأس وهي حـالة يكون فـيـها الرأس منخـفـض ومـسطح ، مع منسب الرأس (القحف) 70 أو أقل .

انظر تحت chemocephaly .

chemocephaly **فَطَحُ الرَّأس**

تسطح الرأس .

انظر تحت chamaecephaly .

chemoceptor **مُسْتقبِلَة كِيمْيائِيَّة**

انظر تحت chemoreceptor .

chemocoagulation **تَخَثّرٌ كِيمْيائِيٌ**

تخثر أو تدمر الأنسجة بتطبيق مواد كيميائية .

chemodectoma **وَرَمُ المُسْتقبِلات الكِيمْيائِيَّة**

أي ورم حميد سلبي ـ أليف للكروم في جملة المستقبلات الكيميائية ، النوع الأكثر شيوعاً : هـو ورم الجـسم السـبـاتي ، الورم الكبي الوداجي ، والورم الكبي الحائر ، ويسمى أيضاً ورم المسـتـقـبـلات اللاصـبـوغـة بالكروم (Non-chromaffin paraganglioma) .

chemodifferentiation **تَمايُزٌ كِيمْيائِيٌ**

النقطة اللامـرئيـة لـلتـحكم ، والتي تـتـقـدم وتـتـحـكم في تمـايز الخـلايا إلى أعـضـاء رديمة للجنين .

physical chemistry **الكيمْياءُ الفيزْيائيَّة**

فرَع الكيمَياء الَذي يستعمل الأساليب الكمية ، مع تطبيق مفـاهيم وقـوانين علـم الطبيـعـة ، لوصف وفهم الخواص الكيميائية .

physiological chemistry (=biochemistry) **الكيمْياءُ الفِيزْيولوجيَّة (= الكيمْياءُ الحَيَويَّة)**

انظر تحت biochemistry .

radiation chemistry **الكيمْياءُ الإشْعاعيَّة**

الكيمياء اَلتي تَختص بدراسة الإشعاع وتأثيره من الناحية الكيميائية على المواد الأخرى .

structural chemistry **الكيمْياءُ البنْيَويَّة**

اَلعلم الذَي يَبـحث في التكوين البنيـوي الكيميائي .

surface chemistry **الكيمْياءُ السَّطْحيَّة**

دراسـة القـوى المؤثرة على سطوح الغـازات والسـوائل أو الجـوامـد أو الأسطح البينية بين حالتين من المواد .

synthetic chemistry **الكيمْياءُ التَّخْليقيَّة**

فـرع الكيـمـيـاء الذي يدرس بناء المركبـات الكيميائية من مواد بسيطة أو من عناصر .

chemo- **سابقة بمعنى الكيمياء**

صيغة جمع ترمز إلى العلاقة مع الكيمياء ، أو إلى مادة كيميائية ، تكتب كذلك (Chemi-) و (Chemic) (o) .

chemoantigen **مُسْتَضِدٌ كِيمْيائِيٌ**

عامل كيميائي يحفز الانجذاب الموجب .

chemoattractant **جاذِبٌ كِيمْيائِيٌ**

عامل الانجذاب الكيميائي الذي يحفز الانجذاب الكيميائي الإيجابي .

chemoautotroph **ذاتِيُّ التَّغَذِّي الكِيمْيائِيُّ**

مكروب (كائن دقيق) ذاتي التغذية الكيميائية .

chemoautotrophic **متعلق بذاتِي التَّغَذِّي الكِيمْيائِي**

كائنات تتطلب للنمو مركبات غير عضوية فقط مع ثاني أكسيد الكربون باعتباره المصدر الوحيد للكربون (ذاتي التغذية) ، والمركبات الكيميائية غير العضـوية المؤكسدة والتي تعتبـر كـمصـدر

chemonucleolysis **الحَلُّ الكيمْيائيُّ للقُرْص الفِقْري**

احـلال (ذوبـان) النواة اللبـيـــة للقــرص بين الفـقـرتين بـحـقن عـامل حـال للبـروتين مـثل الكيموبابائين ، يستعمل خاصة في علاج انفتاق القرص بين الفقرتين .

chemoorganotroph **عُضْويُّ التَّغَذي الكيمْيائِي**

كائن حي عضوي التغذية الكيميائية .

chemoorganotrophic **متعلق بعُضْوي التَّغَذي الكيمْيائي**

مـختلف الـتـغذية ، يتطلب مـركـبـات عـضـوية سابقة التكوين كـمصـدر للكربون ومـركـبات عـضـوية مـؤكـسـدة كـمـصـدر للطاقة ، يقـال للجراثيم .

chemopallidectomy **الاستئصالُ الكيمْيائيُّ للكرة الشَّاحِبَة**

تدمير جـزء من الكـرة الشـاحـبة بإدخال عـامل كيميائي .

chemopallidothalamectomy **الاستئصالُ الكيمْيائيُّ للكرة الشَّاحِبَة و المِهاد**

تدمـير جـزء من الكرة الشـاحـبة والمهـاد بإدخـال عامل كيميائي .

chemopallidotomy **البَضْعُ الكيمْيائيُّ للكرةِ الشَّاحِبَة**

بضع الكرة الشاحبة بإدخال مادة كيميائية .

chemopharmacodynamic **متعلق بالتَّأثيرات الكيمْيائيَّة للدَّواء**

تدل عـلى العــلاقـة بين التكوين الـكـيـمـيـائي والنشـاط الـبـيـولـوجي أو الدوائي أي أنهـا تدرس العـلاقـة بين تـأثـير الدواء الـبـيـولـوجي وفـعـاليته الدوائـية من جـهـة وبالتـركـيب الكـيمـيـائي له من جـهة أخرى .

chemophysiology (=biochemistry) **الفِيزْيولوجْيا الكيمْيائيَّة (= الكيمْياءُ الحَيَويَّة)**

انظر تحت biochemistry

chemoprevention **وقايَة كيمْيائيَّة**

chemoheterotroph **غَيريُّ التَّغَذي الكيمْيائِي**

كائن متغاير التغذية الكيميائية .

chemoheterotrophic **متعلق بغَيري التَّغَذي الكيمْيائي**

متـغـايـر التـغـذية الكـيـمـيـائيـة ، والتي تـتطلب مـركـبـات عـضـوية مسـبـقـة التـشكيل كـمـصـدر للكربون ومـركـبـات عـضـوية مؤكـسـدة ومصـدر للطاقة .

chemohormonal **كيمْيائيٌّ هُرْمونِي**

يعود إلى مـواد مصنعة كيميائياً (غالـباً دوائية) ، وتملك نشاط هرموني .

chemoimmunity **مَناعَة كيمْيائيَّة**

1 ـ دراسـة الأسـاسـيات الكـيـمـيـائيـة لـلظواهر المناعية .

2 ـ تطبيـق الأضـداد أو اسـتـخـدامـهـا كـكواشف كيميائية .

chemoimmunology (=immunochemistry) **المَناعِيَّاتُ الكيمْيائيَّة**

كيمياء مناعية .

chemokinesis **تَنْشيطٌ كيمْيائِيّ**

زيادة النشـاط (الفـاعلية) غيـر الموجهة للخلية بسبب وجود مادة كيميائية .

chemokinetic **مُنَشِّط كيمْيائِي**

خاصة أو تظهر بالتنشيط الكيميائي .

chemolithotroph **جَماديُّ التَّغَذي الكيمْيائِي**

كائن حي جمادي التغذية الكيميائية .

chemolithotrophic **متعلق بجَمادي التَّغَذي**

اسـتـخـدام ثنائي أكـسـيـد الكربون كـمـصـدر للكربون ، واستمداد الطاقة من أكسدة المركبات غير العضوية .

chemoluminescence **لُمَاْنٌ كيمْيائِيّ**

انظر تحت chemiluminescence .

chemolysis **تَحَلُّلٌ كيمْيائِيّ**

انظر تحت decomposition .

chemomorphosis **اسْتِحالَة شَكليَّة كيمْيائيَّة**

تغير في الشكل أو المرحلة التطويرية بسبب فعل كيميائي .

والتي تملك قدرة تثبيت المواد الكيميائية ، تماماً مثل طريقة تثبيت السموم الجرثومية ، تسمى أيضاً (Chemoceptor) .

chemoreflex **مُنْعكسٌ كيمْيائيّ**

المنعكس الذي يبدأ بتنبيه المستقبلات الكيميائية مثل تنبيه الجسم السباتي .

chemoresistance **مُقاومَة كيمْيائيَّة**

مقاومة نوعية تكتسبها الخلايا لفعل المواد الكيميائية .

chemosensitive **حَسَّاسٌ للكيماويَّات**

حساس إلى التغيرات في التكوين الكيميائي في البيئة .

chemosensory **حِسيٌّ كيمْيائيّ**

يعود إلى الإدراك الحسي للمواد الكيمائية ، كما في اكتشاف الرائحة .

chemoserotherapy **مُعالجَة كيمْيائيَّة مَصْليَّة**

علاج المرض بالأدوية والأمصال معاً .

chemosis **وَذْمَة المُلتحِمَة**

فرط وذمة ملتحمة العين المفرطة .

chemosmosis **تَناضُحٌ كيمْيائيّ**

انظر تحت chemiosmosis .

chemosmotic **متعلق بالتَّناضُح الكيمْيائيُّ**

يشيرأو يتعلق بالتناضح الكيميائي .

chemosorption **امْتِزازٌ كيمْيائيّ**

انظر تحت chemisorption .

chemosphere **الكرَة الكيمْيائيَّة**

طبقة في الغلاف الجوي العلوي حيث تصبح فيه التفاعلات الضوئية الكيميائية هامة (ارتفاعها 30-80 كيلو متر) .

chemostat **ناظِمٌ كيمْيائيّ**

جهاز يتم فيه التحكم في البيئة بحيث يتم الاحتفاظ بمجموعات من الجراثيم في حالة انقسام للخلايا ثابت في بيئة ثابتة .

chemosterilant **مُعقِّمٌ كيمْيائيّ**

مركب كيميائي يسبب تناوله عقم للكائن الحي ، مثل تلك المركبات التي استعملت كوسيلة للتحكم في مختلف الحشرات والآفات (=chemoprophylaxis)

انظر تحت chemoprophylaxis .

chemoprophylaxis **وقاية كيمْيائيَّة**

استخدام عامل علاجي كيميائي كوسيلة تطور وقائي لمرض معين ، وتسمى أيضاً (Chemprevention) .

local chemoprophylaxis **وقايَةٌ كيمْيائيَّةٌ مَوضعيَّة**

الوقاية التي تستعمل المواد الكيميائية موضعياً في الوقاية من المرض ، كالواقيات من تأثير الأشعة الشمسية .

primary chemoprophylaxis **وقايَةٌ كيمْيائيَّةٌ أوَّليَّة**

استعمال إتقائي لعامل علاج كيميائي قبل حدوث العدوى في الفرد .

secondary chemoprophylaxis **وقايَةٌ كيمْيائيَّةٌ ثانَويَّة**

استعمال إتقائي لعامل علاجي كيميائي بعد حدوث العدوى في الفرد قبل أن يصبح المرض ظاهراً عليه ، مثل العدوى بالمتفطرة السلية .

chempsychiatry **المعالجَة النَّفسيَّة الكيميائيَّة**

استعمال العوامل العلاجية الكيميائية في علاج الاضطرابات العقلية والعاطفية (دواء نفساني) .

chemoreception **اسْتِقبالٌ كيمْيائيّ**

عملية الإحساس والإدراك بالمثير الكيميائي في الوسط المحيط .

chemoreceptor **مُسْتقبلَة كيمْيائيَّة**

1 ـ مستقبل مكيف للاستثارة بمواد كيميائية ، مثل المستقبلات الشمية والتذوقية .

2 ـ أعضاء إحساس مثل الجسم السباتي ، والأجسام الأورطية أو الكبة الوداجية ، التي تكون حساسة للتغيرات الكيميائية في مجرى الدم ، وخاصة محتوى الأكسجين المنخفض ، وانعكاسه بزيادة كلاً من التنفس وضغط الدم معاً .

3 ـ مجموعة ذرات مفترضة في جبلة الخلية ،

مواقع التفاعلات الالتهابية ، والتي تشمل اللمفوكين ، والوسائط بالعقدات والخلايا البدنية ، والمنتجات الجرثومية ، C_{5a} ، ومكونات المتممة المفعلة .

الاستئصال الكيميائي للمهاد **chemothala-mectomy**

تدمير جزء من المهاد بإدخال عامل كيميائي .

البضع الكيميائي للمهاد **chemothalamotomy**

تدمير لجزء من الغدة النخامية بإعطاء مادة كيميائية .

1ـ متعلق بالمعالجة الكيميائية **chemotherapeutic**

2ـ علاج كيميائي

يشير إلى العلاج الكيميائي .

المنسب العلاجي الكيميائي **chemotherapeutic index**

نسبة الجرعة الدوائية الفعالة الدنيا بالتأثير الدوائي مقسومة على الجرعة القصوى للدواء التي يمكن تحملها ، وقد استعملها إيرلخ في الأساس للتعبير عن السمية النسبية للأدوية بالنسبة للطفيليات (الجراثيم) والثوي .

مبحث المعالجة الكيميائية **chemotherapeutics**

انظر تحت chemotherapy .

معالجة كيميائية **chemotherapy**

معالجة المرض بعوامل كيميائية ، والتي تطبق أولاً وبصورة مبدئية لتستخدم المواد الكيميائية التي تؤثر على الكائنات الحية المسببة للمرض ولكنها غير مؤذية للمريض .

متعلق بوذمة الملتحمة **chemotic**

1ـ صفة منسوبة إلى (Chemosis) ، وهي حالة وذمة الملتحمة العينية التي تشكل تورماً حول القرنية .

2ـ عامل يزيد إنتاج اللمف في ملتحمة العين .

كيميائي التغذي **chemotrophic**

يشتق الطاقة من أكسدة المركبات العضوية (متغذية عضوية كيميائية) ، وغير عضوية (متغذية جمادية كيميائية) تقال عن الجراثيم .

كيميائي التوجه **chemotropic**

الأخرى بأحداث عقم في الذكور .

تعقيم كيميائي **chemosterilization**

استعمال المواد الكيميائية في تخريب المناسل أو النطاف أو البيوض . وأكثر ما تستعمل في تعقيم الحشرات .

كبت كيميائي **chemosuppression**

الكبت والتثبيط للجهاز المناعي بتأثير الكيميائيات الدوائية الكابتة للمناعة .

جراحة كيميائية **chemosurgery**

تدمير الأنسجة عن طريق عوامل كيميائية ، تستعمل في الأصل للتثبيت الكيميائي للأنسجة المصابة بالورم الخبيث أو الغرغرينة ، مع استعمال مقاطع مجمدة لتسهيل التحكم المجهري المستمر بمدى حجم الجذ (الاستئصال) .

تخليق كيميائي **chemosynthesis**

تصنيع الكربوهيدرات من ثنائي أكسيد الكربون والماء نتيجة الطاقة المشتقة من التفاعلات الكيميائية ، عوضاً عن الضوء الممتص مثل ذلك التركيب تفضله بعض أنواع الجراثيم والطحالب .

1ـ متعلق بالتخليق الكيميائي **chemosynthetic**

2ـ مخلق كيميائيا

يشير إلى أو يتصف بالتخليق الكيميائي .

1ـ جاذب كيميائي **chemotactic**

2ـ منجذب كيميائيا

يشير للانجذاب الكيميائي .

انجذاب كيميائي **chemotaxis**

توجه الخلية على طول مدروج التركيز الكيميائي أو الحركة في اتجاه المدروج ، إما نحو (إنجذاب كيميائي موجب) أو بعيداً عن (إنجذاب كيميائي سالب) التركيز الأكبر في المادة ، يشار إليه بوصفه عامل انجذاب كيميائي ، أو مجذب كيميائي ، أو جاذب كيميائي تظهر كلا من البلاعم والعدلات اليوزينية والخلايا اللمفاوية كاستجابة كيميائية إلى مجموعة واسعة من المواد التي تفرز عند

كَرَز **cherry**

1ـ أي من الأشـجـار الشـبـيـهـة بالورد والأنواع المختلفة من جنس البرقوق (جنس من الفاكهة)، يسمى أيضاً (Cerasus).

2ـ ثمار أحـد هذه الأشـجـار والذي يسـتـخدم كنكهة.

انظر تحت juice.

3ـ أي من الأشـجـار المعينة الأخرى التي تـشبه أشجار الكرز من جنس البرقوق.

الكَرَزُ الغاريُّ **cherry laurel**

يسـمى أيضـاً (Prunus laurocerasus)، وهي أنواع كثيرة من أشـجار وشجيرات الكرز التي تنتشر كثيراً في الحـدائق الأمريكية وأوراقها دائمة الخضرة وكثيرة الاستعمالات، لكنها سامة للحيوانات.

بَرْقوقُ فِرْجينْيا **choke cherry**

(=Prunus virginiana)

شجرة توجد شمال أمريكا، وللحائها خواص مسكنة وقابضة، وثمارها ذو خاصية قابضة عالية وتحتوي أوراقها وبذورها على مركبات مكونة للسـيـانيـد ويمكن أن تسبب التسـمم بالسيانيد للحيوانات.

الكَرَزُ الأَسْوَدُ البَرِّيُّ **rum cherry**

(=Prunus serotina)

الكَرَزُ الأَسْوَدُ البَرِّيّ **wild cherry**

(=Prunus serotina)

1ـ شجرة أمريكية كبيرة مع لحاء داكن وأوراق بيضاوية سميكة، وتنتج الكرز البري ذو النكهة وتحتوي أوراقها وبذورها على مركبات مكونة للسيان، وتسبب تسمم السيانيد في الماشية.

2ـ لحـاء السـاق الجـاف في الشـجـرة والذي يستعمل على شكل عصير ليعطي نكهة الأدوية ويسمى أيضاً (Wild cherry syrup).

وَرَمُ زَوايا الفَك **cherubism**

تورم وراثي ثنائي الجانب مترق عند زاوية الفك الأسفل وأحياناً ما يشمل الفكَّ بأكمله. يعطي التورم مظهر ملائكي للوجه ويكون متزايد في

منسوب أو يعود إلى التوجه الكيميائي.

تَوَجُّهٌ كِيمْيائِيّ **chemotropism**

انتماء أو انجذاب في استجابة إلى مثير كيميائي.

كِيمْياءُ الخاماتِ العُضْوِيَّة **chemurgy**

تطبيق مادة كيميائية في الاستعمال الصناعي للمنتجات العضوية الخام، خاصة المنتجات الزراعية.

كِيْنودِيُوكْسِي كولات **chenodeoxycholate**

ملح أو شكل أنيوني من حمض كينوديوكس كوليك.

كِينودِيُول **chenodiol**

(حَمْضُ كِينودِيُوكْسِي كولِيك)

هو حـمـض كـينوديوكس كـوليك والذي يستخدم كمضاد للحصيات الصفراوية، لإذابة الحصيات الشفيفة للأشعة غير المتكلسة، ويعطى فموياً.

رِجْلُ الوَزّ **Chenopodium**

(جِنسُ أعشاب مِنَ السَّرْمَقِيَّات)

جنس أعشاب من فصيلة السرمقيات، متوطنة في الأقاليم المعتدلة، وهي مصدر لزيت رجل الوز، أو الفـزلين الأبيض لرجل الوز تحـوي وأوكسلات ونترات ويمكن أن تسبب تسمم أوكسالاتي ونتريتي في الحيوانات المجترة (المجترات).

مُعالجَة بالكِينُودِيُول **chenotherapy**

المعالجة التي تستعمل الكينوديول في إذابة الحصيات الصفراوية.

صَبُّ القالِب مِنَ المَعْدَنِ الذَّوّاب **cheoplasty**

(أسنان)

في طب الأسنان المختبري، هي عملية صب المعدن الذواب في القالب ليأخذ شكله، وتشكيل الأسنان الصناعية من سبائك لهادرجة انصهار منخفضة، ولم تعد تستعمل في الوقت الحاضر.

رُهابُ السَّعادَة **cherophobia**

الخوف المرضي من حدوث السعادة للمصاب بهذا النمط من الخوف.

بعض الحـالات عند إرتداء العيـون إلى أعلى ـ يسـمى كـذلـك خلل التنسج الليـفي في الفك وورم الخلية العملاقة ثنائي الجانب .

chest **صَدْر (ج:صُدور)**

انظر تحت thorax .

alar chest **صَدْرٌ جَنَاحِيّ**

(=flat chest) **(= صَدْرٌ مُسَطَّح)**

انظر تحت flat chest .

barrel chest **صَدْرٌ بَرْمِيلِيّ**

صدر مستَدير بارز ، مع زيادة غير طبيعية في القطر الأمامي الخلفي ، يظهر حركة قليلة عند التنفس ، يرى في النفاخ والحداب .

blast chest **صَدْرُ الانْفِجار**

تسـمى أيضـاً ارتجـاج رئوي (Pulmonary concussion) ، والنزف الدموي الذي يحـدث في إصابات الانفجار .

cobbler's chest **صَدْرُ الإسْكافي**

صدر يظهر غوران عند الطرف الأسفل لعظم القص (Sternum) .

emphysematous chest **صَدْرٌ نُفَاخِيّ**

الصدر البَرميلي الذي نشاهده في مرض الربو .

fissured chest **صَدْرٌ مَشْقُوق**

نوع من تشـوه الصـدر يكون فيـه عظم القص غائراً بشدة .

flail chest **صَدْرٌ سائِب**

الصدر الّذي يتحرك جداره بصورة عكسية مع التنفس ، نتيجة لكسور متعددة في الضلوع .

flat chest **صَدْرٌ مُسَطَّح**

(تشوه اعوجاج) يكون فيه الصدر مسطحاً من الأمـام للخلف ، يسـمى أيضـاً (Pterygoid chest) ، (Alar chest) .

foveated chest **صَدْرٌ نَقِيرِيّ**

(=funnel chest) **(= صَدْرٌ قِمْعِيّ)**

انظر تحت funnel chest .

انظر تحت pectus excavatum .

funnel chest **صَدْرٌ قِمْعِيّ**

تشوهٌ صَدري يكون فيه شكل الصدر كالقمع واسعاً في الأعلى وضيقاً في الأسفل .

انظر تحت pectus excavatum .

hourglass chest **صَدْرٌ مَخْصُور**

تشوه في شكل الصدر يكون ضيقاً في منتصفه بحيث يشبه الساعة الرملية المخصورة في وسطها .

keeled chest **صَدْرٌ جُؤْجُؤِيّ**

(=pigeon breast)

انظر تحت pectus carinatum .

paralytic chest **صَدْرٌ شَلَلِيّ**

صدر طويل وضيق مع هزال شديد ، وتبرز فيه الضلوع بشكل واضح تحت الجلد .

pendelluft chest **صَدْرٌ سائِب**

يسمى أيضاً (Flail chest) ، (Stove-in chest) ، وهو الذي تكون فيـه الأضـلاع غيـر مـرتبطة بالقص ، ويحـدث في كسـور الأضـلاع في الحوادث أو عمليات الصدر المفتوحة . ويسبب حالة من نقص التنفس .

phthinoid chest **صَدْرٌ سُلِّيّ**

صـدر المريض المصـاب بمرض السل وتظهـر علاماته الشعاعية بمنظر كهف وصفي في قمة إحدى الرئتين ، أو الكثافات الرئوية المزمنة .



cobbler's chest **صَدْرُ الإِسْكافِي**

والتي تغـزو القطط ، والخـيلتـيـة النهـومـة (Parasitovorax) ، (Cheyletiella) والتي تغــزو الأرانب (Cheyletiella yasguri) والتي تغــزو الكلاب .

Cheyletiella parasitovorax **الخَيلَتيلَةُ النَّهومَة**

تسبب حالة سوس فـرو الأرانب (Rabbit fur mite) بالمراقبة الدقيقة للأرانب المصابة تشاهد بالفعل قشور متحركة على الجلد . وتعتبر ناتجة عن تحــرك هذا النوع من الســوس تحت هذه القشور .

chiasm **تصالبَة**

تصالب أو تقاطع على شكل X .

انظر تحت chiasma .

chiasm of digits of hand **تَصالُبَةُ أصابعِ اليَد**

تصالب وتري في الأصابع الصغرى .

انظر تحت chiasma tendinum digitorum .

optic chiasm **التَّصالُبَةُ البَصَرِيَّة**

انظر تحت chiasma opticum .

tendinous chiasm of flexor digitorum sublimis muscle (=chiasma tendinum digitorum manus TA) **التَّصالُبَةُ الوَتَرِيَّةُ للعَضَلَةِ الصَّاعِدَةِ الْمُثْنِيَةِ لأصابِعِ اليَد (=التَّصالُبَةُ الوَتَرِيَّةُ لأصابِعِ اليَد)**

chiasma TA **تصالبَة**

(pl.chiasmata) **(ج:تصالبات)**

1ـ مصطلح عام في التسمية التشريحية في التصــالب أو التـقــاطع على شكل X مـثل الأعصاب .

2ـ في الوراثة : الأمـاكن التي يظل فـيـهـا شقي الكرومـوسـوم المماثلين مرتبطان خـلال الطور الأول في الانقسام الخلوي إلى طور الصعود في طور الانتصاف الأول ، والمؤشر له حدوث تبادل القطع المماثلة بين شقي الكروموسومات غير الأخوية بالتعابر .

chiasma opticum TA **التَّصالُبَةُ البَصَرِيَّة**

الجزء من الوطاء المتكون نتيجة التصالب ، أو

pigeon chest (=pigeon breast) **صَدْرٌ جُؤْجُؤِيّ**

انظر تحت pectus carcinatum .

pterygoid chest (=flat chest) **صَدْرٌ جَناحِيّ (= صَدْرٌ مُسَطَّح)**

انظر تحت flat chest .

rachitic chest **صَدْرٌ رَخَدِيّ**

يظهـر عندَ الأطفال على شكل عقيدات كبيرة على جانبي القص تشبه السبحة . وكثيراً ما تكون الأضلاع ضعيفة ولينة جداً ، وينجم عن نقص تكلس العظام بسبب عوز الڤيتامين D عند الأطفال .

stove-in chest **صَدْرٌ مُهَشَّم**

هو الصدر السائب .

انظر تحت pendelluft chest .

tetrahedron chest **صَدْرٌ هَرَمِي**

صدر يشبَه شكل صلب ذو أربعة جوانب ، كل منها مثلث متساوي الأضلاع ، ويبرز الصدر في ذروته بين الحلمات .

chestnut **كَسْتَنَة؛ أبو فَرْوَة**

1ـ الكستنة (جنس شجر من الفصيلة البلوطية)

2ـ جوزة أي نوع من أنواع الكستنة المختلفة .

3ـ واحد من كتل القـرن على السطح الإنسي للساعد في الإنسان ، أو على الجزء القاصي من السطح الإنسي لرصغ الحصان .

horse chestnut (=Aesculus) **كَسْتَنَةُ الهِنْد ؛ كَسْتَنَةُ الخَيل**

chetivism **ضَآلَة**

أصل الكلمة فرنسي (Chétif) ، وتعني النحافة أو القلة والضآلة .

chew **يَمْضَغ**

فعل المضغ وهو هرس الطعام بين الأسنان .

Cheyletiella **الخَيلَتيلَة (جِنسٌ مِنَ السُّوس)**

جنس من الســوس غـيــر الناقب من عــائلة الخـيلتـيـة ، وتغـزو بشكل رئيـسي الحـيـوانات الأليفة ، غير أن بعض الأنواع تسبب داء الجلاد في الإنســان . ومنهـــا (Cheyletiella blakei) ،

بلاجرة **Chichism (=pellagra)**

تسمى أيضاً (Pellagra) ، (Alpine scurvy) ، (Maidism ، (Mal de la rosa) ، (Mal rosso) ، (Mayidism) ، (Psychoneurosis maidica) ، (Saint ignatius' itch) ، هو مرض يتجلى باضطرابات هضمية وحمامية في المناطق المكشوفة من الجسم ، يتلوها التقشر ، مع اضطربات عصبية وعقلية وتحدث في سوء التغذية وخاصة عوز النياسين .

حُماق **chickenpox (=varicella)**

يسمى أيضاً جدري الماء (Varicella) ، وهو مرض معدي (عدوائي) مرتفع العدوى ذو فترة حضانة تبلغ 14 يوم ، وتسببه الفيروسات الحلئية البشرية 3 ، تصيب الأطفال عادة ، تنتشر بالتماس المباشر أو المجرى التنفسي عن طريق نوى القطيرات (الإرذاذ) ، وتتميز بظهور نمو متعاقب على الجلد والأغشية المخاطية للآفات

التعابر لألياف العصب البصري من الضف الإنسي من شبكية العين ، وتسمى أيضاً (Optic decussation)

التَّصالُبَةُ الوتَرِيَّةُ الأُصْبُعِيَّة **chiasma tendinum digitorum manus TA**

تصالبيّ **chiasmal**

متعلق بالتصالبة (Chiasma) .

تصالبيّ **chiasmatic**

متعلق بالتصالبة .

انظر تحت chiasma .

التَّعابُر **chiasmatypy (=crossing over)**

تصالبيّ **chiasmic**

مِقياسُ انْحِرافِ البَصَر **chiasmometer**

جهاز لقياس أي انحراف في المحور البصري عن توازيه الطبيعي .

مِقياسُ انْحِرافِ البَصَر **chiastometer**

جهاز لقياس أي انحراف في المحور البصري عن توازيه الطبيعي .



Rachitic chest **صَدْرٌ رَخَدِيّ**

رئيس شعبة صحية أو قسم إداري .

رَئيسُ الهَيْئَة ؛ رَئيسُ الأَطبَّاء **chief of staff**

رئيس الهيئة الصَحية أو الَرئيس الطبي العام .

القَذَذ (ج: قِذّان) **chigger**

(يَرَقاتُ عُثٍّ مِنْ جِنْسِ الخَطْماء)

اليرقة الحمراء ذات الأرجل الستة من العث (السوس) ، من فصيلة الخطماوات ، والتي تغزو العديد من جلد الفقاريات ، خاصة الثدييات بما فيها الإنسان ، تلتصق بجلد مضيفها وتنتج عضاتها انتبار ، عادة مع حكة حادة والتهاب الجلد (داء الخطماوات) . موطنها في الحشائش الطويلة والشجيرات النامية تحت الاشجار الكبيرة . ومنها الخطيماء الألفريدوجيسية (Eutrombicula afreddugеs) ، هو السائد في الولايات المتحدة . ونوع الخطماء الرائعة (Eutrombicula splendens) في جنوب شرق الولايات المتحدة ، ونوع الخطماء الخريفية (Trombicula autumnalis) ، وهو نوع معروف في أوروبا ، وتكون بعض الأنواع في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي عوائل ريكتسيات التيفوس ، ويختلف القذذ عن نوع البرغوث الوالج .

البُرْغوثُ الوالِج **chigo**

انظر تحت chigoe .

البُرْغوثُ الوالِج **chigoe**

البرغوث الطامر الوالج ، والمتواجد في أمريكا وأفريقيا الاستوائية وشبه الاستوائية ، تحفر الأنثى الحامل للبرغوث في القدم (تحت الظفر غالباً) والساق أو جزء آخر في الجسم ، والتي تسبب تهيج شديد وتقرح ، وتؤدي أحياناً إلى بتر تلقائي للأصبع ، يجب تمييزها كذلك من القذذ (Chigger) ، وتسمى أيضاً البرغوث الحفار (Burrowing flea) وبرغوث الرمل (Sand flea) .

شِيكونجونيا **chikungunya**

(نوعٌ مِنَ الحُمِّيَاتِ النَّزْفِيَّة)

مرض محدود ذاتياً يشبه حمى الدنك ، يشاهد الحويصلية الحكية المألوفة ، وتترافق عموماً مع أعراض بدئية خفيفة ، وهي حميدة نسبياً في الأطفال في ما عدا أولئك منقوصي المناعة وحديثي الولادة فتكون لها أعراض وخيمة . ربما تتضاعف إصابة الكبار بسبب التهاب الرئة والتهاب الدماغ .

انظر تحت herpes zoster .

حِمِّص **chick-pea**

(جنس نبات من الفصيلة القرنية)

(=Cicer)

نبات بقلي (قرني) في جنوب أوربا من الفصيلة القرنية ، ويستعمل على نحو واسع كطعام لكنه سام لبعض الأفراد .

هِنْدِباء (نبات) **chicory**

نبات بأنواع مختلفة أهمها الهندباء الشائعة (Common chicory) أو (Cichorium intybus) ، وهي شجيرات عشبية دائمة الخضرة طوال العام ومنها ذات أزهار زرقاء ومنها بيضاء الأزهار . تستخدم جذورها كمضاف للنكهات أو كبديل للقهوة.

رَئيس **chief**

أي شيء يمثل القمة أو الذروة في العمل والتوجيه والأهمية .

رَئيسُ المُهَنْدِسين **chief engineer**

مهندسَ رئيس للمهندسين ، في الإدارة والتوجيه .

المُديرُ التَّنْفيذيُّ **chief executive officer**

رئيس العملَ الموجه لتنفيذ الخطط المقررة .

المُديرُ الماليُّ **chief financial officer**

الرئيس َالأعلى المسؤول عن الشؤون المالية في دائرة أو شركة .

مَسْؤولُ الإسْتِعْلاَمات الرَّئيسيُّ **chief information officer**

المسؤول الإعلامي .

رَئيسَةُ المُمَرِّضات **chief of nursing**

رئيسة الممرضات العامة في مستشفى .

رَئيسُ الشُّعْبَة **chief of service**

الأنانية .

طفلٌ مَوهوب gifted child

الطفل المتطور الإبداعي في مجال معين أو أكثر بحيث يسبق عمرهُ العقلي عمرَه الزمني .

طفلٌ وليد newborn child
(=neonate)

الطفل المولود حديثاً وحتى الشهر الأول من العمر تقريباً . ويسمى أيضاً (Neonate) .

طفلُ ما قَبْلَ المَدْرَسَة (2-6 سَنَوات) preschool child

طفل ما قبل المدرسة ، طفل عمره ما بين سنتان وست سنوات .

طفْلُ المَدْرَسَة (6-12 سَنَة) school child

طَفل بين السادسة والعاشرة إلى الثانية عشر من العمر .

إرْشادُ الأطفال child guidance

العمليات التربوية في توجيه الأطفال إلى طرق السلامة في فترة طفولتهم .

الولادة child-bearing

فترة الحمل حتى نهاية المخاض وحدوث الولادة . وقد يراد به الولادة فقط .

نِفاس childbed

قد يكنى بهذا المصطلح عن فترة النفاس التي تمكث فيها الأم في السرير بعد الولادة ، وقد يراد به سرير المولود .

حُمَّى النِّفاس childbed fever

الحمى التي تصاب بها الأم في فترة النفاس بسبب الالتهابات الجرثومية الحوضية أو الرحمية وغير ذلك من أسباب تتعلق بالتهابات الثدي الناجمة عن سوء الإرضاع .

الولادة childbirth

فعل أو عملية ولادة الطفل وتشمل مخاض ووضع .

مَرْكَزُ الولادَة childbirth center

المكان المجهز بكل ما يلزم لإجراء الولادات بشكل آمن كمستشفيات الولادة .

طفولة childhood

في أفريقيا وجنوب شرق آسيا ، تسببه الفيروس الألفاوية الذي تنقله بعوضة من جنس الزاعجة ، وأعراضها الأكثر ظهوراً هي عضلية هيكلية ، وأحياناً ما تترافق مع حمى نزفية .

سابقة بمعنى الشَّفَة chil-

سابقة مصطلح تعطيه معنى متعلق بالشفة .

شَرَث chilblain

تورم حمامي متموضع راجع تحت الجلد عجيني بسبب التعرض للبرد يصاحبه تبلل وإحساس حارق وحكة ، يتضمن عادة الأيدي والأقدام والأذن والوجه عند النساء ، واليدين والأصابع في الرجال ، وتسمى أيضاً تثليج حمامي (Erythema pernio) .

طِفل Child
(ج: أطفال) (=pl. children)

صغار الإنسان من سن الطفولة إلى البلوغ .

طفلٌ غَير نَموذجيّ atypical child

الطفل الذي ينحَرف عن المعايير الأساسية للبيئة التي يعيش فيها .

طفْلٌ ذاتَويّ autistic child

الطفل المصاب بحالة الذاتوية الانطوائية .

طفْلٌ مُعتَسَف battered child

طَفل معتدى عليه أو منتهك .

طفْلٌ مُتَضَرِّرُ الدِّماغ brain damaged child

الطفل المصاب بأذية دماغية .

اختِصاصيُّ حَيَاة الأَطْفَال child life specialist

الطَبيب المتخصِّص بطبيعة حياة الأطفال .

طِبُّ أَعْصَاب الأَطْفَال child neurology

الطب التخصصي المتَعلق بالجهاز العصبي عند الأطفال وأمراضه .

الطِّبُّ النَّفْسيُّ عند الأطفال child psychiatry

الطب الذي يدرس الأمراض النفسية التي قد يصاب بها الطفل أثناء مرحلة الطفولة .

طفْلٌ مُنْحَرِفُ الأَنا ego deviant child

طَفل مصاب بمرض نفسي أساسه التفسير غير الطبيعي للذات أو الأنا ، كعدم تمييز هذه الذات عن المحيط . أو أن تتضخم بحيث يفرط في

أحياناً تالية لإمرار قثطرة إحليلية .

حُمَّى الزِّنْك zinc chill

(= حُمَّى أَدْخنة الزِّنْك) (=zinc fume fever)

chilo- سابقة بمعنى الشَّفَة

chiloalveoloschisis فلحٌ شفويٌ سِنخِيّ

تشوه ولادي على شكل شق يصيب الشفة والفك حتى الأسناخ السنية دون الوصول إلى الحنك .

Chilodon شَفويَّات الأَسْنان

جنْسٌ منَ طفيليات الأوالي ومن المُهَدَّبات .

Chilognatha شَفويَّات الفَكّ (صُنيفٌ مِنَ المفصليَّات)

رتبة من مفصليات الأرجل والمفصليات من طائفة مزدوجات الأقدام .

chilomastigiasis داءُ شَفويَّاتِ السياط

عدوى بذوات السياط الشفوية .

Chilomastix شَفويَّة السياط

جنْسٌ منَ الحَيَوانات الأوالي .

شَفَوِيَّةُ السِّياط المَنيليَّة Chilomastix mesnili

جنْسٌ منَ الحَيَوانَات الأوالي تصيب حوالي (3.5٪) من سكان الولَايات المتحدة الأمريكية . وتوجد لدى قردة الشمبانزي والمونكي والخنازير .

chilomastixiasis داءُ شَفويَّاتِ السياط

عدوى بذوات السياط الشفوية .

chilomastosis داءُ شَفويَّاتِ السياط

يسمى أيضاً (Chilomastigiasis) ، وهو المرض التي يحدث بسبب الإصابة بشفويات السياط من الأوالي مثل شفوية السياط المنيلية (Chilomastix mesnili) ، التي تصيب منطقة السيني القولوني لدى البشر .

chilopa أونيالِيا

(=onyalai)

يسمى أيضاً (Onyalai) ، (Akembe) ، (Kafindo) ، وهو مَرَضٌ تَغْذَويٌّ أَفْريقيٌ حاد أكثر ما يحدث في وسط أفريقيا . ويَتصف بنزف أوعية الفم والبراز أسود اللون والبيلة الدموية وقد يكون السبب سوء التغذية .

فترة حياة الصبي التي تمتد عموماً من الطفولة الأولى إلى البلوغ .

طُفولَةٌ سَيِّئَةُ التَّلاؤُم maladjusted childhood

هي التي لا يستطيع فيها الطفل التأقلم مع بيئته ، فيعيش منفصلاً عن بيئته .

childproof حَريزٌ على الأطفال

الاحتياطات المتخذة لوقاية الطفل من الوصول إلى الأماكن المؤذية له كالمواقد الحرارية أو أدراج السلالم التي قد يسقط منها .

chilitis التِهابُ الشَّفَة

(=cheilitis)

chill نافِض (حمى مترافقة برعدة)

رعشة أو هزة ، ويكون فيها نوبة تقلصات لا إرادية في العضلات الإدارية ، يرافقها إحساس بالبرد وشحوب الجلد ، يسمى كذلك البرداء ، يسمى أيضاً (Ague) ، وغالباً ما تميز بداية الحمى .

حُمَّى النُّحاس brass chill

(=حُمَّى أَدْخنَة المَعادن) (=metal fume fever)

حُمَّى النَّحَّاسين brazier's chill

(=حُمَّى أَدْخنَة المَعادن) (=metal fume fever)

نافضٌ زاحفَ creeping chill

إحساسَ قشعريرة بدون رعاش واضح أو اصطكاك في الأسنان .

نافضٌ عَصَبي nervous chill

تَوصف هذه النوافض كموجات عصبية متتالية تصعد وتنزل ، وتبدأ من الكتفين .

نافضٌ راجف shaking chill

إحساس قَشعريرة مع ارتعاش واضح .

حُمَّى الزِّنْك spelter chill

(=حُمَّى أَدْخنَة المَعادن) (=metal fume fever)

انظر تحت fever .

نافضٌ إحْليلي urethral chill

(يَتْلو القَثْطَرَةَ الإحْليليَّة)

إحساس بالقشعريرة مَع أو بدون رعشة ، تكون

خيمر تكون فيه الخلايا أو الأنسجة الغريبة مشتقة من كائن من ذات الجنس لكنه من نوع جيني مختلف .

خَيمَرٌ إسْويّ **isologous chimera**

خيمر تكون فيه الخلايا أو الأنسجة الغريبة مشتقة من كائن مختلف من ذات النوع الجيني ، مثل التوأم المتماثل

خَيمَرٌ مُشَعَّع **radiation chimera**

كائن حي يعيش بخصائص مناعية للمضيف وللمتبرع بعد طعم نقي العظم من معطي مختلف في المستضدات الجينية ، ويتم تعريض المضيف أولاً لجرعات إشعاعية قرب مميتة لكل الجسم ، وبذلك تكون الاستجابة المناعية منخفضة أو معدومة للخلايا الأجنبية من المتبرع .


الخَيمَرِيَّة **chimerism**

(وجود خلايا مختلفة المنشأ الوراثي)

خاصية أن يكون الشيء خميري في علم الوراثة ، وجود خلية ذات منشأ مختلف في الفرد مثل خلايا الدم المشتقة من توأم متحد ثنائي الزيجوت .

بِعَام؛ شِمْبانْزي **chimpanzee**

قرد شبيه بالإنسان ، يعيش في الغابات المطيرة الاستوائية في أفريقيا ، ويستخدم للأغراض التجريبية بسبب قابليته للتعرض لبعض أمراض الإنسان ، وفي الدراسات السلوكية بسبب مستوى ذكائه المرتفع .



الخَيمَرِيَّة Chimerism

شَفَويَّاتُ الأرْجُل **Chilopoda**

(صِنفٌ مِنَ المفصليَّات)

حريشة ، وهو صنف من حيوانات مفصلية الأرجل من عمارة الحريشيات ، وهي تملك زوج من الأرجل في كل مقطع جسدي بمخالبها السامة ، والتي هي أرجل معدلة لقطع الجسم الأولى مع 15 إلى 173 زوج من السيقان . وهي أنواع قليلة من جنس العقربات والتي تكون قادرة على اختراق جسم الإنسان مع عضة مؤلمة ، وهي تعمل على شلل وقتل الحشرات والحيوانات الصغيرة .

داءُ شَفَويَّاتِ الأرْجُل **chilopodiasis**

مرض يتجلى بغزو شفويات الأرجل لأحد الأجواف وخاصة التجويف الأنفي .

عَلَم **chiloschisis**

(= شفة مشقوقة) (= cleftlip)

هو حالة الشفة المشقوقة (Cleft lip) أو شفة الأرنب .

انظر تحت cheilognathus .

انظر تحت cleft lip .

خَيمَر **chimaera**

انظر تحت chimera .

خَيمَر **chimera**

(كائن ذو كروموسومات مختلفة الأعراس)

(وحش خرافي ينفث النار مع رأس أسد وجسم معزة وذيل ثعبان) ، كائن يحوي جسمه مجموعات من الخلايا مشتقة من لاقحات مختلفة من نوع واحد أو أنواع مختلفة ، وقد تظهر تلقائياً ، كما في التوأم (خيمر الزمرة الدموية) ، أو يتم انتاجها صناعياً مثل الكائنات الحية التي تتطور من أجزاء مشتركة من مضغة (أجنة) مختلفة ، أو ذلك الذي ثم فيه إدخال أنسجة أو خلايا أخرى .

خَيمَرٌ غَيرَوِيّ **heterologous chimera**

خيمر تكَون فيه الخلايا أو الأنسجة الغريبة مشتقة من كائن من جنس مختلف .

خَيمَرٌ مِثْليّ **homologous chimera**

chiniofon — **شِينْيُوفون**

دَواءٌ مُضادٌّ للحَيَوانات الأوالي .

chinless — **عَديمُ الذَّقَن**

صفة من ذقنه أو فكه السفلي صغير جداً ويظهر كأنه عديم الذقن .

chionablepsia — **عَمَى الثَّلج**

(=snowblindness)

انظر تحت snowblindness .

chip — **1ـ رُقاقَة**

2ـ شيبٌ (ج: أشْيَاب)

قطعة صغيرة ، مثل جزء من شيء مكسور .

bone chips — **أشْيابٌ عَظْميَّة**

قطع صغيرة من العظم ، اسفنجية الشكل ـ تستخدم عادة لملء الفراغات العظمية لتسهيل إعادة التلكس .

chip blower — **مِنْفاخُ الأشْياب**

جهاز نفخ قوي يستعمله أطباء الأسنان لتنظيف البقايا الناتجة عن الحفر وتجفيف الحفر بعد تنظيفها لإعدادها للحشو .

chip syringe — **حاقِنُ الأشْياب**

جهاز نفخ لتنظيف الأسنان من النفايات وللتجفيف أيضاً ويتمثل جهاز النفخ فيه ببصلة مطاطية مرنة متصلة بأنبوب دقيق المخرج ، وهي أداة نادرة الاستخدام حالياً ، وتستعمل لإزالة الفضلات خلال المداخلة السنية أو لتجفيف مكان العمل لتسهيل الرؤية الجيدة .

computer chip — **شيبٌ حاسوبيّ**

رقاقة إلكترونية تستعمل في الحاسوب .

chir- — **1ـ سابقة بمعنى اليَد**

2ـ سابقة بمعنى الجِراحَة

سابقة مصطلح تعبر عن معنى الجراحة أو اليد .

Chiracanthium — **شائِكاتُ اليَد**

(جِنسٌ مِنَ العَناكِبِ السّامَّة)

جنس عناكب سامة ، يوجد منها نوعان (Chiracanthium Inclusum) في كاليفورنيا ، (Chiracanthium Diversium) في هاواي ، وتنتج تفاعلات موضعية في الإنسان .

chin — **ذقن**

(=mentum TA)

انظر تحت mentum .

chin cup — **حِزامٌ ذَقْنيّ**

طبيقة تقويم الأسنان خارج الفم تتكون من جهيزة شبيهة بالكوب مطابقة تماماً لفوق الذقن ، والتي تتصل بغطاء الرأس عن طريق شريط مطاطي لغرض تطبيق قوة لأسفل ولأعلى على الفك السفلي في علاج الفقم .

chin reflex — **مُنْعكَسُ الذَّقْن**

يسمى أيضاً (Jaw reflex) ، والمنعكس الفكي ومنعكس المضع ، وهو انقباض تشنجي للعضلات الصدغية يتلو قرع ذروة الفك السفلي المتدلي للأسفل .

chin retractor — **مِبْعادُ الذَّقْن**

أداة الغرض منها تبعيد الفك السفلي عن الفك العلوي .

double chin — **ذَقْنٌ مُزْدَوج**

وجود كتلة دهنية تشبه الذقن وتتدلى تحته وتسمى أيضاً (Buccula) .

galoche chin — **ذَقْنٌ طَويلٌ بَارز**

ذقن طويل مدبب

chinacrine — **كيناكْرين**

انظر تحت quinacrine .

chincap — **مِشَدُّ الذَّقْن**

(=chincup)

جهاز تقويم أسنان خارج الفم يتكون من جهاز مثل غطاء الرأس يركب فوق الذقن ، ويكون متصلاً إلى قطعة أخرى لغرض بذل قوة إلى أعلى وقوة دافعة إلى الخلف على الفك الأسفل في علاج بروز الفك السفلي (الفقم) .

chinch — **بَقُّ الفراش**

يسمى أيضاً (Bedbug) ، وعلمياً (Cimex lectularius) ، وهي حشرات صغيرة تعيش في البيئات غير الصحية والخشب المنخور ، وتسبب لسعات شروية الأثر ومزعجة للإنسان ، وثبت نقلها للأمراض حتى الآن .

chiral **عَديمُ التَّناظُرِ المِرآتيّ**

chirality **عَدَمُ التَّناظُرِ المِرآتيّ**

خاصية اليدوية ، وخاصية عدم التناظر في صورة المرآة ، يدوية الجزيء اللاتماثلي ، كما يحدده دورانها البصري أو تشكيلها المطلق ، على سبيل المثال حامض اللاكتيك ، تحمل ذرتها الكربونية رباعية الاحداثيات أربعة بديلات مختلفة ولا تكون قابلة للتركيب على صورتها في المرآة ، هما إيثلين جليكول ، مع بديلين متطابقتين على كربونها رباعي الإحداثيات ، يمكن أن تركب على صورتها في المرآة .

chirapsia **تدْليكٌ لطيف**

إمرار اليد أو أصابعها على المنطقة المطلوب تدليكها لتحريك الدورة الدموية فيها .

chirarthritis **الْتِهابُ مَفاصِل اليَد**

أي التهاب في مفاصل السلاميات ومنها الالتهاب الروماتزمي أو التنكسي .

chiro- **1 ـ سابقة بمعنى اليَد**

2 ـ سابقة بمعنى الجِراحَة

صيغة جامعة ترمز إلى العلاقة لليد .

chirobrachialgia **ألَمُ الذراعِ و اليَد**

انظر تحت cheirobrachialgia .

chirognostic **متعلق بإدْراكِ جِهَةِ المَنْبه**

انظر تحت cheirognostic .

chiromegaly **ضَخامَة اليَد**

انظر تحت cheiromegaly .

Chironomidae **الوامِئات**

(فصيلة مِنَ الحَشَرات الخَيطيَّات القَرْن)

فصيلة من رتبة خيطيات القرن ، رتبة ذوات الجناحين ، والتي تمثل القعمة الحقيقية (الذبابة الصغيرة) .

Chironomus **الوامِئَة (جِنسٌ مِنَ الحَشَرات)**

جنس ذباب كبير الحجم ، والمشهور بكروموسوماتها العملاقة .

chiroplasty **رَأبُ اليَد**

انظر تحت cheiroplasty .

chiropodalgia **ألَمُ اليَدِ و القَدَم**

انظر تحت cheiropodalgia .

chiropodical **متعلق بمَبْحَثِ الأقدام**

يعود إلى طب الأقدام ، يسمى أيضاً (Podiatry) .

chiropodist **إخْتِصاصِيُّ الأقدام**

انظر تحت poidiatrist .

chiropody **طِبُّ الأقدام**

انظر تحت podiatry .

chiropractic **المُعالجَة اليَدَوِيَّة؛ المِيادة**

(مَذْهَبٌ في المعالجَة)

علم في التشخيص العصبي الفيزيولوجي التطبيقي يقوم على النظرية أن الصحة والمرض يكونان عمليات حيوية ترتبط بوظيفة الجهاز العصبي ، وإن إثارة الجهاز العصبي بعوامل ميكانيكية أو كيميائية أو بدنية تكون سبباً للمرض وتعتمد استعادة الصحة والمحافظة عليها على الوظيفة الطبيعية للجهاز العصبي . ويكون التشخيص هو التعرف على هذه المثيرات المزعجة وتعالج بإزالتها وفق الطريقة الأكثر تحفظاً .

chiropractor **المُعالِجُ اليَدَوِيُّ؛ المِيادي**

ممارس في المعالجة باليد .

chiropraxis **المُعالجَة اليَدَوِيَّة؛ المِيادة**

(مَذْهَبٌ في المعالجَة)

انظر تحت chiropractic .

chiroscope **مِنْظارُ تَرَسُّم الصُّوَر**

انظر تحت cheiroscope .

chirospasm **تَشَنُّجُ اليَد**

انظر تحت cheirospasm

chirurgenic **جِراحِيُّ المَنْشَأ**

صف منسوبة لكل عمل منشؤه جراحي .

chirurgeon **جَرَّاح**

ترادف وتسمى أيضاً (Surgeon) ، وهو الطبيب الجراح الذي يستعمل المشرط في العلاج .

chirurgery **جِراحَة**

ترادف وتسمى أيضاً (Surgery) ، وهي علم

الإزميل الذي يتمادى جسده مع رأسه على استقامة واحدة .

إزْميلُ ويدلشتد **Wedelstaedt chisel**

أي من أزاميل ما حول الأسنان المختلفة التي يكون نصلها متصلاً مع الساق وعلى تقوس منه .

كيتين (كيمياء) **chitin**

(عديد سكاريد في الحشرات)

عديد سكاريد متماثل خطي غير قابل للذوبان ، أبيض اللون ، يتكون من ثمالات N- أسيتيل جلوكوز أمين مترابطة في الرابطة β (1 ، 4) ، تكون واسعة الانتشار ، تمثل المكون الرئيسي في الهيكل العظمي الخارجي في المفصليات ، وتتواجد في بعض النباتات وبخاصة الفطريات .

كيتيناز **chitinase**

إنزيم يتواسط إماهة الكيتين ، ويلعب دوراً حالاً أيضاً (إنزيم حال) .

تكيتن **chitinization**

العمليات التي تؤدي إلى تكون الكيتين .

كيتينيّ **chitinous**

يتكون من أو من طبيعة الكيتين .

كايتوبْيوز (مركب سكري) **chitobiose**

ثنائي السكاريد ، مكون من جزئين من N- أسيتيل جلوكوزامين في الرابطة B- (1 ، 4) وتشكل الوحدة الأساسية المتكررة في الكيتين .

كيتوزان **chitosan**

(عديد سكاريد في الحشرات)

عديد السكاريد يتكون من وحدات جلوكوزامين متكررة ، يتم الحصول عليها من إزالة الأسيتلين من الكيتين ، وتستعمل لامتصاص المعادن الثقيلة في معالجة المياه .

كايتوز (كيمياء) **chitose**

مادة كيميائية سكرية غالباً .

كايتوترايوز (كيمياء) **chitotriose**

جُيَّوفة **chiufa**

الْتهابُ القَولون والمُستَقيم المَواتيُّ .

طب الجراحة .

جراحِيّ **chirurgic**

ترادف (surgical) ، وهي صفة منسوبة لكل ما يتعلق بعلم الجراحة .

إزميل **chisel**

1 ـ أداة تشبه الأسفين ذات حافة قاطعة عند نهاية النصل .

2 ـ أداة في طب الأسنان تكون حافتها القاطعة في خط واحد مع مركز المقبض ، تستعمل لتسوية أو صقل السطح ، مثل إعداد التجويف ، وتستعمل في قطع ميناء السن عند تحضير وتجهيز الحفرة السنية .

إزْميلٌ مُزْدَوجُ الزَّوايا **binangled chisel**

نوع من الأدوات الجراحية التي تستعمل في القطع والكسر من نوع مزدوج الزوايا ، أو ذو زاوية مضاعفة .

إزْميلُ العَظْم **bone chisel**

إزميل وحيد النهاية له ساعد طويل بنهاية مربعة يمكن الدق عليها بواسطة المطرقة ، لتقشير العظم خلال العمليات الجراحية .

إزْميلٌ ذو زاويَة مُعاكسَة **contra-angled chisel**

الإزميل المجهز بزاويتين مشطوفتين من جهتين متقابلتين وله زاوية عكسية . ويسمى أيضاً (Contrabevel chisel) .

إزْميلٌ ذو تَجْليف مُعاكس **contrabevel chisel**

انظر تحت contra-angled chisel .

إزْميلُ دَواعم السِّن **periodontal chisel**

أداة مستقيمة تتقوس قليلاً عند إمتداد النصل من الساق ، ويكون الطرف القاطع المستقيم عند نهاية الأداة على مستوى زاوية 45° ، يستعمل غالباً لجلف السطوح المجاورة للأسنان ، ضيقة التباعد أكثر مما ينبغي للسماح باستعمال أدوات الجلف الأخرى ، يسمى أيضاً (Chisel scaler) .

إزْميلُ الضَّغْط اليَدَوي **pressing chisel**

الإزميل الذيَ يمكنَ استعماله بالضغط اليدوي دون الطرق بمطرقة .

إزْميلٌ مُسْتَقيم **straight chisel**

وُجودُ المتدَثراتِ في الدَّم — **chlamydemia**

المتدَثرة — **Chlamydia**

(جِنْسٌ مِنَ الجَراثيم السَّلبيَة الجرام)

جنس جراثيم من فصيلة المتدثرات ، رتبة المتدثراوات ، توجد ككائنات مكورة سالبة الجرام ، تتكاثر فقط داخل الخلية المضيفة ولها دورة حياة فريدة ، غالباًهي ممرضة للحيوانات ، وتسبب أنواع مختلفة من الأمراض للإنسان ، تسمى أيضاً مجموعة (PLT) .

المُتَدَثِّرَةُ البَبَّغائيَّة — **Chlamydia psittaci**

نوع تسبب سَلالات مختلفة منه داء الببغائية في الإنسان والطيور وأنواع أمراض مختلفة في حيوانات المزارع والثدييات الأخرى .

المُتَدَثِّرَةُ الحَثَرِيَّة — **Chlamydia trachomatis**

نوع يظهر في الغالب كممرض أمراض بشري ، يسبب التراخوما (الحثر) ، التهاب الملتحمة الاشتمالي ، التهاب المثانة غير المحدد ، والتهاب المستقيم ، والتهاب الرئة الفأري ، والزهري الحبيبي اللمفي ، والتهاب الرئة بالمتدثرة الحثرية .

مُتدَثرة — **chlamydia**

المتدَثرات — **Chlamydiaceae**

(فصيلة مِنَ الجَراثيم السَّلبيَة الجرام)

فصيلة جراثيم من رتبة المتدثراوات ، تتألف من كائن دقيق حي ، مكوراتية صغيرة ، وتملك دورة تطورية فريدة تحدث داخل الخلية ، إجبارياً ، وتكون غير قادرة على تخليق(ATP) ، تحدث العدوى حين يدخل الشكل الصغير خارج الخلوي صلب الجدران (الجسم الابتدائي) إلى الخلية ويتحول إلى شكل أكبر رقيق الجدران (جسم أولي) ينقسم بالانشطار . تعد الخلايا الجديدة تنظيم نفسها وتتكاثف لتصبح أجسام ابتدائية ، تعدي عندئذ خلايا أخرى ، وتكون تلك الكائنات الحية طفيليات بشرية والفقاريات الأخرى ، وتصبح قادرة على إنتاج أنواع مختلفة من الأمراض ، ونجدها أيضاً في المفصليات . وتحوي الفصيلة جنس المتدثرة .

مُتدَثرات — **chlamydiae**

جمع المتدثرات .

مُتدَثريّ — **chlamydial**

تعود إلى أو تسببها المتدثرة .

المتدَثراوات — **Chlamydiales**

(رُتبَة مِنَ الجَراثيم السَّلبيَة الجرام)

رتبة في الجراثيم تتكون من كائنات حية طفيلية مكوراتية سالبة الجرام ، تتضاعف فقط داخل هيولى الخلايا المضيفة في الفقاريات عن طريق دورة تطورية (نمائية) فريدة وهي تشمل فصيلة المتدثرات .

داءُ المتدَثرات — **chlamydiosis**

1ـ أي عدوى أو مرض تسببه أنواع من المتدثرات .

2ـ انظر تحت psittacosis .

المتَلحفة — **Chlamydomonas**

جنسٌ منَ الحَيَوانات الأوالي النَّباتيَّة الشَّكْل .

الشَوذَريَّة — **Chlamydophrys**

جنْسٌ منَ الحَيَوانات الأوالي .

بَوغٌ مُتدَثر — **chlamydospore**

انظر تحت chlamydoconidium .

المتدَثرات — **Chlamydozoaceae (=Chlamydiaceae)**

انظر تحت chlamydiaceae .

المتدَثرة — **Chlamydozoon (=Chlamydia)**

انظر تحت chlamydia .

كَلَف — **chloasma (=melasma)**

انظر تحت melasma .

كَلَفٌ شَمْسيّ — **chloasma caloricum**

التبدل الجلَدي الصباغي على الوجه بتأثير أشعة الشمس .

كَلَفُ الحَمْل — **chloasma gravidarum**

ظهور البقع الصباغية على الوجه بسبب الحمل . ويسمى أيضاً (Chloasma uterinum) .

عامل مؤلكل من مجموعة خردل النتروجين ، التي تعمل بالربط التصالبي مع الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعن طريق تثبيط تخليق البروتين ، تستعمل كمضاد لنمو الأورام الخبيثة في علاج الابيضاض اللمفاوي المزمن ، ولمفومة هودجكين ، اللمفومة اللاهودجكينية ، ووجود الجلوبولين الكبروي في الدم نوع والدنستروم ، وورم نقيي متعدد ، يعطى بالفم ، كما استعمل أيضاً كمثبط مناعي في علاج المتلازمة الكلائية المقاومة للستيرويد .

كلورامينُ T (مُطهِرٌ موضعِيّ) **chloramine-T**

مشتق الكلور ، يستعمل كمحلول موضعي مطهر لغسل وتضميد الجروح وغسول للفم ولتعقيم مياه الشرب .

كلورامْفينيكول **chloramphenicol**

(مُضادٌ حَيَوِيّ)

مضاد حيوي واسع الطيف ، مشتق في الأصل من جنس المتسلسلة الفنزويلية ، وحديثاً انفصل من ملتويات أخرى ، يمكن إنتاجه صناعياً . وهو فعال ضد داء الريكتسية ، والجراثيم الموجبة والسالبة للجرام ، وبعض الملتويات ، يستعمل بخاصة في علاج التيفوس وعدوى الريكتسية وفي التيفود وداء الشيجيلة والأمراض المعوية الأخرى ذات العلاقة ـ تستعمل كمضاد للجراثيم ، يعطى باالفم أو موضعياً على الملتحمة ، أو كمضاد للريكتسية ، ويؤخذ بالفم .

كلورات **chlorate**

أي ملح من حامض الكلوريك .

كلورازانيل **chlorazanil**

دَواءٌ مَدرٌّ للبَول .

كلوروبوتانوَل **chlorbutol**

هو مادة الكلوروبوتانول (Chlorobutanol) أو كلوروفورم الأسيتون (Acetone chloroform) ، وهو كحول يعتبر منوماً ومخدراً موضعياً .

كلوروسيكليزين **chlorcyclizine**

(دَواءٌ مُضادٌ لِلهِستامين)

كَلَفٌ كَبِدِيّ **chloasma hepaticum**

ظهور البقع الصباغية على الوجه بسبب مرض كبدي .

كَلَفُ الدَّنَف **chloasma of cachexia**

ظهور البقع الصباغية على الوجه بسبب سوء التغذية والدنف الشديد .

كَلَفٌ رَضْحِيّ **chloasma traumaticum**

ظهور البقع الصباغية على الوجه بسبب رضحي .

كَلَفُ الحَمْل **chloasma uterinum**

انظر تحت chloasma gravidarum .

كلوفيدْيانول **chlophedianol**

دَواءٌ مُضادٌّ للسُّعال .

حِمْضُ الكلوراسِيتيك **chloracetic acid**

انظر تحت chloroacetic acid .

عُدٌّ كلوريُّ المَنْشأ **chloracne**

طفح عدي الشكل يسببه التعرض لمركبات الكلور ، يسمى أيضاً (Chlorine acne) .

كلورال **chloral**

1 ـ سائل زيتي لالون له ذو رائحة لاذعة ومهيجة ، يستخدم في تصنيع هيدرات الكلورال كلوروفينوثان (DDT) (مبيد الحشرات) .

2 ـ هيدرات الكلورال .

هيدْراتُ الكلورال **chloral hydrate**

منوم ومهدئ ، يعطى عن طريق الفم .

التَّسَمُّمُ بالكلورال **chloralism**

حالة مرضية مميتة يسببها الاستخدام المفرط للكلورال .

1 ـ التَّخْديرُ بالكلورال **chloralization**

2 ـ التَّسَمُّمُ بالكلورال

كلورالوز **chloralose**

(بِنْجٌ مَوضِعِيٌّ لحَيَواناتِ التَّجْرِبَة)

مركب من الكلور والجلوكوز ، يستخدم كقاتل للقوارض كالفئران ، وطارد للطيور من على نباتات الحبوب ، يسمى أيضا (α-chloralose) .

كلورامْبُوسيل (دَواءٌ مُضادٌ لِلأورام) **chlorambucil**

1ـ فَرْطُ كلوريدِ الدَّم **chloremia**

2ـ داءُ الاخْضِرار

انظر تحت hyperchloremia .

نسيجٌ كلوروفيليّ؛ **chlorenchyma**

نَسيجٌ يَخْضوري

النسيج الذي يحمل الكلوروفيل (اليخضور) في النبات .

مُدِرٌّ للصَّفْراء **chloretic**

مادة مفرغة للصفراء من المرارة .

كلورجوانيد **chlorguanide**

(= برُوجوانيل) **(=proguanil)**

(دواء لِمعالجَةِ الملاريا)

دواء مبيد مضاد لطفيلات الملاريا .

انظر تحت proguanil .

كلورْهِكسيدين **chlorhexidine**

(دَواءٌ مُضادٌ لِلجَراثيم)

مضاد للجراثيم ، فعال ضد مجموعة واسعة من الكائنات الحية سلبية ، وموجبة الجرام .

فَرْطُ كلوريدِ النُّسُج **chlorhistechia**

فَرْطُ حَمْضُ الكلورهيدريك **chlorhydria**

(في المعدة)

انظر تحت hyperchlorhydria .

كلوريك **chloric**

مشتق أو يحوي كلور خماسي التكافؤ ، مصطلح يستعمل لتمييز تلك المركبات التي تحوي نسبة كلور أقل مما في مركبات الكلوروس (كلور ثلاثي التكافؤ) ، وتكون أملاح تسمى كلورات .

كلوريد **chloride**

ملح من حامض الهيدروكلوريك ، أي من المركبات الثنائية للكلور والذي يكون فيها سالب الشحنة .

فَرْطُ كلوريد الدَّم **chloridemia**

يسمى أيضاً (Hyperchloremia) ، وهو زيادة تركيز الكلور في الدم أكثر من مقداره الطبيعي .

مِقْياسُ الكلوريد **chloridimeter**

أداة لقياس محتوى الكلوريد في البول أو سائل

مناهضة مستقبل الهستامين H_1 المشتق من البيبرازين ، وهو مضاد الفعل الكوليني ، مضاد للقيء ، ومخدر موضعي ومهدئ خفيف ، يعطى بالفم كمكون للعديد من مستحضرات البرد والأرجية وموضعياً كمضاد للحكة .

كلورْدان **chlordan**

مُبيدٌ للحَشَرات .

كلورْدان (مُبيدٌ لِلحشَرات) **chlordane**

مبيد حشري سام هيدروكربوني مزود بالكلور ، وقد يحدث تسمم البشر والحيوانات الأخرى بالامتصاص عبر الجلد أو البلع أو الاستنشاق ، وللتسمم أعراض عصبية تشمل التشنجات العضلية والنوبات ، والتي ربما تكون قاتلة .

كلوردانْتوين **chlordantoin**

(دَواءٌ مُضادٌ لِلفطريَّات)

عامل مضاد للفطريات فعال ضد الفطريات المختلفة ، بما فيها المبيضة البيضاء ، تستعمل موضعياً في علاج العدوى الفطرية في المنطقة الفرجية المهبلية وفي الجلد .

كلورْدِيازيبُوكسيد (دَواءٌ مُهَدِئ) **chlordiazepoxide**

بنزوديازيبين يستعمل كمخفف للقلق في علاج اضطرابات القلق ، وللتفريج قصير الأمد لأعراض القلق ، ولتخفيف أعراض الانسحاب من ادمان الكحول الحادة ، وكعامل مضاد للرعاش ، يؤخذ بالفم .

كلورديمُورين **chlordimorine**

دَواءٌ مُضادٌّ للفُطْرِيَّات .

العَرْمَض **Chlorella**

(طحْلبُ الماءِ العَذْب)

جنس من طحالب المياه العذبة الخضراء التي تكون مصدر الكلوريلين ، وتستعمل في دراسة التخليق الضوئي .

كلوريلين **chlorellin**

(مادَّةٌ كابحَةٌ لِلجَراثيم)

مادة موقفة لنمو الجراثيم مشتقة من طحالب المياه العذبة من جنس العرمض .

كلورْمادينُون **chlormadinone**

(دَواءٌ مانِعٌ لِلحَمْل)

بروجستين $C_{23}H_{29}CLO_4$ ، ويستعمل في منتجات منع الحمل التي تؤخذ بالفم .

كلورمِيرُودْرين **chlormerodrin**

(دَواءٌ مُدِرٌّ لِلبَول)

مدر للبول زئبقي فعال يعطي بالفم ، ويكون موسوم بنظائر مشقة للزئبق ، ^{197}Hg ، أو ^{203}Hg ، ويستعمل كعامل تشخيصي في تحديد وظائف الكلى ولكن حل محله عوامل أخرى .

كلورمِيثازانُون **chlormethazanone**

(دواء مهدىء)

انظر تحت chlormzanone .

كلوريد الميثيل **chlormethyl**

جذر كيميائي مؤلف من الكلور مع المثيل .

كلورمِيزانون **chlormezanone**

(دَواءٌ مُرْخٍ لِلعضَل ومُهدِىء)

مرخ ومهدىء عضلي ، يستعمل في علاج اضطرابات القلق ، يؤخذ بالفم .

سابقة بمعنى اللَّوْن الأخْضَر **chloro-**


صيغة اتحادية تعني أخضر ، أو ترمز إلى وجود الكلور .

حَمْضُ الكلورُوأسيتيك **chloroacetic acid**

حامض قوي ، $CH_2CL\ COOH$ يستعمل كاشف مختبري .

كلوروأزودين (مادّة مُطهرة) **chloroazodin**

مضاد للجراثيم ، ويستخدم كمطهر .



حِمْضُ الكلُوروأسيتيك **Chloroacetic acid**

آخر .

قِياسُ الكلوريد **chloridimetry**

تحديد محتويات السوائل من الكلوريد .

كلوريدْيون (أيونُ الكلوريد) **chloridion**

كلور أيوني سالب ، أنيون حامض الهيدروكلوريك والكلوريد .

مِقياسُ الكلوريد **chloridometer**

انظر تحت chloridimeter .

إسْهالٌ كلوريدِيّ **chloridorrhea**

إسهال مع زيادة كمية الكلوريدا في البراز .

بيلَة كلوريديَّة **chloriduria**

زيادة الكلوريد في البول .

مُكلْوَر **chlorinated**

مشحونة بالكلور .

كَلْوَرَة **chlorination**

إضافة الكلور إلى المياه مثلاً لتطهيرها ، تنقية المياه .

جهازُ الكَلْوَرَة **chlorinator**

جهاز مصمم لإضافة الكلور إلى المياه بنسب معينة .

الكلور (العنصر السابع عشر) **chlorine**

عنصر غازي يميل إلى الأصفر المخضر ، ورائحته خانقة ، رمز CL ، عدده الذري 17 ، وزنه الذري 35.453 ، الكثافة النوعية 1.56 ، وهو مطهر و مطهر بالبخار مزيل للألوان وسم مهيج ، ويستعمل للتطهير والتبييض ، أما في محلول مائي أو في شكل جير مكلور .

كلوريُودِيّ **chloriodized**

يحوي الكلور واليود .

كلوريزُونْدامين **chlorisondamine**

(دَواءٌ خافِضٌ لِضَغْطِ الدَّم)

مشتق أمونيومي مزدوج رباعي غير متماثل له فعل احصار عقدي ، لا تماثلي ذو تأثير عقدي حاجز ، يستعمل كمضاد لفرط ضغط الدم .

كلوريت **chlorite**

أي ملح من حامض الكلوروس (كلور ثلاثي التكافؤ) .

الخَضْرَبِيَّات **Chlorobacteriaceae**

تسمى أيضاً (Chlorobiaceae) ، وهي فَصِيْلَةٌ مِنَ الجَراثيم المائية .

الخَضْرَبِيَّات **Chlorobiaceae**

انظر تحت Chlorobacteriaceae .

الخَضْرَبِيَّة **Chlorobium**

هي جنس من الجراثيم الكبريتية الخضراء ، وتسمى أيضاً (Chlorochromatium) .

داءُ الاخْضِرارالكلويُّ المَنْشأ **chlorobrightism**

داء الاخضرار تسمية قديمة لفقر الدم الشديد بعوز الحديد الناجم عن سوء التغذية الشديد ، وينجم هنا من منشأ كلوي كوجود فشل كلوي مزمن .

كلوروبُوتانول **chlorobutanol**

دَواءٌ مُضادٌّ للجَراثيم ومُسكِّن .

كلوروكرُورين **chlorocruorin**

صبغ تنفسي في الديدان البحرية .

الوَرَمُ الأَخْضَرُ في أرومات الحُمْر **chloroerythroblastoma**

ورم أرومات الكريات الحمر مع ساركومة المحببات .

كلوريدُ الإيثيل **chloroethane (=ethyl chloride)**

انظر تحت ethyl chloride .

كلوروفورْم **chloroform**

ثلاثي كلور الميثان $CHCL_3$ ، سائل متطاير ، عديم اللون ، مع رائحة أثيرية قوية ومذاق يميل إلى الحلاوة ، وله طعم حارق ، مذيب مختبري عام ، مسمم للكلى والكبد عند تناوله ، كان يستعمل في السابق كمخدر بالاستنشاق ومسكن ، ومضاد للكحة وطارد للأرياح ومهيج مقابل .

إدْمانُ الكلوروفورْم **chloroformism**

1 ـ اعتياد استعمال الكلوروفورم لتأثيراته المخدرة .

2 ـ التأثير التخديري لبخار الكلوروفورم .

إعْطاءُ الكلوروفورْم **chloroformization**

تعاطي الكلوروفورم .

كلوروغوانيد (دَواءٌ مُضادٌّ لِلمَلارْيا) **chloroguanide**

هو بروجوانيل (Proguanil) ، ويستخدم كدواء مضاد لطفيليات الملاريا .

قَبَّالُ الأَخْضَر (في شبكية العين) **chlorolabe**

اسم مقترح للصبغة في الخاريط الشبكية للعين ، والتي تكون أكثر حساسية للجزء الأخضر في الطيف الضوئي مقارنة بالأصباغ الأخرى (قبال للأزرق وقبال الأحمر) .

ابْيِضاضُ الدَّمِ الأَخْضَر (=الوَرَمُ الأَخْضَر) **chloroleukemia (=chloroma)**

انظر تحت chloroma .

ساركومة لِمْفِيَّة خَضْراء (= الوَرَمُ الأَخْضَر) **chlorolymphosarcoma (=chloroma)**

ورم خبيث أخضر اللون ينشأ من النسيج النخاعي ، يترافق مع ابيضاض نقيي المنشأ وتحدث في أي مكان في الجسم . وبجانب احتوائها على صبغة خضراء ، فهي لا تملك دور أيضي واضح وإنما هي في الأساس بيروكسيداز نخاعي ، تظهر الخلية المصابة اشعاع أحمر ساطع تحت الضوء فوق البنفسجي . قارن بينها وبين ورم الصفيحة النخاعية . (Myeloblastoma) .

وَرَمٌ أَخْضَر (ابيضاض حاد على حساب المحببات) **chloroma**

هي حالة مرضية تتميز بتعدد الأورام النخاعية ، ذات لون مخضر ، تصيب الوجه والجمجمة بشكل خاص وتكون صورة الدم المصاحبة مشابهة لابيضاض الدم ، وهو ورم خبيث أخضر اللون ينشأ من النسيج النخاعي ، يترافق مع ابيضاض نقيي المنشأ وتحدث في أي مكان في الجسم . وبجانب احتوائها على صبغة خضراء ، فهي لا تملك دور أيضي واضح وإنما هي في الأساس بيروكسيداز نخاعي ، تظهر الخلية المصابة اشعاع أحمر ساطع تحت الضوء فوق البنفسجي . قارن بينها وبين ورم الصفيحة النخاعية (Myeloblastoma) .

الكربون مع الماء والمواد الغذائية النباتية لتكوين النشا ، وطرح الأكسجين .

chlorophyll **كلوروفيل؛ يَخْضُور**

أي مجموعة من مشتقات البرفيرين التي تحتوي على المغنيزيوم الأخضر وتوجد في كل كائنات التخليق الضوئي ، يعمل الكلوروفيل كصبغة تنفسية ، تحول الطاقة الضوئية إلى جهد كامن اختزالي ؛ ويكون اختزال ثنائي أكسيد الكربون هو الخطوة الأولى في تخليق السكريات السداسية في كائنات التخليق الضوئي ، يوجد الكلوروفيل في الكائنات التي تظهر التخليق الضوئي الحيوائي (نباتات خضراء والطحالب والزراقم) ، الكلوروفيل (d) والكلوروفيل (b) في النباتات العليا ، والكوروفيل (C1) و(C2) في المشطورة في الطحلب الأحمر ، يتواجد الكلوروفيل الجرثومي في الجراثيم التي تظهر تخليق ضوئي لا حيوائي ، وتستعمل مستحضرات أملاح الكلوروفيل المذابة في الماء كمزيل للرائحة .

انظر تحت chlorophyllin .

chlorophyllin **كلوروفيلين**

أي من الأملاح التي تذوب في الماء الناتجة من الحلمهة القلوية للكلوروفيل مع استبدال مجموعات استرات الميثل والفيتول بالصوديوم أو البوتاسيوم ، تستعمل مستحضرات الأملاح موضعياً لإزالة الرائحة من الآفات الجلدية ، ويعطى بالفم لإزالة رائحة آفات الجلد القرحية والبول والبراز في فغر القولون ، وفغر اللفائفي أو السلس .


chloropia **اخْضِرارُ الرُّؤيَة**

انظر تحت chloropsia .

Chloropidae **خُضْراواتُ العُيون (فصيلة مِنَ الذُّباب)**

فصيلة من الذباب الصغير إلى الدقيق الحجم (رتبة ثنائية الأرجل) ، الجنسين الهامين من الناحية الطبية هما الهجمة (Hippelates) ، والشاعبة (Siphuriculina) .

chloroplast **صانِعَة الكلوروفيل؛ صانِعَة اليَخْضور**



ورم أخضر Chloroma

p-chloromer-curibenzoate **بارا-كلورومركوريبنزوات**

هو مركب زئبق عضوي ، وحيد التكافؤ ، يتفاعل مع مجموعة (Sulfhydryl) في البروتينات أو الجزئيات الأخرى ، وبذلك مايمنع نشاط تلك المجموعة .

p-chlorophenol **باراكلوروفينول**

هو مطهر موضعي ، ويسمى أيضاً باراكلوروفينول (Parachlorophenol) .

chloromethapyriline **كلوروميثابرلين**

دَواءٌ مُضادٌّ للهِسْتامين ، وهو الكلوروتين (Chlorothen) .

chlorometry **قِياسُ الكلور**

التحديد الكمي للكلور .

chloromyeloma **الوَرَمُ الأخضَرُ النقويّ**

ورم أخضر اللون ينمو في نقي العظام .

انظر تحت choroma .

chloronaphthalene **كلورونفتالين**

انظر تحت chlorinated naphthalene .

chloropexia **تَثْبيتُ الكلور**

تثبيت الكلور في نسيج الجسم .

chlorophane **كلوروفان (صِباغ أخْضَرُ فِي الشَّبَكِيَّة)**

صبغ أخضر مصفر يمكن الحصول عليها من الشبكية .

chlorophyl **كلوروفيل؛ يَخْضُور**

من مشتقات البرفيرين ، وهو المادة التي تعطي الأوراق النباتية لونها الأخضر وهي التي تتواسط في تحويل ضوء الشمس كطاقة ضوئية إلى طاقة أكسدة واختزال الطاقة لتثبيت غاز ثنائي أكسيد

(Chlorostigmine) استعملت (Stuckertianum) لتحفيز إفراز اللبن في الأمهات المرضعات .

كلوروثين **chlorothen**

دواء مضاد للهستامين .

كلوروثينيوم **chlorothenium**

كلوروثيازيد (دواء مدر للبول) **chlorothiazide**

مدر للبول ثيازيدي يستعمل لعلاج فرط ضغط الدم والوذمة ويعطى عن طريق الفم .

كلوروثيمول **chlorothymol**

(مُضادٌّ لِلجراثيم والفطريَّات)

مبيد جراثيم قوي تستعمل كمضاد موضعي للجراثيم والفطريات .

متعلق أو مصاب بداءِ الاخْضِرار **chlorotic**

صفة منسوبة إلى داء الاخضرار ، وهو فقر الدم بعوز الحديد نتيجة سوء التغذية الشديد .

كلوروتريانيسين **chlorotrianisene**

(إستروجين تخليقي)

إستروجين تخليقي يستعمل لكبح أدرار اللبن في النساء ما بعد الولادة ، ويستخدم للعلاج التخفيفي من سرطانة البروستاتة غير القابل للجراحة ، وعلاج بديل لعوز الإستروجين ، يؤخذ عن طريق الفم .

كلوروس (كلور ثلاثي التكافؤ) **chlorous**

مشتق من أو يحوي كلور ثلاثي التكافؤ ، كما في الحامض الكلوروسي ، $HCLO_2$ ، هو مصطلح يستعمل لتمييز تلك المركبات التي تحوي نسبة أكبر من الكلور عن مركبات الكلوريك ، ويكون أملاح تسمى الكلوريت (Chlorites) .

لويسيت **chlorovinyldichloroarsine**

(كلوروفينيل دي كلورورازين) **(=lewisite)**

هو اللويسيت (أحد غازات الحرب القاتلة) .

كلورُوكسين (دَواءٌ لِقشْرَةِ الشعر) **chloroxine**

مضاد جرثومي تخليقي ، ليستعمل في العلاج الموضعي لقشرة الرأس والتهاب الجلد المثي للفروة .

كلورُوزايليِنُول (مُطهرٌ لِلجلد) **chloroxylenol**

أي من الأجسام الحاملة للكلوروفيل في خلايا النبات ، وتسمى أيضاً (Chloroplastid) .

صَانِعَةُ الكلوروفيل؛ صَانِعَةُ اليَخْضُور **chloroplastid**

انظر تحت chloroplast .

مَحْرُوْمُ الكلوريد **chloroprivic**

محروم من الكلوريد ؛ بسبب فقدان الكلور .

كلوروبرُوكائين (بَنْجٌ مَوضِعِيٌّ) **chloroprocaine**

مخدر موضعي يستعمل في الجراحة الصغرى والعامة للإرشاح ، احصار الساحة ، العصب الناحي ، يشمل الاحصار الذنبي واحصار فوق الجافية .

اخْضِرارُ الرُّؤْيَة **chloropsia**

رؤية ملونة تبدو فيها كافة الأشياء كما أن لها مسحة (تلوين خفيف) خضراء ، وتمثل أحد أعراض التسمم بنبات الديجيتال (جنس من الأعشاب الطبية المقوية للقلب) .

كلوروكين **chloroquine**

مركب 4-امينوكينولين ، ذو خصائص مضادة للأوليات ، مضادة للالتهابات ، يستخدم لكبت وعلاج الملاريا وفي علاج داء الجياردية ، وداء الأميبات خارج المعوية ، ولكبح الذئبة الحمامية ، وكمضاد للالتهابات في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي .

ساركومة خَضْراء **chlorosarcoma**

حالة مرضية تتميز بتعدد الأورام النخاعية ، ذات لون مخضر ، تصيب الوجه والجمجمة بشكل خاص ، وتكون صورة الدم المصاحبة مشابهة لابيضاض الدم .

داءُ الاخْضِرار **chlorosis**

اضطراب كان شائعاً في القرن التاسع لكنه اختفى الآن ، ويتميز بتبدل لون الجلد إلى الأصفر المخضر ، وكريات الدم الحمراء ناقصة الانصباغ ، كان يشاهد عادة في الإناث المراهقات ، وربما تترافق مع فقر الدم بسبب عوز الحديد .

كلورُوسْتِجمين (قلواني نباتي) **chlorostigmine**

قلواني من النباتات من جنس كلوروستجما

له فعل مضاد للهستامين مشتق من الفينيرامين .
انظر تحت chlorpheniramine .

كلوربرُوثيكسين **chlorprothixene**

(دَواءٌ لِمعالجَةِ الذُّهان)

دواء ثيوزاثين (للمعالجات النفسية) يملك مفعول مهدئ ، ومضاد للقيء ، ومضاد للهيستامين ومضاد للفعل الكوليني ، محصر لنشاط الأدرينالين ألفا ، يستعمل للتحكم في أعراض الاضطرابات النفسية ، يعطى عن طريق الفم أو الحقن داخل العضل .

كلوركِينالدول (دَواءٌ جِلدِي) **chlorquinaldol**

عامل مبيد للجراثيم والفطريات ، ويملك خواص مماثلة للكليوكينول ، يستعمل موضعياً في علاج العدواى الجلدية المهبلية .

كلورتِتراسِكلين **chlortetracycline**

(مُضادٌ حَيَويّ)

مضاد حيوي واسع الطيف ، استخدم بواسطة المتسلسلة المذهبة وكان الأول في مجموعة التراسيكلين في الاكتشاف .

كلورتاليدُون (دَواءٌ مُدِرٌ لِلبَول) **chlorthalidone**

مشتق السلفوناميد ويملك تركيب كيميائي مختلف ، ولكن له نفس مفعول مدرات البول الثيازيدية ، يستعمل في علاج فرط ضغط الدم والوذمة ، ويؤخذ عن طريق الفم .

الكلور (العنصر السابع عشر) **chlorum**
(=chlorine)

انظر تحت chlorine .

بِيلَة كلوريديَّة **chloruresis**

إفراز الكلوريد في البول .

مُدِرُّ الكلوريد **chloruretic**

1 ـ تنشيط إفرازالكلوريد في البول .
2 ـ عامل ينشط إفراز الكلوريد في البول .

بِيلَة كلوريديَّة **chloruria**

وجود الكلوريد في البول .

كلورزوكسازون **chlorzoxazone**

(مُفرِجٌ لأَلَم العَضَلات)

مرخ للعضلات الهيكلية ، يستعمل لتخفيف

مضاد جرثومي نشط ضد المكورات السبحية ، ويستخدم غالباً كمبيد للآفات الجلدية .

كلورُوفينيزين **chlorphenesin**

(مُضادٌ لِلجَراثيم والفطريَّاتِ السَّوائِط)

عامل مضاد للجراثيم والفطريات والمشعرات ، يستعمل في علاج سعفة القدم والإصابات الفطرية الأخرى في الجلد وفي العداوى الفطرية والمشعرية في المهبل ، ويطبق موضعياً أو داخل المهبل .

كلورفينيرامين **chlorpheniramine**

(دَواءٌ مُضادٌ لِلتَّحَسُّس)

له فعل مضاد للهيستامين مشتق من الفينيرامين .

كلورفينوكسامين **chlorphenoxamine**

(دَواءٌ مُرَخٍ لِلعَضَلات)

دواء مضاد للفعل الكوليني مع تأثير ضعيف مضاد للهيستامين ، يستعمل كمرخ للعضلات الهيكلية في علاج داء باركنسون ، يؤخذ بالفم .

كلورفينتيرْمين **chlorphentermine**

(دَواءٌ مانِعٌ لِلشَّهيَّة)

امين محاكي للودي له خواص مماثلة لخواص الديسكتروأميتامين ، استعمل سابقاً كعامل قهمي .

كلوربرُومازين **chlorpromazine**

من الأدوية النفسية المضادة للذهان ، وهو دَواءٌ مُضادٌ للقَيء ، يستخدم للتحكم في التوجس السابق للجِراحة ، وللتحم في الطور الهوسي للاضطراب ثنائي القطبية ، ولعلاج الفواق المعند ، والبرفيرية الحادة المتقطعة ، والكزاز ، وفي التدابير العلاجية لاضطرابات السلوك الوخيمة عن الأطفال .

كلورْبرُوباميد **chlorpropamide**

دواء فموي خافض للسكر بطريق الفم من مركبات السلفونيل يوريا .

كلوربروفينبيريدامين **chlorprophenpyridamie**

(=كلورفينيرامين)

النهاية الأمامية للخلية .

مُقتمِعاتِ السَّوط **Choanoflagellida**

رُتْبَةٌ منَ السَّوطيَّات .

قِمْعِيُّ الشَّكل **choanoid**

شَعْرورَة **choanomastigote**

(= اللَّيشْمانَة) **(=amastigote)**

أي من الأجسام التي تمثل المرحلة المورفولوجية في دورة حياة أوالي المثقبات من جنس الشعرورية ، التي فيها منشأ الحركة والجسم القاعدي أمام النواة وتنشأ الزائدة الشبيهة بالسوط من غور قمعي الشكل عند الطرف الأمامي في الخلية .

الشَّريطِيَّة القِمْعِيَّة **Choanotaenia**

(جِنْسٌ مِنَ الديدان الشَّريطِيَّة)

جنس من الديدان الشريطية ، وهو طفيلي شائع لكن غير ممرض في الدجاج والديك الرومي .

صَدْمَة **choc**

تسمى أيضاً (Shock) ، وهي حالة هبوط الضغط الشرياني بشكل يهدد الحياة ، وقد تطلق أيضاً على الصدمات النفسية .

شوكولاتة **chocolate**

نبات الكاكاو .

اخْتِيار **choice**

الانتقاء من بين عدة خيارات متاحة .

1ـ شَرَق **choke**

2ـ يَشْرَق

1ـ التنفس المتقطع بالانسداد أو الضغط ، يسمى أيضاً (Strangel) .

2ـ حالة ناتجة من انقطاع التنفس ، وتسمى أيضاً (Strangulation) .

3ـ إحساس حارق يحدث عند إزالة الضغط ، والذي يبدأ من منطقة ما تحت عظم القص ، مع الحاح متزايد لا يمكن السيطرة عليه للسعال وشعور بخوف شديد ، مما يقود إلى نوبة وعائية حائرة (Vasovagal attack) .

شَرَقٌ صَدْرِيّ **thoracic choke**

دخول لقمة أو سوائل في الطريق التنفسي الاضطرابات العضلية الهيكلية المؤلمة أو المزعجة يؤخذ عن طريق الفم .

1ـ قِمْعٌ **choana TA**

2ـ مَنْعَر (قِمْعُ الأنفع)

1ـ أي تجويف على شكل قمع أو مخروط .

2ـ الفتحات المزدوجة بين التجويف الأنفي والبلعوم الأنفي ، تسمى أيضاً الفتحات الأنفية الخلفية (Posterior nasal apertures) ، والمنخران الخلفيان (Posterior nares) .

المَنْعَران العَظْميَّان **bony choanae**

القسمَ العظمَي من فتحة الأنف الداخلية التي تفتح على البلعوم الأنفي ، وتسمى أيضاً (Choanae osseae) وتتألف في الأعلى من قاع الحجاجين وفي الجانبين من الجدار الجانبي العظمي للأنف مع تبارز المحارات فيه ومن الأسفل عظم الحنك .

المَنْعَران العَظْميَّان **choanae osseae TA**

انظر تحت bony choanae .

المَنْعَرُ الأوَلي **primary choana**

فتحة الكَيس الشمي الجنيني داخل الفم .

المَنْعَرُ الثَّانَوي **secondary choana**

المنخران النهائيان بعد تكوين الحنك .

المَنْعَران **choanae TA**

جمع المنعر .

انظر تحت choana .

مَنْعَرِيّ **choanal**

تعود إلى المنعر .

خَلِيَّة قِمْعِيَّة **choanocyte**

نوع فريد من الخلايا يملك سوطاً يحيط به طوق هيولي رفيع ، وتميز الأسفنج وبعض الأوليات .

مُقتمِعُ السَّوط **choanoflagellate**

يسمى أيضاً (Choanomastigote) ، (Collared flagellate) ، وهومصطلح يطلق على مرحلة من مراحل تطور أوالي المثقبيات لجنس الشعرورية وفيه يكون منشأ الحركة والجسم القاعدي أمامياً للنواة والزائدة الشبيهة بالسوط تنشأ من خلال انخفاض شبيه بالقمع عند

استِئْصالُ القَناتَيْن الكَبِديَّةِ والصَّفراويَّةِ و المَرارَة — **cholangiocholecystoch-oledochectomy**
استئصال قناتي الكبد والقناة الصفراوية والمرارة.

مُفاغَرَة صَفراويَّة مِعَويَّة — **cholangioenterostomy**
مفاغرة جراحية لقناة الصفراء مع الأمعاء .

مُفاغَرَة صَفراويَّة مَعِديَّة — **cholangiogastrostomy**
مفاغرة جراحية بين قناة الصفراء مع المعدة .

صورَة الأقْنِيَةِ الصَّفراويَّة — **cholangiogram**
صورة شعاعية للمرارة والقنوات الصفراوية .

تَصْويرُ الأقْنِيَةِ الصَّفراويَّة — **cholangiography**
تصوير شعاعي للقنوات الصفراوية بعد تعاطي أو حقن وسط تباين ، بالفم أو الوريد أو تحت الجلد .

تَصْويرُ الأَقْنِيَة الصَّفْراويَّة بطَريق القَناةَ المراريَّة — **cystic duct cholangiography**
التصوير الشعَاعي للأوعية الصفراوية عبر الكبد ، بعد إدخال وسط تباين داخل الجهاز الصفراوي وذلك بإحداث ثقب في جدار القناة الصفراوية .

تَصْويرُ الأَقْنِيَة الصَّفْراويَّة اَلوَريديُّ — **intravenous cholangiography**
التصويرَ اَلشعاعَي للأقنية الصفراوية بحقن وسط تباين بالوريد .

تَصْويرُ الأَقْنِيَة الصَّفْراويَّة اَلجراحيُّ — **operative cholangiography**
التصويرَ اَلشعَاعي َلالأوعية الصفراوية ، والذي يتم أثناء أي إجراء جراحي للمرارة .

التِهابُ الأقْنِيَةِ الصَّفراويَّةِ والكَبِد — **cholangio-hepatitis**
التهاب وخيم في المجاري الصفراوية في الإنسان والحيوانات المجترة أو الخيول ، والتي تترافق في أحيان كثيرة مع إصابة الكبد بالديدان المثقبة التي تسبب انسداد في القنوات الصفراوية .

وَرَمٌ كَبِديٌّ صَفْراويّ — **cholangiohepatoma**
سرطانة كبدية خلوية من منشأ مختلط في خلايا الكبد وخلايا القناة الصفراوية ، وتسمى الصدري بدلاً من القناة الهضمية فتسبب الاختناق .

شَرَقٌ مائيّ — **water choke**
تقلص (تشنج) بلعومي بسبب دخول السوائل في البلعوم وخاصة عند الدخول بين الحبال الصوتية الكاذبة والحقيقة .

شَرَق — **choking**
دخول السوائل عبر الحنجرة فتسبب تشنجها ، وقد يحدث الاختناق بسببها .

سابِقَة بمعنى الصَّفْراء — **chol-**
سابقة مصطلح يعطي معنى الصفراء أو الطرق الصفراوية .
انظر تحت bile .

مُدِرُّ الصَّفْراء — **cholagogic**
تنشيط وتنبيه تدفق الصفراء داخل الإثنا عشري .

مُدِرُّ الصَّفْراء — **cholagogue**
عامل يحفز وينبه تدفق الصفراء داخل الاثنا عشري .


ثَرُّ الصَّفْراء — **choleneresis**
زيادة في إنتاج أو إزالة الأحماض الصفراوية أو متقارنتها أو أملاحها .

التِهابُ الأقْنِيَةِ الصَّفراويَّة — **cholangeitis (=cholangitis)**
انظر تحت cholangitis .

توسُّعُ الأقْنِيَةِ الصَّفراويَّة — **cholangiectasis**
تمدد القناة الصفراوية وركود الصفراء بها .

وَرَمٌ غُدِيٌّ صَفْراويّ — **cholangioadenoma**
انظر تحت bile duct adenoma .

سَرَطانَة الأقْنِيَةِ الصَّفراويَّة — **cholangiocarcinoma**
1 ـ سرطان غدي ينشأ من ظهارة الأقنية الصفراوية داخل الكبدية ، تتكون من خلايا ظهارية عمودية أو مكعبة أليفة اليوزين مرتبة على شكل أنابيب أو نبيبات مع سدى ليفية كثيرة ، وربما يتم إفراز المخاط لكن ليس الصفراء .
2 ـ سرطانة الأقنية الصفراوية الخلوية .



Cholangeitis التهاب الأقنية الصفراوية

مساره عند أطراف فصيص الكبد ، يسمى أيضاً قنية الصفراء (Bile ductule) أو قنية صفراوية (Biliary ductule) ، ونادراً شعيرية الصفراء (Bile capillary .

cholangiolitis **التِهابُ القُنَيَّاتِ الصَّفْراوِيَّة**

cholangioma **وَرَمُ الأَقْنِيَةِ الصَّفْراوِيَّة**

سرطانة خلايا الأقنية الصفراوية .

انظر تحت cholangiocellular carcinoma .

cholangiostomy **فَغْرُ القَناةِ الصَّفْراوِيَّة**

إنشاء فتحة داخل قناة الصفراء ، والتي تستعمل أحياناً للإشارة إلى ناسور داخل قناة الصفراء .

cholangiotomy **بَضْعُ القَناةِ الصَّفْراوِيَّة**

شق جراحي في قناة الصفراء .

cholangitis **التِهابُ الأَقْنِيَةِ الصَّفْراوِيَّة**

أيضاً سرطانة كبدية صفراوية (Hepatocholangio carcinoma) .

cholangiojejunostomy **مُفاغَرَة صَفْراوِيَّة صائِمِيَّة**

مفاغرة جراحية لقناة الصفراء الصائم .

intrahepatic cholangiojejunostomy **مُفاغَرَةٌ صَفْراوِيَّةٌ صائمية داخل الكَبِد**

(=مَفاغَرَةٌ بابيَّة معويَّة)

انظر تحت portoenterostomy .

cholangiolar **متعلق بالقُنَيَّاتِ الصَّفْراوِيَّة**

متعلق بالقنية الصفراوية (Cholangiole) .

cholangiole **قُنَيَّة صَفْراوِيَّة**

إحدى العناصر الانتهائية الدقيقة في جهاز القناة الصفراوية ، والذي يترك القناة البابية ، ويتابع

(5β- cholan- 24 -oic acid) .

تكَوُّنُ الصَّفْراء **cholanopoiesis**

تخليق الكبد للأحماض الصفراوية أو مشتقاتها وأملاحها .

مُكَوِّنُ الصَّفْراء **cholanopoietic**

1 ـ يتعلق أو يحفز تولد الأصبغة الصفراء أو ينشطها .

2 ـ عامل منشط (محفز) لتكون الصفراء .

كولانترين **cholanthrene**

(هيدْرُوكَرْبُونِيٌ مُسَرْطِن)

هيدروكربون خماسي الحلقة ، مولد للسرطان .

كولات **cholate**

ملح ، أو أنيون أو إستر لحمض الكوليك .

سابقة بمعنى الصَّفْراء **chole-**

كوليبيلِيروبين **cholebilirubin**

صبغة تختلف عن البيليروبين ، توجد في صفراء المرارة ، تعطي تفاعل مباشر لاختبار فان دن بيرج .

كوليكالسيفيرول **cholecalciferol**

1 ـ هرمون يخلق في الجلد من تشعيع 7- ديهيدروكوليستيرول أو يتم الحصول عليه على شكل ڤيتامين من المصادر الغذائية ، وينشط عند التأيض إلى 1 ، 25 ثنائي هيدروكسي كولي كالسيفيرول ، يسمى أيضاً ($Vitamin\ D_3$)

انظر تحت ergocalciferol .

2 ـ مستحضر هذا المركب مشتق من أنسجة الحيوان ، ويستعمل في الوقاية من وعلاج عوز ڤيتامين (D) بسبب انخفاض المدخول الغذائي ، المتطلبات العالية ، أو الامتصاص العليل للڤيتامين . ويستخدم كذلك في علاج تكزز نقص كالسيوم الدم ، وقصور الدريقات .

تكَوُّنُ الأصْبِغَةِ الصَّفْراويَّة **cholechromopoiesis**

تخليق صبغات الصفراء .

كوليسْيانين **cholecyanin**

هو البيليسيانين (صبغ صفراوي) .

انظر تحت bilicyanin .

المَرارَة **cholecyst**

اِلْتهابُ الأَقْنيَة الصَّفْراوِيَّة القَيحيُّ الحادُّ **acute suppurative cholangitis**

التهاب في الأقنية الصفراوية بسبب الجراثيم المقيحة ، ويكون مسار المرض حاداً شديداً .

اِلْتهابُ الأَقْنيَة الصَّفْراوِيَّة الصّاعد **ascending cholangitis**

اِلْتهابُ الأَقْنيَة الصَّفْراوِيَّة البَطيء **cholangitis lenta**

التهاب مزمن عدوائي بالأقنية الصفراوية بدون حصاة صفراوية أو انسداد بالسبيل الصفراوي .

اِلْتهابُ الأَقْنيَة الصَّفْراوِيَّة داخلَ الكَبد **intrahepatic cholangitis**

التهاب السبل الصفراوي الموجود داخل الكبد سواء كان بسبب جرثومي أو ڤيروسي .

اِلْتهابُ الأَقْنيَة الصَّفْراوِيَّة اللاقَيحيُّ **nonsuppurative cholangitis**

التهاب الأقنية الصفراوية لأسباب غير جرثومية قيحية كالأسباب الركودية ، والمناعية ، أو الڤيروسية .

اِلْتهابُ الأَقْنيَة الصَّفْراوِيَّة المُسدُّ **obliterative cholangitis**

التهاب الأقنية الصفراوية بأسباب تؤدي إلى انسدادها كالأورام أو الحصيات الصفراوية .

اِلْتهابُ الأَقْنيَة الصَّفْراوِيَّة الطُّفَيليُّ **parasitic cholangitis**

التهاب الأقنية الصفراوية لأسباب طفيلية كالمتحول الزحاري .

اِلْتهابُ الأَقْنيَة الصَّفْراوِيَّة المُصلِّب **sclerosing cholangitis**

انظر تحت primary sclerosing cholangitis .

اِلْتهابُ الأَقْنيَة الصَّفْراوِيَّة القَيحيُّ **suppurative cholangitis**

التهاب بسبب الجراثيم المقيحة في السبيل الصفراوي .

حَمْضُ الكولانيك **cholanic acid**

حامض ستيرويدي ، والذي يمكن أن يعتبر المركب الأم للأحماض الصفراوية ، وتركيبه

انسداد مخرج المرارة ، بأعراض وعلامات تتباين من وذمة بسيطة واحتقان حتى عدوى وخيمة وغرغرينة وانثقاب .

أَلْتهابُ المَرارَةِ النُّفاخي **cholecystitis emphysematosa**
التهاب المرارة بسبب كائنات حية منتجة مكونة للغازات ، يتميز بوجود غاز بتجويف المرارة ، وعادة يكون هناك ارتشاح بجدار المرارة والأنسجة المجاورة .
انظر تحت emphysematous cholecystitis .

أَلْتهابُ المَرارَةِ اَلغُدِّيُّ التَّكاثُري **cholecystitis glandularis proliferans**
تغلظ وتثخن بجدار المرارة الملتهبة بشكل مزمن ، مع تكون خبايا (Crypts) قد تتطور لتكون كسيات (Cysts) .

أَلْتهابُ المَرارَةِ المُزْمن **chronic cholecystitis**
التهاب المرارة ، والذي يتظاهر نسبياً بأعراض بسيطة والذي يستمر لمدة طويلة .

أَلْتهابُ المَرارَةِ اَلنُّفاخيُّ **emphysematous cholecystitis**
التهاب المرارة بسبب كائنات حية منتجة للغازات ، يتميز بوجود غاز بتجويف المرارة ، وعادة يكون هناك ارتشاح ، بجدار المرارة والأنسجة المجاورة ويسمى أيضاً (Gaseous cholecystitis) .

أَلْتهابُ المَرارَةِ اَلجُرَيبي **follicular cholecystitis**
التهاب المرارة والذي تتكون فيه عقد لمفاوية واضحة ، والتي عادة ما يكون فيها مراكز إنتاشية .

أَلْتهابُ المَرارَةِ الثَّاقب **perforating cholecystitis**
التهاب المرارة الحاد بسبب جرثومي مقيح غالباً مما يسبب انثقابها ودخول السائل الصفراوي إلى جوف البطن مسبباً التهاب الصفاق الحاد . وهي حالة خطيرة .

مُفاغَرَةٌ مَراريَّةٌ كلَويَّة **cholecystnephrostomy**

انظر تحت vesica biliaris .

مُقلصُ المَرارَة **cholecystagogic**
انظر تحت cholecystokinetic .

مُقلصُ المَرارَة **cholecystagogue**
عامل مقلص المرارة ، أو عامل محرك المرارة .

cholecystalgia **1 ـ أَلَمٌ مَراريّ**
2 ـ مَغْصٌ مَراريّ
1 ـ المغص الصفراوي .
2 ـ ألم بسبب التهاب المرارة .

وَنى المَرارَة **cholecystatony**
وني المرارة .

تَوسُّعُ المَرارَة **cholecystectasia**
تمدد المرارة .

استِئْصالُ المَرارَة **cholecystectomy**
الإزالة الجراحية للمرارة .

مَراريٌّ مِعَوي **cholecystenteric**
تتعلق بالاتصال بين المرارة والأمعاء ، وتسمى أيضاً (Cholecystointestinal) .

مُفاغَرَةٌ مَراريَّةٌ مِعَويَّة **cholecystentero-anastomosis**
انظر تحت cholecystenterostomy .

رَفْوٌ مَراريٌّ مِعَويّ **cholecystenterorrhaphy**
رفو المرارة بالمعى الدقيق .

مُفاغَرَةٌ مَراريَّةٌ مِعَويَّة **cholecystenterostomy**
المفاغرة الجراحية للمرارة إلى المعي ، وتسمى أيضاً (Cholecystenteroanastomosis) .

مُفاغَرَةٌ مَراريَّةٌ مَعِدِيَّة **cholecystgastrostomy**
مفاغرة المرارة بالمعي .
انظر تحت cholecystogastrostomy .

مَراريّ **cholecystic**
يعود إلى أو يتعلق بالمرارة .

المَرارَة **cholecystis**
انظر تحت gallbladder .

التِهابُ المَرارَة **cholecystitis**
التهاب المرارة سواء كان حاداً ، أو مزمناً .

أَلْتهابُ المَرارَةِ الحادّ **acute cholecystitis**
شكل من التهاب المرارة ، عادة ما يكون بسبب

انظر تحت cholecystopyelostomy .

cholecystocele **قيلة مَراريَّة**

توسع المرارة الشديد مع احتوائها على سائل .

Cholecystochol-angiogram **صورة المرارة والأقنيةِ الصَّفراويَّة**

التصوير الشعاعي للمرارة والقناة الصفراوية .

cholecystocolonic **مَراريٌّ قولونيّ**

يعود إلى الاتصال بين المرارة والقولون مثلما في الناسور المراري القولوني .

cholecystocolostomy **مُفاغرَة مَراريَّة قولونيَّة**

مفاغرة جراحية للمرارة مع القولون ، ويسمى أيضاً (Colocholecystostomy) .

cholecystocolotomy **بَضْعُ المرارةِ و القولون**

الشق الجراحي للمرارة والقولون .

cholecystocutaneous **مَراريٌّ جِلدِيّ**

صفة منسوبة للعلاقة بين المرارة والجلد في آن واحد .

cholecystoduo-denocolc **مَراريٌّ إثناعَشَريّ قولونيّ**

مفاغرة المرارة مع الإثنا عشري والقولون .

cholecystoduo-denostomy **مُفاغرَة مَراريَّة اثناعَشَريَّة**

مفاغرة جراحية للمرارة بالإثناعشري جراحياً .

cholecysto-endysis **فتحُ المرارة**

بضع المرارة جراحياً ، ويسمى أيضاً (Cholecystotomy) .

cholecystoenterostomy **مُفاغرَة مَراريَّة مِعَويَّة**

انظر تحت cholecystenterostomy .

cholecystogastric **مَراريٌّ مَعِدِيّ**

يعود إلى الاتصال بين المرارة والمعدة ، مثلما في الناسور المراري المعدي .

cholecystogastrostomy **مُفاغرَة مَراريَّة مَعِديَّة**

مفاغرة جراحية بين المرارة بالمعدة .

cholecystogogic **مُحَرِكُ المَرارة**

(=cholecystokinetic)

cholecystogram **صورة المَرارة**

صورة شعاعية للمرارة .

cholecystography **تصْويرُ المَرارة**

تصوير شعاعي للمرارة .

cholecystography post fatty meal **تَصْويرُ المَرارَةِ التَّالي للوَجْبَةِ الدُّهْنيَّةِ**

أحد أنماط اختبارات وظيفة المرارة وكشف مدى قدرة جدارها على الانقباض ، ويكون بعد تناول المواد الظليلة وتصوير المرارة على الريق وقبل تناول الوجبة الدهنية ، ثم بعد تناولها لملاحظة فرق حجمها قبل وبعد الوجبة الدهنية .

cholecystoileostomy **مُفاغرَة مَراريَّة لفائِفيَّة**

مفاغرة جراحية للمرارة باللفائفي .

cholecystointestinal **مَراريٌّ مِعَويّ**

انظر تحت cholecystenteric

cholecystojejunostomy **مُفاغرَة مَراريَّة صائِمِيَّة**

مفاغرة جراحية للمرارة والصائم .

cholecystokinase **كوليسيستوكيناز**

إنزيم يتواسط حلمة الكوليسيستوكينين .

cholecystokinetic **مُحَرِكُ المَرارة (مُقلصُ المَرارة)**

يسبب أو ينشط تقلص المرارة .

cholecystokinin **كوليسيستوكينين (هرمون ببتيدي)**

هرمون عديد الببتيد تفرزه الأغشية المخاطية بواسطة مخاطية الأمعاء العليا والوطاء . وهو ينشط تقلص المرارة (مع إطلاق الصفراء) وإفراز إنزيمات البنكرياس . الكوليسيستوكينين الوطائي هو ناقل عصبي ، ويسمى أيضاً (Pancreozymin) .

cholecystolithiasis **تَحَصي المَرارة**

حدوث حصى صفراوية داخل المرارة .

انظر تحت cholelithiasis .

cholecystolithotomy **الشَّقُّ عَنْ حَصاةِ المَرارة**

بضع المرارة لاستخراج حصاة منها .

cholecystolithotripsy **تَفتيتُ حَصاةِ المَرارة**

تفتيت حصى المرارة داخل المرارة .

cholecystonephrostomy **مُفاغرَة مَراريَّة كلَويَّة**

انظر تحت cholecystopyelostomy .

الجراثيم التي تسبب الحمى التيفية .

choledochal — **متعلق بقناة الصَّفراء**

تعود إلى أو تتعلق بقناة الصفراء .

choledochectasia — **توسيعُ قناةِ الصَّفراء**

هي في الواقع حالة توسع في قناة الصفراء لأسباب انسدادية أو خلقية ، وتكتشف بتصوير الصدى أو التصوير الظليل .

choledochectomy — **قطعُ قناةِ الصَّفراء**

استئصال جزء من قناة الصفراء .

choledochendysis — **قطعُ قناةِ الصَّفراء**

انظر تحت choledochotomy .

choledochitis — **التِهابُ قناةِ الصَّفراء**

التهاب في قناة الصفراء (Ductus choledochus) .

choledocho- — **سابقة بمعنى قناة الصَّفراء**

صيغة اتحادية تشير إلى العلاقة مع قناة الصفراء .

choledochocele — **قيلةُ قناةِ الصَّفراء**

شكل نادر في التمدد الكيسي الخلقي لقناة الصفراء يكون فيه الجزء المتمدد داخل جدار القناة .

choledochocholedochostomy — **مُفاغَرةُ قناةِ الصَّفراءِ بقناةِ الصَّفراء**

cholecystopathy — **اعتِلالٌ مَراريّ**

أي مرض في المرارة .

cholecystopexy — **تثبيتُ المَرارة**

تعليق أو تثبيت المرارة بوسيلة جراحية .

cholecystoptosis — **تدلّي المرارة**

انزياح قاص أو للأسفل للمرارة .

cholecystopyelostomy — **مُفاغَرةٌ مَراريَّةٌ حُوَيضيَّة**

مفاغرة جراحية للمرارة مع حوض الكلية ، وتسمى أيضاً (Cholecystonephorostomy) .

cholecystorrhaphy — **رَفوُ المرارة**

خياطة أو ترميم المرارة .

cholecystosis — **داءٌ مَراريّ**

أي مرض غير التهابي في المرارة .

hyperplastic cholecystosis — **الدَّاءُ المَراريّ المُفْرِطُ التَّنَسُّج**

زيادة شاذة في التركيب الخلوي للمرارة .


cholecystostomy — **فَغْرُ المرارة**

cholecystotomy — **فتحُ المرارة**

شق جراحي في المرارة ، والذي يعمل من أجل الاستكشاف ، أو تصريف أو إزالة الحصوات .

cholecystotyphoid — **التِهابُ المَرارةِ التيفيّ**

التهاب المرارة بالسلمونيلات التيفية ، وهي



Cholecystography — **تَصْويرُ المَرارة**

الشَّقُّ عَنْ حَصاةِ قناةِ الصَّفْراء **choledocho-lithotomy**
شق القناة الصفراوية لإزالة الحصى .

تفتيتُ حَصاةِ قناةِ الصَّفْراء **choledocho-lithotripsy**
تفتيت أو تكسير الحصوة داخل القناة الصفراوية .

رَأْبُ قناةِ الصَّفْراء **choledochoplasty**
إجراء عملية تقويمية في القناة الصفراوية ، ترميم تقويمي للقناة بعد الإصابة .

رَفْوُ قناةِ الصَّفْراء **choledoch-orrhaphy**
خياطة أو رأب قناة الصفراء .

مِنْظارُ قناةِ الصَّفْراء **choledochoscope**
جهاز يستعمل أثناء الاستكشاف الجراحي من أجل الفحص المباشر لداخل القناة الصفراوية

تَنْظيرُ قناةِ الصَّفْراء **choledochoscopy**
رؤية قناة الصفراء عبر المنظار الراجع في التنظير الهضمي .

فَغْرُ قناةِ الصَّفْراء **choledochostomy**
تكوين جراحي لفتحة داخل القناة الصفراوية والتصرف بالقثطرة أو أنبوب على شكل T .

بَضْعُ قناةِ الصَّفْراء **choledochotomy**
شق داخل قناة الصفراء لاستكشاف أو إزالة الحصوة ، وتسمى أيضاً (Choledochendysis) .

قناةُ الصَّفْراء **choledochus**
انظر تحت ductus choledochus .

كوليجلوبين **choleglobin**
(من مستقلبات الهيموجلوبين)
مركب من جلوبين وبروفين حديدي مفتوح الحلقة ، يعتبر وسيط في تكوين صيغة الصفراء من الأيض الهدمي للهيموجلوبين .

كوليهيماتين **cholehematin**
(صبغ أحمر في صفراء الحيوانات العاشبة)
انظر تحت phylloerythrin .

choleic
1ـ كوليك (حمض صفراوي)
2ـ صَفْراويّ

تكوين جراحي لمفاغرة بين جزأين في القناة الصفراوية .

تكوين جراحي لمفاغرة بين جزأين في القناة الصفراوية .

مُفاغَرَةُ المَرارَةِ بِقناةِ الصَّفْراء **choledochocys-tostomy**
عمل جراحي يوصل قناة الصفراء بجدار المرارة عبر فتحة بينهما .

مُفاغَرَةُ قناةِ الصَّفْراءِ بالإثنا عَشَرِي **choledocho-duodenostomy**
مفاغرة جراحية للقناة الصفراوية الجامعة بالإثنا عشري .

مُفاغَرَةُ قناةِ الصَّفْراءِ بالمِعَى **choledocho-enterostomy**
مفاغرة جراحية بين قناة الصفراء بالمعى .

مُفاغَرَةُ قناةِ الصَّفْراءِ بالمَعِدَة **choledocho-gastrostoy**
مفاغرة جراحية لقناة الصفراء والمعدة .

صورَةُ قناةِ الصَّفْراء **choledochogram**
صورة شعاعية للقناة الصفراوية .

تَصْويرُ قناةِ الصَّفْراء **choledochography**
تصوير شعاعي للقناة الصفراوية بعد تناول مادة ظليلة .

مُفاغَرَةُ قناةِ الصَّفْراءِ بالقناةِ الكَبِديَّة **choledoch-ohepatostoy**
مفاغرة جراحية للقناة الصفراوية إلى القناة الكبدية .

مُفاغَرَةُ قناةِ الصَّفْراءِ باللَّفائِفي **choledoch-oileostomy**
مفاغرة جراحية للقناة الصفراء واللفائفي .

مُفاغَرَةُ قناةِ الصَّفْراءِ بالصَّائِم **choledocho-jejunostoy**
مفاغرة جراحية للقناة الصفراء والصائم .

حَصاةُ قناةِ الصَّفْراء **choledocholith**
حصاة أو حصوة في القناة الصفراوية .
انظر تحت bile duct calculus .

تحَصّي قناةِ الصَّفْراء **choledocholithiasis**
حدوث الحصوات في القناة الصفراوية .
انظر تحت cholelithiasis .

اعتِلالٌ صَفراويّ cholepathia

أي علة تصيب السبل الصفراوية .

اعْتلالٌ صَفْراوي تَشَنُّجي cholepathia spastica

إصابة السبل الصفراوية بعلة تسبب تشنجها .

التِهابُ الصفاقِ الصَّفْراويُّ choleperitoneum (=choleperitonitis)

وجود الصفراء في الصفاق والناجم من تمزق في مسالك الصفراء . ويسمى أيضاً (Bile peritonitis)

التِهابُ الصفاقِ الصَّفْراويُّ choleperitonitis

انظر تحت choleperitoneum .

تكَوُّنُ الصَّفْراء cholepoiesis

1 ـ صناعة وإفراز الكبد لمكونات الصفراء بخلاف الماء .

2 ـ صناعة وإفراز أملاح الصفراء بواسطة الكبد .

مُكوِّنُ الصَّفْراء cholepoietic

تكوين أو إفراز مكون خاص بالصفراء ، وزيادة إفراز الصفراء دون انخفاض في ثقله النوعي .

كوليبْرازين (صبغ صفراوي) choleprasin

إحدى صباغ الصفراء المعزولة من حصاة الصفراء .

كوليرا cholera

1 ـ التهاب عدوائي حاد ، خاطف أحياناً ، وهي نوع من التهاب الأمعاء المستوطن في الهند وجنوب شرق آسيا ، وينتشر دورياً في شكل جائحة أو وباء إلى المناطق الدافئة الأخرى في العالم ، ينتشر بالمياه والطعام الملوث بالبراز ، ويكون السبب ذيفان معوي كامن (كوليراجين) ، الذي يتكون بواسطة الضمة الكوليرية ، والذي يعمل على الخلايا الظهارية في الأمعاء الدقيقة ليسبب إفراز كثير لسائل متساوي التوتر من السطح المخاطي ، تتميز الحالات الوخيمة بإسهال مائي غير مؤلم (براز شبيه بماء الرز) ، والذي يشخص ويؤدي إلى فقد سوائل جسيم ، ونفاذ الأملاح والحماض ، والصدمة ، والقيء من غير جهد ، تشنج

صفة منسوبة إلى الصفراء أو الحمض الصفراوي .

حمض الكوليك choleic acid

أي من المعقدات المتكونة بين حمض (Deoxycholic acid) والحمض الدهني أو الشحيمات الأخرى .

انظر تحت biliary .

حَصاة صَفراويّة cholelith

انظر تحت gallstone .

تحَصٍ صَفراويّ (تحصي صفراوي) cholelithiasis

وجود أو تكوين حصاة مرارية ، والتي تكون إما في المرارة ، وتسمى أيضاً (Cholecystolithiasis) ، أو في قناة صفراء وتسمى أيضاً (Choledocholithiasis) .

متعلق بالحَصَياتِ الصَّفْراويَّة cholelithic

تتعلق إلى أو ناتجة عن حصاة الصفراء .

الشَّقُّ عن حَصاةِ الصَّفْراء cholelithotomy

إزالة الحصى عبر شق جراحي في المرارة .

تفْتيتُ الحَصَيَاتِ الصَّفْراويَّة cholelithotripsy

تكسير حصاة الصفراء .

تفْتيتُ الحَصَيَاتِ الصَّفْراويَّة cholelithotrity (=cholelithotripsy)

انظر تحت chdelithotripsy .

قيءٌ صَفراويّ cholemesis

وُجودُ الصَّفْراءِ فِي الدَّم cholemia

وجود الصفراء أو صبغات صفراوية في الدم .

وُجودُ الصَّفْراء في الدَّم عائليُّ المَنْشَأ familial cholemia

انظر تحت Gilbert syndrome .

وُجودُ الصَّفْراء في الدَّم بحسب جيلبير Gilbert's cholemia

انظر تحت Gibert syndrome .

متعلق بوُجُودِ الصَّفْراءِ فِي الدَّم cholemic

تعود إلى أو تتميز بوجود أو بسبب وجود الصفراء في الدم .

قِياسُ صَفْراءِ الدَّم cholemimetry

تحديد كمية الصبغة الصفراوية في الدم .

الشللي تجمعاً غزيراً للسائل في المعدة ، يترافق مع صدمة عميقة مع إسهال .
انظر تحت summer cholera .

كوليرا جافَّة **cholera siderans**
(=cholera sicca)
نوع نادر من الكوليرا ، تنتج فيه الانسداد المعوي الشللي تجمعاً غزيراً للسوائل في المعدة ، يترافق مع صدمة عميقة مع إسهال .

كوليرا جافَّة **dry cholera**
(=cholera sicca)
نوع نادر من الكوليرا ، ينتج فيه الانسداد المعوي الشللي تجمعاً غزيراً للسوائل في المعدة ، يترافق مع صدمة عميقة مع إسهال .

كوليرا الطُّيور **fowl cholera**
عدوى تسببها الباستوريلة القتالة ، تشاهد في أنواع الطيور حول العالم ، تشمل الدجاج المنزلي ، طائر الكناري ، طيور الماء النورس ، طيور الصيد ، الطيور المفترسة . يحدث في أشكال حادة مميتة أحياناً وأشكال مزمنة ، أعراضها تشمل تبيغ بطني مع حبرات ونزف دموي وحمى ، والريش المكشكش والإسهال وزيادة معدل التنفس الزائد وأحيانا التهاب الرئة .

كوليرا الخَنازير **hog cholera**
مرض عدوائي سوافي معد للخنازير تسببه فيروس طخائي ، تتميز بوجود حمى ، وفقدان الشهية ، والهزال ، وتقرح المعي والإسهال وكدمة دموية في الكلية وعلى جلد السطح البطناني في الجسم ، وتسمى أيضاً (Swine fever) .

كوليرا بَنْكرْياسيَّة **pancreatic cholera**
انظر تحت Verner - Morrison syndrome .

كوليرا صَيفيَّة **summer cholera**
الاسم القدَيم لنوع يتميز بالتهاب المعدة الحاد مع الإسهال والقيء ، يحدث في الصيف أو الخريف ، تسمى أيضاً كوليرا الصيف .

كوليرا تيفيَّة **typhoid cholera**
عضلي ، وصوت خافت غريب عالي النبرة .
2ـ أي من العداوى الوخيمة والتي تشبه هذا المرض ، خاصة في الطب البيطري ، لكن لا تسببها العوامل المسببة للكوليرا (الضمة الكوليرية) .

كوليرا آسْيَويَّة **Asiatic cholera**
كوليرا تقليدَية ، سميت كذلك لأن المرض كان مقتصر في بدايته على آسيا .

كوليرا الدَّجاج **chicken cholera**
إسهال شديد يصيب الدجاج بجرثومة الكوليرا .

كوليرا صاعقَة **cholera fulminans**
تسمى أيضاً الكوليرا الجافة (Cholera sicca) لأنها تسبب التجفاف السريع للمصاب ، وهو نموذج نادر قاتل من الكوليرا والتي تسبب علوص منتج لتجمع السوائل من المعي ، والمصاحبة مع صدمة عميقة مع الإسهال .

كوليرا الطُّيور **cholera gallinarium**
(=fowl cholera)
عدوى تسببها الباستوريلة القتالة ، تشاهد في أنواع الطيور حول العالم ، تشمل الدجاج المنزلي ، طائر الكناري ، طيور الماء النورس ، طيور الصيد ، الطيور المفترسة . يحدث في أشكال حادة مميتة أحياناً وأشكال مزمنة ، أعراضها تشمل تبيغ بطني مع حبرات ونزف دموي وحمى ، والريش المكشكش والإسهال وزيادة معدل التنفس الزائد وأحيانا التهاب الرئة .

كوليرا طِفْليَّة **cholera infantum**

كوليرا مُمْرَضَة **cholera morbus**
(=كوليراً صَيفيَّة) **(=summer cholera)**
الاسم السابق لنَوع يتميز بالتهاب معوي معدي حاد مع الاسهال والقيء والمعص ، والذي يحدث في الصيف أو الخريف ، تسمى أيضاً (Summer cholera) .

كوليرا جافَّة **cholera sicca**
نوع نادر من الكوليرا ، ينتج فيه الانسداد المعوي

صورة ثنائية الأبعاد للجهاز الصفراوي عن طريق ومضان الجهاز الصفراوي .

وَمَضانُ الجهازِ الصَّفْراوي **cholescintigraphy**

تصوير ومضي للسبيل الصفراوي .

كوليستَان (ستيرويد مشبع) **cholestane**

هيدروكربون ستيرويدي مشبع مع مجموعتين مثيل (C_{19}- C_{18}) وسلسلة جانبية (أيزوكتيل) عند (C_{-17}) ، ينتج من اختزال الكوليستيرول والستيرويدات الأخرى ذات C_{27} .

كولِيستَانول **cholestanol**

(مستقلب كولستيرولي يطرح في البراز)

مركب ، تركيبه الكيميائي $C_{27} H_{47} OH$ يتكون باختزال الكوليستيرول .

بيتا ـ كُوليسْتانُول **beta-cholestanol**

مـصـاوَغ للكوبروستيرول ، والمشتق من الكوليستيرول بفعل جراثيم توجد في البراز ، يسمى أيضاً (Dihydrocholesterol) .

رُكودٌ صَفْراويّ **cholestasia**

وقف أو كبح تدفق الصفراء ، لمسببات داخل وخارج الكبد .

انظر تحت cholestasis .

رُكودٌ صَفْراويّ **cholestasis**

وقف أو كبح تدفق الصفراء ، لمسببات داخل وخارج الكبد .

رُكودٌ صَفْراويٌّ داخلَ الكَبدَ **intrahepatic cholestasis**

تباطُؤ مرور المادة الصفراوية في الأقنية داخل الكبد لتوسعها أو التهابها أو انسدادها .

متعلق بالرُكودِ الصَّفْراوي **cholestatic**

تعود إلى أو تتميز بوجود ركود صفراوي .

وَرَمٌ كوليستيرُولِيّ **cholesteatoma**

كتلة شبه كيسية أو ورم حميد مبطنة بظهارة قشرية تطابقية ، عادة ما تكون متقرنة ومملوءة بزاوئد متقشرة تحوي الكوليستيرول ، تظهر في الغالب في الأذن الوسطى ومناطق الخشاء تابعة للرضوح أو الالتهاب والتي تشفي بطريقة غير صحيحة بحيث تتكون الظهارة متدخلة ، ومنها

اسم قديم للكوليرا تسيطر فيه الأعراض العصبية كالهذيان والاختلاط العقلي .

كوليرا شَتَوِيَّة **winter cholera**

الكوليرا التي تظهر في الشتاء على خلاف المعتاد .

كوليراجين (ذيفانُ الكوليرا) **choleragen**

ذيفان خارجي تنتجه جرثومة الكوليرا ، يعتقد أنه يحفز إفراز الكهارل والماء في الأمعاء الدقيقة في الكوليرا الأسيوية .

1 ـ متعلق بالكوليرا **choleraic**

2 ـ كوليرائِيّ

متعلق بالكوليرا أو من طبيعتها .

عاثيَة ضَمَّاتِ الكوليرا **choleraphage**

عاثية تصيب عصيات الكوليرا .

إفرازُ الصَّفْراء **choleresis**

إفراز الصفراء من الكبد أما بتكوين الصفراء أو استسقاء الصفراء .

مُفْرِزُ الصَّفْراء **choleretic**

1 ـ تنشيط انتاج الكبد للصفراء أما عن طريق تكوين أواستسقاء الصفراء .

2 ـ عامل مفرغ للصفراء .

مِزاجٌ صَفْراوِيّ **choleria**

أحد نماذج الطبائع البشرية التي وصفت قديماً بالسوداوية والصفراوية والبلغمية والدموية ، وقد وصف المزاج الصفراوي بالحار اليابس .

صَفْراويُّ المِزاج **choleric**

حاد الطبع ، سريع الغضب ، يملك مزاج تسببه وفق نظرية قدماء الإغريق ، زيادة إفراز الصفراء

شَبِيهٌ بالكوليرا **choleriform**

انظر تحت choleroid .

مُحْدِثُ الكوليرا **cholerigenic**

مسبب للكوليرا .

مُحْدِثُ الكوليرا **cholerigenous**

انظر تحت cholerigenic .

شَبِيهٌ بالكوليرا **choleroid**

يشبه الكوليرا .

وَمِيضَةُ الجهازِ الصَّفْراوي **cholescintigram**

فَرْطُ كوليستيرول الدَّم **cholesterinemia**
انظر تحت cholesteremia .

الدَّاءُ الكولِيستيرولِيُّ **cholesterinosis**

بِيلةٌ كوليستيروليَّة **cholesterinuria**
وجود الكوليستيرول في البول وبمقدار كبير .

تراكُم الكوليستيرول في الأنسِجَة **cholesterohistechia**
ترسب الكوليستيرول في الأنسجة في حالات ارتفاع تركيزه في الدم ، فيشكل كيسات كوليستيرولية تحت الجلد مثلاً .

مَوَهُ الصَّدْر الكوليستيرولِيُّ **cholesterohydrothorax**
انصباب كيلوسي الشكل يرتفع فيه الكوليستيرول .

كوليستيرول **cholesterol**
1 ـ ستيرول حقيقي النواة يكون في الحيوانات العليا كمادة سابقة للأحماض الصفراء والهرمونات الستيرويدية ومكون أساسي في أغشية الخلية ، لتسهيل سيولتها ونفاذيتها ، يتم تصنيعه غالباً في الكبد والأنسجة الأخرى ، ولكن بعضه يتم امتصاصه من مصادر غذائية ، مع نقل كل نوع في البلازما بواسطة بروتين شحمي خاص . يمكن أن يتراكم الكوليستيرول أو يترسب على نحو شاذ ، كما في بعض حصى المرارة وفي تصلب الشرايين .
2 ـ مستحضر كوليستيرول والذي يستعمل كعامل مستحلب في الأدوية .

فَرْطُ كوليستيرول الدَّم **cholesterolemia**
انظر تحت hypercholesterolemia .

ثَرٌّ كوليستيروليٌّ صَفراويّ **cholesteroleresis**
إزالة (إطراح) زائدة للكوليستيرول في الصفراء .

نَقصُ إستيرات الكوليستيرول **cholesterolestersturz**
انخفاض في نسبة الإسترات في كوليستيرول الدم .

تَكَوُّنُ الكوليستيرول **cholesterologenesis**
عمليات تكوين الكوليستيرول كيميائياً .

نوع خلقي غير أنه ليس شائع وينتج من جنين أو مضغة مشتملة .

وَرَمٌ كُولِيسْتِيرُولِيٌّ طَبْلِيّ **cholesteatoma tympani**
نوعٌ يترافق عادة مع إصابة مزمنة في الأذن الوسطى ، تتكون من الطبقات القشرية في الظهارة الحرشفية المتطابقة التي تمددت إلى الداخل وإلى أعلى لتكون في خط واحد مع طبلة الأذن الوسطى .

وَرَمٌ كُولِيسْتِيرُولِيٌّ خِلْقِيّ **congenital cholesteatoma**
وَرَم حميد ناتج من دخول عناصر جلدية عند وقت قفل التجويف ، وقد تكون داخل أو قرب الأذن ، لكن في أحيانا كثيرة تكون على شكل ورم كوليستيرولي داخل القحف .

الوَرَمُ الكولِيسْتِيرُولِيٌّ داخلَ القَحْف **intracranial cholesteatoma**
ورمَ خلقيّ من نوع كيسي جلدي في الجمجمة أو السحايا أو المخ وهو ينمو ببطء في الصهاريج ، تتباين الأعراض تبعاً للجزء في الدماغ ، الواقع تحت الضغط ، ولكنه قد يصبح مهدد للحياة .

وَرَمِيٌّ كوليستيرولِيّ **cholesteatomatous**
تعود إلى الورم الشحمي الكوليستيرولي .

تنكُّسٌ كوليستيرولِيّ **cholesteatosis**
ترسبات دهنية لاسترات الكوليستيرول في النسيج .

كوليستين **cholestene**
مادة كيميائية تخفض مقدار الكوليستيرول في الدم .

فَرْطُ كوليستيرول الدَّم **cholesteremia**
يسمى أيضاً (Cholesterinemia) ، وهو ارتفاع مقدار الكوليستيرول في الدم أكثر من مقداره الطبيعي (100-200 ملجرام) .

كوليستيرين **cholesterin**
(= كوليستيرول) **(=cholesterol)**
انظر تحت cholesterol .

انظر تحت erythema elevatum dilutinum .

كوليتيلين (مستقلب للبيليروبين) **choletelin**

صبغة صفراء ، ناتج عن أكسدة البيليروبين ، البليزنتين .

مُعالجَة بأمْلاح الصَّفْراء **choletherapy**

معالجة تتم يتعاطى أملاح الصفراء .

بيلَةٌ صَفْراويَّة choleuria

كوليَفيردين **choleverdin**

(= بليفِيرْدين) **(=biliverdin)**

انظر تحت biliverdin .

كولين **choline**

مركب قابل للذوبان في الماء يشتق من الكثير من أنسجة الحيوان وبعض أنسجة الخضروات ، وينتج صناعياً ، يعتبر ڤيتامين من فصيلة ڤيتامين B المركب ، وهو المكون الأساسي لليسيتين ويمنع ترسب الدهن في الكبد ، والإسترات لحمض الأسيتيك للكولين (أسيتيل كولين)

تكَوُّنُ الكوليستيرول **cholesterolopoiesis**

تخليق الكوليستيرول عن طريق الكبد .

الداءُ الكوليستيروليُّ **cholesterolosis**

هي حالة تتميز بترسب الكوليستيرول في الأنسجة بكمية غير طبيعية ، وتسمى أيضاً (Cholesterosis) .

بيلَة كولِيستيروليَّة **cholesteroluria**

وجود الكوليستيرول في البول .


الداءُ الكوليستيروليُّ **cholesterosis**

انظر تحت cholesterolosis .

الدَّاءُ الكوليستيروليُّ الجلْديّ **cholesterosis cutis**

يسَمَى أيضاً الوُرام الأصفر (Xanthomatosis) ، وهو تراكم الكوليستيرول في أنسجة الجلد على شكل أورام كوليستيرولية صفراء .

الداءُ الكوليسْتيروليُّ خارجَ الخَلَوَي **extracellular cholesterosis**



تأثير الكوليستيرين (الكوليستيرول) **Effect of cholesterin (cholesterol)**

الألياف العصبة الودية واللاودية والتي تفرز الأسيتيل كولين عند المشبك حين تمر الدافع العصبي .
انظر تحت receptor .
2ـ عامل ينتج مثل تلك التأثيرات ، يسمى أيضاً (Parasympathomimetic)

كولِينِستيراز (إنزيم) **cholinesterase**

إنزيم من نوع الهيدرولاز ، والذي يحفز انشطار مجموعة الأسيل من مختلف إسترات الكولين ، وتشمل أسيتيل كولين ، وبعض المركبات ذات الصلة ، يوجد الإنزيم في المقام الأول في المصل والكبد والبنكرياس ، ويستعمل تحديد النشاط الإنزيمي لاختبار وظيفة الكبد ، وحساسية السكسينيل كولين ، حينما يحدث تسمم بمبيدات الحشرات العضوية الفسفورية . ويسمى أيضاً (Choline esterase II) .

كُولينسْتيرازٌ حَقيقيَّة (= أسيتيل كُولينسْتيراز) **true cholinesterase (=acetylcholinesterase)**

انظر تحتَ acetylcholinesterase .

كولينِيُّ الاسْتِقبال **cholinoceptive**

تشير إلى مواضع من الخلايا المتأثرة والتي تعمل بالناقلات كولينية الفعل .

حالُّ الكولين **cholinolytic**

1ـ يحصر عمل الأسيتيل كولين ، أو العوامل كولينية الفعل .
2ـ عامل يحصر فعل الأسيتيل كولين في مناطق كولينية الفعل ، أي من الأجهزة المزودة بالأعصاب اللاودية ، والعضلات الإرادية .

مُحاكي الكولين **cholinomimetic**

له ذات فعل يشبه الإسيتيل كولين ؛ محاكي للاودي (Parasympathomimetic) .

مُستَقبِلَة الكولين **cholinoreceptor**

يسمى أيضاً (Cholinergic receptor) ، وهي المواضع من الخلايا أو المشابك العصبية التي تتقبل تأثير الأسيتيل كولين .

كولينِيُّ الفِعْل **cholinergic**

1ـ منشط أو محفز أو منقول بالكولين (أسيتوكولين) ، كلمة تستعمل لتدل على ضرورية في النقل المشبكي للدوافع العصبية ، كما تتم أكسدته لتكوين البيتان (Betain) في التصنيع الحيوي للميثيونين .

أسيتيلازُ الكولين **choline acetylase**

إنزيم يتواسط تكثيف الكولين وأستيل تميم الإنزيم A لتكوين الأستيل كولين . وتسمى أيضاً (Choline acetyltransferase) .

ناقلَةُ أسيتيل الكولين **choline acetyltransferase**

انظر تحت choline acetylase .

كينازُ الكولين **choline kinase**

تسمى أيضاً كولين فسفوكيناز (Choline phosphokinase) ، وتعمل على إنتاج الفسفوكولين من الكولين و (ATP) .

ثُلاَثيُّ ساليسيلاَت المَغْنزْيُوم والكولَين **choline magnesium trisalicylate**

توليفة من كولين ساليسيلات والكولين والمغنزيوم ، يستعمل كمضاد لالتهاب المفاصل .

ساليسيلاَتُ الكولين **choline salicylate**

هو ملح الكولين في حامض ساليسيليك ، والذي يستعمل كمسكن وكمضاد للحمى والروماتزم .

تِيُوفيلينات الكولين **choline theophyllinate**

انظر تحت oxtriphylline .

فُسْفاتيديل الكولين **phosphatidyl choline**

هو الليستين (Lecithin) وهو شحم فسفوري ينتج بالإماهة لجزيئتين من حمض شحمي وجزئي من حمض الجليسيروفسفوريك والكولين ، وفي بعض الأشكال تكون كلا الجزيئين الشحميين مشبع بينما تحتوي في بعضها الآخر أحماضاً غير مشبعة فقط . واللستين شمع أصفر أو بني ويوجد في النسيج الحيواني والنباتي .

cholo- **سابقة بمعنى الصَّفْراء**

تدل على العلاقة إلى الصفراء .

cholochrome **صِباغٌ صَفْراويّ**

cholocyanin **كولوسّيانين**

انظر تحت bilicyanin .

cholegenetic (=cholepoietic) **مُكوِّنُ الصَّفْراء**

ينتج الصفراء .

cholohematin **كولوهيماتين**

أحد الأصبغة الصفراوية .

cholohemothorax **تدمِّي الجَنْبَةِ الصَّفْراويُّ**

انصباب جنبي يحوي صفراء ودم ، عادة يكون بسبب تمزق في جدار المعى .

chololith **حَصاة صَفْراويَّة**

انظر تحت cholelith .

chololithiasis **تحصٍّ صَفْراويّ (تحصِّي صَفْراوي)**

انظر تحت cholelithiasis .

chololithic **متعلق بالحَصاةِ الصَّفْراويَّة**

انظر تحت cholelithic .

cholopoiesis **تكَوُّنُ الصَّفْراء**

انظر تحت cholepoiesis

cholothorax (=cholohemothorax) **صَفْراويَّة الجَنْبَة (= تدمِّي الجَنْبَةِ الصَّفْراويُّ)**

انصباب جنبي يحوي صفراء ، عادة يعود إلى تمزق في جدار الأمعاء نفسه .

choluria **بيلة صَفْراويَّة**

وجود الصفراء في البول ، مما يؤدي إلى تلون البول بصبغات الصفراء .

choluric **متعلق بالبيلةِ الصَّفْراويَّة**

تتعلق أو تتميز بوجود الصفراء بالبول .

chondodendrine **البيبيرين**

يسمى أيضاً (Bebeerine) ، وهو جنس من الأشجار ، يستخرج من لحاء شجر البيبيرو .

Chondodendron **غُضْروفيَّة الأَغْصان (جِنْسٌ مِنَ النَّباتاتِ المُتَسلِقة)**

جنس شجيرات متسلقة ، من عائلة قمرية البذور وهي إحدى مصادر الأدوية المرضية للأعصاب .

انظر تحت curare .

Chondodendron tomentosum **غُضْروفيَّةُ الأَغْصانِ الوَبْراءَ**

نبات من جنس غضروفية الأشجار ، وهو مصدر الكورار (دواء مرخٍ للعضل) .

انظر تحت curare .

chondr- **سابقة بمعنى الغُضْروف**

سابقة مصطلح تدل على معنى الغضروف .

chondral **غُضْروفِيّ**

يعود إلى الغضروف .

chondralgia **أَلَمٌ غُضْروفِيّ**

انظر تحت chondrodynia .

chondralloplasia (=dyschondroplasia) **خَلَلُ تنَسُّجِ الغُضْرُوف**

انظر تحت dyschondroplasia .

chondrectomy **استِئْصالُ الغُضْروف**

استئصال جراحي للغضروف .

chondri- **سابقة بمعنى الغُضْروف**

طليعة مصطلح تدل على معنى الغضروف .

chondric **غُضْروفِيّ**

Chondrichthyes **الأَسْماكُ الغُضْروفِيَّة**

صنف سمك ذات هيكل غضروفي ، والتي تشمل الفك المفترس ، وسمك السَّفَن .

انظر تحت elasmobranch .

chondricont **مُتقدرة قطيبيَّة**

متقدرات خلوية ذات قطبين أو خيطية الشكل ولكنها ليست مستديرة وتسمى أيضاً (Chondrocont) .

chondrification **تغَضْرُف**

تكون الغضروف ، أو تحول إلى غضروف .

chondrigen **مُوَلِّدُ الكوندرين**

ويسمى أيضاً (Chondrogen) ، وهي تسمية قديمة للمواد الأساسية في الغضروف والتي تتحول بالغلي المديد بالماء إلى مادة هلامية تسمى الكوندرين . وقد أصبحت تسمى الآن

بالتكلس ، ومرتبة بشكل سداسي الأضلاع ، تشبه أسلاك الدجاج (Chicken wire) ، حول خلايا متراصة بقرب شديد .

وَرَمٌ أَرُومِيٌّ غُضْرُوفِيٌّ حَمِيدٌ — **benign chondroblastoma**

انظر تحت chondroblastoma .

كلاسُ الغضاريف (= نِقرسٌ كاذِب) — **chondrocalcinosis (=pseudogout)**

وجود أملاح الكالسيوم بخاصة بيروفسفات الكالسيوم في التركيبات الغضروفية في مفصل واحد أو أكثر .

سَرَطانَةٌ غُضْرُوفِيَّة — **chondrocarcinoma**

ورم غضروفي خبيث يظهر في النسيج الظهاري للغضروف .

نَقْضُ الغُضْرُوف — **chondroclasis**

اختفاء الغضروف المفصلي نتيجة تحلله . لسبب ما ، كما يحدث في التهاب المفاصل الروماتزمي .

ناقِضَةُ الغُضْرُوف — **chondroclast**

خلية عملاقة من النوع الذي يعتقد أنه يترافق مع امتصاص الغضروف .

مُتَقدِّرَةٌ خَيطِيَّة — **chondrocont**

انظر تحت chondricont .

غُضْرُوفِيٌّ ضِلعِيّ — **chondrocostal**

تتعلق بالضلوع والغضاريف الضلعية .

القِحفُ الغُضْرُوفِيّ — **chondrocranium**

ذلك الجزء في القحف العصبي المتكون من تعظم داخل الغضروف ، ويضم عظام قاعدة الجمجمة ، يسمى أيضاً (Cartiaginous neurocranium) .

خَلِيَّةٌ غُضْرُوفِيَّة — **chondrocyte**

خلية غضروفية مكتملة النمو ومنطمرة في جوبة داخل مطرس الغضروف .

خَلَايَا غُضْرُوفِيَّةٌ إِسوِيَّةُ التَّكْوِين — **isogenous chondrocytes**

خلايا غضروفية متجانسة الأصل تؤلف مجموعة واحدة .

الكولاجين .

كوندرين — **chondrin**

انظر تحت chondrigen .

قَنْدُرِيَّة — **Chondrina**

جنسٌ منَ الحَلَزونات .

1 ـ سابِقة بِمعنى الغُضْرُوف — **chondrio-**

2 ـ سابقة بمعنى الحُبَيْبات

مُتقدرات الخَلِيَّة — **chondriome**

كل متقدرات الخلية أو الكائن الحي باعتبارها بنية واحدة .

مُتقدِرة — **chondriosome (=mitochondrion)**

انظر تحت mitochondrion .

التِهابُ الغُضْرُوف — **chondritis**

الْتِهابٌ مُكَلِّسٌ لِلغَضاريف بين الفقار — **chondritis intervertebralis calcanea**

يسمى أيضاً كُلاسٌ بَينَ الفقار (Calcinosis intervertebralis) ، وهو ترسبَ الكالسيوم على الأقراص بين الفقرية لأسباب التهابية فيها .

الْتِهابُ غُضْرُوف الضِّلْع — **costal chondritis**

انظر تحت Tietz's syndrome .

سابقة بمعنى الغُضْرُوف — **chondro-**

ترمز إلى العلاقة إلى الغضروف .

وَرَمٌ غُدِيٌّ غُضْرُوفِيّ — **chondroadenoma**

يسمى أيضاً (Adenochondroma) ، وهو ورم مختلط من الخلايا الغدية والغضروفية ، ويمكن مشاهدته في الغدد اللعابية .

وَرَمٌ وعائِيٌّ غُضْرُوفِيّ — **chondroangioma**

ورم متوسطي حميد يحتوي على عناصر غضروفية ووعائية معاً .

أَرومَةٌ غُضْرُوفِيَّة — **chondroblast**

خلية تنشأ من اللحمة المتوسطة ، وتكون الغضروف . وتسمى أيضاً (Chondroplast) .

وَرَمٌ أَرُومِيٌّ غُضْرُوفِيّ — **chondroblastoma**

ورم حميد مشتق عادة من خلايا غضروفية غير مكتملة النمو ، تحدث في المقام الأول في المشاش في المراهقين ، تتميز بمطرس دقيق شبيه

chondrodermatitis **التِهابُ الغُضْروفِ و الجِلْد**

عملية التهابية تتضمن الغضروف والجلد ، وهو تعبير يستعمل على وجه التحديد للتعبير عن التهاب جلد وغضروف حتار الأذن العقدي المزمن .

chondrodermatitis nodularis chronica helicis **اِلْتِهابُ غُضْروف وَجِلْد حَتار الأُذُن العُقَيْدِيُّ المُزْمِن**

هو آفه عقدية قشرية مؤلمة صغيرة على حتار الأذن ، لون جلدي ملون ، رمادي أو شفاف ، ربما تظهر آفات متعددة على طول حافة الأذن ، تشاهد عادة في الرجال متوسطي العمر وفي الغالب في الأذن اليمنى ، يسمى أيضاً مرض فينكلر (Winkler's disease) .

chondrodynia **ألَمُ الغَضْروف**

chondrodysplasia **خَلَلُ التَّنَسُّج الغَضْروفِيّ**

انظر تحت dyschondroplasia .

chondrodysplasia punctata **خَلَلُ التَّنَسُّج الغُضْروفيُّ المُنَقَّط**

مجموعة متغايرة من خلل التنسج العظمي ، يتميز بترقط المشاش في الطفولة .

وتشمل المجموعة شكل من الوراثة المتنحية الجسدية الوخيمة (قرامة بصغر الفخذ) ، وهو شكل وراثي سائد جسدي (متلازمة كونرادي هنرمان) ، وشكل مرتبط بالجنس (مرتبط بالكروموسوم X) .

hereditary deforming chondrodysplasia **خَلَلُ التَّنَسُّج الغُضْروفيّ الوراثيّ المُشَوِّه**

الاسم الرسمي (الرئيسي) للعرن الغضروفي المتعدد .

chondrodystrophia **الحَثَلُ الغَضْروفِيّ**

تسمى أيضاً (Chondrodystrophy) ، (Chondro-dysplasia) ، وهي حالة مرضية تتميز بتطور الغضروف الاتصالي غير السوي في العظام الطويلة ، ما يسبب القزامة بنقص نمو العظام الطويلة بينما يبقى نمو الرأس والجذع طبيعياً .

chondrodystrophia calcificans congenita **الحَثَلُ الغُضْروفيُّ الكُلاسيُّ الخَلْقيّ**

انظر تحت chondrodystrophia congenita punctata .

chondrodystrophia congenita punctata **الحَثَلُ الغُضْروفيُّ الخَلْقيُّ المُنَقَّط**

تسمى أيضاً (Chondrodystrophia calcificans congenita) ، (Conradi-Hunermann syndrome) ، (Dysplasia epiphysialis punctata) ، (Epiphyses stippled) وهي حالة خلل تنسج عظمي غضروفي متغايرة ، والتي تسبب ظهور المشاش بشكل مرقط أو منقط غير متجانس ، ومنها نماذج تنتقل وراثياً بصفة جسدية .

chondrodystrophia fetalis **الحَثَلُ الغُضْروفيُّ الجَنينيّ**

أي نمَط من أنماط الحثل الغضروفي الخلقي .

انظر تحت chondrodystrophia congenita punctata .

chondrodystrophia fetalis calcificans **الحَثَلُ الغُضْروفيُّ الكُلاسيُّ الجَنَينيّ**

انظر chondrodystrophia congenita punctata .

chondrodystrophy **الحَثَلُ الغَضْروفِيّ**

حالة مرضية تتميز بنمو شاذ في الغضروف .

chondrodystrophy malacia **الحَثَلُ الغُضْروفيُّ التَّلَيُّنيّ**

أحد أنماط خلل التنسج الغضروفي تتميز بتلين الغضروف المشاشي .

familial chondrodystrophy **الحَثَلُ الغُضْروفيُّ العَائليّ**

الاضطرابات الغضروفية التي توجد في عائلات معينة دون التمكن من إثبات عنصر جيني وراثي

hereditary deforming chondrodystrophy **الحَثَلُ الغُضْروفيُّ الوراثيُّ المُشَوِّه**

ويسمى أيضاً (Osteochondrodystrophia deformans) ، (Osteochondrodystrophy) ، وتستعمل هذه المصطلحات لتصف اضطرابات غضروفية وعظمية معاً وهي تنتقل

مُكَوِّنٌ للغُضْروف **chondrogenic**

إنشاء أو تكوين الغضروف .

العَضَلَة اللاميَّة اللسانِيَّة **chondroglossus TA**

انظر تحت muculus .

كوندرُوجلوكوز **chondroglucose**

السكر الغضروفي المتخمر الذي ينتج من غلي الغضروف فترة طويلة للحصول على الكوندرين .

توصيفُ الغَضاريف **chondrography**

شِبْهُ غُضْرُوْفِيّ **chondroid**

1 ـ يشبه الغضروف .

2 ـ انظر تحت hyaline cartilage .

1 ـ شِبْهُ غُضْرُوْفِيّ **chondroitic**

2 ـ غُضْروفِيٌّ

يعود إلى أو مشتق من أو يشبه الغضروف .

كُنْدرُويتِين (مادة من مكونات الغضروف) **chondroitin**

جليكوز أمينو جليكان ، يسود في المواد الأساسية للغضروف والعظم والأوعية الدموية وأيضاً في الأنسجة الضامة ، يتألف من وحدات متكررة من وحدات من ثنائي السكاريد برابط معين ، وكل وحدة تتكون من ثمالة من حمض الجلوكورونيك المتحد مع ثمالة أسيتيل جلاكتوزامين ـ N سلفات ومنها نوعان أو شكلان كندرويتين 4- سلفات (كندرويتين سلفات A) وكندرويتين 6- سلفات (كندرويتين سلفات C) ، والمحددة تبعاً لموقع مجموعة السلفات على السكر . واحد أو كلاً النوعان يتجمعان بشكل شاذ في حالات من حالات عديد السكاريد المخاطي سلفات الكوندرويتين B ويسمى حالياً ديرماتان سلفات

بِيلَة كُنْدرُويتِينِيَّة **chondroitinuria**

وجود حامض الكندرويتيك في البول .

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ غُضْروفِيّ **chondrolipoma**

ورم متوسطي حميد يحوي عناصر شحمية وغضروفية .

ساركومة شَحْمِيَّةٌ غُضْروفِيَّة **chondrolip-osarcoma**

وراثياً وتكون مشوهة للعظام ، وأهمها متلازمة موركيو (Morquio syndrome) .

الحَثَلُ الغُضْروفيُّ المُفْرِطُ التَّنَسُّجَ **hyperplastic chondrodystrophy**

حثَل غضروفي مفرط التنسج مع نمو زائد في المشاش .

الحَثَلُ الغُضْروفيُّ النَّاقِصُ التَّنَسُّج **hypoplastic chondrodystrophy**

هو حَثل غضروفي ناقص التنسج ، وفيه تكون العظام أسفنجية والمشاش نامي بغير انتظام .

الحَثَلُ الغُضْروفيُّ الجَنِينيُّ النَّاقِصُ التَّنَسُّج **hypoplastic fetal chondrodystrophy**

حثَل غضروفي ناقص التنسج : تكون العظام فيه أسفنجية والمشاش نامي بغير انتظام .

انظر تحت chondrodysplasia punctata .

متعلق بالغُضْروف وبالأديم الظَّاهِر **chondroect-odermal**

صفة تطلق على كل ما ينسب إلى الغضروف والطبقة الأديمية الجنينية .

وَرَمٌ بطانِيٌّ غُضْروفِيّ **chondroendothelioma**

ورم متوسطي حميد يحتوي عناصر الورم الغضروفي والورم البطاني .

غُضْروفِيٌّ مُشاشِيّ **chondroepiphyseal**

يعود إلى مشاش الغضروف .

التِهابُ المُشاشِ والغُضْروف **chondroepiphysitis**

التهاب يتضمن مشاش الغضروف .

وَرَمٌ لِيفِيٌّ غُضْروفِيّ **chondrofibroma**

ورم حميد مع عناصر ليفية وغضروفية زائدة .

ساركومة لِيفِيَّة غُضْروفِيَّة **chondrofibrosarcoma**

ورم خبيث مشتق من ألياف النسيج الضام أي ساركومة ليفية لكن يوجد معها بؤر من النسيج الغضروفي والمخاطي .

مُوَلِّدُ الكُونْدْرين **chondrogen**

انظر تحت chondrigen .

تَكَوُّنُ الغُضْروف **chondrogenesis**

عملية تشكل وتخلق الغضروف ، ويطلق على العملية أحياناً (Chondrosis) .

الغضروف الكردوسي .

تَلَيُّنُ غُضْروف الرَّضَفَة **chondromalacia patellae**

ألم ، وفرقعة فوق المنظر الأمامي للركبة ، خاصة في الثني مع تلين في السطح على السطح في الرضفة وانصباب في مرحلة متأخرة .

تَلَيُّنٌ غُضْروفيٌّ مَجْموعيّ **systemic chondromalacia**

وُرامٌ غُضْروفِيّ **chondromatosis**

تكون ورم غضروفي متعدد .

وُرامٌ غُضْروفيٌّ زَليليّ **synovial chondromatosis**

تكوّن عقيدات داخل الزليلي متعددة ، والتي تشبه الورم العظمي الغضروفي ، ينتج من تغيرات تكاثرية في التبطين الزليلية في المفاصل ، ومع تقدم الاضطراب تنتقل العقيدات بسرعة متزايدة من مناطق داخل الزليلية إلى تجاويف المفصل .

متعلق بالورم الغضروفي **chondromatous**

يعود إلى أو من طبيعة الغضروف .

قُسَيمٌ غُضْروفِيّ (جنين) **chondromere**

فقرة غضروفية في العمود الفقري الجنيني .

حُؤولٌ غُضْروفِيّ **chondrometaplasia**

حالة تتميز بنشاط حؤولي (استحالي) في الأرومة الغضروفية .

حُؤولٌ غُضْروفيٌّ زَليليّ **synovial chondrometaplasia**

انظرَ تحت synovial chondromatosis .

حُؤولٌ غُضْروفيٌّ زَليليٌّ وَتَريّ **tenosynovial chondrometaplasia**

ورَام غضروفي زليلي يؤثر في غمد الوتر .

نُظَيرَةُ النَّواة **chondromitome (=paranucleus)**

انظر تحت paranucleus .

كُونْدْرُومُوسين (مادة خَلَويَّة) **chondromucin**

انظر تحت chondromucoprotien .

مُخاطانِيٌّ غُضْروفِيّ **chondromucoid**

ورم خبيث غضروفي ويحتوي على خلايا شحمية أيضاً . وأكثر ما يحدث في عظام الحوض وقرب نهايات العظام الطويلة .

عِلمُ الغَضاريف **chondrology**

مجموع المعلومات فيما يتعلق بشأن الغضاريف .

تَحلُّلُ الغُضْروف **chondrolysis**

تدرك الخلايا الغضروفية ، والذي يحدث في عملية التعظم داخل الغضروف .

وَرَمٌ غُضْروفِيّ **chondroma**

ورم حميد أو نمو شبه ورمي في الغضروف الزجاجي الناضج ، وقد يحدث مركزياً داخل مادة الغضروف أو العظم (ورم غضروفي باطن) أو قد ينمو على سطح الغضروف أو العظم (ورم غضروفي مجاور للقشرة) ، ويحدث عادة في المراهقين أو البالغين في العظام الصغيرة في اليدين أو القدمين أو عظم الفخذ أو العضد أو الأضلاع .

وَرَمٌ غُضْروفيٌّ ساركومي (= ساركومةٌ- غُضْروفيَّة) **chondroma sarcomatosum (=chondro sarcoma)**

وَرَمٌ غُضْروفيٌّ مَفْصليّ **joint chondroma**

كتلة غضروَف في الَغشاء الزليلي في المفصل .

انظر تحت synovial chondromatosis .

وَرَمٌ غُضْروفيٌّ زَليليّ **synovial chondroma**

جسم غضروفي يتكون في الغشاء الزليلي .

انظر تحت chondromatosis .

وَرَمٌ غُضْروفيٌّ حَقيقيّ **true chondroma**

انظر تحت enchondroma .

تَليُّنُ الغُضْروف **chondromalacia**

تلين في الغضروف المتمفصل ، غالباً في الرضفة .

التَّلَيُّنُ الغُضْروفِيُّ الجَنينيّ **chondromalacia fetalis**

حالةَ تكون فيها أطراف المليص (وليد ميت) تكون طرية وقابلة للطي بسبب طراوة

اعْتِلالٌ غُضْروفِيّ **chondropathia**
انظر تحت chondropathy .

اعْتلالٌ غُضْروفِيٌّ عُجَرِي **chondropathia tuberosa (=Tietze's syndrome)**
انظر تحت Tietze's syndrome .

باثالوجيا الغُضْروف **chondropathology**
باثولوجيا أمراض الغضاريف .

اعْتِلالٌ غُضْروفِيّ **chondropathy**
أي داء في الغضروف .

غُضْروفِيٌّ بُلْعومِيّ **chondropharyngeal**
صفة تشير إلى كل ماله علاقة بالغضروف والبلعوم .

نابِتَة غُضْروفِيَّة **chondrophyte**
نمو غضروفي عند الطرف المتمفصل في العظم .

تكْوينُ الغُضْروف **chondroplasia**
تكون الغضروف من خلايا متخصصة (خلية غضروفية) (Chondrocytes) .

تكَوُّنٌ مُنَقَّطٌ للغُضْروف (=خَلَلُ التَّنَسُّج المُشاشِيُّ المُنَقَّط) **chondroplasia punctata (=dysplasia epiphysealis punctata)**
تكوينَ غضروفي متنقط .
انظر تحت chondrodysplasia punctata .

بانِيَة الغُضْروف **chondroplast**
بانية الغضروف .
انظر تحت chondroblast .

متعلق ببانِيَة الغُضْروف **chondroplastic**
تعود إلى عمليات تقويمية في الغضروف .

رأبُ الغُضْروف **chondroplasty**
جراحة تقويمية في الغضروف ، وإصلاح الغضروف المتهتك أو المنزاح .

تخلْخُلُ الغُضْروف **chondroporosis**
تكوين أحياز أو جيوب في الغضروف ، تحدث عادة أثناء التعظم .

بروتِينٌ غُضْروفِيّ **chondroproteid**
يسمى أيضاً (Chondromucoid) ، بروتين غضروفي مخاطي .
انظر تحت chondromucoprotien .

بروتِينٌ مُخاطِيٌّ غُضْروفِيّ **chondromucoprotein**
المكون الأساسي للمادة الأساسية للغضروف ، وهو بلمر مشترك من البروتين المخاطي وسلفات الكوندروتين .

وَرَمٌ عضَلِيٌّ غُضْروفِيّ **chondromyoma**
ورم متوسطي حميد يحوي عناصر الورم العضلي والورم الغضروفي .

وَرَمٌ لِيفِيٌّ غُضْروفِيٌّ مُخاطِيّ **chondromyxofibroma**
يسمى أيضاً (Chondromyxoid fibroma) ، وهو ورم حميد يصيب الغضاريف والنسيج الضام ، ويتواجد على شكل كتل بيضاء رمادية في الركبة أو العظام الصغيرة للقدم ، وقد يلتبس مع الساركومة الغضروفية .

وَرَمٌ مُخاطِيٌّ غُضْروفِيّ **chondromyxoma**
انظر تحت chondromyxoid fibroma .

ساركومة مُخاطِيَّة غُضْروفِيَّة **chondromyxosarcoma**
ورم متوسطي خبيث يحوي عناصر مخاطية وغضروفية .

نخْرٌ غُضْروفِيّ **chondronecrosis**

غُضْروفِيٌّ عظْمِيّ **chondro-osseous**
يتكون من غضروف وعظم .

الحَثَلُ الغُضْرُوفِيّ العَظْمِيّ **chondro-osteodystrophy**
يسمى أيضاً (Osteochondrodystrophia deformans) ، (Osteochondrodystrophy) ، وهو مصطلح استعمل للدلالة على مجموعة من الاضطرابات العظمية الغضروفية أهمها متلازمة موركيو .

ساركومة عَظْمِيَّة غُضْروفِيَّة **chondro-osteosarcoma**
ورم خبيث ينشأ على حساب الخلايا الغضروفية والعظمية ، ويصيب أيضاً عظام الكلاب أكثر من غيرها .

(Chondromucin) ، (Chondroprotein) ، وهو مصطلح قديم وضع للتعبير عن مكون الغضروف البروتيني ومن المحتمل أنه يعرف الآن بسلفات الكوندرويتين مع مركبات أخرى .

chondroprotein — **بروتينٌ غُضْرُوفيّ**

انظر تحت chondroproteid .

chondrosamine — **كوندروزامين**

(=galactosamine) — **(= جلاكتوزامين)**

انظر تحت galactosamine .

chondrosarcoma — **ساركومة غُضْرُوفيَّة**

ورم خبيث مشتق من خلايا غضروفية أوسليفتها ، لكن ينقصه تكوين عظماني مباشر ، تحدث في الغالب في الحوض وعظم الفخذ والحزام الكتفي لدى متوسطي العمر إلى البالغين الأكبر سناً ، وقد تكون أولية ، وتكون ناشئة من خلايا غضروفية ، أو تكون ثانوية ومن ثم ترجع إلى آفة حميدة سابقة .

central chondrosarcoma — **ساركومةٌ غُضْروفيَّةٌ مَرْكَزِيَّة**

ساركومة تتطور في داخل العظم ، تتظاهر عادة مع ألم كليل (غير حاد) ، ولكن نادراً ما تكون على شكل كتلة .

mesenchymal chondrosarcoma — **ساركومةٌ غُضْروفيَّةٌ مُتَوَسِّطيَّة**

ساركومة نادرة ، عدوانية ، وهي تنشؤ خبيث يتكون من سدى خلايا صغيرة تحتوي على جزر من عناصر غضروفية ، وتحدث بشكل أولي في العظام المسطحة ، ولكنها تنشأ في الأنسجة الرخوة ، وتظهر خاصة في البالغين وصغار المراهقين .

chondrosarcomatosis — **وُرامٌ ساركوميٌّ غُضْروفِيّ**

تكوين ساركومات غضروفية متعددة .

chondrosarcomatous — **متعلق بالساركومة غُضْروفيَّة**

تعود إلى ، أو من طبيعة ساركومة غضروفية .

chondroseptum — **الوَتيرَةُ الغُضْروفيَّة (في الأنف)**

انظر تحت pars cartilaginea septi nasi .

chondrosin — **كوندرُوزين (سُكَّرٌ ثنائيّ)**

الوحدة الأساسية لثنائي السكاريد في سلفات الكوندروتين ، والتي تتألف من جزيئين هما حمض الجلوكورونيك و N- أسيتيل جالاكتوزامينامين السلفاتي في رابطة خاصة .

chondrosis — **تشكُّل الغُضْرُوف**

تكوين الأنسجة الغضروفية .

chondroskeleton — **هَيكلٌ غُضْرُوفِيّ**

1 ـ الهيكل الغضروفي كما في بعض الأسماك .

2 ـ ذلك الجزء في الهيكل ، والمكون للغضروف .

chondrosome — **مُتَقدِرَة**

(=chondriosome)

chondrosteoma — **وَرَمٌ عَظْميٌّ غُضْروفيّ**

انظر تحت osteochondroma

chondrosternal — **غُضْروفِيٌّ قصيّ**

تعود إلى الغضاريف الضلعية وعظم القص .

chondrosternoplasty — **رَأبٌ غُضْروفِيٌّ قصيّ**

تصحيح جراحي للصدر قمعي الشكل .

chondrotome — **مِبْضَعُ الغُضْروف**

أداة لقطع الغضروف .

chondrotomy — **بَضْعُ الغُضْروف**

التشريح أو التقسيم الجراحي للغضروف .

chondrotrophic — **مُنَمٍ للغُضْروف**

(مُنْمِي للغُضْروف)

يملك تأثير في تكوين أو نمو الغضروف .

chondroxiphoid — **غُضْروفِيٌّ رَهابِيّ**

انظر تحت xiphisternal .

chondrus — **أشْنَةُ إيسلَنْدا**

جنس من الطحلب الأحمر ، والذي يستخرج منه مادة كربوهيدراتية تستخدم كعامل استحلابي في المنتجات الغذائية .

chonechondrosternon — **صَدْرٌ قِمْعِيّ**

(=funnel chest)

انظر تحت pectus excavatum .

chorangioma — **وَرَمٌ وعائيٌّ مَشيمائِيّ**

(=chorioangioma)

الحبالُ الوَتَريَّةُ القَلْبيَّة **chorda tendineae cordis TA**

الحبال الوترية والتي تربط كل شرفة من الصمامان الأذيني البطيني إلى العضلات الحليمية المناسبة في بطينات القلب . تمتلك هذه الحبال أطوال وثخانة متفاوتة وعادة هي تتفرع بشكل متواتر .

حَبْلُ الطَّبْل **chorda tympani TA**

عصب ينشأ من العصب الوجهي (العصب المتوسط) ، ويتوزع إلى تحت الفك الأسفل ، والغدد تحت اللسان ، والغدد اللسانية ، والثلثين الأماميين في اللسان ، هي وحدة حسية للاودي والحسي النوعي .

الحَبْلُ السُّرِّيّ **chorda umbilicalis**


(= السَّرَر)

انظر تحت umbilical cord .

الحَبْلُ الصَّوتيّ **chorda vocalis**

(= الرِّباطُ الصَّوتيّ) **(=ligamentum vocale)**

انظر تحت plica vocalis .



ساركومة غُضْروفِيَّة **Chondrosarcoma**

انظر تحت chorioangioma .

حَبْل **chord**

انظر تحت cord .

حَبْلُ اللُّقْمَة **condyle chord**

(= محْوَرٌ لُقْميّ) **(=condylar axis)**

انظر تحت condylar axis .

سابقة بمعنى الحَبْل **chord-**

طليعة مصطلح تشير إلى معنى الحَبْل .

حَبْل **chorda TA**

(ج: حِبال) **(pl.chordae)**

أي حبل أو وتر .

الحَبْلُ الظَّهْري **chorda dorsalis**

(=notochord)

انظر تحت notochord .

حَبْلُ رَسَن الخُصْيَة **chorda gubernaculum**

جزء من رسن الخصية ، أو الرباط الدائري للرحم ، والذي يتطور في العرف الأربي وجدار الجسم المجاور .

العُرْقوب **chorda magna**

(=tendo calcaneus)

انظر تحت tendo calcaneus .

الحَبْلُ الغشائيُّ المائلُ بَيْنَ عَظْمَي السَّاعد **chorda obliqua membranae interosseae antebrachii TA**

شريط رباطي صغير يمتد من الوجه الوحشي لأحدوبة الزند إلى الكعبرة مباشرة قاصياً لأحدوبتها ، ويسمى أيضاً الحبل المائل للمفصل الكعبري (Oblique cord of elbow joint) .

الحَبْلُ المَنَويّ **chorda spermatica**

انظر تحت funiculus spermaticus .

الحَبْلُ النُّخاعيّ **chorda spinalis**

النخاع العَصبي الموجود في القناة الفقرية ، والذي ويشتمل على الخلايا العصبية السنجابية النخاعية الحركية في القرنين الأماميين من مادته السنجابية ، وسبل الألياف العصبية الهرمية والحسية النازلة والصاعدة إلى الدماغ .

التهاب حنجري حاد ، والذي يتميز بترسب الفبريس ، وتكون تآكلات على الحبال الصوتية .

chorditis nodosa **اَلْتهابُ الحبالِ الصَّوتيَّةِ العَقَدِ**

(=chorditis tuberosa) (= اَلْتهابُ الحبالِ الصَّوتيَّةِ الحُدَيبي)

تكونَ عَقيدات بيضاء صغيرة (عقد الوتر الصوتي) على واحد أو كلا الحبلين الصوتيين في الأشخاص الذي يستعملون أصواتهم بشكل مفرط .

انظر تحت chorditis tuberosa .

chorditis tuberosa **اَلْتهابُ الحبالِ اَلصَّوتيَّةِ اَلحُدَيبيُّ**

تكون عَقيدات بيضاء صغيرة (عقد الوتر الصوتي) على واحد أو كلا الحبلين الصوتيين في الأشخاص الذي يستعملون أصواتهم بشكل مفراط .

chorditis vocalis **اَلْتهابُ الحبالِ الصَّوتيَّة**

chorditis vocalis inferior **اَلْتهابُ الحبالِ اَلصَّوتيَّةِ اَلسُّفْليَّة**

التهابَ مَزمن لَلحنجرة تحت المزمار .

chordo- **سابقة بمعنى الحَبْل**

يرمز إلى العلاقة مع الحبل .

chordoblastoma **وَرَمٌ أرُوَمِيٌّ حَبْلِيٌّ**

(=chordoma) **(= وَرَمٌ حَبْلِيّ)**

انظر تحت chordoma .

chordocarcinoma **سَرَطانة حَبْلِيَّة**

(=chordoma) **(= وَرَمٌ حَبْلِيّ)**

انظر تحت chordoma .

chordoepithelioma **وَرَمٌ ظِهاريٌّ حَبْلِيّ**

(=chordoma) **(= وَرَمٌ حَبْلِيّ)**

انظر تحت chordoma .

chordoid **شَبيهُ الحَبْل**

يشبه الحبل الظهري .

chordoma **وَرَمٌ حَبْلِيّ**

ورم خبيث ينشأ من البقايا الجينية في الحبل الظهري ، ويكون عادة بطول المنطقة السرجية أو

chordae TA **حِبال**

(sing:chorda) **(ف: حَبْل)**

جمع حبل .

انظر تحت chorda .

chordae Willisii **حبالُ ويليس**

تَرابيقُ تمتد عرضياً في الجافية عبر الزاوية السفلية للجيب الناصف العلوي .

chordal **حَبْلِيّ**

يعود إلى أية حبال (تستعمل في الغالب للحبل الظهري)

chorda-mesoderm **حَبْلِيٌّ-أديميٌّ مُتوسط**

نسيج في الشفة الظهرانية للبوغ البرعمي ، والتي تعطي الحبل الظهري والأديم المتوسط .

Chordata **الحَبْلِيَّات (شعبة من الحيوانات)**

شعبة في المملكة الحيوانية تضم كل الحيوانات التي تملك حبل ظهري خلال مرحلة ما في نموها وهي تشمل الشعبة الفرعية حبليات الرأس ، وحبليات الذيل ، والفقاريات .

chordate **حَبْلِيّ**

1 ـ حيوان يندرج تحت شعبة الحبليات .

2 ـ ذوات الحبل الظهري .

chordectomy **اسْتِئصالُ الحَبْلِ الصَّوتِي**

انظر تحت cordectomy .

chordee **انْحِناءُ القَضيب**

(=gryposis penis)

اعوجاج للأسفل للقضيب نتيجة شذوذ خلقي (إحليل تحتاني) ، أو عدوى إحليلية (سيلان) ، يسمى أيضاً تقوس القضيب (Gryposis penis) .

chorditis **1 ـ اَلْتِهابُ الحَبْلِ الصَّوْتِي**

2 ـ اَلْتِهابُ الحَبْلِ المَنَوي

chorditis cantorum **اَلْتهابُ الحبالِ الصَّوتيَّةِ عَنْدَ المُغَنِّين**

اَلتهاب الحبال الصوتية بسبب رضح ، ومثله التهاب الحبال الصوتية عند المعلمين والخطباء .

chorditis fibrinosa **اَلْتهابُ الحبالِ اَلصَّوتيَّةِ اَلفيبْريني**

إرادية .

رَقْصُ الأَطْفال الكَهْرَبيّ **children electric chorea**

انظر تحت Bergeron's chorea .

رَقْصٌ قَلْبيّ **chorea cordis**

رقص مع عدم انتظار واضح للفعل القلبي (عمل القلب) .

رَقْصٌ شِقِّيّ **chorea dimidiata (=hemichorea)**

انظر تحت hemichorea .

رَقْصٌ مُسَرَّع **chorea festinans**

هو الشلل الرعاش (Paralysis agitans) ، أو داء باركنسون .

رَقْصٌ حَمْليّ **chorea gravidarum**

يسمى أيَضاً رقص سيدنهام (Sydenham's chorea) ، يحدث في الشهور الأولى للحمل ، مع أو بدون سابق تاريخ لمرض روماتزمي ، وقد تتكرر في مرات الحمل اللاحقة .

رَقْصٌ وَخيم **chorea gravis**

تسمى أيضاً (Hemiballism) ، (Hemibal-lismus) ، (Paroxysmal choreo-athetosis) ، وتتمثل بحركات شديدة تصيب الكتابة وتحدث بسبب آفة في الوطاء في الجهة المقابلة للشق الذي تظهر فيه الحركات .

رَقْصٌ جُنونيّ **chorea insaniens**

هي حالات داء الرقص التي ترافق الأمراض العقلية ، ولا تعرف العلاقة السببية بينهما ، لكن التأثير الشديد لداء الرقص على الحالات الهلوسية والتفاقم الشديد في الحالة أصبح معروفاً .

رَقْصٌ وَهْنيّ **chorea mollis**

يسمى أيَضاً (Limp chorea) ، وهو شكل نادر من داء رقص سيدنهام (Sydenham's chorea) .

رَقْصٌ لَيْليّ **chorea nocturna**

رقص تَستمر فيها الحركات أثناء النوم .

رَقْصٌ انْحنائيّ **chorea nutans**

رقصةإيمَائيَة ، وهو نوبات إيماء أو حركات أثناء

العجزية العصعصية ، يسمى أيضاً ورم الحبل (Chondoepithelioma) .

تثبيتُ الحَبَل **chordopexy (=cordopexy)**

انظر تحت cordopexy .

ساركومة حَبَلِيَّة (= وَرَمٌ حَبَلِيّ) **chordosarcoma (=chordoma)**

انظر تحت Chordoma .

الهَيكلُ الحَبَلِيُّ **chordoskeleton**

ذلك الجزء في الهيكل العظمي الذي يتكون حول الحبل الظهري .

بَضْعُ الحَبَل **chordotomy**

انظر تحت hordotomy .

انحِناءُ القَضيب **chordurethritis (=chordee)**

انظر تحت chordee .

رَقَص **chorea**

حدوث لا ينتهي لأنواع متفاوتة من الحركة السريعة والمعقدة والمختلة ، والتي تبدو متناسقة تماماً ، ولكنها تتم بشكل لا إرادي .

رَقْصٌ حادّ **acute chorea**

انظر تحت Sydenham's chorea .

رَقْصٌ وَنائيّ **atonic chorea**

يسمى أيَضاً رقص شللي (Paralytic chorea) ، ويوجد فيه ضعف أو شلل في عضو أو أكثر من الجسم مع ظهور حركات نفضية في العضو المصاب .

رَقْصٌ تِلْقائيّ **automatic chorea**

حركات عَضلية شاذة لا يمكن السيطرة عليها .

رَقْصُ بيرجيرون **Bergeron's chorea**

تسمى أيضاً رقص الأطفال الكهربائي (Chil-dren electric chorea) ، (Dubini's disease) ، (Begbie's syndrome) ، (Bergeron's dis-ease) ، (Guertin's disease) ، (Guertin's syn-drome) ، (Henoch's disease) ، (Henoch-Bergeron syndrome) ، وهو مرض وراثي يظهر عند الأطفال على شكل حركات عضلية لا

رَقْصُ هينوخ **Henoch's chorea**
يسمى أيضاً رَقْصٌ كَهْرَبِيٌّ مُتَرَقٍّ مُزْمِن (Chronic progressive electric chorea) ، والعــــرات التشنجية (Spasmodic tic) ، والتي تظهر بشكل تشنجات فجائية في مجموعات عضلية .

رَقْصٌ وراثيّ **hereditary chorea**
انظر تحت Huntington's chorea .

رَقْصُ هَنْتِنْجتُون **Huntington's chorea**
(رَقْصٌ وراثيٌّ تَنَكُّسيٌّ
لإصابة القَشَرة المخية والجسم المخطط)
مرض كروموسومي جسدي سائد ، يتميز برقص متقدم مزمن ، وتخلف عقلي ينتهي بالخبل ، بداية المرض تتباين عادة في العقد الرابع من العمر ، والوفاة تحدث خلال 15 سنة .

رَقْصُ التَّسَمُّم بالهيُوسين **hyoscine chorea**
حركات شبه رقصيَة تحدث فيها الأعراض بسبب التسمم الحاد بالهيوسين .

رَقْصٌ هستيري **hysterical chorea**
اضطراب تحولي تكون فيه الأعراض حركات متراقصة الشكل .

رَقْصُ المُحاكاة **imitative chorea**
تسمى أيضاً (Mimetic chorea) ، (Chorea mimetica) ، وتتظاهر تقليداً لحركات مشابهة تظهر عند شخص آخر.

رَقْصٌ عَدْوائيّ **infective chorea**
الحركات الرقصية التي تتلو مرضاً جرثومياً عدوائياً كالتهابات اللوزتات بالعقديات المخضرة .

رَقْصٌ قَفْزيّ **jumping chorea**
يسمى أيضاً الهوس الرقصي (Choreomania) ، ويظهر على شكل حركات رقصية وقفزية ودورانية ، كما يسمى بالرقص الجنوني (Chorea insaniens) .

رَقْصٌ يَفَعيّ **juvenile chorea**
انظر تحت sydenham's chorea .

رَقْصٌ حَنْجَريّ **laryngeal chorea**
عرات تشنجية عضلية تسبب ظهور الكلام النوم .

رَقْصٌ مُزْمِن **chronic chorea**
انظر تحت Huntington's chorea .

رَقْصٌ مُتَرَقٍّ **chronic progressive**
مُزْمِن وراثيّ **hereditary chorea**
انظر تحت Huntington's chorea .

رَقْصٌ مُتَرَقٍّ **chronic progressive**
مُزْمِن غَيرُ وراثيّ **non-hereditary chorea**
انظر تحت senile chorea .

رَقْصٌ قَفْزيّ **dancing chorea**
(=saltatory chorea)

رَقْصٌ تَنَكُّسيّ **degenerative chorea**
انظر تحت Huntington's chorea .

رَقْصٌ حِجابيّ **diaphragmatic chorea**
يسمى أيضاً رقص شروتر (Schrotter's chorea) ، وهو داء الرقص أو التشنجات العضلية التي تصيب الحجاب الحاجز بين الصدر والبطن .

رَقْصٌ دوبينيّ **Dubini's chorea**
(رَقْصٌ كَهربي حاد مميت
تلو مرض عصبي مركزي)
نوع حاد قاتل بسبب الالتهاب الحاد للجهاز العصبي المركزي .

رَقْصٌ كَهْرَبيّ **electric chorea**
انظر تحت Dubini's chorea .

رَقْصٌ وَبائيّ **epidemic chorea**
يسمى أيضاً الرجفان الهستيري (Hysterical tremor) ، وهوس الرقص (Choreomania) ، والرقص الجنوني (Chorea insaniens) .

رَقْصٌ لُيَيفيّ **fibrillary chorea**
(= نَظيرُ الرَّمَع العَضَلي) **(=paramyoclonus)**
انظر تحت paramyoclonus .

رَقْصٌ مُعْتاد **habit chorea**
(= عُرَّة) **(=tic)**
انظر تحت tic .

رَقْصٌ شِقِّيّ **hemilateral chorea**
انظر تحتَ hemichorea .

حـركـات منتظمـة في العـضـلات تحـدث في حالات الأمراض الهستيرية التحويلية .

رَقَص ٌ دَوَّار **rotary chorea**

حـركـات دورانيـة رقـصـيـة تحدث في سيـاق الرقص الجنوني أو الهستيري .

رَقَص ٌ قَفْزِيّ **saltatory chorea**

أي رقصَ مثل رقص سيدنهـام ، والتي تتضمـن قفزاً لا إرادي أو حركات نافضة لا إرادية .

انظر تحت saltatory spasm .

رَقَص ُ شروتر **Schrotter's chorea**

انظر تحت diaphragmatic chorea .

رَقَص ٌ شَيَخوخِيّ **senile chorea**

اضطراب حمَيد عادة يكون خفيف يحدث في الشيـوخ ، يتـميـز بحـركـات راقـصـة ، والتي لا ترتبط بالاضطراب العقلي .

رَقَص ٌ بَسيط **simple chorea**

انظر تحت sydenham's chorea .

رَقَص ُ سَيدنْهام **Sydenham's chorea**

(يصيب اَلأطفال والمراهقين)

اضطراب حـاد ، عادة مـا يكون مـحدد ذاتيـاً ، يحدث في الحياة الباكـرة ما بين عمر 5-15 سنة أو أثناء الحـمل ، يرتبط على نحـو وثيق مع الحمى الروماتزمية . ويتميز بحركات لا إرادية تـتـدرج إلى وخـيـمـة ، تؤثر على كل الأنشطة الحـركـيـة بما فـيـهـا المشي وحـركـات الذراع والكلام ، عادة مـا يصـاحـبـهـا اضطراب نفسي بسيط ، وقد يتحـدد الاعتلال في جانب واحد في الجـسـم (رقص نصـفي) ، أو على شكل صـمل عـضلي (رقص شللي) ، يسـمى أيضـاً (St.Vitu's dance) .

رَقصِيّ **choreal**

يعود إلى أو من طبيعة يتميز بالرقص .

رَقصِيّ **choreatic**

صفة منسوبة لكل ما يتعلق بداء الرقص .

رَقصِيّ **choreic**

يعود إلى أو من طبيعة يتميز بالرقص .

رَقصِيُّ الشَّكل **choreiform**

بشكل انفجاري مفاجئ .

رَقَص ٌ وَهَنِيّ **limp chorea**

انظر تحت chorea mollis .

رَقَص ٌ مَوضعِيّ **local chorea**

الحركات اَلنَفضية العضلية غير المعممة بل المحددة بمجموعة عضلية معينة .

رَقَص ٌ مطْرَقِي **malleatory chorea**

نوع منَ الرَقص العقلي الهذياني .

رَقَص ٌ هَوَسِي **maniacal chorea**

رَقَص ٌ نظامِيَ **methodic chorea**

رقصَ منهَجي ، وهو نوع تحدث فيه الحركات عند فواصل منتظمة .

رَقَص ُ المُحاكاة **mimetic chorea**

رقص يحدث بالمحاكاة .

رَقَص ٌ شِقِّيّ **one-sided chorea** **(=hemichorea)**

رقص وحيد الجانب .

انظر تحت hemichorea .

رَقَص ٌ شَلَلِيّ **paralytic chorea**

رقص تحلَ فيه عدم الحـركـة (التوقف) محل الحركة .

انظر تحت Huntington's chorea .

رَقَص ٌ تال للفالج **posthemiplegic chorea**

نوع يؤثرٌ علىَ العضلات المشلولة جزئياً بعد الفالج .

انظر تحت athetosis .

رَقَص ٌ سابق ٌللفالج **prehemiplegic chorea**

حـركـاتَ نفضيةَ في المنطقة التي يحدث فيـهـا الفالج لاحقاً .

رَقَص ٌ روماتزمِيّ **rheumatic chorea**

هي رقص سـيـدنهـام (Sydenham's chorea) والـذي يسـمـى أيضـاً (juvenile chorea) ، (Chorea minor) ، (Sydenham's disease) ، وهي حـركات عضلية وجهية ورقبية وطرفية رقصية مفاجئة تحدث لدى اليافعين والشباب في حالات الإصابة بالروماتزم .

رَقَص ٌ نَظْمِيّ **rhythmic chorea**

التِهابُ المَشيماءِ و السَّلَى **chorioamnionitis**

التهاب المشيمشاء والسلّى .

وَرَمٌ لِيفِيٌّ وعائِيٌّ مَشيمائِيّ **chorioangiofibroma**

ورم وعائي ليفي في المشيماء .

وَرَمٌ وعائِيٌّ مَشيمائِيّ **chorioangioma**

وَرَمٌ أرومِيٌّ مَشيمائِيّ **chorioblastoma**

وُرامٌ أرومِيٌّ مَشيمائِيّ **chorioblastosis**

نسيجي زائد في المشيماء .

المَشيماءُ الشُّعَيرِيَّة **choriocapillaris**

انظر تحت lamina choroidocapillaris .

سَرَطانَةٌ مَشيمائِيَّة **choriocarcinoma**

خباثة ظهارية في خلايا الأورمية الغاذية ، والتي تتكون من تكاثر شاذ للخلايا المكعبة المخلوية للظهارة المشيمية ، وبدون إنتاج الزغابات المشيمائية . تنشأ كل الحالات في الرحم ، وتتطور من رحى عدراية ، أو خلال الحمل العادي . تحدث البقية في حالات الحمل النابذ والورم المسخي التناسلي (مبيضي وخصوي) وخارج الأعضاء التناسلية .

قِيلَةٌ مَشيمائِيَّة **choriocele**

بروز العين عبر فتحة في المشيماء .

وَرَمٌ ظِهارِيٌّ مَشيمائِيّ **chorioepithelioma**

انظر تحت choriocarinoma .

وَرَمٌ ظِهارِيٌّ مَشيمائِيٌّ خَبيث **chorioepithelioma malignum**

انظر تحت choriocarcinoma .

تَكَوُّنُ المَشيماء **choriogenesis**

تطور المشيماء .

المَشيمِيَّة **chorioid**

(في العين وفي البطينات الدماغية)

انظر تحت choroid .

المَشيمِيَّة **chorioidea**

انظر تحت choroid .

chorioido-

1ـ سابقة بمعنى المَشْيَمِيَّة

(والنسبة إليها مشيموي: للعين والبطينات الدماغية: chorioid)

2ـ سابقة بمعنى المَشيماء

يشبه الرقص .

كَنَعِيٌّ رَقصِيّ **choreoathetoid**

يعود أو يتميز بالكنع الرقصي .

كَنَعٌ رَقصِيّ **choreoathetosis**

حالة تتميز بحركات راقصة وكتفية .

كَنَعٌ رَقَصِيٌّ انْتِيابِيّ **paroxysmal choreoathetosis**

انظر تحت Mount-Reback syndrome .

رَقصِيُّ الشَّكل **choreoid**

هُوَسٌ رَقصِيّ **choreomania**

الحركات الرقصية العنيفة الذي تظهر في سياق المرض الهوسي الحاد .

تَلَفُّظٌ رَقصِيّ **choreophrasia**

مَشيمائِيّ (متعلق بمَشيماءِ الجَنين) **chorial**

chorio-

1ـ سابقة بمعنى المَشْيَمِيَّة

(والنسبة إليها مشيموي: للعين والبطينات الدماغية: chorioid)

2ـ سابقة بمعنى المَشيماء

(والنسبة إليها مشيمائي: للطبقة الخارجية من الأغشية الجنينية الباكرة: chorion)

وَرَمٌ غُدِيٌّ مَشيمائِيّ **chorioadenoma**

ورم غدي في المشيماء .

وَرَمٌ غُدِّيٌّ مَشيمائِيٌّ مُخَرِّب **chorioadenoma destruens**

نوع من الرحى العدارية ، والتي فيها الزغابات المشيمائية للرحى تتغلغل عضل الرحم ، أو نادراً ما تنتقل إلى مواقع بعيدة في الرئة ، وتسمى (malignant mole) .

سِقائِيٌّ مَشيمائِيّ **chorioallantoic**

يعود على أو يتعلق بالسقاء المشيمائي .

السِقاءُ المَشيمائِيّ **chorioallantois**

بنية خارج الجنين مشتقة من اتحاد السقاء المشيماء ، وعن طريق أوعية دموية في الأديم المتوسط المصاحب بحيث يتم التبادل الغازي ، ويتواجد في الطيور والزواحف وهو غشاء مقابل لقشر البيض ، وفي كثير من الثدييات يشكل المشيمة .

المَشيماءُ البدائيَّة **primitive chorion**

المشيماء مَنذَ البداية وبإضافة الأديم المتوسط إلى الأرومة الغازية خلال مرحلة التي فيها تملك المشيماء زغابات بدئية عديدة .

المَشيماءُ الشَّعْثاء **shaggy chorion**

(=chorion frondosum)

انظر تحت chorion frondosum .

وَرَمٌ ظِهاريٌّ مَشيمائِيّ **chorionepithelioma**

انظر تحت choriocarcicnoma .

مَشيمائِيّ **chorionic**

تعود إلى أو يتعلق بالمشيماء .

اعْتِيانٌ من الزَّغابات المَشيمائيَّة **chorionic villus sampling**

أخذ عينة بالإبرة منَ الزغابات المشيمائية للجنين بغرض الفحص .

مَشيمائِيٌّ مَشيمِيّ **chorioplacental**

تعود إلى أو يتعلق بالمشيماء ومشيمة الجنين .

لُوَيحَة مَشيمائيَّة **chorioplaque**

قطعة متميزة بمواصفات خاصة على المشيمة العينية أو الجنينية ، كقطعة متكلسة على المشيمة مثلاً .

الآدمِة (جِنسٌ منَ السُّوس) **Chorioptes**

جنس من السوس الطفيلي من فصيلة القارشة ، والتي تصيب الجلد والشعر في الحيوانات المنزلية وتسبب جرب الحيوان الناتج عن الآدمات .

مَشيمَويٌّ شَبَكِيّ **chorioretinal**

تعود إلى المشيمية (في العين أو الدماغ) ، والشبكية .

التِهابُ المَشيميَّةِ و الشَّبَكِيَّة **chorioretinitis**

التهاب المشيمية والشبكية وتسمى أيضاً (Retinochoriditis) ، ومنها نوع تسببه إصابة إرتجاجية غير نافذة تتميز بفتق مشيمي وشبكي ونزيف دموي وتليف وتدمير شبكي وضعف النظر ، وتكون نتيجة (طلقة بندقة) ومنها نوع آخر يسمى (Toxoplasmic chorioretinitis) ،

(والنسبة إليها مشيمائي؛ للطبقة الخارجية من الأغشية الجنينية الباكرة؛ chorion)

التِهابُ المَشيميَّةِ و الشبكِيَّة **chorioidoretinitis**

التهاب المشيمية العينية والشبكية المترقي الذي يسبب العمى غالباً ، وقد يحدث لأسباب فيروسية .

وَرَمٌ مَشيمائِيّ **chorioma**

1 ـ أي تكاثر أرومي غاذي ، حميد أو خبيث

2 ـ انظر تحت choriocarinoma .

التِهابُ السَّحايا و المَشيميَّات **choriomeningitis**

(في البطينات الدماغية)

التهاب السحايا الدماغية مع ارتشاح لمفي في الضفيرة المشيموية .

الْتِهابُ السَّحايا وَالمَشيميَّات اللِّمْفاويُّ **lymphocytic choriomeningitis**

نوع منَ التهاب السَحايا ، والذي يسببه فيروسات التهاب السحايا المشيمية اللمفاوية ، والتي تحدث عادة في البالغين من 20 إلى 40 سنة ، وتكون خلال شهور الشتاء المتأخرة . تنتج العدوى من الاتصال بالقوارض المصابة بالعدوى ، وعادة ما تكون غير أعراضية أو بأعراض خفيفة ، بالرغم من حدوث التهاب سحايا دماغية وخيم .

المَشيماء (في الجنين) **chorion**

في علم الجنين البشري ، هو الغشاء السطحي ، الخلوي خارج الجنين ، والذي يتكون من الأرومة الغاذية المبطنة بالأديم المتوسط ، ويتطور إلى زغابات حوالي بعد أسبوعين من الإخصاب ، ويحدث له توعي دموي من خلال الأوعية الدموية السقائية .

المَشيماءُ الشَّعْثاء **chorion frondosum**

المنطقة في المشيماء ، والتي تظهر تعطي الزغابات ، تسمى أيضاً (Villons chorion) ، (Shaggy chorion) .

المَشيماءُ المَلْساء **chorion laeve**

الجزء الأملس (عديم الزغابات) والغشائي من المشيماء ، وتسمى أيضاً (Smooth chorion) .

تنكُسُ المشيميَّة (في العين) **choroideremia**

تنكس أولي وراثي مشيمائي ، ينتقل كخلة مرتبطة بالكروموسوم الجنسي X ، وتبدأ في العقد الأول في الحياة . في الذكور ، تكون أولى الأعراض عادة ما تكون العمى الليلي (العشاوة) ، يعقبه انحسار المجال البصري والعمى في النهاية والذي تحدث مع تقدم تنكس الظهارة الصبغية في الشبكية والتي تكتمل إلى ضمور كامل . أما في الإناث ، فيكون المسار للمرض غير مترق ، وعادة ما تكون الرؤية طبيعية وكثيراً ما يحدث اعتلال شبكي تصبغي شاذ ، ويسمى أيضاً (Progressive tapetochoroidal dystrophy) .

التِهابُ المشيميَّة (في العين) **choroiditis**

التهاب العنبية والتي تؤثر على المشيمة ، وخاصة الجزء الخلفي في السبيل العنبي (الغلالة الوعائية للمقلة) .

الْتهابُ المَشيميَّة الأماميُّ **anterior choroiditis**

وَالذي فيه يَتوَاجد نَقاط التهابية في محيط المشيمية .

الْتهابُ المَشيميَّة الهاليُّ المَرْكَزيّ **areolar central choroiditis**

الذيَ يبدأ حوَل أو قرب البقعة الصفراء ، ويتقدم (يترمى) نحو المحيط ، وبخلاف الأنواع الأخرى من التهاب المشيمية ، فإن الآفات تكون مصطبغة عند البداية ثم تفقد تصبغها ، تسمى أيضاً التهاب أو مرض فورستر (Foster disease) .

الْتهابُ المَشيميَّة الهاليُّ **areolar choroiditis**

ذَلك الذي يبَدأ حوَل أو قرب البقعة الصفراء ، ويتقدم نحو المحيط ، وبخلاف الأنواع الأخرى في التهاب المشيمية ، تكوت الآفات مصطبغة عند البداية ثم تفقد تصيغها ، تسمى أيضاً التهاب أو مرض فورستر (Foster disease) .

الْتهابُ المَشيميَّة المَرْكَزيُّ **central choroiditis**

نَوع يكون فَيَه الالتَهاب في منطقة البقعة الصفراء .

وهي التهاب المشيمية والشبكية المقوساتية : حالة وحيدة أو ثنائية الجانب تحدث في مرحلة لاحقة متأخرة في داء المقوسات الخلقي ، تتميز بحالات معاودة من الألم العيني وانخفاض النظر ، مع فقدان مطرد للنظر ، وتترافق مع آفات عميقة ، غزيرة الصبغة ، نخرية في الشبكية البقعية والمحيطية معاً والتهاب العنبية الخلفية ، تسمى أيضاً داء المقوسات العيني وداء المقوسات الشبكي المشيمي (Toxoplasmic retinochoroiditis) .

اعتِلالُ المشيميَّةِ والشَّبَكيَّة **chorioretinopathy**

عملية غير التهابية تكتنف كلا من المشيمية والشبكية .

وَرَمٌ أروميٌّ اغتِرابيّ **choristoblastoma**

(نسيج سوي في عضو غير العضو الأصلي)

كتلة من الأنسجة الطبيعية لجهاز أو طرف في الجسم في موقع غير الذي يقع فيه .

انظر تحت choristoma .

وَرَمٌ أروميٌّ اغتِرابيّ **choristoma**

كتلة من الأنسجة الطبيعية من الناحية الهيستولوجية لجهاز أو جزء من الجسم في موقع غير مكان تموضعه ، ويسمى أيضاً (Heterotopic tissue) .

المَشيمِيَّة (في العين أو الدماغ) **choroid**

1 ـ الغطاء الوعائي الصبغي الرفيع في العين الممتد من حافة الحاشية المشرشرة (Ora serrata) إلى العصب البصري ، وهو يوصل امداد الدم إلى الشبكية ويقود الشرايين والأعصاب إلى البنى الأمامية ، وتسمى أيضاً (chorioid) .

2 ـ تشبه المشيماء في الجنين .

مَشيمَويّ **choroidal**


المَشيمِيَّة (في العين أو الدماغ) **choroidea TA**

انظر تحت choroid .

استِئصالُ الضَّفيرةِ المَشيمَويَّة **choroidectomy**

(في البطين الجانبي للدماغ)

استئصال أو تدمير جراحي للضفيرة المشيموية في البطين الجانبي (الوحشي) في المخ .



Choroid المَشيمِيَّة

متفرقة .

Forster's choroiditis الْتهابُ المَشيميَّة بَحسب فُورسَتر (= الْتهابُ المَشيميَّةِ الهاليِّ المَرْكَزِيّ) **(=areolar central choroiditis)**

انظرَ تحت areolar central choroiditis .

metastatic choroiditis الْتهابُ المَشيميَّة النَّقيليّ

نَوع يسبب اَلنقائل مَثل ما يحدث في حالة التهاب السحايا وتقيح الدم . .إلخ

myopic choroiditis الْتهابُ المَشيميَّة الحَسَريّ

اَلتهاب المشيمَية العينيةَ المرافق لحسر البصر .

nonsuppurative choroiditis الْتهابُ المَشيميَّة اَللاقَيحيّ

التهاب المشيمية العينية لأسباب غير جرثومية قيحية كالأسباب المناعية أو الفيروسية .

senile macular exudative choroiditis الْتهابُ المَشيميَّة البُقْعيّ اَلشَّيخُوخيّ النَّضْحَيّ **(=disciform macular degeneration)** (= تَنكُّسُ البُقْعَة القُرْصيّ)

انظر تحت disciform macular degeneration .

suppurative choroiditis الْتهابُ المَشيميَّة اَلقَيحيّ

ذلك اَلالتهاب الذي يقود إلى تكون الصديد ، أو القيح ، غالباً ما يرجع لأسباب جرثومية .

choroiditis guttata senilis الْتهابُ المَشيميَّة اَلشَّيخوخيُّ المُنَقَّط

ضمور المشَيمية ، والذي يتميز ببقع صفراء غير منتظمة حول البقعة الصفراء ويعتقد أنه بسبب وجود تصلب في الشرايين ، وهو يشاهد في عمر الشيخوخة ، تسمى أيضاً داء طاي أو التهاب تنقط شيوخي .

انظر تحت Tay's choroiditis .

choroiditis serosa (=glaucoma) الْتهابُ المَشيميَّة المَصْليّ (=الزَّرَق)

انظر تحت glaucoma .

diffuse choroiditis الْتهابُ المَشيميَّة المُنْتَشر **(=disseminated choroiditis)**

آفة نضحية واسعة الانتشار في المشيمية .

Doyne's familial honeycombed choroiditis الْتهابُ المَشيميَّة العائليُّ الشَّبيهُ بعُشِّ النَّحْل (بحسب دوان)

شذوذ عيني وراثي تنكسي ، والذي يتميز ببقع خفيفة اللون في جوار القرص البصري والبقعة ، ويسمى أيضاً (Doyne's honeycomb degeneration) .

exudative choroiditis الْتهابُ المَشيميَّة اَلنَّضحيّ

ذلك الالتهاب الذي يتميز برقع ناضحة

أليفُ الكروم **chromaffin**

يصطبغ بقـوة مع أملاح الكروم (العنصر الرابع والعشرون) .

انظر تحت chromaffin cell .

ألفة الكروم **chromaffinity**

خاصية التلون بقوة بأملاح الكروم .

وَرَمُ أليفاتِ الكروم **chromaffinoma**

أي ورم يحـوي خـلايا أليـفة الكروم ، مثل ورم القوائم (Pheochromocytoma) .

الوَرَمُ اللُّبِّيُّ لأليفات الكروم (= وَرَمُ القَـواتم) **medullary chromaffinoma (=pheochromocytoma)**

انظر تحت pheochromocytoma .

اعتِلالُ أليفاتِ الكروم **chromaffinopathy**

أي مرض في جهاز الأليف للكروم .

أليفُ الكروم **chromaphil (=chromophil)**

انظر تحت chromaffin .

أليفُ الكروم والفِضَّة **chromargentaffin**

التصبغ بأمـلاح الكروم وتغليفه بالفـضة ، يقال عن بـعض الخـلايا ذات الغـشـاء المخـاطي في السبيل المعوي .

chromat-

1 ـ سابقة بمعنى الكروماتين

2 ـ سابقة بمعنى اللَّون

3 ـ سابقة بمعنى الكروموسوم

طليعة مصطلح بمعنى الكروموسوم أو اللون أو الكروماتين الكروموسومي .

كرومات **chromate**

1 ـ أي ملح من حمض الكروميك .

2 ـ الخضوع لفعل ملح حمض الكروميك .

القَرْموطيَّات **Chromatiaceae**

فَصيلَةٌ من الجَراثيمِ المائيَّة .

chromatic

1 ـ كروماتينيّ

2 ـ لَونيّ

3 ـ صَبوغ

1 ـ يعود إلى اللون ، قابل للصبغ بالأصباغ

2 ـ يعود إلى أليف الكروم .

التِهابُ المَشيميَّةِ والجِسْمِ الهَدَبيّ **choroidocyclitis**

التهاب العنبية في النتوءات المشيمية والهدبية .

التِهابُ المَشيميَّةِ والقَزَحيَّة **choroidoiritis**

التهاب العنبية في الغلاف المشيمي والقزحية .

اعتِلالُ المَشيميَّة (في العين) **choroidopathy**

انظر تحت choroiditis .

اعْتلالُ المَشيميَّة الهاليُّ **areolar choroidopathy**

يُسَـمى أيضـاً (Central areolar choroidal atro-phy) ، (Central areolar choroidal sclerosis) ، وهو تنكس مترق صباغي في المشيمية في سن مبكرة ، ويتـميز ببؤرة سوداء توجد قريبة من القطب الخلفي ومنطقة اللطخة في العين .

اعْتلالُ المَشيميَّة المَصْليُّ المَرْكَزيّ **central serous choroidopathy**

يسمَى أيضاً (Central angiospastic retinitis) ، (Central angiospastic retinopathy) ، (Central serous retinopathy) ، وهو انفـصال الشـبكية مركزياً على مستوى الطبقة الظهارية الصباغية ما يسمح لبلازما الشعريات المشيمية بالدخول تحت الحيز الشبكي .

التِهابُ المَشيميَّةِ والشَّبَكيَّة **choroidoretinitis**

انظر تحت chorioretinitis .

الجُغْرافيا البيُولوجيَّة **chorology**

يسـمى أيضـاً (Biogeography) ، وهي دراسـة العلاقات السببية بين الظواهر الجغرافية التي تحدث ضمن منطقة معينة . أو دراسة التوزع الفـراغي لـلعـضـيـات (الكائنات الحـيـة) أو الجراثيم .

صانِعَةُ الكلوروفيل؛ صانِعَةُ اليَخْضور **choroplastid**

المادة أو الجـزيء الذي يتطور إلى اليـخـضـور النباتي (الكلوروفيل) .

كورْتوستيرول **chortosterol**

ستيرول فضلات الحصان .

chrom-

1 ـ سابقة كيميائية بمعنى الكروم

2 ـ سابقة بمعنى اللَّوْن

طليعة مصطلح تعبر عن اللون أو مادة الكروم .

انظر تحت Lyon hypothesis .

كروماتينيّ **chromatinic**
تشير للكروماتين .

سَلبيُّ الكروماتين **chromatin-negative**
ينقصه الكروماتين الجنسي ، خاصية لأنوية الخلايا في الذكور الطبيعيين أو في أشخاص آخرين بكروموسوم جنسي X واحد فقط .

انحلالُ الكروماتين **chromatinolysis**
ضياع وانحلال المادة الكروماتينية الكروموسومية . يسمى أيضاً (Chromolysis) .

تفتّتُ الكروماتين **chromatinorrhexis**
تفتت المادة الكروماتينية الكروموسومية .

إيجابيُّ الكروماتين **chromatin-positive**
له كروماتين جنسي (جسم بار) في أنوية الخلايا الجسدية ، وهي من خصائص الأنثى الطبيعية ، أو الأفراد الآخرين الذين لهم اثنين أو أكثر من الكروموسومات الجنسية X .

الزَّيغُ اللَّونيُّ **chromatism**
ترسبات صبغية غير طبيعية .

القَرْموطيَّة (جنسٌ منَ الجَراثيم المائيَّة) **Chromatium**

يُعامِلُ بالكروم **chromatize**
الشحن بمركب الكروم .

chromato-
1ـ سابقة بمعنى الكروماتين
2ـ سابقة بمعنى اللَّون؛ الصباغ
3ـ سابقة بمعنى الكروموسوم

أرومَةُ المَصْطبِغَة **chromatoblast**
خلية تستطيع أن تكون حاملة للصبغة ، أو ناقلة للصبغة .

حَرَكِيَّةُ الكروماتين **chromatocinesis**
انظر تحت chromatokinesis .

جُلادٌ تَصَبُّغِيّ **chromatodermatosis**
المرض الجلدي الذي يتظاهر بتصبغات جلدية .

خَلَلُ رُؤيَةِ الأَلوان **chromatodysopia**
أي اضطراب بصري يسبب خللاً في رؤية الألوان كعمى الأخضر .

مُوَلِّدُ اللَّون **chromatogenous**
منتج للون ، أو لمادة ملونة .

شِقُّ الكروموسوم **chromatid**
أحد طيقان الكروموسوم المزدوجة ، والمتصلة عند القسيم المركزي ، والتي تؤلف الطور التالي للكروموسوم ، والناتج من ارتداف الكروموسوم خلال الطور S (الطور التخليقي DNA) في الطور البيني .

شقَّا الكروموسوم اللامُتَآخِيان **nonsister chromatids**
إثنان من شقي الكروموسوم لكروموسوم واحد متماثل من النظر للنديد الآخر .

شقَّا الكروموسوم المُتَآخِيان **sister chromatids**
إثنان من شقي الكروموسوم والمتماكسان معاً بالقسيم المركزي ؛ ويسمى أيضاً (Dyads) .

كروماتين **chromatin**
الجزء الأكثر قابلية للصبغ في نواة الخلية ، والذي يشكل شبكة من الألياف النووية ، وهو حمض الديوكسي ريبونوكلييك المتصل إلى قاعدة بنيوية بروتينية (هيستونية في الغالب) ، وهي ناقلة للموروثات . توجد في حالتين ، كروماتين حقيقي وكروماتين مغاير ، مع خواص تصبغ مختلفة ، والتي تلتف خلال انقسام الخلية وتنثني لتكون كروموسومات الطور التالي في انقسام الخلية .

الكروماتينُ المُرافِقُ للنُّويَّة **nucleolar-associated chromatin**
كروماتين مغاير يحتوي على الدنا (DNA) ، يقع حول وأحياناً يمتد داخل نواة الخلية .

الكروماتينُ المُرافِقُ للنُّويَّة **nucleolus-associated chromatin**
كروماتين مغاير يحتوي على الدنا (DNA) ، يقع حول نواة الخلية وأحياناً يمتد داخل نواة الخلية .

الكروماتينُ الجِنْسيُّ **sex chromatin**
كتلة كروماتينَ (جسم بار) في نواة خلايا الإناث خلال الطور البيني في معظم أنواع الثديات بما فيها الإنسان ، وهي تمثل كروموسوم جنسي X متكاثف مفرد خامل ومكثف .

على الممتز .

استْشْرابٌ بالأُلْفَة **affinity chromatography**

المبنية عَلى تفاعل حيوي خاص مثل ذلك الذي يحدث بين المستضد والضد ، والإنزيم والركيزة ، أو المستقبل واللجين . أي من هذه المواد التي تتحد بداعم غير قابل للذوبان أو غير متحرك داخل مادة هلامية ، والتي تصلح كمادة ممتزة تسمح للمادة المتفاعلة أن تفصل من العينات غير النقية نسبياً . وعادة يمكن الوصول إلى 1000 ضعف من النقاوة في خطوة واحدة .

استْشْرابٌ عَلى العَمود **column chromatography**

نوع من الاستشراب يستخدم ممتز معبأ في عمود ، وفيه تذاب العينة في مذيب وتسكب من أعلى ، تبقي بعض المكونات في العمود مرتبطة بالممتز ، وبعد ذلك يتم غسلها وإزالتها على دفعات من نفس المذيب ، وتفصل المواد المرتبطة أكثر في النهاية أو بواسطة مذيب آخر .

استْشْرابٌ كَهْرَبِيّ **electric chromatography**

تأثير الحقل الكهربائي لفصل المواد البروتينية والصباغية ، وله طرق ووسائل أكثرها شيوعاً ، مثل الاستشراب على الورق .

استْشْرابٌ اسْتْبْعاديّ **exclusion chromatography**

انظَر تحتَ gel-filration chromatography .

استْشْرابٌ عَلَى وَرَق التَّرْشيح **filter paper chromatography**

نوع مَن الفصل يكون فيه الطور الثابت عبارة عن صفحة من ورق الترشيح . وهو في كل الأوجه الأخرى مماثل للفصل بالطبقة الرقيقة .

استْشْرابٌ غازيّ **gas chromatography**

نوَع من الفصَل الآلي والذي يتم فيه تبخر العينات المذابة ونقلها بغاز خامل عبر عمود معبأ بممتز لواحد من عدة أنواع من الكواشف ، وكل من مكونات العينة يفصل من الأخرى بعبوره خلال العمود لينتج ذروة منفصلة في مخرجات

مُخَطَّط استِشْرابيّ؛ مُخَطَّط كروماتوجرافي **chromatogram**

في الأصل نموذج للشرائط للمواد المفصولة بطريقة الفصل الكروماتوجرافي العمودي ، وسميت بذلك لأن التقنية كانت تستعمل بداية لفصل الأصباغ النباتية لتنتج حزم ملونة ، وبالقياس فهو أي تسجيل ينتج بأي من أشكال الفصل اللوني ، مثلاً ، في الفصل اللوني بالورقة أو الطبقة الدقيقة ، وهي عبارة عن صفيحة أو ورقة ترشيح مجففة ومصبوغة ، أو في الفصل الكروماتوجرافي للسائل عالي الأداء أو الغازي ، والذي يسجل في شكل تسجيل بياني .

مِشْراب؛ مِخْطاط كروماتوجرافي **chromatograph**

1 ـ الجهاز المستخدم في الفصل اللوني (الاستشراب) .

2 ـ التحليل باستخدام الفصل اللوني (الاستشراب)

استِشْرابيّ؛ كروماتوجرافيّ **chromatographic**

يعود إلى ناتج من الفصل اللوني .

استِشْراب؛ كروماتوجرافيا **chromatography**

أي من مجموع التقنيات التي تستخدم لفصل خليط من المركبات بناء على الاختلاف النسبي لقابلية الانجذاب لوسطين مختلفين أحدهما (المرحلة المتحركة) سائل متحرك والأخرى (المرحلة الثابتة أو الممتز) ، والذي يكون صلب نفاذ ، وهو عبارة عن هلام أو سائل يغطي داعم صلب ، والسرعة التي عندها تفعل أي من هذه المواد خلال المرحلة المتحركة تعتمد على قابليتها للذوبان (في مرحلة السائلة المتحركة) ، أو ضغط البخار (في مرحلة المتحرك) ، وعلى قابليتها للانجذاب للممتز .

استْشْرابٌ امْتِزازيّ **adsorption chromatography**

تكَونَ فيه المرحلة الثابتة عبارة عن ممتز غير محدد مثل هلام السيليكا ، أو بلمر مسامي أو الفحم بحيث ترفض الجزيئات المراد فصلها

فصل مختلفة تشمل ، الامتزاز ، الترشيح الهلامي ، التبادل الأيوني والتجزئي .

اسْتِشْرابٌ بِتَبَادُلِ الأَيونات **ion-exchange chromatography**

يكون فيه الطور الثابت ناتج من الارتباط الأيوني ، والطور المتحرك عبارة عن محلول مائي دراىء والذي يحدد درجة تأين مكونات العينة ، وبالتالي درجة الانجذاب للطور الثابت .

اسْتِشْرابٌ سائِليٌّ ـ سَائِليّ **liquid-liquid chromatography**

انظر تحت Partition chromatography .

اسْتِشْرابُ المُنْخُلِ الجُزَيئيّ **molecular sieve chromatography**

انظر تحت gel-filration chromatography .

اسْتِشْرابٌ وَرَقيّ **paper chromatography**

نوع من الفصل اللوني والذي يكون فيه الطور الثابت عبارة عن صفحة من ورق الترشيح ، وهو في جميع الأوجه الأخرى مماثل للفصل بالطبقة الرقيقة .

اسْتِشْرابٌ تَقاسُميّ **partition chromatography**


يكون فيه الطورَ الثابت والمتحرك عبارة عن سوائل غير قابلة للامتزاج ، وتفصل مكونات العينة على أساس معامل التقاسم في أحداهما . يسمى أيضاً الفصل السائل ـ السائل (Liquid - liquid chromatography) .

اسْتِشْرابُ الطَّبَقَةِ الرَّقِيقَة **thin-layer chromatography**

نوع من الفصل يكون فيه الطور الثابت عبارة عن طبقة رقيقة من المذيب مثل هلام السيليكا المطلي فوق صفيحة مستطيلة ، والمرحلة المتحركة عبارة عن مذيب مختلط ، وتوضع العينة على بقعة صغيرة من الصفيحة وتوقف الصفيحة على نهايتها على أن تكون حافتها السفلية في المذيب ، ويرتفع المذيب بفعل الخاصية الشعرية خلال الهلام ، وبذلك فإن مكونات العينة تنقل بمعدلات مختلفة ، ويمكن رؤيتها كصف من النقط بعد تجفيف الصفيحة المكشاف والتي ترسم بمسجل بياني . قد يكون الممتز صلب مسامي خامل (استشراب صلب غازي) ، أو سائل غير طيار يغطي داعم صلب (استشراب سائل ـ غازي) .

اسْتِشْرابٌ غازِيٌّ ـ سَائِليّ **gas-liquid chromatography**

انظر تحت gas chromatography .



بروفيل الاستشراب بالألفة
Affinity Chromatography Profile

اسْتِشْرابٌ تَرْشيحِيٌّ ـ هُلامِيّ **gel-filtration chromatography**

يكون فيه الطور الثابت مكون من هلام مكوناً خرزات مستطربة لها مسامات منضبطة الحجم بدقة ، وتحمل العينة خلال الهلام الجزئيات الصغيرة ، والتي تحتبس غالباً في المسامات وتعطل ، بينما الجزئيات الكبيرة تمر دون إعاقة ، وبذلك يتم فصل مكونات العينة على أساس الحجم والشكل ، تسمى أيضاً (Molecular sieve chromatography) ، (Moleuclar exclusion chromatography) .

اسْتِشْرابٌ نُفُوذِيٌّ ـ هُلامِيّ **gel-permeation chromatography**

انظر تحت gel-filtration chromatography .

اسْتِشْرابٌ سَائِليٌّ بِالضَّغْطِ العالِي **high pressure liquid chromatography**

فصل آليّ يكوَن فيه الطور المتحرك سائل يتم دفعه تحت ضغط مرتفع عبر عمود معبأ بمذيب ، وكما في الفصل الغازي فإن الكاشف في نهاية العمود يكون متصل بورق تسجيل بياني والذي يرسم تدفق العينة . وتستعمل طرق

أليفُ اللَّون chromatophilic

سهل الصبغ .

أليفُ اللَّون chromatophilous

سهل الصبغ .

رُهابُ الألوان chromatophobia

حامِلُ الصباغ chromatophore

أية خلية صبغية ، أو صانعة منتجة للون ، مثل تلك التي بالجلد ، أو الطبقة العميقة بالبشرة .

مُوَجِّهَة حامِلِ الصباغ chromatophorotropic

مؤثر أو مسيطر على حاملات الألوان ، كالتأثير الصبغي للهرمون المنبه للخلايا الميلانية .

الجِبْلَة المتلونة chromatoplasm

الأجزاء الملونة في جبلة الخلية المصطبغة .

1 ـ خَلَلُ إدْراكِ الألوان chromatopsia

2 ـ رُؤيَة مُلَوَّنة

1 ـ عيب بصري تبدو فيه الأشياء الملونة ملونة بصورة غير طبيعية ، وتبدو الأشياء غير الملونة كما لو أنها مشربة بلون ، ويسمى العيب البصري حسب اللون الذي يرى معيباً : عمى اللون الأزرق ، عمى اللون الأخضر ، عمى اللون الأحمر ، عمى اللون الأصفر . قد تكون العيوب البصرية بسبب أدوية ، أو اضطرابات المراكز البصرية ، أو استئصال عتامة عدسة العين ، أو الضوء المبهر .

2 ـ إحساس غير كامل للون ، أو رؤية غير سوية للون .

مِقْياسُ رُؤيَةِ الألوان chromatoptometer

انظر تحت chromatometer .

قِياسُ رُؤيَةِ الألوان chromatoptometry

اختبار المقدرة على تمييز الألوان .

مِنْظارُ رُؤيَةِ الألوان chromatoscope

جهاز يستخدم للكشف اللوني .

1 ـ فَحْصُ رُؤيَةِ الألوان chromatoscopy

2 ـ التَّشْخيصُ بِتَلَوُّنِ البَول

1 ـ اختبار رؤية الألوان .

2 ـ تشخيص وظائف الكلى عن طريق لون البول بعد إعطاء الأصباغ .

وصبغها أو رؤيتها بالضوء تحت البنفسجي حسب نوع العينة .

شِبْهُ كروماتينيّ chromatoid

له خواص الكروماتين التلوينية .

انظر تحت body .

حَرَكِيَّة الكروماتين chromatokinesis

حركة الكروماتين أثناء حياة وانقسام الخلية .

عِلْمُ الألوان chromatology

الفرع من العلم المختص بدراسة الألوان .

انحِلالُ الصَّبْوغات chromatolysis

(انحلال جسيمات نيسل)

تحلل أجسام نيسل (أليف الكروم) في الخلايا العصبية كنتيجة إصابة ، أو تعب ـ أو إرهاق ، والذي يعتبر جزء في ما يسمى تفاعل المحوار العصبي .

متعلق بانحِلالِ الصَّبْوغات chromatolytic

صفة منسوبة لكل ما له علاقة بانحلال الأصبغة .

مِقْياسُ رُؤيَةِ الألوان chromatometer

(=chromoptometer)

جهاز لقياس اللون ، أو الإدراك الحسي للون .

ويسمى (Chromoptometer) .

اعْتِلالُ تَصَبُّغِ الجِلد chromatopathy

أي مرض يسبب خللاً في اصطباغ الجلد .

مُثَبِّتُ الألوان chromatopectic

انظر تحت chromopectic .

تَثْبيتُ الألوان chromatopexis

انظر تحت chromopexy .

مُتْلِفُ الأَصْبِغَة chromatophagus

مخرب للأصبغة .

أليفُ اللَّون chromatophil

خلية أو عنصر سهل التلوين .

أليفُ اللَّون chromatophile

1 ـ انظر تحت chomatophil .

2 ـ انظر تحت chromatophihlic .

ألفة اللَّون chromatophilia

حالة التلوين بسهولة .

المقاوم للجو ، وهو مكون هام في معظم سبائك الفلز القاعدي المستعمل في طب الأسنان ، يلعب الكروم دور في أيض الجلوكوز ويعتبر من العناصر الأساسية في التغذية بمقادير زهيدة ، والكروم السداسي التكافؤ مسرطن .

الكروم 51 — **Chromium 51**

هو نظير مشع من الكروم ، كتلته الذرية 51 ، نصف عمره 27.7 يوم ، يتحلل بالالتقاط الإلكتروني ، ويرسل أشعة جاما (0.32 ميجا ڤولت) ، ويستعمل لتوسيم كريات الدم الحمراء لقياس كتلتها أو حجمها ، وزمن البقيا ، ودراسات الانحجاز ، ولتشخيص النزف المعدي المعوي ، ويستخدم لوسيم الصفيحات الدموية لدراسة البقيا ، واستعمل كذلك لوسم ألبومين المصل لقياسات فقدان البروتين المعدي المعوي .

بيكولينات الكروم — **chromium picolinate**

نوع من الكروم النشط حيوياً ، ويستعمل كمكمل غذائي .

ثلاثي أكسيد الكروم — **chromium trioxide**

انظر تحت chromic acid .

chromo-

1ـ سابقة بمعنى الكروماتين

2ـ سابقة بمعنى اللَّوْن؛ الصباغ

3ـ سابقة بمعنى الكروموسوم

المتصابغة (جِنسٌ مِنَ الجراثيم) — **Chromobacterium**

أحد أجناس الجراثيم سالبة الجرام ، حيوائية ، أو لا حيوائية اختيارياً ، غير ممرضة عادة ، وهي جراثيم عضوية الشكل ، توجد في الأرض والماء في الدول الإستوائية ، وتتميز بانتاج صبغة بنفسجية قابلة للذوبان في الكحول ، ولكن لا تذوب في الماء أو الكلوروفورم .

المُتَصابِغَة البَنَفْسَجِيَّة — **Chromobacterium violaceum**

نوع من الجراثيم التي قد تعدي الإنسان ، تسبب الخراجات ، وإسهال ، وعداوى المسالك البولية والجهازية .

أرومَة المُصْطَبِغَة — **chromoblast**

تَصَبُّغ — **chromatosis**

تسمى أيضاً (Pigmentation) ، وهي تشكل الصباغ أو الاصطباغ .

مِقياسُ الظِّلالِ اللَّونِيَّة — **chromatoskiameter**

مقياس لوني باستخدام الظلال الملونة .

انجذابٌ للكرُوماتين — **chromatotaxis**

جذب أو تأثير مواد محددة على كروماتين نواة الخلية ، والذي يسبب تدمير للكروماتين ، مع الإبقاء على جسم الخلية سليماً .

تَوَجُّهٌ لَونِيّ — **chromatotropism**

استجابة واعية (توجيهية) للون .

بِيلَة مُصْطَبِغَة — **chromaturia**

تلون غير طبيعي للبول .

مَطليٌّ بالكروم — **chrom**

الكروم (العنصر الرابع والعشرون) — **chrome (=chromium)**

انظر تحت chromium .

إحْساسٌ مُصاحِبٌ لِلَّوْن — **chromesthesia**

ارتباط الأحاسيس التخيلية للون مع الأحاسيس الفعلية للسمع أو التذوق ، أو الشم .

انظر تحت photism .

تَعَرُّقٌ مُلَوَّن — **chromhidrosis**

إفراز عرق ملون يسمى أيضاً (Chromidrosis) .

يُعامِلُ بالكروم؛ يُكَرِّم — **chromicize**

المعالجة بمركب الكروم .

حُبَيْبَة مُلَوَّنَة — **chromidium**

جزيء أو تكوين أليف الملونات القاعدية في الهيولى الغني بالرنا (RNA) ، كثيراً ما يوجد في الخلايا المتمايزة أو المتخصصة .

تَعَرُّقٌ مُلَوَّن — **chromidrosis (=chromhidrosis)**

انظر تحت chromhidrosis .

الكروم (العُنْصُرُ الرّابِعُ والعشرون) — **chromium**

معدن هش أزرق مبيض ، عدده الذري 24 ، ووزنه الذري 51.996 ، ووزنه النوعي 7.1 ، ورمزه (Cr) ، العديد من مكوناته عبارة عن صبغات ، والمعدن نفسه يستخدم للتصفيح

أية خلية ملونة أو كرية دموية مصبوغة .

دُماعٌ مُلوَّن **chromodacryorrhea**

انسكاب دموع مدممة .

تشخيصٌ لونيّ **chromodiagnosis**

1 ـ التشخيص بتغير اللون .

2 ـ تشخيص التشويش الوظيفي بملاحظة المعدل الذي عنده المادة الملونة ـ مثل كلوريد الميثيلثايونين ـ تفرز خارج الجسم .

3 ـ الفحص التشخيصي خلال الزجاج الملون أو شرائح من الجلاتين الملون .

مُوَلِّدُ اللّون **chromogen**

1 ـ مركب كيمائي عديم اللون ، والذي يمكن أن يتحول الى مركب ملون ، أو أن يتفاعل مع مادة أخرى ليشكل مركباً ملوناً .

2 ـ مكروب منتج للصبغة ، مثال : بعض ذريات المتفطرات التي تنتج مستعمرات صفراء إلى حمراء اللون .

مولد اللون بورتر ـ زيلبر **Porter-Silber chromogen**

17- هيدروكسي كورتيكوستيرويد مع ثنائي هيدروكسي الأسيتون ، حيث تتفاعل السلسلة الجانبية منها إيجابياً في تفاعل بورتر ـ زيلبر .

جِينُ الكروموسوم **chromogene**

الجين الوراثي الموجود على الكروموسوم الحامل له .

توليدُ الألْوان **chromogenesis**

تشكيل الأصبغة أو الألوان بواسطة الفعل الجرثومي .

مُوَلِّدُ اللّون **chromogenic**

إنتاج الصباغ أو المادة الملونة .

كرُومُوجرانين **chromogranin**

(بروتين في خلايا لب الكظر)

أية مجموعة من عديدات الببتيد الحامضية التي تشكل المكون البروتيني المنحل الرئيسي للحبيبات الإفرازية للخلايا أليفة الكروم للب الكظر . كذلك تتوزع بشكل واسع في النسج الصماوية والخلايا الورمية . بعضها تشكل

خلية جنينية تتطور إلى خلية صبغية .

فُطارٌ اصْطِباغِيّ **chromoblastomycosis (=chromomycosis)**

عدوى فطرية مزمنة بالجلد ، تبدأ عادة عند موقع الجرح الثاقب أو أي حالات رضح أخرى ، وتصيب إحدى الساقين أو القدم (قدم مطحلبة) ، وأحياناً تصيب أماكن أخرى بالجسم ، محدثة عقيدات تشبه الثؤلول أو الورم الحليمي ، والذي قد يتقرح أو لا يتقرح ، وبالفحص المجهري ، فإن الآفة تتميز بأجسام بنية مستديرة (أجسام متصلبة) ، والتي تتكاثر بالتشطر الاستوائي وليس بالتبرعم ، وعادة ما تسببها الفائلية البروفية ، والفنسقية البيصرية ، والفنسقية المكتنزة ، والمبغثرة الجيفية ، أو بعض الفطريات الجلدية الأخرى .

وتسمى أيضاً (Chromomycosis) ، (Verrucose) ، (Verrucous dermatitis) .

جُسَيمٌ نَوَوِيّ **chromocenter (=karyosome)**

1 ـ انظر تحت karyosome .

2 ـ كتلة متحدة من الكروماتين المتغاير مع امتدادات شعاعية للكروماتين الحقيقي ، والتي تمثل أجزاء من الكروموسومات في الغدد اللعابية لبعض الحشرات .

اسْتِصْباغُ الصَّفْراء **chromocholoscopy**

فحص الوظائف المرارية باختبار إفراز الصبغة (كلوريد الميثال ثونين) .

مُتْلِفُ الصبْغِيَّات **chromoclastogenic**

تسبب أو تؤدي إلى تمزق أو تلف الكروموسومات .

تَنْظيرُ المَثانةِ المُلَوَّن **chromocystoscopy**

فحص داخل المثانة بعد إعطاء صبغة القرمز النيلي أو أي صبغة أخرى تفرز في البول ، وذلك لتحديد ودراسة نشاط فتحات الاحليل ، وتسمى أيضاً (Chromoureteroscopy) ، (Cystochromoscopy) .

خَلِيَّة مُلَوَّنَة **chromocyte**

chromonema **خَيطُ الكروموسوم**

خيط مركزي ملفوف للشق الكروموسومي مقابل لمناطق القسيم الكروموسومي الملتفة بشكل أكثر تكثفاً .

chromonemal **متعلق بخَيطِ الكروموسوم**

chromonemata **خُيوطُ الكروموسومات**

chromoneme **خَيطُ الكروموسوم**

chromoparic **مُوَلِّدٌ للَّون**

(=chromogenic)

ينتج أو يعطي زيادةً في اللون ، مولد اللون .

chromopathy **اعتلالُ تصبُّغِ الجلد**

انظر تحت chromatopathy .

chromopectic **مُثبتُ اللَّون**

يتعلق ، أو يتميز ، أو يعزز تثبيت اللون .

chromopexic **مُثبتُ اللَّون**

مثبت للصبغة ، وهو مصطلح يستخدم بشكل خاص للتعبير عن وظيفة الكبد في تكوين البيليروبين .

chromopexy **تثبيتُ اللَّون**

تثبيت الصباغ ، وهو مصطلح يطلق بشكل خاص على وظيفة الكبد في تشكيل البيليروبين .

chromophage **مُتلِفةُ الصباغ (خلية)**

انظر تحت pigmentophage .

chromophane **كرُومُوفان (صِباغ في الشَبكِيَّة)**

صباغ في شبكية العين يشاهد في بعض أنواع الحيوانات .

chromophil **أليفُ اللَّون**

أية خلية ، أو بنية ، أو نسيج قابل للتلون بسهولة .

chromophile **أليفُ اللَّون**

chromophilic **أليفُ اللَّون**

سريع أو سهل التلون ، يطلق بشكل خاص على بعض الكريات البيض أو العناصر الهيستولوجية الأخرى التي تتلون بسهولة .

chromophilous **أليفُ اللَّون**

chromophobe **كارهُ اللَّون**

الطلائع الببتيدية للهرمونات .

chromoisomerism **تصاوُغٌ لَونيّ**

تصاوغ ، حيث إن المصاوغات لها ألوان مختلفة .

chromolipoids **صِبْغٌ شَحْمِيّ**

(=lipochromes)

انظر تحت lipochromes .

chromolysis **انحِلالُ الصَّبوغات**

هو انحلال الكروماتين .

انظر تحت chromatolysis .

chromomere **قُسَيمٌ كروموسومي**

1 ـ أي من الحبيبات السبحية الشكل التي تشاهد في الطور الأول من تشكل السلاسل على طول الخيط الكروموسومي . يسمى أيضاً (Idiomere)

2 ـ انظر تحت granulomere .

chromometer **مِقياسُ رُؤيَةِ الألوان**

(=chromatometer)

1 ـ انظر تحت chromatometer .

2 ـ انظر تحت colorimeter .

chromomycosis **فُطارٌ اصْطِباغيّ**

انظر تحت chromoblastomycosis .


chromonar **كرُومُونار**

دَواءٌ مُوَسِّعٌ لشَرايين القَلْب .

chromone **كومارين (دَواءٌ مانِعٌ لتَخثرِ الدم)**

(=coumarin)

انظر تحت coumarin .



Chromium الكروم (العُنْصُرُ الرَّابِعُ والعشرون)

chromopsia **1 ـ خَلَلُ إدْراكِ الألْوان**
2 ـ رُؤيَة مُلوَّنة
(=chromatopsia)
انظر تحت chromatopsia .

chromoptometer **مِقياسُ رُؤيَةِ الألْوان**

chromoretinography **تَصْويرُ الشَّبكِيَّةِ المُلَوَّن**
التصوير الفوتوجرافي الملون للشبكية .

chromorhinorrhea **ثَرٌّ أنفِيٌّ مُلَوَّن**
مفرزات ملونة تطرح من الأنف .

chromosantonin **كرُومُوسانْتونِين (سانتونين أصفر)**
سانتونين أصفر ، شكل تصاوغي ينتج عندما يتعرض السانتونين لأشعة الشمس .

chromoscope **مِنْظارُ رُؤيَةِ الألْوان**
انظر تحت chromatoscope .

chromoscopy **1 ـ التَّشْخِيصُ بِتَلَوُّنِ البَوْل**
2 ـ تَنْظِيرُ رُؤيَةِ الألْوان
انظر تحت chromatoscopy .

gastric chromoscopy **التَّشْخِيصُ بتَلَوُّن الإفْرازِ المَعدي**
تشخيص وظائف المعدة عن طريق لون محتوياتها ؛ بغرض الكشف عن عيوب إفراز الحمض المعدي .

chromosomal **كروموسومي**

chromosome **كروموسوم (ج: كروموسومات)**
1 ـ في الخلايا الحيوانية : يتمثل ببنية في النواة تحتوي على خيط خطي من الدنا (DNA) ، والذي ينقل المعلومات الوراثية و يترافق مع الرنا (RNA) والهيستونات . خلال الانقسام الخلوي فإن مادة الكروماتين المكونة للكروموسوم تلتف مندمجةً و يصبح الكروموسوم مرئياً بالتلوين المناسب و بذلك تسمح له بالحركة في الخلية مع تقييد طفيف . كل كائن حي من أي نوع يمتلك بشكل طبيعي عدد محدد و مميز من الكروموسومات في خلاياه الجسدية ، يوجد في الإنسان بشكل طبيعي 46 كروموسوماً اثنان منهما جنسيان إما (XX) أو (XY) ، واللذان يحددان جنس الكائن الحي . الكروموسومات

أية خلية ، أو بنية ، أو نسيج لا يتلون بسهولة ، مثل الخلايا التي لا لون لها النخامية الغدية .

chromophobia **ضَعْفُ التَّلَوُّن**
ضعف نوعية التلون بالأصبغة .

chromophore **حامِلُ اللَّون**
أية مجموعة كيمائية يعطي وجودها لوناً واضحاً للمركب ، والذي يتحد مع مجموعة أخرى محددة (زمرة كيمائية صباغية) لتشكل الأصبغة . تسمى أيضاً (Color radical) .
انظر تحت color radical .

chromophoric **حامِلُ اللَّون**
1 ـ حامل اللون ، يطلق على بعض الجراثيم بأنها مولدة للون عندما يكون الصباغ جزءاً مكوناً للخلية الجرثومية نفسها .
2 ـ متعلق بحامل اللون .

chromophorous **حامِلُ اللَّون**

chromophose **ضُواءٌ لَوْنِيّ**
شعور شخصي بوجود بقعة ملونة في العين .

chromophototherapy **مُعالجَة بالضَّوءِ المُلَوَّن**
انظر تحت chromotherapy .

chromoplasm **كروماتين**
(=chromatin)
انظر تحت chromatin .

chromoplast **بَانِيَةُ اللَّون**
(=chromoplastid) **(= صانِعَةُ اللَّون)**
انظر تحت chromoplastid .

chromoplastid **صانِعَةُ اللَّون**
أية خلية صانعة للون غير الخلايا الصانعة للكلوروفيل .

chromoprotein **بروتِينٌ مُلَوَّن**
بروتين مقترن ملون . مثاله الهيموجلوبين الأحمر اللون في الحيوانات العليا ، والهيموسيانين (الأزرق اللون) في الحيوانات الدنيا ، والأصبغة الحمر والزرق في الطحالب البحرية . وللبروتينات الملونة وظائف تنفسية ، و لها علاقة وثيقة بالكلوروفيل الأخضر في النباتات العليا .

الطبيعي .

ذراعُ الكروموسوم **chromosome arm**
أحد الأذرع الأربعة لكل الكروموسوم ، اثنان قصيران واثنان طويلان .

تكَسُّراتُ الكروموسوم **chromosome breaks**
انفصال جزء أو أجزاء من الكروموسوم ، وقد يعاد ارتباطها في مواضع مختلفة منه .

خَبْنُ الكروموسوم **chromosome deletion**
هي حالة فقدان جزء من الكروموسوم ، بعد حدوث التكسر في منطقتين منه . ويمكن ملاحظة ذلك مجهرياً .

تَضاعُفُ الكروموسوم **chromosome duplication**
حالة من الزيغ الكروموسومي ، والتي تحدث نتيجة عدم التساوي في التعابر أو تبادل القطع المتماثلة أثناء الانقسام الكروموسومي ، فأحد الكروموسومين يكتسب قطعة إضافية لديه مثلها . وهي حالة تضاعف الكروموسوم بينما يخسر الكروموسوم المقابل هذه القطعة ويحصل لديه خبن . فالتضاعف عكس عملية الخبن .

انْقلابُ الكروموسوم **chromosome inversion**
دَوران قطعة مكسورة من طرفيها دوراناً كاملاً (180 درجة) ، وعودة التحام الطرفين المتقابلين فيتسبب ذلك في انقلاب الأوامر الجينية .

خَريطَةٌ كروموسومية **chromosome map**
رسم تمثيلي لمواضع الجينات على الكروموسومات .

اخْتِزالُ كروموسوم **chromosome reduction**
انتَصاف عدده الزوجي إلى فردي ، ويحدث ذلك في الانقسام الانتصافي للبيوض أو النطاف فيعود العدد الزوجي لكروموسومات الإنسان مثلاً من العدد (46) إلى العدد الفرداني (23) في كل بيضة معدة للتلقيح أو نطفة ذكرية ناضجة . ويعود العدد زوجياً كاملاً بحدوث التلقيح.

إزْفاءٌ كروموسومي **chromosome translocation**

الانسانية الذكرية مع تلوين جيمزا (الاستشراط نمط G) تعرف بالنمط المورثي . الكروموسوم A : هو كروماتين طويل خيطي الشكل في الطور البيني من الانقسام الخلوي في النواة . الكروموسوم B : يتلون بملون جيمزا ، يتكثف شق الكروموسوم جزئياً في الطور المتأخر من الانقسام الخلوي . الكروموسوم C : يتلون بملون جيمزا ، يتكثف شق الكروموسوم كلياً في الطور التالي من الانقسام الخلوي . لاحظ أن بعضاً من تحت الأشرطة تكون مرئية في الطور المتأخر و قد تكثفت إلى أشرطة مفردة . (في الكروموسومان B و C فقط هناك زوج من شقي الكروموسوم المتآخيين تكون مشاهدة) .
2 ـ في المورثات الجرثومية : حلقة مغلقة من الدنا DNA ثنائي الطاق ، والتي تحتوي على المادة الوراثية للخلية ، و ترتبط بالغشاء الخلوي . ومعظم هذه المادة الوراثية تشكل النواة الجرثومية المندمجة (يطلق عليها اسم الجسيم الكروماتيني) .

كروموسومات إضَافيَّة **accessory chromosomes**
انظر تحت supernumerary chromosomes .

كروموسوم عَديمُ القُسَيم المَرْكَزي **acentric chromosome**

كروموسوم طَرَفيٌّ القُسَيم المَرْكَزيَ **acrocentric chromosome**
كروموسوم مع قسيم مركزي يتوضع قرب نهايته . مثل هذه الكروموسومات في البشر لها أذرع قصيرة تابعة تحمل مورثات الرنا (RNA) الريباسي .

الكروموسوم B **chromosome B**
انظر تحت chromosome .

الكروموسوم ثُنائيُ التَّكافُؤ **bivalent chromosome**
انظر تحت bivalent .

زَيغُ الكروموسوم **chromosome aberration**
انحراف حالة الكروموسوم عن تكوينه

منتصف الكروموسوم بحيث تصبح أطرافه متماثلة الطول .

كروموسوم وَسَطيُّ القُسَيم المَرْكَزيَ **metacentric chromosome**
كروموسوم مع قسيم مركزي يتوضع في المركز والأذرع تكون متساوية الطول .

كروموسوم مُتَقَدِّرِيّ **mitochondrial chromosome**
كروموسوم صغير مفرد دائري الشكل يتوضع داخل كل متقدرة ، ويكون قادرعلى تصنيع البروتين لاحتوائه على الرنا (RNA) الريباسي الرنا المرسال والرنا الناقل . يحمل كروموسوم المتقدرة مورثات لعدد (13) بروتين ، ويشكل قاعدة للوراثة الأموية . والبعض يعتبره الكروموسوم البشري رقم 25 بالإضافة إلى الكروموسومات رقم 22 الجسدية الأخرى والكروموسومان الجنسيان (Y ، X) .

كروموسوم تَفَتُّليٌّ **mitotic chromosome**
الكروموسوم الناتج عن عملية الانقسام الخلوي التفتلي . أي هو ال كروموسوم الموجود في الخلايا الجسدية حتى بعد انقسامها وتكاثرها .

كروموسوم أُحاديُّ القُسَيم المَرْكَزيَ **monocentric chromosome**
الكروموسوم الذي يحتوي على قسيم مركزي واحد .

كروموسومان لامُتَماثلاَن **nonhomologous chromosomes**
الكروموسومان اللذان يختلفان في عدد الجينات المحمولة عليهما كالكروموسوم الأول والكروموسوم الثالث ، أو غير ذلك من الأزواج الكروموسومية .

كروموسوم نُوَيِّيّ **nucleolar chromosome**
هذه الكروموسومات لها علاقة بإعادة تنظيم النويات خلال الطور الانتهائي من الانقسام الخلوي .

كروموسومات أود **odd chromosome**
انظر تحت sex chromosome .

انتقال قطعتين من كروموسومين غير متماثلين وتبادلهما في المواضع نتيجة تكسر متضاعف في كل منهما وتبادل القطع المنفصلة .

كروموسومات بَنات **daughter chromosomes**
اسم الشقوق الكروموسومية عندما تصل أقطاب الخلية في طور الصعود من الانقسام الخلوي .

كروموسوم ثُنائيُّ القُسَيم المَرْكَزيَ **dicentric chromosome**
كروموسوم شاذ البنية مع قسيمين مركزيين .

كروموسوم عرْسيّ **gametic chromosome**
كروموسوم الخلية الفردية (العروس) .

كروموسوم عمْلاَقة **giant chromosomes**
كروموسومات عملاقة في الخلية البيضية للعديد من الحيوانات الدنيا المصنفة مثل الفراشات الاسطوانية .

كروموسومات مُتَغايِرَةُ النَّمَط (=كَروموسومان جِنْسيَّان) **heterotypical chromosomes (=sex chromosmes)**
انَظرَ تحت sex chromosome .

كروموسومان مُتَماثلاَن (=كروموسومان مِثْليَّان) **homologous chromosomes**
توافق زوج من الكروموسومات ، واحد من كل أب ، في نفس الموضع المورثي و في نفس الترتيب .

كروموسومات فِرْجَونِيَّة **lampbrush chromosomes**
كروموسوم عملاق في الخلية البيضية والتي توجد في العديد من الحيوانات الدنيا المصنفة مثل الفرشاة الاسطوانية .

كروموسوم m **m-chromosome**
انظر تحت mitochondrial chromosome .

كروموسوم وَسَطيُّ القُسَيم المَرْكَزيَ **mediocentric chromosome**
أن يكون القسيم المركزي في كل كروموسوم في

واحد أو أكثر من الكروموسومات الإضافية والتي توجد بشكل غير ثابت في المجتمعات البرية لبعض أنواع محددة من الحيوانات . وهي ليست مطابقة لأجزاء المواضع النظامية للكروموسومات و لها بشكل واضح تأثير طفيف على النمط الظاهري . تسمى أيضاً (Accessory chromosome) .

كروموسوم طرفي القسيم المركزي **telocentric chromosome**

كروموسوم مع قسيم مركزي انتهائي ، لايشاهد بشكل طبيعي في الإنسان .

الكروموسوم W **W chromosome**

هو من الكروموسومات الجنسية لبعض الحشرات والطيور والأسماك ، حيث تكون الإناث متغايرة الأعراس (تملك الكروموسوم W ، Z) ، والذكور تكون متماثلة الأعراس (تملك فقط الكروموسوم Z) .

الكروموسوم X **X chromosome**

الكروموسوم الجنسي الأنثوي ، ويمثل الكروموسوم الجنسي المميز ويحمل بواسطة نصف الأعراس الذكرية وكل الأعراس الأنثوية في الذكر والأنواع متغايرة الأعراس الذكرية الأخرى .

الكروموسوم Y **Y chromosome**

هو الكروموسوم الجنسي الذكري ، والذي يمثل الكروموسوم الجنسي المميز و يحمل بواسطة نصف الأعراس الذكرية وليس في أي من الأعراس الأنثوية للذكر ، و في بعض الأنواع متغايرة الأعراس الذكرية الأخرى عندما يتم الاحتفاظ بالكروموسوم X المماثل .

كروموسوم الخميرة الاصطناعي **yeast artificial chromosome**

قطعة من الدنا (DNA) ، والتي تحتوي على أكثر من ألف كيلوقاعدة زوج و تمتلك قسيم مركزي وقسيم طرفي ، وتنتج في خميرة سكيراء البيرة . وهي تتيح استنساخ و عزل كمية أكبر من قطع الدنا (DNA) من تلك المحتمل أن

كروموسوم ph (= كروموسوم فيلادَلفيا) **ph chromosome (=Philadelphia chromosome)**

شذوذٌ في الكروموسوم 22 ، يتميز بقصر طول الأذرع الطويلة (الجزء المفقود عادةً ما يشكل إزفاء مع الكروموسوم 9) ويوجد في خلايا النقي في معظم المرضى المصابين بابيضاض الدم المزمن بالمحببات .

كروموسوم عَديدُ القُسَيمات المَرْكَزيَّة **polycentric chromosome**

كروموسَوم يحَتوي على أكثر من قسيم مركزي .

كروموسومات عَديدَةُ الخُيوط **polytene chromosomes**

حزم عملاقة من الخيوط الكروموسومية ، والتي توجد بشكل خاص في الغدد اللعابية لبعض الحشرات . تسمى أيضاً (Giant chromosome) .

كروموسوم حَلَقيّ **ring chromosome**

كروموسوم فقدَ كلتا نهايتيه (خبن) ثم اتحدت نهايتاه المكسورتان لتشكل الحلقة .

كروموسومات جِنْسيَّة **sex chromosomes**

الكروموسوماتَ التَي تترافق مع تحديد الجنس وتؤلف في الثدييات زوجاً غير متساوي من الكروموسومات (X ، Y) .

كروموسوم صَغير **small chromosome**

انظر تحت m- chromosome .

كروموسوم جَسَديّ **somatic chromosome**

كروموسوم الخليةَ المضاعفة في الجسم .

الكروموسوم الموسطاني **submetacentric chromosome**

الكروموسوم الموسطاني ، هو كروموسوم مع قسيم مركزي متوضع قريب من وسطه ، بحيث تكون أذرع الكروموسوم مختلفة عن بعضها في الطول .

كروموسوم علاَويّ **supernumerary chromosome**

العوامل الفيزيائية كالضوء والحرارة والضغط والمذيبات أو التبدلات الإلكترونية في المادة .

تنظيرُ الحالِبِ المُلوَّن **chromoureteroscopy**

(= تنظيرُ المثانةِ الملوَّن) (=chromocystoscopy)

انظر تحت chromocystoscopy .

التَّشخيصُ بتلوين البَول **chromourinography**

التشخيص بقياس شدة لون البول وزمن ظهور الصباغ في البول بعد حقن الصباغ للمريض .

سابقة بمعنى الزَّمَن **chron-**

طليعة مصطلحية تشير إلى الزمن .

سابقة بمعنى زمني **chron (0) -**


سابقة بمعنى زمني ، سابقة تشير إلى العلاقة مع الزمن .

الزَّمَنَة **chronaxia**

(أصغر زمن يحتاجه تيار كهربي لتنبيه العضلة)

انظر تحت chronaxy .

الزَّمَنَة **chronaxie**




الكروموسوم Y Y chromosome

تستنسخها الجراثيم .

الكروموسوم Z **Z chromosome**

انظر تحت W chromosome .



الكروموسوم X X chromosome

اصْطِباغُ المَني **chromospermism**

حالة ملونة من الحيوان المنوي .

مُعالجَة بالأضْواءِ المُلوَّنة **chromotherapy**

الاستخدام العلاجي للضوء لمناطق محددة من الطيف . تسمى أيضاً (Beam therapy) .

مُتلِفٌ للهيمُوجلوبين **chromotoxic**

مخرب للهيموجلوبين أو ناتج عن تخرب الهيموجلوبين .

اصْطِباغ الشَّعَر **chromotrichia**

متعلق باصْطِباغ الشَّعَر **chromotrichial**

مُوجِهٌ للَّون **chromotropic**

محول أو جاذب للون أوللصباغ .

توَجُّهٌ لونيّ **chromotropism**

تبدلات عكوسة في الألوان نتيجة التأثر ببعض

chroniosepsis **إنْتانٌ مُزْمِن**

أي عدوى بعامل جرثومي أو فطري ، والذي يأخذ طابع وعلامات الإزمان بطول فترة استمراريته وبقائه .

chrono- **سابقة بمعنى الزَّمَن**

سابقة تشير إلى وجود علاقة بالزمن .

chronobiologic (=chronobiological) **متعلق بعِلم البيولوجيا الزَّمَنِي**

متعلق بعلم البيولوجيا الزمني ، له علاقة بتأثيرات الزمن والنظم البيولوجي على أجهزة الحياة .

chronobiologist **اِخْتِصاصِيٌّ بعِلْم البَيولوجيا الزَّمَنِي**

الشخص المختص بدراسة علم البيولوجيا وعلاقته بتأثرات الزمن .

chronobiology **عِلْمُ البَيُولوجْيا الزَّمَنِي**

الدراسة العلمية لتأثير الزمن على الأجهزة الحيوية .

chronognosis **إدْراكُ الزَّمَن**

الإدراك الشخصي لمرور الزمن .

chronograph **مِخْطاطُ الزَّمَن**

أداة لتسجيل الفواصل الصغيرة للزمن .

chronohygiene **التَصَحُّحُ الزَّمَنِيّ**

معالجة اضطرابات النوم بسبب التغيرات الزمنية عند الطيران من بلد لآخر .

chronological age **العُمْرُ الزَّمَنِيُّ**

عدد سنوات الشخص التي عاشها ، وتستخدم بشكل خاص في القياسات النفسية كمعيار بالنسبة للسلوك والذكاء والقدرة على العمل وأداء الوظائف .

chronometer **ميقاتِيَّة**

قياس الزمن أو الفواصل الزمنية .

chronometry **قِياسُ الزَّمَن**

قياس ودراسة الوقت للعمليات العقلية .

mental chronometry **قياسُ زَمَنِ الأَحْداثَ النَّفْسِيَّة**

قياس و دراسة زمن الأحداث النفسية .

chronaximeter **مِقْياسُ الزَّمَنَة**

جهاز لقياس الزَّمَنَة (Chronaxie) أو (Chronaxia) ، وهي قياس مدة استثارة النسيج العصبي أو العضلي . ويتمثل بالطول الزمني للتنبيه الكهربائي الفعال ، وتعادل قوته ضعف القوة الدنيا المطلوبة لحدوث الاستثارة . أو أقل زمن كهربائي يحتاجه تنبيه العضلة . ويسمى أيضاً (Chronomyometer) .

chronaximetry **قِياسُ الزَّمَنَة**

عملية قياس أقل زمن لحصول التنبيه باستخدام مقياس الزمنة .

chronaxy **الزَّمَنَة**

أصغر زمن (الزمن الأنى) الذي يحتاجه تيار كهربائي للتدفق بفولطيه ضعف قرارة التيار لإحداث تقلصاً عضلياً .

chronic **مُزْمِن**

مستمر لمدة طويلة من الزمن .

chronic abscess **خُراجٌ مُزْمِن**

التقيح النسيجي الذي يدوم فترة طويلة ولا يشفى . ويكون محاطاً بنسيج ليفي عادة .

chronic disease **مَرَضٌ مُزْمِن**

صفة المرض المتميز بواحد أو أكثر من الخصائص التالية : يستمر ، ولا يختفي ، ويترك عجزاً بدرجات مختلفة ، وعامله الإمراضي غير قابل للتراجع ، ويتطلب جهداً تدريبياً خاصاً من المريض ليتلاءم معه ، كما يتطلب مراقبة ورعاية حتى فترة طويلة من الزمن .

chronic disease hospital **مُسْتَشْفَى الأَمْراض المُزْمِنَة**

المستشفى الذي يستقبل الحالات المزمنة من الأمراض ، والتي توفر جميع المرافق والخدمات التي تساعد على التدبير العلاجي للأمراض التي تحتاج إلى فترة طويلة من الرعاية التمريضية والطبية المديدة .

chronicity **إزْمان**

chronicle **الوَقائِع**

مدونة لنشر الوقائع التاريخية بالتسلسل .

إدراك اللون ويترافق غالباً بالرأرأة ونقص القدرة البصرية .

chrys- **سابقة بمعنى الذَّهَب**

طليعة مصطلحية تفيد معنى الذهب .

chrysalis **خادِرَة (أحدُ أطوار الحشَرات)**

خادرة (Pupa) بعض الحشرات ، خاصةً العث أو الفراشة .

chrysanthemum **الأقحوان**

جنس من الأزهار العشبية الحولية من عائلة ذوي الفلقتين ، موطنها البلقان و الشرق الأوسط ، وهي إحدى النباتات التي تم تصنيفها في جنس عاقر قرحا (Pyre thrum) وهي سبب شائع لالتهاب الجلد التماسي ، وتستخدم بودرة أزهارها كمبيد للحشرات والجرب و مصدر للبيرثرين .

chrysarobin **كريزارُوبين (دواءٌ للصُّداف)**

بودرة بلورية مكروية بنية أو صفراء برتقالية اللون ، وتتألف من مزيج أساسيات متعادلة مستخرجة من بودرة الجوا (Goa) ، هو منتج اختزالي لحمض الكريزوفانيك ، يستخدم موضعياً في معالجة مرض الصداف و أمراض الجلد المزمنة الأخرى .

chrysazin **كريزازين**

(=danthron) **(= دانترون)**

دانترون (Danthron) وهو دواء مسهل .

chrysene **كريزين**

هو مركب عطري هيدروكربوني رباعي الحلقة ، مسرطن ، مشتق من قطران الفحم بالتقطير ، ويستخدم في التركيب العضوي .

chrysiasis **تَذَهُّب**

1 ـ ترسب جسيمات الذهب في النسج كنتيجة للمعالجة الخلالية المديدة أو الزائدة بالذهب ، والتي تسبب بشكل شائع استجابات ضارة تتضمن مبدئياً التهاب الجلد ، التهاب الفم ، أو بيلة بروتينية خفيفة عابرة . تصيب السمية الجدية جهاز التكوين الدموي ، والكبد ، والكليتين ، والعينين (القرنية ، العدسة) ، أو

chronomyometer **مِقياسُ الزَّمَنَة**

انظر تحت chronometer .

chronon **كرُونون**

وَحْدَةٌ زَمَنِيَّةٌ لفَعاليَّات الجين .

chronophobia **رُهابُ الزَّمَن**

خوف شديد غير عاقل للزمن . وبسبب كونه شائع جداً في المساجين ، لذلك يسمى أحياناً بعصاب السجن (Prison neurosis) .

chronophotograph **صورَة تتابُعيَّة**

صورة فوتوجرافية تؤخذ بواسطة مصور الحركات (Kinetoscope) .

chronoscope **مِقياسُ الفترات الزَّمَنِيَّة الوَجيزَة**

أداة لقياس الفواصل الزمنية الصغيرة .

chronosphygmograph **مِخْطاطُ النَّبْض**

أداة لمراقبة نظم القلب بالإضافة إلى مراقبة مميزات النبض .

chronotaraxis **توَهانٌ زَمَنِيّ**

توهان زمني ، والذي يلاحظ كعرض عابر يتلو آفات تصيب المهاد أو الفص الجبهي .

chronotherapy **المعاجة بالزمن**

المعاجة بالزمن هي معالجة لبعض اضطرابات النوم بالاستفادة من تأخير الطور الطبيعي في البالغين . يتقدم زمن النوم بشكل متتابع من ساعة واحدة إلى عدة ساعات كل يوم حتى يصبح الفرد قادراً على الجلوس والنوم والاستيقاظ في الأوقات الملائمة .

chronotropic **مُؤثِّرٌ على الميقاتيَّة**

مؤثر على الزمن أو المعدل ، كمعدل عدد مرات تقلص العضلة القلبية .

chronotropism **التَّأثُّرُ بالمِيقاتيَّة**

تعديل انتظام الحركات المتواقتة ، كضربات القلب .

chrotoplast **خَلِيَّة جِلدِيَّة**

خلية أدمية أو خلية جلدية .

chrotopsia **خَلَلُ إدْراك الألْوان**

يسمى أيضاً (Chromatopsia) ، (Achromatopsy) ، وهو عوز خلقي شديد في

والحيوانات الأخرى كما هي الحال في داء النغاف الجلدي بالنبر في الماعز . يمكن أن يسبب أيضاً داء النغاف الشديد والمشوه في الإنسان . يسمى أيضاً الذبابة الذهبية المتحلزة المنكدة (Cochliomyia bezziana) .

الذبابة الذهبية الماسيلية **chrysomyia macellaria**

انظر تحت Cochliomyia hominivorax .

رَحلانٌ ذهبيّ **chrysophoresis**

الرَّحَلان الذي يستخدم أجهزة الرَّحَلان الكهربائية القديمة التي كانت تجعل مصعدها الكهربائي من الذهب .

ذهَبِيَّة العُيون (جنسٌ منَ الذّباب) **Chrysops**

جنس من الذباب الماص لدم الخيول في المناطق الحارة ، من عائلة النحرة (Tabanidae) .

ذَهَبِيَّةُ العُيون المُعَمِّيَّة **Chrysops cecutiens**

أنواع من الذباب تلدغ الإنسان قرب العينين والأنواع الأخرى من الحيوانات .

ذَهَبِيَّةُ العُيون المُتَنَاصِفَة **Chrysops dimidiata**

أنواع تتواجد في جنوب غرب أفريقيا و لها مضيف وسيط للوااللوائية . تسمى أيضاً ذبابة المانجو أو المانجروف (Mangrove fly) .

ذَهَبِيَّةُ العُيون القُرْصِيَّة **Chrysops discalis**

هو العامل الشائع الغالب للتولاريمية في الجزء الغربي من الولايات المتحدة . تسمى أيضاً بذبابة الأيل (Deer fly) .

ذَهَبِيَّةُالعُيون المُتَغَيِّرَة **Chrysops dispar**

المضيف المتوسط لداء اللوااللوائية (Loa Loa) .

ذَهَبِيَّةُ العُيون المُغْرِيَة **Chrysops silacea**

المضيف المتوسط لداء اللوااللوائية (Loa Loa) .

تذَهُّب **chrysosis**

يسمى أيضاً (Chrysiasis) ، وهي ترسبات الذهب في العين والنسج الأخرى نتيجة المعالجات الزائدة والمديدة بأملاح الذهب .

ذهَبِيَّة الأبْواغ **Chrysosporium**

(جنسٌ منَ الفطريّات)

جنس من الفطور الناقصة المصنفة تحت الأعضاء الحيوية الأخرى . تسمى أيضاً (Auriasis) .

2 ـ تذهب الجلد .

انظر تحت chrysoderma .

سابقة بمعنى الذَّهَب **chryso-**

سابقة تشير للعلاقة بالذهب .

تذَهُّبٌ جِلدِيّ **chrysoderma**

تظاهرة من تذهب الجلد ، والتي تتظاهر بتصبغ دائم رمادي ـ رمادي فاتح اللون دائم في الوجه ، والأجفان ، والمناطق الأخرى من الجسم المعرضة للشمس . تسمى أيضاً بتصبغ الجلد الذهبي(Aurochromoderma) ، والتذهب الجلدي (chrysiasis) .

العَسْجَدِيَّة **Chrysomonadina**

(رُتبَةٌ مِنْ ذواتِ السياط)

حيوان من الأوالي من رتبة حرة السباحة والسوطيات والأميبية الرئيسية واللدنات والشبيهات بالنبات وهي من البحرية و أوالي الماء العذب (زمرة السوائط النباتية ، شعبة السوائط) والتي تمتلك سوطين غير متساويين وصانعات اليخضور البنية مذهبة ، ولديها جدار كيسي سيليسي بشكل نموذجي . المتذايلة (Synura) هي الجنس الممثل لها .

الذُّبابَة الذَّهَبِيَّة **Chrysomyia**

(جِنسٌ مِنَ الذّباب)

جنس من الذباب من عائلة الخوتعيات ، يشاهد في إفريقيا و استراليا و أجزاء من آسيا . العديد من هذه الأنواع تضع بيوضها على الجروح أو الصوف ، مسببةً داء النغف الجلدي .

الذُّبابَةُ الذَّهَبِيَّةُ العَرْماء **Chrysomyia albiceps**

أنواع تتوزعَ بشكل واسع في آسيا و إفريقيا ، ويرقاتها تتواجد بشكل متواتر في جروح البشر (نغفة الصوف) والحيوانات الأخرى ، كما هي الحال في داء النغاف الجلدي بالنبر في الماعز .

الذُّبابَةُ الذَّهَبِيَّةُ المُنكَّدَة **Chrysomyia bezziana**

أنواع تتوزعَ بشكل واسع في آسيا وإفريقيا ، نغفها تتواجد بشكل متواتر في جروح البشر

ماريُوانا churganja

تسـمى أيضاً (Marihuana) ، وهو الاسم التجاري لنبات القنب الذي يستعمل مجففه للتدخين بما يعرف بالحشيش .

تحْضِيْن churning

غنْجا churus

تسمى أيضاً (Ganja) ، وهو تبغ النرجيلة .

علامة خفوستيك ـ فايس Chvostek-Weiss sign

[علامة منسوبة للطبيب شوفستك (F.Chvostek) والطبيب ناثان ويس (Nathan Wpiss) ، وهما طبيبين أسترالين 1851-1883] .

انظر تحت Ghvostek's sign .

علامَة خفوستيك Chvostek sign

[علامة منسوبة للطبيب فرانس سفوزتك (Franz Chvostek) ، وهو جراح أسترالي ، عاش ما بين 1835-1884] ، وهو تقلص في العضلات الوجهية يظهر بالقرع على العصب الوجهي في منطقة الغدة النكفية ، وترى في التكزز .

انظر تحت sign .

سابقة بمعنى الكَيْلوس chyl-

مصطلح يشير إلى معنى الكيلوس ، وهو حصيلة الهضم في الأمعاء . ومثله (chyli) ، (chylo) .

وَرَمُ الأوعِيَةِ الكَيلوسيَّة chylangioma

ورم ينشأ على حساب الأوعية اللمفاوية المعوية

الكيلوس المائي chylaqueous

يحتوي الكيلوس وفي نفس الوقت يكون سائل من الماء .

انظر تحت chylous hydrocele .

الكَيْلوس chyle

1 ـ سائل حليبي مصنوع من المرابض (الأوعية اللمفاوية المعوية) من الطعام في الأمعاء خلال عملية الهضم ، ويتألف من اللمف وقطيرات ثلاثي جليسريد (الكلومكرون) في مستحلب ثابت . هذا السائل يعبر إلى الأوردة بواسطة القناة الصدرية ليختلط مع الدم .

الفطريات الخوطية ، والتي منها فطور التربة المحبة للكيراتين ، التي لها علاقة بالفطار الجلدي . وبعض الأنواع تم عزلها من داء الفطار الجلدي .

المعالجَة بالذَّهَب chrysotherapy

المعالجة بأملاح الذهب ، تسمى أيضاً بالمداواة بالذهب (Aurotherapy) .

القرميد الذهبي chrysotile

هو الشكل الأوسع استخداماً للأسبست وهو عبارة عن ساليسيلات المغنيزيوم الرمادي المخضر في الصنف المتطوي للأسبست والذي من الممكن أن يسبب استنشاق غباره داء الأسبست ونادراً ورم المتوسطة وسرطانات الرئة الأخرى .

ذهَبيَّة النطاق Chrysozona

(جنْسٌ مِنَ الذُّباب)

انظر تحت Haematopota .

أكلُ الطين chthonophagia

يسمى أيضاً (Chthonophagy) ، (Geophagia) ، وهي ممارسة أكل الأوساخ والطين .

أكلُ الطين chthonophagy

انظر تحت chthonophagia .

مِقبَض chuck

مكان القبض على الأداة كمقبض طبيب الأسنان .

مِقْبَضٌ مَبْرِيّ taper chuck

مقبض ذو رأس مدبب .

خَزونة chunk

مَعْلومَةٌ يُمكِنُ اخْتِزانُها .

متلازمة شيرج ستراوس (=التهاب أوعية) Churg-strauss syndrome (=vasculitis)

[متلازمة منسوبة للطبيب جاكوب (Jacob Churg) أمريكي ولد 1910 . والطبيب لوت ستراوس (Lotte Strauss) ، وهو طبيب باثولوجيا أمريكي ولد 1913] . وهو التهاب الأوعية الورمي الحبيبي الأرجي .

انظر تحت syndrome .

chylomediastinum **وُجُوْدُ الكَيْلوس في المَنْصِف**

chylomicrograph **مِخْطاطُ الكيلومكرونات**

منحني المخطط الناتج عن إحصاء عدد الكيلومكرونات .

chylomicronemia **وُجودُ الكيلومكروناتِ في الدَّم**

فرط الدقائق الكيلوسية في الدم .

chylomicrons **كيلومكرونات**

صنف من البروتينات الشحمية التي تنقل الكوليستيرول و ثلاثي الجليسريد خارجي المنشأ (الغذائي) من المعي الدقيقة إلى الأنسجة بعد الوجبات . تتركب الكيلومرونات في المخاطية المعوية و تحمل بواسطة الأوعية اللمفاوية المعوية و الجهاز اللمفاوي إلى الدوران الدموي ، ثم تتدرك بعدها إلى الثمالات (البقايا) الكيلومكرونية في الأوعية الشعرية للعضلات والنسج الشحمية بواسطة شطر الغالبية العظمى من ثلاثي الجليسريد بواسطة ليباز البروتين الشحمي البطاني . لا تلبث هذه الثمالات أن يتم تصفيتها بواسطة الكبد عن طريق الالتقام المتواسط بالمستقبلات .

chylopericarditis **التِهابُ التَّأمور الكَيْلوسيّ**

التهاب التأمور الناتج عن انصباب الكيلوس في الكيس التأموري .

chylopericardium **وُجُوْدُ الكَيْلوس في التَّأمور**

وجود انصباب كيلوسي في التأمور ، والذي ينتج عادةً عن رضح القناة الصدرية .

chyloperitoneum **وُجُوْدُ الكَيْلوس في الصفاق**

حبن كيلوسي الشكل .

chylophoric **ناقِلُ الكَيْلوس**

انظر تحت chyliferous

chylopleura **وُجُوْدُ الكَيْلوس في الجَنْبَة**

وجود الكيلوس في الصدر أو الجنبة .

انظر تحت chylothorax .

chylopneumothorax **استِرْوَاحُ الصَّدْرِ الكَيْلَوسيّ**

وجود الكيلوس والهواء في الجوف الجنبي.

chylopoiesis **تَكَوُّنُ الكَيْلوس**

تشكل الكيلوس ، يسمى أيضاً (Chylifaction) ،

2 ـ سائل حليبي ، عكر يشبه ذلك الذي ينتج أثناء الهضم .

chylectasia **تمَدُّدُ الأوعِيَةِ الكَيْلوسِيَّة**

chylemia **وُجودُ الكَيلوس في الدَّم**

chylhidrosis **تَعَرُّقٌ كَيلوسيّ**

يسمى أيضاً (Chylidrosis) ، وهو حالة تعرق بعرق فيه من المادة الكيلوسية .

chyli- **سابقة بمعنى الكَيْلَوْس**

chylifacient **مُكَوِّنٌ للكَيلوس**

انظر تحت chylopoietic .

chylifaction (=chylopoiesis) **تَكَوُّنُ الكَيلوس**

انظر تحت chylopoiesis .

chylifactive **مُكَوِّنٌ للكَيلوس**

انظر تحت chylopoietic .

chyliferous **ناقِلٌ للكَيلوس**

1 ـ مكون الكيلوس .

انظر تحت chylopoietic

2 ـ ناقل الكيلوس .

chylification (=chylopoiesis) **تَكَوُّنُ الكَيلوس**

انظر تحت chylopoiesis .

chyliform **كَيلوسِيُّ الشَّكل**

كيلوسي الشكل ، ويسمى أيضاً (Chyloid) .

chylo- **سابقة بمعنى الكَيْلَوْس**

chylocele **قِيلَةٌ كَيلوسِيَّة**

انظر تحت elephantiasis scroti .

parasitic chylocele **قِيلَةٌ كَيلوسِيَّةٌ طُفَيلِيَّة**

chylocyst **كيسَةٌ كَيلوسِيَّة**

انظر تحت cisterna chyli .

chyloderma (=elephantiasis) **داءُ الفيل**

انظر تحت elephantiasis .

chyloid **شَبيهُ الكَيْلَوس**

chylology **عِلمُ الكَيلوس**

الدراسة العلمية للكيلوس ، وتكوينه والأمراض التي تنتج عن انسداد مساره الطبيعي .

كيلوسيّ **chylous**

يتعلق ب أو يختلط مع ، أو في طبيعة الكيلوس

بيلة كيلوسيَّة **chyluria**

وجود الكيلوس في البول معطية له المظهر الحليبي . والذي ينتج عن الانسداد في أي مكان ما بين الأوعية اللمفاوية المعوية و القناة الصدرية ، والتي بدورها تؤدي إلى حدوث تمزقاً في الأوعية اللمفاوية الكلوية إلى النبيبات الكلوية . يمكن أن تحدث كنتيجة لانسداد الأوعية اللمفاوية خلف الصفاق في داء الفيلاريات البنكروفتية . تسمى أيضاً البول الكيلوسي (Chylous urine) ، أو البيلة اللبنية (Galacturia) .

بيلَةٌ كَيلوسيَّةٌ مَداريَّة **chyluria tropica**

الكيلوس **chylus TA**

انظر تحت chyle .

كيماز (إنزيم في عصارة المعدة) **chymase**

إنزيم من صنف إنزيمات الهيدرولاز الذي يحفز حلمهة الروابط الببتيدية مع نوعية شبيهة لتلك الموجودة في الكيموتربسين . وهو بروتيناز السيرين ، ويتواجد في حبيبات الخلية البدينة .

الكيموس **chyme**

مادة جزئية السيولة ، متجانسة ، كريمية أو عصيدية الشكل تنتج عن الهضم المعدي للطعام . يسمى أيضاً (Chymus) .

الكيموكس **chymex**

الاسم التجاري لمستحضر البنتيرومايد (Bentiromide) .

تكوّنُ الكيموس **chymification**

تكون الكيلوس ، أو الهضم المعدي .

كيمُوبابائين **chymopapain**

إنزيم من صنف الهيدرولاز ، وهو ببتيداز داخلي للسيستيئين ، يحفز حلمهة البروتينات وعديد الببتيد . نوعيته تكون خاصة جداً بإنزيم البابايين وكلاهما يتواجد في اللاتكس لشجرة البابايا الإستوائية و البابايا الكاريكا . يستخدم (Chylification) .

مُكونُ الكيلوس **chylopoietic**

له علاقة بتشكل الكيلوس . يسمى أيضاً (Chylifactive) ، (Chylifacient) .

1 ـ ثَرُّ كيلوسيّ **chylorrhea**

2 ـ إسْهالٌ كيلوسيّ

1 ـ إفراز كيلوسي ، ناتج عن تمزق أو أذية القناة الصدرية .

2 ـ اسهال كيلوسي ، ناتج عن تمزق الأوعية اللمفاوية في الأمعاء الدقيقة .

التّكيلس (تحوُّلُ الدَّم إلى الكيلوس) **chylosis**

عملية تحول الطعام إلى الكيلوس (تكون الكيلوس) ، وامتصاصه إلى النسج .

وُجوُدُ الكَيْلوس في الصَّدْر **chylothorax**

انصباب جنبي يتألف من الكيلوس أو من سائل شبيه بالكيلوس . يوجد نمطان اثنان منه : *الانصباب الكيلوسي* ، وينتج عن تسرب الكيلوس من القناة الصدرية . *والتكون الكيلوسي أو الانصباب الكيلوسي الكاذب* ، ويتألف من سائل كيلوسي الشكل ناتج عن مرض مزمن مثل التدرن . يسمى أيضاً بوجود الكيلوس في الصدر (Chylopleura) ، واسترواح الصدر الكيلوسي (Chylous hydrothorax) ، والتهاب الجنبة الكيلوسي (Chylous pleurisy) .

وجود الكيلوس في الصدر الخلقي **congenital chylothorax**

هو انصباب كيلوسي ناتج عن بعض العيوب الخلقية في القناة الصدرية ، تصيب الأطفال والذين يمكن أن يموتوا بسبب سوء التغذية أو العدوى الجهازية .

وجود الكيلوس في الصدر الرضحي **traumatic chylothorax**

انصباب كيلوسي ناتج عن الأذية الرضحية للقناة الصدرية ، وتتضمن الأسباب : جراحة الأعضاء الصدرية أو الأوعية الدموية والرضح غير النافذ كفرط تمديد لشوكات السيساء .

تنضيـر الآفـات النخـرية وتقليل الالتـهـاب والوذمة . يعطى فموياً أو شدقياً أو عضلياً .

مُوَلِّدُ الكيمُوتربْسين **chymotrypsinogen**

طليعة إنزيم غير فعالة تفرز بواسطة البنكرياس وتشطر بواسطة التربسين في الأمعاء الدقيقة ليعطي إنزيم الكيموتربسين الفعال .

كيموسِيّ **chymous**

الكيموس **chymus**

انظر تحت chyme .

القدَيريَّات **Chytridiales**

رُتْبَةٌ مِنَ الفُطْرِيَّات .

الفطريَّاتَ القدَيريَّة **Chytridiomycetes**

صُنَيفٌ مِنَ الفُطْرِيَّات .

القدَيريَّة **Chytridium**

جِنْسٌ مِنَ الفطريات .

غدد تَشاتشو **Ciaccio's glands**

[غـدد منسـوبة للطـبيب كـرملو تـشـاتـشـو (Carmelo Ciaccio) ، وهو مـشـرح *ايطالي* ، *[1824-1901]* ، وهي *الغدد الدمعية الإضافية* .

انظر تحت glandulae lacrimales accessoriae .

طريقة تشاتشو، **Ciaccio's**
تلوين تشاتشو **method stain**

[طريقة منسوبة للطبيب جايزي فينكتروتشاتشو (Giuseppe Vincenzo Ciaccio) ، وهو مـشـرح *إيطالي [1877-1956* .

انظر تحت stains .

انظر تحت staining methods .

طعامِيّ **cibarian**

صـفـة لما يتـعلق بالطعـام ، أو أجـزاء من فم الحشرات . ويسمى أيضاً (Cibarious) .

طعامِيّ **cibarious**

انظر تحت cibarian .

مِبْضَعُ مِحفَظةِ العَدَسَة **cibisotome**
(=cystitome)

انظر تحت cystitome .

رُهابُ الطَّعام **cibophobia**

الخوف الشديد المرضي من تناول الطعام .

هذا الإنزيم لتكسير جزء البروتيوجليكان للنواة اللبيـة في معـالجة انفتاق الأقـراص الفقـرية بواسطة الحل الكيميائي للقرص الفقري .

تكوُّنُ الكيموس **chymopoiesis**

يسـمى أيضـاً (Chymification) ، وهو عـمـليـة هضم الطعـام النهـائي ومـآله إلى سـائل كـنهـاية للهضم المعدي .

ثَرُّكيموسِيّ **chymorrhea**

تفريغ أو تدفق الكيموس .

كيموسين **chymosin**
(= رينين) **(=rennin)**

1ـ إنزيم من صنف الهـيـدرولاز ، والذي يحفر تشطر تقـوم الرابطة الوحـيـدة في الكازين (بروتين في اللبن) لتشكل الباراكازين الذائب ، والذي يتـفـاعل لاحقاً مع الكالسيـوم ليـشكل البـاراكـازين الرائب وغيـر الذائب . يوجـد في المعدة الرابعة للعجل وبقية المجترات . المستحضر التجـاري منه هو المنفـحة (الإنفحة) يستخـدم لتحضير الأجبـان ومنتجـات الألبان الأخرى . يسـمى أيضـاً (Rennin) (يجب ألا يـختلط مع الرينين) .

مُوَلِّدُ الكيموسين **chymosinogen**

انظر تحت prochymosin .

كيمُوترِبْسين **chymotrypsin**
(إنزيم ببتيدي بنكرياسي)

1ـ ببتيداز داخلية السيرين تقوم بشطر الروابط الببتيدية بشكل تفضيلي في جهة الكربوكسيل من الحمض الأميني مع ثمالات ضخمة كارهة للمـاء ، خصـوصـاً التيـروزين والتريبتـوفـان والفـينيل ألانين واللوسين . وهو يفـرز من قبل البنكرياس كطليـعة إنزيم غـيـر مـفـعلة لمولد الكيموتربسين .

2ـ إنزيم حـال للبروتين على شكل مستحضر بلوري من خـلاصـات بنكرياس الثـور ، والذي يسـتخـدم لخاصيـته الإنزيمية كـحل النطقيـة (Zonulolysis) في استـخـراج العـدسة العينية داخل المحفظة . وقـد تم استـخدامـه أيضـاً في

cicatrectomy **اسْتِئْصالُ النَّدْبَة**
(=ulectomy)

cicatrices **ندوب؛ ندبات**
(sing cicatrix) **(ف: ندبَة)**
انظر تحت cicatrix .

cicatricial **ندبيّ**
ندبي أو له طبيعة الندبة .

cicatricotomy **بَضْعُ النَّدْبَة**

cicatricule **ندَيبَة**
ندبة أو تشكل ليفي صغير المقدار والحجم يمثل شفاء لجرح أو تخرب جلدي نسيجي .

cicatrix **ندبَة**
(pl.cicatrices) **(ج: ندبات؛ ندوب)**
انظر تحت scar .

filtering cicatrix **نَدْبَةٌ راشِحَة**
ندبة تتلو عملية الزرق ، ومن خلالها يفلت الخلط المائي .

hypertrophic cicatrix **نَدْبَةٌ ضَخامِيَّة**
ورم قاس صَلب يتشكل بتضخم نسيج الندبة .

manometric cicatrix **نَدْبَةٌ تَضاغُطِيَّة**
ندبة صغيرَة في طبلة الأذن نتيجة انثقابها بفرط الضغط داخل الأذن الوسطى .


vicious cicatrix **نَدْبَةٌ مَعيبَة**
ندبة تسبب تشوهاً أو خللاً في وظيفة الأطراف .

cicatrizant **مُندب**
عامل يحرض التندب .

cicatrization **تَنَدُّب**
تشكل الندبة .

cicatrize **يَتَنَدَّب**
الشفاء بواسطة تشكل الندبة .

Cicer **جنس من النباتات**
جنس من النباتات من عائلة القرنيات (سنفيات) ، موطنها جنوب أوربا و أجزاء من آسيا .



Chymosin **الكيموسين**

المداري مثل أسماك الجروبر والسنابر ، والتي تحتوي على السم في نسجها . هذا المصطلح كان يطلق سابقاً على كل أنماط التسمم بالأسماك في غرب الهند .

سم السيجواتا **ciguatoxin**

سم لحمي سمكي ثابت بالحرارة يفرز من دوامي السياط جامبرديسكس السامة (Gambierdiscus toxicus) ، والذي يتركز في النسج لبعض الأسماك البحرية . وهي تؤثر على قنوات الصوديوم ، وهي السبب الرئيسي للتسمم بالأسماك المدارية .

سيلاستاتين الصوديوم **cilastatin sodium**

مثبط ثنائي الببتيدازالكلوي ، والذي يحصر استقلاب الإيميبنيم(Imipenem) يستخدم كتوليفة مع الإيميبنيم لزيادة المستويات الكلوية من الإيميبنيم . المستحضر الرسمي هو سيلاستين الصوديوم العقيم .

أهْداب **cilia**

(ف: هُدْب) **(sing.cilium)**

1ـ أهداب العين : الأشعار التي تنمو على حواف الأجفان .

2ـ الزوائد المهتزة الدقيقة الشبيهة بالشعر التي تبزغ من السطح الحر للخلايا ، والتي تتكون من تسعة أزواج من النبيبات الدقيقة التي تنتظم حول الزوج المركزي . يكون امتدادها من الأجسام القاعدية و تتحرك بحركات منتظمة (الحركات الهدبية) ، بذلك تقوم بتحريك الخلية حول محيطها أو بتحريك السائل أو الفلم المخاطي فوق السطح الخلوي .

انظر تحت flagellum .

انظر تحت mucociliary clearance .

1ـ العَضَلَة الهُدَبِيَّة **ciliaris**

2ـ هُدَبِيّ

انظر تحت muculus .

مِنْظارُ الجِسْمِ الهُدَبِيّ **ciliariscope**

أداة لفحص المناطق الهدبية للعين .

بَضْعُ الجِسْمِ الهُدَبِي **ciliarotomy**

سِيكلافرين **ciclafrine**

دَواءٌ رافِعٌ لِضَغْط الدَم .

سِيكلوبيرُوكْس (مُضادٌ لِلفطريَّات) **ciclopirox**

مضاد فطري واسع الطيف مع فعالية شبيهة لتلك التي يتمتع بها الإيميدازول ، يستخدم في معالجة الأمراض الجلدية المعدية المتسببة عن الكائنات الحية الحساسة له . يطبق موضعياً .

سِيكلوبروفين **cicloprofen**

دَواءٌ مُضادٌّ للالتهاب .

شَوْكران **Cicuta**

(جنسُ نباتٍ مِنَ الفصيلةِ الخَيمِيَّة)

نبات الشوكران المائي ، وهو جنس من نباتات عائلة الخيميات التي تحتوي على سم الشوكران ، والذي يعتبر ساماً للانسان و المواشي .

الشَّوكَرانُ الأَبْقَع **Cicuta maculata**

هو نبات الشوكران المائي الأمريكي ، والذي يملك سم الشوكران في جذوره .

الشَّوكَرانُ المُنْتِن **Cicuta virosa**

هو نبات الشَوكران الأوربي .

سُمُّ الشَّوكران **cicutoxin**

كحول عالي التركيز غير مشبع ، فائق السمية ، ويوجد في أنواع نباتات الشوكران . يسبب فرط النشاط في الجهاز العصبي المركزي مع اختلاجات وفشل تنفسي في الانسان والحيوانات الأخرى .

سيدكس **cidex**

ماركة تجارية لمستحضر الجلوتارألهيد .

سيدوفيفر **cidofovir**

مضاهيء نوكليوزيدي مضاد للفيروسات يستخدم لمعالجة التهاب الشبكية بالفيروس المضخم للخلايا في المرضى المصابين بمتلازمة عوز المناعة المكتسب ، ويعطى بالتسريب وريدياً

تَسَمُّمٌ بالأَسْماكِ المَدارِيَّة **ciguatera**

شكل من التسمم بالسم اللحمي السمكي ، والذي يتميز بظهور أعراض هضمية وعصبية ناتجة عن تناول السمك البحري المداري وشبه

النوى، ونواة كبروية ونواة صغيرة (مع استثناءات نادرة) فإن الفجوة القلوصة تكون موجودة بشكل نموذجي. تتضمن الجنسانية الالتحام والإعراس الذاتي والخلوي. معظم المهدبات تعيش حرة وبعضها مُطاعمات للفقاريات واللافقاريات، وبَعض الطفيليات، تتشكل الشعبة من ثلاث أصناف هي (Kinetofragminophorea)، (Polyhymen- ophorea)، (Oligohymenophorea).

ciliophoran **هادِب (حيَوانٌ مِنَ الهَوادِب)**

كائن حي من الأوالي من شعبة الهوادب.

cilioretinal **هَدَبِيٌّ شَبَكِيّ**

يتعلق بالشبكية والجسم الهدبي بالعين.

cilioscleral **هَدَبِيٌّ صُلبَوِيّ**

يتعلق بالجهاز الهدبي وصلبة العين.

ciliospinal **هَدَبِيٌّ نُخاعِيّ**

يتعلق بالجسم الهدبي والحبل النخاعي.

انظر تحت center.

انظر تحت reflex.

ciliotomy **قَطعُ الأعصابِ الهَدَبِيَّة**

القطع الجراحي للأعصاب الهدبية.

cilium TA **هَدَب**

(pl.cilia) **(ج: أهْداب)**

1 ـ الهدب الواحد.

2 ـ المصطلح القديم للحافة الخارجية للجفن.

cilium inversum **هَدَبٌ مُنْقَلِب**

اتجاه الهدَب العيني باتجاه للداخل، فيخرش الملتحمة أو القرنية ويسبب التهابهما واحمرار العين وحكتها.

olfactory cilium **هَدَبٌ شَمِّيّ**

انظر تحت hair.

cillo **ارْتِجافُ الجَفْن**

(=cillosis)

انظر تحت cillosis.

Cillobacterium **الجراثيم الهدبية**

نظام شكلي للتصنيف، وهو جنس من الجراثيم من عائلة العصيات اللبنية تشكل عضيات

البضع الجراحي للمنطقة الهدبية في الزرق.

ciliary **هَدَبِيّ**

1 ـ يتعلق أو يشبه الهدب.

2 ـ يتعلق بأهداب العين.

ciliastatic **موقِفُ الأهْداب**

صفة منسوبة إلى الدواء أو الحالة التي تسبب توقف أو تباطؤ شديد في أهداب القصبات أو السبل التنفسية بشكل عام.

Ciliata **المهَدَّبات**

نظام رسمي للتصنيف، فصنف الهوادب تتضمن تلك الأوالي التي تتميز بوجود الأهداب خلال كامل دورة حياتها.

ciliate **1 ـ مُهَدَّب**

2 ـ هَدَبِيّ

1 ـ تملك أهداباً.

2 ـ أي كائن من الأوالي من شعبة الهوادب (الهادب).

ciliated **مُهَدَّب**

مزود بالأهداب أوخمل من الأشعار.

ciliated epithelium **ظِهارَةٌ مُهَدَّبَة**

ciliectomy **1 ـ قَطعُ الجِسْمِ الهَدَبِي**

2 ـ قَطعُ الحافَة الهَدَبِيَّةِ في الجفن

1 ـ قطع جزء من الجسم الهدبي.

2 ـ قطع الحافة الهدبية من الجفن مع جذور الأهداب.

ciliocytophoria **تهَتُّكُ الخَلايا المهَدَّبَة**

فقدان الثلث القاصي من الخلية المهدبة مع أهدابها مع تهتك في النواة.

ciliogenesis **تكَوُّنُ الأهْداب**

تشكل أو تكون الأهداب.

Ciliophora **الهَوادِب (شُعْبَة مِنَ الأوالِي)**

شعبة من الأوالي تتميز بوجود الأهداب أو بنى هدبية مركبة مثل العضيات التحركية أو الجامعة للطعام في بعض الأوقات من دورة حياتها، إن تحت الهدبيات تحت الجليدية المكونة من الأجسام القاعدية الهدبية والروابط الحركية (حتى في غياب الأهداب)، ونوعين من

فـراش بق مسطح ، بيضـوي الشكل ، أحمـر اللون يصـيب الإنسـان بالعـدوى في المناطق المدارية . يسمى أيضاً بق نصفي الجناح (Cimex hemipterus) .

بقّة **cimex**

(ج: بقّ؛ بقّات) **(pl.cimices)**

جنس من الحـشـرات (بق الفـراش) من عـائلة البقيات .

بقّ؛ بقّات **cimices**

(ف: بقّة) **(sing.cimex)**

وهو طفيلي حشري منه بق الفراش(Bedbug) والذي يسمى علمياً (Cimex lectularius) ، وهو ذات أجنحة مسطحة حمراء بنية وعينان جانبيتان.

بقّيّ **cimicid**

يتعلق بالحشرات من عائلة البقيات .

البقيّات (فصيلة من الحشرات) **Cimicidae**

عائلة من الحشـرات عديمة الأجنحة ، ماصة الدم ، نصفية الأجنحة ، تصنف تحت رتيبة متغايرات الأجنحة (Heteroptera) وتتضمن بق الفـراش والأشكال المتعلقة به . إن بق الطثرة والبق النحيف و بق الضمجة هي أجناس هامة طبياً .

طاردُ البقّ (جنسٌ من النباتات) **Cimicifuga**

جنس من النبـاتات من عـائلة الحـوذان (Ranunculaceae) ، وهو جذر الأفعى الأسود أو نبات الكوهوش الأمريكي و له جذيرات لها فعالية مقوية و مضادة للتقلص .

حِكّة البقّ؛ بقاق **cimicosis**

الحكة الجلدية الناتجة عن عضة بق الفراش .

سابقة بمعنى الحرَكة **cin-**

فِقدانُ الحِس الحرَكي **cinanesthesia**

يسمى أيضاً (Kinanesthesia) ، (Cinanesthesia) ، وهو حالة اضطراب الحس العميق فلا يوجد قدرة على إدراك حس الاتجاه ودرجة الحركة ويؤدي ذلك إلى الرنح .

سينانسيرين **cinanserin**

لابوغية ، لا حيوائية ، إيجابية الجرام عصوية الشكل . هذه العضيات قد حددت حالياً بجنس الجراثيم الحقيقية .

ارْتِجافُ الجفْن **cillosis**

الاهتزاز التقلصي للجفن . يسمى أيضاً (Cillo) .

الحِباك (شَريطٌ أبْيَضُ على السَّاقِ المخيَّة) **cimbia**

شريط أبيض يتحرك عبر السطح البطناني للساق المخية .

سيميتيدين (دَواءٌ لِقرْحَةِ المِعدة) **cimetidine**

مضاد للمستقبلات الهيستامينية H_2 ، والتي تثبط إفراز الحمض المعدي كاستجابة لكل المنبهات ، وهو فعال بشكل خاص في معالجة القرحة الهضمية ، يعطى فموياً ووريدياً بالتسريب الوريدي .

هيدروكلوريد السيميتيدين **cimetidine hydrochloride**

ملح أحادي الهيدروكلوريد للسيميتيدين ، يملك نفس الفعالية والاستخدامات ، يعطى فموياً و وريدياً وعضلياً .

البقّ (جنس من الحشرات) **Cimex**

هو جنس من الحشرات ، ويسمى أيضاً بق الفراش (Bedbug) ، من عائلة البقيات .

البَقُّ البُويتيُّ **Cimex boueti**

بق الفراش المداري لغرب إفريقيا و جنوب أمريكا . يسمى أيضاً (Leptocimex boueti) .

البَقُّ الأنْصفُ **Cimex hemipterus**

انظر تحت cimex rotundatus .

البَقُّ الفراشيُّ **Cimex lectularius**

بق الفراش الشائع ، والذي يصيب الإنسان بالعدوى في المناطق المعتدلة . يسمى أيضاً ببق الفراش الشوكي (Acanthial lectularia) .

البَقُّ الأشْعَر **Cimex pilosellus**

نوع أمريكي من البق يتواجد في الخفاش .

البَقُّ الوَطْواطيُّ **Cimex pipistrella**

أنواع تنقل داء مثقبيات الخفاش .

البَقُّ المُقبَّب **Cimex rotundatus**

دَواءٌ مُضادٌ للفُصام .

cinching — **تخَبُّن (تقصيرُ عضَلَةِ العَين بطيها)**

Cinchona — **الكينا (جنس من الأشجار)**

جنس من النباتات الأمريكية الجنوبية من عائلة (Rubiaceae) ، وهو مصدر اللحاء الدوائي يسمى الكينا . غالبية أنواعها تستخدم طبياً .

cinchona — **كينا (لحاء شجر الكينا)**

1 ـ أي نبات من جنس الكينا .

2 ـ اللحاء الجاف من ساق أو جذر الأنواع المختلفة من نبات الكينا ، والذي يشكل مصدر هام طبياً للكينولين قلوي الكينين ، والكينيدين و السينكونين . والذي كان يستخدم لفترة من الزمن بشكل واسع كدواء مضاد للملاريا ، ولكن حالياً تم استبداله بشكل كبير بقلوانيته . يسمى أيضاً بلحاء الكاليسايا (Calisaya bark) ، أو لحاء الكينا (Cinchona bark) ، ولحاء يستوعي (Jesuit's bark) ، ولحاء بيرو (Peruvian bark) ، والكينا (Quinquina) .

cinchonidine — **سِينكونيدين (دَواءٌ مُضادٌ لِلمَلارْيا)**

هو قلواني الكينا ، والذي يستخدم كمضاد للملاريا ، وبشكل رئيسي في شكل ملح السلفات ، يعطى فموياً .

cinchonine — **سِينكونين (دَواءٌ مُضادٌ لِلمَلارْيا)**

هو قلواني الكينا ، يستخدم كمضاد للملاريا ، وبشكل رئيسي في شكل ملح السلفات ، يعطى فموياً .

cinchoninic acid — **حمض السِينكونينيك**

كينولين -4- حمض الكربوكسيليك ، وهو منتج مؤكسد من قلوانيات الكينا .

cinchonism — **التَّسَمُّمُ بالكينا**

تسمم يحدث بالاستخدام الطائش (غير الحكيم) للحاء الكينا أو قلوانياته ، يتميز بحدوث غثيان وقيء وصداع و طنين وصمم وأعراض احتقان الدماغ والدوار واضطرابات إبصارية .

cinchophen — **سِينكوفين**

دَواءٌ مُسكِّنٌ ومُضادٌ للحُمَّى .

cinclisis — **تراجُف (حركة سريعة ومتكررة)**

حركات سريعة ومتكررة ، مثل التنفس السريع أو المشي السريع .

cine- — **1 ـ سابقة بمعنى السينما**

2 ـ سابقة بمعنى الحَرَكة

(=kine-)

شكل اتحادي يشير إلى العلاقة مع الحركة .

cineangiocardiography — **تصْويرُ القلبِ والأوعيةِ السينَمائِيُّ**

تسجيل فوتوجرافي لصورة التنظير التألقي للعضلة القلبية والأوعية الدموية الكبيرة بتقنيات التصوير الحركي (الفيلم السينمائي) .

cineangiograph — **صورة الوعاءِ السينَمائيَّة**

تصوير الأوعية السينمائي بالمنظار التألقي .

cineangiography — **تصْويرُ الأوعِيةِ السينَمائيُّ**

تصوير الأوعية الدموية بالمنظار التألقي باستخدام تقنيات التصوير الحركي .

radionuclide cineangiography — **تَصْويرُ الأوعيَة السِّينَمائيُّ بالنُّوكليداتَ المُشعَّة**

cinedensigraphy — **تصْويرُ الأحْشاءِ السينَمائيُّ**

تصوير حركات البنى الداخلية للجسم باستخدام الأشعة السينية والخلايا الحساسة للأشعة .

cine-esophagogram — **صورة المَريءِ السينَمائيّة**

تصوير المريء بصور متحركة أثناء التنظير الهضمي .

cinefluorography — **تصْويرٌ تنْظيريٌّ سينَمائيّ**

(=cineradiography)

انظر تحت cineradiography .

cinemascopia — **دراسةُ الحَركاتِ سينَمائيًا**

دراسة الصور والأشكال (Cinemascopy) ببطء وبسرعة وللأمام والخلف حتى تدرس جميع المظاهر والظواهر التي يتضمنها الفلم . ويسمى أيضاً (Cinemascopy) .

cinemascopy — **دراسةُ الحَركاتِ سينَمائيًا**

انظر تحت cinemascopia .

cinematics — **عِلْمُ التَّحْريك**

cineplasty رأبٌ ضامِنٌ للحرَكَة
(=kineplasty)
انظر تحت kineplasty .

cineraceous سِنْجابيّ
صفة للتشبيه بلون يشبه لون الرماد .

cineradiofluorography تصوير شعاعي سينمائي
تصوير تنظيري سينمائي .

cineradiography تَصْويرٌ تَنْظيريٌ سينَمائِيّ
تسجيل صور حركية لصور متتابعة تظهر على المسح بالمنظار التألقي . يسمى أيضاً بالتصوير التألقي السينمائي والتصوير التنظيري السينمائي (Cinematoradiography) .


كينا (لحاء شجر الكينا) cinchona

cinerea المادّةُ السِّنْجابِيَّة (لِلجهاز العَصَبي)
المادة الرمادية للجهاز العصبي .

cinereal سِنْجابيّ
يتعلق بالمادة الرمادية للدماغ والجملة العصبية .

(=kinematics)
انظر تحت kinematics .

cinematization رأبٌ ضامِنٌ للحرَكَة
(=kineplasty)
انظر تحت kineplasty .

cinematography تَصْويرٌ تَنْظيريٌ سينَمائِيّ
(=cineradiography)
انظر تحت cineradiography .

cinematoradiography تَصْويرٌ تَنْظيريٌ سينَمائِيّ
(=cineradiography)
انظر تحت cineradiography .

cinemicrography تَصْويرٌ سينَمائِيٌ مِجْهَرِيّ
أخذ صور متحركة للأجسام الصغيرة تحت عدسات المجهر .

time-lapse cinemicrography تَصْويرٌ سِينَمائيٌ مِجْهَرِيٌّ مُتَبَاطِىء
أخذ صور حركية لأجسام دقيقة خلال الفحص المجهري بشكل متباطئ من السرعة الطبيعية ، بحيث يظهر عرض الصور المتحركة على الشاشة بالسرعة الطبيعية حركات الجسم أكثر سرعةً .

cineol سينيول
(=eucalyptol) (= يُوكالِيبْتول)
دواء طارد للبلغم .

cinepazet سينيبازيت (دَواءٌ مُوَسِّعٌ لِشَرايين القلب)
دواء موسع لشرايين القلب الإكليلية ، والذي استخدم في معالجة الذبحة الصدرية التالية للجهد .

cinephlebography تَصْويرُ الأوردَةِ السينَمائِيُّ
تصوير الأوردة السينمائي بعد إعطاء المادة الظليلة . في الصعود الوظيفي ، فإن المادة الظليلة تدخل الوريد في القدم ويراقب تقدمها بدخولها أوردة الظنبوب و المأبض والفخذ والحرقفة .

cineplastics رأبٌ ضامِنٌ للحرَكَة
(=kineplasty)
انظر تحت kineplasty .

cineritious **سِنْجابيّ**
(=cineraceous)
سنجابي ، رمادي ، لون الرماد .

cineroentgeno-fluorography **تصْويرٌ تنْظيريٌ سينَمائيّ**
يسمى أيضاً (Cineroentgenography) ، وهو استخدام أدوات التصوير السينمائي في الفحص الذي يتطلب التقاط صور الأشياء المدروسة ، وهي متحركة .

cineroentgenography **تصْويرٌ تنْظيريٌ سينَمائِيّ**
انظر تحت cineroentgenofluorography .

cinesalgia **ألمُ العَضَلةِ التَحَرُكيُّ**
ألم العضلة عند بداية تقلصها .

cinesi- **سابقة بمعنى الحرَكة**
(=kinesi-)

cineto- **سابقة بمعنى الحرَكة**
(=kineto-)

cineurography **التَّصْويرُ السينَمائيُ للجهازِ البَولِي**

cingestol **سِينْجيستول**
مادة بروجستينية .

cingula **أحْزِمَة**
(sing.cingulum) **(ف: حزام)**

cingulate **يحزم**
يتعلق بالحزام .

cingule **حزام**
انظر تحت cingulum .

cingulectomy **اقتِطاعُ التّلفيفيْن الحزامِيَّيْن**
استئصال ثنائي الجانب للنصف الأمامي من التلفيف الحزامي .

cingulotomy **بضع التلفيف الحزامي**
ابتكار ، بإدخال مساري كهربية بالتوضيع التجسيمي إلى الآفات في التلفيف الحزامي لتخفيف الألم المعند وفي معالجة الاضطرابات النفسية والإدمان .

cingulum TA **حزام**
(pl.cingula) **(ج: أحْزِمَة)**
1 ـ جزء أو تركيب مطوق ، أي شيء يحيط أو يطوق الجسم . يسمى أيضاً بالحزام (Cingule) .
2 ـ حزمة من الألياف المرافقة ، والتي تحيط بالجسم الثفني بشكل جزئي بحيث لا تكون بعيدةً عن المستوى الناصف ، والألياف التي تصل ما بين التلفيف الحزامي والتلفيف الحصيني .
3 ـ الفص اللساني للأسنان الأمامية ، والمشكل لكتلة الثلث العنقي للسطح اللساني ، ويسمى أيضاً العنق اللساني القاعدي والحافة اللسانية اللثوية (Linguogingival ridge) .

cingulum athleticum **حزامُ الرِّياضيّ**
تشوه بالصَدر في موقع ارتكاز الحجاب .

cingulum dentis NA **حزامٌ سِنِّيّ**
يَسمَى أيضاً (Basal ridge) ، (Cingulum of tooth) ، (Lingual lobe) ، وهو حافة على شكل حرف U أو W في قاعدة السطح اللساني من القواطع العلوية والأنياب . وتسير الأطراف الجانبية مسافات قصيرة على طول الزوايا السنية الخطية الدانية وأما القسم المركزي فيكون فوق اللثة مباشرة .

cingulum extremitatis inferioris **حزامُ الطَرَفِ السُّفْليّ**
يسمَى أيضاً (Cingulum membri inferioris) ، وهو الحزام الحوضي (Pelvic girdle) ، وتتشكل الحلقة العظمية فيه من العظام الوركية والعجز والتي ترتبط بها الأطراف السفلية .

cingulum extremitatis superioris **حزامُ الطَّرَفِ العُلْويّ**
يسمَى أيضاً (Cingulum membri superioris) ، وهو الحزام الكتفي (Shoulder girdle) ، (Thoracic girdle) ، وهي حلقة عظمية غير تامة من الخلف بحيث تخدم في ارتباط ودعم الطرف العلوي وتتألف من قبضة القص والترقوة وعظم الكتف (لوح الكتف) .

cingulum hemispherii **حزامُ نصفُ الكُرَةَ المُخيَّة**
يسمى أيضاً التلفيف الحزامي (Gyrus cinguli) ،

(=ستايرين) (=styrene)

انظر تحت styrene .

القِرْفة (نبات من الفصيلة الغارية) **Cinnamomum**

جنس من نباتات دائمة الخضرة من فصيلة إكليل الغار (Lauraceae) ، موطنها آسيا . إن خشب الكافور هو مصدر الكافور ولحاء اللواري (Loureirii) ، هو مصدر القرفة .

قِرْفة (نبات من الفصيلة الغارية) **cinnamon**

اللحاء الجاف للقرفة ، يحتوي في كل (100) جرام ، ليس أقل من (2.5 ملي لتر) من الزيت الطيار ، ويستخدم كمنكه في المستحضرات الدوائية .

سيناريزين (دَواءٌ مُضادٌ للدُّوار) **cinnarizine**

دواء مضاد للهيستامين ، يستخدم في معالجة الغثيان والدوار المترافق مع الاضطرابات التيهية ، وفي الوقاية ومعالجة داء الحركة (داء السفر) .

سنتازون **cinnopentazone**

يسمى أيضاً سِنْتازون (Cintazone) ، وهو دَواءٌ مُضادٌّ للالْتِهابَ .

اللهائية **cinoella**

جنس من القواقع الأرضية من عائلة اللهائيات (صنف من الحلزونات) . والتي تلعب دور المضيف للدودة المثقوبة الكبدية ومتفرعة المعي المتغصنة في أمريكا الشمالية .

عِلْمُ حَرَكاتِ الجِسْمِ **cinology**

(=kinesiology)

انظر تحت kinesiology .

مِقْياسُ حَرَكاتِ الجِسْمِ **cinometer**

(=kinesiometer)

الهيولى الحركية **cinoplasm**

انظر تحت kinetoplasm .

سِينُوكزاسين (مُضادٌّ لِلجَراثيم) **cinoxacin**

عامل مضاد جرثومي كينولوني واسع الطيف ، يعطى فموياً .

سِينُوكزات **cinoxate**

(مادَّة حاجِبَة لِلأَشِعَّةِ فوقَ البَنَفْسَجِيَّة)

وهو تلفيف طويل منحن من السطح الناصف ، ويصبح قوسياً فوق الجسم الثفني ومنها ينفصل عنه بواسطة ثلم الجسم الثفني العميق بينما يقترن مع التلفيف المجاور للحصين ومعه يستمر خلف الجسم الثفني مشكلاً التلفيف القبوي .

حزامُ الطَّرَفِ السُّفْلِيُّ **cingulum membri inferioris TA**

انظر تحت cingulum pelvicum .

حزامَ الطَّرَفِ العُلْوِيُّ **cingulum membri superioris TA**

انظر تحت cingulum pectorale .

الحزام الصدري **cingulum pectorale**

بناء عظمي يحيط و يدعم الأطراف العلوية مشكلاً عظام الترقوة والكتف ، يتمفصل مع بعضها البعض مع عظم القص والعمود الفقري بشكل منتظم . يسمى أيضاً بحزام الطرف العلوي و الحزام الكتفي .

الحزام الحوضي **cingulum pelvicum**

بناء عظمي يحيط و يدعم الأطراف السفلية ، ويشكل عظم الورك ، ويتمفصل مع بعضها البعض و مع العجز ليكمل الحلقة العظمية الأساسية القاسية . يسمى أيضاً بحزام الطرف السفلي .

بَضْعُ التَّلْفيفِ الحِزامِي **cingulumotomy**

انظر تحت cingulotomy .

سينامالديهيد (عامِلٌ مُنَكه) **cinnamaldehyde**

سائل أصفر اللون زيتي مع رائحة قرفة قوية ، تستخدم كعامل منكه .

سينامين **cinnamene**

(= ستايرين) (=styrene)

هو الستايرين ، وهو مادة لدنة تستخدم في صناعة البلاستيك .

حمض السيناميك **cinnamic acid**

حمض عطري ، حمض الفينيل أكريليك ، يوجد في القرفة والبلسم وفي الراتنجات العطرية الأخرى .

سينامول **cinnamol**

أداة المشرط الجراحي المستعمل في قطع اللهاة .

بَضْعُ اللَّهاة **cionotomy**

عملية قطع اللهاة جراحياً .

سيبرو **cipro**

الماركة التجارية لمستحضر هيدروكلوريد السيبروفلوكساسين .

سِيبْرُوسِينُونيد **ciprocinonide**

(ستيرويد قشري كظري)

سِيبْرُوفِبْرات **ciprofibrate**

(دَواءٌ خافِضٌ لِشَحَمِيَّاتِ الدَّم)

مشتق من حمض الفيبريك له تأثير مشابه لتلك التي يتمتع بها الكلوفيبرات ، يستخدم خافض للشحميات في معالجة محددة لفرط بروتينات الدم الشحمية ، ويعطى فموياً .

سيبروفلوكساسين **ciprofloxacin**

مضاد جرثومي فلورين 4- كينولون ، والفعال تجاه العديد من الجراثيم سلبيات وإيجابيات الجرام ، وتتضمن بعض السلالات المقاومة للبنسلين والسيفالوسبورين والأمينوجليكوزيد .

سيبروفلوكساسين هيدروكلوريد **ciprofloxacin hydrochloride**

ملح هيدروكلوريدي أحادي الإماهة للسيبروفلوكساسين ، له نفس الفعالية كمركب أولي ، ويستخدم لمعالجة طائفة واسعة من الأمراض المعدية .

يَوماويّ **circadian**

يحدث كل يوم (24 ساعة) . يطبق بشكل خاص للتكرار النظمي لظواهر محددة في الكائنات الحية في نفس الوقت من كل يوم .

عاماويّ **circannual**

يحدث كل سنة . يطبق بشكل خاص للتكرار النظمي لظواهر محددة (مثاله : إزهار النباتات) في الكائنات الحية في نفس الوقت من كل عام .

دُوَيْئِرَة **circellus**

حلقة صغيرة أو دائرة .

مادة واقية فعالة من الأشعة فوق البنفسجية B ، تطبق موضعياً على الجلد .

سِينْرُوميد **cinromide**

دواء مضاد للاختلاج .

سِينْتازون **cintazone**

دواء مضاد للالتهاب ويسمى أيضاً (Cinnopentazone) .

قَطْعُ اللَّهاة **cionectomy**

يسمى أيضاً (Uvulectomy) ، (Staphylectomy) ، وهو العمل الجراحي المستهدف منه قطع اللهاة خاصة في الحالات التي تتضخم بها وتشكل عائقاً لمرور الطعام .

اللَّهائِيَّة **Cionella**

جِنْسٌ مِنَ الحَلَزونات الأرضية من عائلة اللَهائيات ، والتي تقوم بوظيفة تضيف للدودة المثقوبة الكبدية ، والتي تدعى متفرعة المعي المتغصنة في شمال أمريكا .

اللَّهائِيَّات (صِنْفٌ مِنَ الحلزونات) **Cionellidae**

عائلة من قواقع الحدائق من رتيبة (Stylommatophora) تحت زمرة العيشنور (جنس من الرخويات) . وغالباً ما تلعب دور المضيف للدودة المثقوبة الكبدية متفرعة المعي المتغصنة .

التِهابُ اللَّهاة **cionitis**

التهاب الأنسجة المكونة للهاة بحيث تتضخم فجأة ، وقد تتطلب تداخلاً جراحياً ، أو أن يكون الالتهاب جرثومياً فيعالج بالمضادات الحيوية أو ڤيروسياً فيعالج بمضادات الڤيروسات ، أو أن يشفى تلقائياً .

سابقة بمعنى اللهاة **ciono-**

طليعة مصطلحية تدل على معنى اللهاة .

تَدَلّي اللَّهاة **cionoptosis**

يسمى أيضاً (Falling palate) ، (Staphylodialy-sis) ، (Staphyloptosis) ، (Uvulaptosis) ، وهي حالة ارتخاء اللهاة وتطاولها في تجويف الفم .

رَفْوُ اللَّهاة **cionorrhaphy**

خياطة اللهاة المجروحة أو المقطوعة .

مِبْضَعُ اللَّهاة **cionotome**

(الدِّماغيَّة **cerebri)**

انظر تحَت circulus arteriosus cerebri .

دائرة زين **circle of Zinn**

(= الدَّائرَةُ الوعائيَّةُ **(=circulus vasculosus**
للعَصَبَ البَصَّرِي) **nervi optici)**

اَنظر تحَت circulus vasculosus nervi optici .

دوائر هوفيوس **circles of Hovius**

(الدَّوائرُ الوَريديَّةُ في الصُّلْبَة)

تنظيمَ دائري دَاخلَ الصلبـــة ، والتي تنظم التفاغرما بين الأوردة الهدبية الأمامية للأوردة الدورية ، ليس بعـيـداً عن الحـافـة القـرنيـة الصلبوية ، توجد هذه الدائرة في الثدييات أكثر من الإنسان .

دَوائرُ ويبَر **circles of Weber**

دوَائرَ مـتـراكـزة حـول منطقـة يتم التحـري عن الشـعـور بالإحـسـاس بهـا عند الأشـخـاص الهـسـتـيريين ، وتسـتـخـدم في الطب النفسي لكشف حالة الحس الجلدي .

دائرَةٌ دفاعيَّة **defensive circle**

اَلدائرَة الدَفاعية ، والتي ترافق أو تعايش حالتين تميل كل واحـدة منهـمـا أن تملك تأثيـراً مناهضاً ومثبطاً للأخرى .

دائرَةُ الانْتشار **diffusion circle**

دَائرة مرُور الضوء في العدسات المتتالية .

الدَّائرَةُ الشِّرْيانيَّةُ **greater arterial**
القُزَحيَّةُ الكَبيرَة **circle of iris**

انظر تحَت circulus arteriosus iridis major .

دائرَةُ القُزَحيَّة الكُبْرَى **greater circle of iris**

أَقصى دائرَة تتشكل في فتـحة القزحية وتتكون في الظلام عادة أو بالتوسيع بالأتروبين .

دَوائرُ هوغيير **Huguier's circles**

(اَلدَّوائرُ الشِّرْيانيَّةُ العُنُقيَّةُ للرَّحم)

دوائر هَوغيير ، وَهي دائرَة تتشكلَ قرب الوصل مـا بين عنق الـرحـم و جـسـم الرحـم بواسطة الشرايين الرحمية .

دائرةُ لاثام **Latham's circle**

(مَساحة أصمية القلب عند الفحص بالقرع)

مُتحلَق **circinate**

1 ـ دائري .

2 ـ حلقي .

دائرَة (ج: دوَائر) **circle**

شكل دائري ، أو بنية ، أو جزء دائري ، وتسمى أيضاً (Anulus) ، (Ring) .

دائرة شريانية **arterial circle**

انظر تحت circulus arteriosus .

الدَّائرَةُ الشِّرْيانيَّةُ **arterial circle**
الدِّمَاغيَّة لويلِّس **of Willis**

(=circulus arteriosus cerebri)

انظر تحت circulus arteriosus cerebri .

دَوائرُ بيري **Berry's circles**

(لاختبار إدراك العمق والتَّجْسيم)

هي مـخططات ودوائر عليهـا لاجراء اختبـارات الرؤية بالتنظير المجسم .

الدائرة الشريانية **cerebral arterial**
الدماغية **circle**

انظر تحت circulus arteriosus cerebri .

دائرَةُ كاروس **circle of Carus**

(دائرَةُ مَخْرَج الحَوض)

انظرَ تحت curve .

دائرَةُ التَّخْليط **circle of confusion**

هَو قرص يمثل صورةً من نقطة افتراضيـة تحدث بالعدسة .

دائرةُ التَّبَعْثُر **circle of dispersion**

دَائرة التـبـعـثـر ، أو دائرة التشـتـت ، وهـو الفـراغ الدائري على الشـبـكيـة عندمـا تـتـشـكل صـورة النقطة اللماعة عليها .

دَائرَةُ التَّبَدُّد **circle of dissipation**

نَظرية قديمة لتعليل التمييز باللمس .

دائرَةُ هالر **circle of Haller**

(= الدَّائرَةُ الوعائيَّةُ **(=circulus vasculosus**
للعَصَبَ البَصَّري) **nervi optici)**

اَنظر تحَت circulus vasculosus nervi optici .

دائرة ويلِّيس **circle of Willis**

(= الَدَّائرَةُ الشِّرْيانيَّةُ **(=circulus arteriosus**

دائرة لاثام ، وهي دائرة بقطر 5 سنتي متر ، التي تغطي منطقة الأصمية القلبية ، وتتوضع في منصف المسافة ما بين حلمة الثدي الأيسر ، والنهاية السفلية من عظم القص .

الدَّائرَةُ الشِّرْيانيَّةُ القُزَحيَّةُ الصَّغيرَة **lesser arterial circle of iris**

انظر تحت circulus arteriosus irids minor .

الدَّائرَةُ القُزَحيَّة الصُّغْرَى **lesser circle of iris**

أضَيق دائرةَ تَتَشكل في القزحية ، وتحدث بالتنبيه الضوئي الشديد .

دَوائرُ مينْسكي **Minsky's circles**

(لَفَحَص مَستويات الرؤية في العين)

دوائر مينسكي ، وهي سلسلة من الدوائر التي تستخدم للتسجيل التخطيطي لآفات العين ، وفحص مستويات الرؤية .

دائرَةُ رُوبِنْسون **Robinson's circle**

دَائرة شَريانية تتشكل بالتفاغر ما بين الأورطي البطني والشريان الحرقفي الأصلي والشريان الخثلي والشريان الرحمي والشريان المبيضي .

دائرَةٌ حسيَّة **sensory circle**

أَي دائرَة تحدد على سطح الجلد ليتم اختبار الحس فيها .

الدائرة الوعائية **vascular circle**

انظر تحت circulus vasculosus .

الدَّائرَةُ الوعائيَّةُ للعَصَبَ البَصَري **vascular circle of optic nerve**


انظر تحتَ circulus vasculosus nervi optici .

دائرَةٌ مَعيبَة **vicious circle**

فَعل متسارع متبادل بين مرضين مستقلين أو بين تأثير أولي وثانوي . ويمكن أن تطلق على مرور الطعام عبر مفاغرة جراحية معدية معوية من الفتحة إلى العروة المعوية بفعل مضاد للحركة المعوية التمعجية ثم يرجع الطعام إلى المعدة مرة أخرى عن طريق الفتحة البوابية . أو العكس .

دُوَيئِرَة **circlet**

انظر تحت circellus .



Circle of Zinn دائرة زين

1ـ دَوَرانِيُّ الحَرَكَة 2ـ دَيرورَة **circling**

المشي في دائرة كما تفعل الحيوانات المصابة بداء الليستريات واضطرابات الجهاز العصبي المركزي الأخرى .

دارَة (ج: دارات) **circuit**

دائرة أو مسار والتي تُعترض بتيار كهربي ، ويقال أن الدائرة مغلقة عندما تكون مستمرة ، ولذلك فإن التيار من الممكن أن يمر خلالها ، وأيضاً يقال أن الدائرة مفتوحة عندما تكون متقطعة ، ولذلك فهي تكون غير مستمرة والتيار لا يستطيع العبور خلاله .

دارَةٌ تَنَفُّسيَّة **breathing circuit**

أي جهازَ يمكنه تأمين إدخال الهواء وإخراجه من

دارةٌ قَصيرَة **short circuit**

1 ـ اتصال منخفض المقاومة غير مطلوب ما بين نقطتين في الدارة الكهربائية .

2 ـ اتصال ما بين نقطتين في الأمعاء ، واحدة فوق و الأخرى تحت مستوى الانسداد .

دائِريّ **circular**

شكل شبيه بالدائرة أو يحدث في شكل دائري . تسمى أيضاً (Annular) .

مُمَرِضَة دوَّارَة **circulating nurse**

درجة تمريضية تحتاج إلى سنتين أو أربع سنوات مع دورات تدريبية مستمرة ، ومهمة القائم بهذا العمل (ممرض أو ممرضة) أن يحضر المريض للعمل الجراحي خاصة تزويده بالألبسة الخاصة بالعملية وتحضير مستلزمات العملية من أدوات ووضعها على طاولة العمليات .

دوَران **circulation**

1 ـ حركة شيء ما خلال مسار دائري .

2 ـ حركة الدم خلال القلب والأوعية الدموية .

الدَّوَرانُ السِّقائيّ **allantoic circulation**

دوران جنينيَ خلال الأوعية السرية . يسمى أيضاً (Umbilical circulation) .

دَوَرانٌ مُعان **assisted circulation**

مضخة تقدم المساعدة للفعالية الطبيعية للقلب .

دَوَرانُ الدَّم **blood circulation**

عملية جريان الدم ضمن الأوعية الدموية منتقلاً من البطين الأيسر محملاً بالأكسجين حتى يعود إلى البطين الأيمن مفرغاً حمولته من الأكسجين ، كما يطلق أيضاً على عمليات دوران الدم في الأوعية النسيجية للتعبير عن الإرواء النسيجي .

تقْنيُّ الدَّوَران **circulation technologist**

الممرض أو الفني المتخصص بشؤون تدبير دوران الدم أو سوائل إرواء النسج ، ويسمى أيضاً تقْنيُّ التَّسْريْب (Perfusion technologist) .

دَوَرانٌ رَادِف **collateral circulation**

الدوران الدموي الذي يجري عبر أقنية ثانوية بعد انسداد الأوعية الدموية الرئيسية التي تزود الصدر كجهاز الأمبو .

فاصِلَةُ الدَّارَة **circuit breaker**

قاطعة التيار الكهربائي عندما يحدث خلل في التيار كاتصال القطب السالب بالموجب ، أو زيادة حمل التيار أو نقصه عن حد معين .

بوابة الدارة **gate circuit**

انظر تحت gate .

دارة راجعة كبروية **macroreentrant circuit**

سبيل عودة الدخول ، والذي يتألف من تفرعات حزم جهاز التوصيل القلبي .

دارةٌ مَغْناطيسيَّة **magnetic circuit**

طريق مغلقَ يحتوي على مواد مغناطيسية وحديد ممغنط وفجوات هوائية . تصنع منها نضوات قدم الحصان سواء بحافظة حديدية أو بدونها ، كما توضع في بعض المحركات الكهربائية .

دارة راجعة صغرى **microreentrant circuit**

طريق عودة الدخول ، الذي يتألف فقط من عدد قليل من عضل القلب .

دارةٌ مَفْتوحَة **open circuit**

وهي دارة تحتوي على بعض الانقطاعات بحيث أن التيار لايمر أو لايستطيع المرور .

دارة بابز **Papez circuit**

دارة عصبونية في الجهاز الحوفي ، والتي تتألف من الحصين والقبو ، والجسم الحلمي ونوى المهاد الأمامية والتلفيف الحزامي . ويفترض أن بابز يكتنفها بتعبيرات العواطف والاستجابات التابعة لها .

دارة عود الدخول **reentrant circuit**

دارة تتشكل بدوران النبضات بتكرار عودة دخولها .

دارةٌ انْعكاسيَّة **reflex circuit**

انظر تحت arc .

دارةٌ ارْتدادِيَّة **reverberating circuit**

هو سَبيلَ عصبوني ينتظم في دارة من النبضات التي تدور في حلقة راجعة لتؤمن طريق راجع إيجابي أو ارتدادي .

انظر تحت primitive circulation .

الدَّورانُ الرَّابع (للِّمْفاويَّات) **fourth circulation**

الحركة المستمرة للمفاويات من مصادرها في النسج المكونة للدم والنسج الضامة إلى الدم المار مروراً بكل النسج والأعضاء ، ثم إلى العقد اللمفاوية ، ثم إلى اللمف والخاص بالقناة الصدرية ، ومن ثم إلى الدم مجدداً .

الدَّورانُ الكَبير (=دَوَرانٌ مَجْموعيّ) **greater circulation (=systemic circulation)**

انظر تحت systemic circulation .

الدَّورانُ النُّخاميّ البابيّ **hypophyseoportal circulation**

الجهاز النخامي البابي تحت الوطائي .

الدَّورانُ بَيْنَ الزُّغابات **intervillous circulation**

تدفق الدم الأمومي عبر الفراغات الزغابية .

الدَوَرانُ الصَّغير (=الدَوَرانُ الرِّئَوي) **lesser circulation (=pulmonary circulation)**

انظر تحت pulmonary circulation .

دَوَرانُ اللِّمْف **lymph circulation**

مرور اللمف عبر الأوعية اللمفاوية والعقد اللمفاوية .

الدوران السُّري المساريقي **omphalomesenteric circulation**

انظر تحت vitelline circulation .

دَوَرانٌ جَنينيٌّ مُسْتَديم **persistent fetal circulation**

هو فرط ضغط الدم الرئوي في فترة ما بعد الولادة الثانوي للتحويلة من الأيمن إلى الأيسر للدم من خلال الثقبة البيضوية والقناة الشريانية .

الدَّورانُ المَشيميّ **placental circulation**

هو الدوران الجنيني ، أيضاً الدوران الأمومي عبر الفراغات الزغابية للمشيمة .

هذا الجزء . يسمى أيضاً الدوران المعاوض (Compensatory circulation) .

دَوَرانٌ مُعاوِض **compensatory circulation**

انظر تحت collateral circulation .

الدَّوَرانُ التَّاجيّ **coronary circulation**

دوران الدم من خلال الأوعية التاجية للقلب .

دَوَرانٌ مُتَصالِب (بين كائنَين) **cross circulation**

جزء من دوران الجسم في أحد الحيوانات يأتي من التروية الدموية لحيوان آخر .

دَوَرانٌ اشْتِقاقيّ **derivative circulation**

الدوران الذي يصل من الشرينات إلى الوريدات مباشرة .

دَوَرانٌ جَنينيّ **embryonic circulation**

الدوران الخاص بالجنين المتميز باتصال الدوران الشرياني والوريدي عبر الفتحة بين الأذينتين والقناة الشريانية .

الدَّوَرانُ المِعَويّ الكَبِديّ **enterohepatic circulation**

الدورَة المتكررة التي تطرح فيها الأملاح الصفراوية والمواد الأخرى بواسطة الدوران الكبدي عبر الخاطية المعوية وعودة امتصاصها بواسطة الخلايا الكبدية وإعادة طرحها مجدداً .

دَوَرانٌ خارِجَ الجِسْم **extracorporeal circulation**

دوران الدم خارج الجسم ، كالتبادل الغازي لثنائي أكسيد الكربون ـ الأكسجين في الجهاز القلبي الرئوي ، أو من خلال الكلية الصناعية لإزالة المواد التي عادةً ما تطرح في البول .

دَوَرانٌ جَنينيّ **fetal circulation**

الدوران المَدفوع بواسطة القلب الجنيني عبر الجنين والحبل السري والزغابات المشيمائية للمشيمة .

الدَّوَرانُ الأَوَّل (=الدَّورانُ البدائيّ) **first circulation (=primitive circulation)**

دَوَرانٌ ثيبسيوس **thebesian circulation**
(= الأوردة القلبية الصغرى) **(=venae cardiacae minimae)**
دوران تيبسيان ، دوران الدم عبر الأوردة القلبية الصغيرة (أوردة تيبسيوس) .

الدَّوَرانُ السُّرِّيُّ **umbilical circulation**
انظر تحت allantoic circulaion .

الدَّوَرانُ المُحِّيُّ **vitelline circulation**
دوران الدم عبر الأوعية الدموية لكيس المح . يسمى أيضاً بالدوران السري المساريقي (Omphalomesenteric circulation) .

دَوَرانِيّ **circulatory**
1ـ يتعلق بأي دوران .
2ـ يتعلق بالدوران الدموي .
3ـ يحتوي على الدم . يسمى أيضاً بحامل الدم (Sanguiferous) .

قَناةٌ دَوَرانيَّة **circulatory canal**

دَوائِر **circuli**
(ف: دائِرَة) **(sing.circulus)**
الدائرة هي المحيط دائري الشكل الذي تلتقي نقطة بدايته مع نهايته ، ولذلك يوصف به أي شيء ولو معنوياً إذا كان محتواه المتحرك يعود إلى بدايته التي انطلق أو بدأ منها .

دائِرَة **circulus TA**
(ج: دَوائِر) **(pl.circuli)**
تسمية تشريحية عامة لأي تنظيم يشبه الحلقة أو الدائرة ، وعادة ما تطلق على الشرايين والأوردة .

الدَّائِرَةُ الشِّرْيانيَّةُ (لَويليس) **circulus arteriosus (Willis)**
هي دائرة شريانية ، والتي هي دائرة كاملة أو غير كاملة من التفاغرات الشريانية .

الدَّائِرَةُ الشِّرْيانيَّةُ الدِّماغيَّة **circulus arteriosus cerebri TA**
هي المَفاغرة متعددة الأضلاع الهامة التي تتشكل من الشريان السباتي الباطن والشرايين الدماغية الأمامية والخلفية والشريان الاتصالي الأمامي ،

دَوَرانُ البلازْما **plasmatic circulation**
يصف طور تروية الطعم الجلدي بالمصل .

الدَّوَرانُ البابيُّ **portal circulation**
1ـ دوران الدم من الشعرات الدموية لعضو واحد خلال الأوعية الدموية الكبرى إلى الشعيرات الدموية لعضو آخر ، قبل عودة الدم عبر الأوردة الكبرى إلى القلب . مثال ذلك الدوران النخامي البابي .
2ـ مرورالدم من الشعيرات الدموية للسبيل المعدي المعوي والطحال عبر الشعيرات الدموية التابعة للكبد قبل دخولها الوريد الكبدي .
3ـ الجهاز النخامي البابي الوطائي .

الدَّوَرانُ البابيُّ السُّرِّيُّ **porto-umbilical circulation**
انظر تحت Cruveilhier-Baumgarten syndrome .

الدَّوَرانُ البدائيُّ **primitive circulation**
هو الدوران الأولي ، والذي يمثل الدوران الباكر الذي ينقل بواسطته المغذيات والأكسجين إلى الجنين . يسمى أيضاً الدوران الأول (First circulation) .

الدَّوَرانُ الرِّئَويُّ **pulmonary circulation**
هو الذي يحمل الدم الوريدي من البطين الأيمن إلى الرئتين ، ويعود بالدم المؤكسج إلى الأذين الأيسر من القلب . يسمى أيضاً بالدورة الدموية الصغرى (Lesser circulation) .

مخطط ترسيمي للدوران الجنيني **Schematic diagram of fetal circulation**

دَوَرانٌ جَيْبانيّ **sinusoidal circulation**
الدوران الجَيباني ، والذي يحدث خلال الجيباني وشبه الجيبي .

الدَّوَرانُ المَجْموعيُّ **systemic circulation**
الدوران العام ، والذي يحمل الدم المؤكسج من البطين الأيسر إلى النسج المختلفة من الجسم ، ويعود بالدم الوريدي إلى الأذين الأيمن من القلب . يسمى أيضاً الدورة الدموية الكبرى (Greater circulation) .

(Areolar venous ، (Plexus venosus areolaris) (Vascular cir- ، (Haller's circle) ، plexus) ، (Venous circle of mammary gland) ، cle) وهي الضفيرة الوريدية الدائرية المحيطة بالحلمة . وترسل الدم منها إلى الوريد الصدري الجانبي .

الدَّائرَةُ الوَريديَّةُ الهُوفيَّة **circulus venosus hovii**

تفاغرات خلفية وأمامية بين الأوردة الكهفية .

الدائرَةُ الوَريديَّةُ الرِيَدليَّة **circulus venosus ridleyi**

يسَمى أيضاً الجيب الدائري (Sinus circularis) ويطلق على الدوران الدائري في محيط المشيمة ، والأصح إطلاقه على الجيوب بين الكهفية (Sinus intercavernosi) .

دائرَةُ ويلِّيس **circulus willisii**

(= الدَّائرَةُ الشِّرْيانيَّةُ الدِّمَاغيَّة) **(=circulus arteriosus cerebri)**

انظر تحت circulus arteriosus cerebri .

دائرَةُ زين **circulus zinnii**

هي الدائرة الوعائية العصبية البصرية (Circulus vasculosus nervi optici) ، وهي شبكة من تفرعات الشرايين الهدبية القصيرة التي توجد في الصلبة ، وتحيط بمدخل العصب البصري .

سابقة بمعنى حَول **circum-**

حَولَ الشَّرَج **circumanal**

صفة لكل ما يتعلق بما حول الشرج .

حَولَ المَفصل **circumarticular**

حَولَ الإبْط **circumaxillary**

حَولَ الفم **circumbuccal**

صفة منسوبة لكل ما يتعلق بما حول الفم .

حَولَ المُقلة **circumbulbar**

حَولَ الثَّفَنِي **circumcallosal**

يَخْتِن **circumcise**

إجراء عملية الختان .

خِتان **circumcision**

إزالة كل أو جزء من القلفة (Prepuce) ، أو الغرلة (Foreskin) ، وهي ثنية جلدية تغطي نهاية

والشرايين الاتصالية الخلفية . تسمى أيضاً الدائرة الشريانية لويليس (Arteial circle of Willis) .

الدَّائرَةُ الشِّرْيانيَّةُ الهَاليريَّة **circulus arteriosus halleri**

(الدَّائرَة الوعائية للعَصب البَصري)

ضفيرة وريدَية شريانية للعصب البصري .

الدَّائرَةُ الشِّرْيانيَّةُ القُزَحيَّةُ الكَبيرَة **circulus arteriosus iridis major TA**

الدائرةَ الشريانية الكبرى للقزحية ، وهي دائرة تتكون من تفاغر الشرايين التي تتوضع في الجسم الهدبي على طول الحافة الهدبية للقزحية .

الدَّائرَةُ الشِّرْيانيَّةُ القُزَحيَّةُ الصَغيرَة **circulus arteriosus iridis minor TA**

الدائرةَ الشريانية الصغرى للقزحية ، وهي دائرة تتكون من تفاغر الشرايين في القزحية قرب حافة الحليمة البصرية .

الدَّائرَةُ الوعائيَّةُ المَفْصليَّة **circulus articularis vasculosus TA**

تنظيمَ من تفاغرات وعائية التي تحيط بالمفاصل .

الدَّائرَةُ السُّرِّيَّة **circulus umbilicalis**

ضفيرة شريانية في النسيج تحت الصفاقي حول السرة .

الدائرة الوعائية **circulus vasculosus**

هي دائرة كاملة أو غير كاملة من الأوعية الدموية التفاغرية .

الدَّائرَةُ الوعائيَّةُ للعَصَبَ البَصَري **circulus vasculosus nervi optici NA**

دائرة وعائية مؤلَفة من شرايين الصلبة التي تحيط بمكان دخول العصب البصري . يسمى أيضاً دائرة هالر (Circle of Haller) ، ودائرة زين (Circle of Zinn) .

الدَّائرَةُ الوَريديَّةُ الهَاَلريَّة **circulus venosus halleri**

تسمى أيضاً الضَّفيرَةُ الوَريديَّةُ الهاليَّة

كفافُ الرَّأس **head circumference**

كَفاف منتصف الذراع العلوي **midram circumference**

مـحـيط منتـصـف الذراع العـلـوي ويقـاس في منتصف المسافة ما بين الأخرم والزج .

كِفاف **circumferentia**

انظر تحت circumference .

كفافُ المَفْصل **circumferentia articularis**

هو المحيط المفصلي ، والذي يمثله السطح المحيط بالعظم الذي يتسع لانخساف عظم آخر ، ويتمفصل معه .

كفافُ مَفْصل رأس الزَّنْد **circumferentia articularis capitis ulnae TA**

المحيط المفصلي لرأس عظم الزند . والذي يتكون من السطح الهلالي لرأس عظم الزند ، والذي يتمفصل مع الثلمة الزندية لعظم الكعبرة . يسمى أيضاً محيط مفصل رأس عظم الزند (Circumferentia articularis capiuli ulnae) .

كفافُ مَفْصل الكُعْبُرَة **circumferentia articularis radii TA**

يسمى أيضاً (Articular circumference of radius) ، وهو سطح تمفصل رأس الكعبرة من البارزة الكعبرية من عظم الزند .



كفاف الرأس Head circumference

القضيب .

ختانُ الأُنْثَى ؛ خفاض **female circumcision**

(قطع قلفة البظر)

مصطلح عام يتضمن كلاً من استئصال جزء من الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية و تشويه الأعضاء . وعلى أنها تترافق مع مخاطر صحية شديدة و تم اعتبارها غير قانونية في العديد من البلدان ، فإنها ما تزال تمارس في عدد من البلدان الزراعية بشكل خاص في إفريقيا .

ختانٌ فِرْعَوني **pharaonic circumcision**

(= تَبْتِيك) **(=infibulation)**

ختانٌ فرعوني ، وهو نموذج من ختان الإناث يتضمن نوعين من الإجراءات ، استئصال جذري حيث يزال كلاً من البظر والشفرين الصغيرين والشفرين الكبيرين و النسج الباقية تقرب بواسطة مشبك أو بالخياطة ، وشكل آخر معدل حيث تزال القلفة و الحشفة للبظر والشفرين الصغيرين المجاورين .

ختان السنة **Sunna circumcision**

شكل من ختان الإناث حيث تزال قلفة البظر .

غَلَقُ الشريان التَّطويقِيُّ **circumclusion**

انغلاق الشريان من جميع جوانبه .

حَوْلَ القَرْنِيَّة **circumcorneal**

التِهابُ كِفافِ التَّاج **circumcoronitis**

التهاب محيطي بالتاج السني .

مُحيطِيُّ النُّمُو **circumcrescent**

1ـ دَيرورَةُ الطَرَف **circumduction**

2ـ دَيرورَةُ العَيْن

الحركات الدائرية الفاعلة و المنفعلة للطرف أو العين .

كِفاف **circumference**

الحد أو الحافة الخارجية المحيطة بالجسم الدائري .

كَفافُ الذِّراع **arm circumference**

محيط الذراع ، ويقاس من وسط العضد عادة .

كَفافُ المَفْصل **articular circumference**

انظر تحت circumferentia articularis .

circumferential **كِفافِيّ**

يتعلق أو يكون الكفاف .

circumferential clasp **مشْبكَةٌ كفافيَّة**

مشبكة مسك وتثبيت تعمل بطريقة الإحاطة بما يراد تثبيته .

circumferential lamella **صَفائح كفَافيَّة**

circumferential wiring **إسْلاكٌ كفافيّ**

تركيب سلك محيط بالسن مثلاً .

circumflex **مُنْعَطِف**

منعطف منحن كالقوس .

circumflexus **مُنْعَطِف**

circumgemmal **حَولَ البُرْعُوْم (العَصَبوني)**

حول البرعم ، وهو مصطلح يطلق على شكل نهاية العصب حيث تحاط نهاية البرعم بالليفات .

circuminsular **حَولَ الجُزَيرَة**

يحيط أو يتوضع أو يحدث حول الجزيرة .

circumintestinal **حَولَ الأمْعاء**

circumlental **حَولَ العَدَسَة**

circumnuclear **حَولَ النَّواة**

حول النواة أو يحيط بالنواة .

circumocular **حَولَ العَيْن**

يحيط أو يحدث حول العين .

circumoral **حَولَ الفَم**

حول أو يحيط بالفم .

circumorbital **حَولَ الحِجاج**

يتوضع حول أو يحدث قرب الحجاج العيني .

circumpolarization **دَيرورَة الاسْتقطاب**

الاستقطاب الدائري في الشعاع .

circumpulpar **حَولَ اللُّبّ**

المنطقة المحيطة باللب السني .

circumpulpar dentin **عاجٌ حَولَ اللُّب**

المادة السنية العاجية المحيطة باللب .

circumrenal **حَولَ الكلْيَة**

circumscribed **مُتَحَدِّد**

متحدد أو مقيد ، يقتصر على نطاق محدود .

circumscriptus **مُتَحَدِّد**

circumstantiality **إطْناب**

نموذج مضطرب من التكلم أو الكتابة يتميز بالتأخر في إدراك النقطة المطلوبة بسبب إقحام التفاصيل غير الضرورية والملاحظات المعترضة التي لا صلة لها بالموضوع . يشاهد في الأشخاص المصابين بالفصام و باضطرابات الوسواس القهري .

circumstraint **سيركومسترينت**

ماركة تجارية لجهاز يستخدم لتثبيت الطفل من أجل إجراء الختان .

circumtonsillar **حَولَ اللَّوزَة**

المنطقة المحيطة باللوزة الموجودة في الفم .

Cilcumtonsillar abscess **خُراجٌ حَولَ اللَّوزَة**

الخراج القيحي المحيط باللوزة .

انظر تحت peritonsillar abscess .

circumtractor **مِبْعادٌ تطويقِيّ**

أداة التبعيد بعد الإحاطة بالمنطقة .

circumvallate **مُحَوَّط**

محوط ، أو محاط بخندق أو حافة .

circumvallate papilla **حُلَيمَةٌ مُحَوَّطَة**

circumvascular **حَولَ الوِعاء**

حول الوعاء الدموي أو محيطاً به .

circumventricular **محيط البطين**

يتوضع حول البطين بشكل خاص في الدماغ .

circumvolute **مُتَلَفِّف**

circumvolutio **تلفيف**

واحد من الانثناءات الملتوية في الدماغ ، والتي تزيد بانحناءاتها من سطح الدماغ .

circumvolutio cristata **التَّلْفيفُ القَبْويّ**

يسمى أيضاً (Gyrus fornicatus) ، وكان يشار إليه قديماً بالجهاز الحوفي الداخلي ، ويطلق الآن على التلفيف القشري الدماغي المجاور لنقير نصف الكرة المخية الدماغية .

cirrhogenous **مُحْدِثٌ للتَّشَمُّع**

cirrhonosus **صَفراويَّة الجَنْبَة والصفاق**

مرض مميت يتميز بتصبغ أصفر ذهبي في الجنبة والصفاق .

تشـمع صـفـراوي ثانوي تال لرتق القنوات الصفراوية الخلقي . يسمى أيضاً بالكبد الطفلي (Infantile liver) .

انظر تحت indian childhood cirrhosis .

تَشَمُّعٌ حَصَوِيُّ المَنْشَأ — **calculus cirrhosis**

تشـمع صـفـراوي ثانوي ينتج عن وجـود الحصيات المرارية .

تَشَمُّعٌ قَلْبِيُّ المَنْشَأ — **cardiac cirrhosis**

تليف الكبد ، والذي يتبع بشكل محتمل النخر النزفي المركـزي المترافق مع الداء القلبي الاحتقاني . يتميز بتندب و تليف حول الوريد الكبدي للفص الكبدي .

تَشَمُّعُ شارْكُو — **Charcot's cirrhosis**
(= تَشَمُّعٌ صَفْراوِيٌّ أَوَّلِيّ) — **(=primary biliary cirrhosis)**

انظر تحت primary biliary cirrhosis .

تَشَمُّعُ الثَّدْي — **cirrhosis mammae**

التهاب مزمن ليفي حول الغدد الثديية .

تَشَمُّعُ الكُلْية — **cirrhosis of kidney**

هو التـهـاب الكليـة الخـلالي المزمن (Chronic interstitial nephritis) ، ويسمى أيضاً -Tubulo) interstitial nephritis) ، وهو يصـيب النسـيج الخلالي المحيط بالنبيبات الكلوية ، ومنه شكل حـاد يبدأ فـجـأة ، وأمـا المزمن فـينتـهي عـادة بالفـشل الكلوي . ويسـمى أيضـاً Renal) cirrhosis) .

تَشَمُّعُ الكَبِد — **cirrhosis of liver**

مـجـموعـة من الأمراض المزمنة للكبـد ، والتي تـتميز بفـقـدان الكبد للبناء الفـصيصي الطبيعي وحـدوث التليف وبتـدمير الخلايا المتنية وعـود تجددها لتشكل العقيدات . لهذا المرض فترة آجلة طويلة ، وعـادةً مـا يتلوها مظاهر مفـاجئة من التـورم البطني و الألم و القيء الدمـوي والوذمـة المعـتـمـدة ، أو اليـرقـان . في المراحل المتقدمة يتظاهر الحبن و اليرقان و فرط ضغط الوريد البـابي واضطرابات الجـهـاز العـصـبي المركـزي ، والتي يمكن أن تنتـهي بالسـبـات

تشَمُّع؛ تليُّف — **cirrhosis**

مرض كبدي يتميز بأشرطة متداخلة منتشرة من النسيج التليفي ، والذي يقسم المتن الكبدية إلى مناطق عقيدات مكروية أو عقيدات كبروية .

انظر تحت cirrhosis of liver .

تَشَمُّعٌ أَقْنِيَة الصَّفْراءَ — **acholangic biliary cirrhosis**

علة كبدية تصيب الأطفال فوق عمر (12) سنة ، والناتج عن عـدم التـخلق الكامل أو الجـزئي للأقنيـة الصـفـراوية دخل كـبـد وداخل الفصيصات مع تظاهرات شبيهة بتلك الموجودة في التشمع الصفراوي الانسدادي .

تشمع الكبد الحاد الشبابي — **acute juvenile cirrhosis**

هو التهاب الكبد المزمن الفعال .

انظر تحت chronic active hepitis .

تَشَمُّعٌ كُحوليّ — **alcoholic cirrhosis**

تشـمع الكبَد في مـدمني الكحـول ، يعـزى في بعضها للعوز الغذائي المرافق وفي البعض الآخر للتعـرض الزائد و المزمن للكحول بكونه سامـاً كبدياً .

تَشَمُّعٌ ضُموريّ — **atrophic cirrhosis**

تشمع كبديَ يتناقص فيه حجم الكبد . يمكن أن يشـاهد في مدمني الكحـول ، لكنه أكثر شيوعـاً في التـشـمع التالي لالتهـاب الكبـد أو للنخـر الكبدي .

تَشَمُّعٌ جُرْثوميّ — **bacterial cirrhosis**

العديد يقولَ أنه تشـمع جرثومي المنشأ ، أي يتلو الالتهاب الجرثومي في الكبد .

تَشَمُّعٌ صَفْراويّ — **biliary cirrhosis**

تشـمـع الكبَد الناتج عن الإصـابة بـالعـدوى أو انسداد القنوات الصفراوية الرئيسية الخارجية وداخل الكبـد (باسـتـثناء التـشـمع الصـفـراوي البـدئي) . يتظاهر باليـرقـان و الألـم البطني والإسهال الدهني وبتضخم الكبد والطحال .

التَّشَمُّعُ الصَّفْراويُّ في الأَطْفال — **biliary cirrhosis of children**

الكحول .
انظر تحت laennec's cirrhosis .

تَشَمُّعُ هانُو **Hanot's cirrhosis**
هو التشمع الصفراوي (Biliary cirrhosis) ، وهو التشمع الذي يحدث نتيجة ركود أو انسداد في الجريان الصفراوي ويسمى أيضاً (Hypertrophic cirrhosis) .

تَشَمُّعُ الكَبِد **hepatic cirrhosis**
تلف وتموّت الأنسجة الكبدية وإحلال نسيج ليفي محلها فيفقد الكبد وظيفته .

تَشَمُّعٌ ضَخاميّ **hypertrophic cirrhosis**
نوع من التشَمع الصفراوي الالتهابي لهانو ، ويسبب ضخامة الكبد والطحال وتبدلات لونية برونزية في الكبد .

تَشَمُّعُ الأطْفال الهُنود **Indian childhood cirrhosis**
تشمع الكبد عند الأطفال الهنود ، وهو تشمع كبدي بآلية غير معروفة يحدث في الأطفال في الهند ، يتميز ببدء مخاتل بشكل نموذجي ونقص في النمو (قزامة) وضخامة كبدية وحمى خفيفة غير ثابتة . في المراحل المتأخرة يمكن مشاهدة ضغط الوريد البابي مع الحبن وبينات على الدوران الجانبي (الرادف) والقيء الدموي والضخامة الطحالية والوذمة .

تَشَمُّعُ لاينيك **Laennec's cirrhosis**
(= تَشَمُّعٌ كُحُوليّ)
هو تشمع كبديّ يترافق بشكل وثيق مع التناول الزائد و المزمن للكحول . في المراحل الباكرة ، يتضخم الكبد و الذي يعكس الارتشاح الشحمي (الدهني) للخلايا الكبدية (تشمع دهني) مع نخر والتهاب ناتج عن الأذية الكحولية الحادة . لايلبث للتليف المترقي أن يمتد من المناطق البابية يفصله عقيدات تجددية صغيرة موحدة .

تَشَمُّعٌ كَبِيرُ العُقَيْدات **macronodular cirrhosis**
هو تشمع الكبد الذي يتلو النخر الكبدي تحت الحاد الناتج عن التهاب الكبد الفيروسي أو

الكبدي وتصبح أعراضاً دائمة . يسمى أيضاً بالتهاب الكبد الخلالي المزمن (Chronic interstitial hepatitis) .

تَشَمُّعُ الرِّئَة **cirrhosis of lung**
هو تَلَيُّفُ الرِّئَة الخلاليُّ المُنْتَشِر (Diffuse interstitial pulmonary fibrosis) ، وهو التهاب مزمن ليفي ندبي يصيب الأنسجة الرئوية العميقة . ويسمى أيضاً (Pulmonary cirrhosis) .

تَشَمُّعُ المَعِدَة **cirrhosis of stomach**
هو التهاب نسيجة المعدة المنسج (Linitis Plastica) ، ويؤدي إلى تليف الغشاء وفقدانه مرونته ووظيفته .

تَشَمُّعٌ كَبِديٌّ خِلْقِيّ **congenital hepatic cirrhosis**
تلَفُ الخلايا الكبدية وتليف نسيجي منذ الولادة . وقد يبدأ قبل الولادة .

تَشَمُّعٌ احْتِقانيٌّ المَنْشَأ **congestive cirrhosis**
تشمع ينتج عن فرط الضغط الوريدي الكبدي أو الخثار ، وبشكل أكثر شيوعاً في الفشل القلبي الاحتقاني (تشمع قلبي) أو عن انسداد الوريد الكبدي .

تَشَمُّعُ كرُوفيلْيِيه باومْغارْتِن **Cruveilhier-Baumgarten cirrhosis**
(تشمع مَترافق بأوعية سرية رادفة)
انظر تحت syndrome .

تَشَمُّعٌ مَجْهُولُ السَّبَب **cryptogenic cirrhosis**
تشمع لا يمكن تفسيره لانتفاء تحديد الأسباب المعروفة في التسبب بتشمع الكبد . فلا يوجد مثلاً التهاب كبدي سابق ولا سابق الكحول .

التشمع الكبدي غير المعاوض **decompensated cirrhosis**
هو تشمع كبدي مترافق مع الحبن .

تَشَمُّعٌ دُهْنيّ **fatty cirrhosis**
هو تشمع كبدي تكون الخلايا الكبدية فيه مرتشحة بالدهن (ثلاثي الجليسريد) ، ويكون الارتشاح الشحمي عادةً ناتجاً عن تناول

للنَّخَر) **cirrhosis)**
هو تشمع كبير العقيدات .
انظر تحت macronodular cirrhosis .

تَشَمُّعٌ تَغَذَوِيُّ المَنْشَأَ **nutritional cirrhosis**
تشمع كبدَي بسبب العوز الغذائي .

تَشَمُّعٌ انْسداديُّ المَنْشَأ **obstructive cirrhosis**
تشمع بسَببَ انسدادي يسبب احتقان وبطء الجريان الصفراوي ، والذي يؤدي بدوره إلى تشمع الكبد وتلفها .

تَشَمُّعٌ مُحيطٌ بالباب **periportal cirrhosis**
التشمع المحيط بالوريد البابي ، وهو تشمع من النوع كبير العقيدات .

تَشَمُّعٌ صباغيّ **pigment cirrhosis**
التشمعَ النَاجم عن سوء استقلاب المعادن كالحديد والنحاس الذي يؤدي إلى تشمع الكبد وتخريبها .

تَشَمُّعٌ صباغيّ **pigmentary cirrhosis**
حالة تَتميز بتضخم كبدي خفيف إلى متوسط وكبد بني إلى شوكولاتي اللون ، إن السطح الكبدي العقيدي بشكل منتشر . هو الآفة المميزة لداء ترسب الأصبغة الدموية .


السمي . ينهار الهيكل الشبكي للفصيصات الكبدية الطبيعية ، ويمكن أن تستبدل بشرائط عريضة من النسيج الليفي تفصلها عقيدات تجددية من أحجام مختلفة . يسمى أيضاً بالتشمع عديد العقيدات والتشمع حول البابي والتشمع بعد النخري والتشمع السمي .

تَشَمُّعٌ مَلاَرِيُّ المَنْشَأ **malarial cirrhosis**
هو تشمع كبدي يترافق مع الملاريا ، لكن الملاريا بشكل محتمل ليست عامل إمراضي للتشمع .

تَشَمُّعٌ اسْتِقْلاَبيّ **metabolic cirrhosis**
هو تشَمع الكبد المترافق مع الأمراض الاستقلابية ، مثل داء ترسب الأصبغة الدموية ، وداء ويلسون وأمراض خزن الجليكوجين ووجود الجلاكتوز في الدم واضطرابات استقلاب الأحماض الأمينية .

تَشَمُّعٌ صَغيرُ العُقَيْدات **micronodular cirrhosis**
نوع من التشمع النسيجي تتشكل فيه عقيدات صغيرة في الكبد .

تَشَمُّعٌ مُتَعَدِّدُ الفُصَيْصات **multilobular cirrhosis**
(= تَشَمُّعٌ تالٍ **(=postnecrotic**



Hepatic cirrhosis تشمع الكبد

المزمن الناتج عن رتق السبل الصفراوية الخلقي أو التضيقات الصفراوية .

تَشَمُّعٌ رُكوديّ **stasis cirrhosis**
هو مصطلَح عام يطلق على التشمع الكبدي الناتج عن انسداد تدفق (سريان) الوريد الكبدي .
انظر تحت cardic cirrhosis .

تَشَمُّعٌ زُهْريّ **syphilitic cirrhosis**
هو تشمعَ كبدي ناجَ عن السفلس (الزهري) الخلقي أو الثالثي .

تشمع تود **Todd's cirrhosis**
(= تَشَمُّعٌ صَفْراوِيٌّ أوَّلِيّ) **(=primary biliary cirrhosis)**

تَشَمُّعٌ سُمِّيّ **toxic cirrhosis**
انظر تحت macronodular cirrhosis .

تَشَمُّعٌ وَحيدُ الفَصّ **unilobular cirrhosis**
(= تَشَمُّعٌ صَفْراوِيٌّ أوَّلِيّ) **(=primary biliary cirrhosis)**

تَشَمُّعٌ وعائيُّ المَنْشَأ **vascular cirrhosis**
تشمعَ كَبدي يتلو انسداد الوريد الكبدي أو الوريد البابي أو الدوران الكبدي العام .

1ـ تَشَمُّعِيٌّ **cirrhotic**
2ـ مُتَشَمِّع
تشمعي ، يتعلق أو يتميز بالتشمع .

هُدَّابات **cirri**
(ف:هُدَّابَة) **(sing.cirrus)**
انظر تحت cirrus .

هُدَّابَة **cirrus**
(ج:هُدَّابات) **(pl.cirri)**
(عضو حس في بعض الأوالي)
1 ـ لواحق متنوعة الأشكال دقيقة و عادة مرنة ، مثل تلك التي تستخدمها العضيات من أجل الحركة كالأوالي محيطية الأهداب . يشاهد قضيب في الديدان المسطحة بشكل بروز شبيه بالأصبع في (Polychete parapodium) ، وهو فرع من القدم الصدرية لنوع من الأوز ، وهي لاحقة جانبية على السويقة أو القاعدة البعيدة

تَشَمُّعٌ ماسوريُّ الشَّكْل **pipe stem cirrhosis**
(يرافق الإصَابة بالبلهارسيا المنسونية بسبب تشكل أغلفة ليفية قاسية حول الأوعية الكبدية)
هو تشمع كبدي يتميز بتشكل ندبات تليفية حول الأوعية البابية الكبيرة ، تشاهد في داء البلهارسيات الكبدية ، حيث يحيط التليف بالطفيليات أو بالبيوض المتوضعة في فروع الوريد البابي .

تَشَمُّعٌ بَابِيّ **portal cirrhosis**
انظر تحت laennec's cirrhosis .

تَشَمُّعٌ تالٍ لالْتِهابِ الكَبِد **posthepatitic cirrhosis**
تشمع كَبَدي (عادة كبير العقيدات) ينتج كعاقبة (كمضاعفة) لالتهاب الكبد الحاد .

تَشَمُّعٌ تالٍ للنَّخَر **postnecrotic cirrhosis**
انظر تحتً macronodular cirrhosis .

تَشَمُّعٌ صَفْراوِيٌّ أوَّلِيّ **primary biliary cirrhosis**
هوَ شكل نادر للتشمع الصفراوي بآلية مجهولة ، حيث تتحطم القنيات الصفراوية داخل الكبدية الصغيرة في الوقت الذي تبقى فيه القنيات الرئيسية داخل وخارج الكبد مفتوحة . إن (90٪) من المرضى معظمهم نساء وفي أواسط العمر . يتميز بركود صفراوي مزمن مع حكة و يرقان و فرط كوليستيرول الدم والورم الأصفر وتلين عظام ، وفي المراحل المتأخرة يتميز بحدوث فرط ضغط الوريد البابي والفشل الكبدي . كل المرضى تقريباً لديهم أضداد للمتقدرات جائلة .

تَشَمُّعٌ رِئَوِيّ **pulmonary cirrhosis**
انظر تحتَ cirrhosis of lung .

تَشَمُّعٌ كُلْوِيّ **renal cirrhosis**
انظر تحتَ cirrhosis of kidney .

تَشَمُّعٌ صَفْراوِيٌّ ثانَوِيّ **secondary biliary cirrhosis**
هو تشمع كبدي ناتج عن الانسداد الصفراوي

مَقرون (كيمياء) **cis**

1 ـ بادئة بمعنى على هذه الجهة ، أو على الجانب نفسه ، أو على الجانب القريب .

2 ـ في الكيمياء العضوية ، يوجد ذرات معينة أو جذور كيمائية على الجهة نفسها .

3 ـ في الوراثة ، تشير إلى موضعين أو أكثر ، خصوصاً الأليل الكاذب ، يوجد على الكروموسوم نفسه في الزوج المتماثل .

ريتينال **II-cis retinal**

هو مصاوغ الريتين ألدهيد ، والذي يمكنه الارتباط بالأوبسين لتكوين الرودوبسين ، ويتكون من الريتينال المفروق (all-trans-retinal) بفعل إنزيم مزامرة الريتينال .

سيسابريد **cisapride**

دواء يعزز تحرر الأسيتيل كولين في الضفيرة العصبية العضلية المعوية ، ويستخدم ليحرض الإفراغ المعدي في معالجة الداء القلسي المعدي المريئي و الخزل المعدي ، ويعطى فموياً .

سيساتراكوريوم بيزيلات **cisatracurium besylate**

عامل محصر عصبي عضلي غير نازع للاستقطاب ، يعطى وريدياً كعامل مساعد في التخدير ليسهل التنبيب الرغامي ، يحدث ارتخاءً في العضلات الهيكلية خلال الجراحة ، ويسهل التهوية الاصطناعية .

سيس كلوميفين **cisclomiphene**

(= إينكلوميفين) **(=enclomiphene)**

انظر تحت enclomiphene .

بذور قِثَّاءِ الهِند **cismatan**

بذور نباتية تستخدم في بعض العلاجات العينية .

مِقصّ **cisors**

أداة للقطع ولها ساقان حادان على خلاف المشرط أو الشفرة .

سِيسْبلاتين (دواءٌ مُضادٌ للأورام) **cisplatin**

ثنائي الكلور ثنائي مينبلاتين ، وهو معقد بلاتيني متناسق قادر على إنتاج تصالبات بين وداخل شريط الدنا (DNA) ، ويملك طيف

عن الفم في (Crinoid) ، أو واحد من النتوءات حول الفم في حبليات الرأس التي تشكل معاً منخلاً لمنع دخول الجسيمات الكبيرة إلى الفم .

2 ـ الشعر الخشن على الحيوانات ، الأطول من معظم شعر الجسم لكن أقل خشونةً من أشعار اللمس أو أشعار الأنف .

هداية الرأس **cirrus capitis**

واحدة من الأشعار الطويلة لشعر مقدمة الرأس في الحصان .

هداية الذنب **cirrus caudae**

واحدة من الأشعار الطويلة في ذيل الحيوانات .

سابقة بمعنى الدَّوالي **cirs-**

سابقة بمعنى الدوالي .

قطعُ الدَّوالِي **cirsectomy**

مصطلح قديم كان يستعمل للتعبير عن عملية قطع الوريد المصاب بالدوالي .

تَصْليبُ الدَّوالِي **cirsenchysis**

العلاج بالتصليب في معالجة الدوالي الوريدية .

سابقة بمعنى الدَّوالي **cirso-**

قيلة دَواليَّة **cirsocele**

(=varicocele)

انظر تحت varicocele .

رَبْطُ الدَّوالِي **cirsodesis**

مصطلح قديم يعبر عن عملية ربط الوريد المصاب بالدوالي .

دَوالانِيّ **cirsoid**

دَوالِي السُّرَّة **cirsomphalos**

الدوالي التي تتوضع في السرة .

انظر تحت caput medusae .

دَوالِي المُلتحِمَة **cirsophthalmia**

الدوالي التي تتوضع في الأوعية الدموية للملتحمة .

مِبْضَعُ الدَّوالِي **cirsotome**

الأداة الجراحية المستعملة في قطع الأوردة المصابة بالدوالي .

بَضْعُ الدَّوالِي **cirsotomy**

العمل الجراحي المتبع لقطع الدوالي .

انظر تحت cisterna interpeduncularis .

الصِّهْريجُ المُخَيخِيُّ البَصَلِيّ **cerebellomedullary cistern**

يسمى أيضاً (Cisterna cerebellomedullaris) ، (Cisterna magna) ، وهو صهريج تحت العنكبوتي بين السطح السفلي من المخيخ والسطح الظهراني من البصلة السيسائية .

صهْريجُ التَّصالُبَة **chiasmatic cistern**

صَهْريجُ الكَيلوس **chyle cistern**

يَسمى أيضاً (Cisterna chyli) ، وهو توسع كيسي في النهاية السفلية من القناة الصدرية ، والتي تنفتح عليها القناتان اللمفية القطنية والجذع المعوي اللمفاوي ، ووجوده غير ثابت وإذا وجد فيقع خلف الأورطي وأمام جسمي الفقرتين القطنيتين الأولى والثانية .

صهْريجُ التَّصالُبَة **cistern of chiasma**

يَسمى أيضاً (Chiasmatic cistern) ، وهو صهريج ممتد من الصهريج الحدبي باتجاه الأمام لتقع تحت التصالبة البصرية ، على الحافة العلوية من الجسم الثفني ويتكامل هذا الصهريج مع صهريج الصفيحة الانتهائية .

صهْريجُ حُفْرَة سَيلفيوس **cistern of fossa of Sylvius**

(= صهْريجُ الحُفْرَة الجَانبيَّة) (للمُخّ) **(=cisterna fossae lateralis)**

انظرَ تحت cisterna fossae lateralis cerebri .

صهْريجُ الحُفْرَة اَلجَانبيَّة للمُخِّ **cistern of lateral fossa of cerebrum**

انظرَ تحَت cisterna fossae lateralis .

صهريج بيكيه **cistern of Pecquet**

(= صهْريجُ الكَيلوس) **(=cisterna chyli)**

انظر تحَت cisterna chyli .

صهْريجُ سيلفيوس **cistern of Sylvius**

(= صهْريجُ الحُفْرَة الجَانبيَّة للمُخِّ) **(=cisterna fossae lateralis cerebri)**

الصهَاريج تحت العنكبوتية ، وهي توسعات موضعة في المسافة تحت العنكبوتية ، توجد في واسع من الفعالية المضادة للأورام ، ويستخدم في معالجة طائفة واسعة من الأورام ، خصوصاً النقائل المبيضية وسرطانة الخصية و سرطانة المثانة المتقدم ، و يعطى وريدياً .

سِيسْبلاتين **cis-platinum**

دواء مضاد للأورام .

قطا ؛ وَحَم **cissa**

تسمى أيضاً (Pica) ، (Citta) ، (Cittosis) ، وتعني في اللاتينية الشهية الموهمة أو الخادعة ، وهو نمط من الشهية بمواصفات خاصة هي الإحساس بولع شديد لتناول مواد غير طبيعية ، وتشاهد لدى الأطفال الصغار ، وفي الحمل ، عند انقطاع الشهية بشدة وفي سوء التغذية والهستيريا والأمراض النفسية .

العِنَبُ اللبْلابيّ (جِنْسُ نباتٍ أفريقي) **Cissampelos**

جنس من نبات الكرمة المتسلق من العائلة اللبلاب (Menispermaceae) ومنه العنب اللبلابي (Cissampelos Ccapensis) ، في أفريقيا الجنوبية ، وهو نبات مقيء ومسهل . أما العنب اللبلابي من النوع المعترش (Pareira) ، فهو نبات كرمة كاذب أو مخملي الأوراق ، ويستخدم في الأجزاء المدارية من أمريكا لمعالجة عضات الأفاعي وكمدر بولي وطارد للبلغم ومطمث وخافض للحرارة .

صِهْريج **cistern**

هو حيز مغلق يعمل كمستودع للسوائل .

انظر تحت cisterna .

الصهريج المحيط **ambient cistern**

انظر تحت citerna ambiens .

الصِّهْريجُ المُخَيخِيُّ الأمامِيّ الوَحْشِيّ **anterolateral cerebellar cistern**

توسع صهريجيَ تحت العنكبوتي يقع في الجهة الأمامية الوحشية من المخيخ بينه وبين الحدبة العصبية .

الصِّهْريجُ القاعدِيّ **basal cistern**

(= الصِّهْريج بَيْنَ السُّوَيقَتَين) **(=cisterna interpeduncularis)**

الصِّهْريجُ فَوقَ الثَّفَنِي **supracallosal cistern**
صهريج يتوضع فوق الجسم الثفني ويتلقى السائل النخاعي من صهريج الصفيحة الانتهائية .

الصَّهاريجُ الانْتِهائيَّة **terminal cisterns**
هي أزواج منَ القَنوات التي تتوضع بشكل مستعرض ، والتي تندمج مع نبيبات عضلية ، والتي تشكل مع النبيبات T المتوسطة ثلاثي العضلات الهيكلية .

صِهْريج **cisterna TA**
(ج: صَهاريج) (pl.cisternae)
هو حيز يعمل كمستودع للملف أو سوائل الجسم الأخرى ، خاصة واحد من الأحياز تحت العنكبوتية الممتدة والمحتوية على السائل النخاعي الدماغي .

الصِّهْريجُ المُحيْط **cisterna ambiens**
المسافة تحتَ العنكبوتية التي تحيط بالدماغ المتوسط ، وهي تربط الصهريج الدماغي الوريدي الكبير مع الصهريج بين السويقتين . يسمى أيضاً بصهريج الدماغ المتوسط (Cisterna mesencephalicum) .

الصِّهْريجُ القاعديّ **cisterna basalis**
(= الصِّهْريجُ بَيْنَ السُّوَيقَتَين) **(=cisterna interpeduncularis)**
انظر تحت cisterna interpeduncularis .

الصِّهْريجُ المُخَيْخيُّ البَصَليّ **cisterna cerebellomedullaris TA**
يسمَى أيضاً (Cerebellomedullary cistern) ، (Cisterna magna) ، وهو أكبر صهريج تحت العنكبوتية يقع تحت السطح السفلي من المخيخ والسطح الظهراني من البصلة السيسائية .

الصهريج المخيخي البصلي الخلفي **cisterna cerebellomedullaris posterior**
هو توسع في المسافة ما بين السطح السفلي للمخيخ والسطح الخلفي للبصلة السيسائية ، ويستمر إلى الأسفل مع المسافة تحت العنكبوتية للنخاع الشوكي . يمكن بزله بواسطة إبرة تدخل

المناطق التي لا تكون فيها الأم الجافية و الأم العنكبوتية تتبعان المحيط الدماغي بشكل لصيق مع بقاء تغطيتها للأم الحنون ، وتفيد بكونها مخزناً للسائل الدماغي الشوكي .

الصِّهْريجُ الكَبير **great cistern**
(= الصِّهْريجُ المُخَيْخي البَصَلي) **(=cisterna cerebellomedullaris)**
انظر تحت cisterna cerebellomedullaris posterior .

الصِّهْريجُ بَيْنَ السُّوَيقَتَين **interpeduncular cistern**
انظر تحت cisterna interpeduncularis .

الصِّهْريجُ القَطَنيُّ **lumbar cistern**
يسمى أيضاً (cisterna lumbalis) ، وهو التوسع تحت العنكبوتي الذي يؤوي النخاع العصبي ، والذي يبدأ من الفقرة القطنية الثانية حتى العجزية الثانية وفيه يصلح البزل القطني . وتشغله الجذور الأمامية والخلفية العصبية التي تسمى ذنب الفرس .

الصَّهاريجُ اللِّمْفيَّة **lymphatic cisterns**
توسعات لمفية وَعائية يمكن أن تقع تحت الجلد أو في العضلات . وقد تكون موجودة منذ الحياة الجنينية وقد تدخل في آليات تشكل الأورام الوعائية اللمفية .

الصِّهْريجُ الجِسْريُّ **pontine cistern**
الصهريج الجسري ، هو فراغ واسع في بطن الجسر ، يستمر بشكل الذنب مع المسافة العنكبوتية النخاعية والصهريج المخيخي البصلي وبشكل المنقار مع المسافة بين السويقتين يمر الشريان القاعدي عبره .

الصِّهْريجُ الخَلْفيّ **posterior cistern**
(= الصِّهْريجُ المُخَيْخيُّ البَصَليّ) **(=cisterna cerebellomedullaris)**
انظر تحت cisterna cerbellomedullaris posterior .

الصَّهاريجُ تَحْتَ العَنْكَبوتيَّة **subarachnoidal cisterns**

الفصين الصدغيين فوق قاعدة الدماغ (Base of brain) .

صِّهْرِيجٌ بَيْنَ السُّوَيقَتَيْن **cisterna interpeduncularis TA**
هو توسع في المسافة تحت العنكبوتية ما بين السويقات الدماغية . يسمى أيضاً بالصهريج القاعدي (Basal cistern) .

صِهْرِيجُ الصَّفيحَة الاَنْتهائيَّة **cisterna lamina terminalis**
صهَريَج يمتد متصلاً مع صهريج التصالبة البصرية نحو أمام المخ ويقع عند ركبة الجسم الثفني والدماغ البيني .

الصِّهْرِيجُ الكَبِير **cisterna magna TA**
(=الصِّهْرِيج المُخِّيُّ البَصَلِيّ) **(=cisterna cerebellomedullaris)**
انظر تحت cisterna cerebello medullaris posterior .

صهريج الدماغ المتوسط **cisterna mesencephalicum**
انظر تحت cisterna ambiens .

الصِّهْرِيجُ الجِسْرِيُّ **cisterna pontis**
انظر تحت pontine cistern .

الصهريج خلف المهاد **cisterna retrothalamica**
هو المسافة تحت العنكبوتية التي تقع خلف المهاد .

صِهْرِيجُ الشِّقِّ الجَانبيّ **cisterna sulci lateralis**
يسمى أيضاً صِهْرِيجُ سَلَفيوس (Cisterna Sylvii) ، (Cisterna fossae lateralis) ، وهو صهريج الحفرة الجانبية الدماغية وله علاقة بشق سلفيوس الجانبي . ويسمى أيضاً (Cistern of the lateral sulcus) .

صِهْرِيجُ أَوردَة المُخِّ الكَبِيرَة **cisterna venae magnae cerebri**
هو الجزء العلوي المندمج من المسافة تحت العنكبوتية ، يتوضع في الزاوية ما بين شريط من خلال الغشاء الفهقي القذالي الخلفي (البزل الصهريجي) . يسمى أيضاً بالصهريج الكبير والصهريج العظيم والصهريج الخلفي .

صِهْرِيجُ التَّصالُبَة **cisterna chiasmatica TA**
هَو الحيز تحت العنكبوتية بين التصالبة البصرية ومنقار الجسم الثفني . يسمى أيضاً الصهريج التصالبي (Cistern of chiasma) .

صِهْرِيجُ التَّصالُبَة **cisterna chiasmatis**
هَو الحيز تحت العنكبوتية بين التصالبة البصرية ومنقار الجسم الثفني . يسمى أيضاً الصهريج التصالبي (Cistern of chiasma) .

صِهْرِيجُ الكَيلُوس **cisterna chyli TA**
جزء متسع من القناة الصدرية في منشأها (بدايتها) في المنطقة القطنية . يستقبل هذا الجزء عدة أوعية جامعة للمف ، وهي تتضمن الأوعيةاللمفاوية الهضمية والقطنية والجذوع الوربية النازلة . يسمى أيضاً الأمبولة الكيلوسية (Ampulla chyli) والكيسة الكيلوسية وصهريج بيكيه ، والصهريج الكيلوسي.

صِهْرِيجُ الحُفْرَة الجَانبيَّة للمُخِّ **cisterna fossae lateralis cerebri TA**
هو الحيَز الذي يقع ما بين الحفرة العنكبوتية و الحفرة الجانبية للمخ . تسمى أيضاً حفرة سيلفيوس (Cisterna fossae sylvii) .

صِهْرِيجُ حُفْرَة سَيلْفيوس **cisterna fossae Sylvii**
(= صِهْرِيجُ الحُفْرَة الجَانبيَّة للمُخّ) **(=cisterna fossa lateralis cerebri)**
انظر تحتَ cisterna fossa lateralis cerebri .

الصِّهْرِيجُ العَميقُ بَيْنَ السُّوَيقَتَيْن **cisterna intercruralis profunda**
يسمى أيضاً (Cisterna interpeduncularis) ، (Cisterna basalis) ، (Cisterna cruralis) ، (in- terpeduncular cistern) و (Tarin's space) وهو توسع في الحيز تحت العنكبوتي وأما الحدبة حيث يمتد الغشاء تحت العنكبوتي بين

انتفاخات مجوفة في النبيبات للجهاز الشبكي للهيولى العضلية ، والتي تسهم في اقتران النبيبات العضلية الهيولية الشبكية مع الغمد الليفي للعضلات القلبية .

صهاريج cisternae
(ف: صِهْرِيج) (pl.cisterna)

انظر تحت cisterna .

صِهْريجِيّ cisternal

صهريجي ، يتعلق بالصهريج ، خصوصاً الصهريج المخيخي البصلي .

متعلق بتصوير الصَّهاريج cisternographic

تصْويرُ الصَّهاريج cisternography

تصوير الصهريج القاعدي للدماغ بعد حقن المادة الظليلة في الأحياز تحت العنكبوتية .

تصوير الصهاريج الهوائي air cisternography

رؤية الصهاريج الدماغية بعد حقن (5 ملي لتر) من الهواء تقريباً بواسطة البزل القطني ، يستخدم في تقييم الكتل في الزاوية الجسرية المخيخية وفي كشف الأورام السمعية الصغيرة في مجرى السمع الباطن .

تصوير الصهاريج بالمتريزاميد metrizamide cisternography

رؤية الصهاريج الدماغية بالتصوير المقطعي المحوسب بعد الحقن داخل القراب بالمتريزاميد .

تصوير الصهاريج بالنوكليدات المشعة radionuclide cisternography

تصوير الصهاريج الدماغية بعد الحقن داخل القراب بالنوكليد المشع .

سِيْسْترون؛ مَقْرون (كروموسومات) cistron

أصغر وحدة في المادة الوراثية يجب أن تكون سليمة لتقوم بدور الناقل للمعلومات الوراثية ، ولتحديد تسلسل الأحماض الأمينية في سلسلة عديد ببتيد واحدة . يحدد السيسترون بواسطة اختبار المقرون ـ المفروق (لتحديد مواضع الطفرات على الكروموسومات) . بتحديد وحيد ، فإن المورثة تكون مثلة للسيسترون .

الجسم الثفني والسطوح العلوية للمخيخ والدماغ المتوسط ، ويحتوي على الوريد الكبير للمخ .

الصَّهاريجُ تَحْتَ العَنْكَبوتِيَّة cisternae subarachnoideae TA

توسعاَت متموضعة في المسافة تحت العنكبوتية ، توجد في المناطق التي لاتكون فيها الأم الجافية و الأم العنكبوتية تتبعان المحيط الدماغي بشكل لصيق مع بقاء تغطيتها للأم الحنون ، وتفيد بكونها مخزناً للسائل الدماغي الشوكي .



Cisternae صهاريج

الصهريج المقابل الاسطواني cylindrical confronting cisterna

بنى هيولية تترافق مع بنى أنبوبية شبكية في الخلايا في العديد من الحالات المرضية المختلفة التي تتضمن الاضطرابات المناعية والتنشؤية والأمراض العصبية التنكسية والعدوى بالأمراض الفيروسية .

الصِّهْريجُ حَولَ النَّواة perinuclear cisterna

هو المسافة التي تفصل ما بين الغشاء النووي الداخلي عن الغشاء النووي الخارجي . يسمى أيضاً بالمسافة حول النواة (Perinuclear space) .

الصهريج تحت الغمد الليفي subsarcolemmal cisternae

citalopram hydrobromide **سيتالوبرام هيدروبروميد**

هو مركب مضاد للاكتئاب يستخدم في معالجة الاضطرابات الاكتئابية الرئيسية ، يعطى فموياً .

Citanest **سيتانست**

العلامة التجارية لهيدروكلوريد البريلوكائين .

Citelli's syndrome **متلازمة سيتللي**

[متلازمة منسوبة للطبيب سالفاتور سيتللي (Salvatore Citelli) ، وهو اختصاصي أمراض الحنجرة ، 1875-1947] .

انظر تحت syndrome .

Citellus (=Spermophilus) **هُوقل (جِنسُ حيوانٍ منَ السنْجابيّات)**

citrate **سيترات**

أي شكل أنيوني أو ملحي أو إستر من حمض الستريك .

citrate phosphate dextrose **دكستروز فسفات السيترات**

محلول مضاد للتخثر .

citrate phosphate dextrose adenine **سيترات فسفات دكستروز الأدينين**

محلول مضاد للتخثر .

cupric citrate **كبريك السيترات**

بودرة خضراء مزرقة اللون بللورية ، يستخدم كمطهر وقابض .

ferric citrate **سيترات الحديديك**

حبيبات معدنية حمراء اللون أو حبيبات بنية اللون ، تستخدم ككاشف . يسمى أيضاً (Iron citrate) .

citrate (si)-synthase **إنزيم سينثاز السيترات**

إنزيم من زمرة الليـاز يحفـز تكثف الأوكسالوآسيتات ومجموعة الأستيل لتميم الإنزيم A لتشكل السيترات والتميم الإنزيمي A ، وهذا هو التفاعل المبدئي في دورة الحمض الثلاثي الكربوكسيل .

citrate cleavage enzyme **إنزيم شطر السيترات**

انظر تحت ATP citrate lyase .

citrated **سيتراتيّ**

يحتوي على السيترات ، خصوصاً سيترات البوتاسيوم .

citreoviridin **سِيتريُوفِردين (سم فِطري المنشأ)**

سم فطري يوجد في فطور المكنسية الليمونية السامة ، والتي أحياناً تلوث الأرز ، ويمكن أن تسبب أذية قلبية .

citric acid **حَمْضُ السيتريك؛ حَمْضُ اللَّيمون**

مركب من الفواكه الحمضية والذي يلعب دوراً وسيطياً في دورة الحمض الثلاثي الكربوسيل (حلقة كريبس) تقوم السيترات بخلب أيونات الكالسيوم ، وتمنع تخثر الدم ، وتستخدم كمضاد للتخثر في الدم الكامل المختزن والكريات الحمر المختزنة وأيضاً في العينات الدموية .

citrinin **سيترينين**

سم فطري ينتج من قبل فطور الرشاشية المغراء والمكنسية الليمونية والأنواع التابعة لها ، والتي تلوث القمح . تسبب اعتلال كلوي بالسم الفطري في الدواجن وهو متورط في اعتلال الكلية البلقاني في الإنسان .

Citrobacter **اللَّيمونيَّة (جِنسُ جَراثيمٍ منَ الأمْعائيَّات)**

جنس من جراثيم سلبية الجرام ، لا حيوائية ، جراثيم عصوية الشكل من عائلة الأمعائيات ، تشكل عضيات متحركة قادرة على استخدام السيترات كمصدر وحيد للكربون . توجد هذه العضيات في الماء و الطعام والبراز والبول . وتترافق الإصابة بها بالإسهال والعدوى الثانوية في المرضى المضعفين ، مسبباً أحياناً انتاناً دموياً بدئياً شديداً .

citrobacter amalonaticus **الليمونية الأمالوناتيك**

نوع من الجراثيم تنتج الإندول ، لا تستطيع تخمير الأدونيتول ، ولا تثبط من قبل سيانيد البوتاسيوم ، توجد في الإنسان كممراض انتهازي .

citrobacter diversus **الليمونية المتحولة**

جنس من النباتات من عائلة القرعيات ، موطنها الأصلي أفريقيا . الحنظل الشائع هو بطيخ الماء .

بيلة سيتراتيَّة **citruria**

زيادة طرح مادة السترات في البول .

اللَّيمون (جِنسُ نباتٍ مِنَ السَّذابيَّات) **Citrus**

هو نوع من الفاكهة وجنس من الأشجار من عائلة السذابيات (Rutaceae) ، يزرع بشكل واسع من أجل ثماره ، والعديد من ثماره غنية بالڤيتامين C ويعمل كمصدر للمنكهات .

النَّارَنْج **Citrus aurantium**

(= اللَّيمونُ النَّارَنْجيُّ)

اللَّيمونُ العطْريّ **Citrus bergamia**

(= اللَّيمونُ البرْغاميُّ)

اللَّيمون **Citrus limonum**

(= اللَّيمونُ اللَّيمونيُّ)

الكبَّاد **Citrus medica**

(= اللَّيمونُ الطِّبِّيُّ)

اليوسفيّ **Citrus nobilis**

(= اللَّيمونُ النَّبيل)

الأُتْرُج **Citrus paradisi**

يسمى أيضاً اللَّيمونُ الفرْدَوسيُّ ، وهو نوع من الحمضيات المطعمة بين النارنج والبرتقال .

البُرْتُقال **Citrus sinensis**

(= اللَّيمونُ الصِّينيُّ)

الليمون الحلو ، أو البرتقال ، أو الليمون الصيني .

وَحَم؛ القطا **citta**

هو مرادف لمصطلح (Pica) .

انظر تحت cissa .

انظر تحت pica .

وَحَم؛ القطا **cittosis**

وهو مرادف لمصطلح (Pica) .

انظر تحت cissa .

انظر تحت pica .

مُستشفى المدينة **city hospital**

مستشفى كبير ضمن المدينة يؤمن احتياجات نوع من الجراثيم تنتج الأندول ، وتخمر الأدونيتول ، وتثبط من قبل سيانيد البوتاسيوم . أحياناً تسبب التهاب السحايا عند الولدان .

الليمونية الفروندي **citrobacter freundii**

النوع الجرثومي الأشيع الذي يعزل . لا ينتج الأندول أو يخمر الأدونيتول ولا يثبط من قبل سيانيد البوتاسيوم ، يوجد في التربة و الماء ومياه البالوعات والطعام ، وفي العينات الطبية المأخوذة من الأشخاص الطبيعيين ، وكعامل ممراض انتهازي .

الليمونية المتوسطة **citrobacter intermedius**

نوع من الليمونية فروندي . تسمى أيضاً الإشريكية المتوسطة .

الفطر الليموني **citromyces**

الاسم الرسمي للمكنسية (البنسليوم) وهو جنس من الفطر بشكل مكنسة .

الكبَّاد **citron**

(= اللَّيمونُ الطبيُّ) **(=citrus medica)**

شجرة شبيهة بشجرة البرتقال .

أترُجيَّة (نبات) **citronella**

يسمى أيضاً (Cymbopogon nardus) ، وهو مصدر زيت الإذخر (الأترجية) .

سيترات الفسفات **citrophosphate**

مركب من السيترات والفسفات .

سِيترولين (مستقلب كبدي لليوريا) **citrulline**

هو ألفا ـ أمينو دلتا ـ كرباميد حمض الفاليرك الطبيعي . والذي يتشكل من الأورنيثين ، وهو نفسه يتحول إلى الأرجنين في دورة اليوريا .

وُجودُ السيترولين في الدَّم **citrullinemia**

(عَوَزُ إنزيم مُخلقة أرجنينو سكسينات)

1 ـ عوز إنزيم سينثاز الأرجنينو سكسينات .

2 ـ زيادة السيترولين في الدم .

بيلة سيترولينيَّة **citrullinuria**

1 ـ عوز إنزيم سينثاز الأرجنينوسكسينات .

2 ـ طرح (إفراز) مستويات عالية من السيترولين في البول .

الحَنْظَل (نباتٌ مِنَ القرْعيَّات) **Citrullus**

كان هو من نفس جنس المبغثرة الشعرانية أم كان خلاف ذلك .

المُبَغْثَرَةُ الجيفيَّة Cladosporium carrionii

نوع يشكل عامل لداء الفطار الاصطباغي .

المُبَغْثَرَةُ العُشْبِيَّة Cladosporium herbarium

من الفطريات أو العفنيات التي تعتبر من العوامل الأرجية التي يمكنها استثارة النوبة الربوية .

المُبَغْثَرَةُ المَنْسونيَّة Cladosporium mansonii

انظر تحت Malassezia furfur .

المُبَغْثَرَةُ الشَّعْرانيَّة Cladosporium trichoides

أنواع تسبب خَراجات ثخينة الجدران في الدماغ وأحياناً التهاب سحايا . يختلف العلماء عما إذا كانت المبغثرة البانتينية من نفس النوع أم كانت خلاف ذلك .

المُبَغْثَرَةُ الويرنيكيَّة Cladosporium werneckii

انظر تحت Exophiala werneckii .

كلادوتريكس cladothrix

جنس من الجراثيم تتألف حالياً من الكائنات الحية المصنفة من أجناس الشعيات ، الخيطاء ، النوكاردية والكراتية والمتسلسلة .

كلادريبين cladribine

مضاد استقلابي بوريني ، يستخدم كمضاد للتنشؤات في معالجة ابيضاض الدم بالخلايا المشعرة ، يعطى وريدياً . يسمى أيضاً 2-كلورودوكسي أدينوزين (2- Chlorodeoxya-denosine) .

مُطالبَة claim

شكوى أو حق مكتسب يقوم صاحبه بالمطالبة به .

مُعامَلَة المُطالَبات claims processing

الإجراءات التي يقوم بها المطالب بحقه لتحصيله .

مُراجَعَةُ المُطالَبات claims review

عملية النظر والتدقيق في أحقية المطالبة .

سَنَدُ تَأمين ضدّ المُطالَبات claims-mode policy

وثيقة تأمين تتكفل فيها شركة التأمين برد تلك المدينة الصحية والإسعافية .

الأجسام السيفاتية، تبكل الجلد Civatte'bodies, poikiloderma

[أجسام منسوبة للطبيب أشيل سيفات (Achille civatte) ، وهو اختصاصي أمراض جلدية ، فرنسي ، 1805-1844] .

انظر تحت poikiloderma .

رباط تشيفينيني civinini's ligament ,process (spine)

[رباط منسوب للطبيب فيليبو تشيفينين (Filippo Civinini) ، وهو مشرح إيطالي 1805-1844] .

انظر تحت ligamentum pterygo-spinale .

التِهابُ الأوعِيَةِ اللمْفيَّةِ الصَّمْغيُّ cladiosis (=gummatous lymphangitis)

اسم أطلق على حالة وحيدة من الداء الفطري تشبه داء الشعريات المبوغة .

أشْنَةُ الأيل Cladonia

جِنْسٌ من الحَزاز .

مُتغصِّنُ الخُصْيَةِ الواطسونِيّ (=الواطسونِيَّة الواطسونيَّة) Cladorchis Watsoni (=Watsonius Watsoni)

انظر تحت Watsonius Watsoni .

داءُ المُبَغْثرات cladosporiosis

مصطلح عام يطلق على العدوى بالمبغثرة (جنس من الفطريات) ، تتضمن إصابة الدماغ بالخراج والتهاب السحايا ، وإصابة الجلد بالفطار الاصطباغي والسعفة السوداء .

المُبَغْثَرَة (جِنسٌ مِنَ الفِطريَّات) Cladosporium

جنس من الفطريات الناقصة الرمية غالباً ، من صنف الفطريات الخوطية ، من فصيلة المبرساوات ، والتي تملك برعم لا جنسي عديم الحواجز ، ومستطرف .

المُبَغْثَرَةُ البانْتيَّة Cladosporium bantianum

نوع يسبب خراج ثخين الجدران في الدماغ وأحياناً التهاب سحايا . اختلف العلماء عما إذا

المطالبات أو ضمانها كوكيل عن المشترك لديها بالتأمين .

closed claim — **مُطالَبَةٌ مُغْلَقَة**

تكون المطالبة مغلقة عندما يقرر الطبيب أن المعالجات الإضافية لن تحسن الحالة أو عندما تكون الحالة خفيفة والمعالجة ناجحة .

open claim — **مُطالَبَةٌ مَفْتُوحَة**

المطالبة المسموحة دون أن تكون لها عوامل تغلقها .

clairvoyance — اسْتِبْصار

شكل من الإدراك خارج الحسي عندما يطلب معرفة الحوادث الشخصية بشكل مكتسب دون استخدام الحواس .

clammy — مُتَنَدٍ بالعَرَق

رطب الجلد ، مع برودة عادة .

clamoxyquin — كلامُوكسيكين

دَواءٌ مُضادٌّ للأميبات .

clamp — مِلقاط

ملقاط .

anastomosis clamp — **مِلْقاطُ المُفاغَرَة**

مَلقاط خاص يسهل عمل المفاغرة بين فوهات القطع المطلوب مفاغرتها .

bone-holding clamp — **مِلْقاطُ مَسْك العظام**

أداة التقاط العظام والإمساك بها أثناء عمليات الجراحة العظمية .

carotid clamp — **مِلْقاطُ السُّباتي**

أداة التقاط الأوعية وخاصة الشريان السباتي في الجراحة الوعائية .

cholecystectomy clamp — **مِلْقاطُ اسْتِئْصال المَرارَة**

أداة ملقطية تستخدم في عمليات استئصال المرارة .

circumcision clamp — **مِلْقاطُ الخِتان**

أداة ملقطية تستخدم في الإمساك بالقلفة عند إجراء عمليات الختان .

clamp band — **شَرِيطُ مِلْقاط**

ملاقط بنماذج مختلفة تهدف إلى تناسب الملقاط مع مقاسات مختلفة من الأشياء التي يطلب ربطها أو التقاطها ، فمنها مدورة مع فتحة يمكن التحكم بها بواسطة شريط .

clamp holder — **مُمْسِكُ المِلْقاط**

القبضة التي يتم التحكم بها بالملقاط .

Cope's clamp — **مِلْقاطُ كُوبْ**

(في جراحة القَولون والمستقيم)

ملقاط هرس مع أقسام عديدة متمفصلة لاستخدامها في جراحة القولون والمستقيم .

cotton roll rubber dam clamp — **مِلْقاطُ لَفّات القُطْن**

ملقاط سد مطاطي مع جناح ذو فم و لسان أو حافة بارزة لمسك لفات القطن لوضعها في الفم . مفيد في وضع الذهب المباشر أو أي ترميم بأي معدن آخر في تحضير الحفرة تحت اللثوية الصنف الخامس .

Crile's clamp — **مِلْقاطُ كرايل**

(ذو نهايتين مطاطيتين للإرقاء في الجراحة الوعائية)

ملقاط ذو نهايتين مطاطتين للارقاء الدموي المؤقت في خياطة الأوعية الدموية الجراحي .

Doyen's clamp — **مِلْقاطُ دوانْ**

(ذو نصلتين مرنتين للإرقاء في جراحة المعدة والأمعاء)

ملقاط ذو نصلتين مرنتين لمسك النسج للسيطرة على النزف بشكل مؤقت خلال العمل الجراحي في الجهاز الهضمي .

fenestrated clamp — **مِلْقاطٌ مُنَوفَذ**

محيط الملقاط يكون مثقب .

gant`s clamp — **ملقاط جانت**

ملقاط ذو جناح أيمن يستخدم في جراحة البواسير .

gingival clamp — **مِلْقاطٌ لِثَوِيّ**

ملقاط يستخدم كمبعد للنسج اللثوية .

Goldblatt's clamp — **مِلْقاطُ جولْدبلاَتْ**

(للشريان الكلوي لتوليد ضغط تجريبي)

والأمعاء والقولون .

مِلْقاطُ العُنَيْقَة **pedicle clamp**

مَلْقاطُ القَضيب **penis clamp**

َ ملقاط معد لمنع تسرب البول من القضيب في حال وجود سلس البول .



ملقاط المفاغرة Anastomosis clamp

مِلْقاطُ بُوتْ **Pott's clamp**

َ(لإمساك الأوعية الدموية بشكل غير راضح)

ملقاط غير راضح ، يستخدم لقبض الأوعية الدموية .

مِلْقاطُ رانْكِينْ **Rankin clamp**

َ(ثلاثي النَصال في عمليات استئصال القَولون)

ملقاط للشريان الكلوي لإحداث فرط ضغط شرياني تجريبي .

مِلْقاطُ هيرْف **Herrf's clamp**

َملقاط مَنسوب للعالم هيرف لكنه لم يعد يستعمل الآن .

مِلْقاطُ جُوزيف **Joseph's clamp**

َ(في عمليات الأنف)

ملقاط يستخدم بعد العمليات الأنفية لتحسين رصف الأجزاء المتحركة من الهيكل العظمي للأنف .

مِلْقاطُ العَتَلَة الضَّاغطَة **lever compressing clamp**

ملقاطَ شديد الضغط لأنه يعتمد على مبدأ العتلة وهو مجهز بها .

مِلْقاطُ مارْتل **Martel's clamp**

َ(لعملياتَ قطع القَولون)

ملقاط الهرس ، يستخدم في استئصال القولون .

مِلْقاطُ الأوعيَة الدَّقيقَة **microvascular clamp**

مَلقاط دقيقَ الَرأس معد لالتقاط الأوعية الدموية الصغيرة .

مِلْقاطُ ميكُوليتْش **Mikulicz's clamp**

َ(في جراحةَ الأمعاء)

ملقاط يستخدم في هرس الحاجز ما بين الأقسام القريبة والبعيدة من القولون بعد نقل عضو من الداخل إلى الخارج .

مِلْقاطٌ مُسدّ **occlusion clamp**

َملقاط يَحقق القدرة على إغلاق الأوعية أو المجاري الأنبوبية وسدها ومنع التسريب منها .

المِلقاط الرقعي **patch clamp**

نوع من الملقاط الفولطاجي حيث يضغط مسرى رقعي في مواجهة منطقة من الغشاء البلازمي للخلية مشكلاً سدادة كهربائية محكمة بحيث يمكن قياس التدفق المستمر عبر القنوات الأيونية .

مِلْقاطُ بَايَرْ(في جراحة الأمعاء) **Payr clamp**

ملقاط هرس ، يستخدم في استئصال المعدة

صوت حاد أو قرعي معدني حاد كقرع الجرس . وقد تسمع في بعض الأمراض الهوسية .

تلاحُن **clanging**

نمط من الكلام يحكم فيه الصوت اختيار المفردات أكثر من الحواس ، ويحل السجع والتلاعب اللفظي (المترافق مع اللحن) محل المنطق ، يشاهد بشكل شائع في الفصام ونوب الهوس .

سَيَلان **clap**

(=gonorrhea)

انظر تحت gonorrhea .

طبْطبَة **clapotage**

(صوت يظهر عند هز الجسم وتحرك الهواء والسوائل في المعدة)

طبْطبَة **clapotement**

(=succussion sounds)

الصوت المتناثر الذي يسمع بالرج . يسمى أيضاً (Clapotage) .

خطُّ كلابتون **Clapton's line**

خطٌّ لثَويٌّ أخْضَرُ يشاهد في الانسمام النُّحاسي .

صكّة **claquement**

(=snap)

انظر تحت snap .

صكّةُ الفَتْح **claquement d'ouverture**

انظر تحت opening snap .

خلايا كلارا **Clara cells**

[خلايا منسوبة للطبيب ماكس كلارا (Max Clara) ، وهو مشرح أسترالي ، ولد عام 1899]

خلايا غير مهدبة في القصيبات .

انظر تحت cell .

مُرَوِّق **clarificant**

عامل يجعل السوائل المعكرة رائقة .

1ـ إيضاح **clarification**

2ـ ترْويق

جعل السوائل المعكرة رائقة .

ملقاط ثلاثي النصل لهرس القولون أثناء استئصاله .

مَلاَقيطُ السُّدود المَطَّاطيَّة **rubber dam clamps**

أداة مصنوعة مَن المعدَن الرفاص الذي يستخدم لإبقاء السد المطاطي على الأسنان . له فكين منحنيين بحيث يلمس الأسنان والعظم معاً وبالتالي يربط الفكين .

مِلْقاطُ سيرْت **Sehrt's clamp**

(= ضاغِطَةُ سيرْت) (=Sehrt's compressor)

(لضغطَ الأورَطي)

ملقاط يستخدم لضغط الأبهر أو لضغط الطرف لوقف النزف . يسمى أيضاً بضاغطة سيرت (Sehrt's compressor) .

مِلْقاطُ المَعِدَة **stomach clamp**

ملقاط يستعمل في الأعمال الجراحية الهضمية على المعدة .

مِلْقاطُ الفُوَط **towel clamp**

ملقاط معد لاستخراج الفوط والشاش لاستعمالها أثناء العمل الجراحي .

مِلْقاطُ الفُولْطاج **voltage clamp**

تقنية كهربائية توظف مبدأ التأثير الراجع لتفرض اختلاف في الكمون الثابت عبر الغشاء الخلوي . يكون الفولطاج عبر الغشاء الخلوي ثابتاً في مستوى محدد والتغيرات المستمرة لموازنة أي تدفق محرض للأيونات ثابتة . يقاس التغير المستمر بقياس التغير في التوصيل للغشاء الخلوي لأيون نوعي أو أكثر .

مِلْقاطُ ويليت **Willet's clamp**

(لقطعَ النزيف في المشيمة المنزاحة)

مِلْقاطُ ييلن (في الختان) **Yellen clamp**

ملقاط نَوعي يستخدم في الختان .

تثبيت **clamping**

في قياس الإفراز الأنسوليني وفعاليته ، فإنه يتم تسريب المحلول السكري بمعدل منتظم بشكل دوري وذلك للمحافظة على تركيز دموي للسكر ثابت .

رَنَّة **clang**

[خلايا منسوبة للطبيب جاكوب أوجستيس لوكارت كلارك (Jacob Augustus Lockhart Clarke) طبيب و مشرح إنجليزي 1817-1880] ، وهي خلايا في الجزء الصدري من النخاع .
انظر تحت cell .
انظر تحت nucleus thoracicus posterior .

Clark's tongue — **لِسانُ كلارْك**
اللسان المشقوق في الزهري .

clasmatocyte — **خَلِيَّة مُتَهافِتَة**
(=macrophage) — **(= خَلِيَّة بَلْعَمِيَّة)**
المصطلح القديم للخلية البلعمية .

clasmatocytosis — **كَثْرَةُ الخَلايا المُتَهافِتَة**
كثرة الخلايا البلعمية .

clasmatodendrosis — **تَكَسُّرُ التَغَصُّناتِ الخَلَوِيَّة**
انقطاع وتخرب التغصنات الخلوية العصبية .

clasmatosis — **تَهافُتٌ خَلَوِيّ**
1 ـ تكسُّر أجزاء من الخلية .
2 ـ عَمَلِيَّةُ إفراز الخلية البلازمية للجلوبولينات المناعية .

clasmocytoma — **وَرَمُ الخَلايا المُتَهافِتَة**
تسمى أيضاً ساركومةُ الخَلِيَّةِ الشَّبَكِيَّة (Reticulum cell sarcoma) ، وهِيَ تَسمِية قَدِيمة للمفومة الخلايا الناسجة .

clasp — **مِشْبَكَة (ج: مشَبْكات)**
1 ـ جهيزة بواسطتها تمسك الأشياء .
2 ـ في طب الأسنان ، جزء مثبات مباشر خارج التاج ، والذي يرجع ، ويثبت البدلة السنية بارتباطه بالدعمة السينة.

Adams clasp — **مِشْبَكَةُ آدامْز**
(في تقويم الأسنان)
مشبكة قوسية معدلة تستخدم الإبطة الشدقية والإنسية والقاصية الدانية للسن للتثبيت المباشر .

all cast clasp — **مِشْبَكَةٌ مَصبُوبَةٌ بالكَامل**
يراد بها مشبكة كاملة الإحاطة .

arrowhead clasp — **مِشْبَكَةُ رَأْسِ السَّهْم**
مشبكة تصنع بثني قطعة من فولاذي مقاوم

clarifier — **مُرَوِّق**
منقي الماء ومخلصه من الشوائب والعوالق .

clarify — **1 ـ يُوَضِّح**
2 ـ يُرَوِّق
يروق ، أو يجعل السوائل المعكرة و المواد المعلقة رائقة .

clarithromycin — **كلاريترومِيسين**
مضاد حيوي ماكروليدي فعال تجاه طيف واسع من الجراثيم إيجابية وسلبية الجرام ، يستخدم في معالجة عدوى الجهاز التنفسي وإصابة الجلد والنسج الرخوة بالعدوى . وبالمشاركة مع الأميبرازول (دواء مثبط لإفراز حمض المعدة) لمعالجة قرحة الإثنا عشري المترافقة مع الإصابة بالعدوى الملوية البوابية ، يعطى فموياً .

claritin — **كلاريتين**
الاسم التجاري لمستحضر اللوراتيدين (Loratadine) ، وهو مناهض للمستقبلة H_1 ، يستخدم لمعالجة حمض الكلأ والشرى المزمن مجهول السبب ، وفي علاج الربو ، ويعطى فموياً .

Clark-collip method — **طريقة كلارك ـ كوليب**
[طريقة منسوبة للكيميائي إيرل بيري كلارك (Earl Perry Clark) ، وهو كيميائي أمريكي ولد 1892 ، والكيميائي جيمس بيرترام كوليب (Jammes Bertram Collip) ، وهو كيميائي كندي 1892-1965] ، وهي طريقة لمعايرة الكالسيوم في المصل .
انظر تحت method .

Clarke-Hadfield syndrome — **متلازمة كلارك ـ هادفيلد**
[متلازمة منسوبة للطبيب سيسل كلارك (Cecil Clarke) ، وهو طبيب إنجليزي عاش في القرن العشرين ، والطبيب جوفري هادفيلد (Geoffrey Hadfield) ، وهو طبيب إنجليزي 1889-1968] .

Clarke's cells, nucleus (column) — **خلايا كلارك، نواة (عمود)**

إلى الوضعية الأفقية .

مشْبَكَةٌ مِهْمَازِيَّة **lug clasp**

مشبكة لها شوكة مهمازية .

صِنْف (ج: أصْناف) **class**

1 ـ فئة تصنيفية ترتب إلى شعبة (أو شعيبة) وأعلى إلى رتبة .

2 ـ في الإحصائيات ، مجموعة فرعية من الناس ولأجل اختلافات محددة مقاسة للأفراد في المجموعة تسقط من خلال الحدود النوعية .

1 ـ مَعْهود **classic**

2 ـ كلاسيكيّ

كلاسيكي ، الصنف أو المرتبة الأولى ، أو معياري .

1 ـ مَعْهود **classical**

2 ـ كلاسيكيّ

صفة لكل ما هو مدرسي أو تقليدي معهود .

تَصْنيف **classification**

تنظيم جهازي لكينونة مشابهة اعتماداً على مميزات مختلفة معينة .

تصنيف أدانسونيان **adansonian classification**

هو تصنيف عددي .

انظر تحت numerical toxonomy .

تَصْنيفُ آنْجِل **Angle's classification**

(سوء إطباق الأسنان)

تصنيف لسوء إطباق الأسنان على أساس الوضع الإنسي الوحشي للقوس السنية للفك السفلي وعلاقة الأسنان بالنسبة للقوس السنية للفك العلوي و أسنانه .

انظر تحت malocclusion .

تَصْنيفُ آرْنيت **Arneth's classification**

(للكرياتَ البيض وفق عدد الفصوص النووية فيها)

تصنيف الكريات البيض (العدلات) حسب عدد الفصوص النووية فيها حسب تعداد آرنيت .

تصنيف بيرجي **Bergey's classification**

نظام تصنيفي للجراثيم حيث تصنف الكائنات

للصدأ على شكل رأس السهم ، تستخدم لتثبيت طبقة التقويم السنية بمسك السن في المناطق التلاصقية .

مشْبَكَةٌ شَرِيطيَّة **band clasp**

مشبكة مجهَزة بأشرطة إضافية لضبط الإحكام حسب المقاسات المتفاوتة .

مشْبَكَةٌ رتاجيَّة **bar clasp**

(في تقويمَ الأسنان)

مشبكة أذرعها لها امتدادات رتاجية النمط من المثبتات الرئيسية أو من خلال قاعدة البدلة السنية . تقرب الأذرع نقطة التماس على السن في الاتجاه العنقي ـ الإطباقي .

مشْبَكَةٌ مَحاطيَّة **circumferential clasp**

مشبكة تحيط بالسن لأكثر من 180 درجة متضمنة مقابلة الزوايا ، وعادة تمس السن على طول امتداد المشبكة ، وعلى الأقل تكون نهاية واحدة منها في منطقة البروز السفلي .

مشْبَكَةٌ مُسْتَمِرَّة **continuous clasp**

المشبكة اللسَانية المستمرة ، وهي واحدة أواثنتين أو أكثر من المشابك اللسانية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والتي تتمفصل مع بعضها البعض ثم تتمفصل مع وصلة رئيسية بواسطة اثنتان أو أكثر من الوصلات الصغيرة ، تستخدم لسند السن اللساني العلوي . يسمى أيضاً بالمثبت السلكي المستمر ، وسلك كيندي ، والسلك اللساني .

مشبكة كروزات **crozat clasp**

وصلة معدنية للطبيقة النزوعة المطبقة للملائمة على فرجة بين الأسنان المتجاورة .

مشْبَكَةُ دُوجارْييه **Dujarier's clasp**

مشبكة تستعمَل في تجبير كسور العقب .

مشبكة رتاجية **I - bar clasp**

مشبكة البروز السفلي ، وهي مشبكة ذو ذراع سلكي تقرب السن من الاتجاه القمي ، دون المرور عبر خط المسح ، عابرة وصل النسيج ـ السن في الزاوية اليمنى وتستمر في خط مستقيم إلى المخاطية غير الملتصقة قبل أن تتحول

ورُمِزت من A إلى G حسب تناقص أطوالها .
انظر تحت Chicago classification .

تصنيف ديوكس **Dukes` classification**
ثلاثة أصناف مرحلية تصنف سرطانة القولون والمستقيم من A إلى C على أساس امتداد الورم : A ، امتداد إلى لكن ليس عبر الجدار المعوي : B ، امتداد عبر الجدار المعوي : C . إصابة العقد اللمفاوية بغض النظر عن الامتداد إلى الجدار المعوي . ولكن يوجد العديد من التعديلات على هذا التصنيف .

تصنيف فيجو **FIGO classification**
(الاتحاد الدولي لطب أمراض النساء)
أي من أنظمة التصنيف التي أقرها الاتحاد الدولي لطب أمراض النساء لوضع مراحل السرطانات النسائية . السرطانات في أي موضع هام يوضع له مراحل من 0 إلى IV حيث في المرحلة 0 يكون السابق للتسرطن ، أو سرطان لابد ، بينما في المرحلة IV يكون الورم عالي الخباثة أو غزوي . يمكن استخدام تقسيمات فرعية مع الأرقام مثل IA ، IB ، IIA ، IIB وهكذا .

تصنيف فرانكل **Frankel classification**
تصنيف يقسم أذيات الحبل الشوكي إلى خمسة مجموعات حسب وخامة النقيصة تحت مستوى الأذية . المجموعة A : انقطاع تام لكل الوظائف الحسية والحركية ، المجموعة B : انقطاع غير تام ، مع بعض الحس لكن دون وظائف حركية ، المجموعة C : انقطاع غير تام ، مع وظيفة حركية إرادية واضحة لكن في المستويات الدنيا وغير مفيدة ، المجموعة D : انقطاع غير تام ، مع وظائف حركية إرادية مفيدة للمريض ، المجموعة E : تحقيق الشفاء إلى الوصول للوظائف الطبيعية .

تصنيف فريدريكسون وليس **Fredrickson and Lees classification**
مخطط لتقسيم فرط بروتينات الدم الشحمية العائلي على أساس النمط الظاهري ، والتي الحية في مجموعات حسب تفاعل جرام والناحية الشكلية ، وكل مجموعة تقسم إلى رتب وعائلات وأجناس وأنواع .

تصنيف بلاك **Blak's classification**
تصنيف تسوس الأسنان إلى خمسة مجموعات على أساس من التشابه في المعالجة المطلوبة .

تصنيف بورمان **Borrmann's classification**
تصنيف لسرطانة المعدة ، كسليلي الشكل ، والمتقرح والارتشاحي المتقرح والارتشاحي .

تَصْنيفُ برودرز **Broders' classification**
(للسرطان تبعًا لدرجة تمايز خلاياه)
انظر تحت index .

تَصْنيفُ القِطَعِ الشِّدْقِيَّة **buccal segment classification**
ترتيبُ القطع الشدقية حسب صفات ومواصفات معينة تستخدم في طب الأسنان .

تَصْنيفُ كالْدويل مولُوي **Caldwell-Moloy classification**
(للحَوض الأنثوي وفقًا لأبعاده)
تصنيف للحوض الأنثوي وفقاً لشكله ، كالأنثواني و ذكري المظهر ، والبشراني والحوض المسطح القصير .

تصنيف شيكاغو **Chicago classification**
تصنيف للكروموسومات عند الإنسان تم تبنيه من قبل علماء الوراثة في شيكاغو عام (1966) لتحديد الشرائط الكروموسومية ومناطق ومواضع الاضطرابات الكروموسومية البنيوية .
انظر تحت Denver classification .

تَصْنيفُ دنْفَر **Denver classification**
(لكرومَوسومات الإنسان وفقاً لطولها)
تصنيف سابق للكروموسومات عند الإنسان على أساس حجم و موضع القسيم المركزي ، تم تبني هذا التصنيف من قبل علماء الوراثة في دنفر عام 1960 . حيث تم ترتيب ال 23 زوجاً من الكروموسومات في 7 مجموعات ،

تَصْنيفُ يانْسكي **Jansky's classification**
تصنيف الزمَر الدموية البشرية وفق الأرقام اللاتينية : , I, II, III, IV وتقابل AB ، B ، A ، O .

تَصْنيفُ كاوفْمان ـ هوايت (للسالمونيلاَّت) **Kauffman-White classification**
مخطط للتحديد المصلي لأنواع السلمونيلات لتصنيفها حسب تفاعلاتها مع الأضداد المصلية (O ، H، Vi) .

تَصْنيفُ كيث ـ واجنَر ـ بارْكَر **Keith-Wagener-Barker classification**
(لاعتلال الشبكية بفرط ضغط الدم)
تصنيف لفرط الضغط الشرياني والتصلب العصيدي بالاستناد على التغيرات الشبكية . الفئة الأولى : فرط الضغط الشرياني الأساسي الحميد ، ويشير إليه بالتوهين المتوسط الشدة . الفئة الثانية : فرط الضغط الشرياني الثابت ، لكن لاتأثير له على الصحة ، ويشير إليه بتوهين الشرينات النهائي مع التضيق المتموضع . الفئة الثالثة : فرط ضغط الدم مع أعراض شبكية وكلوية ودماغية وأعراض أخرى ، ويشير إليه بتوهين واضح في الشرينات ونضحات ندف القطن و النزف . الفئة الرابعة : فرط ضغط الدم الشرياني الشديد مع اضطرابات عصبية مركزية شديدة واضطرابات بصرية و اضطرابات في أعضاء أخرى ، ويشير إليه بالعلامات تظهر بتنظير قاع العين المشاهدة في الفئة الثالثة مع وذمة حليمة العصب البصري .

تَصْنيفُ كندي **Kennedy classification**
(للبدلاتَ السنية الجزئية)
تصنيف للبدلات السنية الجزئية على أساس موضع البدلة السنية بالنسبة للأسنان الباقية .

تصنيف كيل **Kiel classification**
تصنيف للمفومة لا هودجكينية ، استخدم أولاً في أوربا على أساس المعايير الشكلية والخلوية . والتصنيف الأخير هو التصنيف الأوروبي تصنف من I إلى V .

التصنيف الفرنسي ـ الأمريكي ـ الانجليزي **French-American-British (FAB) classification**
التصنيف الفرنسي ـ الأمريكي ـ الإنجليزي ، وهو تصنيف لابيضاض الدم الحاد و ضع من قبل تعاون و اشتراك ثلاثة دول ، حيث قسموا ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد إلى ثلاثة أنماط وقسموا ابيضاض الدم النقوي الحاد إلى ستة أنماط .

تَصْنيفُ جيل وَكُومس **Gell and Coombs classification**
(للآليات المناعية في الأمراض النسيجية)
تصنيف للآليات الإمراضية المناعية في الأذيات النسجية ، سميت من قبل جيل وكومس بالتفاعلات الأرجية ، وتتضمن أربعة أنماط : النمط الأول ، تفاعلات فرط التحسس العاجل والمتواسطة بأضداد الجلوبولين المناعي (IgE) E ، والنمط الثاني ، تفاعلات فرط التحسس المتواسط بالأضداد ، وتتضمن الانحلال المعتمد على المتممة ، والسمية الخلوية المعتمدة على الأضداد المتواسطة بالخلايا (ADCC) ، البلعمة المحرضة بالضد الطهائي ، والنمط الثالث ، تفاعلات فرط التحسس المتواسطة بالمعقدات المناعية ، وتتضمن داء المصل وتفاعل أرتوس الحمامي ، والنمط الرابع ، تفاعلات فرط التحسس المتواسطة بالخلايا ، والمتواسطة باللمفاويات التائية المحسسة و بتحرر اللمفوكينات أو بواسطة السمية الخلوية والمتواسطة باللمفاويات التائية ، وتتضمن التهاب الجلد التماسي و رفض الطعم الخيفي وداء الطعم ـ حيال ـ الثوي . أضاف مؤلفون آخرون النمط الخامس ، الأضداد التي تتداخل مع وظيفة المواد الفعالة حيوياً ، وتتضمن أمراض المناعة الذاتية المتواسطة بأضداد تجاه المستقبلات والاضطرابات التخثرية المتواسطة بالأضداد الموجهة ضد عوامل التخثر .

تَصْنيفُ جَمْعيَّة أطبَّاء القَلْب في نيُويُورْك **New York Heart Association classification**
(لدرجات العجز الناتجة عن أمراض القلب)
هو تصنيف وظيفي وعلاجي لوصف الفعالية الفيزيائية الجسدية لمرضى القلب .

تَصْنيفٌ عَدَدِيّ **numerical classification**
انظر تحت taxonomy .

تَصْنيفُ باريس **Paris classification**
(للكروموسومات عند الإنسان)
تعديل تم في باريس عام 1971 على تصنيف شيكاغو للكروموسومات عند الإنسان ، معطيةً معلومات مورثية خلوية أكثر تفصيلاً .
انظر تحت Denver classificatcen .

تصنيف رابابورت **Rappaport classification**
تصنيف للمفومة اللاهودجكينية على أساس المعايير الهيستولوجية ، حيث تم تطوير تصنيف اللمفومة إلى لمفومة عقيدية ولمفومة منتشرة واستبدلت بتصنيف لوك ـ كولين وتصنيف كيل .

تصنيف ريال **REAL classification**
تصنيف اللمفومة الأوروبي الأمريكي المراجع (Revised European American Lymphoma Classification) ، تصنيف اللمفومة على أساس المعايير الهيستولوجية ، مقسمةً اللمفومات إلى ثلاثة فئات رئيسية : تنشؤ الخلايا البائية ، وتنشؤ الخلايا التائية أوالخلايا القاتلة الطبيعية و داء هودجكين .

تَصْنيفُ رَانْيُون **Runyon classification**
(للمتفطِّرات)
تصنيف رانيون ، تصنيف للمتفطرات على أساس حالة النمو والاصطباغ للعضيات .
انظر تحت nontuberculous mycobacteria .

تصنيف راي **Rye classification**
تصنيف لداء هودجكين على أساس هيستولوجي و إمراضي إلى فئات هي : نمط اللمفاويات السائد ونمط الخلوية المختلطة ونمط الأمريكي المعدل للمفومة . يسمى أيضاً (Lennert's classification) .

تَصْنيفُ لانسفيلد **Lancefield classification**
(للعقْديَّات من الناحية المناعية المصلية)
تصنيَفَ لانسفيلد ، تصنيف العقديات الحالة للدم مصلياً ، على أساس فحص واستخلاص مجموعة المستضدات الكربوهيدراتية النوعية التي يحتويها الجدار الخلوي بواسطة تقنية الترسيب ، المجموعة A خلال O الوطيدة .

تصنيف لينيرت **Lennert`s classification**
انظر تحت kiel classification .

تصنيف لوك ـ كولينز **Lukes -Collins classification**
تصنيف للمفومة لا هودجكينية على أساس أصل خلاياه المفترضة . حيث يؤكد هذا التصنيف على التمييز ما بين لمفومة الخلايا التائية ولمفومة الخلايا البائية ولمفومة الخلايا اللمفاوية الأخرى ، وهذه الأنماط من اللمفومات بالخلايا التائية والبائية لها أنماط فرعية عدة يمكن تصنيفها حسب درجة خباثتها . التصنيف الأخير هو التصنيف الأوربي الأمريكي المعدل للمفومات .

تصنيف لوند ـ براودر **Lund-Browder classification**
هو تصنيف لوخامة الحرق لدى الأطفال ، يعطي هذا التصنيف نسبة مئوية لكل مناطق سطح الجسم المختلفة بشكل شبيه لقاعدة الثمانيات المستخدمة بالنسبة للبالغين ، لكن معدلة حسب عمر الطفل .

تَصْنيفُ ماكْنير **McNeer classification**
(لسرطان المعدة)
انظر تحت Borrmann's classification .

تَصْنيفُ ميجولا **Migula's classification**
(للجراثيم)
تصنيف للجراثيم أعده ميجولا عام 1900 .

تَصْنيفُ مُوس **Moss' classification**
(للزمر الدموية)

مع كريستيان ريني دودوف ، وجورج إميلي بليد على جائزة نوبل عن الطب أو عن الفيزيولوجيا عام 1974 ، وذلك لقاء إكتشافاتهم فيما يتعلق بالتنظيم البنيوي والوظيفي للخلية .

كلود بيرنار **Claude Bernard**

انظر تحت Bernard .

متلازمة أو علامة فرط الحراك بحسب كلود **Claude's hyperkinesis sign syndrome**

[متلازمة أو علامة منسوبة للطبيب هنري كلود (Henri Claude) ، وهو طبيب نفسي فرنسي *عاش بين عامي 1869-1945]* . وهي علامة فرط الحراك في العضلات المصابة بالشلل .

انظر تحت sign .

انظر تحت syndrome .

1ـ أعْرَجُ **claudicant**

2ـ عَرَجِيّ

1ـ يتعلق بالعرج ، يسمى أيضاً (Claudication) .

2 ـ يتأثر بالعرج .

3ـ يتأثر بالعرج المتقطع .

عَرَج **claudication**

يسمى أيضاً (Limping) ، (Lameness) .

عَرَجٌ دماغيُّ المَنْشَأ **cerebral claudication**

نقصُ ترَوِية وألم أثناء الحركة يزول بالراحة ومنشؤه عصبي مركزي دماغي .

عَرَجٌ مُتَقَطِّع **intermittent claudication**

مجموعة معقدة من الأعراض التي تتميز بالألم والتوتر والضعف في الطرف عند البدء بالمشي واشتداد الحالة حتى يصبح المشي مستحيلاً وغياب الأعراض بعد فترة من الراحة . يشاهد في الأمراض الانسدادية للشرايين في الأطراف مثل التهاب الأوعية الخثاري المسد و في انضغاط ذيل الفرس . يسمى أيضاً متلازمة شاركو (Charcot's syndrome) والذبحة الساقية (Angina cruris) .

عَرَجٌ نُخاعِيٌّ مُتَقَطِّع **intermittent spinal claudication**

نفاذ اللمفاويات ونمط العقيدي التصلبي .

تَصْنيفُ سكينر **Skinner classification**

(للبدلات السنية الجزئية)

تصنيف للبدلات السنية الجزئية ، على أساس موضع مسافات البدلات السنية بالنسبة للأسنان الباقية .

مُصَنِّف **classifier**

من يقوم بعملية التصنيف ، أو يعدلها .

يُصَنِّف **classify**

فعل عملية التصنيف والترتيب وفق الصفات المطلوبة .

1ـ ناقِض؛ مُكسِّر **clastic**

2ـ مُتَفكك

1ـ مسبب أو خاضع لتقسيم إلى أجزاء .

2ـ يفصل إلى أجزاء ، كنموذج تشريحي .

مُكسِر (للكروموسومات) **clastogenic**

يعطي زيادة أو يحدث تحطيماً أو تكسيراً في الكروموسومات .

تقصُّفُ الشَّعْرِ العقِد **clastothrix (=trichorrhexis nodosa)**

انظر تحت trichorrhexis nodosa .

مُشَبَّك **clathrate**

1ـ له شكل أو مظهر الشبيكة .

2ـ مركب مشبك .

3ـ يتعلق بمثل مركب ما .

كلاترين **clathrin**

بروتين ذو وزن جزيئي 180 ألف دالتون ، يغلف الوجه الهيولى للوهدات المغلفة . والذي يكتنف في عملية التقام المتواسطة بالمستقبل للبروتين الشحمي منخفض الكثافة (LDL) ، والأنسولين واللجين الأخرى .

المُشَبَّكة الخَضْراء **Clathrochloris**

جنْسٌ من الجَراثيمَ المائيَّة وخلاياها دائرية أو بيَضية وتصطف في صفوف متسلسلة .

كلود **Claude**

[ألبرت كلود ، عالم في السيتولوجيا أمريكي مولود في بلجيكا عام (1899)] . حائز بالمشاركة

نقص تروية وألم أثناء الحـركـة يـزول بالراحـة ومنشؤه عصبي مركزي نخاعي .

jaw claudication — **عرج فكي**

عرج فكي ، مجموعة من الأعراض المعقدة التي تشبه العـرج المتقطع لكن تشاهد في العـضلات الماضـغـة ، يشاهـد في التهـاب الشـرايين بالخلايا العملاقة .

neurogenic claudication — **عرج عصبي**

عـرج يتـرافق مع ألم مـذل في الظهـر والألية والرجلين وتخف هذه الأعـــراض بالانحناء (التحدب) ، ينتج عن الاضطرابات الميكانيكية الناتجة عن الوضعية أو عن نقص تروية منطقة ذيل الفرس .

venous claudication — **عَرَجٌ وَريديُّ المَنْشأ**

عرج متقطَع ناجِ عن الركود الوريدي .

claudicatory — **1ـ أعْرَجْ**
2ـ عَرَجيّ

Claudius' cells — **خلايا كلاوديوس**

[خلايا منسوبة للطبيب ، فـريدريك ماتياس كـــلاويـوس (Friedrich Matthias Claudis) ، وهو مشرح ألماني 1822-1869] وهي خلايا في القوقعة السمعية .

انظر تحت cell .

claustra — **عوائِق**
(sing:claustrum) — **(ف: عائِق)**

انظر تحت claustrum .

claustral — **عائِقِيّ**

يتعلق أو يختص بالعوائق .

claustromania — **هَوَسُ الأماكِنِ المُغلَقَة**

حب البقاء في الأماكن المغلقة .

claustrophilia — **حُبُّ الأماكِنِ المُغلَقَة**

حب غـيـر عـقـلي من الأمـاكـن المغلقـة ، مـثل المصعد والأنفاق .

claustrophobia — **رُهابُ الأماكِنِ المُغلَقَة**

خـوف غـيـر عـقـلي من الأمـاكـن المغلقة ، مـثل المصعد أو الأنفاق .

claustrum — **العائِق**
(pl:claustra) — **(ج: العوائِق) (بنية تشريحية دماغية)**

طبقة رقيقة من مادة رمادية جانبية لـلمحفظة الخارجية للنواة العـدسية الشكل ، تفصل النواة عن المادة البـيــضــاء للجــزيـرة . تكون بشكل رئيـسي مـغـزل الخـلايا . تسـمى أيضـاً بالعـائق الجزيري (Claustrum of insula) .

claustrum gutturis — **الخِفَّاف ؛ شِراعُ الحَنَك**
(=palatum molle)

claustrum virginale — **غشاءُ البكارَة**

غـشاء مـوجـود على فـوهة مدخل المهـبل عند المرأة العذراء التي لم تتزوج ، وله أشكال متعددة كـالغربالي وذو الفتحة الوحيدة أو الفتحتين ، وذلك ضـروري لتـمـرير الإفـرازات الرحـمـيـة خلال فترة الحيض (الدورة الشهرية) .

clausura — **رَتَق**
(=atresia)

انظر تحت atresia .

clava — **دُبَيسَة**
(=tuberculum nuclei gracilis TA) — **(=حُدَيبَة النَّواة النَّاحِلَة)**

انظر تحت tuberculum gracile .

clavacin — **باتولين (كيمياء)**
(=patulin)

مضاد حيوي سام .

انظر تحت patulin .

claval — **دُبَيسِيّ**

clavate — **1ـ دُبَيسِيّ**
2ـ مُتعَجِّ

1ـ انظر تحت claval .

2ـ هراوية الشكل .

clavi (pl.clavus) — **أثْفان (ف: ثفن)**

تقـرن جلدي يظهـر في مناطق الـضـغط على النتوءات العظمـيـة خـاصـة في إبهـام القـدم عند ارتداء الأحـذية الضيقـة . ويسمى أيضاً (Corn) ، (Callosity) .

Claviceps — **الدَّبُّوسِيَّة (جِنسٌ مِنَ الفطريّات)**

جنس من الطفـيـليــات الفطرية مـن عــائلة

أي من ألياف شاربي (مجموعة من الألياف التي تمسك معاً صفائح العظم) .

claviforme **دَبُّوسِيُّ الشَّكل**

claviformin **كلافيفورمين**

(=patulin) **(= باتولين)**

(مادة مضادة للجراثيم فطرية المنشأ)

clavipectoral **تَرْقَوِيٌّ صَدْرِيّ**

يتعلق بالترقوة والصدر .

clavispora **كلافيسبورا**

جنس من الفطور من زمرة الفطريات الداخلية . ومنهـــا (Clavispora lusitaniae) هي الدور الكامل (الجنسي) للمبيضات اللوزيتنة (Lusitaniae) .

clavulanate potassium **كلافونات البوتاسيوم**

هو مثبط للبيتا لاكتاماز يستخدم بالمشاركة مع البنسلين في معالجة الأمراض المعدية المتسببة عن الكائنات الحية المنتجة للبيتا لاكتاماز .

clavus (pl.clavi) **ثفن (ج: أثفان)**

انظر تحت corn .

clavus durus **ثَفَنٌ قاس**


انظر تحت hard corn .

clavus hystericus **ثَفَنٌ هستيريّ**

(الإحساس بمسمار يدق في الرأس) احساس مؤلم حاد كدق المسمار في الرأس ، وعادةً ما يرجع كتظاهرة للتحويل .

clavus mollis **ثَفَنٌ لَيِّن**

انظر تحت softcorn .



Claudius' cells **خلايا كلاوديوس**

الدبوسيات تصيب بذور العديد من النباتات ، وتعتبر العديد من هذه الأجناس مصدر للأرغوت .

claviceps paspali **الدبوسية الكلائية**

يصيب أعشاب الكلأ (العشب) ، ويسبب ترنح الكلأ في المجترات .

Claviceps purpurea **الدَّبُّوسيَّةُ الفُرْفُرِيَّة**

تصيبَ بذور الشَيلم و هي أشيع مصدر للتسمم بالأرغوت في الإنسان .

Clavicipitaceae **الدَّبُّوسِيَّات (فصيلة مِنَ الفطريَّات)**

عائلة من الفطور من رتبة الدبوسيات ، تملك كيس اسطواني طويل وبوغ زقي خيطي الشكل طويل . ويتضمن أجناس الدبوسية (Claviceps) والنبوتية (Cordyceps) .

Clavicipitales **الدَّبُّوساوات (رُتبَة مِنَ الفطريَّات)**

رتبة من الفطريات الكاملة من شعيبة الفطور الزقية ، من سلالة (Unitunicatae) ، تتميز بتشكل المزقاقيات مع سدى متطور بشكل جيد وزقاق ذووصاد (Inoperculate) ، ومعظم الأنواع هي طفيليات أو حشرات أو فطور . بعضها نباتات متطفلة . تتضمن عائلة الدبوسيات .

clavicle **التَّرْقُوَة**

انظر تحت clavicula .

clavicotomy **قَطعُ التَّرْقُوَة**

عملية قطع أو فصل الترقوة جراحياً .

clavicula TA **التَّرْقُوَة**

عظم منحني مثل الحرف f ، يتمفصل مع عظمي القص والكتف ، مشكلاً جزءاً من حزام الكتف في الجهة الأخرى . يسمى أيضاً بعظم الطوق (Collar bone) .

clavicular **تَرْقَوِيّ**

يتعلق بعظم الترقوة .

claviculectomy **استِئْصالُ التَّرْقُوَة**

عمل جراحي يهدف إلى استئصال الترقوة .

claviculus **ظفير**

(بنية ليفية في الصفيحة العظمية)

يُنَظِّف cleanse

ينظف أو يطهر خاصة من الذنوب والآثام وأثر الجريمة .

صافٍ (صافِي) clear

1 ـ إزالة العكر من العينات المجهرية باستخدام العوامل المروقة (في تلوين الأنسجة) .

2 ـ إزالة المواد من الدم .

خَلِيَّةٌ صافيَة clear cell

تصفِيَة clearance

1 ـ عملية التي بها إزالة مادة أو أي إنسداد .

2 ـ القياس الكمي للمعدل الذي به مادة معينة تزال من الدم بعملية مثل التصفية الكلوية ، أو التصفية الكبدية أو الديال الدموي . أي أنها حجم البلازما التي تروق من المادة لكل وحدة زمن . ويرمز لها C .

3 ـ المسافة أو الحيز المتواجد بين بنى مقابلة .

تَصْفِيَةُ يوريا الدَّم blood-urea clearance

انظَر تحت urea clearance .

تَصْفِيَةُ الكرياتينين creatinine clearance

التَصفيَة الكلوية للكرياتينين داخلي المنشأ ، غالباً فإن القياس الإكلينيكي هو الشائع ، والذي يقيم معدل الترشيح الكبيبي بشكل دقيق .

تَصْفِيَةُ الدِيُودْراسْت Diodrast clearance

دراَسة وظَيفة النُبيبات الكلوية الدانية .

تَصْفِيَةُ الماء الحُر free-water clearance

الحَجم النَهائي للذائبة في الماء الحر المتحرك من الدم إلى البول . الفرق مابين حجم البول والتصفية الأسمولالية .

التصفية الكبدية hepatic clearance

إزالة المواد من الدم بواسطة الكبد .

تَصْفِيَةٌ مَناعيَّة immune clearance

هوَ الاطراحَ المناعي .

انظر تحت immune elimination .

تَصْفِيَةٌ إطْباقيَّةٌ بَينِيَّة interocclusal clearance

(=المَسَافَةُ الإطْبَاقيَّةُ البَينِيَّةُ) (أسنان) (=interocclusal distance)

انظَر تحت distance .

الأَرْجوت clavus scalenus

(=ergot)

انظر تحت ergot .

ثفن زهري clavus syphiliticus

آفات تشبه المسمار ، والتي تشاهد في راحة اليدين وأخمص القدمين ، كنمط للطفحة الزهرية الحطاطية .

مِخْلب claw

ظفر الحيوانات ، خصوصاً الحيوانات اللاحمة (آكلة اللحوم) ، حيث تكون طويلة ومنحنية ولها نهاية حادة تسمى أيضاً (Unguiculus) .

قدَمٌ مِخْلَبِيَّة clawfoot

انظر تحت gampsodactyly .

يَدٌ مِخْلَبِيَّة clawhand

انثناء وضمور اليد والأصابع ، والتي تحدث في آفات العصب الزندي ، والجذام وتجوف النخاع يسمى أيضاً (Main engriffe) .

غَضار clay

سيليكات الألومينيوم المميتة ، والتي تنتج عن تفكك الصخور الناتج عن العوامل الجوية ، يستخدم أشكال عديدة من الغضار في الطب ، بشكل داخلي و خــارجي ، ومنذ الأزمنة الأولى .

الغضار الصيني China clay

(=كاولين) (=kaolin)

انظر تحت kaolin .

كلازولام clazolam

دَواءٌ مُهَدِّئٌ خَفيف .

كلازوليمين clazolimine

دَواءٌ مُدرٌّ للبَول .

كلازوريل clazuril

يستخدم ككابح للأكريات (Coccidiostat) في الطيور .

1 ـ نَظيفٌ clean

2 ـ يُنَظِّف

فعل التنظيف وصفته .

تَنْظيف cleaning

البول ، P هو تركيز البلازما .

تصفية كامل الجسم **total body clearance**
التصفية الكلية للمواد بواسطة كل أعضاء الجسم .

التصفية الكلية **total clearance**
انظر تحت total body clearance .

تَصْفِيَةُ اليُورْيا **urea clearance**
تصفية اليوريا من الدم ، وذلك بالتصفية الكلوية أو بالديال الدموي ، حيث إن مردود تصفية اليوريا أو تصفية اليوريا الجزئي في دورة ديال دموي واحدة يعبر عنها بالمعادلة (Kt /V) .

تصفية كامل الجسم **whole body clearance**
انظر تحت total body clearance .

1ـ مُوَضِّح **clearer**
2ـ مُصَفّي
عامل مصفي (مروق) ، عامل يستخدم بالفحص المجهري لإزالة العكر من العينة .

عامِلُ التَّصْفِيَةِ **clearing agent**
في المختبرات عامل يستخدم لتنظيف المستحضرات لاستخدامها في الفحوص المجهرية .

مَرْكَزُ تَبادُلِ المَنْشورات **clearing house**
مركز إعلامي لنشر المعلومات وتبادلها مع دور النشر الأخرى .

تَشَطُّر **cleavage**
تقطع فتلي للزيجوت ، ويظل حجم البنية غير ثابت ، ويحدث هذا في الخلايا المتشطرة ، أو القسيمات الأرومية ، والتي تصبح أصغر وأصغر من كل انقسام .

تَشَطُّرٌ إضافيٌّ **accessory cleavage**
تشطرَ محيطي (طرفي) في الخلايا البيضية طرفية المح ناتج عن تعدد الإمناء .

تَشَطُّرٌ مُتَقارِب **adequal cleavage**
شكل من التشطر تكون فيه القسيمات الأرومية متساوية بالحجم بشكل عملي .

تَشَطُّرٌ ثُنائِيُّ الجانب **bilateral cleavage**
ويسمى الانشاط أو التشطر المتساوي (Equal

تَصْفِيَةُ الإِينولين **inulin clearance**
التصفية الكلوية للإينولين الذي يحافظ على مستوى مصلي ثابت منه بالتسريب المستمر ، يعتبر المقياس الأكثر دقة والمرجع لمعدل الترشيح الكبيبي .

التصفية المخاطية الهدبية **mucociliary clearance**
تصفية المخاط والمواد الأخرى من السبل الهوائية بواسطة أهداب الخلايا الظهارية ، والتي تحرك المخاط رأسياً مع كل ضربة لها .
انظر تحت ciliary beat .

التَّصْفِيَةُ الإِطْباقِيَّة **occlusal clearance**
حالَة يمكَن أنَ تنزلق فيها السطوح الإطباقية المتقابلة فوق بعضها البعض دون تداخل أي بروز .

التصفية الأسمولالية **osmolal clearance**
التصفية الأسمولالية ، حجم الماء المصفى من البلازما ، والذي ينتج عنه البول الذي يملك نفس أسمولية البلازما ، ويقاس مثل حجم البول بتقسيم أسمولية البول على أسمولية البلازما .

تَصْفِيَةُ البارا ـ أمينوهيبورات **P-aminohippurate clearance**
التصفية الكلوية للإعطاء الخارجي لحمض بارا- أمينوهيبوريك ، والمقبول على أنه المقياس الأكثر دقةً في تقييم الجريان البلازمي الكلوي الفعال .

تَصْفِيَةُ البْلاَزْما **plasma clearance**
يسمى أيضاً (Renal clearance) ، وهي قدرة الوظيفة الكلوية على تنقية المواد السمية من البلازما .

تَصْفِيَةُ حَديد البْلاَزْما **plasma iron clearance**
نصف عمر تصفية الحديد البلازمي .

التصفية الكلوية **renal clearance**
قياس معدل إزالة المواد المختلفة من الدم بواسطة الكليتين ، بالمعادلة المعطاة التالية (C = V U / P) حيث إن C هي التصفية ، V هي حجم البول بالملي لتر / دقيقة ، U هو تركيز المواد في

تَشَطُّرٌ خَط ـ طُوليّ **meridional cleavage**
تشطر يحدث في مستويات تمر عبر محوار الخلية البيضية .

تَشَطُّرٌ قُسَيمِيّ **meroblastic cleavage**
هو التشطر الجزئي(Partial cleavage) ، وهو شكل من التشطر تشارك فيه الأجزاء الجبلية فقط من الخلية البيضية . يسمى أيضاً التشطر غير التام (Incomplete cleavage) .

تَشَطُّرٌ جُزْئِيّ **partial cleavage**
في علم الجنين ، هو الانقسام الذي يؤدي إلى أن قسماً معيناً من البيضة يتابع التقسم لتكوين القسيمات الأرومية ، أو هو تشطر تشارك فيه الأجزاء الجبلية فقط من الخلية البيضية .

تشطر مترقي **progressive cleavage**
في تشكل الأبواغ داخل كيس البوغ ، فإن انتاج سلسلة من مستويات التشطر المتتالية ينتج عنه تشكل أبواغ أولية و آجلاً تشكل بوغ مباغي .

تشطر جذري **radical cleavage**
نموذج من التشطر المميز للفقاريات و شائكات الجلد ، حيث تكون محاور مغزل الانقسام متوازية ، أو على الزوايا اليمنى للمحوار القطبي للخلية البيضية .

التشطر الحلزوني **spiral cleavage**
نموذج مميز من التشطر في اللافقاريات مثل الدود العلقي والرخويات ، حيث تكون مستويات التشطر متوجهة بشكل مائل بالنسبة للمحوار القطبي للخلية البيضية .

تَشَطُّرٌ سَطْحِيّ **superficial cleavage**
شكل من التشطر تشارك فيه فقط المنطقة السطحية من الخلايا البيضية مركزية المح .

تَشَطُّرٌ شامل **total cleavage**
انظر تحتَ holoblastic cleavage .

تَشَطُّرٌ غَيْرُ مُتَساو **unequal cleavage**
شكل من التشطّر تبقى فيه القسيمات الأرومية في القطب النباتي أكبر حجماً من تلك القريبة لها في القطب الحيواني .

cleaver ساطور

cleavage) ، ويطلق على الانقسام التفتلي في البيضة الملقحة حيث تنتج خلايا متساوية لتشكيل التويتة .

تَشَطُّرٌ تامّ **complete cleavage**
تشطر كامل التقسم .
انظر تحت holoblastic cleavage .

تَشَطُّرٌ مُحدِّد **determinate cleavage**
(في الأَرُيمَة الجَنينيَّة)
تشطر يتلو نموذجَ محدد ، حيث يملك القسيم الأرومي مصير مميز غير قابل للتغير ، وكل قسيم أرومي يصبح طليعة لجزء محدد من الجنين .

تَشَطُّرٌ قُرَيصيّ (في البَيض) **discoidal cleavage**
تشطر محصور في القطب الحيواني من الخلايا البيضية طرفية المح العالية .

تَشَطُّرٌ مُتَساو **equal cleavage**
شكل من التشطر تكون فيه القسيمات الأرومية متساوية في الحجم .

تَشَطُّرٌ اسْتوائيّ **equatorial cleavage**
تشطر يحَدث في مستوى يمر عبر خط استواء الخلية البيضية .

تَشَطُّرٌ تامّ **holoblastic cleavage**
(=total cleavage)
شكل من التشطر يشارك فيه كامل الخلية البيضية في الانقسام الخلوي . يسمى أيضاً بالتشطر التام أو الكلي (Complete cleavage) ، (Total cleavage) .

تَشَطُّرٌ ناقص **incomplete cleavage**
تشطر جَزئي التقسم .
انظر تحت meroblastic cleavage .

تَشَطُّرٌ غَيرُ مُحدِّد **indeterminate cleavage**
يتلو نموذج للتشطر غير المقيد ، حيث تملك القسيمات الأرومية امكانيات تطور أكثر من المشاهد عادةً ، إذ أن كلاً منها عندما يعزل ، فإنه يملك القدرة على التطور إلى جنين طبيعي .

تَشَطُّرٌ عَرْضانيّ **latitudinal cleavage**
تشطر في مستويات تمر على الزوايا اليمنى إلى محوار الخلية البيضية .

أداة حادة لتقسيم المواد الصلبة تستعمل في طب الاسنان .

فلح (ج: فلوح) — **cleft**

1 ـ شق أو فتحة مستطيلة ، خاصة التي تحدث في المضغة .

2 ـ شق مـرضي يحـدث فـشل الأجـزاء من الالتحام خلال التطور الجنيني .

الفَلْحُ الشرَجيُّ — **anal cleft**

الشق الطبيَعي الذي يفصل بين العضلات الألوية في الجانبين وتوجد في قعره فتحة مصرة الشـرج . ويسـمى أيضـاً (Intergluteal cleft) ، (Clunial cleft) .

فَلْحٌ خَيْشوميّ — **branchial cleft**

1 ـ أي من الَفتحات الشقية في خياشيم (غلاصم) الأسماك ، والمتكونة بين الأقواس الخيشومية .

2 ـ انخفاض سطحي خطي في منطقة البلعوم في الجنين المبكر في مقابل جيبة بلعومية (غلصمية) ويحدها الأديم الظاهر .

فَلْح عُنُقيّ — **cervical cleft**

هي إصَابة خلقية نادرة تتمثل بشق طولاني في وسط العنق مغطى بالجلد مع تبارز حدبي في نهايته . ويرتبط الجلد المجاور بنسيج ندبي والذي يشكل وهدة تنتـهي بجـيب أعـور في نهـاية الشق .

فَلْحٌ كُوليسْتيروليّ — **cholesterol cleft**

يلاحظ في المحضَر النسيجي المغطوس بالبارافين وجود شق يتمثل بمسافة بينية تنجم عن انحلال بلورات الكوليستيرول في المقطع النسيجي .

1 ـ علَم — **cleft lip**

2 ـ الشفة المشقوقة

هو انشقـاق الشـفـة الخلقي ويسـمى أيضـاً (Cheilognathus) .

انظر تحت cheilognathus .

فَلْحٌ حَنَكيّ — **cleft palate**

شق خلقي يصيب الحنك العظمي . وقد يتسبب في دخول الطعام إلى الأنف .

الفَلْحُ الأَلَويُّ — **clunial cleft**

يسمى أيضاً الفُرْضَةُ الشَّرَجِيَّة (Crena ani) ، (Anal cleft) .

فَلْحُ القَرْنِيَّة — **corneal cleft**

يسمى أيضاً (Limbo corneal) ، وهو إصابة خلقية تحدث كشق في القرنية . ويمكن أن يحدث شق القرنية نتيجة استعمال الكورتيزون بكميات كبيرة خاصة لدى المسنين ولفترة طويلة .

انظر تحت fissure .

فَلْحٌ وَجْهيّ — **facial cleft**

1 ـ أي مَن الفلوح بين البروز الجنينية ، والتي عادة ما تتحد لتكون الوجه .

2 ـ يسمى أيضاً (Prosopoanoschisis) ، وهو شق في الوجه ينجم عن عدم الالتحام الكامل أثناء الحياة الجنينية بين بوارز الوجه في الجهتين كما يحدث في شق الشفة أو الشفتين وشق الحنك وغير ذلك .

الفَلْحُ الوَجْهيُّ الوَحْشيُّ — **genal cleft**

يسمى أيضاً (Transverse facial cleft) ، (Lateral facial cleft) ، ويتصف بوجود شق فموي يجعل الفم كبيراً جداً (Macrostomia) شبيهاً بفم السمكة ، ولذلك يسمى بهذا الاسم أيضاً ، ويمتد الشق من المنشم الأذني وبين القوسين البلعوميتين الأولى والثانية .

الفَلْحُ التَّناسُليّ — **genital cleft**

في الإناث : هو الشق الموجود بين الشفرين الكبيرين ، ويسمى أيضاً الشق البولي التناسلي (Urogenital cleft) ، والشق الدهليزي (Vulvar slit) ، (Fissura pudendi) ، (Pudendal cleavage) ، (Pudendal slit) ، (Rima vulvae) ، (Pudendal cleft) ، (Rima pudendi) ، وفي الذكور : هو انخفاض المنطقة التناسلية الخارجية للجنين ، والتي تتطور إلى إحليل الذكر .

فَلْحٌ لِثَويّ — **gingival cleft**

1 ـ مَنطَقة من الانحسار اللثوي ، والذي يحدث فوق تغرز العظم المغطي للجذر .

انظر تحت incisures of lanterman .

فَلْحُ لاري **Larrey's cleft**

هو المثلث القصي الضلعي (Trigonum sternocostale) ، (Sternocostal triangle) ، وهو عيب عضلي بين الارتكاز الضلعي وعظم القص .

الفَلْحُ الوَجْهِيُّ الوَحْشِيُّ **lateral facial cleft**

يسمى أيضاً (Macrostomia) .

انظر تحت genal cleft .

فُلوحُ ماورر **Maurer's clefts**

تسمى أيضاً نقاط ماورر (Maurer's dots) وهي مشتملات ضمن الكريات الحمر المصابة بالملاريا .

الفَلْحُ الوَجْهِيُّ النَّاصِف **median facial cleft**

شق واسع يمتد من الحنك إلى الأنف إلى القحف ، وقد يترافق بحالة صغر الدماغ .

فَلْحُ الأُذُنِ الوُسْطَى **middle-ear cleft**

يسمى الفَلْحُ النَّفيريُّ الطَّبْلِيّ (Tubotympanic cleft) ، وهو تجويف الأذن الوسطى أو التجويف الطبلي ، وهو الذي يحتوي على العظيمات السمعية وله ستة جدران جميعها عظمية ما عدا الجدار الوحشي فيشكله غشاء الطبل (الطبلة) .

الفَلْحُ الأَلْوِيّ **natal cleft**

2 ـ شق يترافق بتشكل جيبي ، وهو مبطن بخليط من ظهارة لثوية جيبية .

الفَلْحُ اللاميُّ الخَيْشُومِيّ **hyobranchial cleft**

يسمى أيضاً (Posthyoidean cleft) ، وهو الشق الموجود في النهاية الذنبية من القوس اللامية ، والمكون من شق بين العظم اللامي والقوس التالية بالتتابع في الجنين (المضغة) المتطور .

الفَلْحُ اللاميّ **hyoid cleft**

انظر تحت hyomandibuular cleft .

الفَلْحُ اللاميُّ الفكيُّ **hyomandibular cleft**

يسمى أيضاً (First visceral cleft) ، وهو الشق الجنيني بين القوسين اللامية والفكية السفلية .

الفَلْحُ بَينَ الأَسْنان **interdental cleft**

أي فجوة واسعة بين الأسنان دون ضياع أو قلع سني .


انظر تحت diastema .

الفَلْحُ بَينَ الأَلْيَتَين **intergluteal cleft**

انظر تحت anal cleft .

فُلوحُ لانترمان **Lanterman's clefts**

تسمى أيضاً ثلمات لانترمان (Lanterman incisures) ، وفلوح شميت لانترمان (Schmidt-Lanterman clefts) ، وتوجد في أغماد ألياف الأعصاب .



Cleft palate **الفلح الحنكي**

فَلْحٌ حَشَوِيّ **visceral cleft**

انظر تحتَ pharyngeal groove .

الفَلْحُ الفَرْجِيّ **vulval cleft**

يسمى أيضاً مَشَقُّ الفَرْج (Rima pudendi) ، (Genital cleft) .

ذبابُ الفرَس **clegs**

نوع من الذباب الكبير تقوم أنثاه بامتصاص الدم من الحيوانات الأخرى .

سابقة بمعنى التَّرْقوَة **cleid-**

سابقة مصطلحية تفيد معنى الترقوة .

ألمٌ ترْقويّ **cleidagra**

ألم نقرسي في الترقوة .

ألم ترقوي **cleidagra**

ألم نقرسي في الترقوة .

ترْقَويّ **cleidal**

يتعلق بإصابة الترقوة .

ألمُ المَفصِل التَّرْقوي **cleidarthritis**

نقرس في منطقة الترقوة .

سابقة بمعنى التَّرْقوَة **cleido-**

سابقة بمعنى الترقوة .

ترْقَويٌّ ضِلعِيّ **cleidocostal**

يختص أو يتعلق بالترقوة والضلوع الصدرية .

ترْقَويٌّ قِحْفِيّ **cleidocranial**

يتعلق بالترقوة وعظام القحف ، أو القحف نفسه .

خَلَلُ التَّعَظُّم التَّرْقُوي القَحْفيّ **cleidocranial dysostosis**

ترْقَويٌّ عَضُدِيّ **cleidohumeral**

صفة منسوبة لكل ما له علاقة بالترقوة والعضد في آن واحد .

مُستَغلِق **cleidoic**

معزول من البيئة ، يحتوي على نفسه ، مثل الخلايا البيضية للتماسيح والطيور والثدييات البدائية ، والتي تكون مكتفية بذاتها ، وتملك نظام مغلق باستثناء أخذها للأكسجين ، وتتطور على حساب المواد المختزنة في داخل الخلية البيضية ذاتها مباشرة إلى البالغات الصغيرة دون

يسمى أيضاً الأُخْدودُ الأَلْويُّ (Gluteal furrow) ، وهو الشق الفاصل بين الأَلْيَتين .

الفَلْحُ الوَجْهِيُّ المائل **oblique facial cleft**

يسمى أيضاً (Prosoposchisis) ، وهو فلح جنيني يمتد مائلاً من الفم إلى الحجاج .

الفَلْحُ البُلْعوميُّ **pharyngeal cleft**

شق طبيعيّ لدى الأسماك يوجد كشق بين الأقواس الغلصمية في جدار البلعوم ، ويمر من خلالها الماء من البلعوم إلى الخارج .

الفَلْحُ خَلْفَ اللامي **posthyoidean cleft**

يسمى أيضاً الفَلْحُ اللاميُّ الخَيْشُوميُّ (Hyobranchial cleft) .

الفَلْحُ الفَرْجِيّ **pudendal cleft**

انظر تحت genital cleft .

فُلوحُ شميت ـ لانْترمَان **Schmidt-Lanterman clefts**

تسمى أيضاً ثُلماتُ لانْترمَان (Lanterman incisures) .

انظر تحت Lanterman's clefts .

فَلْحُ الحَنَك الرَّخو **soft palate cleft**

شق في شراع الحنك أو ما يعرف بالحنك اللحمي أو الرخو .

الفَلْحُ تَحْتَ المُخاطِيَّة **submucous cleft**

الشق الذي يصيبَ الحنك العظمي أو اللحمي أو كليهما مع بقاء الغشاء المخاطي ساتراً للشق .

فَلْحٌ مَشْبَكيّ **synaptic cleft**

1 ـ شق ضيق خارج الخلوي بين الغشاء قبل المشبكي والغشاء بعد المشبكي .

2 ـ المسافة التي يقدر بعدها بعشرين نانومتر بين حافتي طرفي المشبك العصبي .

الفَلْحُ الوَجْهِيُّ المُسْتَعْرِض **transverse facial cleft**

انظر تحت genal cleft .

الفَلْحُ النَّفيريُّ الطَّبْليّ **tubotympanic cleft**

يسمى أيضاً فَلْحُ الأُذُن الوُسْطى (Middle-ear cleft) .

انظر تحت middle ear cleft .

ظيَّان **Clematis**
(جِنسُ نباتاتٍ كثيرٌ مِنها سامّ)
جنس من نباتات الأزهار من عائلة الحوذان (نباتات عشبية) . تحتوي معظم هذه الأنواع على الحوذان (Ranunculin) ، والذي يتحطم نحو الأسفل في الجسم المثمر ليشكل ذيفان البروتوأنيمونين المميت .

كليميزول (دَواءٌ مُضادٌ للهيستامين) **clemizole**
مركب مضاد للهيستامين ، ويستخدم أيضاً لينتج شكل مستخزن للبنسلين G .

هيدروكلوريد كليميزول **clemiazol hydrochloride**
ملح هيدروكلوريد للكليميزول ، يستخدم كمضاد هيستاميني في معالجة الأرجيات الجلدية وفرط الحساسية تجاه الطعام ومواد التجميل وداء المصل ، يعطى فموياً .

كليميزول البنسلين **clemizole penicillin**
انظر تحت penicillin .

كلينبوتيرول **clenbuterol**
ناهضة أدرينالية الفعل β-2 مديد التأثير ، والذي يستخدم لمعالجة التشنج القصبي في الحصان .

كَزّ **clenching**
(تشنج العضلة الماضغة أثناء الكرب)
صريف الأسنان وانضغاط الفك والأسنان معاً في إطباق مركزي ، والذي يترافق بشكل كثير التواتر في التوتر العصبي الحاد أو المجهود الفيزيائي ، مثل الدفع وحمل الأشياء الثقيلة أو إنجاز الأعمال الشاقة .
انظر تحت bruxism .

كليوسين **Cleocin**
الاسم التجاري لمستحضرات الكليندامايسين (مضاد حيوي) .

مِنْحَتَة مِخْلَبيَّة (أسنان) **cleoid**
رأس له شكل المخلب يستخدم في نحت حشوات المغلم .

هَوَسُ السَّرِقة **cleptomania**
يسمى أيضاً (Kleptomania) ، وهو الميل الشديد المرور بمرحلة اليرقة .

تَرْقويٌّ خُشَّائيّ **cleidomastoid**
يتعلق بالترقوة والناتىء الخشائي .

تَرْقويٌّ قذاليّ **cleido-occipital**
صفة منسوبة لكل ما له علاقة بالترقوة والعظم القذالي في آن واحد .

قطعُ التَّرْقوَة **cleidorrhexis**
العمل الجراحي الهادف إلى قطع عظم الترقوة . ويسمى أيضاً (Clavicotomy) .

تَرْقويٌّ كَتِفِيّ **cleidoscapular**
صفة لكل ما يتعلق بعظمي الترقوة والكتف في آن واحد .

تَرْقويٌّ قصيّ **cleidosternal**
صفة لكل ما يتعلق بعظمي الترقوة والقص في آن واحد .

قطعُ التَّرْقوَة **cleidotomy**
القطع الجراحي للترقوة في الجنين في الولادات العسيرة ، لتسهيل مرور الكتفين عبر قناة الولادة .

تفْتيتُ التَّرْقوَة **cleidotripsy**
عملية تقطيع الترقوة بهدف تسهيل ولادة الجنين ، وغالباً يتم في الجنين الميت .

ألم ترقوي **cleisagra**
انظر تحت cleidagra .

عُلَيبَة مُسْتَغْلِقة **cleistothecium**
(في بَعْضِ الفطرياتِ الزقيَّة)
الجسم المثمر المنتج من نوع محدد من الفطريات الزقية ، والذي لايتواجد فيه مسامات كي تفلت الأبواغ الزقية منه ، و تتحرر الأبواغ بتمزق أو بتخرب الجسم المثمر .

كليماسْتين (دَواءٌ مُضادٌ للهيستامين) **clemastine**
كليماستين ، مشتق من الإيثانولامين ، مع تأثيرات مضادة للهيستامين .

كليماستين فومارات **clemastine fumarate**
ملح الكليماستين ، وهو مضاد هيستامين يستخدم في معالجة التهاب الأنف الأرجي واضطرابات الجلد الأرجية .

انظر تحت midsytolic click .
انظر تحت ejection sounds .

قلقلة **clicking**
سلسلة من القلقلة ، مثل طقطقة أو الفرقعة ، أو ضجة الفرقعة المشاهدة في سيوح لقمة الفك السفلي .

كِليدينيُوم (دَواءٌ مُضادٌ لِلفِعْلِ الكولينِي) **clidinium**
دواء مضاد للفعل الكوليني أمونيومي رباعي مع تأثيرات مضاد للتشنج بصورة واضحة ومضادة للإفراز في السبيل المعوي المعدي ، والذي يستخدم كمعالجة مساعدة في معالجة القرحة الهضمية والاضطرابات المعوية المعدية الأخرى ، ويعطى فموياً .

بروميد الكليدينيوم **clidinium bromide**
مضاد للفعل الكوليني رباعي الأمونيوم مع تأثيرات مضادة للتشنج ومضاد للإفراز على الجهاز الهضمي ، يستخدم كمعالجة مساعدة في علاج القرحة الهضمية والاضطرابات الهضمية الأخرى ، يعطى فموياً .

سابقة بمعنى التَرْقوَة **clido-**
(=cleido-)

مُراجع **client**
تعبير يستخدم في التمريض للتعبير عن أي مراجع للعيادات الصحية ويبحث عن حل مشكلته الصحية ، وهي مفضلة في هذا المجال الصحي العام لأن المراجع قد يكون صحيحاً لكنه يريد الارتقاء بصحته إلى مستوى أعلى .

إياسِيّ **climacteric**
1ـ متلازمة من التغيرات الغدية والجسمية والنفسية التي تحدث في سن الإياس عند الإناث .
2ـ تغيرات مشابهة تحدث في الرجال الذين يصلون لمرحلة تناقص الحث الجنسي مع تقدم العمر . يسمى أيضاً (Climacterium) .

الإياس **climacterium**
(=menopause)
انظر تحت climacteric .

للسرقة بشكل مرضي .

رُهابُ السَّرِقة **cleptophobia**
الخوف المرضي من بالسرقة .

كليرامبو **clérambault**
انظر تحت de Clérambault .

العُكبوريَّة (جِنسٌ مِنَ القوارض) **Clethrionomys**
جنس من القوارض من عائلة (Muridae) ، والتي تتضمن فأر الحقل .

العُكْبوريَّةُ الرَّمْليَّة **Clethrionomys glareolus**
فأر حقل المصرف ، نوع أوروبي يشكل المضيف الطبيعي لڤيروس البومالا (Puummala virus) .

الكليڤلاندِيّات **Clevelandellina**
رُتْبَةٌ مِنَ المُهَدَّبات .

قلقلة **click**
(صوت قصير وحاد في أمراض القلب)

قَلْقَلَةُ القَذْف **ejection click**
انظر تحت sound .

قلقلة منتصف الانقباض **midsystolic click**
صوت كثير التواتر في منتصف الانقباضة ، وغالباً ما يترافق مع تدلي الصمام المترالي اللين ، ويمكن أن تترافق مع نفخة انقباضية متأخرة .

قَلْقَلَةُ المِتْرالِيّ **mitral click**
(=صكَّةُ الانْفتاح) **(=opening snap)**
انظر تحت mitral opening snap .

قلقلة انقباضية **nonejection**
غير قذفية **systolic click**
انظر تحت midsystolic click .

قَلْقَلَةُ أُورتُولاني **Ortolani's click**
انظر تحت sign .

قَلْقَلَةٌ انْقِباضيَّة **systolic clicks**
قلقلة قَلبيَّة قصيرة وخشنة خلال فترة الانقباضة ، وغالباً ما تشير إلى حالات قلبية مختلفة تترافق مع صمامات مترالية أو أورطية شاذة لكن يمكن أن تكون هنالك أسباب خارج قلبية .

ملح الهيدروكلوريد المميه للكليندامايسين ، والذي يستخدم بشكل مبدئي في معالجة الإصابة بالعدوى بالجراثيم إيجابية الجرام المقاومة للبنسلين وعند المرضى الذين لديهم حساسية تجاه البنسلين ، يعطى فموياً .

هيدروكلوريد بالميتات كليندامايسين **clidamycin palmitate hydrochloride**

ملح هيدروكلوريد مذاب في الماء لإستر الكليندامايسين وحمض البالميتيك ، والذي يملك نفس الفعالية والاستخدامات لملح الهيدروكلوريد ، والذي وهو مناسب في تحضير المحاليل للاستخدام الفموي .

فسفات الكليندامايسين **clindamycin phosphate**

إستر ذواب بالماء للكليندامايسين وحمض الفسفوريك ، والذي يملك نفس الفعالية والاستخدامات لملح الهيدروكلوريد ، وهو مناسب لتحضير أشكال الحقن المختلفة ، يعطى عضلياً أو وريدياً .

مراحل تسلسلية **cline**

سلسلة مستمرة من الاختلافات في البنية والوظيفة التي يظهرها أفراد من أنواع على طول خط يمتد من جزء واحد من المجال التابع لها إلى آخر .

1 ـ مُسْتَشْفَى (في النظام الأمْريكِي) **clinic**

2 ـ إكلينيكيات (محاضرة طبية جانب سرير المريض)

3 ـ عِيادَة

1 ـ مؤسسة يتم فيها إدخال المرضى للمعالجة والدراسة الفاحصة لحالاتهم عن طريق مجموعة من الأطباء الممارسين للطب .

2 ـ محاضرة طبية ، أو فحص المرضى من قبل مجموعة الطلبة ، مع إعطاء توصيل بجانب سرير المريض .

عِيادَةٌ مُتَنَقِّلَة **ambulant clinic**

عيادة للمرضى دون تقييدهم بالسرير .

كاتبُ العِيادَة **clinic clerk**

المَوظف في عيادات المرضى .

إياسٌ مُبَكِّر **climacterium praecox**

1 ـ أوجِيّ **climactic**

2 ـ متعلق بهَزَّةِ الجِماع؛ إرْجازيّ

كليمارا **Climara**

الاسم التجاري لمستحضر الإستراديول .

مُناخ **climate**

حالة الجو المحيط من حرارة أو أمطار أو عواصف أو جو مشمس أو ربيعي .

عِلمُ المَناخ **climatology**

علم يختص بدراسة حالات البيئة الطبيعية (هطول المطر وساعات اليوم و الحرارة و الرطوبة وحركات الهواء) المسيطرة في مناطق معينة من الأرض .

علم المناخ الطبي **medical climatology**

علم يهتم بشكل خاص بتأثير العوامل المناخية على الإنسان وعلى وظائفه وصحته وعلى معالجة علله .

المداواة بالمَناخ **climatotherapeutics**

انظر تحت cilmatotherapy .

المداواة بالمَناخ **climatotherapy**

معالجة المرض بواسطة المناخات المفضلة .

1 ـ أوْج **climax**

2 ـ هَزَّة الجِماع؛ إرْجاز

الأوج أو فترة الشدة العظمى ، كما هي الحال في حالة المرض (النوبات) ، أو في الإثارة الجنسية (الإرجاز أو هزة الجماع) .

مِخْطاطُ تأثير المَناخ **climograph**

مخطاط تأثير المناخ على الإنسان .

اعْوِجاجُ المَفْصِل **clinarthrosis**

انحراف شاذ في ارتصاف العظام عند المفصل .

كلِينْدامايسين (مُضادٌ حَيَوِيّ) **clindamycin**

مضاهئ شبه تخليقي للمضاد الحيوي اللينكوميسين الطبيعي ، والذي يتم انتاجه بكلورة الأخير . تأثيراته موجهة بشكل مبدئي تجاه الجراثيم إيجابية الجرام .

هيدروكلوريد الكليندامايسين **clindamycin hydrochloride**

العيـادة التي تقـدم الخـدمـات اللازمـة لحل مشكلات الإنجاب أو العقم أو تنظيم الأسرة .
انظر تحت fertility clinic .

سَريري؛ إكلينيكيّ **clinical**

يتعلق بالإكلينيكيات ، أو بالجانب الإكلينيكي ، ويتعلق بإيجاد مراقبة ومعالجة فعلية للمرضى على قواعد نظرية وعلمية .

كيمْيائيٌّ إكلينيكي **clinical chemist**

الكيمَيائي المتخصص بالسريريات ، وما يحدث في إمراضها من تبدلات كيميائية .

مُتَدَرِّبٌ إكلينيكي **clinical clerk**

من يمارس السريريات (الإكلينيكيات) عملياً وتطبيقياً وفق أصول تدريبية دون التركيز على الخلفيات النظرية الدقيقة .

تَدْريبٌ إكلينيكي **clinical clerkship**

عمليـة التـدريب على الأعـمـال الإكلينيكيـة للمرضى .

تاجٌ إكلينيكي **clinical crown**

مـا يمكن كـشـفـه من التاج السني عند فـحص المريض بفـتح الفم . ويسـمى أيضـاً (Corona clinica) .

مُهَنْدِسٌ إكلينيكي **clinical engineer**

المهَندس الذي يسعى إلى تطوير الخدمات الفنية والتكنولوجية في المجالات الإكلينيكية .

الهَنْدَسَةُ إكلينيكية **clinical engineering**

العلـم التكنـولوجي الهنـدسي الذي يبـحث في تطوير الشـؤون الإكلينيكيـة وتقـدمـهـا لخدمـة المرضى وتأمين راحتهم .

مُمَرِّضَةٌ مُدَرِّسَةٌ إكلينيكية **clinical instructor nurse**

الممـرضـة ذات الكفـاءة والقـدرة على تدريب الممرضين في المجالات التمريضية الإكلينيكية . وهي عادة ممرضة مجازة .

مُخْتَبَرٌ إكلينيكي **clinical laboratory**

المختـبر الذي يمكنه تقديم خدمـات التحـاليل المختبرية بأدوات بسيطة يمكن استخدامها بجانب سرير المريض ، كمقياس سكر الدم الصغير .

إكلينيكيات في غياب المَرِيْض **dry clinic**

(درس إكلينيكيَ بدَون َوجود مريض)
درس إكلينيكي مع تقـديم الحـالة والتـاريخ المرضي في غياب المريض المدروس حالته .

عيادَةُ تَنْظيمِ الأُسْرَة **family planning clinic**

العيادة التي تقدم الخدمات والمعلومات للأسرة فيما يتعلق بأصول تنظيم الإنجاب .

عيادَةُ الإنْجاب **fertility clinic**

العيـادة النسائية التي تعنى بتقـديم الخدمات للزوجين الذين يعـانيـان من العـقـم الأولي أو الثانوي بقصـد حل المشكلة وتحقيق الإنجاب . وتسـمى أيضـاً (Infertility clinic) ، (Sterility clini) .

عيادَةٌ مَجانيَّة **free clinic**

العيادة التي تقدم الخدمات الصحية مجاناً بلا أجور .

عيادَةٌ مُتَنَقِّلَة **mobile clinic**

العيـادة التي تنتقل بالسيـارة لزيارة المرضى في المدارس أو المنازل .

عيادَةٌ خارجيَّة **outpatient clinic**

العيـادة الَتيَ تستقبل المرضى خارجياً من غير المستشفى لتقديم الخدمات الصحية لهم ، وفيها يتخذ قرار العـلاج الخارجي أو إدخال المريض إلى المستشفى .

عيادَةٌ إيصاليَّة **outreach clinic**

العيادة التيَ ترسل الفريق خارجها إلى المنازل أو المناطق البعيدة لتقديم الخدمات الصحية .

عيادَةُ التَّحَرِّي **screening clinic**

العيادة التي تقدم خدمات التحريات المختبرية والفحوص الشعاعية ويمكن إجراء التحريات والدراسات بناء على مراجعيها .

عيادَةٌ تَخَصُّصِيَّة **specialty clinic**

العيـادة التي تقـدم الخدمات الصـحية في فـرع طبي تخصصي دقيق ، كـالعيادة العينية وعيادة الأذن ، والأنف والحنجرة .

عيادَةُ العُقْم **sterility clinic**

clinical nurse specialist **مُمَرِّضَةٌ إكلينيكية اخْتِصَاصِيَّة**
المرض أو الممرضة المختصان بفن التمريض الإكلينيكي .

clinical privileges **امْتِيازاتٌ إكلينيكية**

clinical psychologist **اخْتِصاصيٌّ علْم النَّفْس الإكلينيكي**
المختصّ بعلم النفس الذي يتضمن الدراسات العلمية والتطبيقية النفسية لمعالجة وشفاء الضوائق النفسية وتعزيز الصحة الشخصية والتطور النفسي الشخصي .

clinical psychology service **شُعْبَةُ علْم النَّفْس الإكلينيكي**
القسم الذي يهتم بتطبيق علم النفس الإكلينيكي ، ويقوم عليه مختصون بهذا العلم .
انظر تحت clinical psychologist .

clinical root **جَذْرٌ إكلينيكي**
القسم من السن أو الأسنان الذي لا يرى في التجويف الفموي .

clinician **طبيبٌ إكلينيكي**

nurse clinician **مُمرضة إكلينيكية**

clinico- **سابقة بمعنى المُمَارَسَة الطبيَّة الإكلينيكية**
سابقة مصطلحية تشير إلى كل ما يتعلق بالسريريات (الإكلينيكيات) .

clinicogenetic **إكلينيكي وراثيّ**
يتعلق بالتظاهرات الإكلينيكية للاضطرابات الكروموسومية .

clinicopathologic **إكلينيكي إمْراضيّ**
يتعلق بأعراض المرض وآلياته الإمراضية معاً .

clinicopathology **الباثولوجْيا الإكلينيكية**
علم التشريح المرضي المتعلق بالسريريات وضمن إطارها .

Clinistix **كلينيستكس**
الاسم التجاري لشريط المغمس بالإنزيم ، والذي يستخدم لكشف السكر في البول . يغمس الشريط في البول والنتائج الإيجابية أو السلبية يشير إليها اللون في الشريط .

Clinitest **كلينيتست**
الاسم التجاري للحبوب الكاشفة الحاوية على سلفات النحاس ، والتي يستخدم كاختبار لكشف وجود السكر في البول . توضع عشرة نقاط من الماء مع خمسة نقط من البول في أنبوب الاختبار ، ثم تضاف هذه الحبوب المولدة للحرارة مع المحلول ويسمح للمحلول بالغليان . بعد عدة لحظات يقارن لون المحلول مع لون المخطط .

clino- **سابقة بمعنى المُمَارَسَة الطبيَّة الإكلينيكية**

clinocephalic **مُسَطَّحُ الرَّأس**
يسمى أيضاً (Clinocephalous) ، وهي صفة منسوبة لمسطح الرأس .

clinocephalism **تَسَطُّحُ الرَّأس**
انظر تحت clinocephaly .

clinocephaly **تَسَطُّحُ الرَّأس**
تسطح خلقي أو تقعر لقمة الرأس .

clinodactylism **انْحِرافُ الأصابع**
انظر تحت clinodactyly .



Mobile clinic **عيادة متنقلة**

الإصابات المتشاركة ، يطبق موضعياً أو داخل المهبل . كان في السابق أشكال دوائية منه تعطى فموياً في معالجة الزحار الأميبي ، لكن هذه المعالجة قد أوقفت بسبب السمية العصبية المرافقة .

clioxanide **كلِيُوكسانيد**

دَواءٌ مُضادٌّ للدِّيدان .

clip **مِشْبَك**

أداة معدنية تستخدم لتقريب حواف الجرح أو لمنع حدوث النزف من الأوعية الدموية الصغيرة .

catheter clip **مشْبَكُ القَثْطَرَةِ البَولِيَّة**

مشبك يستعمل لغلق فتحة القثطرة البولية .

dura clip **مشْبَكٌ دائم**

يستعمل لإرقاء الأوعية النازفة .

nose clip **مشْبَكُ الأَنْف**

مشبك لإغلاق فتحتي الأنف لمنع خروج الهواء منها وقصر التنفس بطريق الفم ، أو لمنع دخول الماء فيها عند الغطس مثلاً .

skin clip **مشْبَكُ الجلْد**

مشبك يستعمل لتقريب حواف الجروح الجلدية كبديل الخياطة .

towel clip **مشْبَكُ الفُوَط**

مشبك أو ملقاط لربط حواف الفوط والأغطية .

cliprofen **كلِيبْرُوفين**

دواء مُضادٌّ للالْتهاب غير ستيرويدي .

cliseometer **مِقياسُ الزَّاوِيَةِ الحَوْضِيَّةِ السيسائِيَّة**

أداة لقياس الزاوية التي يصنعها محوار الحوض مع العمود الفقري (السيسائي) وهي المعروفة بالحوضية الفقرية .

Clistin **كليستين**

الاسم التجاري لمستحضرات ماليت الكربينوكسامين ، وهو دواء مضاد للهستامين .

clitellum **كليتوليم**

قطعة غدية تشبه السرج في ديدان الأرض وديدان العلق ، والتي تفرز الفيلجة التي تطوق (تحيط) البيوض .

clinodactyly **انحِرافُ الأصابع**

انحراف جانبي أو إنسي دائم أو انعطاف واحد أو أكثر من الأصابع .

clinography **المُخطَّط الإكلينيكي**

(مُخطَّط السيرةِ المَرضيَّة)

نظام تخطيطي للموجودات الإكلينيكية كالحرارة والأعراض والتظاهرات المرضية التي يبديها المريض .

clinoid **سَريريُّ الشَّكل (بنية تشريحية)**

clinology **عِلمُ تقوُّض الكائِناتِ الحَيَّة**

العلم الذي يدرس حالات فناء وتخرب الكائنات الحية .

clinometer **مِقياسُ انحِرافِ العَين**

جهاز كان يستعمل قديماً لتحديد محور العين في حالة اللابؤرية .

Clinoril **كلينوريل**

الاسم التجاري لمستحضر السولينداك (Sulindac) ، وهو دواء مضاد للالتهاب لاستيرويدي .

clinoscope **مِنْظارُ انحِرافِ العين**

جهاز يقيس درجة الاحولال التدويري .

clinostatic **اسْتِلقائِيّ**

يحدث عندما يستلقي المريض في الفراش .

clinostatism **اسْتِلقاء**

وضعية الاستلقاء في الفراش للجسم .

clinotherapy **المعالجة بالاسْتِلقاء**

بالمحافظة على أن يكون المريض راقداً في سريره .

clioquinol **كلِيُوكينول (دواء مضاد للجراثيم والفطريات والأميبات)**

(=iodochlorhydroxyquin)

عامل مضاد جرثومي ومضاد فطري ، وذو خصائص مضادة للإكزيمة ، ومضاد للحكة ، يستخدم كمضاد موضعي للإصابة بطائفة واسعة من الأمراض الجلدية ، وتتضمن كل أنماط الإكزيمة والتهابات المهبل بالمشعرات المهبلية والمبيضات البيض والشعرويات أو

clithrophobia **رُهابُ الأماكِنِ المُغلَقة**

الخوف الشديد المرضي من الأماكن مغلقة الأبواب . ويسمى أيضاً (Claustrophobia) .

clition **الحُديرى**

(نقطة في قاعدة الجمجمة في القياسات البشرية)

نقطة متوسطة في الحافة الأمامية للمحدر (الجدار الأمامي للحفرة الخلفية للقحف) .

Clitocybe **الحَدْرَجيَّة**

(جِنسٌ مِنَ الفطريات مِنْها ماهُوَ سامّ)

جنس من الفطريات هراوية الشكل (الفطريات الدعامية) من فصيلة الأجاريسيكا (Agaricaceae) . بعض الأنواع منها سام ويحتوي على المسكارين (قلواني كوليني الفعل) .

Clitocybe gigantea **الحَدْرَجيَّةُ العِملاَقَة**

نوع مِنَ الفطور العملاقة من نوع الدعاميات (المشروم) ، وبعضها صالحة للأكل وبعضها الآخر سام يحتوي على مواد مسكارينية .

Clitocybe illudens **الحَدْرَجيَّةُ الوَحْلِيَّة**

هو المَشروم البرَتقالي ، والذي يسبب تسمماً هضمياً فطري المنشأ .

Clitocybe nebularis **الحَدْرَجيَّةُ الغَمامِيَّة**

مصدرٌ للنيبولاَرين (مضاد حيوي كابح للسل والأورام) .

clitocybine **كليتوسيبين**

مُضادٌّ حَيَويّ كان يستعمل قديماً في مقاومة العصيات السَلية .

clitoral **بَظرِيّ**

يتعلق بالبظر .

clitoralgia **أَلَمُ البَظر**

clitorectomy **استِئصالُ البَظر**

انظر تحت clitoridectomy .

clitoridauxe **ضَخامَةُ البَظر**

انظر تحت clitorism .

clitoridean **بَظرِيّ**

(=clitoral)

clitoridectomy **استِئصالُ البَظر**

clitoriditis **التِهابُ البَظر**

clitoridotomy **قطعُ البَظر**

clitorimegaly **ضَخامَةُ البَظر**

clitoris **البَظر**

جسم ناعظ ، صغير ، مستطيل الشكل ، يتوضع في الزاوية الأمامية لمشق الفرج ، المماثل للقضيب في الرجل . يسمى أيضاً (Coles feminінus) .

clitorism **1ـ انتِصابُ البَظر**

2ـ البَظارَة؛ ضَخامَةُ البَظر

1ـ ضخامة البظر .

2ـ انتصاب البظر المستمر والمؤلم عادةً .

clitoritis **التِهابُ البَظر**

clitoromegaly **ضَخامَةُ البَظر**

انظر تحت clitorimegaly .

clitoroplasty **رَأبُ البَظر**

رأب البظر الجراحي .

clitorotomy **قطعُ البَظر**

القطع الجراحي للبظر .

clitorrhagia **نَزفٌ بَظرِيّ**

النزف الدموي الناتج عن البظر .

clival **مَحْدَرِيّ**

يتعلق بالمحدر .

clivis **الحَدَرة**

تسمى أيضاً (Decline) ، (Declivis) ، (Lobulus clivi) ، وهي القسم النازل من جبيل الدودة في المخيخ ، وهو فصيص دودي يقع في مؤخرة الشق البدائي .

clivography **تَصْويرُ المَحْدَر**

هو تصوير المحدر الشعاعي ، أو تصوير الحفرة القحفية الخلفية الشعاعي .

clivus TA **المَحْدَر**

(السطح العظمي الذي يشكل الجدار الأمامي للحفرة الخلفية للقحف)

basilar clivus **المَحْدَرُ القاعديُّ**

هو محدر العظم القفوي .

3 ـ في الباثولوجيا ، هي فتحة في القناب (Involucrum) للعظم المنتخر .

مَذْرَقٌ خلْقيٌّ **congenital cloaca**

انظر تحتَ persistent cloaca .

مَذْرَقٌ أديميٌّ ظاهر **ectodermal cloaca**

الجزء منَ المذرقَ الجنيني ، والذي ينشأ خارجياً بالنسبة للغشاء المذرقي .

مَذْرَقٌ أديميٌّ باطن **entodermal cloaca**

الجزء منَ المذرَق الجنيني ، والذي ينشأ داخلياً للغشاء المذرقي .

مَذْرَقٌ مُسْتَديم **persistent cloaca**

استمرار خلقي لتجويف شائع (مشترك) يفتح بداخله القنوات المعوية والبولية والتناسلية . يسمى أيضاً بالمذرق الخلقي (Congenital cloaca) .

مَذْرَقِيّ **cloacal**

يختص ، أو له علاقة بالمذرق .

الْتِهابُ المَذْرَق (عند الدواجن) **cloacitis**

مَذْرَقِيُّ المَنْشأ **cloacogenic**

ينشأ من المذرق ، أو من البقايا المذرقية المستديمة .

كلوبازام (دَواءٌ مُهَدِّىء) **clobazam**

هو البنزوديازبين الذي يملك الأفعال والاستخدامات الشبيهة بتلك التي يتمتع بها الديازبام .

بروبيونات الكلوبيتازول **clobetasol propionate**

هو كورتيكوستيرويد تخليقي ، مضاهيء للبريدنيزولون ، والذي يستخدم موضعياً لتخفيف الالتهاب والحكة في الأمراض الجلدية التي تستجيب للكورتيكوستيرويدات .

ساعة **clock**

ساعة ، جهاز يمكن بواسطته قياس الزمن .

السَّاعَة العُمْريَّة **aging clock**

هي الغدة الصَنوبرية (Pineal gland) ، فهي التي يعتقد بأنها تشرف على التنظيم الزمني لإفراز الهرمونات والإفرازات المختلفة بحسب التوقيت

المَحْدَرُ القاعديُّ **clivus basilaris**

موضع عَمَيق معقد ومكان شائع لنكس السرطانة الأنفية البلعومية . وتسمى أيضاً (Basilar clivus) .

المَحْدَر **clivus blumenbachii (=clivus)**

انظر تحت clivus .

الحَدْرَة (في المخيخ) **clivus monticuli (=declive)**

انظر تحت declive .

مَحْدَرُ العَظْمِ القَذالي **clivus ossis occipitalis TA**

الجزء السفلي من المحدر ، يتشكل بواسطة القسم القاعدي لعظم القذالي ، يسمى أيضاً بالمحدر القاعدي (Basilar clivus) والثلم القاعدي للعظم القذالي (Basilar groove of occipital bone) .

مَحْدَرُ العَظْمِ الوَتَدي **clivus ossis sphenoidalis**

الجزءَ العلوي من المحدر ، يتشكل بواسطة سطح جسم العظم الوتدي ، يسمى أيضاً بالثلم القاعدي للعظم الوتدي (Basilar grove of sphenoid bone) .

كلو (وَحْدَةُ العَزْل الحَراري) **clo**

وحدة قياس للعزل الحراري الناتج عن الملابس اليومية الطبيعية للإنسان ، وتمثل تقريباً العزل المتولد من 4/1 من ثخانة الصوف .

مَذْرَق **cloaca**

1 ـ ممر مشترك (شائع) للإفرازات البولية والبرازية والتوالدية (التناسلية) في وحيدات المسلك ، والطيور ، والفقاريات الدنيا .

انظر تحت cloacal aperture .

2 ـ في علم الأجنة للثدييات ، النهاية الانتهائية للمعي المؤخر قبل انقسامة للشرج والمثانة والأعضاء التناسلية الأولية ، وإذا حدث فشل في الانقسام خلال النمو ، ينتج عنه المذرق المستديم (Persistent cloaca) .

هو مسكن فيناماتي (دواء مسكن ومضاد للالتهاب) .

كلوفيبْرات (دَواءٌ خافِضٌ لِشَحْمِيَّاتِ الدَّم) **clofibrate**

دواء خافض لشحميات الدم ، يستخدم لانقاص المستويات المصلية المرتفعة من شحميات الدم ، يعطى فموياً .

كلوجيستّون **clogestone**

مُرَكَّبٌ برُوجِسْتيني .

كلوماكران **clomacran**

دَواءٌ مُهَدِّئ .

كلوميد **Clomid**

الاسم التجاري لمستحضر الكلوميفين سيترات (دواؤ مضاد للعقم) .

كلوميفين (دَواءٌ مُضادٌ للعُقم) **clomiphene**

منبه للغدد التناسلية تخليقي ، بنيته الأساسية لها علاقة بكلوروتريانيسين البروجسيترون ، يتواجد في صورة مسحوق أبيض أو أصفر باهت ، وتتألف من مزيج من مصاوغ المفروق ـ المقرون (Trans-cis) يستخدم لإحداث الإباضة في أشكال معينة من العقم اللاإباضي ، يعطى فموياً .

كلوميبْرامين (دَواءٌ مُضادٌ للاكتِئاب) **clomipramine**

من مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات من صنف الديبنزازيين ، وكذلك يملك فعالية مزيلة للقلق . يستخدم أيضاً بشكل استقصائي لتخفيف أعراض اضطراب الوسواس القهري .

نسيلة **clon**

تسمى أيضاً (Clone) وهي مزرعة أو مجموعة خلايا من أصل خلية واحدة تكاثرت لا جنسياً ، ولذلك تكون وراثياً متطابقة تماماً .

نسيلِيّ **clonal**

يتعلق بالنسيلة .

قابلِيَّة التَّنْسِيل **clonality**

قابلية تشكيل النسيلة .

كلونازيبام (دَواءٌ مُضادٌ للاخْتِلاج) **clonazepam**

هو بنزوديازبين والذي يستخدم كمضاد للاختلاج في معالجة متلازمة لينوكس ـ جاستو

اليومي والعمري إجمالاً .

ساعةٌ ذَرِّيَّة **atomic clock**

تسمى أيضاً (Nuclear clock) ، وهي نمط من الساعات التي تستعمل التردد الرنيني الذري المعياري كعنصر أساسي للمحافظة على الزمن ، وتعتبر من أدق الساعات في العالم ، ولذلك تستخدم في ضبط الأزمنة العالمية والفروق بينها لتنظيم الإشارات بين الإذاعات ومحطات التلفاز والأقمار الصناعية .

السَّاعَةُ البَيولوجيَّة **biological clock**

آلية فيزيولوجيةَ تحكم الحدوث النظمي لظواهر كيمائية حيوية وفيزيولوجية وسلوكية معينة في النباتات و الحيوانات .

باتِجَاهِ عَقارِب السَّاعَة **clockwise**

الدوران والحركة كدوران عقارب الساعة انطلاقاً من الساعة 12 إلى الواحدة فالثانية . . أي نحو اليمين في الدوران .

كلوكورتولون (قشراني سكري) **clocortolone**

ستيرويدات سكرية ، متوفرة على شكل (21- أسيتات) ، (21- بيفالات) ، الإستر .

كلودانولين **clodanolene**

اسم دواء مرخ للعضلات الهيكلية .

كلودازون **clodazon**

دَواءٌ مُضادٌّ للاكْتئاب .

كلودرونات ثنائية الصوديوم **clodronate disodium**

ملح ثنائي الصوديوم لحمض الكلودرونيك . وهو عامل منظم لكالسيوم ثنائي الفسفات ، حيث يثبط الانحلال العظمي ويستخدم لمعالجة التهاب العظم المشوه وحالات فرط كالسيوم الدم التالية للخباثات . يعطى فموياً أو وريدياً .

حمض الكلودرونيك **clodronic acid**

هو منظم للكالسيوم العظمي .

كلوفازيمين (دَواءٌ مُضادٌ للمُتفطرات) **clofazimine**

مضاد جرثومي ، له تأثيرات كابحة للجذام وللمتفطرات السلية .

حمض الكلوفيناميك **clofenamic acid**

انظر تحت clonism .

كلونيكسِيريل clonixeril
دَواءٌ مُسكِّن .

كلونيكسين clonixin
دَواءٌ مُسكِّن .

مُوَلِّدُ التَّسائِل clonogenic
يعطي زيادة في نائل الخلايا .

مِخْطاطُ الرَّمَع clonograph
جهاز تسجيل الحركات العضلية التشنجية التقلصية أثناء حدوث الحركات الرمعية .

كلونوبين clonopin
شكل من الكلونوبين(Klonopin) ، وهو من مشتقات البنزوديازيبين (دواء مهدئ ومضاد للاكتئاب) .

داءُ مُتفرعاتِ الخُصيَة clonorchiasis
هو داء متأخرات الخصية في الإنسان أو الحيوانات الأخرى ، يتسبب عن عدوى بالطفيليات (الاحتشار) للممرات الصفراوية بواسطة الدودة الكبدية المثقوبة متأخرة الخصية الصينية (متفرعة الخصية الصينية) ، التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الشجرة الصفراوية ، وتكاثر الظهارة الصفراوية ، والتليف البابي المترقي و أحياناً سرطانة القنوات الصفراوية . الامتداد إلى المتن الكبدي يمكن أن يؤدي إلى تبدلات شحمية والتشمع الكبدي . يسمى أيضاً (Clonorchiosis) .

داءُ مُتفرعاتِ الخُصيَة clonorchiosis
انظر تحت clonorchiosis

مُتفرِعُ الخُصيَةِ الصينيُّ Clonorchis sinensis
(جنس من الديدان المثقوبة)
اسم علمي معروف لجنس من المثقوبات ، الآن تعتبر مماثلة لجنس متأخرة الخصية .

تَشَنُّجٌ رَمَعِيّ clonospasm

نسيلي النمط clonotype
توليفة خاصة من الجلوبولينات المناعية الثقيلة والخفيفة السلاسل ، والتي تنتج من قبل نسيلة

(اعتلال دماغي صرعي المنشأ عن الأطفال) ، وفي النوب الونائية والنوبة الرمعية العضلية . يستخدم فموياً .

نسيلة (ج: نسائل) clone
1 ـ واحد أو مجموعة من الخلايا المتماثلة وراثياً (جينياً) ، أو الكائنات الحية ، أو النباتات المشتقة بواسطة التوالد الإنباتي من أب وحيد كذلك جمهرة الدنا (DNA) المشتقة من جزيء دنا (DNA) وحيد هجين (ناقل مأشوب) بواسطة التنسخ في حقيقيات النوى أو الخلايا الثوية الجرثومية .
2 ـ يستخدم كفعل للإشارة إلى إنشاء نسيلة .

النَّسيلَةُ المَحْظورَة **forbidden clone**
انظر تحت clonal deletion theory .

رَمَعِيّ clonic
يتعلق بطبيعة الرمع .

ترَمُّع clonicity
حالة كونه رمعي .

رَمَعِيّ توتُّرِيّ clonicotonic
يملك كل من كونه رمعي وتوتري في آن واحد .

كلونيدين (دَواءٌ خافِضٌ لِضغطِ الدَّم) clonidine
ناهض ـ مناهض أدرينالي ـ α_2 (فعاليته الرئيسية ناهض أدرينالي ، لكن يصبح ذو فعل مناهض أدرينالي إذا كان تركيز النورأبينفرين مرتفعاً) ، يستخدم كخافض لضغط الدم فموي . يستخدم أيضاً كعلاج وقائي للشقيقة ، وفي معالجة عسر الطمث ، والأعراض الحركية الوعائية المصاحبة لسن الإياس وحالات الامتناع عن الخدرات .

تنسيل؛ إستِنْساخ cloning
استنساخ ، وتشكيل النسيلة .

استنساخ الدنا (DNA) **DNA cloning**
في الوراثة ، إنتاج العديد من النسخ المتماثلة لشذف الدنا (DNA) النوعية .

ترَمُّع clonism
تتالي للتشنجات الرمعية .

ترَمُّع clonismus

حركة متناوبة انقباضية انبساطية لإبهام القدم تتلو الشد الباسط القسري للمفصل المشطي السلامي .

رَمَعُ المِعْصَم **wrist clonus**

حركات تشنجية لليد ، والتي تتحرض ببسط اليد المفاجىء و العنيف تجاه المعصم .

كلوباميد (دَواءٌ مُدِرٌّ لِلبَوْل) **clopamide**

مدر بولي يستخدم في معالجة الوذمة المترافقة مع الاضطرابات المختلفة وفرط ضغط الدم الشرياني .

كلوبنتيكسُول (دَواءٌ مُضادٌّ للفصام) **clopenthixol**

مركب يملك خصائص مهدئة وملطف ومضادة للقيء ، ومضادة للهيستامين و مضادة للكولين ومحصرة للأدرينالي ـ ألفا وقد استخدم سابقاً كمهدئ في معالجة الفصام .

بيسلفات الكلوبيدوجريل **clopidogrel bisulfate**

مثبط لتكدس الصفيحات الدموية ، يستخدم كمضاد للتخثر الدموي من أجل الوقاية من احتشاء العضلة القلبية والسكتة الدماغية والموت الوعائي في المرضى المصابين بالتصلب الشرياني العصيدي ، ويعطى فموياً .

كلوبيدُول (دَواءٌ كابِحٌ للكرَوانِيَّات) **clopidol**

دواء كابح للكروانيات في الدجاج .

كلوبيموزيد **clopimozide**

دَواءٌ مُهَدِّئ .

كلوبيراك **clopirac**

دَواءٌ مُضادٌّ للالْتِهاب .

كلوبريدنُول **cloprednol**

كورتيكوستيرويد سكري .

كلوبروستينُول **cloprostenol**

(أحَدُ البرُوستَاجلاندِينيَّات)

هو بروستاجلاندين ، تركيبه الكيميائي $(C_{22}H_{28}ClO_6)$ ، متوفر أيضاً كملح صوديومي .

قناة ، لفافة كلوكه **Cloquet's canal , fascia etc.**

[قناة أو لفافة منسوبة للطبيب ، جول جيرمين

وحيدة من الخلايا البلازمية . كائن حي وحيد ينتج حوالي تصانيف 10^7 إلى 10^8 نمط نسيلي . أي محددة مستضدية واحدة يمكن أن تتفاعل مع 10^3 إلى 10^4 نمط نسيلي .

رَمَع **clonus**

1 ـ تقلص عضلي وارتخاء متناوب في تتال سريع .

2 ـ منعكس نظمي مستمر رعاش يبدأ من النخاع تحت المنطقة المصابة من النخاع .

رَمَعُ الكاحل **ankle clonus**

سلسلة منَ الحركات الانعكاسية النظمية الشاذة للقدم ، والتي يتحرض بواسطة الانثناء الظهراني المفاجئ ، الذي يسبب تقلصاً وارتخاء متناوبا للعضلة مثلثة الرؤوس الربلية (عضلة الساق والعضلة النعلية) . يسمى أيضاً (Foot clonus) .

رَمَعُ الغَلْق المَصْعَدي **anodal closure clonus**

الحركة الرمعيةَ التي تحدث أثناء غلق الدارة باتجاه المصعد أو القطب الموجب .

رَمَعُ الفَتْح المَصْعَدي **anodal opening clonus**

الحركة الرمعيةَ التي تحدث أثناء فتح الدارة الموجبة .

رَمَعُ الغَلْق المَهْبطي **cathodal closure clonus**

الحركة الرمعيَة التي تحدث أثناء غلق الدارة باتجاه المهبط أو القطب السالب .

رَمَعُ الفَتْح المَهْبطي **cathodal opening clonus**

الحركة الرمعيَة التي تحدث أثناء فتح الدارة السالبة .


رَمَعُ القَدَم **foot clonus**

انظر تحت ankle clonus .

رَمَعُ الرَّضَفَة **patellar clonus**

حركات نفضية نظمية للرضفة تنتج عن قبضها ما بين الإبهام والسبابة ودفعها بشكل مفاجىء وعنيف تجاه القدم ، وهذا منعكس شاذ مع تقلص وارتخاء متناوب للعضلة مربعة الرؤوس .

رَمَعُ إبْهام القَدَم **toe clonus**



Cloning Process عملية الاستنساخ

كلورباكتين XCB **Clorpactin XCB**

الاسم التجاري لمستحضر الأكسي كلوروسين (Oxychlorosene) ، وهو مضاد موضوعي للعدوى .

كلورْبرينالين (دَواءٌ مُوَسِّعٌ لِلقصبات) **clorprenaline**

هو كلوربرينالين هيدروكلوريد ، والذي يملك خصائص أدرينالية الفعل ، وتركيبه الكيميائي ، $(C_{11}H_{16}CINO.HCL.H_2O)$ ، يستخدم كموسع قصبي .

كلورسولون **clorsulon**

هو سلفوناميد يستخدم كمضاد لداء المتورقات في الانسان و الحيوانات الأليفة .

كلورتِيرمين (دواء مُفقد للشهية) **clortermine**

دواء يملك خصائص أدرينالية الفعل ، ويستخدم كمقهم فموي في المعالجة قصيرة الأمد للبدانة خارجية المنشأ .

كلوزانْتيل (دَواءٌ مُضادٌّ لِلديدان) **closantel**

دواء مضاد للديدان ساليسيلانيليدي (Salicylanilide) يستخدم في الماشية والماعز .

يغلق **close**

فعل عملية إغلاق ما هو مفتوح .

عَضَّةٌ مُغْلَقَة **close bite**

كلوكه *(Jules Germain Cloquet)* ، وهو جراح فرنسي *[1790-1883]* .

انظر تحت canalis hyaloideus .

انظر تحت fascia .

كلورازيبات (دَواءٌ مُضادٌّ لِلقلَق) **clorazepate**

دواء متواجد في شكل كلورازيبات ثنائية البوتاسيوم ، وهوبنزوديازيبين والذي يستخدم كمزيل للقلق لتخفيف قصير الأمد لأعراض القلق ، وكمضاد للإختلاج في معالجة نوب الصرع المعقد الجزئي ، وفي معالجة أعراض الامتناع عن الكحول الحاد ، يعطى فموياً .

حمض الكلورازيبك **clorazepic acid**

حمض حر من الكلورازيبات .

كلوريكسولون (دَواءٌ مُدرٌّ لِلبَول) **clorexolone**

مدر للبول ، والذي يستخدم في معالجة الوذمة المترافقة مع الاضطرابات المختلفة وفي فرط ضغط الدم .

كلوروبيرُون **cloroperone**

دَواءٌ مُهَدِّئٌ .

كلوروفين (مادَّةٌ مُطهرة) **clorophene**

دواء مضاد للعدوى ، فعال تجاه طيف واسع من الجراثيم و الفطور .

(Clostridium his- أو ، (Clostridiopeptidase B)
tolyticum proteinase B) .

مِطثيَّة (جرثومة من المطثيات) **clostridium**

جنس من الجراثيم من فصيلة العصويات ، لا هوائية إجبارياً ، أو أليفة الهواء القليل ، وإيجابية الجرام ، مكونة للأبواغ ، عصيات شبيهة بالنبابيت ، تمتلك أبواغ قطرها أكبر من الخلايا الإنباتية من الممكن أن تكون الأبواغ مركزية ، أو طرفية أو تحت الطرفية . يوجد منها أكثر من مئة نوع ، والتي تتمايز على أساس الفيزيولوجية ، والمورفولوجية ، وتكون الذيفان . الأنواع الإمراضية منها تنتج ذيفان داخلي مدمر أو إنزيم . أنواع مختلفة منها تتواجد في التربة ، وفي الماء ، وفي السبيل المعوي للإنسان والحيوانات الأخرى .

المطثية مطثية **clostridium**

الشكل **clostridioforme**

أنواع إيجابية الجرام بشكل ضعيف تعزل بشكل شائع من العينات الإكلينيكية . تسمى أيضاً العصوانيات مطثية الشكل .

المطثية الحميدة **clostridium innocuum**

أنواع تتواجد في الإصابات بالعدوى في الانسان والحيوانات وتعزل في البراز ، واحدة من أكثر المطثيات المعزولة شيوعاً في العينات الإكلينيكية .

المطثية الليمونية **clostridium limonsum**

أنواع سامة توجد في التربة وفي العديد من عداوى الحيوانات .

المطثية الوتدية **clostridium sphenoides**

أنواع توجد في التربة وفي الجروح المصابة بالعدوى (المنعدمة) .

المِطثيَّة **Clostridium**

(جنس من الجراثيم الإيجابية الجرام اللاهوائية ذات الأبواغ)

جنس من الجراثيم من فصيلة العصويات ، لا هوائية إجبارياً ، أو أليفة الهواء القليل ، وإيجابية الجرام ، مكونة للأبواغ ، عصيات شبيهة

في طب الأسنان : إطباق الأسنان على ورقة الكربون أو أي صفيحة تترك الأسنان عليها أثراً لكشف سوء الإطباق .

مُغَلق **closed**

الصفة التي يتصف بها منفذ أو بوابة وهي في حالة الإغلاق ، بعكس الفتح فلا ينفذ منها شيء .

تَدْليكُ القَلْبِ بالصَّدْرِ المُغلَق **closed chest cardiac massage**

العمل الإسعافي في تدليك القلب من خارج الصدر بضغطه عبر القص دون الحاجة إلى فتح الصدر جراحياً.

فَمٌ مُغْلَق **closed mouth**

وصف حالة الفم وهو في وضعية الإغلاق أو إطباق الأسنان والشفتين على بعضهما .

مُحَدَّدُ الهَيئَةِ الطِّبِّيَّة **closed staff**

فريق طبي ذو عدد محدد وقليل ، ويقوم أفراده بالممارسة بالتنسيق مع بعضهم ضمن مجال عملهم الطبي في المؤسسة الطبية .

كلوزيرامين **closiramine**

دَواءٌ مُضادٌّ للهستامين .

المِطثيَّات **clostridia**

جنس من الجراثيم العصوانية اللاهوائية الإيجابية الجرام المكونة للأبواغ (Spores) ، وتوجد في التراب وأمعاء البشر والحيوانات ، وينتج الكثير من أنواعها الذيفانات الخارجية ، وتسبب المطثيات الوشيقية (Clostridium botulinum) ، التسمم الغذائي الشديد بعد تناول المعلبات سيئة الحفظ .

مِطثيّ **clostridial**

مطثي ، يتعلق أو يتسبب عن المطثيات .

كلوستريديوبيبتيداز **clostridiopeptidase**

إنزيم له نمطان (A) ، ويسمى (Clostridium his- tolyticum collagenase) ، أو (Clostridiopepti- dase A) أو (Collagenase A) ، أو (Collagenase I) ، وهو إنزيم يتواسط إماهة الكولاجين . والنمط الآخر (B) ، ويسمى (Clostripain) ، أو

والإنسان .

المطَثِّيَّةُ الشُّوفُوِيَّة **Clostridium chauvoei**
سَبب مسؤول عن الجمرة النفاخية في المواشي والماعز . تسمى أيضاً المطثية الفيسيرية (Clostridium feseri) .

المطَثِّيَّةُ العَسِيرَة **Clostridium difficile**
أنواع تشكل جزءاً من النبيت الطبيعي للقولون في حديثي الولادة ، وأحياناً في البالغين في الإنسان . تنتج ذيفاناً يسبب التهاب القولون الغشائي الكاذب في المرضى الذين يتلقون علاجاً بالمضادات الحيوية .

المطَثِّيَّةُ الشُّوفُوِيَّة **Clostridium feseri**
(=Clostridium chauvoei)
انظر تحت clostridium chauvoei .

المطَثِّيَّةُ الحَالَّةُ لِلدَّم **Clostridium haemolyticum**
أنواع تعزل من الدم والنسج الأخرى في المواشي الميتة مع بيلة هيموجلوبينية عصوية ، ويظن انها هي المطثية النوفية (Clostridium novyi) .

المطَثِّيَّةُ الحَالَّةُ لِلنُّسُج **Clostridium histolyticum**
أنواع ممرضة تتواجد في الجروح و تترافق مع الغنغرينة الغازية . تتواجد بشكل شائع في التربة .

المطَثِّيَّةُ الكلُويفيرِيَّة **Clostridium Kluyveri**
أنواع تعزل مِنَ التربة القريبة من الماء العذب أو المالح ، والتي تم استخدامها في دراسات التخليق الجرثومي وأكسدة الأحماض الدهنية .

المطَثِّيَّةُ النُّوفِيَّة **Clostridium novyi**
أنواع تشكل سبباً هاماً للغنغرينة الغازية في الانسان ، وهي مصدر للعدوى في الحيوانات الأخرى . قد تم تحديد ثلاثة أنماط مناعية لها (A ،B ،C) ، والنمط C يسمى شكلياً المطثيات المؤذمة (Clostridium oedematiens) ، والعصيات المؤذمة الخبيثة رقم II .

المطَثِّيَّةُ المؤذِمَة **Clostridium oedematiens**
انظر تحت clostridium novyi .

بالنبابيت ، تمتلك أبواغ قطرها أكبر من الخلايا الإنباتية من الممكن ان تكون الأبواغ مركزية ، أو طرفية أو تحت الطرفية . يوجد منها أكثر من مئة نوع ، والتي تتمايز على أساس الفيزيولوجية ، والمورفولوجية ، وتكون الذيفان . الأنواع الإمراضية منها تنتج ذيفان داخلي مدمر أو إنزيم . أنواع مختلفة منها تتواجد في التربة ، وفي الماء ، وفي السبيل المعوي للإنسان والحيوانات الأخرى .

المطَثِّيَّةُ الأَسِيتُوبُوتيلِيَّة **Clostridium acetobutylicum**
أنواع تتواجد بشكل واسع التوزع في التربة الزراعية ، ولكن لاتتواجد بشكل ممرض .

المطَثِّيَّةُ الخَروفِيَّة **Clostridium agni**
اسم شكلي للنمط B من المطثيات الحاطمة .

المطَثِّيَّةُ المُزْدَوِجَةُ التَّخْمِير **Clostridium bifermentans**
أنواع واسعة التوزع في الطبيعة ، تتواجد بشكل شائع في البراز و مياه المجارير (المقاذير) ، والتربة . تترافق أحياناً مع حالات الغرغرينة الغازية (Gas gangrene) .

المطَثِّيَّةُ الوَشِيقِيَّة **Clostridium botulinum**
عامل يسبب التسمم الوشيقي في الانسان والبط البري وطيور الماء الأخرى ومرض ارتخاء الرقبة في الطيور . تسبب أشكال معينة منه التسمم بعلف الحيوانات في المواشي والخيول في أستراليا ، وداء العرج في المواشي في جنوب إفريقيا . وهي تنتج ذيفاناً خارجياً فعالاً مقاوماً للهضم الحال للبروتين ، ويقسم إلى أنماط A ،B ،C ألفا و بيتا ، و D ،E ،F ،G على أساس النوعية المناعية للذيفان . يسمى شكلياً العصيات الوشيقية (Bacillus botulinus) .

المطَثِّيَّةُ الزُّبْدِيَّة **Clostridium butyricum**
أنواع تعزل من التربة و البراز ومنتجات الحليب .

المطَثِّيَّةُ الجِيفِيَّة **Clostridium cadaveris**
أنواع تتواجد في البراز والعدوى في الحيوانات

الإنسان والحيوانات في البراز ، هي واحدة من أكثر المطثيات المعزولة شيوعاً في العينات الإكلينيكية .

المطَثِّيَّةُ المُنْتِنَة **Clostridium septicum**

هي أنواعَ مولدة للذيفان توجد بشكل شائع في أمعاء الحيوانات والتربة ، وهي ممرضة بشكل لافت للعديد من الحيوانات المختلفة ، مسببةً حدوث أمراض مثل البردسة و الوذمة الخبيثة . تترافق في الإنسان مع الغنغرينة الغازية في حوالي (20٪) من الحالات فقط . قد تم تمييز ستة مجموعات مناعية لها . تسمى أيضاً الضمة المنتنة (Vibrio septicus) وعصية جون ـ ساش (Ghon - Sachsbacillus) .

المطَثِّيَّةُ السُّورْديلِيَّة **Clostridium sordellii**

أنواع غير محدَدة الإمراضية ، تتواجد مترافقة مع الإصابة بالعدوى في الإنسان والحيوانات .

المطَثِّيَّةُ المُبَوِّغَة **Clostridium sporogenes**

أنواع واسعة التوزع في الطبيعة ، تكون في المزرعة الخالصة مكروبات رمامية غير مؤذية ، تترافق وتوضع بالتقارير مع اللاهوائيات الممرضة في العداوى الغنغريبية .

المطَثِّيَّةُ الثُّلْثِيَّة **Clostridium tertium**

هي أنواعَ تشاهد بشكل واسع التوزع في البراز (القاذير) ومياه المجارير والتربة ، وتترافق مع الغنغرينة الغازية .

المطَثِّيَّةُ الكُزازِيَّة **Clostridium tetani**

تمثل النوع المقيم (المتوطن) الشائع في التربة وأمعاء الإنسان والخيول ، وسبب الكزاز في الإنسان والحيوانات الداجنة (الأليفة) . تشكل الذيفان الخارجي الفعال من مكونتين هما : سم عصبي أو التتانوسبازمين (مادة مشنجة من ذيقان الكزاز) ، والسم الحال للدم أو التتانوليزين (الحالّة الكزازية) . تسمى شكلياً بالعصيات الكزازية (Bacillus tetani) .

المطَثِّيَّةُ الوِلْشِيَّة **Clostridium welchii**

الاسم البَريطاني للمطثيات الحاطمة (Clostridium perfringens) .

المطَثِّيَّةُ السَّامَّةُ لِلخراف **Clostridium ovitoxicus**

اسمَ شكلي للنمط D من المطثيات الحاطمة .

المطَثِّيَّةُ الوَبالِيَّة **Clostridium paludis**

اَسم شكلي للنمط C من المطثيات الحاطمة .

المطَثِّيَّةُ نَظيرَةُ الوَشيقِيَّة **Clostridium parabotulinum**

أنواعَ توجد في التربة و البراز .

المطَثِّيَّةُ الوَشيقِيَّة **Clostridium parabotulinum equi (=Clostridium botulinum)**

انظر تحت Clostridium botulinum .

المطَثِّيَّةُ الباسْتورِيَّة **Clostridium pasteurianump**

مكروباتَ لاهوائية تتواجد في التربة ، والتي كانت الجرثومة الأولى في تثبيت النتروجين لتدريس المزرعة الخالصة (Pure culture) .

المطَثِّيَّةُ الباسْتُورِيَّة **Clostridium pastorianum**

انظر تحتَ Clostridium pasteurianum .

المطَثِّيَّةُ الحاطمَة **Clostridium perfringens**

العامل الإمَراضي الأكثر شيوعاً في الغنغرينة الغازية ، يتم تمييزها على أساس توزع (12) ذيفان مختلف إلى عدة أنماط مختلفة : منها النمط A : يسبب الغنغرينة الغازية ، والتهاب القولون النخري والتسمم الغذائي في الإنسان ، والنمط B : يسبب زحار الخراف ، والنمط C : يسبب التهاب الأمعاء النخري في الإنسان وداء الخبطة في صغار الأنعام ، والنمطD : يسبب تذيفن الدم معوي المنشأ (داء الكلية اللبي) في الماعز ، والنمط E : يسبب تذيفن الدم معوي المنشأ في الخراف والعجول . المطثيات الحاطمة هي أيضاً سبب رئيسي للتسمم الغذائي ، وتسمى أيضاً (Clostridium Welchii) .

المطَثِّيَّةُ المُتَفَرِّعَة **Clostridium ramosum**

أنواع تتواجد في الإصابات بالعدوى في

. (p- chlorobenzenesulfonate)

جُلطة **clot**

1 ـ كتلة شبه جامدة ، مثل الدم أو اللمف ، وتسمى أيضاً (Coagulum) .

2 ـ جلطة دموية .

انظر تحت blood clot .

3 ـ متخثر .

انظر تحت coagulate .

جُلْطَةُ الاحْتضار **agonal clot (=agony clot)**

نمط من الجلطة الدموية التالية للموت التي تتشكل أثناء الاحتضار .

جُلْطَةُ الاحْتضار **agony clot**

نمط من الجَلطة الدموية التالية للموت التي تتشكل أثناء الاحتضار .

جُلْطَةٌ سابقَةٌ للمَوت **antemortem clot**

جلطة دمَوية تتشكل قبل الموت ، لكنها تتواجد بعد الموت في القلب أو في وعاء دموي كبير .

جُلْطَةٌ دَمَوِيَّة **blood clot**

تخثر في المجرى الدموي والذي يتشكل من تكدس العوامل الدموية ، متمثلة بشكل أولي في الصفيحات الدموية والفيبرين مع العناصر الخلوية المتورطة . بعض الأطباء يميز مابين تشكل الخثار والتخثر الدموي البسيط أو تشكل الجلطة . تسمى أيضاً (Cruor) .

جُلْطَةٌ شَبِيْهَةٌ بدُهْن الدَّجاج **chicken fat clot**

جلطة دمَوية ذات مظهر أصفر اللون بسبب التوضع الخارجي للكريات الحمر قبل حدوث التخثر .

جُلْطَةٌ شَبيهَةٌ بهُلام الكِشْمِشَ **currant jelly clot**

جلطة دموية حمراء اللون بسبب وجود الكريات الحمر المتموضعة في شكل شبكة فيها (Enmeshed) .

جُلْطَةٌ قاصيَة **distal clot**

جلطة دمَوية تتشكل في وعاء دموي بعيداً عن مكان الربطة .

غَلَق **closure**

1 ـ غلق .

2 ـ انسداد .

غَلْقٌ أَوَّلِيٌّ آجل **delayed primary closure**

انغلاق الجرح بعد فترة طويلة من حدوثه بسبب تلوثه المعيق لشفائه بفترة قصيرة ، وهو الذي يدعى في فن الجراحة بالشفاء بالمقصد الثالث .

الغَلْقُ النِّهائيُّ للبُوْتَقَة (أسنان) **final flask closure**

الغلق النهائي للبوتقة قبل تصليب المادة السنية الأساسية المكدسة في القالب .

غَلْقُ البُوتَقَة (أسنان) **flask closure**

تقريب شطري أو نصفي البوتقة التي تتشكل منهما المادة السنية الأساسية بعضهما إلى بعض بغرض الإغلاق .

غَلْقٌ تَجْميليّ **plastic closure**

خياطة لأنسجة منزاحة عند مكانها بعد مداخلات لجرها أو تدويرها وإعادتها إلى مكانها الصحيح ، ثم إجراء الخياطة الجراحية بخيوط دقيقة لا تترك أثراً .

غَلْقٌ أَوَّلِيّ **primary closure**

الخياطة على جرح نظيف والذي يشفى بسرعة في الأشخاص الطبيعيين .

الغَلْقُ التَّجْريبيُّ للبُوْتَقَة (أسنان) **trial flask closure**

الغلق التمهيدي للبوتقة ، لطرح المادة الزائدة والتأكد أن القالب مملوء بشكل تام .

غَلْقُ الشِّراعِ والبُلْعوم **velopharyngeal closure**

غلق هروب الهواء الأنفي بواسطة رفع الحنك الرخو ، وتقليص عضلات الجدار الخلفي للبلعوم .


انظر تحت velophryngeal insufficiency .

غَلْقُ الجُرْح **wound closure**

خياطة الجرح بتقريب شفتيه إلى بعضهما .

كلوسيليت **closylate**

من الأسماء المعتمدة في الولايات المتحدة لـ P ـ كلوروبينزين سولفونيت



Blood Clot جلطة دموية

جُلْطَةٌ سَغَليَّة **marantic clot**

جلطة دمَوية تتـشكل بسـبب الدوران الدمـوي الضـعـيف ، أو الفـقـدان الدمـوي العـام أو المواد المفعلة للتخثر المتحررة من السرطانات .

جُلْطَةٌ عَضَلَيَّة **muscle clot**

الجلطة المؤلَّفة من الميوزين مع مادة ملونة حمراء تطابق الهيموجلوبين .

جُلْطَةٌ لافَاعِلَة **passive clot**

جلطة تتشكل في كيس الأنوروزم حيث يتوقف داخلها الدوران الدموي .

جُلْطَةٌ بلازَمية **plasma clot**

تخثر عناصر التجلط في البلازما وتشكل الجلطة

جَلْطَةٌ خارجيَّة **external clot**

جلطة دمَوَيَّة تتشكل خارج الوعاء الدموي.

جُلْطَةٌ قَلْبيَّة **heart clot**

التخثر الدمـوي داخل القلب الذي يحدث تـالياً للموت .

جُلْطَةٌ داخليَّة **internal clot**

جلطة دمَوَيَّة تتشكل داخل الوعاء الدموي .

جُلْطَةٌ صُفَاحيَّة **laminated clot**

(= **جُلْطَةٌ طَبَاقيَّة**) **(=stratified clot)**

جلطة دموية تتَشكل بواسطة الترسب المتتـالي للفـيـبـرين وكـامل الدم ، مـعطيـةً إياها منظر طباقي ، تسمى أيضاً (Stratifed clot) .

المهبل في معالجة داء المبيضات المهبلي .

تجلط **clotting**

انظر تحت coagulation .

زَمَنُ التَّجَلُّط **clotting time**

يسمى أيضاً زمن التخثر ، وهو الزمن الذي يستغرقه الدم أو المصل لتشكل الجلطة الدموية أو البلازمية في أنبوب الاختبار .

تغيُّم **clouding**

فقد الصفاء أو الوضوح .

تَغَيُّمُ الوَعْي **clouding of consciousness**

تناقص مستوى الوعي مع تناقص القدرة على الاستجابة الدقيقة للمنبهات الخارجية ، يسمى أيضاً (Mental fog) ، (Obnubilation) .

انظر تحت levels of consciousness .

ورم ميلانيني بحسب كلودمان **Cloudman's melanoma S91**

[ورم ميلانيني منسوب للعالم آرثر موشر كلودمان (Arthur Mosher Cloudman) ، وهو عالم حيوانات أمريكي ، ولد 1901] .

انظر تحت melanoma .

متلازمة كلاوستون **Clouston's syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب كلاوستون (H.R Clouston) ، وهو طبيب كندي ، عاش في القرن العشرين] . هو خلل التنسج الأديمي الظاهر المتجلي بانعدام التعرق .

1 ـ كَبْشُ القَرَنْفل؛ قرَنفول **clove**

2 ـ فصّ

1 ـ أي من أعضاء في جنس شجرة السيزية العطرية .

2 ـ براعم الزهور المجففة لشجرة السيزية العطرية (القرنفل) ، والذي يستخدم كتوابل عطرية ومنكه ومصدر لزيت القرنفل .

زَيتُ القَرَنْفُول **clove oil**

حافِرٌ مَشْقوق **cloven hoof**

نمط من حوافر أقدام الثدييات يكون فيها الحافر مشطوراً شطرين (أصبعين) ، ومثالها عند الغزلان والخراف والخنازير .

دون أن يحتوي على كريات حمراء .

جُلْطَةٌ تَشْكيلِيَّة **plastic clot**

جلطة تتشكل على الغلالة الباطنة للشريان في نقطة الربطة ، مسببةً انسداد الشريان المستمر .

جُلْطَةٌ تاليَةٌ للمَوت **postmortem clot**

خثرة دموية تتشكل في القلب أو في وعاء دموي كبير بعد الموت .

جُلْطَةٌ دانيَة **proximal clot**

جلطة تتشكل في الوعاء الدموي القريب للربطة .

الجلطة الخفيرة **sentinel clot**

ناشزة منعزلة (متفاصلة) ضمن أقنة (حفرة صغيرة محاطة بحافة مرتفعة) القرحة الهضمية ، عادةً تتواجد مع جلطة مرقئة في الأنورزم الوعائي أو الأنورزم الكاذب . غالباً ما يكون تصبغ الناشزة منذراً بتكرر نزف القرحة .

جُلْطَةٌ شَبِيْهَةٌ بِبَيت العَنْكَبوت **spider-web clot**

خثرةَ الفيبرين الهشة التي تتشكل عندما تترك عينة السائل الدماغي المأخوذة من الشخص المصاب بالتهاب السحايا الدرني لفترة من الزمن ، وخصوصاً عندما يتم تدفئتها إلى الدرجة 37 مئوية لعدة ساعات .

جُلْطَةٌ طِبَاقِيَّة **stratified clot**

انظر تحت laminated clot .

جُلْطَةٌ مَغْسولَة **washed clot**

(= جُلْطَةٌ بَيضاء) **(=white clot)**

الجلطة المغسولة أو الجلطة البيضاء ، هي خثرة دموية تتألف من الفيبرين والصفيحات الدموية انظر أيضاً تحت thrombus .

كلوثيابين **clothiapine**

دَواءٌ مُهَدِّئ .

كلوتريمازول (دَواءٌ مُضادٌ لِلفطريّات) **clotrimazole**

دواء مشتق من الأميدازول والذي يستخدم كعامل مضاد للفطور واسع الطيف ، يطبق موضعياً على الجلد في معالجة داء المبيضات وأشكال مختلفة من السعفات ، ويعطى داخل

السلاميات الانتهائية لأصابع اليدين والقدمين ، وبدون تغيرات عظمية ثابتة ، يشاهد في أنماط متعددة من الأمراض المزمنة للأعضاء الصدرية .

تَعَجُّرُ الكَأس **clubbing of the calix**

صفة شكل المضرب التي تأخذها الكأس التي تصب في الحويضة الكلوية .

تَعَجُّرُ الأصابع **clubbing of the fingers**

انظر تحت clubbing .

حَنَفُ القَدَم **clubfoot**

انظر تحت talipes .

حَنَفُ اليَد **clubhand**

تشوه اليد الناتج عن الغياب الخلقي لعظم الكعبرة أو الزند حيث تنحرف اليد في الشكل أو الوضعية . تسمى أيضاً (Talipomanus) .

حنف اليد الكعبري **radial clubhand**

هو النمط الأكثر شيوعاً لحنف اليد ، حيث تنحرف اليد باتجاه الناحية الكعبرية ، وعندما توضع اليد في الوضعية التشريحية تعرف باليد الروحاء ، وعندما توضع بالاتجاه المعاكس تعرف باليد الفحجاء . تسمى أيضاً (Manus valga) .

انظر تحت madelung deformity .

حنف اليد الزندي **ulnar clubhand**

هو حنف اليد بحيث تنحرف اليد تجاه الناحية الزندية ، وعندما توضع اليد في الوضعية التشريحية تعرف باليد الفحجاء ، وعندما توضع في الاتجاه المعاكس تعرف باليد الروحاء . تسمى أيضاً (Manus vara) .

لَزْنَة (جراثيم متكدسة) **clump**

تكدس مثل تكدس الجراثيم المتسبب عن فعل الراصات (التراص) .

تلازُن (تكدس الجراثيم) **clumping**

تكدس الجسيمات ، مثل الجراثيم في كتل غير منتظمة .

ألْوِيّ **cluneal**

انظر تحت gluteal .

برسيم **clover**

1 ـ أي عضو من جنس ثلاثية الورقة ، تسمى أيضاً ثلاثية الرقاقة (Trefoil) .

2 ـ أي من الأعضاء المختلفة لعائلة البازلاء ، مثل جنس المليساء (Melitotus) .

برسيم حلو **sweet clover**

البرسيم الحلو ، أي عضو من جنس المليساء .

انظر تحت sweet clover disease .

جُمْجُمَة شَبِيْهَة بورَق البَرْسيم **clover leaf skull**

يسمى أيضاً (Kleeblattsch) ، وتعظم الدروز الباكر (Craniosynostosis) ، (Craniostosis) وهو تكلس باكر في دروز الجمجمة تسبب ظهورها في الأشعة كخطوط شبيهة بورق البرسيم ، وقد تترافق بتشوهات في الجمجمة أو استسقائها في بدايات التكلس والإطراق ونقص تكون القسم السفلي من الوجه .

تَهْريج **clownism**

عرض عاطفي شاذ يظهر في بعض الحالات الهستريائية الصرعية .

كلوكساسيلين (مُضادٌ حَيَوِيّ) **cloxacillin**

هو بنسلين شبه تخليقي مقاوم للبنسليناز ، يستخدم بشكل أولي في معالجة العدوى بالمكورات العنقودية المنتجة للبنسليناز ، يعطى فموياً .

كلوكسيكين **cloxyquin**

مُضادٌّ حيوي ضد الجَراثيم .

كلوزابين (دَواءٌ مُهَدِئ) **clozapine**

عامل مهدئ ومضاد للذهان ، من الديبنزوديازبين ، والذي يستخدم في معالجة الفصام .

مُعجَّر **clubbed**

صفة تطلق على الأصابع العريضة النهايات مع تقبب الأظافر لتكون كل أصبع كالمضرب . بينما تطلق أيضاً كصفة للقضيب المنحني أثناء انتصابه لأحد الجانبين أو الصفن .

تعَجُّر **clubbing**

تشوه ناتج عن تكاثر النسيج الرخو حول

جيد كما يحدث في الأمراض التنكسية مثل داء آلزهايمر وداء الراعوش (التهاب دماغي في الماشية) . يسمى أيضاً (SP -40,40) .

clustering **تَعَنْقد**

كلام عصبي سريع يتميز بنقص تقطع الكلام ، عادةً ما يشاهد في الأطفال .

clutch **مِقْبَض**

القبضة أو حالة اليد وهي مقبوضة وكأنها تمسك بشيء بقوة ، وتستعمل كفعل يدل على القبض .

dental clutch **مِقْبَضٌ سِنِّيّ**

ما يمسك به طبيب الأسنان من أدوات لها قبضات .

clutch point **نقطة القَبْض**

مكان تشديد القبضة .

cluttering **هَذْرَمَة**

كلام عصبي سريع يتميز بنقص تقطع الكلام ، عادةً ما يشاهد في الأطفال .

Clutton's joint **مفصل كلوتون**

[مفصل منسوب للجراح ، هنري هوج كلوتون (Henry Hugh Clutton) ، وهو جراح انجليزي 1850-1909] موه المفصل المتناظر اللاموئلم ، وخاصة مفصل الركبة ، يشاهد غالباً في الزهري الخلقي .

انظر تحت joint .

clysis **1ـ غَسْلُ الجَوف**

2ـ سائلُ الحَقْن (السَّائلُ المستخدَمُ في الحقن أو في الغسل)

3ـ سائلُ الغَسْل

4ـ حَقْنُ السَّوائِل (للجسم)

1ـ إعطاء العديد من المحاليل المختلفة بأي طريق آخر غير الطريق الفموي لإعاضة الجسم من السوائل المفقودة أو لتزويده بالمغذيات أو لرفع الضغط الدموي .

2ـ المحاليل المعطاة حقناً .

clysma **حُقْنَة شَرَجِيَّة**

(=enema)

clunes (sing.clunis) **1ـ أليات (ف: ألية)**

2ـ الأليَتان (ف: ألية)

clunial **ألوي**

تعبير يستخدم بشكل خاص للأعصاب الألوية (Nervi clunium) .

clunis **ألية**

(pl.clunes) **(ث: أليتان؛ ج: أليات)**

انظر تحت nates .

clupanodonic acid **حَمْضُ الكلوبانودُونيك**

(حمض شحمي لامشبع)

حمض شحمي يحتوي على 22 كربون ، ويحتوي أيضاً على خمسة روابط مضاعفة قد تم عزلها من زيت السمك ، ولكن يمكن أن يكون خطأ أو خادعة خلال عمليات العزل .

clupeine **كلوبئين (مادة من مني الأسماك)**

بروتامين يستحصل عليه من مني أسماك الرنكة .

cluster **عُنْقود**

كل تجمع يأخذ شكلاً متناقصاً شبيه بعنقود العنب .

cluster headache **صُداعٌ عُنْقودِيّ**

يسمى أيضاً (Histaminic cephalalgia) ، (Histamine cephalgia) ، (Histaminic headache) ، (Horton's cephalalgia) ، (Horton's headache) ، (Vasculosympathetic facial pain) ويعتبره البعض من أشكال الشقيقة ، ويسمى أيضاً الألم العصبي الشقيقي (Migrainous neuralgia) ، ويشيع عند الذكور أكثر من الإناث .

clusterin **كلوسترين**

بروتين سكري متعدد الوظائف له دور في استقلاب ونقل شحميات الدم ، وشدف الغشاء الخلوي ، و إفراز الهرمونات ، والتناسل الحيوي والتثبيط التجمعي لمقعد هجمات المتممة المفعلة للغشاء الخلوي ، وبرمجة الموت الخلوي وتعديل التفاعلات داخل خلوية . يعبر عنه في الأذية النسجية وإعادة ترميمها بشكل

1 ـ يتعلق أو يعود إلى شعبة القراصات .
2 ـ فرد من شعبة القراصات .
انظر تحت coelenterate .

Cnidian **الإقنيديَّة (مَدْرَسَة إغريقيَّة في المعالجَة)**
يتعلق بأقنيدوس ، وهي مدينة إغريقية تقع على الساحل الآسيوي الجنوبي الغربي الصغير ، واشتهرت بوجود هيكل الشفاء فيها ومدرستها الطبية ومكتباتها . اجتهدت هذه المدرسة في تشخيص وتصنيف الأمراض (وخصوصاً الإمراضيات) إلى حد تجاهل المرضى .

cnidoblast **أرومَة القارصَة**
هي الخلايا البشروية للمجوفيات ، والتي تحتوي على الكيسات الخيطية ، خصوصاً على اللوامس الكثيرة .

cnidocil **هُدبٌ قارص**
أهداب مثل الشعر الغليظ في نهاية واحدة من أرومة القارصة ، والتي عندما تنبه تحرض طرح (إفراز) الكيسة الخيطية .

cnidospora **دقيقات البوغ القراصي**
هي دقيقات الأبواغ (شعيبة من الحيوانات الأوالي) .
انظر تحت microspora .

cnidosporidia **مكرويات الأبواغ القراصية**
هي مكرويات الأبواغ ، والتي هي رتبة من ديقيقات الأبواغ .
انظر تحت microsporida .

CO **رمز أحاديّ أكسيد الكَرْبون**

Co **رمز الكوبالت (كو؛ Co)**
رمز معدن الكوبالت (Cobalt) ، ورقمه الذري (27) ، ووزنه الذري (58.93) ويدخل في تركيب الفيتامين B_{12} ، كما يدخل في تركيب بعض الأصبغة مثل زرقة الكوبالت .

co- **سابقة بمعنى الاشْتِراك**

CO_2 **رمز ثنائيّ أكسيد الكَرْبون**
رمز كيميائي لغاز ثنائي أكسيد الكربون المؤلف من ذرة كربون مع ذرتي أكسجين ، وهو ناتج طبيعي في الجسم لاستقلاب الأغذية ويطرح

انظر تحت enema .

clysodrast **كليسودراست**
الاسم التجاري لمستحضر البيساكوديل تانكس (Bisacodyl tannex) ، وهو دواء ملين مضاد للإمساك .

clyster **حُقْنَة شَرْجيَّة**
(=enema)
انظر تحت enema .

clysterize **يُعالِجُ بالحُقْنَةِ الشَّرجيَّة**

clytocybine **كليتوسيبين**
(=clitocybine)
مضاد حيوي .

cnemial **متعلق بحرْفِ الظُّنْبوب**
انظر تحت tibial .

Cnemidocoptes **قرادُ السيقان**
(جِنْسٌ مِنْ قرادِ الطيور)
(=Knemidokoptes)
انظر تحت Knemidokoptes .

cnemis **1 ـ حَرْفُ الظُّنْبوبِ**
2 ـ الظُّنْبوب
3 ـ السَّاق
انظر تحت tibia .

cnemitis **التِهابُ الظُّنْبوب**

cnemoscoliosis **جَنَفُ السَّاق**
انحناء جانبي للساق .

cnid (o)- **قراص**
صيغة اتحادية تشير إلى العلاقة مع القراص (جنس نبات عشبي من الفصيلة القراصية) أو بنية شبيه بالقراص .

Cnidaria **القرَّاصات (شُعْبَة مِنَ اللافقاريَّات البَحْرِيَّة)**
شعبة من اللافقاريات البحرية التي تتضمن شقائق النعمان والعدار والمرجان والأسماك الهلامية (كل الأشكال المذكورة قد حددت في شعبة المجوفيات) ، بالإضافة إلى الهلاميات المشطية أو جوز البحر ، والتي تتميز بجسم شعاعي متناظر يحمل اللوامس حول الفم .

cnidarian **متعلق بالقرَّاصَات**

الحالة القابلة للخثار .

خثور **coagulable**

قادر على التحول إلى جلطات .

مُخثر **coagulant**

1 ـ محرض أو مسرع أو جاعل تخثر الدم ممكناً .

2 ـ عامل يحرض أو يسرع تخثر الدم .

المخثرة **coagulase**

إنزيم جرثومي يتفاعل مع عامل تميم يتواجد في بلازما الدم لتحفيز تشكل الفبرين من الفبرينوجين . ينتج من قبل المكورات العنقودية الذهبية واليرسنية الطاعونية .

1 ـ يتخثّر **coagulate**

2 ـ يُخثّر

يخضع للتخثر ، ويسمى أيضاً (Clot) .

انظر تحت clot .

1 ـ تخثُّر **coagulation**

2 ـ تخثيرٌ

1 ـ في الكيمياء الغروانية : تصلب الحلالة (Sol) إلى كتلة هلامية ، وهو بديل للطور المتغير أو الصلب الذائب والذي يسبب فصل النظام إلى الطور سائل وكتلة غير ذائبة تسمى الجلطة ، وهو عادة غير عكوس ، ويسمى أيضاً (Clotling) .

2 ـ انظر تحت blood clot .

3 ـ في الجراحة : انفتاح أو تمزق النسيج بواسطة وسائل فيزيائية لتكون ثمالة عديمة الشكل ، كما يحدث في التخثر الكهربي والتخثر الضوئي .

تَخثُّرُ الدَّم **blood coagulation**

سلسلة من العمليات المتعاقبة التي تتفاعل فيها عوامل تخثر الدم المتعددة في شلال التخثر ؛ لينتج عنها في النهاية تشكل جلطة الفبرين غير المنحلة .

انظر تحت pathways of coagulation .

زَمَنُ التَّخثُّر **coagulation time**

الزمن الذي يستغرقه تحول الدم من شكله السائل إلى مادة متجلطة لا تتحرك في الأنبوب .

عن طريق التنفس بالتبادل الغازي عبر الأسناخ الرئوية مع الأكسجين .

تميم الإنزيم الناقل **CoA - transferase**

واحد من تحت ـ تحت زمرة الإنزيمات الناقلة التي تحفز نقل تميم الإنزيم A من جزيء لآخر .

قوصرة **coacervate**

الطور اللزج الذي يتم فيه فصل الجهاز الحاوي على المواد الغروية في ظاهرة القوصرة (فصل المواد الغروية عن الماء) .

تقوْصُر (فصل المواد الغروية عن الماء) **coacervation**

فصل مزيج من سائلين واحد منهما أو كلاهما سائل غرواني في طورين ، الأول (القوصرة) ، حيث يحتوي على الجسيمات الغروانية ، والثاني يبدأ في المحاليل المائية . مثال : عندما يضاف الصمغ العربي إلى الجلاتين .

كواكتين **coactin**

الاسم التجاري لمستحضر الأمدينوسيلين (Amdinocillin) ، والذي هو بنسلين شبه تخليقي فعال ضد عدد من الجراثيم سلبية الجرام ، ويستخدم في علاج التهاب السبيل البولي .

مُلاءمَة مُتبادَلة **coadaptation**

التغيرات التنافعية والتبادلية والتكيفية في عضوين معتمدين على بعضهما البعض .

اتحادٌ تكتُّلِيٌّ **coadunation**

اتحاد مادتين غير متشابهتان في كتلة واحدة .

اتحادٌ تكتُّليٌّ **coadunition**

اتحاد مادتين غير متشابهتان في كتلة واحدة .

تراصٌ مُشترَك **coagglutination**

تكدس المركبات المستضدية الجسيمية مع راصات أكثر من نوعية واحدة .

خَثَرات **coagula**

(ف: خَثَرة) **(sing.coagulum)**

ناتج انقلاب المائع إلى جامد بالتخثر أو التجلط عندما تتوفر شروطه المناسبة ، كتخثر الدم عندما يخرج من الأوعية الدموية .

خَثوريّة **coagulability**

(syndrome في التهاب السحايا و النخاع الشوكي أو ورم الحبل الشوكي .

مُخثِّر **coagulative**
مرافق للتخثر أو محرض لعمليات التخثر ، أو من طبيعة تخثرية .

مِخْثار **coagulator**
جهاز تخثير الأوعية ويستخدم في قطعها ، ومنه كهربائي وضوئي .

مُخطَّط التَّخثُّر **coagulogram**
مصطلح عامي يستخدم في طب الدم الإكلينيكي ، للإشارة إلى سلسلة الاختبارات المخبرية التي تقيس مشعرات مختلفة للإرقاء الدموي .

اعْتِلالٌ خَثْريّ **coagulopathy**
أي اضطراب في التخثر .

اعْتلالٌ خَثْري اسْتهْلاكيّ **consumption coagulopathy**
التخَثر الدَموي داخل الأوعية المنتشر .
انظر تحت diffuse intravascular coagulation .

خَثْرَة **coagulum**
(ج: خَثَرات) **(pl.coagula)**

الخَثْرَة المُسِدَّة **closing coagulum**
انظر تحت schlusskoagulum .

التِحام **coalescence**
التحام أو اندماج الأجزاء .

اندماج **coalition**
التحام الأجزاء المنفصلة بشكل طبيعي .

اندماج عقبي كعبي **calcaneocuboid coalition**
اندماج رصغي غير متناظر غالباً يصيب العقب والعظم الكعبي .

اندماج عقبي زورقي **calcaneonavicular coalition**
واحد من أشيع أنماط الالتحام الرصغي ، والذي يكتنف عظم العقب والعظم الزورقي .

اندماج كعبي زورقي **cubonavicular coalition**

التَّخَثُّرُ المُنْتَشِرُ داخلَ الأوعَيَة **diffuse intravascular coagulation**
يسمى أيضاً (Disseminated intravascular coagulation) ، ويختصر (DIC) ، وهو متلازمة نزفية تحدث عندما تتفعل عناصر تخثير الدم أو الإنزيمات الحالة للفبرين في آن واحد داخل الأوعية الدموية الصغيرة ؛ فيترسب الفبرين وتستهلك الصفيحات وتقوم نواتج تفكك الفبرين بتثبيط التبلمر المتعدد للفبرين .

التَّخَثُّرُ المُنْتَشِرُ داخلَ الأوْعِيَة **disseminated intravascular coagulation**
هو التَخثر داخل الأوعية المنتشر ، وهو اضطراب نزفي يتميز بتناقص شاذ في العناصر المتورطة في التخثر الدموي الناتج عن استخدامها الواسع في التخثر داخل الأوعية . يمكن أن يسببها العديد من الاضطرابات ، في المراحل المتأخرة يلاحظ حدوث النزوف الغزيرة . يسمى أيضاً بالاعتلال التخثري المستهلك (Consumption coagulopathy) ومتلازمة إزالة الفبرين ومتلازمة التخثر داخل الأوعية المنتشر.

تَخَثُّرٌ كَهْرَبيّ **electric coagulation**
(=electrocoagulation)
انظر تحت electrocoagulation .

تَخْثيرٌ بالأشعَّة تَحْتَ الحَمْراء **infrared coagulation**
استخدام الأشعة تحت الحمراء في تخثير الأوعية ، وتستخدم في معالجة البواسير ورقء النزف ، وغير ذلك .

تَخَثُّرٌ داخل الأوعيَة **intravascular coagulation**
حدوث التخثر الدموي ضمن الأوعية الدموية .
انظر تحت diffuse intravascular coagulation .

تَخَثُّرٌ جَسيم **massive coagulation**
هو تخثر السائل الدماغي الشوكي ليشكل جلطة صلبة تقريباً ، وهي حالة تشاهد في بعض حالات متلازمة فروين (Froin's

شكل يتميز بتضيق موضع في ، أو تحت مدخل القناة الشريانية ، أو بعيداً عن برزخ الأورطي والشريان تحت الترقوة الأيسر ، مع قناة مغلقة (Closed ductus) وغياب للزرقة (Cyanosis) .

تَضيُّقُ الأورطي **coarctation of aorta**

تشوه موضع يتميز بتشوه الطبقة المتوسطة للأورطي ، مسبباً تضيقاً شديداً عادةً وخيم ، لتجويف الوعاء الدموي .

تَضيُّقُ الأورطي مِنْ نَمَط الأطْفال **infantile type coarctation of aorta**

شكل عادةً ما يشاهد في الأطفال ، يتميز بالزراق ، والإصابة التي تشمل برزخ الأورطي ، ويترافق مع تشوهات أخرى مثل بقاء القناة الشريانية مفتوحة .

تَضيُّقُ الأورطي التَّالي للقَناة **postductal coarctation**

تضيَق خلقي في الأورطي يحدث بعد مستوى القناة الشريانية التي تصل بين الشريان الرئوي والأورطي في الحياة الجنينية .

تَضيُّقُ الأورطي السَّابقُ للقَناة **preductal coarctation**

تضيقَ خلقي في الأورطي يحدث قبل مستوى القناة الشريانية التي تصل بين الشريان الرئوي والأورطي في الحياة الجنينية .

تَضيُّقُ الأورطي المَعْكوس **reversed coarctation**

انظر تحت Takayasu's arterities .

اسْتِئْصالُ التَّضَيُّق **coarctotomy**

عمل جراحي وعائي لاستئصال التضيق الأورطي غالباً .

خَشِن ؛ غَليظ **coarse**

ليس ناعم ، وليس دقيق .

مَفْصِلٌ لِيفِيّ **coarticulation**
(=articulatio fibrosa TA)

انظر تحت articulatio fibrosa TA .

غِلالَة (ج: غَلائِل) **coat**
(=tunica)

اندماج رصغي يكتنف العظم الكعبي والعظم الزورقي .

اندماج زورقي اسفيني **naviculocuneiform coalition**

اندماج رصغي يكتنف العظم الزورقي والعظم الإسفيني .

اندماج كاحلي عقبي **talocalcaneal coalition**

واحد من أشيع أنماط الالتحام الرصغي ، يكتنف العظم الكاحلي والعقبي .

اندماج كاحلي زورقي **talonavicular coalition**

اندماج رصغي يكتنف الكاحل والعظم الزورقي .

الاندماج الرصغي **tarsal coalition**

الالتحام الليفي أو الغضروفي أو العظمي لإثنين أو أكثر من عظام الرصغ ، غالباً ما ينتج عنه الحنف الرححي الروحي ، وعلى الرغم من التشوهات الأخرى التي قد تحدث فإن بعض المرضى يكونون لا إعراضيين . يمكن أن يكون خلقياً أو مكتسباً كاستجابة للرضح ، أو للعدوى ، أو للأمراض المفصلية . يسمى أيضاً بالعارضة أو الجسر الرصغي .

يُلَئِّم (يُقرِبُ الحَوافَ) **coapt**

يقرب حواف الجرح ، أو يقرب نهايات العظم المكسور .

تلئيم **coaptation**

التقريب المناسب والمنسجم بين شفتي جرح أو حافتي عظم مكسور .

1 ـ يُضَيِّقُ **coarctate**
2 ـ مُتَضيِّق

1 ـ يضيق أو يقلص .
2 ـ يضغط معاً أو يحصر .

تَضَيُّق **coarctation**

انظر تحت stenosis .

تَضيُّقُ الأورطي مِنْ نَمَط البالغين **adult type coarctation of aorta**

طبقة رقيقة صفراء اللون من الكريات البيض تكسو الكريات الحمر المكدسة في الدم المثفل . يسمى أيضاً رغوة الكريات البيض (Leukocytic cream) .

غلاَلَةُ القَرْنيَّة والصُّلْبَة **corneoscleral coat**

هي الطبقَةَ الخارجية لكرة العين ، والتي تضم الصلبة والقرنية . وهي تعلو الطبقة العنبية مباشرة والتي تتضمن المشيمية والجسم الهدبي والقزحية .

الغلاَلَةُ المُشَمِّرِيَّةُ للخُصْيَة **cremasteric coat of testis**

انظر تحت musculus cremaster .

1 ـ انظر تحت tunica .

2 ـ الطبقة أو الطبقات المصنوعة من البروتين الواقي المحيط بالحمض النووي في الفيروس .

الغلاَلة البَرَّانيَّة **adventitial coat**

اَنظر تحت tunica adventitia .

غلاَلَةُ البوق البَرَّانيَّة **adventitious coat of uterine tube**


هو النسيج تحت المصلية للبوق .

انظر تحت tela subserosa tubae uterinae .

الغلاَلَةُ البَيضاء **albugineous coat**

اَنظر تحت tunica .

الغلاَلَةُ الشَّهْباء **buffy coat**



Coagulation **التخثر**

هي القراب الجريبي .
انظر تحت theca folliculi .

fibrous coat of testis **الغلاَلَةُ اللِّيفيَّةُ للخُصْيَة**
اَنظر تحت tunica albuginea testis .

inner coat of vessels **الغلالة الداخلية للأوعية**
انظر تحت tunica intima vasorum .

internal coat of capsule of graafian follicle **الغلاَلَةُ الغائرَةُ لَمحْفَظَة جُرَيب جرافْ**
اَنظر تحَت tunica interna thecae folliculi .

internal coat of pharynx of Luschka **الغلاَلَةُ الغائرَةُ للبُلْعوم بَحسب لوَشكا**

middle coat of vessels **الغلالة المتوسطة للأوعية**
انظر تحت tunica media vasorum .

mucous coat **غلاَلَةٌ مُخاطيَّة**
اَنظر تحت tunica mucosa .

mucous coat of tympanic cavity **الغلالة المخاطية لجوف الطبل**
انظر تحت tunica mucosa cavitatis tympani-cae .

muscular coat **غلاَلَةٌ عَضلَيَّة**
اَنظر تحت tunica muscularis .

outer coat of vessels **الغلالة الخارجية للأوعية**
انظر تحت tunica externa vasorum .

pharyngobasilar coat **الغلاَلَةُ البُلْعوميَّةُ القَاعديَّة**
انظر تحَت fascia pharyngobasilaris .

proper coat **الغلالة المخصوصية**
انظر تحت tunica propria .

proper coat of corium (=stratum reticulares corii) **الغلاَلَةُ المَخْصوصَةُ للأَدَمَة (= الطَّبَقَةُ الشَّبكيَّةُ للأَدَمَة)**
اَنظر تحت stratum reticulare dermidis .

proper coat of pharynx **الغلاَلَةُ المَخْصوصَةُ لَلبُلْعوم**

dartos coat (=tunica dartos) **الغلاَلَةُ السِّلْخيَّة**
انظر تحت tunic dartos .

dry coat **الغلالة الجافة**
انظر تحت anhidrosis .

external coat of capsule of graafian follicle **الغلاَلَةُ الظَّاهرَةُ لَمحْفَظَة جُرَيب جرافْ**
اَنظر تحَت tunica externa thecae folliculi .

external coat of esophagus **الغلاَلَةُ الظَّاهرَةُ لَلمَريء**
انظر تحت tunica adventitia oesophagi .

external coat of ureter **الغلاَلَةُ الظَّاهرَةُ لَلحالب**
انظر تحت tunica adventitia ureteris .

external coat of vessels **الغلاَلَةُ الظَّاهرَةُ لَلأَوْعيَة**
انظر تحَت tunica externa vasorum .

external coat of viscera **الغلاَلَةُ الظَّاهرَةُ لَلأَحْشاء**
هي الغلالة البرانية .
انظر تحت tunica adventitia .

extraneous coat **الغلاَلَةُ الخارجيَّةُ لَلخلاَيا**
هي بنية يشبه الملاط والذي يؤلف الجدار الخلوي المرئي ، في بعض الخلايا الحيوانية ، وهو عادة لا يلعب دوراً في النفــوذية ، ولكن له وظائف أخرى هامة .

fibrous coat **غلاَلَةٌ ليفيَّة**
اَنظر تحَت tunica fibrosa .

fibrous coat of corpus cavernosum of penis **الغلاَلَةُ اللِّيفيَّةُ للجسْم الكَهْفيِّ لَلقَضيب**
انظر تحت tunica albuginea corporum caver-nosorum .

fibrous coat of eye **الغلاَلَةُ اللِّيفيَّةُ للعيَن**
هَي الغلالَةَ الليفية البصلية .
انظر تحت tunica fibrosa bulbi .

fibrous coat of ovary **الغلاَلَةُ اللِّيفيَّةُ للمَبيض**

انظر تحت uvea .

الغلاَلَةُ الوِعائيَّةُ لَلبُلْعومَ **vascular coat of pharynx**

تعبير قديم للدلالة على الطبقة الوعائية (غالباً من فروع الشريان السباتي) التي تقوم على إمداد البلعوم بالدم والتروية الجيدة .

الغلاَلَةُ الوِعائيَّةُ لَلمَعِدَةَ **vascular coat of stomach**

انظر تحت tela submucosa ventriculi .

الغلاَلَةُ الوِعائيَّةُ لَلأَحْشاءَ **vascular coat of viscera**

انظر تحت tela submucosa .

الغلاَلَةُ الزُّغابيَّةُ لَلأَمْعاء الدَّقيقة **villous coat of small intestine**

انظر تحت tunica mucosa intestine tenuis .

الغلاَلَةُ البَيضاء **white coat (=tunica albuginea)**

انظر تحت tunica albuginea .

لِسانٌ مُطلِيّ **coated tongue**

يسمى أيضاً (Furred tongue) ، ويراد بها طبقة بيضاء فوق ظهر اللسان تتألف من نفايات هضمية تسوفات خلوية ، وكثيراً ما تحدث مع سرعة تناول الطعام دون مضغه والاضطرابات الهضمية والحمى ، والتهابات البلعوم واللوزتين .

داء كوتس، التهاب الشبكية بحسب كوتس **Coats' disease , retinitis**

[داء أو التهاب الشبكية المنسوب للطبيب ، جورج كوتس *(George Coats)* ، وهو طبيب عيون إنجليزي *1876-1915]* .

انظر تحت exudative retinopathy .

مُتَشَارِكٌ في المِحور **coaxial**

يطلق على أنبوبين يحتضن (يحتوي) أحدهما الآخر بحيث يكون أحدهما داخل الآخر .

ناقل الأدينوزيل كوبالامين(I) **cob (I) alamin adenosyltransferase**

إنزيم متقدري من صنف النواقل التي تحفز نقل

تسمى أيضاً النَّسيجَةُ البُلْعوميَّةُ تَحْتَ المُخاطيَّة (Tela submucosa pharyngis)، (Fascia pharyngobasilaris)، (Aponeurosis pharyngea)، وهي غلالة ليفية من الجدار البلعومي يتوضع بين الطبقتين البلعوميتين المخاطية والعضلية وترتكز في الأعلى على القسم القاعدي .

انظر تحت aponeurosis pharyngea .

الغلاَلَةُ المَخْصُوصَةُ لَلخُصْيَة **proper coat of testis**

(= الغلاَلَةُ البَيضاءُ لَلخُصْيَة) **(=tunica albuginea testis)**

انظر تحت tunica albuginea testis .

الصُّلْبَة **sclerotic coat (=the sclera)**

انظر تحت sclera .

الغلاَلَةُ المَصْليَّة **serous coat (=tunica serosa)**

انظر تحت tunica serosa .

الغلاَلَةُ تَحْتَ البِطانَة **subendothelial coat**

طَبقة من النسيج الضام والأرومات الليفية تقع تحت بطانة الأوعية الدموية والعضلة القلبية .

الغلاَلَةُ تَحْتَ المُخاطيَّة **submucous coat**

انظر تحت tela submucosa .

الغلاَلَةُ تَحْتَ المَصْليَّة **subserous coat**

انظر تحت tela subserosa .

الغلاَلَةُ العِنَبيَّة **uveal coat**

(= الغلاَلَةُ الوِعائيَّةُ لَلمُقْلَة) **(=tunica vasculosa bulbi)**

انظر تحت tunica vasculosa bulbi .

انظر تحت uvea .

الغلاَلَةُ الغِمْديَّةُ لَلخُصْيَة **vaginal coat of testis**

(=tunica vaginalis testis)

الغلالة الغمدية للخصية .

انظر تحت tunica vaginalis testis .

الغلالة الوعائية لمقلة العين **vascular coat of eyeball**

الفيزيولوجية الرئيسية تكمن بشكل محتمل كونه مكون للڤيتامين B_{12} .

الكوبالت 57 **cobalt 57**

نظير مشع للكوبالت ، كتلته الذرية (57) ، عمر النصف (271.77) يوم ، ويتلاشى على شكل إلكترون ملتقط و أشعة جاما (طاقة 0.122 ميجافولط إلكتروني) ، يستخدم لوسم الڤيتامين B_{12} من أجل اختبار شيلينغ ، واختبارات سوء الامتصاص المعوية الأخرى .

الكوبالت 58 **cobalt 58**

نظير مشع للكوبالت ، كتلته الذرية (58) ، عمر النصف (71.92) يوم ، ويتلاشى على شكل إلكترون ملتقط و بوزيترون (بطاقة 0.48 ميجافولط إلكتروني) وأشعة جاما (بطاقة 0.811 ميجافولط إليكتروني) . يستخدم مع الكوبالت ^{57}Co في اختبار الامتصاص المعوي لڤيتامين B_{12} .

الكوبالت 60 **cobalt 60**

نظير مشع للكوبالت ، كتلته الذرية 60 ، عمر النصف (5.27) سنوات ، ويصدر جسيمات بيتا (بطاقة 0.318 ، 1.48 ميجافولط إلكتروني) وأشعة جاما (بطاقة 1.173 ، 1.332 ميجافولط إلكتروني) . يستخدم كمصدر للإشعاع في معالجة الخباثات . وقد استخدم أيضاً لوسم الڤيتامين B_{12} من أجل اختبار شيلينغ واختبارات سوء الامتصاص المعوية الأخرى .

قُلَّةُ الكُوبالت **cobalt bomb**

من أنواع القنابل النووية المرتكزة على الكوبالت 60 ، والتي يعتقد أنه باستطاعتها تدمير كامل الكرة الأرضية بسرعة مذهلة .

شُعْبَةُ المُعالجَة بالكُوبالت **cobalt therapy service**

قسم من أقسام المعالجة في الطب النووي الذي يستخدم النظائر المشعة للكوبالت .

سُحارٌ كوبالتِيّ **cobaltosis**

تغبر الرئة الناتج عن استنشاق الغبار الكوبالتي ، والتفاعل النسجي الناتج عن ذلك .

مجموعة الأدينوزيل لـلكوبالامين من ثلاثي فسفات الأدينوزين ، مشكلاً تميم إنزيم الأدينوزيل كوبالامين . يورث عوز هذا الإنزيم كخلة جسمية متنحية ، و يؤدي هذا العوز إلى فقد فعالية إنزيم الموتاز ميثيل مالونيل التيم A ، وينتج عنه احمضاض الدم الميثيلمالونيكي .

كوبالامين **cobalamin**

1 ـ تسمية كيمائية لمركب يشكل بديل لحلقة الكورين ، والنوكليوتيد المحتوي على 5 ، 6- ثنائي ميثيل بنزيميدازول والذي يميز الڤيتامين B_{12} لكنه يفتقر اللجين في الموضع السادس من الكوبالت .

2 ـ مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى المشتق البديل لهذا المركب و يتضمن السيانوكوبالامين ، خصوصاً المركب مع فعالية الڤيتامين B_{12} .

مختزلة الكوبالامين **cobalamin reductase**

واحد من اثنين من إنزيم مختزل متقدري يحفز خطوات تخليق الأدينوزيل كوبالامين من الهيدروكسوبالامين ، عوز أحدهما أو كلاهما سبب مؤكد لحدوث احمضاض الدم الميثيلمالونيكي .

كوبالوفيلين **cobalophilin**

انظر تحت R protien .

كوبالت (العُنْصُرُ السابع والعشرون) **cobalt**

معدن ، عدده الذري (27) ، وزنه الجزيئي (58.933) ، رمزه (Co) ، هو المعدن الذي يستخدم في الخليطة الممغنطة ، والمركبات الصباغية المتيسرة . يمكن أن يسبب إن استنشاق الغبار السحار الكوبالتي والتعرض للبودرة (المسحوق) يمكن أن يتسبب بالتهاب الجلد . يؤدي عوز هذا العنصر في الحيوانات إلى فقر الدم . والزيادة في المتطلبات الغذائية الطبيعية منه قد يؤدي إلى كثرة الكريات الحمر . في الإنسان وعلى الرغم من كون الكوبالت قد استخدم مع تأثيرات عابرة محدودة لمعالجة فقر الدم في العدوى والداء الكلوي ، إلا أن وظيفته

هي الكوبرا ذات الرأس ، أنواع توجـــد في جنوب أفريقيا .

الصل الناشر المصري **Egyptian copra**

الكوبرا المصرية ، أنواع تتواجد عبر أفريقيا والجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية .

الصِّلُّ النَّاشِرُ الهِنْدِيُّ **Indian cobra**

كوبرا صفرَاء إلَى بَنية غامقة اللون مع واصمات سوداء و بيضاء اللون تشبه زوجاً من النظارات على داخونتها . وهي تبلغ أحياناً طولاً يصل إلى 6 أقدام تسمى أيضاً (Naja naja) .

انظر تحت Naja naja .

الصِّلُّ النَّاشِرُ السُّلْطانِيُّ **king cobra**

ملك الكوبَرا ، وهي كوبرا كبيرة الحجم تتواجد من الهند إلى الفليبين ، والتي يمكن أن يصل طولها حتى 3.6 متر .

الصل الناشر الموزامبيقي **Mozambique cobra**

الكوبرا الموزامبيقية ، نمط من الكوبرا الباصقة تتواجد في جنوب شرق آسيا .

الصِّلُّ النَّاشِرُ الباصق **spitting cobra**

أي من أنواَع الكوبَرا المختلفة التي تملك قناة سم مفتوحة على طول الأنياب ، حيث تستطيع الأفعى أن تقذف رذاذاً ناعماً من السم (بصق) على طول امتداد عدة أمتار . فإذا دخل السم العيون فإنه يسبب حدوث تهيج شديد في العين وإصابة عدوائية ثانوية يمكن أن تقود إلى العمى . هذه المجموعة منها الكوبرا ذات الرقبة السوداء والكوبرا الموزامبيقية ، والكوبرا (Sputatrix) .

التَّسَمُّمُ بِزُعافِ الصل النَّاشِر **cobraism**

التسمم بسم الصل الناشر أو بسم الكوبرا .

كوبْراليزين **cobralysin**

(مادة حالَّة للدم في زعاف الصل)

بَيتُ العَنْكبوت **cobweb**

يطلق هذا التعبير على الشبكة الإلكترونية وموقعها على الإنترنت لشبه تشابك اتصالاتها بخيوط بيت العنكبوت ، وقد تطلق في الطب على أي نسيج واهن يشبه بيت العنكبوت .

كوبالتيّ **cobaltous**

يتعلق أو يحتوي على الكوبالت بحالته ثنائية التكافؤ .

كوباميد **cobamide**

1 ـ في التسميات الكيميائية ، مشتق للكوبالامين يفتقر إلى جزء 5 ، 6 - ثنائي ميثيل بنزيميدازول .

2 ـ مصطلح يستخدم أحياناً بشكل عام لأي مركب بديل يحتوي على هذه البنية و خصوصاً لأي كوبالامين .

لسان مصروف **cobblestone tongue**

فرط تنسج وضخامة وتليف في الزغابات الخيطية فطرية الشكل تبدو بمنظر حجارة الطرق المرصوف . وتشاهد في فقر الدم بعوز الفيتامين B_{12} وكان يشاهد في التهاب اللسان الإفرنجي .

الصلُّ النَّاشِر؛ الكوبرا **cobra**

أي من الأفاعي العربيدية السامة العديدة من جنس كبير هو الكوبرا (Naja) وجنس أصغر هو الأفوفيجيز (Ophiophagus) ، توجد بشكل شائع في إفريقيا وآسيا والهند . هذه الأفاعي قادرة على مد منطقة الرقبة لتشكل داخون ولها نابان قصيران ناعظان وذا ثلمين عميقين نسبياً ، ويتغذى على غيره من الثعابين المصل الذي يستحصل عليه من الحيوانات الملقحة بسم الكوبرا ويستخدم كمضاد لتأثيرات السم .

الصل الناشر الآسيوي **Asian cobra**

هي الكوبرا الآسيوية وهي من أنواع الكوبرا التي تتوزع أنواعها الفرعية بشكل واسع عبر آسيا وقرب جزر أندونيسيا والفليبين . وبين الكوبرا الآسيوية توجد الكوبرا الهندية والكوبرا الباصقة وتوجد في جنوب شرق آسيا والفليبين .

الصِّلُّ النَّاشِرُ الأَسْوَدُ العُنُقِ **black-necked cobra**

نوع من الكوبرا الباصقة التي توجد في جنوب مصر وغرب أفريقيا ومن جنوب وغرب أفريقيا ، إلى جنوب أفريقيا .

الصِّل الناشرِ ذي الرأس **Cape cobra**

المُعَالجَة بالكوكائين **cocainization**

الفعل من وضع شخص ما تحت تأثير الكوكائين .

يُعَالِجُ بالكوكائين **cocainize**

وضع شخص تحت تأثير الكوكائين .

هَوَسُ الكوكائين **cocainomania**

تعبير آخر عن الإدمان على الكوكائين وخاصة الشديد منه .

تميمُ الكَرْبُوكسيلاز **cocarboxylase**


هو بيروُفُسْفات الثِّيامين ، وتركيبه الكيميائي (C_{12} H_{19} ClN_4 O_7 P_2S. H_2O) ، وله أهمية كبيرة في التفاعلات الأيضية (مثل تفاعلات نزع الكربوكسيل في دورة كريبس) .

عَونُ المُسَرْطِن **cocarcinogen**

هو المعزاز (مادة تعزز استقلاب مادة أخرى أو إنتاجها) .

سَرْطَنَة مُعانَة **cocarcinogenesis**

تطور السرطان بحسب نظرية واحدة فقط في الخلايا الشريطة ، وكنتيجة للظروف المفضلة لنموها .



اختبار الكوكائين Cocaine test

أرْبَويُّ الشَّكل **cocardiform**

شكل يشبه الوردة مثل الآفات الجلدية المتراكزة بألوان متباينة ، ويماثل عبارة (Cocarde) ، (Cockade) .

مُكَوَّرِيّ **coccal**

يشبه أو يتعلق بالمكورات .

كوكسيرين (شَمْعُ دودةِ القِرْمِز) **coccerin**

وفي الطب النفسي تستخدم بمعنى الاختلاط الذهني واضطرابات التفكير لكثرة اختلاط وتشابك الأفكار .

كوكا **coca**

1 ـ نبات إريثروكسالون الكوكا (Erythroxylon coca) .

2 ـ أوراق إريثروكسالون الكوكا ، والمستخدم بشكل واسع في أجزاء من أمريكا الجنوبية كشمق مضغي ، ومنبه للجهاز العصبي المركزي . كان يستخدم طبياً بشكل واسع ، وهومصدر لاستخراج الكوكائين البلوري .

كوكائين **cocaine**

قلواني بلوري ، والذي يستحصل عليه من أوراق إريثروكسالون الكوكا (أوراق الكوكا) ، وأنواع الإريثروكسالون الأخرى أو بتركيبه من الإيكجونين أو مشتقاته . يستخدم كمخدر موضعي وكمقبض وعائي يطبق موضعياً على الأغشية المخاطية . يؤدي الإفراط في تناول الكوكائين (المعاقرة) أو أملاحه إلى الاعتياد (Dependence) .

هيدرو كلوريد الكوكائين **cocaine hydrochloride**

ملح هيدروكلوريد الكوكائين ، والذي يستخدم كمخدر موضعي ومقبض وعائي ، يطبق موضعياً على الأغشية المخاطية .

الكوكائين الممتاز **crack cocaine**

شكل قابل للتدخين من الكوكائين يحضر للاستخدام غير المشروع ، يتميز بالامتصاص والبدء السريع في التأثيرات الشمقية .

تَسَمُّمٌ بالكوكائين **cocainism**

تناول الكوكائين بمقادير تفوق الجرعة الدوائية ، وغالباً ما يحدث ذلك بسبب الإدمان .

مُدْمِنُ الكوكائين **cocainist**

الشخص الذي يستعمل الكوكائين ولا يمكنه تركه بسبب ظهور أعراض امتناع الدواء فيما فعل ذلك . وأهمها القلق الشديد والخوف وضيق النفس ، والاكتئاب .

زمرة الفطريات الخوطية من عائلة الطوقيات . تنمو في التربة كأفطورة مع تشكل أبواغ مفصلية . أما في النسج فتنمو مثل كريوة مع تشكل أبواغ داخلية .

الكُرَوانيَّةُ اللَّدودَة **Coccidioides immitis**

كروانيّة تسبب داء الفطار الكرواني .

كوكسِيديُودين **coccidioidin**

(اختبار جلدي من الفطور الكروانية)

اختبار جلدي مستضدي يحضر من الطور الأفطوري لفطور الكروانية اللدودة . وبسبب كون معظم المرضى في المناطق المستوطنة إيجابيي الاختبار الجلدي ؛ فإن هذا الاختبار ليس مفيداً في تأكيد التشخيص . سلبية الاختبار الجلدي (الاستئصال الجلدي) يحدث في العديد من المرضى المصابين بالداء المنتشر ، ويشير ذلك إلى المآل السيء .

وَرَمٌ كُرَوانِيّ (علامة شعاعية في الرئة) **coccidioidoma**

صلابة حول مركز من ثمالات عقيدات ورم حبيبي رئوي ، تشاهد شعاعياً في الفطار الكرواني .

التِهابُ السَّحايا الكُرَوانِيُّ **coccidioidomeningitis**

نوع من التهاب السحايا بفطور الكروانية وغالباً ما يحدث عند منقوصي المناعة كالمصابين بعوز المناعة المكتسب .

فُطارٌ كُرَوانِيّ **coccidioidomycosis**

داء فطري تسببه العدوى بفطر الكروانية اللدودة ، ويحدث بشكليه البدئي والثانوي . يسمى أيضاً بداء كاليفورنيا والفطار الكرواني ، والورم الحبيبي الكرواني وداء بوسادا ، أو داء بوسادا ـ فيرنيكه .

فُطارٌ كُرَوانيٌّ **asymptomatic**
عَديمُ الأَعْراض **coccidioidomycosis**

العَدوى الناجمة عن استنشاق أبواغ الكُرَوانيَّةُ اللدودة (Coccidioides immitis) ، ولا توجد أعراض في 60٪ من الحالات ، والأعراض الأساسية تشبه الإصابة بالأنفلونزا وتشفى خلال 8 أسابيع . وفي حالات قليلة يتطور المرض

شمع من القرمزية (جنس من الحشرات) ، والذي يكون إستر كوكسيريل الكحول ، وحمضين هما 13 ـ كيتو ـ n ـ حمض دوترياكونتانويك و n ـ حمض ترياكونتانويك ، و يستخدمان كأصبغة بيولوجية .

1 ـ قِرْمِزيّات (حشرات) **cocci (sing.coccus)**
2 ـ مُكَوَّرات (جراثيم)

انظر تحت coccus .

قِرْمِزيّات (فصيلة مِنَ الحَشَرات) **Coccidae**

عائلة من الحشرات من رتبة نصفيات الجناح . تضم أجناس القرمزية و الملتمعة .

الأكريَّات (صُنَيْفٌ مِنَ الأوالي) **Coccidia**

الأكريات .

أكريَّات (من الأوالي) **coccidia**
(ف: أكرية) **(sing.coccidium)**

تحت زمرة الأوالي الطفيلية (صنف البوائغ ، شعبة أبيكومبلكس (Apicomplexa) تتواجد في الفقاريات والتي تتضمن الإنسان ، والفقاريات العليا ، تكتنف دورة حياتها التقسم ، وتكون الأعراس ، والتكاثر البوغي ، والعرسية . عادةً ما تكون العرسية النضجة صغيرة وداخل الخلايا بشكل نموذجي ، بدون نيشوب . عادةً لا يحدث الانقران (الاقتران) ، لكن إذا حدث فإنه يتضمن عرس متفاوت الأعراس تتكون تحت الزمرة ثلاثة رتب هي : الأكريات اللاعرسية والأكريات البدئية والكرويات الحقيقية .

متعلق بالأكريَّات **coccidial**

انظر تحت coccidian .

متعلق بالأكريَّات **coccidian**

1 ـ يتعلق بالأكريات .

2 ـ أي من الأوالي من رتبة الأكريات .

داء الأكريات **coccidioidal**

الداء الذي يتسبب عن الفطور من جنس الكروانية (جنس من الفطريات) .

الكُرَوانيَّة (جِنسٌ مِنَ الفطريَّات) **Coccidioides**

جنس ممرض (إمراضي) من الفطور الناقصة من

عبارة عن عدوى جديدة أوعن إعادة تفعيل إصابة بدئية هاجعة كما هي الحال في المرضى منقوصي المناعة .

فطارٌكرَوانِيّ coccidioidosis

انظر تحت coccidioidomycosis .

فطارٌكرَوانِيّ coccidiomycosis

يسمى أيضاً (Desert rheumatism) ، (Coccidioidomycosis) ، (Valley fever) ، وهو تنفسي جلدي عامله الفطريات الكروانية يتصف بغزارة القشع والتظاهرات الجلدية الفطرية.

داءُ الأكريَّات coccidiosis

1ـ في الإنسان ، الإصابة بالعدوى بأوالي الأكريات متماثلة البوائغ البشرية أو متماثلة البوائغ البديعة . مثل هذه العدوى غالباً ما تكون لا إعراضية ، وتتواجد فقط عند فحص عينات البراز ، لكن أحياناً قد تسبب اسهالاً مخاطياً مائياً شديداً ، خصوصاً في المرضى منقوصي المناعة .

2ـ في الثدييات مثل المواشي والماعز والأرانب والخنازير والقطط والكلاب تكون الإصابة بالعدوى بالأكريات من جنس متماثلة البوائغ الكيسية أو الأيمرية أو الكبيداء أو متماثلة البوائغ أوالتيزرية . تؤثر بشكل خاص على الحيوانات الصغيرة مسببةً تخريب الخاطية المعوية ، وتترافق بالإسهال والنزف المعوي والهزال وأحياناً بالزحار المميت . تسبب العدوى بالأكريات أكبر الأذيات في الدجاج ، وأنواع الأيمرية هي المسؤولة عن العدوى بشكل خاص مسببةً نسبة عالية من الإمراضيات والوفيات ، خصوصاً في الطيور الصغيرة .

كابحُ الأكريَّات coccidiostat

عامل يسيطر على داء الأكريات في الحيوانات ، غالباً ما يضاف كمغذيات إضافية أو في ماء الشرب . يسمى أيضاً مضاد الأكريات و كابح الأكريات .

كابحُ الأكريَّات coccidiostatic

بشكل مشابه السل ، وتعالج الحالات الشديدة بالأمفوتيريسين (Amphotericin) .

فُطارٌ كُرَوانِيٌّ مُنْتَشِر **disseminated coccidioidomycosis**

الشكل الذي يشبه السل من داء الفطار الكرواني .

انظر تحت asymptomatic coccidioidomycosis .

فُطارٌ كُرَوانيٌّ خاف (خَافي) **latent coccidioidomycosis**

هو الفُطار الكرواني الذي لاتظهر له أعراض .

انظر تحت asymptomatic coccidioidomycosis .

الفطار الكرواني البدئي **primary coccidioidomycosis**

عدوى تنفسية حادة حميدة ومحدودة ذاتياً ، ناتجة عن استنشاق أبواغ فطر الكروانية اللدودة ، ويشاهد بشكل مبدئي في جنوب غرب الولايات الأمريكية وشمال غرب المكسيك وأجزاء من منتصف وجنوب أمريكا . يختلف في الشدة من حالة تشبه الزكام لأعراض تشبه الأنفلونزا وأحياناً التهاب رئوي والتكهف مع حرارة عالية ، وأحياناً حمامى عقدة (تحاديب) . يسمى أيضاً حمى الوادي أو حمى الصحراء وحمى الوادي بحسب سان خواكين وروماتزم الصحراء .

فُطارٌ كُرَوانيٌّ أَوَليٌّ خارجَ الرِّئَة **primary extrapulmonary coccidioidomycosis**

الإصابة الأولى بالفطريات الكروانية ، والتي تكون خارج الجهاز التنفسي .

الفطار الكرواني المترقي **progressive coccidioidomycosis**

فطار كرواني ثانوي ، داء ورم حبيبي شديد الفوعة مزمن ومترق مع اكتناف الجلد والنسج تحت الجلد والأحشاءً والجهاز العصبي المركزي والرئتين مع فقر الدم والتهاب الأوردة واستجابات أرجية متنوعة . يمكن أن يكون

1 ـ مثبط لنمو الأكريات .
2 ـ انظر تحت coccidiostat .

الأكريَّة (جنس من الأوالي) **Coccidium**
في نظام التــصــنيف الشكلي هي جنس من الأكريات ، وهي كائنات حية قد تم تحديدها لجنس آخر .

الأَكْرِيَّةُ المُتْئِمَة **Coccidium bigeminum**
تسـمى أيضـاً المُتَبـائغَـةُ المُتْـئـمَـة (Isospora bigemina) ، وهي تصـيب الأمـعـاء الدقـيـقـة للكلاب والقطط والثعـالب والمنك . . وتسبب لها الإسهـال وتأخذ الشكل البوغي في البراز وقد يصعب تفريقهـا عن المقوسات الغوندية (Toxoplasma gondii) .

الأَكْرِيَّةُ النَّاقِبَة **Coccidium cuniculi**
تسـمى أيضـاً الأَيْمَرِيَّةُ السِّتيـداويَّة (Eimeria stiedae) ، (Monocystis stiedae) ، (Coccidium oviforme) ، وهي من الطفـيليـات الأوالي ، وتسـبب الفطار الكرواني الكبـدي في الأرانب والقطط والكلاب وأعراضهـا معوية كبدية من إسهالات أو إمساك ويرقان .

الأَكْرِيَّةُ البَشَرِيَّة **Coccidium hominis**
تسـمى أيضـاً المُتَـقـرِّمَـةُ البَـشَـرِيَّة (Sarcocystis hominis) ، وهي مـن الأنـواع الّتي تـصـــيب الإنسان والبقر وسيط في انتقالها والإنسان ثويها النهائي وتصيب أنسجته بالأكياس وخاصة في الأمعاء الدقـيقـة وتصاب الأبقار عندما تناول الغذاء الملوث ببراز الإنسان .

الأَكْرِيَّةُ البَيْضاوِيَّة **Coccidium oviforme**
انظَر تحت coccidium cuniculi .

الأَكْرِيَّةُ الرَّهيفَة **Coccidium tenellum**
(=الأَيْمَرِيَّةُ الرَّهيفَة) **(=Eimeria tenella)**
انظر تحتَ Eimeria tenella .

أكريَّة (من الأوالي) **coccidium**
(ج: أكريَّات) **(pl.coccidia)**
أي من الأوالي تحت زمرة الأكريات .

مُكَوَّراتِيُّ المَنْشَأ **coccigenic**
يتسبب عن المكورات .

الكوئليَّة (جنس نبات من النخليات) **coccillana**
انظر تحت cochineal .

دودةُ القِرْمِز **coccinella**
(=cochineal)
انظر تحت cochineal .

قِرْمِز **coccinellin**
(=carmine)
الأساس اللوني لدودة القرمز .

سابقة بمعنى مكورة **Cocco-**
كلمة تشير إلى ما يشبه ثمرة التوت العزوة (ثمرة تشبه حبة العنب) .


عَصَوِيٌّ مُكَوَّرِي؛ عُصَوَّرِيّ **coccobacillary**
يتعلق أو يشبه للعصيات المكورة .

عَصَوِيَّاتٌ مُكَوَّرَة؛ عُصَوَّرات **coccobacilli**
(ف: عُصَوَّرَة) **(sing.coccobacillus)**
انظر تحت coccobacillus .

العَصَوِيَّة المُكَوَّرَة؛ العُصَوَّرَة **Coccobacillus**
(ج: عُصَوَّرات) **(pl.coccobacilli)**
العصوية المكورة ، في نظام التصنيف الشكلي ، جنس من الجـراثيم مـؤلف من الكـائنات الحـيـة التي صنفت حالياً في جنس العصوانية والمغزلية والمستدمية .

العَصَوِيَّة المُكَوَّرَة؛ عُصَوَّرَة **coccobacillus**
(ج: عُصَوَّرات) **(pl.coccobacilli)**
هي جـراثيم بيضـوية الخلية تشكل توسطاً مـا بين المكورة والعصية من حيث الشكل .

الجَراثيمُ المُكَوَّرَة **coccobacteria**
اسم شـائـع للجـراثيم الكروية أو لكـثـيــر من المكورات الجرثومية .



Coccidiosis داء الأكريات

coccode — **حُبَيبَة كروِيَّة**

coccogenic — **مُكوَّراتيُّ المَنْشأ**

انظر تحت coccingenic .

coccogenous — **مُكوَّراتيُّ المَنْشأ**

يشبه المكورة أو كروي الشكل .

انظر تحت cocigenic .

coccoid — **مُكوَّراتيّ**

يشبه المكورة ، أو كروي الشكل .

cocculin — **البيكرُوتوكسين**

هو البيكروتوكسين (Picrotoxin) ، والذي يستعمل كترياق ضد التسمم بالباريتورات .

cocculus — **العُنَيبيَّة (نبات)**

1 ـ انظر تحت Anamirta cocculus .

2 ـ بذور نبات العنيبية التي تحتوي على البيكروتوكسين (منبه عصبي) .

cocculus indicus — **العُنَيبيَّةُ الهِنْديَّة (=سُمُّ السَّمَك)**

يسمى أيضاً سم السمك ، وهو نبات من الفصيلة القمرية .

Coccus — **1 ـ القِرْمِزيَّة (جنس من الحشرات)**
2 ـ المكوَّرَة (زمرة من الجراثيم)

جنس من حشرات نصفية الجناح من عائلة الأكريات من رتبة نصفيات الجناح . ومنها قرمزية الصبار هومصدر دودة القرمز .

coccus (pl.cocci) — **1 ـ القِرْمِزيَّة (حشرة) (ج: قِرْمِزيَّات)**
2 ـ مُكوَّرَة (جراثيم)

جرثومة مكورة الخلية ، عادةً أقل قليلاً من واحد مكرومتر في القطر .

coccyalgia — **ألَمُ العُصْعُص**

انظر تحت coccygodynia .

coccycephalus — **عُصْعُصِيُّ الرَّأس (مسخ)**

جنين له رأس منقاري الشكل .

coccydynia — **ألَمُ العُصْعُص**

انظر تحت coccygodynia .

coccygalgia — **ألَمُ العُصْعُص**

انظر تحت coccygodynia .

coccygeal — **عُصْعُصِيّ**

يتعلق أو يتوضع في منطقة العصعص .

coccygectomy — **استِئْصالُ العُصْعُص**

coccygerector (=ventral sacro-coccygeal muscle) — **مُقيمَةُ العُصْعُص (= العَضَلَة العَجُزيَّة العُصْعُصِيَّة البَطنِيَّة)**

العضلة العجزية العصعصية البطنية .

انظر تحت ventral sacrococcygeal muscle .

coccygeus — **عُصْعُصِيّ**

انظر تحت coccygeal .

coccygodynia — **ألَمُ العُصْعُص**

ألم في العصعص والمنطقة المجاورة له . يسمى أيضاً (coccyalgia) .

coccygotomy — **بَضْعُ العُصْعُص**

تحرير العصعص من التصاقاته .

coccyodynia — **ألَمُ العُصْعُص**

انظر تحت coccygodynia .

coccyx TA — **العُصْعُص**

انظر تحت os coccygis .

Cochicella — **الإسْكابيَّة**

جِنْسٌ من الحَلَزون .

cochineal — **دودَةَ القِرْمِز**

الحشرات الأنثوية الجافة ، منها المكورات القرمزية ، والتي تحيط باليرقة الصغيرة . تستخدم شكلياً كعامل ملون للمواد الدوائية . وهي مصدرللكارمين وحمض الكارمينيك .

cochlea TA — **القَوقعَة**

1 ـ أي شيء له شكل حلزوني .

2 ـ أنبوب مجوف حلزوني الشكل ، يشبه محارة الحلزون ، والذي يشكل جزءاً من الأذن الداخلية . قاعدته تتوضع في مواجهة النهاية الوحشية للصماخ السمعي الباطن وقاعدته تتجه إلى الأمام والوحشي . وتتألف القوقعة من عماد القوقعة والقناة العظمية والصفيحة الحلزونية العظمية ، والتي تقسم القوقعة جزئياً إلى الأعضاء الأساسية للسمع والسقالة

والملعقة الصغيرة (Cochleare parvum)، وتقابل معنى (Teaspoonful) .

مُلْعَقَةٌ مُعَرَّمَة **cochleare amplum**

ترادف ملعقة كبيرة أو ملعقة الطعام (Cochleare magnum)، وتعادل 15 ملي لتر .

مُلْعَقَةٌ كَبيرَة **cochleare magnum**

هي ملعقة الطعام التي تعادل 15 ملي لتر وتسمى أيضاً (Cochleare amplum)، (Tablespoon) .

مُلْعَقَةٌ مُتَوَسِّطَة **cochleare medium**

تسمى أيضاً (Dessertspoonful)، وتعادل 10 ملي لتر .

مُلْعَقَةٌ صَغيرَة **cochleare parvum**

تسمى أيضاً (Teaspoonful)، وتعادل 5 ملي لتر .

مُلْعَقَةٌ مَمْلوءَة **cochleare plenum**

ملعقة الطعام مملوءة بـ 15 ملي لتر من المادة .

المِلعَقيَّة؛ حَشيشة الملاعق **Cochlearia**

(نبات طبيٌّ منَ الفصيلة الصَّليبيَّة)

الملعقية، جنس من النباتات من عائلة الدهليزية والسقالة الطبلية . تتواصل السقالة عبر ثقب القوقعة .

القَوقَعَةُ العَظْميَّة **bony cochlea**

القسم الأذني الباطن الذي تستقر فيه القوقعة الغشائية، وما فيها من نهايات عصبية لاستقبال الاهتزازات الصوتية . وتوجد في الصخرة من العظم الصدغي .

القَوقَعَةُ الغشائيَّة **membranous cochlea**

انظر تحت ductus cochlearis .

قوقعة مونديني **Mondinis cochlea**

تشوه في القوقعة يشاهد في تشوه مونديني .


قوقعيّ **cochlear**

قوقعي أو يتعلق بالقوقعة .

1ـ ملْءُ مِلعَقَة **cochleare**

2ـ مِلعَقَة

ترادف الملعقة (Spoon)، أو ما يعادل حجمها (Spoonful)، ولها مقاسات فملعقة الطعام (Cochleare amplum)، (Cochleare magnum)، (Tablespoonful)، والمتوسطة (Cochleare medium)، وتقابل (Dessertspoonful)،



Cochlea **القوقعة**

انظر تحت Cochliomyia hominivorax .

المُتَحَلِّزَةُ المُنَكِّدَة **Cochliomyia bezziana**
(= الذُّبابَةُ الذَّهَبِيَّةُ المُنَكِّدَة) **(=Chrysomyia bezziana)**

انظر تحت Chrysomyia bezziana .

المُتَحَلِّزَةُ الشَّرِهَةُ لِلبَشَر **Cochliomyia hominivorax**

المتحلزة الشرهة للبشر هي ذبابة دودة اللولب ، هي ذبابة لونها أخضر مزرق تضع بيوضها خلال الساعات الحارة من اليوم على جروح الحيوانات . تعرف اليرقة بالدودة اللولبية ، وبعد التفقيس تحفر ملجأ لها في الجرح و تتغذى على النسج الحية . تسمى أيضاً بالمتحلزة الأمريكية و الذبابة الذهبية الماسيلية .

المُتَحَلِّزَةُ الماسيلِيَّة **Cochliomyia macellaria**
(= المُتَحَلِّزَةُ الشَّرِهَةُ لِلبَشَر) **(=Cochliomyia hominivorax)**

أنظر تحت cochliomyia hominivorax .

التِهابُ القَوقَعَة **cochlitis**
(=cochleitis)

انظر تحت cochleitis .

الكوثلِيَّة (نبات) **cocillana**

لحاء نبات الغواريا روسبي (Guarea rusbyi) وهو نبات دائم الخضرة ، يستخدم كمقيء وطارد للبلغم ومسهل .

حَنَفِيَّة **cock**

الصنبور المعد للفتح والإغلاق بهدف عبور السوائل عبره أو توقيفها .

أَرِيَة **cockade**

آفة جلدية ذات مناطق متراكزة متباينة الألوان .

انظر تحت cocardiform .

متلازمة كوكين **Cockayne's syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب إدوارد ألفريد كوكين (Edward Alfred Cockayne) ، وهو طبيب إنجليزي ، 1880-1965] هي قزامة وضمور الشبكية مع صمم .

انظر تحت syndrome .

الصليبيات ، والملعقية المخزنية هو عشب البثع ، وهي أنواع تستخدم لمعالجة البثع ، ومنه فجل الخيل (جنس نبات من الفصيلة الصليبية) .

الملعقية المدرعة **Cochlearia armoracia**

هي اسم شكلي لنبات فجل الخيل .

المِلْعَقِيَّةُ المَخْزَنِيَّة **Cochlearia officinalis**

هي حشيشة البثع ، هي أنواع من النباتات تستخدم لمعالجة البثع .

مِلعَقِيُّ الشَكل **cochleariform**

تشبه شكل الملعقة .

التِهابُ القَوقَعَة **cochleitis**

البضع الكييسي القوقعي **cochleosacculotomy**

هو بضع الهدف منه خلق ناسور ما بين الكييس والقناة القوقعية بواسطة أداة تدخل عبر النافذة الدائرية ، من أجل إراحة استسقاء موه اللمف الباطن .

فَغْرُ القَوقَعَة **cochleostomy**

إجراء فتحة في الحيز حول القوقعة ، وهي أهم مرحلة في عمليات الزرع القوقعي . وتجرى عبر الفوهة البيضية أو المدورة أو عبر فتحة في ذروة القوقعة .

متعلق بطوبوغرافِيَّةِ القَوقَعَة **cochleotopic**

متعلق بتنظيم الطريق السمعي والمنطقة السمعية في الدماغ .

قوقعيٌّ دِهْلِيزِيّ **cochleovestibular**

يتعلق بقوقعة ودهليز الأذن .

البلعة القوقعية **cochliobolus**

جنس من الفطور من رتبة الدوثيديال (Dothideales) ، تتضمن المرحلة الجنسية التامة لأنواع مختلفة من ثنائية القطب والمنحنيات والدريكسليرا (Drechslera) .

المُتَحَلِّزَة (جِنسٌ مِنَ الذُّباب) **Cochliomyia**

جنس من الذباب من فصيلة الخويعيات (Calliphoridae) .

المُتَحَلِّزَةُ الأَمْرِيكِيَّة **Cochliomyia americana**
(= المُتَحَلِّزَةُ الشَّرِهَةُ لِلبَشَر) **(=Cochliomyia hominivorax)**

الثيامين والأنسولين ، يعطى تسريباً داخل الوريد من أجل إزالة السمية في التسمم الكحولي الحاد .

cocoa **كاكاو**

1 ـ بودرة تحضر من حبوب الكاكاو الناضجة المشوية ، والتي تحتوي على الكافئين والتيوبرومين . يستخدم كمنكه في المستحضرات الدوائية . الكلاب التي تأكل كميات زائدة من الكاكاو يمكن أن تتسمم من التيوبرومين ، مع أعراض قيء و إسهال ومعص عضلي وسبات . يسمى أيضاً (Chocolate) .

2 ـ انظر تحت cacao .

cocoa bean **حَبُّ الكاكاو**

البذور الخاصة بشجر الكاكاو ، والتي تستعمل كمادة غذائية غنية بالدسم والمنبهات .

cocoa butter **زُبْدَةُ الكاكاو**

الدهون المحضرة بشكل زبدة والتي تستخرج من بذور شجرة الكاكاو .

coconscious **مُواكِبٌ للشُّعُور**

1 ـ ليس في مجال الوعي حتى يصبح قادر تحت ظروف أفضل كي يتذكر ، أي أنه ماقبل الوعي (Preconscious) .

2 ـ يتميز أو يتعلق بالوعي .

coconsciousness **شُعورٌ مُزْدَوَج**

1 ـ هو في الواقع الشعور المشترك بين اثنين ، ويسمى أيضاً (Double consciousness) .

2 ـ وعي ثانوي مرافق للمجرى الرئيسي للوعي ، كما هي الحال في بعض الاضطرابات التفارقية .

3 ـ حافة الوعي .

cocontraction **تَقَلُّصٌ مُتَسَّق**

التنبيه المتناسق بين العضلات المتقابلة الناهضة والمناهضة حول المفصل .

coconut **جَوزُ الهِنْد ؛ نارَجيل**

ثمرة جوز الهند ، أو نارجيل ، هي شجرة نخيل تستخدم عصارتها في تحضير النبيذ وجوزتها كغذاء هام ومصدر لزيت جوز الهند .

cockleburr **كوكليبور**

أي نبات من جنس الثانزيم (Xanthium) .

cockroach **صُرْصور**

أي من الحشرات المجنحة الزاحفة مع أجسام بيضوية مسطحة من رتبة الصراصير . العديد منها هي هامات منزليةو مصدر للمرض . أشيع أجناسها هي جنس الصراصير ، والصرصور ، وتسمى أيضاً (Roach) .

american cockroach **الصرصور الأمريكي**

هامة منزلية شائعة في نصف الكرة الشمالي .

Australian cockroach **الصرصور الأسترالي**

هامة منزلية شائعة في المناطق الدافئة من العالم .

German cockroach **الصرصور الألماني**

أنواع صغيرة لونها بني فاتح تتواجد كهامات منزلية في شمال أمريكا وأوربا . يسمى أيضاً بق حب الملوك (Croton bug) .

Oriental cockroach **الصرصور الشرقي**

أنواع سوداء اللون تشاهد في آسيا كمنشأ لها ، ولكن حالياً تتواجد كهامة منزلية في أجزاء عديدة من العالم .

cocktail **مَخْلوط ؛ كوكتيل**

مزيج من الشراب المعد من مكونات عديدة .

lytic cocktail **كوكتيل حال**

مزيج من أدوية مختلفة يستخدم لحصر الوظيفة المستقلة للجهاز العصبي المركزي على كل المستويات ، لذلك يثبط تفاعلات الدفاع الاستتبابية للكائن الحي ، وينتج عنه حالة تعرف بالسبات الشتوي الاصطناعي .

McConckey cocktail **كوكتيل ماكونكي**

مستحلب زيت كبد السمك مع عصير البندورة .

Philadelphia cocktail **كوكتيل فيلادلفيا**

انظر تحت Rivers' cocktail .

Rivers` cocktail **كوكتيل ريفارز**

محلول من الديكستروز في محلول ملحي مساوي (إسوي) التوتر ، مع إضافة كلوريد

سَمَكُ القدّ **cod**

انظر تحت Gadus morrhua .

زيتُ كَبِدِ القدّ **cod liver oil**

الزيت الغني بالڤيتامين A و D ، ويستخلص من الأسماك خاصة نوع سمك القد (Gadus morrhuae) .

1 ـ راموز (ج: رَوامِيز) **code**

2 ـ دُستور

1 ـ مجموعة من القوانين الموضوعة ليتبعها الأفراد .

2 ـ نظام به نصبح قادرين على التواصل مع المعلومات .

دُسْتورُ آدابِ الطِّبّ **code of ethics**

ضوابط القَواعد الأخلاقية ، في مجال الطب ، والتي تطبق على الأطباء عند تنفيذ الأدوار المهنية الواجب عليهم القيام عليها

دُسْتورُ المُمارَسَة **code of practice**

ضوابط قواعد ممارسة المهنة وأخلاقياتهاعند تنفيذ الأدوار المهنية عليهم .

تنكس الراموز **degeneracy of code**

انظر تحت degeneracy .

راموزُ الجينات **genetic code**

الطريقة التي تتقى فيها المعلومات نوعية تسلسل ثمالات الحمض الأميني في تركيب عديد الببتيد بواسطة الكائنات الحية بالشيفرة التي تتواجد في النوكليوتيدات على جيناتها .

راموزٌ ثُلاثيّ **triplet code**

انظر تحت codon .

مُرَمَّز **coded**

معطى رمز خاص به ، كملف مرمز لا يمكن فتحه إلا بعد كتابة رمزه عند محاولة فتحه .

تَميمُ نازِعَةِ الهيدرُجين I **codehydrogenase I**

هو ثنائي نوكليوتيد الأدنين والنيكوتيناميد . (Nicotinamide adenine dinucleotide) .

تَميمُ نازِعَة الهيدْروجين II **codehydrogenase II**

هوَ فسفات ثنائي نوكليوتيد الأدنين

فيلَجَة **cocoon**

تسمى الشرنقة ، وهي لفافة من خيطان الحرير تقي بها يرقة دودة القز نفسها ، وهناك حشرات أو حيوانات أخرى تقوم بعمل مشابهة من نسج غطاء حولها يقيها المخرشات المحيطية ، وتوصف بعض الضمادات بهذا النموذج مثل الضماد الشرنقي (Cocoon dressing) .

جوزُ الهند **Cocos**

جنس من أشجار النخيل (عائلة النخيليات) . ومنها النوسيفيرا وهي نخيل جوز الهند ، والذي يعتبرمصدر جوز الهند أو زيت جوز الهند .

غَلْي (صيدلة) **coction**

1 ـ عملية الغلي .

2 ـ هضم .

انظر تحت digestion .

مُسْتَضِدٌ مُسَخَّن **coctoantigen**

مستضد معدل بالمعالجة الحرارية .

مُستَمْنِعٌ مُسَخَّن **cocto-immunogen**

مستضد مسخن (Coctoantigen) .

عَطوبٌ بالغَلْي **coctolabile**

يتخرب أو يتبدل بالتعرض للحرارة إلى درجة غليان الماء .

المرسبة المسخنة **coctoprecipitin**

مرسبة تنتج عن التمنيع مع المستضد المسخن .

بروتينٌ مُسَخَّن **coctoprotein**

صامِدٌ للغَلْي **coctostabile**

لا يتبدل بالتعرض إلى درجة غليان الماء .

صامِدٌ لِلغَلْي **coctostable**

انظر تحت coctostabile .

سيَنوميَنين (نبات) **coculine (=sinomenine)**

انظر تحت sinomenine .

اسْتِنْبات مُشْتَرَك **cocultivation**

زرع الخلايا (مثاله : الخلايا الإنسانية (البشرية) الطبيعية غير المصابة بالعدوى) مع خلايا مصابة بالعدوى أو كامنة العدوى من نفس النوع .

codominance — **سيادة مُشتركة**

وتطلق على السيادة المشتركة للجين .

codominant — **سائِدٌ مُشترك**

انظر تحت gene .

codon — **رامزة (ج: روامز)**

مجموعة من ثلاث قواعد متجاورة على طاق واحد من الدنا (DNA) أو الرنا (RNA) - ، والتي تتكون من 64 روامز مختلفة ، 61 منها تُضمن في حمض أميني محدد إلى سلسلة عديد البتيد و ثلاث إشعارات لطراف السلسلة .

initiation codon — **رامِزةٌ ابْتداريَّة**

الرامزات (AUG) ، أو (GUG) ، والتي تتواجد في بداية تتال رامزات الرنا المرسال من أجل سلاسل عديدات البتيد . حيث يتعرف هناك عليه بواسطة الرنا الناقل ، والذي يحمل الحمض الأميني المثيونين (في العصارة الخلوية لحقيقيات النوى) أو الحمض الأميني N- فورميل المثيونين (في بدائيات النوى والمتقدرات وصانعات اليخضور) . تتعرف هذه الروامز في منتصف السلسلة عديدة البتيد ، وهذه الروامز يتم التعرف عليها بواسطة الرنا الناقل الأخرى ، ولذا فإن (AUG) تتجه في تضمين الميثونين و (GUG) في الفالين .

initiator codon — **رامِزَةٌ ابْتداريَّة**

انظر تحت initiation codon .

nonsense codon — **رامِزَةٌ هُرائيَّة**

انظر تحت termination codon .

termination codon — **رامِزَةٌ إنْهائيَّة**

الروامز الثلاث (UAA) ، (UAG) ، (UGA) ، والتي تنهي تخليق سلسلة عديد البتيد النامية ، وتنهي تحررها من الريبوسومات .

coe - — **بادئة**

coefficient — **مُعامِل**

1 ـ معامل رقمي يضرب في حد بداخل معادلة جبرية .

2 ـ رقم يسبق صيغة في معادلة كيميائية ، موضحاً الرقم المتعلق بالجزيء للأصناف الداخلة في التفاعل .

والنيكوتيناميد (Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) .

codeine — **كودين**

قلواني مخدر يستحصل عليه من الأفيون أو يحضر بمثيلة المورفين ، يستخدم كمسكن ومضاد للسعال ، يعطى فموياً . يسمى أيضاً متيل المورفين(Methylmorphine) .

codein sulfate — **سلفات الكودين**

بودرة بلورية بيضاء أو بلورات بيضاء ، يستخدم كمخدر ومسكن ، يعطى فموياً .

codeine phosphate — **فسفات الكودين**

بودرة بيضاء بلورية أو بلورات بيضاء ، تستخدم كمخدر ومسكن ، يعطى فموياً .

codex — **مُدوَّنة الأدْويَة**

مدونة الأدوية ، كتيب الوصفات الطبية المرخص ، خصوصاً دستور الأدوية الفرنسي .

codex Alimentarius — **مُدَوَّنَةُ الأَغْذيَة**

موسوعة تَقدم معلومات كافية وموسعة عن الأغذية .

codex medicamentarium — **مُدَوَّنَةُ الأَدْويَة**

انظر تحت codex .

coding — **تَرْميز**

عملية وضع رمز لمركب ، أو ملف مخصص به .

category coding — **تَرْميزُ الفئات**

وضع رَمز خاص بكل فئة من الفئات التي تم فرزها وتصنيفها .

Codman's sign, triangle — **علامة كودمان، مثلث كودمان**

[علامة أو مثلث منسوبة للطبيب إيرنست أموري كودمان (Ernest Amory Codman) ، وهو جراح أمريكي 1869-1940] وعلامة كودمان تري في تمزق وتر العضلة فوق الشوك .


انظر تحت triangle .

codocyte — **كُريَّة حَمْراء هَدَفيَّة**

(=target erythrocyte)

انظر تحت target cell .

النسبة بين كمية البول ومجموع المواد الصلبة فيه .



علامة كودمان، مثلث كودمان
Codman's sign, triangle

معامل بونزن (= معامل الامْتصاص) **Bunsen coefficient (=absorption coefficient)**

عدد الملي لترات من الغاز المذابة في ملي لتر واحد من السائل تحت ضغط جوي يبلغ (760) ملي متر زئبق ، وتحت درجة الحرارة النوعية . يسمى أيضاً بمعامل الذوبانية .

معامل شيك ـ مارتن **Chick-Martin coefficient**

انظر تحت Chick - Martin method .

مُعاملُ إزالَة التَّمَعْدُن **coefficient of demineralization**

نسبة المادة المعدنية إلى ثمالة البول الكلية الجافة وتبلغ حوالي 30٪ .

مُعاملُ الانْطفاء (= مُعامل الامْتصاصيَّة المُوليَّة) **coefficient of extinction (=molar absorptivity coefficient)**

انظر تحت molar absorptivity coefficient .

3 ـ ثابت حسابي يميز عملية فيزيائية أو كيميائية .

4 ـ متشابتة إحصائية تحدد كمية التغير في الناتج تحت ظروف موضوعة .

مُعاملُ الامْتصاص **absorption coefficient**

1 ـ الامتصاصية .

2 ـ انظر تحت linear absorption coefficient .

3 ـ انظر تحت mass absorption coefficient .

مُعاملُ النَّشاط **activity coefficient**

يسمى كذلك معامل الفعالية ، وهو معدل فعالية الكهارل المقاسة ببعض الخواص ، مثل تنزيل (خفض) نقطة درجة التجمد للمحلول إلى التركيز الحقيقي (المولالية) . وهي عادةً أقل من 1 ، و تزداد عندما يصبح المحلول أكثر تخفيضاً مقترباً من وحدة التخفيف المطلق ، وخاصة عندما تصبح القوى الجاذبة مابين الإيونات المشحونة بشكل متعاكس مهملة .

مُعاملُ آمانْ **Amann's coefficient**

نسبَة السلفات إلى النتروجين في البول .

مُعاملُ أمْبار **Ambard's coefficient**

قيَاس اليوريا في الدم والبول .

مُعاملُ التَّوهين **attenuation coefficient**

كمّية أساسية تستعمل في حساب نفاذ المواد بجزيئات كمية (الكوانتوم) أو حزم الطاقة الأخرى ، وهي تقيس كمية التوهين .

مُعاملُ بُومان **Baumann's coefficient**

نسبَة السلفات الأثيرية إلى مجمل السلفات في البول .

معامل ثنائي الحدود **binomial coefficient**

هو عدد مؤلف من مجموعات مختلفة في حجم (k) ، والتي يمكن اختيارها من مجموعة أشياء (n) ، ويرمز لها $\left(\frac{n}{k}\right)$ أو ${}_{n}C^{k}$، وتسمى $\frac{n}{k(n-k)}$

معامل بيولوجي **biological coefficient**

حجم الطاقة الكامنة ، والتي تستهلك بواسطة الجسم في حالة الراحة .

معامل بوشارْ **Bouchard's coefficient**

هو احتمالية كون هامش الثقة سيحتوي على القيمة الحقيقية لمتثابتة الجمهرة . على سبيل المثال إذا كان معامل الثقة (95.95٪) فإن هامش الثقة المحسوب من أجل كل عدد كبير من العينات العشوائية سيحتوي على المتثابتة .

مُعاملُ زَواج الأقارب **consanguinity coefficient**

تسمى أيضاً (Inbreeding coefficient) ، وهي طريقة إحصائية لحساب مدى قرابة الجينات بين شخصين . ويرمز عامل القرابة بالحرف f ، ويقيس مدى احتمال تلقي شخص جينين متطابقين من أبوين متطابقين لهذا الجين .

معامل الترابط **correlation coefficient**

قياس إحصائي عندما يعطي مربعه درجة الترافق ما بين متغيرين عشوائيين . معظم معاملات الترابط تجعل طبيعية بحيث تكون القيم مابين (1+) (والتي تشير إلى الترابط التام) ، و (1-) (والتي تشير إلى الترابط المعكوس التام) . والقيمة (0) تشير إلى عدم وجود ترابط . وكما أن القيمة المطلقة لمعامل الترابط تزداد ، فإن قوة الترابط تزداد أيضاً . بطريقة أخرى عندما لا تكون نوعية فإن معامل الترابط للشخص يكون متوسطاً . ومعامل الترابط النظري الحقيقي للجمهرة يرمز له بالرمز p ، أما عينة معامل الترابط المحسوب للبيانات المختبرة والمقيمة نظرياً فيرمز لها بالرمز r .

مُعاملُ الكرْياتنين **creatinine coefficient**

هوَ الرقمَ الذيَ يستحصل عليه من تقسيم الميلي جرامات الكلية للكرياتنين في بول يوم كامل على وزن الجسم معبراً عنه بالكيلوجرامات .

مُعاملُ الانْجماد **cryoscopic coefficient**

معَامل الانجماد ، هو المقارنة مابين انخفاض نقطة درجة حرارة تجمد الكهارل مع تلك بالنسبة لغير الكهارل المثالية في نفس التركيز (عادةً 1 مول لكل منها) .

مُعاملُ الانْتشار **diffusion coefficient**

يسَمى أيضاً ثابت الانتشار (Diffusion

مُعاملُ زواج الأقارب **coefficient of inbreeding**

يستخدم للتعبير عن احتمالية استقبال الشخص كلا الأليلين من السلف الواحد الشائع إلى كلا الأبوين ، أو نسبة الموضع الجيني الذي يكون زيجوت متماثل الألائل .

مُعاملُ التَّوازُع **coefficient of partage**

كمَية الحمض المحلول في الماء التي يزيلها الأثير بشكل ثابت ، وهي عالية عادة في الأحماض العضوية ومنخفضة مع الأحماض المعدنية .

مُعاملُ القَرابَة **coefficient of relationship**

تعَبير عن احتمالية توارث شخصان مورثة (خلة) معينة من سلف شائع ، أو نسبة كل الذين قد ورثوا جيناتهم من أسلاف شائعة .

مُعاملُ التَّوصيليَّة الحَراريَّة **coefficient of thermal conductivity**

عدد يشير إلى كمية الحرارة التي تجتاز في وحدة الزمن خلال وحدة السماكة (الثخانة) للمادة عندما يكون الإختلاف في درجة الحرارة درجة مئوية واحدة .

مُعاملُ التَّمَدُّد الحَراريّ **coefficient of thermal expansion**

التغيرَ في الحجم لكل وحدة حجوم من المادة والناتجة عن زيادة درجة الحرارة درجة مئوية واحدة .

مُعاملُ التَّفاوُت (فيَ الإحصاء) **coefficient of variation**

الانحراف المعياري مقسماً على المتوسط ، وأحياناً يضاعف بضربه 100 . كمية لا وحدةً لها تشير إلى التفاوت ما حول المتوسط في علاقة الحجم بالمتوسط ، ويرمز له بالرمز (CV) .

مُعاملُ اللُّزوجَة **coefficient of viscosity**

القوَة الضرورية للإنزلاق الماسي لوحدة من منطقة ذات سطح أملس على وحدة السرعة على سطح آخر موازي ينفصل عن السطح الأول بواسطة وحدة طبقية من المادة اللزجة .

معامل الثقة **confidence coefficient**

التشعيع عندما تنشأ الفوتونات كلها مع نفس الطاقة .

المُعَاملُ التَّصَحُّحِيُّ في المُخْتَبَرات **hygienic laboratory coefficient**
(= مُعامِلُ الفينول) (للمطهِّرات) **(=phenol coefficient)**

العامل الصحي في المختبرات ، ويساوي معامل الفينول .

انظر تحت phenol coefficient .

المُعاملُ الإسْوِيُّ القِيَاس لحمْض اللاكْتيك **isometric coefficient of lactic acid**

عامل يتعلق بقياس أقصى نسبة إنتاج لحمض اللاكتيك والعضلات بحالة ارتخاء .

مُعاملُ إسْوِيَّة التَّوَتُّر **isotonic coefficient**

كَمِّيَة أمْلاح بلازما الدم الإسوية التوتر (9 جرام/ لتر) أو كمية الأملاح التي يجب إضافتها للماء المقطر لتحضير محلول إسويُّ التوتر .

مرتبة كندال لمعامل الترابط **Kendall's rank correlation coefficient**

تستخدم مرتبة معامل الترابط عندما يظهر متغيرين بيانات ترتيبية في عدد محدود من الدرجات ، مثل الفئات المعدومة والخفيفة والمتوسطة والوخيمة ، لذلك وأن العينات المتعددة يمكن أن تحدد بحسب كل درجة .

يسمى أيضاً بكندال التاسع (Kendall's tau) .

انظر تحت spearman's rank correltion .

مُعاملُ القَرَابَة **kinship coefficient**

يسمى أيضاً (Coefficient of relationship) ، وهو احتمال أن يرث شخصان جينات مماثلة عن الأبوين الأصليين أو أن يرثا التناسب الجيني الموجود لدى الأبوين الأصليين.

معامل لانسيت **Lancet coefficient**
(= مُعاملُ الفينُول) (للمطهِّرات) **(=phenol coefficient)**

انظر تحت phenol coefficient .

المعامل المميت **lethal coefficient**

هو تركيز المطهر الذي يمكن أن يقتل الجراثيم constant) ، ويعبر عنها بكتلة المادة التي تنتشر عبر وحدة المساحة خلال وحدة الزمن وفي وحدة التركيز المتدرج .

معامل التخفيف **dilution coefficient**

رقم يعبر عن فعالية المطهر المضاف للكائن الحي . ويحسب من المعادلة (tc^n=K) ، حيث (t) هي الزمن المطلوب لقتل الكائن الحي ، و(c) هو تركيز المطهر ، و (k) هي ثابتة . وهو معامل منخفض يشير إلى أن المطهر فعال في التركيز المنخفض .

مُعاملُ التَّوَزُّع (لِلْمطهِّرات) **distribution coefficient**

انظر تحت partition coefficient .

مُعاملُ فالْتا **Falta's coefficient**

نسبَة طرح السكر المتناول .

مُعاملُ الخُصوبَة **fecundity coefficient**

عامِل يستعمل لقياس قدرة الأحياء (الكائنات الحية) المتطفلة على التكاثر حسب نضج الجسم وعامل نموه .

مُعاملُ هينْز **Haines' coefficient**

لحسَابَ المواد الصلبة في البول .

مُعاملُ هيزَر **Haser's coefficient**

لحسَاب الأجسام الصلبة في البول .

مُعاملُ الهيمُوجلوبين **hemoglobin coefficient**

نسبَة تركيز الأكسي هيموجلوبين إلى إجمالي تركيز أصبغة السائل النخاعي .

معامل هيل **Hill coefficient**

معامل يعطى بمعادلة هيل ، ويشير إلى درجة التشاركية للإنزيم المختبر . إذا كان معامل هيل يساوي (1.0) فإنه يشير إلى الارتباط المستقل ، بينما القيم الأكثر أو الأقل تشير إلى إيجابية أو سلبية التشاركية على الترتيب . القيمة بالنسبة للهيموجلوبين هي (2.8) .

مُعاملُ التَّجانُس (للأشعة) **homogeneity coefficient**

في علم الأشعة هو معدل طبقة نصف القيمة إلى طبقة نصف القيمة الثانية . وهو وحدة

انظر تحت proetz test .

المُعاملُ التَّناضُحي **osmotic coefficient**

العَامل Ø ، الذي يصحح الانحراف في سلوك الذوائب بالمقارنة مع السلوك المثالي المحدد بواسطة معادلة الغاز المثالي كما يطبق على الضغط التناضحي .

مُعاملُ التَّقاسُم **partition coefficient**

المعَدل الذي تُوزع به المادة المعطاة نفسها بين واحد أو أكثر من طورين مختلفين أو أكثر .

يسمى أيضاً (Distribution coefficient) .

معامل الترابط لبيرسون **Pearson`s correlation coefficient**

هو معامل الترابط الأكثر شيوعاً ، وهو تباين مشترك لمتغيرين عشوائيين يقسم على ناتج الانحراف المعياري الخاص بكل منهم . يسمى أيضاً معامل الترابط النتاج ـ اللحظي .

انظر أيضاً (correlation coefficient) .

مُعاملُ الفينول (للَمطهرات) **phenol coefficient**

قياس الفعالية المبيدة للجراثيم للمركبات الكيميائية التي لها علاقة بالفينول . هذا الاختبار يكون معيراً (طريقة ريديل ـ ووكر ، طريقة قسم الزراعة) . يحسب معامل الفينول بتقسيم تركيز المادة المختبرة التي تقتل الكائنات الحية المختبرة في (10) دقائق ، وليس في (5) دقائق على تركيز الفينول الذي يقتل الكائنات الحية تحت نفس الظروف . يمكن أن يحدد ذلك في غياب المادة العضوية ، أو في وجود حجم معياري من المادة العضوية المضافة .

معامل الترابط النتاجي ـ اللحظي **product-moment correlation coefficient**

انظر تحت pearson's correlation coefficient .

معامل مرتبة الترابط **rank correlation coefficient**

معامل الترابط لمتغيرين محسوبين بعد المرتبات التي قد تستبدل محل القيم الفعلية . انظر أيضاً (kandall's rank correlation coefficient) .

اللابوغية (المعامل المميت السفلي) ، أو الأبواغ الجرثومية (المعامل المميت العلوي) في الماء في درجة حرارة من 20 إلى 25 درجة مئوية في أقصر فترة ممكنة من الزمن .

مُعاملُ الامْتصاص الخَطِّي (للأشعة) **linear absorption coefficient**

في فيزياء الإشعاعية ، هو جزء من حزمة أشعة X (الأشعة السينية) أو أشعة جاما الممتصة لكل وحدة ثخانة من المادة الممتصة .

مُعاملُ التَّوهين الخَطِّي (للأشَعة) **linear attenuation coefficient**

في الفيزياء الإشعاعية ، هو جزء من حزمة أشعة X (الأشعة السينية) ، أو أشعة جاما الممتصة أو المتبعثرة لكل وحدة ثخانة من المادة الممتصة ، ويرمز له بالرمز M .

مُعاملُ لُوبيش **Loebisch's coefficient**

يستخدم في حساب نسبة الأجسام الصلبة في البول ، ويسمى أيضاً (Long's coefficient) .

مُعاملُ لُونْغ **Long's coefficient**

انظَر تحت Loebisch's coefficient .

مُعاملُ مايَّار **Maillard's coefficient**

هوَ معامل يقيس النسبة بين اليوريا والنتروجين الكلي في البول .

مُعاملُ الامْتصاص الكُتْلي (للأشعة) **mass absorption coefficient**

في عَلم الأشعة ، هو ناتج قسمة معامل الامتصاص الخطي مقسوماً على كثافة المادة الماصة .

مُعاملُ التَّوهين الكُتْلي (للأشعة) **mass attenuation coefficient**

هو نَاتج قسمةَ معامل التوهين الخطي مقسوماً على كثافة المادة الممتصة

مُعاملُ الامْتصاصيَّة الموليَّة (للضوء) **molar absorptivity coefficient**

هو مَعامل الانطفاء المولي.

انظر تحت molar absorptivity .

المعامل الشمي **olfactory coefficient**

أيضاً (Spearman's rho) .

مُعامِلُ دَرَجَةِ الحَرارَةِ **temperature coefficient**
عدَد يشير إلى تأثير الحرارة على ثابتة السرعة للتفاعلات الكيميائية . رمز Q10 بسبب كون درجة الحرارة 10 درجات مئوية ، وهي التغير الحراري الأكثر توظيفاً من حيث الشيوع .
انظر تحت Van't Hoffsrule .

مُعامِلُ تراب **Trapp's coefficient**
لحَساب المواد الصلبة في البول . تسمى أيضاً (Haser's coefficient) ، (Haser's coefficient) ، Loebisch's coefficient) ، (Long's coefficient) .

مُعامِلُ حَلِّ الدَّم بالبَول **urohemolytic coefficient**
العـامل المتعلق بقدرة البول على حل الدم حسب تركيزه وثقالته النوعية .

المُعامِلَ السُّمِّيُّ للبَول **urotoxic coefficient**
العـامل الذي يبين كمية السموم في البول وعلاقتها بالأطعمة المتناولة .

مُعامِلُ السُّرْعَة **velocity coefficient**
العَدد الذي يعبر عن معدل التفاعل ، وهو معدل تحول وحدة الكتلة للمادة في التفاعلات الكيميائية .

مُعامِلُ الحَجْم **volume coefficient**
مـعَـامل خاص بحساب حجم الكريات الحمراء .

مُعامِلُ إيفُون **Yvon's coefficient**

سابقةٌ بمعنى الجَوْف **coel-**
طليعة مصطلح تشير إلى معنى الجوف .

المتوَسِطة **coelarium (=mesothelium)**
الغشاء الذي يبطن التجويف الجسمي للجنين أو الجوف العام . يتألف من الطبقة الجدارية وهي الجوف العام الخارجي والطبقة الحشوية وهي الجـوف العـام الداخلي . يسمى أيضاً (Mesothelium) .

المُجَوَّفات (شعْبَة مِنَ اللافِقاريَّات) **Coelenterata**

مُعامِلُ التّحَوُّف **regression coefficient**
يطلق على العلاقات التبادلية بين متغيرين بحيث يؤدي أي تغير في أحد العاملين ذوي العلاقة التبادلية إلى تغير في المتغير الآخر سواء بالزيادة أو النقص .

معامل ريديل ـ ووكر **Rideal-Walker coefficient**
(= مُعامِلُ الفينُول للمطهِّرات) **(=phenol coefficient)**
انظر تحت phenol coefficient .

عينة معامل الترابط **sample correlation coefficient**
انظر تحت correlation coefficient .

مُعامِلُ التَّثَفُّل **sedimentation coefficient**
هيَ السرعة التي تتثفل فيها الجزيئات بواسطة تطبيق مجال نابذي ، والنتيجة المعطاة تكون عبارة على وحدات من الزمن (السرعة تقسم بواسطة التسارع) ، وعادةً مايعبر عنها بوحدات سفيدبرج (S) ، التي تساوي 10^{-13} ثانية . تستخدم معاملات التثفل لتمييز حجم الجزيئات الضخمة مثال ذلك (5.8S r RNA) ، (22 Sr RNA) . وتزداد هذه القيم بزيادة الكتلة والكثافة وهي أعلى في الجزيئات الكروية منها في الجزيئات الليفية . تسمى أيضاً ثابتة التثفل (Sedimentation constant) .

معامل الانتقاء **selection coefficient**
قياس المساوئ في قيمة البقيا لنمط جيني معطى بالمقارنة مع نمط جيني معياري في جمهرة من الناس .

معامل الذوابانية **solubility coefficient**
انظر تحت Bunsen coefficient .

معامل مرتبة الترابط لسبيرمان **Spearman's rank correlation coefficient**
يستخدم معامل مرتبة الترابط عندما يمثل كلا المتغيرين بيانات اعتيادية في ترتيب غير محدد ، مثل الصنف الثابت ، حيث أن كل عينة محدد كمرتبة فريدة وتأخذ الرمز r_s ، وتسمى

اسم سابق لشعبة من اللافقاريات البحرية التي تتضمن شقائق النعمان والعدار والأسماك الهلامية والمرجان ، والتي تحدد الآن بشعبة القراصات .
انظر تحت coelenterate .

coelenterate **مُجَوَّفِيّ**

1 ـ يتعلق أو ينتمي إلى شعبة القراصات .
2 ـ أي فرد من شعبة القراصات .
3 ـ القراصات والمشطيات بشكل عام .

coelenteron (=archenteron) **مِعَى بدائِيّ**

1 ـ انظر تحت archenteron .
2 ـ التجويف الهضمي الوعائي .
انظر تحت gastrovascular cavity

coeliac **بَطنِيّ**

انظر تحت abdominal .

coelio- **سابقة بمعنى البَطن**

سابقة أو شكل مركب بمعنى البطن أو يشير إلى العلاقة مع الجوف أو الفراغ .

coeloblastula **أرَيمة مُجَوَّفة**

النمط الشائع للأريمة (كرة خلوية وحيدة الطبقة التي تحيط بجوف فيه سائل في بواكير تكون الجنين) ، والتي تتألف من كرة مجوفة تشكل القسيمات الأريمية .

coelom **الجَوفُ العام**

الجوف العام في اللافقاريات العليا ، والذي يستمر طول الحياة . والذي يتوضع في أجنة الشدييات ما بين الجنبة الجسدية والجنبة الحشوية . وهما اثنان الجوف العام خارج الجنين ، والجوف العام داخل الجنين . وينشأ من جزء من الجوف العام داخل الجنين الأجواف الرئيسية للجذع . ويسمى أيضاً الجوف العام والجوف الجسمي .

abdominal coelom **الجَوفُ البَطْنيُّ**

التجويف الصفاقي داخل البطن .

extraembryonic coelom **الجَوفُ العامُ خارجَ الجَنين**

جزء من الجوف العام الخارجي للجنين والذي يحيط به الأديم المتوسط المشيميائي والأديم المتوسط للكيس السلوي أو المحي . والذي يتصل بشكل مؤقت في مستوى السرة مع الجوف العام داخل الجنين . يسمى أيضاً الجوف العام الخارجي (Exocoelom) .

coeloma **الجَوفُ العامُّ**

انظر تحت coelom .

Coelomata **الجَوفيَّات**

قسْمٌ منَ المَمْلَكة الحَيَوانيَّة .

coelomate **جَوفِيّ**

1 ـ يملك جوف عام .
2 ـ حقيقي الجوف (Eucoelomate) .

coelomic **متعلق بالجَوفِ العام**

coelomyarial **عَضَلَة جَوفيَّة**

توجد في الديدان .

coelomyarian **عضلة جوفية**

نمط مصمم للمجموع العضلي للدودة المسودة ، حيث تكون الألياف العضلية قريبة من اللحمة (النسيجية تحت الجلد) ، والعمودي لها . تمتد الليفات العضلية لمسافات متباينة للأعلى من الخلية العضلية ، والتي تحيط بشكل جزئي بالهيولى العضلية .

coelomycetes **الفطر المجوف**

زمرة شكلية من الفطور الناقصة ، والتي ينتج أعضاؤها غبيرات في الجسم المثمر (Pycnidia) ، أو رمال الدماغ . والعديد من أفرادها كائنات حية رمامية أو متطفلة على النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الحية الأخرى . يوجد عدة طرق مختلفة لتقسيم هذه المجموعة إلى رتب وفصائل . تتضمن الأجناس الهامة طبياً منها الكوليتوتريكام (Colletotrichum) والمطق (Diplodia) والهندرسونية (Hendersonula) والفوما (Phoma) والسكيتاليديوم (Scytalidium) .

coeloschisis **انشِقاقُ الجَوف**

يسمى أيضاً (Gastroschisis) ، وهو خلل في

مُرَأْسَةٌ مُخِّيَّة **Coenurus cerebralis**


يرقة الشريطية الرأساء ، توجد في دماغ الأغنام (مسببةً الغد و هو مرض عصبي حيواني) ، بالإضافة إلى دماغ الماعز والمجترات وأحياناً الانسان .

مُرَأْسَة **coenurus**

جنس من يرقات الشريطيات من فصيلة المرأسة ، وتسمى أيضاً (Bladder worm) .

تميمُ الإنزيم **coenzyme**

جزيء غير بروتيني عضوي ، غالباً مشتق مفسر للفيتامين الذواب في الماء ، والذي يرتبط مع جزئ البروتين (صميم البروتين) ليكون إنزيم فعال (عميم الإنزيم) ، وعميم الإنزيم هو جزء الوظيفي من الإنزيم الذي يتكون من الصميم والتميم .



الفطر المجوف Coelomycetes

تَميمُ الإنْزيم A **coenzyme A**

هو تميم الإنزيم ، الذي فيه يرتبط حمض البانتوثينيك المفسفر المرتبط بشكل تساهمي إلى

الجدار البطني ينجم عن تمزق الغشاء السلوي أثناء انفتاق العرى المعوية الفيزيولوجي ، أو يكون متأخراً نتيجة تأخر انغلاق الحلقة السرية . ويترافق عادة ببروز الأحشاء .

استِجْوافُ الجِسْم **coelosomy**

انظر تحت celosomia .

المتوسطة **coelothel (=mesothelium)**

انظر تحت mesothelium .

لاحقة بمعنى **coen (o)-**

مخلوي **coenocyte**

1ـ نبات ذات خلايا عديدة النوى محاطة من خلال تجويف جداري . من أمثلتها تلك التي تتواجد في الفطور والطحالب .

2 ـ وحدات هيولية عديدة النوى لا تكون فيها النواة منفصلة بواسطة الجدران .

3ـ نوى الجبلة المجردة لنبات عديد النوى .

مخلوية **coenocytic**

يتعلق أو يمتلك ميزات المخلوية .

داءُ المُرَأسَات (مرض يصيب الأغنام) **coenuriasis**

1ـ أية عدوى بأنواع من المرأسة ، والتي تتواجد فقط تقريباً في الإنسان ، والتي تتواجد في شكل كيسات في الجهاز العصبي المركزي حيث تسد تدفق السائل الدماغي الشوكي ، التي تسبب ارتفاعاً في الضغط داخل القحف ، والذي يمكن أن يكون مميتاً ، وهو مرض يصيب الأغنام يسمى أيضاً داء المرأسة .

2ـ داء الغد (داء عصبي في الحيوانات) .

مُرَأسَة (جنسٌ مِنْ يَرَقات الشَّريطيَّات) **Coenurus**

جنس من يرقات الديدان الشريطية والتي تتألف من كائنات حية شبه شفافة مملوءة بالسوائل ، وتحتوي العديد من الروائس ، والتي تلتصق بالسطح الداخلي لجدار الجوف . هي لا تشكل محافظ للحضن . (محفظة الكيسة العدارية) ، ومنها المرأسة الدماغية ، ويرقاتها تكون موجودة في دماغ الأغنام (تسبب الغد) ودماغ الماعز ، والمجترات الأخرى والإنسان .

مـضـاد الثـرومـبين III في كـونـه يتنبـه بـشكل ملحوظ بواسطة الهيبـارين ، ويختلف عنه بأنه يرتبط و يتـفـعل بواسطة سلفـات الديرمـاتان ، وبكونه لا يثبط أياً من عـوامل التـخثـر المفـعلة الأخرى .

تميم عامل الصفيحات I **platelet cofactorI**

هو عامل VIII .

انظر تحت coagulation factors .

تميم عامل الصفيحات II **platelet cofactorII**

انظر تحت coagulation factors .

تميمُ الإنزيم **coferment**

يسمى أيضاً (Coenzyme) ، (Cofactor) ، وهي مادة غير بروتينية تعزز عـمل الإنزيم أو تكون ضـرورية لـعـمله . وهي أصـغـر حـجـمـاً من الإنزيمات ، وهي قابلة للديال (التحال الدموي) وثابتة بالحرارة . وهناك العديد من الڤيتامينات تعـمـل كـتـمـيـم إنزيمي مـثـل الثـيـامين البيريدكسال .

قَهْوَة **coffee**

1 ـ الحبوب الجافة والمشوية للقهوة العربية أو القهوة اللبيرية .

2 ـ شراب يحضر بغلي أو نقع هذه الحبوب التي تنشط وتقوي وتحفظ الجسم . وهي مفيدة في الربو والصداع والتسمم بالأفيون . تتضمن المادة الفـعـالة : الكافـئين في الحـبـوب وزيت القـهـوة والسكريات والبـروتين والعـديـد من الزيوت المنكهة الطيارة .

سَدٌ مَطَاطِيّ **coffer dam**

وتكتب مـتـصلة (Cofferdam) ، وتسمى أيضاً (Coffer) ، وهي في طب الأسنان حاجز مطاطي يؤمن منطقة عمل جافة .

متلازمة كوفين ـ لوري **Coffin-Lowry syndrome**

[متـلازمـة منسوبة للطبيب جـرانج كـوفين (Grange S.Coffin) ، وهـو طـبـيـب أطفـال أمريكي ، ولد عام 1923 ، والطبيب بريان لوري (Brian Lowry) ، وهو من مواليـد إيرلندا ، وهو

بيتا ـ مركابتوإيثيلامين والأدينوزين 3 ، 5 ـ ثنائي الفسفات . مجموعة الثيول المطرافية إلى بيتا ـ مركابتوإيثانولامين ، والتي تؤستل إنزيمياً لتشكل مركبات إستر الثيول عالية الطاقة مثل الأسيتيل والأسيتوأسـتيل والأحـمـاض الدهنيـة طويلة السلسلة (أسيل) . تلعب إسترات الثيول هذه دوراً مركزياً في التفاعلات الاستقلابية المختلفة . مثال ذلك دورة الحمض الثلاثي الكربوكسيل ، ونقل مجموعات الأستيل وأكسدة الأحماض الدهنية . و يختصر CoA و CoA-SH .

تميم الإنزيم B_{12} **coenzyme B_{12}**

أدينوزيل كوبالامين .

انظر تحت adenosylcobalamine .

انظر تحت methylcobalamin .

تميمُ الإنْزيْم Q **coenzyme Q**

اسم سابق لليوبيكوينون (مركب شحمي في غشاء المتقدرات) .

أزرق **coeruleus**

قلب **coeur**

انظر تحت heart .

قَلْبٌ مَرْكوبيّ **coeur en sabot**

صـورة لَلقلب والذي يشـاهد في الصـورة الشعاعية بزيادة في القطر المستعرض ، وتحدب في الخط السفلي وارتفاع و تدور القمة ، حيث أن شكل القلب يقترح وصفه بشكل مشابه بالحذاء الخشبي . ويلاحظ هذا الشكل أيضاً في رباعي فالو .

استِثارَة مُشتَرَكة **coexcitation**

تنبيه استثاري مشترك ومنسجم من مصدرين مختلفين ، كالاستثارة الجنسية باللمس والنظر .

تميمُ العامِل **cofactor**

عنصر أو جوهر ، مثل تميم الإنزيم حيث يجب أن يتحد مع آخر من أجل القيام بوظيفته .

تميم عامل الهيبارين II **heparin cofactorII**

مثبط للبروتين السيريني من عائلة السيربين . وهو بروتين سكري وحـيـد السلسلة ، Mr= 65.000 ، والتي يثبط الثـرومـبين ، وهو يشبـه

معلومات معرفية تقدمها المراكز الصحية لعموم الناس وبمختلف المستويات لتخدم الأغراض الصحية العامة . كمعلومات عن اللقاحات ومواعيدها ، وطرق انتشار مرض معين لتجنبه .

كوهين **Cohen**

هو ستانلي (Stanley) ، وهو كيميائي حيوي أمريكي ، ولد عام 1922 ، فاز بالاشتراك مع ريتا ليفي مونتالسين (Rita levi-Montalcini) في جائزة نوبل عن الطب أو الفيزيولوجيا عام 1986 لاكتشافاتهم بصدد الآليات التي تنظم بها عوامل النمو الخلية ونمو الأعضاء .

ترابُطٌ مَنْطِقِيّ **coherence**

عمليات الربط بين الأشياء والأفكار بشكل منطقي يقبله العقل .

تماسُك **cohesion**

قوة جاذبة داخل الجزيء تسبب اتحاد الذرات المختلفة للمادة الواحدة .

تماسُكِيّ **cohesive**

يتحد معاً ، أو يتميز بالتماسك .

ذَهَبٌ تَماسُكِيّ **cohesive gold**

ذهب خالص بلا غازات ولا شوائب بحيث يمكن لحمه بالضغط في حرارة الغرفة ، وكان يستعمل في طب الأسنان كحشوات يمكن لحمها في التجويف المحضر جيداً بدرجة حرارة الغرفة .

باحات (مجالات) كونهايم ، نظرية **Cohnheim's areas, (fields) , theory**

[باحات (مجالات) أو نظرية منسوبة للطبيب جوليوس فريدريك كونهايم (Juluius Fridrich Cohnheim) ، وهو اختصاصي باثولوجي ألماني ، (1839-1884)] وهي باحات في الألياف العصبية ، وكذلك فهي تطلق على نظرية تدور حول نشوء الأورام من بقايا جنينية .

انظر تحت area .

انظر تحت theory .

كوهوبَة (مادة مخدرة) **cohoba (=parica)**

طبيب كندي ، عاش في القرن العشرين] .

انظر تحت syndrome .

متلازمة كوفين ـ سيريس **Coffin-Siris syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب جرانج كوفين (Grange S.coffin) ، والطبيب إيفيلين سيريس (Evelyn Siris) ، وهو طبيب أشعة أمريكي عاش ما بين 1914-1987] .

انظر تحت syndrome .

صَفيحَة جَبيرَةِ بحسب كوفين **Coffin split plate**

نوع من أنواع الطبيقات والجبائر السنية المشطورة بحيث يتم الربط بين شطريها بأسلاك فتأخذ أشكالاً تناسب حجم القوس السنية لأي مريض .

تعذر الأداء الحركي العيني بحسب كوجان ، متلازمة **Cogan's oculomotor apraxia, syndrome**

تعذر الأداء الحركي العيني *[المنسوب للطبيب ديفيد جليندينج كوجان (David Glendenning Cogan) ، وهو طبيب عيون أمريكي 1908-1993] .*

انظر تحت syndrome .

مجانس **cogener**

أي أنه من نفس الجنس .

كوجنتين **Cogentin**

الاسم التجاري لمستحضر البنزتروبين ميزيلات ، وهو دواء له خصائص ومضاد للفعل الكوليني .

كوجنيكس **Cognex**

الاسم التجاري لمستحضر التاكرين ، وهو دواء يستخدم في معالجة داء الآلزهايمر .

مَعْرفة **cognition**

تلك العملية التي تجري في الدماغ ، والتي يصبح من خلالها الشخص واعياً للتفكير في الأشياء ، وإدراكها . وتتضمن كل أوجه التعلم والتفكير والتذكر .

مَعْرِفِيّ **cognitive**

يتعلق أو يتميز بالمعرفة .

خَدَماتٌ مَعْرِفِيَّة **cognitive services**

الوشـيـعـة الملتـفـة ذات الدور التـحـريضي والاستثاري .

وَشيعَـةُ الخُيوط **paranemic**
الكروموسومية المُنْعَزِلَة **coil**

الخيطان اللولبية أو الوشيعة التي يمكن عزل خيطانها بدون تشابك .

وَشيعَةُ الخُيوط **plectonemic**
الكروموسومَية المُلْتَفَّة **coil**

الخيطان الكروموسومية المتشابكة التي لا يمكن فصل طيقانها بسهولة لترابطها .

وَشيْعَةٌ عَشْوائيَّة (في البروتين) **random coil**


مَصطلح يستَخدم للإشارة إلى أية بنية بروتينية ثانوية ، والتي لاتملك نموذجاً تكرارياً منتظماً .
مثاله : الحلز (Helix) ، أو الصحيفة .

وَشيْعَة علائقيَّة **relational coil**

فَهي وَحْدَاتُ وَشيعَة الخُيوط الكروموسومية المُلْتَفَّة .
انظر تحت plectonemic coil .

وَشيعَةٌ مُقاوِمَة **resistance coil**

في الكهرباء : الوشيعة التي تعيق وتقاوم مرور التيار .



Chromosome coil **وشيعة الكروموسوم**

انظر تحت parica .

إعَادَةُ التَّقطير **cohobation**
(=redistillation)

التقطير (الترشيح) المتكرر للسائل من نفس المادة .

تَميمُ الهُرْمون **cohormone**

أي هرمون يعمل كمساعد في أعمال هرمونية أو وظيفية أخرى كالميلاتونين الذي يعمل كتميم هرموني لعمل الدوبامين والنواقل العصبية الأخرى .

أترابيَّة **cohort**

1 ـ في الوبائيات ، هي مجموعة من الأفراد يظهرون صفات مميزة شائعة . مثال ذلك : مجموعة من الأشخاص الذين ولدوا في عام واحد (أترابية الميلاد) ، أو مجموعة من الأشخاص الذين يدخلون دراسة استباقية أو اختبارات إكلينيكية ، وهذا المصطلح يعني أيضاً ملاحظة الأفراد خلال مدة من الزمن .
2 ـ فئة تصنيفية مكافئة تقريباً للقسم والرتبة وتحت الرتبة في العديد من طرق التصنيف .

كوهوش (أعْشابٌ طبيَّة في أمريكا الشمالية) **cohosh**

أي من النباتات المختلفة في أمريكيا الشمالية ، مثل الخمانة السفواء ، أو الكوهوش الحمراء ، والكولوفيلوم تياليكتريود (Caulophyllum thalictroides) أوالكوهوش الأزرق و طاردة البق العنقودية الشكل (Cimicifuga racemosa) أو الكوهوش الأسود .

1 ـ وَشيعَة (ج: وَشائع) **coil**
2 ـ مِلفٌ (ج: مِلفّات)

بنية ملفوفة .
انظر تحت spiral .
انظر تحت helix .

وَشيعَةُ الكروموسوم **chromosome coil**

الشكل الوشيعي أو الملتف كالوشيعة بالنسبة للطاق الكروموسومي ، أو الحمض الريبي العادي أو منقوص الأكسجين .

وَشيعَةُ التَّحْريض **induction coil**

جماع غير تام أو معزول ، أو جماع مبتور ، وهو جماع يتم فيه إخراج القضيب من المهبل قبل حدوث القذف ، يستخدم بشكل واسع ، ولكنه طريقة غير موثوقة لمنع الحمل .

عَزْلٌ **coitus interruptus**

إحدى طرق منع الحمل بحدوث القذف المنوي خارج المَهْبل ، بإخراج القضيب قبيل الإرجاز ، والطريقة غير موثوقة بنسبة (10-20) حدوث حمل لكل 100 امرأة/ سنة . وهي طريقة قد تؤدي إلى عدم الانسجام الجنسي والقلق لدى الأنثى أو الذكر أو كليهما .

عَزْل **coitus reservatus**

جماع يتم فيه تثبيط القذف بشكل مقصود .

دَمْعُ أيُّوب **Coix lacryma**

نبات من الفصيلة النجيلية ينتشر في بيت المقدس والشام وبجانب الاسكندرية وقد استعمل في الطب في تورمات الجوف والأورام الظاهرة ولسعات الحشرات والأفاعي والعقارب . ويسمى أيضاً الأمدريان (Coix millet) .

فطر الكوكر **Cokeromyces**

جنس من الفطور من فصيلة عفن الدغلاء (Thamnidiaceae) فطر الكوكر الحجني (Cokeromyces recurvatus) ، قد تم عزله أحياناً من حالات التهاب المثانة والقطارات العفنية .

شيق (أسنان) (المسافة بين الأسنان) **col**

منخفض يشبه الوادي في اللثة ما بين الأسنان والذي يربط ما بين الحليمات الوجهية واللسانية ، ويجعله مطابقاً لشكل مناطق التماس للمناطق البينية القريبة .

سابقة بمعنى اشتراك **col-**

كولامين **colamine**

(=دواء فعال بالسطح) **(=monoethanolamine)**

هو المونوإيثانولامين ، وهو دواء خافض للتوتر السطحي في الصيدلية .

كولاسباز **colaspase**

(= أسْبَاراجيناز) (إنزيم) **(=asparaginase)**

وَشيعَةٌ معْيارِيَّة **standard coil**

وتسمَى وشَيعة جسدية وهي الطيقان الكروموسومية التي تحمل مورثات الصفات الجسدية دون الجنسية .

عَدُّ الدَّراهِم **Coin counting**

حركات الكفين اللا إرادية التي تشبه حركات عد الدراهم التي تظهر في داء باركنسون .

عَدْوَى مُرافِقَة **coinfection**

عدوى أخرى في الوقت نفسه بآلية مرضية منفصلة ، كما في التهاب الكبد B ، والتهاب الكبد D الفيروسي .

سابقة بمعنى الاشْتِرَاك **coino-**

مُطاعِمٌ طَليق **coinosite**

(=cenosite)

كائن حي مطاعم حرة أو غير مثبت ، ويسمى أيضاً (Cenosite) .

تأمِينٌ جُزْئِيّ **coinsurance**

تأمين تشاركي يدفع فيه المريض جزءاً من التكلفة وتدفع شركة التأمين الجزء الباقي .

مُسانِجٌ مُشْتَرَك **coisogeneic**

(= مُجانِي) **(=congenic)**

تتعلق بذريات الحيوانات ذات القربى التي تكون متماثلة التركيب وراثياً باستثناء الاختلاف في المواضع المورثية المفردة .

مسانج مشترك **coisogenic**

انظر تحت coisogeneic .

جِماعِيّ **coital**

يتعلق بالجماع .

جِماع **coition**

انظر تحت coitus .

رُهابُ الجِماع **coitophobia**

الخوف غير الرشيد من الجماع .

جِماع **coitus**

الارتباط أو الاتصال الجنسي في المهبل بين الرجل والمرأة .

عَزْل **coitus incompletus**

(coitus interruptus)

والذي يمكن أن يكون ڤيروسي أو انتان مختلط أو استجابة أرجية. يتميز بالتهاب أنف حاد وارتفاع خفيف في الحرارة والشعور بالقشعريرة. يسمى أيضاً (Common cold).

نَزْلَةٌ أَرَجِيَّة **allergic cold**

تسمى أيضاً (June cold)، وهو الرشح أو الزكام بسبب تحسسي أرجي، ويرادف حمى الكلأ (Hay fever) ومن أنماطها المستثارة بالورود (Rose cold).

خُراجٌ بَارِد **cold abscess**

الخراج الجبني السلي.

كاو بَارِد **cold cautery**

يسمى أيضاً (Cryocautery)، ويطلق على أي مادة غير حرارية كثنائي أكسيد الكربون الثلجي، والهواء السائل والأجهزة الأخرى غير المولدة للحرارة الشديدة ويسبب لمسها تخريب الأنسجة بالبرودة بدل الحرارة.

أَكْرِيلٌ مُصَلَّبٌ بالبُرودَة **cold curing acrylic**

مادة تستعمل في صناعة القوالب والجبائر السنية. ويدخل في تركيبها بنسبة 50٪ من المواد التالية (Polymethylmethacrylate) بالإضافة إلى كمية كافية من موحود ميثاكريلات الميثيب (Methyl methacrylate monomer)، وهو راتين أكريلي يستعمل في الطب وطب الاسنان.

زُكام **common cold**

انظر تحت cold.

نَزْلَةُ حَزيران **June cold**

هي حمى الكلأ.

انظر تحت allergic cold.

نَزْلَةُ الوُرود **rose cold**

أحد أنماط حمى الكلأ، وعاملها المهيج للرشح التحسسي بعض أنواع الورود، ولذلك تسمى (rose hay fever).

انظر تحت allergic cold.

بَارِدُ الدَّم **cold-blooded**

يسمى أيضاً (Poikilothermic)،

هو إنزيم الأسبارجيناز المشتق من الإشريكية القولونية.

1ـ صُفَايَة **colation**

2ـ تَصْفِيَة

1ـ عملية إزالة المواد الصلبة من السوائل، بواسطة التصفية أو الترشيح.

2ـ الناتج من هذه العملية (صفاية).

مِصفَاة **colatorium**

انظر تحت filter.

صُفَايَة **colature**

السائل المستحصل عليه بالتصفية.

كولبينميد **ColBENEMID**

الاسم التجاري لمستحضر البروبينيسيد (Probenecid) مع الكولشيسين (Colchicine).

كولشيسين **colchicine**

قلواني يستحصل عليه من أنواع نبات اللحلاح (Clochicum)، يستخدم في معالجة التهاب المفاصل النقرسي. يرتبط بالنبيبات الدقيقة، ويستخدم في المختبر لوقف الانقسام الخلوي بواسطة تمزيق مغزل الانقسام الفتيلي. تأثيره في النقرس يمكن أن تكون ناتج عن تثبيط هجرة الكريات البيض المحبة إلى مناطق الالتهاب.

اللَحْلاح (نبات) **Colchicum**

جنس من النباتات من فصلية الزنبقيات، ذات الموطن الأوربي والآسيوي. بصيلاتها أو حبوبها الناضجة الجافة هي مصدر للكولشيسين. اللحلاح الخريفي هو الزعفران المرجي (Meadow saffron)، تناول المواشي لكميات زائدة منه يمكن أن تشكو من التهاب الأمعاء المميت.

1ـ بَارِدٌ **cold**

2ـ نَزْلَة

3ـ بَرْدٌ

4ـ الزُكام

1ـ انخفاض في الحرارة والفعالية الفيزيائية أو الفعالية الشعاعية.

2ـ اضطراب نزلي للسبل التنفسية العلوية

فتق يبرز من جدار المهبل .

التِهابُ المَهْبِل والمَثانة **coleocystitis**

الالتهاب الجرثومي أو الفيروسي ، وغير ذلك من الالتهابات التي تصيب المهبل والمثانة في آن واحد .

المُسْتَغمِدة **Coleomitus**

جِنْسٌ منَ الجَراثيم العصوية الشكل وتسمى (Arthromitus) .

مُغْمَّدَاتُ الأَجْنِحَة (رُتبَة من الحَشَرات) **Coleoptera**

هي الخنافس ، التي تمثل رتبة من الحشرات التي تملك أجزاء فموية قوية من أجل المضغ وزوج من الأجنحة الخارجية القاسية التي تقوم بحماية الجسم ، ولكنها ولا تستخدمها من أجل الطيران ، وتغطي أجنحة الطيران الغشائية .

تدلّي القولون **coleoptosis**

يسمى أيضاً (Coloptosis) ، وهي حالة ارتخاء القولون وهبوطه للأسفل وخاصة القسم المستعرض منه .

القضيب **coles**

انظر تحت penis .

البَظْر **coles femininus**

انظر تحت clitoris .

الكوليسيَّة **Colesiota**

جِنْسٌ منَ الجَراثيم صنفها البعض من الكَلاميدَية ، والبعض من الريكتسيات ، وكثيراً ما تسبب التهاب الملتحمة العينية .

كوليستد **Colestid**

الاسم التجاري لمستحضر هيدروكلوريد الكوليستيبول ، وهو دواء خافض لشحميات الدم .

كوليستيبُول **colestipol**

(دواء خافض لشحوم الدم)

يوجد في شكل هيدروكلوريد الكوليستيبول ، وهو راتنج أنيوني التبادل غير ذواب بالماء عالي الوزن الجزيئي يقوم بربط الأحماض الصفراوية في الأمعاء ليشكل مركب معقد يطرح في البراز . يعطى فموياً كمضاد لفرط البروتينات (Hematocryal) ، وهو النوع من الحيوانات التي تسمى ذات الدم البارد والتي تتغير حرارتها الداخلية بتغير حرارة الجو كالزواحف والبرمائيات و بعض النباتات .

بُرودَة **coldness**

الاسم المعبر عن حالة انخفاض الحرارة دون حرارة الجسم بحيث تحسها الأعصاب بأنها باردة .

قُرحَة البَرْد **coldsore**

(= الهربِسُ البَسيط) **(=herpes simplex)**

انظر تحت herpes simplex .

1ـ سابقة بمعنى المَهْبِل **cole-**

2ـ سابقة بمعنى الغِمْد

سابقة بمعنى المهبل أو الغمد .

علامة كول **Cole's sign**

[علامة منسوبة للطبيب ، لويس جريجوري كول (Lewis Gregory Cole) ، وهو طبيب أشعة *أمريكي ، 1874-1954]* . هو تشوه بصلة الإثنا عشري في الصورة الشعاعية .

انظر تحت sign .

تَمَدُّدُ القولون **colectasia**

هي حالة توسع وتمدد لجدار القولون .

إسْتِئْصالُ القولون **colectomy**

استئصال جزء من القولون (استئصال قولون جزئي) ، أو استئصال كامل القولون (استئصال قولون تام) .

استئصال القولون الأيسر **left colectomy**

انظر تحت hemicolectomy .

استئصال القولون الأيمن **right colectomy**

انظر تحت hemicolectomy .

استئصال القولون السيني **sigmoid colectomy**

انظر تحت sigmoidectomy .

1ـ سابقة بمعنى المَهْبِل **coleo-**

2ـ سابقة بمعنى الغِمْد

سابقة بمعنى المهبل أو الغمد .

قيلة مَهْبِلِيَّة **coleocele**

يسمى أيضاً (Colpocele) ، (Vaginocele) ، وهو

انظر تحت vermicular colic .

مَغْصٌ زائدي **appendicular colic**

انظر تحتَ vermicular colic .

مَغْصٌ مَراريّ **biliary colic**

(= مَغْصٌ كَبَديّ) **(=hepatic colic)**

ألم انتيابي معَ أعراض أخرى وخيمة ناتجة عن مرور الحصيات المرارية على طول القناة الصفراوية . يسمى أيضاً مغص الحصيات المرارية (Gallstone colic) أو المغص الكبدي ، أو الألم المراري(Cholecystalgia) .

مَغْصٌ صَفْراويّ **bilious colic**

ألم بطني يترافق مع قيء صفراوي .

مَغْصٌ نُحاسيّ **copper colic**

مغص شديدَ ناتج عن التسمم بالنحاس .

مَغْصٌ مَثانيّ **cystic colic**

الألم التشَنجي الصادر عن المثانة بسبب التهابها أو حصاة فيها .

مَغْصُ ديفونشاير **Devonshire colic**

(= مَغْصٌ رَصاصيّ) **(=lead colic)**

انظر تحت lead colic .

مَغْصٌ مُتَوَطِّن **endemic colic**

شكل خطير من المغص الخاص بالبلدان الحارة .

مغص خيلي **equine colic**

ألم معوي في الخيول ، وأسبابه يمكن أن تتضمن الغازات الزائدة ، وانسداد الأمعاء بالانحشار الغائطي أو بالأجسام الغريبة ، أو بالانفتال ، أو سوء التوضع أو الالتهاب المعوي .

تَطَبُّل ؛ انْتِفاخُ البَطْن **flatulent colic**

(=tympanites)

انظر تحت tympanites .

مَغْصُ الحَصاة الصَّفْراويَّة **gallstone colic**

(=مَغْصٌ مَرَاريّ) **(=biliary colic)**

انظر تحت biliry colic .

مَغْصٌ مَعديّ **gastric colic**

انظر تحتَ gastrodynia .

مَغْصٌ بَاسوريّ **hemorrhoidal colic**

الألم التشَنجي البطني الناتج عن التهاب

الشحمية في الدم في معالجة فرط البروتينات الشحمية العائلي نمط IIa ، والحكة المرافقة للإنسداد الصفراوي الجزئي ، والإسهال الناتج عن زيادة الأحماض الصفراوية في القولون .

الكوليتسيَّة **Colettsia**

جنْسٌ منَ الكلاميدية أو الريكتسيات لم يتفق علَى تصنيفها حتى الآن .

وُجودُ القولونيَّاتِ في الدَّم **colibacillemia**

وجود الإشريكية القولونية في الدم .

داءُ العُصَيَّاتِ القولونيَّة **colibacillosis**

العدوى بالإشريكية القولونية (Escherichia coli) .

داءُ العُصَيَّات القَولونيَّة الحَمْليّ **colibacillosis gravidarum**

عدوى وَخيمة بَالإشريكية القولونية خلال فترة الحمل .

داء العصيات القولونية المعوي **enteric colibacllosis**

(= داء العصيات القولونية المنتج للذيفان المعوي) **(=enterotoxigenic colibacillosis)**

التهاب المعدة والأمعاء القولوني الشكلي .

انظر تحت coliform gastroenteritis .

بيلة العُصَيَّاتِ القولونيَّة **colibacilluria**

وجود الإشريكية القولونية في البول .

العُصَيَّة القولونيَّة **colibacillus**

(= الإشْريكيَّة القولونيَّة) **(=Escherichiacoli)**

انظر تحت Escherichia coli .

colic **1ـ مَغْص**

2ـ قولونيّ

1ـ ألم بطني حاد ، يكون بشكل مميز ألم حشوي متقطع مع تموج (يأخذ شكل متقلب) له علاقة بالحركات التمعجية للعضلات الملساء في الأمعاء .

2ـ انظر تحت colonic .

مَغْصٌ زائديّ **appendiceal colic**

هو مغصَ الزائدة الدودية .

مَغْصٌ بَنْكرِياسيّ **pancreatic colic**
ألم بطني يتسبب عن انسداد القناة الخارجية الإفرازية للبنكرياس .

مَغْص بواتو **Poitou colic**
(= مَغْصٌ رَصاصيّ) **(=lead colic)**
انظر تحت lead colic .

مَغْصٌ كُلْويّ **renal colic**
ألم ينتج عَن الخثار ، أو تسلخ الشريان الكلوي ، أو الاحتشاء الكلوي ، أو الآفات الكتلية داخل الكلوية ، أو مرور الحصيات خلال الجهاز الجامع الكلوي ، أو خثار الوريد الكلوي . يسمى أيضاً (Nephric colic) .

مَغْصٌ لُعابيّ **salivary colic**
آلام بجانب فتحة الغدة اللعابية النكفية عادة أو في منطقة الغدة بالذات ، ويرافقها انتباج وتورم في الغدة ، وتحدث الحالة بشكل هجمات تتوافق مع انسداد القناة الغدية بحصاة كلسية عادة .

مَغْصٌ رَمْليّ (لدى الحيوانات) **sand colic**
عسر هضم مزمن في الخيول و المواشي ناتج عن وجود رمال في المعدة أو الأمعاء والتي تكون متناولة مع الطعام أو الشراب .

مَغْصٌ رَصاصيّ **saturnine colic**
(=lead colic)
انظر تحت lead colic .

مَغْصٌ غائطيّ **stercoral colic**
مغص معَوَي ناتج عن تراكم الغائط .

مَغْصٌ بُوقيّ **tubal colic**
تقلص تشَنجي مؤلم لنفير فالوب .

مَغْصٌ حالبيّ **ureteral colic**
ألم مغصيّ ناتج عن انسداد الحالب .

مَغْصٌ رَحميّ **uterine colic**
انظر تحت hysteralgia .

مَغْصٌ زائديّ **vermicular colic**
حالة منَ المغص تصاحب التهاب الزائدة الدودية كنتيجة لانسداد مخرج الزائدة . يسمى أيضاً (Appendicular colic) .

باسور ، أو تخريش .

مَغْصٌ كَبديّ **hepatic colic**
انظر تحت biliary colic .

مَغْصٌ طِفْليّ **infantile colic**
ألم بطنيَ انتيابي حميد يصيب الأطفال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحياة .

مَغْصٌ معَويّ **intestinal colic**
مغص ينشأ من الأمعاء الدقيقة ، وبشكل مميز يكون توضعه حول السرة .

مَغْصٌ كُلْويّ **kidney colic**
ألم قرب النخاع (العمود الفقاري) ، وينتشر على مسار الحالبين ويكون نتيجة لمصدر كلوي ؛ كحدوث تحرك لحصاة في الحويضة الكلوية .

مَغْصٌ رَصاصيّ **lead colic**
مغص ناتج عَن التسمم بالرصاص . يسمى أيضاً مغص ديفونشاير ، ومغص بواتو(Poitou) أو مغص الدهانين (Painters' colic) .

مَغْصُ العقْي **meconial colic**
الألم البطني بشكل مغص معوي يعاني منه الوليد الحديث . وحتى الشهر الأول ، ويترافق عادة بخروج العقي .

مَغْصٌ حَيْضيّ **menstrual colic**
انظر تحت dysmenorrhea .

مَغْصٌ لَبَنيّ **milk colic**
الألم البطني مغصي الشكل بعد تناول الحليب إذا كان الشخص مصاباً بنقص إنزيم اللاكتاز المسؤول عن هضم سكر اللبن . وهي الحالة المعروفة بعدم تحمل اللاكتوز .

مَغْصٌ كُلْويّ **nephric colic**
(=renal colic)
انظر تحت renal colic .

مَغْصٌ مَبيضيّ **ovarian colic**
انظر تحت oophoralgia .

مَغْصُ الدَّهَّانين **painters' colic**
(=مَغْصٌ رَصاصيّ) **(=lead colic)**
انظر تحت lead colic .

الخلوي و يضعف أجهزة نقل الإلكترون ، أو الوظيفة الغشائية ، أو التركيب الجزيئي ، أو انتاج الطاقة .

مُوَلِّدٌ للكوليسين **colicinogen**

(جرثوم من القولونيات)

مولد للمبيد الجرثومي ، وهو بلازميدة في بعض ذريات العصيات القولونية التي تحث افراز الكوليسين المقابل . بعض مولدات الكوليسين أيضاً تلعب دور العوامل الجنسية .

مُوَلِّدٌ للكوليسين **colicinogenic**

(جرثوم من القولونيات)

إنتاج الكوليسين من ذريات الإشريكية القولونية .

تَوْلِيْدُ الكوليسين **colicinogeny**

انظر تحت colicinogen .

1ـ مَمْغوص **colicky**

2ـ مَغْصِيّ

يتعلق أو يتأثر بالمغص .

مَغْصٌ شَلَلِيٌّ رَصاصِيّ **colicoplegia**

مغص ناتج عن التسمم بالرصاص ويصاحبه شلل رصاصي أيضاً .

التِهابُ المَثانَةِ بالقولونيَّات **colicystitis**

التهاب المثانة ، والمتسبب عن حدوثه وجود الإشريكية القولونية .

التِهابُ المَثانَةِ والحُوَيْضَةِ بالقولونيَّات **colicysto-pyelitis**

القولونيَّات (جراثيم سلبية الجرام) **coliform**

1ـ مصطلح جماعي (عام) يشير إلى عيدان معوية ، تخمرية سلبية الجرام ، وأحياناً تكون مقيدة على العصيات المعوية سلبية الجرام المخمرة للاكتوز كالليمونية والإدواردسيلة والأمعائيات والإشريكية والكلبسيلة ، والسراتية .

2ـ أية كائن حي من تلك المجموعة (القولونيات) .

تخاطط؛ تسامُت **colinearity**

التوافق ما بين التسلسل الخطي للروامز

مَغْصٌ ديدانيّ **verminous colic**

مغص ناتج عن وجود الديدان المعوية . يسمى أيضاً (Worm colic) .

مَغْصُ الأَرْياح **wind colic**

الألم البطني التشنجي بسبب توتر الأمعاء بكثرة نتاج الغازات ، وتحدث في التخمرات وتهيج القولون .

مَغْصٌ ديدانيّ **worm colic**

انظر تحت verminous colic .

مَغْصٌ زَنْكيّ **zinc colic**

المغص النَاتج عن التسمم المزمن بالزنك .

1ـ مَغْص **colica**

2ـ قولونيّ

صفة منسوبة للقولون ، وقد يراد به الشريان القولوني بالذات (Colic artery) ، كما قد يستعمل بمعنى المغص البطني القولوني .

مَغْصٌ مُخاطيّ **colica mucosa**

هو الْتِهابُ القَولون المُخاطيُّ (Mucous colitis) ، (Mucocolitis) ، (Myxomembranous colitis) ، وهي إصابة الغشاء المخاطي بالالتهاب المترافق بالمغص والإمساك أو الإسهال أو تناوبهما معاً مع غزارة المخاط فيه .

مَغْصٌ رَصاصِيّ **colica pictonum**

يسمى أيضاً (Lead colic) ، (Devonshire colic) ، (Painter's colic) ، (Saturnine colic) وهو ألم بطني شديد يرافقه الإمساك مع الأعراض الأخرى للتسمم بالرصاص .

عُسْرُ الطَّمْث **colica scortorum**

يسمى أيضاً (Dysmenorrheal) ، (Menorrhalgia) ، وهي الآلام المرافقة للطمث .

كوليسين **colicin**

(بروتين تفرزه بعض الجراثيم القولونية)

مبيد جرثومي ، والذي يفرز من ذريات مولدة للكوليسين من الإشريكية القولونية والشيجلية السونية التي تكون مميتة للذريات الجرثومية شديدة الصلة بها . يرتبط الكوليسين النوعي بالمستقبلات النوعية المتوضعة على الغشاء

بشكل نوعي تجاه العديد من الجراثيم سلبية الجرام ، وخصوصاً الزائفة الزنجارية ، لكن أيضاً مفيدة تجاه عضيات أخرى تتضمن العصيات القولونية الإشريكية وأنواع الجراثيم الهوائية والكلبسيلة والشيجيلة والبروسيلة . نوع المتقلبة تكون مقاومة .

سلفات الكوليستين **colistin sulfate**

ملح السلفات للكوليستين يتواجد كبودرة بيضاء كريمية اللون مسترطبة . تستخدم في معالجة العديد من الإصابات الانتانية الجهازية للجهاز البولي والهضمي والعيني والأذني الناتج عن التعرض للجراثيم السلبية الجرام ، يعطى فموياً وحقناً وموضعياً .

التهابات القولون **colitides**

التهابات القولون ، اضطرابات التهابية للقولون تؤخذ بعين الاعتبار بشكل مجموعي .

التهابُ القولون **colitis**

هو التهاب يحدث في القولون .

انظر تحت enterocolitis .

الْتهابُ القَولون الأميبيّ **amebic colitis**

اَنظر تحت desentry .

الْتهابُ القَولون المُرافقُ لِلمُضادَّات الحَيَويَّة **antibiotic-associated colitis**

التهاب القولون المرافق للمضادات الحيوية .

انظر تحت enteroclitis .

الْتهابُ القَولون بالقرْبيَّات **balantidial colitis**

اَلتهاب قولون ناجِ َعَن تناول القربة القولونية .

التهاب القولون بالمسهلات **cathartic colitis**

التهاب القولون الناتج عن التناول المسرف للمليّنات المزمن .

التهاب القولون الكيميائي **chemical colitis**

التهاب قولون كاستجابة للغرس الكيميائي عبر المستقيم .

الْتهابُ القَولون الكيسيُّ العَميق **colitis cystica profunda**

حالة تَتميز بالكيسات المخاطية الاحتباسية في تحت المخاطية القولونية وهي مميزة لشفاء الآفات النوكليوتيدية والرنا مع التسلسل الخطي للأحماض الأمينية في عديدات الببتيد المشفرة بذلك التسلسل . هذا المفهوم المطلق هو الذي يمثله نموذج واطسون ـ كريك (للحلز المزدوج في الجينات) لبنية الدنا (DNA) .

التِهابُ الكليَةِ بالقولونيَّات **colinephritis**

التهاب الكلية بالعصيات القولونية .

كوليباز **colipase**

الكوليبازهو عامل مساعد لليباز البنكرياسي ، يفرز من خلايا العنيبات البنكرياسية كطليعة إنزيم ويفعل بواسطة الحلمهة الانشطارية بإنزيم التريبسين .

عاثِيَة العُصَيَّةِ القولونيَّة **coliphage**

هي أي ڤيروس حال للجراثيم التي تصيب الإشريكية القولونية .

العاضيات **Coliphorina**

رتيبة من المهدبات من الأوالي ذات النوى الحقيقية ومتغايرات الأهداب .

تثنِيَة القولون **coliplication (=coloplication)**

تثنيات تتواجد القولون .

بَزْلُ القولون **colipuncture (=colocentesis)**

انظر تحت colocentesis .

العَدْوَى بالقولونيَّات **colisepsis**

وجود عدوى إنتانية بالجراثيم القولونية .

كوليستيميثات (مُضادٌ حيَوِيّ) **colistimethate**

الاسم الكيميائي هو حمض كوليستيميثان سولفونيك خماسي الصوديوم . يشتق ملح خماسي الصوديوم للميثان سولفونات من الكوليستين ، وله وظائف واستخدامات شبيهة لذلك للمركب الأساسي (الكوليستين) . يعطى عضلياً أو وريدياً .

كوليستين (مُضادٌ حيَوِيّ) **colistin**

هو مضاد حيوي عديد الببتيد لمجموعة البوليميكسين ، ينتج بواسطة نمو جراثيم التربة نوع العصويات المخاطة . الكوليستين فعال

القـولـون تحت التـام . قـد يكـون لاعـرضـيـاً أو يتظاهر بزحير وألم شرجي مستقيمي و نجيج مستقـيـمي مدمى . يزول بعد إعـادة المفاغـرة للأمعاء .

التهاب القولون بالإيرليخية الخيلية **equine ehrlichial colitis**

داء وحيدات الخلية الإيرليخية الخيلية .

انظر تحت equine moncytic ehrlichiosis .

اَلْتهابُ القَولون اَلورَمي ُّ الحُبَيبي ُّ **granulomatous colitis**

التهاَب قـولوَن يصيب كـامل الجدار مع تشكل الأورام الحبيبة اللاتجبنية .

التهاب القولون النزفي **hemorrhagic colitis**

عادة داء إسهالي غير مصحوب بحمى يتسبب عن العصيات القولونية الأشريكية ذات النمط المصلي O157 ؛ H57 ، ويتمـيز بالمعص البطني والإسهال المائي والذي يترقى إلى اسهال مدمى بعد يوم أو يومين . وهو عادةً محدد لذاته لكن يمكن أن يصاحب بمضاعفات مثل متلازمة انحلال الدم ـ اليوريمية .

التهاب القـولون العدوائي **infectious colitis**

التهاب القولون المتسبب عن العوامل المعدية .

التهاب القولون التشعيعي **irradiation colitis**

انظر تحت radiation colitis .

اَلْتهابُ القَولون الإِقْفاري ُّ **ischemic colitis**

قصور وعـائي حاَد فيَ القـولون عـادةً ما يصيب الجزء الذي يتروى بالشريان المساريقي السفلي ، وتتضـمن الأعراض الألم في الحفرة الحرقفية اليسـرى والإسـهال المدمى وحـمى منخفـضـة الدرجـة والتـمـدد والإيلام البطني . العـلامـة الشعاعية الكلاسيكية هي الانطباعات الإبهامية الناتجة عن الارتفاع الموضعي للمخاطية بسبب النزف أو الوذمة تحت المخاطية يمكن أن تتبع تلك الحالة بالتقرح .

التهاب القـولون اللمفاوي **lymphocytic colitis**

هو التهاب القـولون المجهري ، وهو شكل شبيه بالتـهـاب القـولون الكولاجـيني لكـن بدون المزمنة للزحار العصوي .

اَلْتهُابُ القَولون اَلكيسي ُّ السَّطْحي ُّ **colitis cystica superficialis**

حالة كَيسية للغَشاء الخاطي للقولون يشاهد أحيـاناً في الأطفال مع بعض الأمـراض المزمنة المضعفة مثل ابيضاض الدم ، وبشكل محتمل كنتيجة لسوء التغذية والعوز الڤيتاميني .

اَلْتهابُ القَولون الوَخيم **colitis gravis**

اَنظر تحت ulcerative colitis .

اَلْتهابُ القَولون السَّليلي ُّ **colitis polyposa**

هَو التهاب قولون تقرَحي مع تشكل السليلات الكاذبة (توذم والتهاب جزر الخاطية بين مناطق التقرح) .

اَلْتهابُ القَولون التَّقَرُّحي **colitis ulcerativa**

(=ulcerative colitis)

عبارة عن تقرحات متكررة مزمنة في القولون ، بشكل رئـيـسي في المخـاطيـة و تحت المخـاطيـة لأسـباب مجهـولة . يتظاهـر سريرياً بألم بطني معصي (Cramping) ونزف مستقيمي ونجيج دموي سائب و قيحي و مخاطي مع جسيمات برازية نزيرة . تتضـمن المضـاعفـات البـواسـير والخـراجـات والنواسـيـر وانثـقـاب القـولون والسليلات الكاذبة والسرطانة .

التهاب القولون الكولاجيني **collagenous collitis**

نمط من التهاب القولون لسببيات غير معروفة ، يتـمـيـز بتكدس مـادة الكـولاجين تحت ظهـارة القـولون مع ألم بطني معصي وتناقص ملحوظ في امـتـصـاص الماء والكـهـرليـات مـؤدياً إلى الإسهال المائي ، لايوجـد تقرحات مخاطية في هذا النمط .

التهاب القولون لكرون **Crohn`s colitis**

انظر تحت disease .

التهاب القولون التحويلي **diversion colitis**

هو التهاب القطعة البعيدة من القولون المعطلة الوظيفـة بتـحـويل مـجرى البراز بواسطة قطع

والانســداد الجـزئي أو التـام . يســمى أيضـاً (Irradition colitis) ، و (Radiation enteritis) .

الْتهابُ القَولون النَّاحيّ **regional colitis**

وَيسمى أيضاً التهابَ القولون القسمي هو داء التهابي حبيبي أو التهاب كامل جدار القولون ، التهاب أمعاء ناحي يكتنف القولون . يمكن أن يترافق مع تقرح ، أو تضيق ، أو نواسير .

الْتهابُ القَولون القطْعيّ **segmental colitis**

ويسمى أيضاً الْتهابُ القَولون النَّاحيُّ أو المنطقي ، وهو مَرَض يصيب أي قطعةَ من القولون وقد يصيب أو لا يصيب معه الأمعاء الدقيقة ، وهو مرض ورمي حبيبي كداء كرون ، ويعتبر وحدة مرضية مستقلة عن التهاب القولون القرحي .

التهاب القولون الصابوني **soap colitis**

التهاب القولون الصابوني ، التهاب القولون كاستجابة لحقن ماء الصابون .

الْتهابُ القَولون التَّشَنُّجيّ **spastic colitis**

يسمى أيضاً (Irritable bowel syndrome) ، (Nervous colon syndrome) ، (Mucous colitis) .

انظر تحت colica mucosa .

الْتهابُ كَامل جدار القَولون **transmural colitis**

هو التهاب يصيب كامل ثخانة الأمعاء ، فضلاً على أنه داء المخاطية وتحت المخاطية ، فإنه عادةً ما يترافق مع تشكل أورام حبيبية لا تجبنية . يمكن أن يكون محدوداً بالقولون أو بشكل قطعي أو بشكل منتشر . يمكن أن يترافق مع داء الأمعاء الدقيقة (التهاب الأمعاء الناحي) . وإكلينيكياً يمكن أن يتشابه مع التهاب القولون التقرحي ، لكن التقرحات غالباً ما تكون طولية أو عميقة ، والمرض غالباً قطعي ، وتشكل التضيقات شائع والنواسير بشكل خاص في العجان ، وكلها مضاعفات كثيرة التواتر ومتكررةَ .


الْتهابُ القَولون اليوريمي **uremic colitis**

هو التهاب القولون الذي ينتج عن يوريمية رواسب في المناطق تحت المخاطية . يتميز بتناقص السائل الممتص مع إسهال مزمن وبدون تقرحات .

الْتهابُ القَولون المُخاطيّ **mucous colitis**

مَصطلح شكلي لمتلازمَة القولون المتهيج .

انظر تحت syndrome .



الْتهابُ القَولون التَّقَرُّحيُّ
Colitis ulcerativa

الْتهابُ القَولون المُخاطيّ الغشائيّ **myxomembranous colitis**

قد يحَدث في حالات من استعمال بعض المضادات الحيوية مثل الكلنداميسين . ويسمى أيضاً (Mucous colitis) ، (Mucocolitis) .

التهاب القولون الأميبي المنخر **necrotizing amebic colitis**

التهاب القولون الأميبي المنخر .

انظر تحت pancolitis .

الْتهابُ القَولون الطُّفَيليّ **parasitic colitis**

اَلتهاب القولون بالطفيليات كالمتحول الزحاري أو المشعرة .

الْتهابُ القَولون الغشائيّ الكاذب **pseudomembranous colitis**

انظر تحت enterocolitis .

التهاب القولون الشعاعي **radiation colitis**

التهاب القولون الناجم عن المعالجة الشعاعية لمنطقة البطن ، يتميز بالزحير والألم والنزف المستقيمي والإسهال وتوسع الشعيرات ، والتي يمكن أن تترقى إلى سوء الامتصاص والتقرحات

غير ليفية وغير دورية لكنها شبكات بنيوية .
يتحول الكولاجين إلى جيلاتين بالغليان .
انظر تحت disease .
انظر تحت fibril .
انظر تحت fiber .

لُيَيفاتٌ كولاجينية **collagen fibrils**

اللييفات التي تشكل الليف الكولاجيني وتتراوح بين 20-200 نانومتر طولاً ويبلغ قطرها 100 نانومتر وتكون الأكبر طولاً وقطراً في الأوتار .

كولاجينٌ ليفيٌّ طَويلُ الفَوَاصِل **fibrous long-spacing collagen**

مختصرها هو (FLS) ، وتظهر دورية الليفات في المنظر المجهري الدقيق بمسافات لا تقل عن 67 نانومتر .

كولاجينٌ قطعيٌّ طَويلُ الفَوَاصِل **segment long-spacing collagen**

طول القطعة الكولاجينية بين فاصلين .

كولاجيناز (إنزيم) **collagenase**

إنزيم يحفز هدرلة الروابط الببتيدية في المناطق الحلزونية الثلاثية للكولاجين .

كولاجيناز المطثية النسجية **Clostridium histolyticum collagenase**

أي من الأشكال المختلفة من الكولاجيناز الجرثومي المعزول من المطثيات النسجية ، والتي تحفز انشطار الكولاجين إلى شدف صغيرة ، وشاطرةً النهاية N في المنطقة الحلزونية الثلاثية إلى ثمالات الجليسين . إنزيم الزنك الخارج خلوي يدرك الهيكل الكولاجيني للعضلات مسهلةً بذلك انتشار الجانجرين الغازي بواسطة المطثيات النسجية .

الكولاجيناز الخلالي **interstitial collaginase**

أي من مجموعة الإنزيمات من زمرة الهيدرولاز التي تحفز انشطار الكولاجين الأصلي (الأهلي) ، وعادةً في الرابطة جليسين ـ لوسين أو الرابطة جليسين ـ أيزولوسين . المجموعة الأفضل دراسةً هي تلك التي تشطر الفشل الكلوي المزمن .

كوليتوز **colitose**

كوليتوز ، سكر غير اعتيادي يتواجد في السلاسل O النوعية في عديدات السكاريد لأنماط مصلية محددة من السلمونيلة الإشريكية القولونية .

تَسَمُّمُ الدَّم بالعُصَيَّاتِ القولونيَّة **colitoxemia**

تسمم الدم بالإشريكية القولونية .

التَّسَمُّمُ بالعُصَيَّاتِ القولونيَّة **colitoxicosis**

التسمم المتسبب بالإشريكيات القولونية .

ذيفانُ العُصَيَّاتِ القولونيَّة **colitoxin**

مادة تحتويها القولونية الإشريكية والتي تشكل سبب التسمم .

بيلةُ العُصَيَّاتِ القولونيَّة **coliuria**

وجود الإشراكية القولونية في البول .

1ـ أعْنَاق (ف: عُنق) **colla (sing.collum)**
2ـ رقاب (ف: رَقَبَة)

مصطلح جمع مفرد عنق أو رقبة .
انظر تحت collum .

كولاسين **collacin**

نسيج كولاجيني متنكس ، ويسمى أيضاً (collastin) .

كولاجين **collagen**

أي من المواد الخارج خلوية التي ترتبط بشكل وثيق بالبروتينات والتي تتواجد كمركب رئيسي للنسيج الضام ، معطيةً إياه القوة و المرونة . يوجد على الأقل 14 نمطاً ، كل واحد منها مكون من وحدات التربوكولاجين التي تشارك في تشكيل شكلاً حلزونياً ثلاثياً لكن تختلف إلى حد ما في التركيب بين الأنماط ، ما بين أنماط تتوضع في أنسجة أو مراحل أو وظائف مختلفة . في بعض الأنماط وهي التي تشكل الأنماط الأكثر شيوعاً كالنمط الأول ، تترافق عيدان التربوكولاجين لتشكل الليفات والألياف . بينما في الأنماط الأخرى لا تكون العيدان ليفية لكن تترافق مع الكولاجين الليفي ، وتشكل في الأنماط الأخرى شبكات

مكوناً الكولاجين أو مكوناً ألياف الكولاجين .

تحلُّلُ الكولاجين **collagenolysis**

يقصد به تحلل الكولاجين ، أو انهضام (هضم) الكولاجين .

حالُّ الكولاجين **collagenolytic**

فعال في هضم الكولاجين .

وَرَمٌ كولاجينيّ **collagenoma**

الورم الناشئ على حساب الألياف الكولاجينية أو تكون الألياف الكولاجينية غزيرة فيه . كالورم الكولاجيني الجلدي العائلي .

داءٌ كولاجينيّ **collagenosis**

داء يصيب الألياف الكولاجينية بشكل واسع في النسيج الضام ، وتسمى أيضاً (Collagen-vascular diseases) لأنها قد تصيب النسيج الضام البطاني أو تحت البطاني في الأوعية الدموية . وبعض هذه الأمراض من أمراض المناعة الذاتية . ونجد فيها الأضداد المضادة للنوى .

كولاجينيّ **collagenous**

يتعلق بالكولاجين ، ويشكل أو ينتج الكولاجين .

1 ـ يُصابُ بالهُبُوط؛ يُصابُ بالوَهَط **collapse**

2 ـ يَنْخَمِص

3 ـ هُبُوْط؛ وَهَط (دورانيّ)

4 ـ انْخِماصٌ (للنسج والأعضاء)

1 ـ حالة من الإعياء التام و الهمود ، مع فشل (وهط) دوراني .

2 ـ انخماص (تدلي) شاذ أو غير طبيعي في جدر أي جزء أو عضو .

انْخمَاصُ الأَسْنَاخ **alveolar collapse**

انطباق جدر الأسناخ الرئوية على بعضها ، وهو ما يحدث في حالات الانخماص الرئوي الفصي أو الشامل عند حدوث الاسترواح الصدري مثلاً .

وَهَطٌ قَلْبِيٌّ وعائيّ **cardiovascular collapse**

هبوط الضغط الشرياني دون الحدود الطبيعية .

وَهَطٌ دَوَرانيّ **circulatory collapse**

الكولاجينات الليفية إلى الشدف النهائية N الكبيرة (75٪) والشدف النهائية C الصغيرة (25٪ لكل سم) . تتطلب هذه الإنزيمات الزنك ، وتتواجد بشكل واسع في الفقرات وهي التي تكتنف في تدرك الكولاجين خلال الإصلاح النسجي أو خلال التطور المضغي والجنيني . ويسمى أيضاً (Vertebrate collagenase) .

الكولاجيناز الجرثومي **microbial collagenase**

أي من أنواع الكولاجيناز المختلفة المنقاة من الجراثيم المتنوعة ، خصوصاً من المطثيات النسجية ، وهي تقوم بشطر الكولاجين على جهة النهاية N لثمالات الجليسين بشكل تفضيلي وتتواجد في العديد من الزمر للأنواع المختلفة من الجراثيم .

تولُّدُ الكولاجين **collagenation**

مظهر الكولاجين في الغضروف المتطور .

مُوَلِّدُ الكولاجين **collagenic**

1 ـ انظر تحت collagenous .

2 ـ انظر تحت collagenogenic .

التِهابُ الكولاجين **collagenitis**

تفاعل التهابي يصيب الألياف الكولاجينية في المكونات الليفية من النسيج الضام ويتصف بالألم والتورم والحمى القصيرة الأمد وارتفاع سرعة التثفل .

أرومَةٌ كولاجينيَّة **collagenoblast**

خلايا تنشأ من الأرومة الليفية وعندما تنضج فإنها تترافق مع انتاج الكولاجين . يمكن أن تشكل الغضروف والعظم بواسطة الحؤول . تتكاثر الأرومة الكولاجينية في موضع الالتهاب المزمن . أحياناً تسمى أيضاً (Collagenoblast) .

خَلِيَّةٌ كولاجينيَّة **collagenocyte**

الخلايا الناضجة المنتجة للكولاجين .

انظر تحت collagenoblast .

مُوَلِّدٌ للكولاجين **collagenogenic**

مصطلح يتعلق أو يتميز بإنتاج الكولاجين ،

حول الرقبة في البلاغرا)
شريط من الاحمرار حول العنق المعرض للضياء في البلاجرا .
انظر تحت neck lace .

الطوق الرقبي **cervical collar**
انظر تحت cervicalorthosis .

الطوق الوريدي حول الأورطي **circumaortic venous collar**
هو تشوه وعائي نادر حيث يكون فيه الوريد الكلوي الأيسر محيطاً بالوريد الأجوف السفلي وضاغطاً إياه . ويسمى أيضاً بالحلقة الوريدية حول الأورطي (Circumaortic venous ring) .

تاجٌ طَوقيّ **collar crown**
تاج اصطناعي يحيط برقبة جذر سن طبيعية .

طَوقُ اللُّؤلُؤ **collar of pearls**
(= وَضَحٌ زُهْري) (=syphilitic leukoderma)
انظر تحت syphilitic leukoderma leukoderma

طَوقُ ستُوكْز **collar of Stokes**
تَوَرُّمٌ وذمي في العنق بسبب مرض الأجوف العلوي)
تورم وذمي في العنق والأجزاء الرخوة من الصدر في متلازمة الأجوف العلوي .

طَوقُ الزُّهَرَة **collar of Venus**
هو زوال أو خفة لون الزهيرة في الإفرنجي الثانوي تاركة مناطق شبكية بلا صباغ وأخرى مفرطة التصبغ وتتوضع بشكل رئيسي على جانبي العنق ، ويسمى أيضاً وَضَحٌ زُهْريّ (Syphilitic leukoderma) ، (Leukoderma col-li) ، (Melanoleukoderma colli) .

خُراجٌ شَبيهٌ بزِرِّ القَميْص **collar stud abscess**
يسمى أيضاً خُراجٌ خُرْجيّ وهو عدوى قيحية حادة تحفر في النسج حفرتين بينهما ممر ضيق يشبه زر القميص أو القبة . كما يشبه منظر الخراج في الجهتين .

طَوقُ سمْحاق العَظْم **periosteal bone collar**
شريط من العظم الإسفنجي الذي يتشكل حول منتصف الجدل (الجزء الاسطواني الطويل من

صدمة ، قصور دوراني دون وجود فشل قلب احتقاني .

انْخماصُ الرِّئَة **collapse of the lung**
حَالة لا هوائية أو جنينية لكل أو لجزء من الرئة ، كما يشاهد في الانخماص الناتج عن الانسداد القصبي واسترواح الصدر .

انْخمَاصُ الشُّعَيْرَات الكُبَيِّة **glomerular capillary collapse**
توهط وانطباق جدر الشعيرات الدموية الكبيبية في الكليتين .

وَهَطٌ حَراريّ **heat collapse**
انخفاض الضغط الشرياني وتغيب الوعي أو الغشي حسب شدة ومدة الوهط الوعائي بسبب حرارة الجو والقيام بالتمارين ضمن جو ساخن ، قد يسبب ارتفاع الحرارة الداخلية الشديدة وخاصة عند ارتداء ثياب تحبس الإشعاع الحراري . وقد تصل الحالة إلى درجة الضربة الحرارية .

انْخمَاصٌ جَسيم **massive collapse**
حَالة تصبح فيها كامل الرئة لا هوائية ، وغالباً ما تكون ناتجة عن انسداد في القصبة الرئيسية .

الانخماص الزورقي الهلالي المترقي **scapholunate advanced collapse**
شكل شائع لالتهاب المفاصل التنكسي للمعصم ، مع خسارة تدريجية للرباط الداعم الناتج عن سوء التنضيد المزمن للعظم الزورقي ، ينتج عنه تشوه تدويري .

collapsed **1ـ مصاب بالهُبُوط؛ الوَهط 2ـ مُنْخمِصٌ**
صفة لكل ما هو متوهط هابط الضغط .

collar **طوق**
شريط محيط عادةً حول العنق .

طَوقُ بيت **Biett's collar**
حلقات متوسعة حول الحطاطات في الزُّهْري الثانوي .

طَوقُ كازال **Casal's collar**
(مساحة من الاحمرار

الإصابات الرياضية . وتسمى أيضاً (Clavicle) ، (Channel-bone) .

تاجٌ طوقيّ **collar-crown**

طوَيق **collarette**

1 ـ حافة ضيقة من الكيراتين الرخو التي تعلو محيط الآفات الجلدية المتحددة ، والتي تتعلق بالمحيط الجلدي السليم ، خصوصاً في داء المونيليا والنخالية الوردية .

2 ـ خط غير منتظم ومثلم يقسم السطح الأمامي للقزحية إلى منطقتين .

3 ـ في علم الفطريات ، الحلقة حول قمة الفيالة الناتجة عن التمزق الحاصل عند تحرر البوغ الفيالي الأولي .

طُوَيق بيت **collarette of Biet**

هو نمَط من الحطاطات الزهرية حيث يكون المركز الحطاطي محاطاً بواسطة حلقة الحراشف .

طُوَيقُ القُزَحيَّة **iris collarette**

خط متعرجَ غير منتظم يقسم السطح الأمامي للقزحية إلى منطقتين .

العظم) للعظم الباكر .

طوق فيلادلفيا **philadelphia collar**

نمط من أنواع المقوام الرقبي التي تقيد حركة العنق الأمامية الخلفية لأقصى درجة لكن تتيح بعض الدوران الطبيعي والانحناء الجانبي .

الطَّوقُ الإِسْبانيّ **Spanish collar**

(= جُلاَع) **(=paraphimosis)**

(انكماش القلفة الذي يسبب انضغاط الحشفة)

جلاع أو انكماش جلد القلفة المتضيقة .

انظر تحت paraphimosis .


طَوقُ الأَمْرَاضِ المَنْقُولَة جنسيّاً **venereal collar**

(=وَضَحٌ زُهْرَيّ) **(=syphilitic leukoderma)**

طوق الداء الزهَري ، أو وضح زهري .

التَرْقوَة **collar-bone**

هو عظم طويل اسطواني منحن ويشكل زوجاً منه القسم الأمامي من الحزام الكَتفي في الجهتين وتتمفصل كل ترقوة وحشياً مع عظم الكتف (لوح الكتف) وأنسيّاً مع قبضة القص (عظم الصدر breastbone) وإنّ كسر عظم الترقوة من



Collapse of the lung **انخماص الرئة**

شؤونهم واحتياجاتهم .

collector **جامع**

صفة أي خزان أو وعاء تصب فيه منتجات أخرى من موارد مختلفة .

collenchyma **التَّسيجُ الغَرَوِيّ**

أحد مكونات الميريستيم النباتي وتتألف من خلايا ذات جدار سليم يحفظ جبلة الخلية .

Colles' fascia, fragment, ligament, space **لفافة، شدفة، رباط، مسافة كوليز**

[لفافة ، أو شدفة ، أو رباط ، أو مسافة منسوبة للطبيب كوليز أبراهام (Abraham Colles) ، وهو جراح إيرلندي (1773-1843)] .

انظر تحت fascia diaphragmatis urogenitalis .

انظر تحت ligamentum inguinale reflexum .

انظر تحت fracture .

انظر تحت space .

Collet-Sicard syndrome **متلازمة كوليه ـ سيكارد**

[متلازمة منسوبة للطبيب كوليه ف . ج (F.J.Collet) ، جون أثاناز سيكارد (Jean Athanase Sicard) وهو طبيب عصبية فرنسي (1872-1929)] .

انظر تحت Collet's syndrome .

Collet's syndrome **متلازمة كوليه**

[متلازمة منسوبة للطبيب فريدريك جوستان كوليه (Frederic Justin Collet) ، وهو طبيب حنجرة فرنسي ، ولد 1870] .

انظر تحت syndrome .

colletotrichum **كوليتوتريكوم**

جنس من الفطريات الناقصة من الزمرة الشكلية للفطريات المجوفة . بعض الأنواع قد تم عزلها من حالات داء الفطار الغبسي .

colliculectomy **قطعُ الأكيمةِ المَنويَّة**

استئصال الأكيمة المنوية .

colliculi (sing.colliculus) **أكيمات (ف: أكيمة)**

المضاف إليه وجمع الأكيمة .

انظر تحت colliculus .

collastin **كولاستين (كولاجين متخرب)**

كولاجين نسجي متنكس حيث تصبح اللطاخات شبيهة بالنسيج المرن الطبيعي .

collate **يُقارِن**

مصطلح يراد به المقارنة الدقيقة ، أو جمع الحقائق ثم المقارنة بينهما لاستخلاص النتائج .

collateral **1 ـ جانِبيّ**
2 ـ رادِف (ج: رَوادِف)

1 ـ ثانوي أو إضافي ، ليس مباشر أو حالي .

2 ـ فرع جانبي صغير ، كما هي الحال في الأوعية الدموية أو الأعصاب .

collateral source rule **قاعدةُ المَصْدَرِ الرَّادف**

قانون إضافي شرع لتحديد من يدفع التعويض للمصاب إذا كان هناك اختلاف في مسبب الإصابة ، وهو يمنع قبول البينات التي تعفي الجاني من الدفع . ويسمى أيضاً (Collateral source doctrine) .

Schaffer collateral **رادف شيفر**

فروع من المحاور العصبية للطبقة الهرمية للحصين ، بعض من نهاياتها في الخلية تتواجد في الطبقة المتجهة ، لكن العديد منها تتجاوز إلى الطبقة الجزيئية .

collateralis TA **جانِبيّ**

تعني المكان البعيد الجانبي أو الوحشي أو غير المباشر وذلك وفق التسميات التشريحية . ويسمى أيضاً (Collateral) .

collating sequence **تَسَلْسُل المُقارَنة**

إجراء مقارنات متتابعة تعتمد على نتائج المقارنة السابقة .

collecting tubule **النُّبَيبُ الجامع**

هو أحد النبيبات المستقيمة في اللب الكلوي يجمع البول من نهايات النبيبات الصاعدة بعد عروة هنلي . ويسمى أيضاً (Tubulus renalis rectus) ، (Straight tubule) .

collective bargaining **المساوَمَة الجَماعِيَّة**

اجتماع للعمال مع أرباب العمل لمناقشة

انظر تحت colliculus inferior .

أُكَيمَةُ العَصَبِ الوَجْهي colliculus facialis TA

ارتفاع في البارزة الإنسية فوق السطور اللبية في الحفرة المعينية ، والمسبب بواسطة الالتفاف الرجوعي للركبة الغائرة للعصب الوجهي حول النواة المبعدة .

الأُكَيمَةُ السُّفْلِيَّة colliculus inferior TA

أي من الزوج السفلي (الذنبي) للبارزة المستديرة والمتوضعة بشكل متناظر في سقف الدماغ المتوسط ، والذي يحتوي على المراكز المنعكسة للاحساسات السمعية . يسمى أيضاً (Caudal Colliculus) .

أُكَيمَةُ الغُضْروف الطِّرْجهالي colliculus of arytenoid cartilage

انظر تحت calliculus cartilaginis arytenoideae .

الأُكَيمَةُ المَنَوِيَّة colliculus seminalis TA

جزء مستمر من العرف الإحليلي ، والذي يشكل فتحة القريبة البروستاتية ، وعلى الجهة الثانية منها فوهات القنوات الدافقة . يسمى أيضاً العرف المنوي والبروز المنوي .

الأُكَيمَةُ العُلْوِيَّة colliculus superior TA

أي من الأزواج العلوية (المنقارية) للبروزات المستديرة والمتوضعة بشكل متناظر في سقف الدماغ المتوسط ، والذي يحتوي على المراكز المنعكسة للاحساسات البصرية . يسمى أيضاً (Rostal Colliculus) .

أُكَيمَةُ العَصَبِ الوَجْهي facial colliculus

هي الجزء المتبارز من البارزة الإنسية من اللب المخطط في الحفرة المعينية وتنجم عن انحناء ركبة العصب الوجهي حول نواة العصب المبعد ، تسمى أيضاً (Colliculus facialis) ، (Eminentia abducentis) ، (Eminentia facialis) ، (Facial colliculus) ، (Facial eminence) ، (Facial hillock) .

الأُكَيمَةُ السُّفْلِيَّة inferior colliculus

الأكيمة السفلية ، أي من الزوج السفلي

التهاب الأكيمة (المنوية) colliculitis

التهاب في أو حول الأكيمة المنوية . يسمى أيضاً (Verumontanitis) .

أكيميّ رُكبيّ colliculogeniculate

صفة منسوبة للأكيمة الركبية .

أكيميّ أحمَريّ colliculorubral

صفة منسوبة للأكيمة الأحمرية .

أكيمة (بنية تشريحية متبارزة قليلاً) colliculus
(ج: أكيمات) (pl.colliculi)

ارتفاع صغير أو ركام أو أكمة أو شكل الربوة والهضبة .

الأُكَيمَةُ البَصَلِيَّة bulbar colliculus
(= الجِسْمُ الإسْفَنْجي للقَضيب) (=corpus spongiosum penis)

انظر تحت corpus spongiosum penis .

الأُكَيمَةُ الذَّنَبِيَّة caudal colliculus

انظر تحت caudal inferior .

الأُكَيمَةُ العُنُقِيَّةُ لإحْليل الأُنْثى بحسَب باركوف cervical colliculus of female urethra of Barkow
(= عُرْفُ الإحْليل الأُنْثَوي) (=crista urethralis (femininae)

انظر تحت crista urethralis .

أُكَيمَةُ المُبعِّدَة colliculus abducentis

هي جزء من البارزة الأنسية فوق اللب المخطط في الحفرة المعينية وتنتج عن منحنى ركبة العصب الوجهي وحول نواة العصب ، وتسمى أيضاً أكيمة العصب الوجهي (Colliculus facialis) ، (Eminentia abducentis) ، Eminentia facialis) ، (Facial colliculus) ، (Facial eminence) ، (Facial hillock) .

أُكَيمَةُ الغُضْروف الطِّرْجهالي colliculus cartilaginis arytenoideae NA

بروز صغير على الحافة الأمامية والسطح الأمامي الجانبي للغضروف الطرجهالي .

الأُكَيمَةُ الذَّنَبِيَّة colliculus caudalis TA

المرجعية أو سطوح الأدوات، أو المجاورة لإثنتين أو أكثر من المحاور البصرية مع وضع كل منهما في الاعتبار.

2 ـ في علم الأشعة، طرح الجزء المحيطي (الأكثر تباعداً) من حزمة الأشعة السينية بواسطة الأنابيب المعدنية، أو الخاريط أو الحجابات المتداخلة في مسار الحزمة.

3 ـ في الطب النووي، استخدام الماصات المثقبة لتحديد حقل الرؤية للمكشاف، ولإنقاص التشتت، واستخدام الماص مع ثقوب لامة أو مباعدة، والذي سيغير أيضاً زاوية النظر للكاميرا.

ميْزاء (حاجب من مادة ماصة للأشعة) **collimator**

حاجب أو نظام من الحجابات التي تصنع من مادة ماصة، والمصممة لتحديد، أو تقييد أبعاد واتجاه الحزمة الشعاعية.

الكولينسونيَّة (جنسٌ منَ الأعشاب) **Collinsonia**

جنس من الأعشاب من عائلة اللابيات (Labiatae). الكولينسونية الكندية، وهي الجذر الحجري (Stoneroot)، أو عشبة الأغنياء (Richweed)، هي عشبة مقوية و مدرة للبول.

قطعُ الالتِصاق **colliotomy**

تفريق الالتصاقات النسيجية عن بعضها بالقطع الجراحي.

انمياع **colliquation**

المقصود به النخر التميعي (Liquefaction necrosis)، وتعني إفراز زائد من السوائل أو التميع أثناء عملية التنخر.

انْمياعٌ بَالُوني **ballooning colliquation**

مصطلح كان يستعمل للتعبير عن التنكس بالوني الشكل في الخلايا.

انْمياعٌ شَبَكي **reticulating colliquation**

مصطلح كان يستعمل للتعبير عن التنكس شبكي الشكل في الخلايا.

انمياعِيّ **colliquative**

1 ـ يتميز بزيادة النجيج السائل.

2 ـ يتميز بإماعة النسج.

(الذنبي) للبوارز المستديرة و المتوضعة بشكل متناظر في سقف الدماغ المتوسط، والذي يحتوي المراكز المنعكسة للإحساسات السمعية. يسمى أيضاً (Caudal Colliculus).

الأكيمة المتقارية **rostral colliculus**

انظر تحت colliculus superior.

الأُكَيمَةُ المَنَويَّة **seminal colliculus**

تسمى أيضاً (Colliculus seminalis)، وهي الجزء البارز للعرف الحليلي، والذي يوجد فيه فتحة القريبة البروستاسية وعلى كل جهة تنفتح فوهة القنوات الدافقة، وتسمى أيضاً (Caput gallinaginis).

الأُكَيمَةُ العُلْويَّة **superior colliculus**

تسمى أيضاً (Colliculus superior)، وهما زوجان من البوارز المستديرة في الدماغ، وتبرز الأكيمتان العلويتان والسفليتان، من سقف الدماغ المتوسط، التي تحتوي على المراكز المنعكسة للإحساس البصرية، وتسمى أيضاً (Rostal collculus).

ضِمام **colligation**

تركيب مميز للمكونات التي يمكن تمييز كل مكون منها وحده. أو جلب عدة أشياء معزولة، وتكوين خبرة موحدة منها، وبمعنى آخر توليف بين الأشياء مع المحافظة على خصوصياتها.

ضِماميّ **colligative**

في الكيمياء الوظيفية، بالاعتماد على عدد الجزيئات الموجودة في فراغ (حيز) معطى، فضلاً عن حجمها أو وزنها الجزيئي أو بنيتها الكيميائية. الخصائص الضمامية للمحاليل هي الضغط التناضحي، رفع نقطة الغليان، وانخفاض نقطة الانجماد، وخفض ضغط البخار.

إيزاء (ترتيب على التوازي) **collimation**

1 ـ في المجهر، العملية التي تجعل الأشعة الضوئية متوازية، العملية التي ترصف المحور البصري للجهاز البصري إلى المحاور الميكانيكية

كولودْيونُ مَرِن **flexible collodion**

مستحضر من الكافور وزيت الخروع والكولوديون ، والذي يستخدم من أجل نفس الأغراض التي يستعمل من أجلها الكولوديون ، ولكن بشرط أن يكون فلم مرن ومتقلص . يسمى أيضاً (collodion elastique) .

كولودْيونٌ سـاليسيليكيّ **salicylic acid collodion**

مستحضر يحتوي على حمض الساليسيليك بنسبة (9.5-11.5٪) في الكولوديون المرن ، ويستخدم كحال للطبقة القرنية للتقران في الثآليل والقرون (Corns) .

كولودْيونٌ قابض **styptic collodion**

يسمى أيضاً (Hemostatic collodion) ، (Styptic colloid) ، (Xylostyptic ether) وهو حمض التانيك بصورة كولوديون مرن ، والذي يمكنه العمل كمادة قابضة وموقفة للنزف الوعائي .

غرْوانيّ **colloid**

1 ـ لاصق غرواني ، أو يشبه الغراء .

2 ـ مادة مكونة من جسيمات صغيرة جداً لا ذوابة بالماء ، عادةً من (1 إلى 1000) نانومتر في القطر ، بحيث تكون مبعثرة على وتيرة واحدة ، أو معلقة في حالة مجزأة (مقسمة) بشكل دقيق عبر الوسط (المبعثرة) المستمر ولا يترسيب بسهولة ، وأي طور يمكن أن يكون صلب أو سائل أو غاز . تسمى الجسيمات غالباً بالطور المبعثر ، وسط التبعثر بالطور المستمر . يمكن أن يشير الغرواني بشكل نوعي إلى الجسيمات ، أو إلى نظام الجسيمات مع وسط التبعثر .

3 ـ انظر تحت thyroid colloid .

غَرَوانيٌّ أميليّ **amyl colloid**

يسمى أيضاً (Anodyne colloid) ، وتركيبه الأميل هيدريد .

غَرَوانيٌّ ثُلاثي سَلْفيد الأَنْتيمُون **antimony trisulfide colloid**

هو مادة معينة صيدلانية ويطلق على سلفيد

تَصادُم **collision**

1 ـ في التوليد ، هو التماس ـ داخل الرحم ـ ما بين أي جزء من أجزاء أحد التوأمين مع أجزاء التوأم الآخر ، بحيث يمنع هذا دموج أحدهما .

2 ـ في دراسات التوصيل العصبي ، هو التقاء فعلين كامنين يتنقلان نحو بعضهما البعض على طول نفس العصب ، ولذا فإن دور الحران التابعة لهما تمنع توالدهما في أي اتجاه من موضع التصادم .

تَصادُمٌ مَرِن **elastic collision**

هو التصادم الذي يكون فيه مجموع الطاقة الحركية بعد التصادم مساوياً لمجموع الطاقة الحركية للأجسام قبل تصادمها .

تَصادُمٌ مُشَتِّت **scattering collision**

التصادم الذي ينتج حركات متناثرة ومبعثرة لا يمكن توحيد اتجاهاتها .

التِهابُ المُثَلَّثِ المَثاني **collitis**

يسمى أيضاً (Trigonitis) ، وهو الالتهاب الذي يصيب المثانة في المنطقة التشريحية المعروفة باسم المثلث المثاني .

كيمْياءُ الغَرَوانِيَّات **collochemistry**

الفرع من الكيمياء بدراسة الغروانيات .

عُنُقِيّ جَدْلِيّ (في عَظم طويل) **collodiaphyseal**

يتعلق بعنق و جدل العظم الطويل ، خصوصاً عظم الفخذ .

كولودْيون **collodion**

غميم خفيف أو صاف ، سريع الالتهاب بشكل كبير ، سائل في شكل شراب للبيروكسيلين (قطن البارود) ، والأثير ، والكحول ، والتي تجف لفلم متمسك شفاف ، والذي يستخدم كحاصن موضوعي ، ويطبق على الجلد ليغطي الجروح الصغيرة ، والسحجات ، والقطع ليساعد في مسك التضمد الجراحي في مكانه ، ولحفظ الأدوية في تماس مع الجلد .

كولودْيونٌ مَرِن **collodion elastique (=flexible collodion)**

انظر تحت flexible collodion .

بسهولة ولا يمكنها التبعثر بمذيب إضافي .

غَرَوانيٌّ سَرِيعُ الذَّوَبان **lyotropic colloid**
(= غَرَوانيٌّ مُسْتَحْلَب) **(=emulsion colloid)**
انظر تحتَ lyophilic colloid .

غَرَوانيٌّ مُحَصِّن **protective colloid**
بلمرَ غرواني محب للماء عديد القسيمات تكون قادرة على منع ترسيب مادة غروانية أخرى بواسطة عملها مثبت أو معلق أو مكثف أو مستحلب .

غَرَوانيٌّ عكوس **reversible colloid**
مادةَ غروانية يمكنها التبعثر بعد أن تترسب أو هلامة يمكن أن تنقلب إلى حلالة .

غَرَوانيٌّ ثابت **stable colloid**
غرواني عَكوس .
انظر تحت reversible colloid .

غَرَوانيٌّ كِبْريتيٌّ قصدِيرَيّ **stannous sulfur colloid**
مَادة غَروانية كبريتية تحتوي على إيونات القصدير ، تتشكل من تفاعل ثيوسلفات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك ثم تضاف أيونات القصدير . تشكل معقداً مع التكنيشيوم 99 (العنصر التاسع والتسعون) وتستخدم كمساعد للتشخيص (في تصوير العظم والكبد والطحال) .

غَرَوانيٌّ مُسْتَعْلَق **suspension colloid**
انظرَ تحت lyophobic colloid .

الغَرَوانيُّ الدَّرَقيُّ **thyroid colloid**
المادة الغروانيَة في الجريبات الدرقية ، تحتوي على العديد من البروتينات والتي تتضمن الثيروجلوبولين CA_2 ويسمى أيضاً (Thyrocolloid) .

غَرَوانيّ **colloidal**
مادة من طبيعة غروانية .

كولوديدين **colloidin**
منتج أصفر شفاف هلامي الشكل للتنكس الغرواني .

تفتُّتُ الغَرَوانِيَّات **colloidoclasia**

الأنتيمون ، وتركيبه (Sb_2 S_3) .

غَرَوانيٌّ تَرابُطِي **association colloid**
مادةَ غروانيةَ تتألف كل من جسيماتها المبعثرة من عدة جزيئات .

غَرَوانيٌّ بَقَرِيّ **bovine colloid**
انظرَ تحتَ conglutinin .

غَرَوانيٌّ تَبَعْثُرِي **dispersion colloid**
يطلقَ أحياناً على النظام الغرواني غير المستقر بشكل نوعي .

غَرَوانيٌّ مُسْتَحْلَب **emulsion colloid**
1 ـ غَرواني أليف للمذيب .
انظر تحت lyophilic colloid .
2 ـ مستحلب .
انظر تحت emulsion .

غَرَوانيٌّ مُسْتَرْطِب **hydrophilic colloid**
(= غَرَوانيٌّ مُسْتَحْلَب) **(=emulsion colloid)**
هو غروانَي محب للماء ، أو غرواني محب للمذيب حيث يكون هذا المذيب هو الماء .

غَرَوانيٌّ كارِهٌ لِلمَاء **hydrophobic colloid**
(= غَرَوانيٌّ مُسْتَعْلَق) **(=suspension colloid)**
غرواني كَاره للمذيب حيث يكون هذا المذيب هو الماء .

غَرَوانيٌّ لاعكوس **irreversible colloid**
مادةَ غروانية عندما تترسب فإنها لا تستطيع أن تتبعثر مجدداً .

غَرَوانيٌّ مُجَفَّد **lyophilic colloid**
(مُجَفَّف بالتَّجْميد)
(= غَرَوانيٌّ مُسْتَحْلَب) **(=emulsion colloid)**
نظام غرواَني مستقر حيث يكون الطور المبعثر نسبياً سائل ، وعادةً ما يؤلف مواداً عضوية عالية التعقيد ، مثل النشاء أو الغراء ، والتي تمتص المذيبات بسرعة ، وتتوزع بشكل موحد خلال الوسط .

غَرَوانيٌّ كارِهٌ لِلمُذيب **lyophobic colloid**
(= غَرَوانيٌّ مُسْتَعْلَق) **(=suspension colloid)**
نظام غرواَني غير مستقر حيث تميل جسيمات الطور التبعثري للنفور من السوائل ، وتترسب

الجـــزء من الضلـع الذي يمتـــد من الـرأس إلى الحديبة .

عُنُقُ السِّن **collum dentis TA**

انظر تحت cervix dentis .

انْفتالُ العُنُق ؛ صَعَر **collum distortum (=torticollis)**

انظر تحت torticollis .

عُنُقُ الفَخذ **collum femoris TA**

العنق الثـقـيل للعظم الذي يصل مـا بين رأس الفخذ والجدل العظمي .

عُنُقُ جُرَيب الشَّعْرَة **collum folliculi pili**

الجزء الضيّق من الجريب الشعري والمتموضع ما بين بصلة الشعرة و فتحة البصلة على سطح الجلد . يسمى أيضاً عنق جراب الشعرة (Neck of hair follicle) .

عُنُقُ الحَشَفَة **collum glandis penis TA**

الجـزء المتـضيق مـا بين تاج الحـشـفـة والجسم الكهفي . يسمى أيضاً (Cervix glandis) .

عُنُقُ العَضُد **collum humeri**

الوجـه الأمـامي للعـضـد الأيمن ، والذي يظهـر العنق الجراحي والعنق التشريحي للعضد .

عُنُقُ المِطْرَقَة **collum mallei TA**

الجزءَ المتضيق من المطرقة تحت رأسها .

عُنُقُ الفَك **collum mandibulae TA**

عنق الفك السفلي ، وهو الجزء الضيق الذي يثبت لقمة الفك السفلي . يسمى أيضاً عنق ناتئ لقمة الفك السفلي (Collum processus condyloidei mandndibulae) .

عُنُقُ عَظْم الفَخذ **collum ossis femoris TA**

انظر تحت collumn femoris .

عُنُقُ النَّاتئِ اللُّقْميّ للفَكِّ السُّفْليّ (عُنُقُ الرَّأد) **collum processus condyloidei mandibulae**

انظر تحت collum mandibulae .

عُنُقُ الكُعْبُرَة **collum radii TA**

هو الجزء المتضيق من عظم الكعبرة أقل مسافة قاصية تماماً عن الرأس .

هي حالة تفكك وتخرب الغروانيات وتسمى أيضاً (Colloidoclasis) .

تفتُّتُ الغَرَوانِيَّات **colloidoclasis**

انظر تحت colloidoclasia .

تثبيتُ الغَرَوانِي **colloidopexia**

عـملية تثبيت الغروانيات ومنع تخربها أو انفكاكها . وتسمى أيضاً (Colloidopexy) .

تثبيتُ الغَرَوانِي **colloidopexy**

انظر تحت colloidopexia .

بَلْعَمَةُ الغَرَوانِي **colloidophagy**

عـملية يحدث بهـا إعادة امـتـصـاص المادة الغروانية من قبل البلاعـم تحت تأثير الهرمون المنبه للدرقية .

كولوكسيلين **colloxylin**

ويتـألف بشكل رئيـسي من رباعي نتـرات السيلولوز ، ويحصل عليه من تأثير حمضي النتريك والسلفوريك على القطن ويستفاد منه في تحضير الكولوديونات ، ويسمى أيضاً (Colloxylin) ، (Dinitrocellulose) ، (Nitrocel-lulose) ، (Soluble gun cotton) ، (Xyloidin) ، (Pyroxylin) .

1ـ الرَّقَبَة (ج: رقاب) **collum TA (pl.colla)**

من الناحية التشريحية هو الجزء بين الرأس والجذع .

2ـ عُنُق (ج: أعناق)

1ـ القسم الأمامي من الرقبة .

2 ـ جزء متضيق يفصل بين جزئين متماثلين .

العُنُقُ التَّشْرِيحِيّ للعَضُد **collum anatomicum humeri TA**

المنطقة المحددة من عظم العضد تماماً القاصية عن الرأس ، والتي تفـصل السطح المفـصلي عن الحديبات .

العُنُقُ الجِراحِيّ للعَضُد **collum chirurgicum humeri TA**

منطقة على عظم العضد تماماً تحت الحديبات ، حيث يصبح فيها العظم متضيقاً .

عُنُقُ الضِّلَع **collum costae TA**

collum scapulae TA **عُنُقُ عَظْمِ الكتَف**
هو الجزءُ المتضَيق من عظم الكتف الذي يحيط بالزاوية الجانبية .

collum tali TA **عُنُقُ الكَاحِل**
هو الجزءُ المتضيق ما بين رأس و جسم الكاحل .

collum valgum **عُنُقٌ أرْوَح (في الفَخذ)**
(=coxa valga) **(= وَرِكٌ رَوحاء)**
انظر تحت coxa valga .

collum vesicae biliaris TA **عُنُقُ المَرارَة**
هو الجزء العلوي المتضيق من المرارة ، ما بين الجسم والقناة الكيسية . يسمى أيضاً (Collum vesicae) .

collum vesicae felleae TA **عُنُقُ المَرارَة**
الاسم البديل لعنق الحويصلة الصفراوي (Clollum vesicae biliaris) .

collunaria **غَسُولاتٌ أنفيَّة**
محلول يطبق كقطرات أنفية أو غسول لتنظيف وتطهير الأنف .

collunarium **غَسُولٌ أنفيّ**
يسمى أيضاً (Nasal douche) ، وهي عملية غسل الأنف بالمحلول المطهر أو الملطف .

collutoria **مَضامِض**
انظر تحت collutrium .

collutorium **مَضْمَضَة**
انظر تحت collutory .


collutory **1 ـ غَرْغَرة**
2 ـ مَضْمَضَة
3 ـ طِلاءُ الفم

Miller's collutory **1 ـ غَسولُ العَين ـ غَرْغَرَةُ ميلَر**
2 ـ قَطَرَاتٌ عَيْنيَّة

Collyriculum **القُطْرورَة (جِنسٌ مِّنَ المثقوبات)**

Collyriculum faba **القُطْرورَةُ الفوليَّة**
والتي تشكل كيسات تحت الجلد في الدجاج والديك الرومي والعصفور الدوري .

collyrium (pl.collyria) **1 ـ غَسولُ العَين**



عنق الفك Collum mandibulae

Beer's collyrium **غَسولُ العَين البيريّ**

colo- **سابقة بمعنى القَولون**

coloboma **ثلامَة (نقص خلقي في نسج العين)**
(pl.colobomas, colobomata) **(ج: ثلامات)**
1 ـ غياب أو نقص خلقي في النسج .
2 ـ بشكل خاص ، هو عيب خلقي في نسج العين ، عادةً ما يكون ناتجاً عن سوء انغلاق الشق داخل المقلة الجنيني أو أحياناً عن الرضح أو المرض . مثل هذه التشوهات تتراوح ما بين حفرة صغيرة في القرص البصري إلى عيب ممتد في القزحية ، أو الجسم الهدبي ، أو المشيمية ، أو الشبكية ، أو القرص البصري . عادةً ما توجد العتمة ، تكون مقابلة لمنطقة الثلامة .

atypical colobomas **ثُلاماتٌ لانَموذَجيَّة**
ثلامة لاتنشأ من الفلح الجنيني ولا تتوضع في الربع الأنفي السفلي للعين ، وهي عادةً أحادية الجانب .

bridge coloboma **ثُلامَةٌ جسْريَّة**
منطقةٌ ضيقة من القاع الطبيعي للعين ما بين الثلامة المشيمية الشبكية و ثلامة العصب البصري .

ciliary body coloboma **ثُلاَمَةُ الجسْمِ الهَدَبي**
آفة بيضاء اللون تحاط بتصبغ متغير ويؤثر على القزحية والعدسة . وهو العيب الخلقي الأكثر

الشـديد وصغـر المقلة والتـصـقلب وانعـدام الجمجمة .

2 ـ خلل يعزى إلى الإنغلاق غيـر التام للشق الجنيني للسويقة البصرية .

ثُلاَمَةُ العَصَب البَصَري **coloboma of optic nerve**

ثلمة خلقية في منشأ العصب البصري تظهر كتقعر ثلمي في حليمة العصب البصري .

ثُلاَمَةُ الشّبَكِيَّة **coloboma of retina**

شق خلقيَ في الشبكية يعزى إلى الانغلاق غير التام للشق الجنيني في الكأس البصري .

ثُلاَمَةُ الزُّجاجيَّة **coloboma of vitreous**

ثلمة في الحافة السفلية للجسم الزجاجي .

ثُلاَمَةُ الجَفْن **coloboma palpebrale**

شق عمودي في الجفن .

ثُلاَمَةُ الشّبَكِيَّة **coloboma retinae**

ظهور ثلمة خلقية في الشبكية العينية نتيجة توقف تطورها فترة من الزمن وخاصة في منطقة الكأس البصري ، ولذلك تسمى أيضاً (Macular coloboma) ، وقد تكون بسبب التهاب الشبكية أثناء الحياة الجنينية داخل الرحم

ثلامة القاع **coloboma of fundus**

هي الثلامة الشبكية المشيمية .

انظر تحت retinochoroidal coloboma .

ثلامة تامة **complete coloboma**

ثلامة نموذجية عندما تمتد من حافة الحدقة إلى القطب الخلفي ، لذلك فإنها تصيب القزحية والجسم الهدبي والمشيمية والشبكية والقرص البصري .

ثُلاَمَةُ الجَفْن **eyelid coloboma**

ثلمة خلقية على شكل شق في الجفن .

ثُلاَمَةٌ وَجْهِيَّة **facial coloboma**

يسمى أيضاً الفلح الوجهي (Facial cleft) .

انظر تحت facial cleft .

ثُلاَمَةُ فوكْس **Fuch's coloboma**

مخروط أو هلال صغير في المشيمية على الحافة السفلية للقرص البصري .

تواتراً للجسم الهدبي والشائع في تثلث الكروموسوم 13 .

الثلامة عند مدخل العصب البصري **coloboma at optic nerve entrance**

هي ثلامة القرص البصري والتي تؤثر فقط على العصب البصري .

ثُلاَمَةُ شَحْمَة الأُذُن **coloboma auriculae**

تسمى أيضاً ثُلاَمَةٌ فُصَيصيَّة (Coloboma lobuli) ، وهو شق خلقي في فَصيص الأذن .

ثُلاَمَةُ القُزَحيَّة **coloboma iridis**

ثلمة لها شكل ثقبة المفتاح في الربع الأنفي السفلي للعين . يمكن أيضاً أن يكون ناتجاً عن قطع القزحية الجراحي .

ثُلاَمَةُ العَدَسَة **coloboma lentis**

فلَح على حافة العدسة ، ويمتد إلى الأسفل مع نقص في نطيقة زين في نفس المنطقة .

ثُلاَمَةٌ فُصَيصيَّة **coloboma lobuli**

(ثُلاَمَةُ شَحْمَة الأُذُن)

شق في الفصيص الأذني ، والتي يمكن أن تكون خللاً خلقياً أو مكتسباً .

ثُلاَمَةُ المَشيميَّة (العَينيَّة) **coloboma of choroid**

شق في المَشيمية ، مسبباً عتمة على الشبكية ، وغالباً ما يترافق مع نقص في الجسم الهدبي والقزحية .

ثُلاَمَةُ القُزَحيَّة **coloboma of iris**

انظر تحت coloboma iridis .

ثُلاَمَةُ القُرْص البَصَري **coloboma of optic disc**

1 ـ ثلامة خفيفة أو شديدة ، خلال أو على ذروة العصب البصري . يمكن أن تكون الثلامة الخفيفة منفصلة و معزولة كلياً و أحادية الجانب ومحدودة لتشكل وهدة صغيرة جداً في القرص البصري . أما الثلامة الشديدة فقد تكون جزءاً من الثلامة الجسرية أو جزءاً من الثلامة الكاملة ، أو يمكن أن تكون تضخماً في القرص البصري ضعفين إلى أربعة أضعاف الطبيعي بحيث تؤثر على الشبكية والمشيمية المجاورة . يمكن أن يتواجد الرأرأة والحول وضعف الرؤية

peripapillary coloboma **الثلامة حول الحليمة**
نقص شبكي مشيمي يحيط أو يمتد إلى الأسفل من القرص البصري .

retinochoroidal coloboma **الثلامة الشبكية المشيمية**
غياب النسيج الشبكي والمشيمي ، عادةً في أسفل القاع ، يتميز بمنطقة بيضاء لامعة متوسعة من الصلبة المتعرضة ، ويمتد ويلتف حول القرص البصري . يسمى أيضاً ثلامة القاع (Coloboma of fundus) .

typical colobomas **ثُلَامَاتٌ نَموذَجيَّة**
عيب ناتج عن الاندماج غير التام أو غير المنتظم أو الناقص لشفتي الشق داخل المقلة الجنيني في نهاية الأسبوع السادس أو السابع . تتواجد الثلامة النموذجية في الربع الأنفي السفلي للعين وغالباً ما تكون ثنائية الجانب .

colocecostomy **مُفاغَرَة قولونيَّة أعوَريَّة**
انظر تحت cecocolostomy .

colocentesis **بَزْلُ القولون**
بزل القولون الجراحي لسحب السوائل أو الغازات ، ويسمى أيضاً (Colopuncture) .

colocholecystostomy **مُفاغَرَة مَراريَّة قولونيَّة**
انظر تحت cholecystocolostomy .

coloclysis **إرْواءُ القولون**

coloclyster **حُقْنَة قولونيَّة**
حقنة تحقن إلى القولون عبر المستقيم .

colocolostomy **مُفاغَرَة قولونيَّة قولونيَّة**
المفاغرة الجراحية مابين جزئين من القولون .

colocutaneous **قولونيّ جِلدِيّ**
يتعلق بالقولون والجلد أو الاتصال مابين القولون وسطح جلد الجسم ، كناسور قولوني جلدي .

colocynth **حَنْظَل (نبات مر)**
1 ـ نبات الحنظل (Citrullus colocynthus) ، وهو نبات مر من فصيلة القرعيات.
2 ـ الثمرة اللبية لنبات الحنظل .
3 ـ اللب الجاف للثمرة كاملة النمو غير الناضجة لنبات الحنظل ، والذي يستخدم كمسهل قوي . يسمى أيضاً التفاح المر (Bitter apple) ، أو الخيار المر (Bitter cucumber) .

colocynthidism **التَسَمُّمُ بالحَنْظل**

colocynthin **كولوسِنْتين**
جليكوزيد يستخدم كمسهل ، ولكنه مر الطعم ، ($C_{38}H_{54}O_{13}$) ويستخرج من نبات الحنظل.

colocynthis **حَنْظل**
انظر تحت coloynth .

colodyspepsia **تخمَة قولونيَّة**
عسر هضم ناتج عن اضطراب المنعكس المتغير بسبب القولون المصاب بالإمساك .

coloenteritis **التِهابُ القولون والأمْعاء**
انظر تحت enterocolitis .

colofixation **تثبيتُ القولون**
تثبيت أو تعليق القولون .

Cologel **كولوجل**
الاسم التجاري لمستحضر الميثيل سيلولوز (ملزج صيدلاني ومزلق للقرنية) .

colohepatopexy **تثبيتُ القولون بالكبد**
تثبيت القولون بالكبد لمنع تشكل الالتصاقات ما بين الكبد والمعدة .

coloileal **قولونيّ لَفائفيّ**
انظر تحت ileocolic .

cololysis **تحْرِيرُ القولون**
تحرير (فصل) القولون من الالتصاقات المحيطة به .

colometrometer **مِقياسُ حَرَكاتِ القولون**
جهاز يقيس فعالية ونشاط القولون .

colon TA **القولون**
جزء من المعي الغليظ الذي يمتد من الأعور إلى المستقيم . أحياناً يستخدم على نحو غير دقيق كمرادف إلى كامل المعي الغليظ .

ascending colon **القَولونُ الصاَّعد**
الجزء من القولون التي تبدأ بالأعور وتنتهي تحت الكبد عند الثنية القولونية اليمنى ليبدأ القسم

القَولونُ المُسْتَعْرِض **colon transversum TA**
جزء من القولَون الذي يمتد بشكل مستعرض على طول الجزء العلوي من البطن من الثنية القولونية اليمنى إلى الثنية القولونية اليسرى .

القَولونُ النَّازل **descending colon**
القطعة القولونية اليسرى التي تبدأ من الزاوية الطحالية التي يصل إليها القولون المستعرض ثم يلتف نازلاً نحو الحوض .

ضَخامَةُ القَولون **giant colon**
(=megacolon)

القَولونُ الحَرْقَفيُّ **iliac colon**
ذلك الجزء مِنَ القولون النازل المتموضع في الحفرة الحرقفية اليسرى ، ويستمر مع القولون السيني .


قَولونٌ هَيوج **irritable colon**
انظر تحت irritable bowel syndrome .

قَولونٌ شَبيهٌ بالمَاسُوْرة الرَّصاصيَّة **lead-pipe colon**
مصطلح يطلق على المظهر الشعاعي لقولون المستعرض من القولون بعدها ويسمى أيضاً (Colon ascendens) .

القَولونُ الصَّاعد **colon ascendens TA**
جزء من القولون بين الأعور والثنية القولونية اليمنى .

القَولونُ النَّازل **colon descendens TA**
الجزء من القولون بين الثنية القولونية اليسرى ، والقولون السيني عند حرف الحوض . وهو الجزء من القولون النازل الذي يتوضع في الحفرة الحرقفية اليسرى ، ويسمى أيضاً القولون الحرقفي (Iliac colon) .

القَولونُ السِّينيُّ **colon sigmoideum TA**
جزء من القولون الذي يأخذ الشكل S ، والذي يتوضع في الحوض ويمتد من حرف الحوض إلى الفقرة الثالثة من العجز ، ويستمر إلى الأعلى مع القولون النازل أو القولون الحرقفي ، وإلى الأسفل مع المستقيم . يسمى أيضاً القولون الحوضي (Pelvic colon) والثنية السينية (Sigmoid flexure) .



Colon القولون

انظر تحت colic .

colonitis **التِهابُ القولون**

التهاب الغشاء المخاطي للقولون بعوامل مختلفة جرثومية ، أو فطرية ، أو مناعية ، أو مجهولة السبب .

colonization **اِستِعْمار**

1 ـ انظر تحت innidiation .

2 ـ الغراس ونمو الكائنات الحية في المضيف (الثوي) .

colonna's operation **عملية كولونا**

[عملية منسوبة للطبيب ، بول كولونا (Paul Colonna) ، وهو جراح تقويم عظام أمريكي 1892-1966] .

1 ـ هي عملية استبناء للكسر داخل المحفظة للعنق الفخذية .

2 ـ نمط شائع من رأب المفصل المحفظي للورك .

انظر تحت operation .

colonogram **صورَةُ القولون**

تسجيل مصور لحركات القولون .

colonopathy **اعتِلالُ القولون**

أي مرض أو اضطراب يصيب القولون .

colonorrhagia **نَزْفُ القولون**

colonorrhea **ثرُّ القولون**

حالة إسهال يعتقد أن منشأها من القولون .

colonoscope **مِنْظارُ القولون**

منظار داخلي مرن مستطيل يسمح بالفحص العياني لكامل القولون ، يسمى أيضاً (Coloscope) .

colonoscopy **تَنْظيرُ القولون**

الفحص باستخدام منظار االقولون ، يسمى أيضاً تنظير القولون (Coloscopy) .

colony **مُسْتَعْمَرَة (ج: مُستَعْمَرات)**

مستعمرة ، مجموعة أو زمرة من الجراثيم في مزرعة مشتقة من الزيادة في كائن حي وحيد معزول ، أو مجموعة الكائنات الحية المعزولة .

colonalgia **أَلَمُ القولون**

انظر تحت colic .

colonial **مُسْتَعْمَرِيّ**

صفة منسوبة لكل ما له علاقة بالمستعمرات .

colonic **قولونيّ**

المريض والذي يصبح فيه القولون قصيراً ، ومنكمشاً وصلباً بسبب التليف الالتهابي . في مثل هذا القولون يُفقد الطراز القبيبي الطبيعي ، كما أن وظيفة القولون يمكن أن تعتل ، وهذا عادةً ما يكون تالياً أو كنتيجة لالتهاب القولون التقرحي المزمن أو الورمي الحبيبي .

left colon **القَولونُ الأَيسَر**

الجزء القاصي من القولون ، والذي يتطور وينمو خلال الحياة الجنينية من المعي المؤخر ، وتكون وظيفته خزن وتجميع الفضلات .

pelvic colon **القَولونُ الحَوضي**

انظر تحت sigmoid colon .

right colon **القَولونُ الأَيمَن**

الجزء الداني من القولون الممتد من الصمام اللفائفي الأعوري عادةً إلى نقطة دانية من الثنية القولونية اليسرى . يتطور جنينياً من الجزء الانتهائي (المطرافي) من المعي المتوسط ، وظيفته الامتصاص .

sigmoid colon **القَولونُ السِّينيُّ**

جزء من القولَون الذي يأخذ الشكل S ، والذي يتوضع في الحوض الممتد من حافة الحوض إلى الفقرة الثالثة من العجز ، ويستمر إلى الأعلى مع القولون النازل أو القولون الحرقفي ، وإلى الأسفل مع المستقيم . يسمى أيضاً القولون الحوضي (Pelvic colon) والثنية السينية (Sigmoid flexure) .

spastic colon **قَولونٌ مُتَشَنِّج**

انظر تحت irritable bowel sydrome .

transverse colon **القَولونُ المُسْتَعْرِض**

جزء من القولَن الذي يمر بشكل مستعرض عبر الجزء العلوي من البطن من الثنية القولونية اليمنى إلى الثنية القولونية اليسرى .

والأميبية لبعض الأوالي الأخرى ، وتسمى أيضاً (Gregaloid) .

مُسْتَعْمَرَةٌ غشاوِيَّة H **H colony**
(= مُسْتَعْمَرَةٌ) **(=Hauch film colony)**
نموذج من المستعمرات الجرثومية والتي تنتشر على الفلم الرقيق فوق وسط الزرع .

مُسْتَعْمَرَةٌ M **M colony**
(=مُسْتَعْمَرَةٌ مُخَاطِيَّة) **(=mucoid colony)**
انظر تحت mucoid colony .

مُسْتَعْمَرَةٌ كامِدَة **matt colony**
مستعمرة جرثومية تبدو بسطح كامد بلا بريق أو لمعان .

مُسْتَعْمَرَةٌ أُمّ **mother colony**
المستعمرة الجرثومية أو النباتية التي تنتج المزارع البنات الثانوية .

المستعمرة المتحركة **motile colony**
مستعمرة تتحرك عبر سطح صفيحة المزرعة تاركةً خطوط من الخلايا الجرثومية على مسارات الحركة ، وهي نموذجية لمستعمرات العصوية الحلقية .

مُسْتَعْمَرَةٌ مُخاطانِيَّة **mucoid colony**
مستعمرة كبيرة لها شكل القبة ولامعة ، تحتوي على كميات كبيرة من مادة عديد السكاريد المحفظي التي يمكن أن ترسم خارجاً أوتاراً لزجةً بواسطة الإبرة . تسمى أيضاً (M Colony) .

مُسْتَعْمَرَةٌ مَثْلومَة **nibbled colony**
منظر مزرعة خمائرية تبدو مثلومة المحيط كالشق .

مُسْتَعْمَرَةٌ O **O colony**
(= مُسْتَعْمَرَةٌ مُكْتَنِزَة) **(=compact colony)**
مستعمرة جرثوميةَ معزولة ومكتنزة بالمقارنة مع المستعمرة H .

مُسْتَعْمَرَةٌ R **R colony**
(= مُسْتَعْمَرَةٌ خَشِنَة) **(=rough colony)**
مستعمرة جرثوميةَ تُظهر مسطحاً خشناً مجعداً حبيبياً منبسطاً .

مُسْتَعْمَرَةٌ S **S colony**

مُسْتَعْمَرَةٌ مَثْلومَة **bitten colony**
وجود ثلمة وعدم تواصل في المستعمرة .

مُسْتَعْمَرَةٌ زُبْدِيَّة **butyrous colony**
مصطلح للتعبير عن بعض أنواع المستعمرات دهنية الملمس كالزبدة .

مُسْتَعْمَرَةٌ مُشَطْرَجَة **checker colony**
(تشبه رقعة الشطرنج)
مستعمرة دائرية ، مرتفعة بانحدار (بشكل السنم) مع قمة مسطحة ، تشبه القرص الذي يستخدم في لعبة الشطرنج . تشاهد بشكل كثير التواتر في مزارع العقدية الرئوية على الآجار الدموي .

مُسْتَعْمَرَةٌ D **D colony**
(= مُسْتَعْمَرَةٌ قَزَمَة) **(=dwarf colony)**
انظر تحت dwarf colony .

مستعمرة رأس زهرة الربيع **daisy-head colony**
مستعمرة دائرية رمادية أو سوداء اللون ذو حافة من النتوءات المدورة الشافة الضيقة ، تنتج بشكل نموذجي من قبل الوتدية الخناقية على تيلوريت الآجار الدموي .

مُسْتَعْمَرَةٌ بِنْت **daughter colony**
مستعمرةَ جرثومية صغيرة تتشكل كحليمة على السطح ، أو على حافة المستعمرة الأقدم .

مُسْتَعْمَرَةٌ قَزَمَة **dwarf colony**
مستعمرة جرثومية أصغر من المستعمرة الطبيعية ، وتحتوي أشكال فقيرة التطور . تسمى أيضاً (D-Colony) .

مُسْتَعْمَرَةٌ مُسَطَّحَة **effuse colony**
وصف للمستعمرة المسطحة دون تقببات أو انحدارات .

مُسْتَعْمَرَةٌ لَمّاعَة **glossy colony**
مستعمرة جرثومية تبدو بسطح لماع .

مستعمرة قطعانية **gregaloid colony**
تصنيف عابر للحيوانات الأوالي ، والتي تتشكل باتحاد الكائنات الحية المستقلة السابقة بشكل واضح . يشاهد في المراحل الجبيلية

انزياح موضع القولون نحو الأسفل ، ويطلق هذا المصطلح على الاعتقاد القديم في أن الاختلافات في توضع أعضاء البطن تكون مرضية .

بَزْلُ القولون colopuncture

انظر تحت colocentesis .

لون color

1 ـ صفة للسطح أو المادة الذي ينتج عن امتصاص لأشعة الضوء العرضي ، وانعكاس الأشعة الأخرى الساقطة في مجال طول الموجة (تقريباً ما بين 370-760 mu) والتي تكون ملائمة لإثارة المستقبلات الشبكية .

2 ـ طاقة الإشعاع في مجال المنبهات الكروماتينية (اللونية) الملائمة للشبكية ، والتي تقع ما بين الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية .

3 ـ انطباع حسي لواحد أو أكثر من الدرجات اللونية لقوس قزح والمثار بتنبيه مستقبلات الشبكية ، وبصفة خاصة المخاريط ، وذلك بواسطة الطاقة المشعة لطول الموجة الملائمة .

دَلِيلُ الأَلْوان color guide

مصدر يحمل الألوان الأساسية ، والتي تقارن بناء عليها الألوان الأخرى لمعرفة مدة اختلاف لونها أوشدة ذلك اللون . ومثالها ما يستخدم في طب الأسنان لاختيار اللون المناسب للتاج الصناعي بالنسبة للون الأسنان المجاورة ، وذلك بناء على دليل للألوان .

تَوافُقُ الأَلْوان color matching

مجموعة من الألوان المتناسقة الجميلة المنسجمة ، والتي تُجمع في كتيبات بشكل منظم لمساعدة المصممين على اختيار التناسق الأجمل في التصميم .

أَلْوانٌ مُتَتامَّة complementary colors

تسمى أيضاً الألوان المتممة ، وهما لونان اثنان يكونان مرتبطان بنفس الآليات الحسية بشدة ، وعندما يختلطا في الدولاب (العجلة) اللوني يلغي كل منهما الآخر تاركين اللون الرمادي

(= مُسْتَعْمَرَةٌ مَلْساء) (=smooth colony)

انظر تحت smooth colony .

مُسْتَعْمَرَةٌ ساتِلَة satellite colony

مستعمرة جَرثومية تنمو بنشاط كبير من الجار المباشر لمستعمرة بعض الكائنات الأخرى ، مثل المستدمية النزلية النامية قرب مستعمرات العنقودية . يسمى أيضاً (Bacterial satellite) .

مُسْتَعْمَرَةٌ ثانَوِيَّة secondary colony

المستعمرة التي تمتد عن المستعمرة الأم الأساسية .

مستعمرة ملساء smooth colony

مستعمرة جرثومية ، والتي تظهر ملساء تلألؤية دائرية ذات سطح منتظم ، تشاهد بشكل طبيعي في مستعمرات الكائنات الحية . تسمى أيضاً (S Colony) .

مُسْتَعْمَرَةٌ كُرَوِيَّة spheroid colony

مستعمرة تتكاثر وتتوسع بشكل دائري .

اعْتِلالُ القولون colopathy

انظر تحت clonopathy .

تَثْبيتُ القولون colopexia

انظر تحت colopexy .

فَغْرُ القولون وتَثْبيته colopexostomy

بَضْعُ القولون وتَثْبيته colopexotomy

شق أو بضع القولون وتثبيته .

تَثْبيتُ القولون colopexy

تثبيت القولون أو تعليق القولون بوسائل جراحية .

تَثْنِيَةُ القولون coloplication

العملية التي يطوى فيها جدار القولون في حالات توسعه لانقاص أو لتقصير تجويفه .

اسْتِئْصالُ القولون والمُسْتَقيم coloproctectomy

انظر تحت proctocolectomy .

الْتِهابُ القولون والمُسْتَقيم coloproctitis

انظر تحت proctocolitis .

مُفاغَرَةُ القولون بالمُسْتَقيم coloproctostomy

انظر تحت colorectostomy .

تَدَلّي القولون coloptosis

(زرقة السيانيد) ، والأصفر ، والأحمر (ماجنتا أو الفوكسين القاعدي) . (ج) نظرية هيلمهولتزيان (المدرسة القديمة) : الأحمر والأخضر والأزرق (أو البنفسجي) . (د) نظرية هيرينغ : أربعة أزواج متممة من الدرجات اللونية ، وهي : الأحمر ، والأخضر ، والأزرق ، الأصفر ، بالإضافة للزوج الأسود ، الأبيض . (هـ) النظريات الأخرى تؤلف قائمة من خمسة إلى سبعة ألوان من الألوان الأساسية .

أَلْوانٌ مُتَماثِلَةٌ كاذِبَة **pseudoisochromatic colors**

ألوان تظهر كأنها نفسها بالنسبة للأفراد المصابين برؤية لونية معيبة الألوان .

لَونٌ خالص **pure color**

لون يتألف منبهه من طول الموجات المتجانس مع قليل أو مزيج من الدرجات اللونية الأخرى .

لَونٌ مُشْبَع **saturation color**

اللون الذي يكون عالياً على السلم اللوني أو الحيوي ، والاحتمال الأبعد يستبعد من اللون الرمادي .

لَونُ السِّن **tooth color**

اللون الذي يظهر عليه السن مطابقاً لرقم معين من مجموعة الألوان االأساسية .

المَنْسَبُ اللَّونيُّ **color index**

يختصر إلى (CI) ، ويسمى أيضاً (Blood quotient) ، وهو النسبة بين كمية الهيموجلوبين وعدد الكريات الحمراء . وتقدر قيمة المنسب اللوني تقريباً 0.85 .

رؤية اللون **Color vision**

القدرة على تمييز الألوان بالنظر .

تلوُّن **coloration**

الحالة التي يصبح فيها ملوناً ، وهو الترتيبات اللونية المميزة للأنواع .

تَلَوُّنٌ تَحْصِينيّ **protective coloration**

التلوين الذَي يخلط مع الخلفية ، جاعلاً المتعادل ، وهما أيضاً يترافقا مع بعضهما البعض في صورة تلوية (Ofterimage) وتباينية .

أَلْوانٌ مُلْتَبِسَة **confusion colors**

ألوان مختلفة بحيث يمكن أن تلتبس وتختلط على الأفراد المصابين بعيب في الرؤية اللونية (مثال ذلك البنفسجي والأزرق مع خلل في الرؤية للون الأحمر) ، من أجل هذا السبب يشتركون في التصميم على المخططات المستخدمة من أجل تحديد الأنماط المختلفة لعيوب الرؤية اللونية .

لَونٌ مُباين **contrast color**

صبغ خَادع من تدرج اللون المتام أو السطوعة الحدث بواسطة تدرج اللون الحيوي أوالتألق على المنطقة المحيطة بها في حقل الرؤية .

لَونٌ عارض **incidental color**

الذي يَشاهد كصورة تلوية .

أَلْوانٌ مُتَصاوِغَةُ البِنْيَة **metameric colors**

(أَلْوانٌ مُتَشابِهَةُ المَظْهَر مُتَبايِنَةُ المُكَوِّنات)

ألوان تظهر متماثلة للعين الطبيعية ، لكن هذا يكون ناتج عن توليفة مختلفة للعديد من المنبهات اللونية ، أو طول الموجة .

أَلْوانُ مونسيل **Munsell's colors**

(مجموعةٌ من الألوان المعيارية)

مجموعة من الألوان المعيارية بالنسبة للعين الطبيعية ، والممثلة في 40 درجة لون في درجات مختلفة من السطوع والتشبع ، ويتم تحديدها بواسطة صيغة الحروف ـ الأرقام البسيطة .

أَلْوانٌ أَوَّلِيَّة **primary colors**

(الأحمر والأزرق والأصفر)

عدد صغير من الألوان الأساسية ، عادةً تُرجع إلى مخاريط المستقبلات الشبكية ، وخليط من نسب مختلفة من منبهات تقريبية من تلك التي تعطي (150) درجة لونية تمييزية للرؤية الطبيعية للإنسان تبعاً لـ (أ) نظرية نيوتن ، فإن الدرجات اللونية السبع لقوس قزح : البنفسجي والنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر . (ب) الدهان والطابعة : الأزرق

نَزْفُ القولون **colorrhagia**

النزف الذي يكون مصدره جدار القولون ، كالنزف بسبب التهاب القولون التقرحي .

رَفْوُ القولون **colorrhaphy**

خياطة أو ترميم القولون .

ثَرٌّ قولونيّ **colorrhea**

إفرازات إخراجية مخاطية من القولون .

مِنْظارُ القولون **coloscope**

تَنْظيرُ القولون **coloscopy**

انظر تحت colonoscopy .

مُفاغَرَةُ القولون بالسينيّ **colosigmoidostomy**

استحداث (خلق) جراحي لفتحة اصطناعية ما بين السيني والجزء الداني من القولون .

يُفْغِرُ القولون **colostomize**

فعل القيام بعملية فغر القولون واستحداث فتحة اصطناعية فيه .

فَغْرُ القولون **colostomy**

الخلق الجراحي لفتحة ما بين القولون وسطح الجسم . أيضاً يستخدم للإشارة إلى الفتحة ، أو الفغرة المحدثة (Stoma) .

فَغْرٌ قَولونيٌّ جافّ **dry colostomy**

مفاغرة تُجرى في النصف الأيسر من القولون ، ولذا فإن الإفرازات الصادرة من الفغر يتألف من ثمالات لينة أو برازية التشكل .

فَغْرُ نِهايَةِ القَولون **end colostomy**

الفغَر الذي يجرى في نهاية القولون .

فَغْرُ القَولون الهارتْمانيّ **Hartmann's colostomy**

(فتح القَسَم الداني على الجلد وغلق القسم القاصي)

انظر تحت procedure .

مُفاغَرَةُ اللَّفائفيّ بالقَولون المُسْتَعْرِض **ileotransverse colostomy**

هي مفاغرة جراحية تجرى ما بين اللفائفي والقولون المستعرض .

فغر القولون لميكوليكز **Mikulicz colostomy**

انظر تحت operation .

الكائنات الحية مرئيةً بشكل أقل من قبل المفترس .

تَلَوُّنٌ تَحْذيريّ **warning coloration**

تلون لامع وواضح للحيوانات السامة غير المستساغة ، كتحذير للمفترسين الكامنين .

أَعْمَى الألوان **color-blind**

يسمى أيضاً (Color blindness) ، وهو شذوذ أو نقص القدرة على تمييز الألوان ، وينتج عن نقص أو غياب أحد صبغة الخاريط البصرية في الشبكية ، أو غياب الخاريط بذاتها .

قولونيّ مُسْتَقيميّ **colorectal**

يتعلق بالقولون والمستقيم ، أو تؤثر على القولون والمستقيم .

التِهابُ القولون والمُسْتَقيم **colorectitis**

انظر تحت coloproctitis .

مُفاغَرَةُ القولون بالمُسْتَقيم **colorectostomy**

تشكيل فتحة اصطناعية ما بين القولون والمستقيم . يسمى أيضاً (Coloproctostomy) .

المُسْتَقيمُ ـ القولون **colorectum**

المستقيم ـ القولون اللذين يعتبران كوحدة .

مِقياسُ الألوان **colorimeter**

أداة لقياس اللون أو الكثافة اللونية للمحلول ، مقياس الطيف اللوني . يسمى أيضاً مقياس الألوان (Chromometer) .

مِقياسُ الأَلْوان لدوبوسْك **Duboscq's colorimeter**

جهاز لقياس التركيز بمقارنة درجة اللون للمادة المتكلم عنه أو الخاضع للدراسة بدرجة اللون المعيارية .

مقياس الألوان العياري **titration colorimeter**

هو جهاز يستخدم تقنية قياس الألوان لوقف المعايرة بشكل آلي في نقطة النهاية .

قِياسُ الألوان **colorimetry**

عملية تحليل كيميائية كمية تعتمد على مقارنة شدة الألوان بحسب كمية ما تحتوي عليه من مادة بالنسبة لمحلول معياري . ويكون التفريق بحسب شدة امتصاص اللون .

يحتوي أيضاً على كريات عديدة من اللبأ ، وعادةً ما يتخثر بالغليان ، ويعزو ذلك إلى وجود كميات كبيرة من ألبومين اللبن .

لبأُ الحَمْل **colostrum gravidarum**
هو اللبأ الذي يفرز قبل الولادة ، ويُفرز خصوصاً خلال الأيام الأولى التالية للولادة .

لبأُ النِّفاس **colostrum puerperarum**
اللبأ الذي يفرز بعد الولادة .

فتحُ القولون **colotomy**
بضع (شق) القولون من أجل استخراج جسم غريب ، أو سليلة ، أو أورام حميدة أخرى .

تيفيَّة قولونيَة **colotyphoid**
السلمونيلات التيفية التي تستعمر القولون .

قولونيٌّ مَهْبِليّ **colovaginal**
يتعلق أويتصل مع القولون والمهبل .

قولونيٌّ مثانيّ **colovesical**
انظر تحت vesicocolonic .

سابقة بمعنى المَهْبل **colp-**
طليعة مصطلح تشير إلى معنى المهبل .

ألمٌ مَهْبِليّ **colpalgia**
انظر تحت vaginodynia .

رَتَقُ المَهْبل **colpatresia**
رتق أو إغلاق المهبل .

تَوَسُّعُ المَهْبل **colpectasia**
توسع أو تمدد المهبل .

تَوَسُّعُ المَهْبل **colpectasis**
انظر تحت colpectasia .

استِئصالُ المَهْبل **colpectomy**

وَذَمَةُ المَهْبل **colpedema**
الوذمة المهبلية بسبب رضح أو التهاب .

مُوَسعةُ المَهْبل أو عُنْق الرَّحِم **colpeurynter**
تسمى أيضاً (Metreurynter) ، وهي كيسة قابلة للنفخ تستعمل لتوسيع المهبل أو مجرى عنق الرحم .


تَوسيعُ المَهْبل **colpeurysis**
توسيع المهبل خصوصاً بواسطة المحفظة أو الكيس .

فَغْرٌ قولونيٌّ رَطب **wet colostomy**
فغر قولوني في : (أ) نصف القولون الأيمن ، حيث يكون النزح منه في شكل سائل هو المميز ، أو
(ب) نصف القولون الأيسر التالي لمفاغرة الحالب إلى السيني أو إلى القولون النازل ، حيث يطرح البول عبر نفس الفغر .

لبَئِيّ **colostric**
يتعلق أو يحدث في اللبأ (Colostrum) .

ثرُّ اللبأ **colostrorrhea**
نجيج تلقائي (عفوي) من اللبأ .

لبَئِيّ **colostrous**
يحتوي أو يملأ باللبأ .



تنظير القولون Coloscopy

لِبأ **colostrum**
سائل خفيف أصفر اللون حليبي ، يفرز من الغدد الثديية (اللبنية) قبل أو بعد الولادة . يحتوي على أكثر 20٪ بروتين ، أغلبه من الجلوبولين المناعي ، ويمثل الأضداد المتواجدة في الدم الأمومي . يحتوي على معادن أكثر ، ودهون وكربوهيدرات أقل من الحليب .

وغالباً ما يترافق مع تأخر عقلي و نوب اختلاجية واضطرابات في الرؤية الناتجة عن ضمور العصب البصري .

colpocleisis **غَلْقُ المَهْبِل**

الإغلاق الجراحي لقناة المهبل .

colpocystic **مَهْبِليٌّ مَثانِيّ**

صفة منسوبة لكل ما يتعلق بالمهبل والمثانة معاً .

colpocystitis **التهابُ المَهْبِل والمَثانة**

colpocystocele **قيلة مَهْبِلِيَّة مَثانِيَّة**

فتق في المثانة إلى المهبل ، بحيث يتدلى الجدار الأمامي للمهبل .

colpocystoplasty **رَأْبُ المَهْبِل والمَثانة**

إجراء جراحي اصطناعي لترميم المهبل والمثانة .

colpocystotomy **بَضْعُ المَثانة بطريقِ المَهْبِل**

بضع المثانة عبر جدار المهبل .

colpocystoure-terocystotomy **فتحُ الحالبِ بطريقِ المَهْبِل والمَثانة**

عملية إظهار فوهة الحالب الجراحي بواسطة بضع جدر المثانة والمهبل .

colpocytogram **مُخَطَّطُ خَلايا المَهْبِل**

تصنيف (جدولة) الأنماط المختلفة من الخلايا المهبلية الملاحظة في اللطاخات المأخوذة من الغشاء المخاطي للمهبل .

colpocy-tology **السيتولوجيا المَهْبِلِيَّة؛ الخَلَوِيَّاتُ المَهْبِلِيَّة**

الدراسة الكمية والمتمايزة للخلايا المتوسفة من الظهارة المهبلية .

Colpodida **كلوبوديدا**

رتبة من الأحياء حرة ـ المعيشة ، والتي تتواجد بشكل شائع في التربة ، المهدبة ، وغالباً هي أوالي كلوية الشكل (تحت صنف الدهليزيات ، صنف الأبواغ القطعية الحركية) (Kinetofrag-minophorea) .

colpodynia **أَلَمُ المَهْبِل**

انظر تحت vaginodynia .

colpoepisiorrhaphy **رَفْوُ المَهْبِل والصفاق**

عمل جراحي لخياطة المهبل المتمزق وإعادة

colpismus (=vaginismus) **تَشَنُّجُ المَهْبِل**

انظر تحت vaginismus .

colpitis **الْتِهابُ المَهْبِل**

انظر تحت vaginitis .

colpitis emphysematosa **الْتِهابُ المَهْبِل النُّفاخي**

انظر تحت vaginitis emphysematosa .

colpitis granulosa **الْتِهابُ المَهْبِل الحُبَيبي**

اَلتهاب المَهبل الذي يظهر النسيج الخاص به بالباثولوجيا طبيعة حبيبية .

colpitis macularis **التهاب المهبل البقعي**

نزف نقطي في المخاطية المهبلية ، غالباً مع حويصلات صغيرة أو حطاطات ، تشاهد في التهاب المهبل بالمشعرات المهبلية . يسمى أيضاً (Strawberry cervix) .

colpitis mycotica **الْتِهابُ المَهْبِل الفُطْرِي**

انظر تحت vaginomycosis .

emphysematous colpitis **الْتِهابُ المَهْبِل النُّفاخي**

وُصفَ لأول مرة تحت مسمى (Colpohyperpla-sia cystica) ، ويسمى الآن (Vaginitis emphy-sematosa) ، (Pachyvaginitis cystica) ويتظاهر بتكون غازات في النسيج الضام المهبلي يحاط بخلايا عملاقة ، ويعتبر سبباً للنزف في النصف الثاني من الحمل .

colpo- **سابقة بمعنى المَهْبِل**

سابقة بمعنى أو تشير إلى العلاقة مع المهبل .

colpocele **قيلة مَهْبِلِيَّة**

انظر تحت vaginal hernia .

colpoceliocentesis **بَزْلُ البَطْن بطريقِ المَهْبِل**

بزل جوف البطن عبر المهبل ، وعادةً عن طريق القبو الخلفي .

colpoceliotomy **بَضْعُ البَطْن بطريقِ المَهْبِل**

بضع (شق) البطن عبر جدار المهبل .

colpocephaly **مهبلي رأسي**

تضخم القرون القذالية للبطينات الجانبية ،

طريق المهبل .

colpoperineoplasty **رَأبُ المَهْبِل والعِجان**

انظر تحت vaginoperineoplasty .

colpoperineorrhaphy **رَفْوُ المَهْبِل والعِجان**

انظر تحت vaginoperineorrhaphy .

colpopexy **تَثْبيتُ المَهْبِل**

خياطة المهبل المتدلي إلى البنى المحيطة به كالجدار البطني . يسمى أيضاً (Vaginofixation) .

colpoplasty **رَأبُ المَهْبِل**

انظر تحت vaginoplasty .

colpopoiesis **تَلديمُ المَهْبِل**

(جراحة رأبية لتكوين مهبل)

تكوين المهبل بالجراحة التجميلية .

colpoptosis **تَدَلّي المَهْبِل**

انظر تحت vaginocele .

colporectopexy **تَثْبيتُ المُسْتَقيمِ بالمَهْبِل**

تعليق المستقيم المتدلي عن طريق خياطته إلى جدار المهبل .

colporrhagia **نَزْفُ المَهْبِل**

انظر تحت vaginal hemorrhage .

colporrhaphy **رَفْوُ المَهْبِل**

1ـ العملية التي يجرى فيها خياطة المهبل .

2ـ عملية تعرية (تجريد) وخياطة جدار المهبل من أجل إعادة بناء المهبل .

colporrhea **ثَرٌّ مَهْبِلِيّ**

غزارة الإفرازات المهبلية .

colporrhexis **تَمَزُّقُ المَهْبِل**

colposcope **مِنْظارُ المَهْبِل**

1ـ أداة لفحص نسج المهبل وعنق الرحم باستخدام عدسات مكبرة .

2ـ انظر تحت vaginoscope .

colposcopic **متعلق بتَنْظيرِ المَهْبِل**

متعلق بمنظار المهبل ، أو تنظير المهبل .

colposcopy **تَنْظيرُ المَهْبِل**

فحص عنق الرحم والمهبل باستخدام منظار المهبل .

colpospasm **تَشَنُّجُ المَهْبِل**

الصفاق إلى مكانه .

colpohyperplasia **فَرْطُ التَّنَسُّجِ المَهْبِلِي**

فرط التنسج المهبلي ، أو النمو الزائد للغشاء المخاطي وجدار المهبل .

colpohyperplasia cystica **فَرْطُ التَّنَسُّج المَهْبِلِيِّ الكِيسِيُّ**

نوع يَتَميز بفَرط التنسج والذي يأخذ شكل الكيسات في الغشاء المخاطي المهبلي .

colpohyperplasia emphysematosa **فَرْطُ التَّنَسُّج المَهْبِلِيِّ النُّفاخِيُّ**

نوع يَتَميز بوجود فراغات صغيرة مملوءة بالغاز في الغشاء المخاطي للمهبل .

colpomicroscope **مِجْهَرٌ مَهْبِلِيّ**

أداة صُممت بشكل خاص من أجل الفحص المجهري للنسج في عنق الرحم في الموضع (Cervix in situ) له قدرة كبيرة في التضخيم أكثر من منظار المهبل العادي .

colpomicroscopic **متعلق بالفَحْص المِجْهَري للمَهْبِل**

يتعلق بالمجهر المهبلي ، أو بالفحص المجهري للمهبل .

colpomicroscopy **الفَحْصُ المِجْهَرِيُّ للمَهْبِل**

فحص خلايا عنق الرحم في الموضع بالمجهر المهبلي .

colpomycosis **فُطارٌ مَهْبِلِيّ**

يسمى أيضاً (Vaginomycosis) ، (Colpitis mycotica) وهي حالة التهاب المهبل بالفطور المختلفة .

colpomyomectomy **استِئْصالُ الرَّحِمِ الكِيسَةِ المَبيْضيَّةِ بطريقِ المَهْبِل**

استئصال الورم العضلي الرحمي عن طريق المهبل .

انظر تحت vaginal myomectomy .

colpoparovariocystectomy **استِئْصالُ الكِيسَةِ المَبيْضيَّةِ بطريقِ المَهْبِل**

عمل جراحي بالدخول إلى الحوض لاستئصال كيسة مبيضية بغير طريق البطن ، ولكن عن

انظر تحت blood group .

الحَنَش (إحدى الحيَّات) **Coluber**

جنس من الحيات غير السامة من فصيلة الأحناش (فصيلة من الحيات)، يتواجد في شمال شرق آسيا وشمال أمريكا. الحنش المضيق (العاصر) (Coluber constrictor) هي الحية السوداء الأمريكية.

حَنَش (أفعى) **colubrid**

1ـ أي ثعبان من فصيلة الأحناش.

2ـ من أو يتعلق بفصيلة الأحناش.

الأحْنَاش (فصيلة مَن الحيَات) **Colubridae**

فصيلة من الحيات التي تتواجد في شمال أمريكا وأفريقيا، معظم أجناسها غير مؤذية. تتضمن جنس الحنش غير السام، والحنش، وجنس الأخلف السام في أفريقيا الجنوبية.

انظر تحت snake .

عُمَيْد **columella**

(ج: عُمَيدات) **(pl.columellae)**

1 ـ أية بنى تشريحية مختلفة شبيهة بالعمود.

2ـ في بعض الفطور والأوالي، هو الانغلاف العقيم لمولدة المباغات إلى داخل المنطقة المخصبة من حافظة الأبواغ. تسمى أيضاً (Columnella).

عُمَيدُ القَوقَعَة **columella cochleae**

انظر تحت modiolus .

عُمَيدُ الأنْف **columella nasi**

الحافة اللحمية القاصية من الحاجز الأنفي.

عُمَيدٌ مُتَدَلٍّ (مُتَدَلِّي) **hanging columella**

هو الجسر الجلدي السفلي من الحاجز الأنفي، وقد يبدو متدلياً بحيث يمكن رؤيته حتى بالمنظر الأمامي للأنف، وقد يكون ذلك نتيجة بقاء تشوه غير مصلح جراحياً أو بقاء حجاب ذنبي طويل متدل في الأنف. وقد يكون هذا التدلي كاذباً نتيجةً قصر جناحي الأنف.

عُمَيدٌ خَبِيْء **hidden columella**

العميد الأنفي الذي لا يمكن رؤيته بالمنظر الجانبي للأنف، ويمكن جعله مرئياً بالعمل الجراحي التجميلي.

انظر تحت vaginal spasm .

مِثبات مَهْبِلِيّ **colpostat**

طبيقة تستخدم للتثبيت شيء ما كالراديوم في المهبل.

تَضَيُّقُ المَهْبَل **colpostenosis**

تقلص أو تضيق المهبل.

بَضْعُ تَضَيُّقِ المَهْبَل **colpostenotomy**

عملية قطع لأجل تضيق أو رتق المهبل.

مِقياسُ حَرارةِ المَهْبَل **colpotherm**

جهاز لقياس الحرارة بطريق المهبل.

بَضْعُ المَهْبَل **colpotomy**

بضع أو شق المهبل بالدخول إلى ردبة المهبل. يسمى أيضاً (Vaginotomy).

بَضْعُ المَهْبِل الخَلْفي **posterior colpotomy**

انظر تحت culdotomy .

بَضْعُ الحالِب وَالمَثانَة بطريقَ المَهْبَل **colpoureter-ocystotomy**

تعرض فوهة الحالبين عن طريق القطع من خلال جدار المهبل والمثانة.

بَضْعُ الحالِب بطريقَ المَهْبَل **colpoureterotomy**

شق الحالب عبر المهبل، وهذا الإجراء يتم لتفريج التضيق الحالبي.

جُفافُ المَهْبَل **colpoxerosis**

جفاف غير طبيعي للفرج و المهبل.

كولْتيرول (دَواءٌ مُوَسِّعٌ لِلقَصَبات) **colterol**

عامل أدرينالي الفعل، نوعي للمستقبلات أدرينالية الفعل ـ B_2، وهذا الدواء ينتج من تحول البيتولتيرول (Bitolterol).

الفيروس الخيلي **Coltivirus**

جنس من الفيروسات من فصيلة الفيروسية الريوية (Reoviridae)، والتي تتضمن فيروس حمى كلولورادو القرادية والفيروسات الأخرى المتعلقة بها.

زمرة الدم بحسب كولتون **Colton blood group**

[زمرة الدم المنسوبة للطبيب النرويجي كولتون (Colton)، والذي كان أول من لفت الانتباه إليها في تقريره عام 1965].

column of fornix **عَمودُ القَبْو**

يسمى أيضاً (Columna fornicis)، (Anterior pillar of fornix) وهو الجــزء الذي ينحنى للأسفل أمام المهاد وداخل ثقبة مونرو ، يستمر عبر الوطاء إلى الجسم الشديي . ويتألف من ألياف تنشأ عن الحصين والمِرْفَد ، عمود القبو هو امتداد مباشر لجسمه .

column of Goll **عَمودُ جول**
(=fasciculus gracilis medullae spinalis) **(= الحُزْمَةُ الرَّشيقَةُ للنُّخاع)**

الحزمة الرشيقة النخاعية الشوكية .

انظر تحت fasciculus gracilis medullae spinalis .

column of Gowers **عَمودُ جاور**
(=tractus spinocerebellaris anterior) **(= السَّبيلُ النُّخاعيُّ المُخَيخيُّ الأماميُّ)**

عمود غاور ، السبيل النخاعي المخيخي الأمامي .

انظر تحت tractus spinocerebellaris anterior .

column of Kolliker **عَمودُ كوليكر**
(=sarcostyle) **(= حُزْمَةٌ لُيَيفيَّةٌ عَضَلَيَّة)**

انظر تحت sarcostyle .

column of Lissauer **عَمودُ ليساور**
(=tractus dorsolateralis) **(= السَّبيلُ الظَّهْرانيُّ الوَحْشيُّ)**

عمود لَيساور ، السبيل الخلفي الجانبي .

انظر تحت tractus posterolateralis .

column of nose **العَمودُ الأَنْفيّ**

هو الوتيرة أو الحاجز بين فتحتي الأنف ويسمى أيضاً (Septum nasi) .

column of Rolando **عَمودُ رولانْدو**

يسمى أيضاً بارزة ثلاثي التوائم (Eminentia trigeminal)، (Rolando's column)، وهو جسر صغير على جانبي البصلة السيسائية ويتعلق بجهاز ألياف مثلث التوائم النازلة .

انظر تحت fasciculus cuneatus medullae spinalis .

columellae **عُمَيدات**
(sing.columella) **(ف: عُمَيد)**

انظر تحت columella .

columellate **شبيه العميد**

بعض الأوالي والفطور التي تمتلك العميد .

column **عَمود**

جزء تشريحي في شكل البنية العمودية ، أحياناً يستخدم بشكل نوعي من أجل العمود الرمادي للحبل الشوكي .

anal columns **أعْمدَةُ الشَّرَج**

انظر تحت columnae anales .

anterior column of fauces **العَمودُ الأماميُّ للحلْق**

هي القوس الحنكية اللسانية .

انظر تحت arcus palatoglossus .

anterior column of spinal cord **العَمودُ الأماميُّ للنُّخاع**

هو العمود الأمامي للنخاع الشوكي .

انظر تحت columna anterior medullae spinalis .

anterior gray column of spinal cord **العَمودُ السِّنْجابيُّ الأماميُّ للنُّخاع**

انظر تحت spinal cord .

anterolateral column **العَمودُ الأماميُّ الوَحْشيُّ**

الحبل الجانبي للنخاع الشوكي .

انظر تحت funiculus lateralis medullae spinalis .

Clarke's column of spinal cord (=nucleus thoracicus TA) **عَمودُ كلارك في النُّخاع (=النَّواةُ الصَّدْريَّة)**

انظر تحت nucleus thoracicus posterior .

column of Burdach **عَمودُ بورداخ**
(=fasciculus cuneatus medullae spinalis) **(= الحُزْمَةُ الإسْفينيَّةُ للنُّخاع)**

الحزمة الإسفينية للنخاع الشوكي .

column of Sertoli **عَمودُ سيرْتولي**
(=Sertoli cell) **(=خَليَّةُ سيرَتولي)**
خلايا سيرتولي المتطاولة في الطبقة الجدارية في النبيبات الناقلة للمني .

columns of abdominal ring **أعْمدَةُ حَلَقَة البَطْن**
ألياف متسمكة للسفاق العضلي الخارجي المائل حول الحلقة الإربية السطحية .

columns of Bertin **أعْمدَةُ بيرتان**
(=columnae renales) **(= الأعْمدَةُ الكُلْويَّة)**
انظر تحت columnae renales .

columns of folds of tongue **أعْمدَةُ طَيَّات اللِّسان**
انظر تحت papillae foliatae .

columns of Morgagni **أعْمدَةُ مورجاني**
(=columnae anales) **(=الأعْمدَةُ الشَّرجيَّة)**
الأعمدة الشرجية .

columns of rugae of vagina **أعْمدَةُ الغُضون المَهْبليَّة**
الأعمدة اللحمية المتبارزة في الجدار المهبلي خاصة قرب فوهته .

columns of vagina **الأعْمدَةُ المَهْبليَّة**
التغضنات المَهبلية العمودية .
انظر تحت columnae rugarum vaginae .

dorsal column **عَمودُ الظَّهْر**
(=columna vertebralis TA) **(= العَمُودُ الفقَريُّ)**
انظر تحت columna vertebralis TA

dorsal column of spinal cord **العَمودُ الظَّهْرانيُّ للنُّخاع**
(=columna dorsalis medullae spinalis)
انظر تحت columna posterior medullae spinalis .

enamel columns **أعْمدَةُ الميناء**
هي مواشير الميناء .
انظر تحت prismata adamantina .

fat columns **الأعْمدَةُ الدُّهْنيَّة**
تبارزات دهنية تحت الجلد في صيوان الأذن ، وخاصة من الناحية الخلفية منه وقرب شحمة الأذن .

fleshy columns of heart **أعْمدَةُ القَلْب اللَّحْميَّة**
الأعمدة اللحمية المتبارزة داخل البطينات وتمتد عنها الألياف التي تمسك بالصمامات .

fornix column **عَمودُ القَبْو**
انظر تحت columna fornicis .

fractionating column **عَمودُ التَّجْزئَة**
عمود التجزئة ، جهاز لفصل المكونات الطيارة من المحلول بواسطة التقطير .

fundamental column **العَمودُ الأساسيّ**
(=fasciculi proprii) **(= الحُزْمَةُ المَخْصوصَة)**
انظر تحت fasciculi proprii .

gray column **العمود السنجابي**
انظر تحت columnae griseae .

gray columns of spinal cord **أعْمدَةُ النُّخاع السِّنْجابيَّة**
هي الثخانات الطولانية السنجابية الثلاثة في العمود الشوكي ، والمكونة من العمود الأمامي والخلفي والجانبي .
انظر تحت columna anterior medulla spinalis .

intermediolateral column **العَمودُ المُتَوسِّطُ الوَحْشيُّ**
انظر تحت columna intermediolateralis medullae spinalis .

lateral column of spinal cord **العَمودُ الوَحْشيُّ للنُّخاع**
انظر تحت columna intermedia medullae spinlis .

lateral gray column of spinal cord **العَمودُ السِّنْجابيُّ الوَحْشيُّ للنُّخَاع**

muscle column **عَمودٌ عَضَليّ**
(=sarcostyle **(= حُزْمَةٌ لُيَيفيَّةٌ عَضلَيَّة)**
انظر تحت sarcostyle .

renal columns of Bertin **أعْمدَةُ الكُلْيَة**
(=columnae renales) **(البيرتانية)**
انظر تحت columnae renales.

sacrococcygeal column **العَمودُ العَجُزِيُّ العُصْعُصيُّ**
الأعمدة العصبية في منطقة العجز والعصعص والتي ترسل إليافها إلى المنطقة الحوضية .



Rectal columns أعمدة المستقيم

somatic motor column **العَمودُ الحَرَكيُّ الجَسَديُّ**
العمود العصبي الهرمي الذي يمتد بالخلايا العصبية في القرن الأمامي من النخاع العصبي الشوكي .

positive column **عَمودٌ إيجابيّ**
مجرى قرنفلي اللون للضوء الذي يشاهد عندما يمر تيار عالي الكمون عبر أنبوب تم خلخلة هوائه بشكل جزئي .

posterior column of fauces **العَمودُ الخَلْفيُّ للحَلْق**
انظر تحت arcus palatopharyngeus .

posterior column of spinal cord **العَمودُ الخَلْفيُّ للنُّخاع**
انظر تحت columna posterior medullae spinalis .

posterior gray column of spinal cord **العَمودُ السِّنْجابيُّ الخَلْفيُّ للنُّخاعَ**

posteroexternal column **العَمودُ الخَلْفيُّ الظَّاهر**
تسمى أيضاً (Burdach's column) ، (Burdach's fasciculus) ، (Burdach's tract) ، (Cuneate fasciculus) ، (Cuneate funiculus) ، (Wedge-shaped fasciculus) ، وهي أكبر حزمة فرعية من الحزم النخاعية الخلفية الوحشية .

posteromedian column of medulla oblongata **العَمودُ الخَلْفيُّ النَّاصفُ للبَصَلَة**
الحزمَة الرشيقة للبصلة السيسائية .
انظر تحت fasciculus gracilis medullae oblongnatae .

posteromedian column of spinal cord **العَمودُ الخَلْفيُّ النَّاصفُ للنُّخاع**
هي الحزمة الرشيقة النخاعية الشوكية .
انظر تحت fasciculus gracilis medullae spinalis .

Rathke's columns **عَمودا راتْكه**
(غضروفان في النهاية الأمامية للحبل الظهري)
غضروفان للنهاية الأمامية للقردود (جنين) .

rectal columns **أعْمدَةُ المستقيم**
(=columnaeanales) **(= أعْمدَةُ الشَّرج)**
انظر تحت columnae anales .

العَمودُ الحِسِّيُّ الجَسَديُّ **somatic sensory column**
العمود الذي ينقل الإحساس من الخلايا الجسدية عبر الحبال الخلفية في النخاع ويرسلها إلى الدماغ .

العَمودُ السِّيْسائِيّ (العَمودُ الفقَرِيُّ) **spinal column (=vertebral column)**
انظر تحت columna vertebralis .

عَمودُ ستيلينج **Stilling's column**
(= العَمودُ الصَّدْرِيُّ) **(=columna thoracica)**
النواة الصدرية الخلَفية .
انظر تحت nucleus thoracicus posterior .

العَمودُ المُخَطَّطيُّ الحَرَكيُّ **striomotor column**
عمود صادر من القرن الأمامي من الحبل الشوكي الذي يعصب العضلات المخططة .

العَمودُ الفقَرِيُّ **vertebral column**
مجموعَ الأعمدة للفقرات من القحف إلى العصعص يسمى أيضاً المحور والعمود الفقري والشوك ولعمود الظهري والعمود الشوكي .

عَمودُ وورين الدُّهْنيّ **Warren's fat column**
عمود دهني منسوب إلى وورين ، والواقع لا يوجد هذا المصطلح إلا بصيغة الجمع فنقول أعمدة وورين الدهنية (Warren's fat columns) ، (Fat-columns of Warren) ، وهي الأعمدة الدهنية التي تمتد في الأدمة وتعطي الجلد نضارته ومرونته ، وتسمى أيضاً (Columnae adiposae) .

عمود سبايتزكا وليساور **column of Spitzka and Lissauer**
انظر تحت tractus posterolateralis .

عَمود (ج: أعْمِدَة) **columna TA (pl.columnae)**
يستخدم في التسميات التشريحية ليصف البنى أو الأجزاء الشبيهة بالأعمدة .

العَمودُ الأماميُّ للنُّخاع **columna anterior medullae spinalis TA**
العمود الأمامي للحبل الشوكي ، هو الجزء الأمامي من المادة الرمادية للحبل الشوكي والذي يحتوي على العصبونات الحركية التي تعصب العضلات الهيكلية للعنق والجذع والأطراف . في المقاطع المستعرضة يشاهد كقرن (القرن الأمامي للنخاع الشوكي) . يسمى أيضاً العمود البطناني للحبل الشوكي ، والعمود البطناني النخاعي الشوكي .

العمود المستقل للنخاع الشوكي **columna autonomica medullae spinalis**
هو العمود المتوسط الجانبي للنخاع الشوكي . انظر تحت columna intermediolateralis medullae spinalis .

العمود الظهراني للنخاع الشوكي **columna dorsalis medullae spinalis**
هو العمود الخلفي للنخاع الشوكي . انظر تحت columna posterior medullae spinalis .

عَمودُ القَبْو **columna fornicis TA**
كلا الكتلتين العموديتين من الألياف المتباعدة من النهاية الأمامية من جسم القبو نزولاً إلى الدماغ البيني . يسمى أيضاً العماد الأمامي للقبو (Anterior pillar of fornix) وعمود القبو (column of fornix) .

العمود المتوسط للنخاع الشوكي **columna intermedia medulae spinalis**
هو الجزء الجانبي من المادة السنجابية للحبل الشوكي ، والذي يمتد من القطعة الصدرية الثانية إلى القطعة القطنية الأولى من الحبل الشوكي . يشاهد بالمقاطع المستعرضة على شكل القرن (القرن الجانبي للنخاع الشوكي) . يسمى أيضاً المنطقة المتوسطة للحبل الشوكي ، أو العمود الجانبي للنخاع الشوكي ، أو العمود الجانبي للحبل الشوكي .

العَمودُ المُتَوَسِّطُ الوَحْشيُّ **columna intermediolateralis TA**
عمودٌ من المادة السنجابية ذات الخلايا (النواة المتوسطة الجانبية) التي تمتد من العمود المتوسط للحبل الشوكي . يسمى أيضاً العمود المستقل

العصبونات الحركية التي تمتد على طول الحبل الشوكي بالإضافة إلى مجموعتين محدودتي الامتداد بالقطع الصدرية والقطنية العلوية . في المقاطع المستعرضة يشاهد كقرن (القرن الخلفي للنخاع) . يسمى أيضاً بالعمود الظهراني للنخاع الشوكي .

العَمودُ الأماميّ للغُضون المَهْبليَّة **columna rugarum anterior vaginae TA**

يسمى أيَضاً اَلعمود المهبلي الأمامي ، وهو حرف طولاني ملحوظ بشكل واضح على الجدار الأمامي للمهبل .

العَمودُ الخَلْفيّ للغُضون المَهْبليَّة **columna rugarum posterior vaginae TA**

يسمى أيضَاً العَمود المهبلي الخلفي ، وهو حرف للحبل الشوكي والعمود المستقل للنخاع الشوكي .

العَمودُ الوَحْشِيُّ للنُّخاع **columna lateralis medullae spinalis TA**


انظر تحت columna intermedia medullae spinalis .

العَمودُ الأَنْفيّ (=الوَتيرَة) **columna nasi (=septum nasi)**

انظر تحت septum nasi .

العَمودُ الخَلْفيُّ للنُّخاع **columna posterior medullae spinalis TA**

يسمى أيضاً العمود الخلفي للنخاع ، وهو الجزء الخلفي من المادة السنجابية للحبل الشوكي ، والذي يحتوي على مجموعات من



Vertebral Column العمود الفقري

تمتد منها الألياف الرابطة للصمامات القلبية التاجية في البطين الأيسر وثلاثية الشرف في البطين الأيمن .

الأَعْمِدَةُ السِّنْجابيَّة **columnae griseae TA**

تسمىَ أيضاً الأعمَدة السنجابية للنخاع أو الأعمدة الرمادية للحبل الشوكي ، وهي عبارة عن ثلاث ثخانات متوجهة بشكل طولاني في الحبل الشوكي (العمود الأمامي الخلفي ، العمود المتوسط للنخاع) . يتألف من المادة الرمادية ويحتوي على أجسام الخلايا العصبية . يشار إلى الأعمدة بشكل شائع بالقرن الأمامي والقرن الخلفي والقرن الجانبي بالترتيب ، لأن هذه الأعمدة تظهر بالمقطع المستعرض للحبل الشوكي منظر القرون .

أَعْمِدَةُ الشَّرَج (المورجانية) **columnae rectales (Morgagnii) (=columnae anales)**

انظر تحت columnae anales .

الأَعْمِدَةُ الكُلْوِيَّة (البرتانية) **columnae renales (Bertini)**

هو امتداد داخلي للبنى القشرية للكلية ، مابين الاهرامات الكلوية . يسمى أيضاً أعمدة برتان .

أَعْمِدَةُ الغُضُون المَهْبليَّة **columnae rugarum vaginae TA**

هي الأعمدة المهبلية ، وهي حروف طولانية تلاحظ بشكل واضح على الجدار الأمامي (العمود الأمامي للغضون المهبلية) ، أو على الجدار الخلفي (العمود الخلفي للغضون المهبلية) للمهبل .

أَعْمِدَة (ف:عَمُود) **columnae (sing.columna)**

انظر تحت sing.columna .

عُمَيد **columnella**

انظر تحت columella .

إعْماد **columning**

تشكيل الأعمدة أو إنشاؤها .

إعْمادُ المَهْبِل المتدلي **columnization**

دعم و تثبيت الرحم المتدلي بالدكات .

طولاني ملحوظ بشكل واضح في الجدار الخلفي للمهبل .

العَمودُ الصَّدْرِيُّ **columna thoracica TA**

هي النواة الصَدرية الخلفية .

انظر تحت nucleus thoracicus posterior .

العَمودُ البَطْنانِيُّ لِلنُّخاع **columna ventralis medullae spinalis**

هو العمود الأمامي للنخاع الشوكي .

انظر تحت columna anterior medullae spinalis .

العَمودُ الفِقَرِيُّ **columna vertebralis TA**

هو تركيبَ عمودي للفقرات من القحف إلى العصعص . يسمى أيضاً المحوار (Axon) ، والعمود الفقري (Backbone) ، والعمود الشوكي (Spinal column) .

أَعْمِدَةٌ شَحْمِيَّة **columnae adiposae**

انظر تحت Warren's fat colum .

أَعْمِدَةُ الشَّرَج **columnae anales TA**

حروف عمودية أو طيات من الغشاء المخاطي في النصف العلوي من القناة الشرجية . تسمى أيضاً أعمدة المستقيم لمورجاني ، أعمدة مورجاني (Columns of Morgagni) ، الطيات المخاطية للمستقيم (Mucous folds of rectum) .

أَعْمِدَةُ الشَّرَج **columnae ani**

تسمى أيضاً (Columnae anales) ، (Anal columns) ، (Morgagni's columns) ، (Rectal columns) ، وهي ثنيات عمودية في الغشاء المخاطي توجد في النصف العلوي من القناة الشرجية .

أَعْمِدَةُ برتان (= الأَعْمِدَةُ الكُلْوِيَّة) **columnae bertini (=columnae renales)**

انظر تحت columnae renales .

الأَعْمِدَةُ اللَّحْمِيَّةُ القَلْبِيَّة **columnae carneae cordis**

وتسمى أيضاً التَّرابيقُ اللَّحميَّةُ القَلْبيَّة (Trabeculae carnea cordis) ، (Columnae carneae) ، (Fleshy beams) ، وهي الأعمدة العضلية التي

تسـمى أيضـاً (Cataphora) ، وهي حـالة من الوسن الشديد والتي تنفصل بفترات من الوعي الجيد .

غَيبوبَةٌ سَهَرِيَّة coma vigil

انظر تحت Loked-in sydrome .

غَيبوبَةٌ لاحَيَوِيَّة deanimate coma

غياب الوعيَ بلا حركة على الإطلاق .

غَيبوبَةٌ عَميقَة deep coma

السبات العميق الذي لا يستجيب فيه المصاب حتى للألم الشديد .

غَيبوبَةٌ سُكَّرِيَّة diabetic coma

سبات الحماض السكري الوخيم ، والتي تترافق مع تنفس كوسماول .

غَيبوبَةٌ صَرْعِيَّة epileptic coma

غياب الوعيَ العميق بسبب الصرع أثناء حدوث النوبة أو بعدها .

غَيبوبَةٌ كَبِدِيَّة hepatic coma

سبات يترافق مع الاعتلال الدماغي الكبدي .

غَيبوبَةُ فَرْط الأَسْمولِيَّة اللاَّكيتونيّ hyperosmolar nonketotic coma

يسمى أيضاً السبات السكري ، وتكون فيه المستويات للأجسام الكيتونية في الدم طبيعية وتحدث نتيجة فرط أسمولية السائل خارج الخلوي ، والذي ينتج عنه تجفاف للسائل داخل خلوي ، والتالي غالباً عن المعالجة الزائدة بالمحاليل مفرطة الأسمولية .

غَيبوبَةُ هُبوط سُكَّر الدِّم hypoglycemia coma

غيابَ الوعي بسبب نقص سكر الدم دون الحد الأدنى الطبيعي .

غَيبوبَةُ القُصور النُخامي hypopituitary coma

غياب الوعي الناجم عن فشل الغدة النخامية الذي يسبب فشل الغدة الكظرية .

غَيبوبَةُ هُبوط الحَرارَة hypothermic coma

غياب الوعيَ بسبب هبوط الحرارة الشديد .

غَيبوبَةٌ لاعَكوسَة irreversible coma

انظر تحت brain death .

كولي ـ ميسين M Coly -Mycin M

الاسم التجاري لمستحضر كوليستيميثات صوديوم .

كولي- ميسين S Coly - Mycin S

الاسم التجاري لمستحضر سلفات كوليستين .

إبْطاءُ الهَضْم colypeptic (=kolypeptic)

انظر تحت kolypeptic .

سابقة بمعنى الاشْتِراك com-

سُبات؛ غَيبوبَة coma

1 ـ حالة اللاوعي التي لا يستثار فيها المريض حتى بالمنبهات القوية . تسمى أيضاً (Loss of cnsciousness) .

2 ـ الزيغ البصري الذي ينتج عندما تستقبل الصورة على الشاشة بحيث لا تكون على زاوية قائمة بشكل دقيق مع خط توالد الشعاع الوارد (المحدث) .

غَيبوبَةٌ سَهَرِيَّة ؛ سُبَاتٌ سَهَرِيّ agrypnodal coma (=coma vigil)

الاسم القديم لمتلازمة المنحبس (Locked-in syndrome) .

غَيبوبَةٌ كُحولِيَّة alcoholic coma

سبات يترافق مع انسمام كحولي وخيم .

غَيبوبَةٌ أَلْفائيَّة alpha coma

سبات يوجَد فيه موجودات نظم مخطط كهربية الدماغ من الموجات ألفا الفعالة السائد .

غَيبوبَةٌ سَكْتِيَّة apoplectic coma

غياب وعي عميق بسبب حادث وعائي دماغي .

غَيبوبَةٌ كَبِدِيَّة coma hepaticum

غياب وعَي عميق بسبب الفشل الكبدي .

غَيبوبَةُ نَقْص كلور الدَّم coma hypochloraemicum

غيابَ الوعي العميق بسبب النقص في كلور الدم .

غَيبوبَةٌ وَسَنِيَّة coma somnolentium

كومبيبرس **Combipres**

الاسم التجاري لمستحضرات هيدرو كلوريد الكلونيدين (دواء خافض لضغط الدم)، والكلورتاليدون (دواء مدر للبول).

كومبيفانت **Combivent**

الاسم التجاري لمستحضر بروميد الإيبراتروبيوم (دواء مضاد للفعل الكوليني) مع سلفات الألبوتيرول (دواء موسع للقصبات)، والذي يستخدم في معالجة الداء الرئوي المسد المزمن (COPD).

كومبيفير **Combivir**

الاسم التجاري لمستحضرالزيدوفيدين مع اللامفيدين، كلاهما له فعل مضاد للريتروفير، والذي يستعمل كدواء مضاد لفيروس العوز المناعي المكتسب.

احتراق **combustion**

أكسدة سريعة مع إصدار (انطلاق) الحرارة.

زؤان (صمامة من الكراتين والزهم تسد فتحة جريب الشعرة) **comedo**

آفة عدية غير التهابية، تتألف من سدادة من الكيراتين والزهم تسد فوهة جريب الشعرة المتوسع، وتحتوي بشكل متواتر على جراثيم البروبيونية العدية، والعنقوديات المذهبة، والملاسيزية النخالية.

انظر أيضاً acne vulgaris.

الزؤان المغلق **closed comedo**

زؤان فوهته ليست متوسعة بشكل كبير، يظهر على شكل حطاطة صغيرة بلون الجلد. وبسبب عدم إمكانية خروج الكيراتين و الزهم المنتجين، فإن الزؤان يمكن أن يتمزق ويسبب آفة التهابية في الأدمة. يسمى أيضاً (Whitehead).

الزؤان المفتوح **open comedo**

زؤان مع فوهة متسعة بشكل كبير، حيث تكون المادة المصطبغة المنحشرة داخله مرئية على سطح الجلد. يسمى أيضاً (Blackhead).

سَرَطانَةٌ زؤانيَّة (في الثدي) **comedocarcinoma**

نمط من السرطانة القنوية في الموضع، والتي

غَيْبوبَة كوسماول **Kussmaul's coma**

(غَيبوبَةُ الحُماض السُّكَّري)

انظر تحت diabetic coma.

غَيبوبَةٌ اسْتقْلابِيَّة **metabolic coma**

السبات الذي يترافق مع الاعتلال الدماغي الاستقلابي.

غَيبوبَةُ الوَذْمَة المُخاطيَّة **myxedema coma**

هو غالباً مضاعفة مميتة لقصور الدرقية طويل الأمد، حيث يكون المريض مصاب بالغيبوبة مع انخفاض في درجة الحرارة، وتثبيط التنفس، وتباطؤ القلب، وانخفاض ضغط الدم، ويشاهد عادةً في المرضى المسنين خلال الطقس البارد.

غيبوبة فرط الأسمولية اللاكيتوني **nonketotic hyperosmolar coma**

انظر تحت hyperosmolar nonketotic coma.

غَيبوبَةُ التَّنْويم **trance coma**

تسمى أيضاً (Lethargic hypnosis)، وهو غياب الوعي الناجم عن تناول المنومات الكبرى (الرئيسية).

غَيبوبَةٌ يوريمِيَّة **uremic coma**

حالة نوامية ناتجة عن اليوريمية.

متعلق أو مصاب بالغَيبوبَة **comatose**

متعلق أو مصاب بالغيبوبة (السبات).

1ـ توليف **combination**

2ـ توليفة (ج: تواليف)

جمع عدة أشياء أو مواضيع منسجمة بطبعها، أو جعلها منسجمة متآلفة.

دائِرَة تَوافقيَّة **combinatorial circuit**

يتعلق بتنظيمات العناصر في مجموعات أو دوائر، أي أنها مجموعة تكاملية منسجة تؤلف دائرة أي يلتقي آخرها في التناغم مع أولها.

مَبْحَثُ التَّجْميعاتِ التَّصْنيفِيَّة **combinatorics**

علم التصنيف بحسب التوافقات المنسجمة.

تمَشيط **combing**

يسمى أيضاً (Hersage)، والمقصود به القيام بتفريق تمشيطي لألياف العَصَب.

انظر تحت symbiosis .

تطاعُم **commensalism**

(تعايش تستفيد منه الأطراف دون الإضرار ببعضها)

تعايش ؛ حيث أن فرد واحد يكسب من مرافقته الفرد الآخر دون أن يستفيد الآخر أو يتأذى منه .

تعليق **comment**

مـلاحظة على شيء أو قـول أو عـمل يبـديهـا المُعلق .

مُفتّت **comminuted**

مفتت أو مكسر إلى أجزاء صغيرة ، كالكسور المتفتتة .

تفتيت **comminution**

فعل التكسير ، أو الحالة التي يكون فيها الشيء مكسوراً إلى شدف صغيرة ، كما هي الحال في العظم المكسور .

المرُّ الحِجازيّ (جِنسُ نبات) **Commiphora**

جنس من النباتات من عائلة البيزراكا ، موطنه الأصلي أندونيسيا وأفريقيا . وينتج المر الحجازي الأثيـوبي (Abyssinica) والأنواع الأخـرى المر . وينتج المر الحجازي ذو البلسم العصاري (بلسم طولو) بلسم مكة .

هَيئة تسجيل الأغذِية **Commission on Dietetic Registration**

منظمة تختـصـر بالنفظ (CDR) ، وهي تهـتم بسلامة الأغذية وتغذية البشر الجيدة ، وتطالب بتسجيل المنتجات الغذائية .

هَيئة الفعَّاليَّات المِهَنيَّة وأنشِطة المستَشفيات **Commission on Professional & Hospital Activities**

هيئة رسـمية تعنى بالفعـاليات المهـنية وتأمين الخطوط الأساسية والساخنة للاتصال من قبل المواطنين وبيان أنشطة المستشفيات من العيادات والعمليات واستغراق مدة التشخيص . والفريق العامل بها في مختلف التخصصات ، وكل من يعمل فيها من الأطباء مختلفي الاختصاصات .

صِوار **commissura (pl.commissurae)**

(ث: صِواران؛ ج: أصْوِرة)

تكون خـلاياها المركـزية مـتنكسـة وتنضـغط بسهولة من السطح المقطوع للورم .

زؤانيّ **comedogenic**

منتج للزؤان .

توَسُّعُ قنَيَّاتِ الثّدْيِ **comedomastitis**

انظر تحت mammary duct ectasia .

مُرافِق (ج: مُرافقة) **comes (pl.comites)**

(تسمية تشريحية لوعاء يرافق جذعاً عصبياً)

تسمية تشريحية تطلق على الشريان أو الوريد الذي يرافق شـريان أو وريد آخـر أو جـذع عصبي .

انظر تحت arteria comitans .

انظر تحت vena comitans .

مِقياسُ توفيرِ الرَّاحَة **comfimeter**

هو مقياس حرارة التهوية .

عِلمُ توفيرِ الرَّاحَة **comfortization**

التطبيق العلمي للمبادئ الفيزيولوجية من أجل توفيـر الراحـة في حـالات المواقف الكـهـربيـة الكامنة .

كومفرِي **comfrey**

جنس نبات من فصيلة السمفوطن الخزني ، والسـمـفـوطن (جنس نبـات من الفـصـيلة الحمحمية) ، وهو نبات يستخدم مثل التبغ في أمريكا الجنوبية .

مُرافِقة (مُرافِق) **comites (sing.comes)**

(تسمية تشريحية لوعاء يرافق جذعاً عصبياً)

صَرْعِيّ **comitial**

أمْرٌ **command**

صدور أمر بتنفيذ شيء .

لِواط **commasculation**

إتيان الرجل للرجل من الشرج .

مُطاعِم **commensal**

1 ـ يعـيش على ، أو ضـمن كـائن حي آخـر ، والذي يستـفـيد دون أن يؤذي أو يفـيد الفـرد الآخر .

2 ـ كـائن حي يعيش على أو ضـمن كـائن حي آخر ، دون أن يسبب أذية للمضيف .

وهو جزء من الصوار السنجابي الأمامي إلى القناة المركزية . يسمى أيضاً الصوار الرمادي البطناني للحبل الشوكي .

الصوار البصلي الدهليزي **commissura bulborum vestibuli**
يسمى أيضاً صوار البصلة والدهليز ، وهو حزمة ضيقة متوسطة تمتد من الفتحة المهبلية لتتحد ببصلات الدهليز . يسمى أيضاً الجزء المتوسط للبصلة الدهليزية .


صوارُ المُخَيخ **commissura cerebelli**
تَسمى أيضاً (Cerebellar commissure) ، وهي تقاطع الألياف الصادرة والواردة من المخيخ إلى المناطق المختلفة منه .

صوار الأكيمات السفلية **commissura colliculi inferiors**
هو حزمة من الألياف العصبية التي تربط الأكيمتين السفليتين . يسمى أيضاً صوار الأكيمات الذنبي ، أو صوار الأكيمات الذنبية .

صوار الأكيمات العلوية **commissura colliculi superioris**
حزمة من الألياف العصبية التي تربط الأكيمات العلوية . يسمى أيضاً الصوار الأكيمي المنقاري ، وصوار الأكيمات المنقاري .

صوارُ الأكَيمتَين الذَّنَبيَّتَين **commissura colliculorum caudalium**
انظر تحت commissura colliculi inferrior .

صوارُ الأكَيمتَين المَنْقاريَّتَين **commissura colliculorum rostralium**
انظَر تحت commissura colliculi superior .



الأصورة **Commissurae**

موضع اندماج الأجزاء المتناسبة ، وهو مصطلح يستخدم لوصف تلك الوصلات التي تربط البنى التشريحية المتناسبة بشكل متواتر ، ولكن ليس دائماً عبر المستوى الناصف للجسم .

الصِّوارُ الأَبْيَضُ للنُّخاع **commissura alba medullae spinalis TA**
ملتقى تقاطع الألياف العصبية في المادة البيضاء النخاعية .

الصوار الأبيض الخلفي للنخاع **commissura alba posterior medullae spinalis**
يسمى أيضاً الصوار الأبيض الخلفي للحبل الشوكي ، وهو مجموعة من الألياف العصبية النخاعية التي تعبر في الحبل الشوكي من جهة إلى القناة المركزية من الجهة الأخرى الخلفية متغلغلةً بالصوار السنجابي . يسمى أيضاً الصوار الظهراني الأبيض للحبل الشوكي .

الصِّوارُ الأَبْيَض الأماميُّ للنُّخاع **commissura anterior alba medullae spinalis TA**
هو الصَوار الأمامي الأبيض للحبل الشوكي ، وهو عبارة عن تكدس مجموعة من الألياف العابرة من جهة واحدة للحبل الشوكي إلى الجهة الأخرى ويكون متوضع إلى الأمام من الصوار الرمادي . يسمى أيضاً الصوار البطناني الأبيض للحبل الشوكي .

الصِّوارُ الأماميُّ للمُخ **commissura anterior cerebriTA**
يسمى أيضاً الصوار الأمامي ، وهو حزمة من الألياف العصبية النخاعية التي تمر بشكل مستعرض عبر الصفيحة الانتهائية وأجزاء الإرتباط المتناظرة لنصفي الكرة المخية . تتألف من الجزء الأمامي الأصغر (الجزء الأمامي من الصوار الأمامي) ، والجزء الخلفي الأكبر (الجزء الخلفي من الصوار الأمامي) . يسمى أيضاً الصوار المنقاري .

الصِّوارُ السِّنْجابيُّ الأماميُّ للنُّخاع **commissura anterior grisea medullae spinalis**
يسمىَ أيضاً الصوار الرمادي للحبل الشوكي ،

صوارٌ شَفَوِيّ commissura labiorum oris TA
يُسمى أيضاً الصوار الشفوي للفم ، وهو الاتصال ما بين الشفة العلوية والشفة السفلية في جهتي الفم .

صوارُ الشُّفْرَين اَلْخَلْفيّ commissura labiorum posterior TA
يسمى أيضاً صوار الشفرين الخلفي ، وهو الصوار الخلفي للشفرين ، الاتصال الظاهر للشفرين الكبيرين خلفياً والمتشكل بواسطة البروز الوتري المركزي للعجان إلى الفلح العجاني .

صوارا اَلشُّفْرَين commissura labiorum pudendi
انظر تحت commissura labiorum anterior .
انظر تحت commissura labiorum posterior .

الصِّوارُ الدِّماغيُّ الكَبير commissura magna cerebri
(= الجِسْمُ الثَّفَنيُّ) (=corpus callosum)
انظر تحت corpus callosum .

الصِّوارُ الزَّيتونيّ commissura olivarum
(= الأَلْيافُ اَلْمُقَوَّسَةُ الدّاخليَّة) (=fibrae arcuatae internae)
انظر تحت fibrae arcuatae internae .

صوارُ الجَفْنَين اَلوَحْشيّ commissura palpebrarum lateralis TA
يسمى أيضاً الصوار الوحشي للجفنين ، وهو الاتصال ما بين الجفن العلوي والسفلي على الجانب الوحشي . يسمى أيضاً الصوار الجفني الجانبي .

صوارُ الجَفْنَين اَلإنْسيّ commissura palpebrarum medialis TA
هوَ الصوار الجفني الأنفي .

صوارُ اَلْمُهَيد commissura epithalamica TA
انظر تحت commissura posterior .

صوارُ القَبْو commissura fornicis TA
هَو حزمة من الألياف التي تربط الحصين من الجهتين عبر جسم القبو . يسمى أيضاً بصوار الحصين .

الصوار السنجابي الأمامي / الخلفي للنخاع commissura grisea anterior / posterior medullae spinalis
يسمى أيضاً الصوار الرمادي الأمامي / الخلفي للحبل الشوكي ، وهو الحزمة المستعرضة من المادة السنجابية المحيطة بالقناة المركزية للحبل الشوكي والممتدة خارجياً بالنسبة إلى المادة الهلامية المركزية ، وتربط الأعمدة المتوسطة والأمامية والخلفية .

الصوار السنجابي الخلفي للنخاع الشوكي commissura grisea posterior medullae spinalis
يسمى أيضاً الصوار الرمادي الخلفي للحبل الشوكي ، وهو جزء الصوار السنجابي إلى الخلف من القناة المركزية . يسمى أيضاً الصوار السنجابي الظهراني للحبل الشوكي .

صوارُ العنان commissura habenularum TA
هَو حزمَة من ألياف السطورالنخاعية التي تمر عبر العنان من كل جانب لتتصالب وتنتهي في العنان في الجانب الآخر .

صوارُ الحُصَين commissura hippocampi
وَيسمى أيضاً صوار القبو ، وهي صفيحة مثلثة تحت الجسم الثفني تتألف من الألياف القبوية اليمنى واليسرى المتقاطعة وتنحني للخلف إلى الجهة المقابلة من القبو . (Commissura fornicis) ، (Commissure of fornix) ، (Delta fornicis) ، (Hippocampal commissure) ، (Psalterium) ، (Transverse fornix) ،

صوارُ الشُّفْرَين اَلأَماميُّ commissura labiorum anterior TA
يسمى أيضاً الصوار الأمامي للشفرين ، وهو الاتصال ما بين الشفرين الكبيرين أمامياً ، على الحافة السفلية للارتفاق العاني .

وهو الشريط البطناني الأكثر مروراً عبر الخط الناصف للدماغ الظهراني إلى الحافة الذيلية للتصالب البصري .

انظر تحت supraoptic commissures .

صِوَارَان؛ أَصْوِرَة **commissurae**
(ف: صِوَار) **(sing.commisura)**

انظر تحت commisura .

صِواريّ **commissural**

يتعلق أو يعمل كصوار .

صِوار **commissure**

1ـ موضع اندماج الأجزاء المتناسبة .

2ـ موضع الاتصال ما بين شرفات الصمام القلبي .

الصوار الأمامي **anterior commissure**

انظر تحت commissure anterior .

الصِّوارُ الأماميُّ المُخّيّ **anterior commissure of cerebrum**

حزمة مدورة من الألياف العصبية التي تعبر الخط الناصف من الدماغ قرب الحدود الأمامية من البطين الثالث ، وتشتمل على ألياف أمامية أصغر ، والتي تمر أليافها في أجزاء من البصلة الشمية ، وأقسام خلفية أكبر وهي التي تتصل داخلياً بالفصين الصدغيين الأيمن والأيسر .

الصِّوارُ الأمامي للشَّفْرَين **anterior commissure of labia**

انظر تحت commissura labiorum .

الصِّوارُ الوِطائيُّ الأماميّ **anterior hypothalamic commissure**

يسمَى أيضاً الصِّوارُ فَوقَ البَصَريِّ الظَّهْرانيُّ (Dorsal supraoptic commissure) ، وتقاطَع جانسر (Ganser) ، وهي التصالبات الليفية العصبية التي تقع فوق وخلف التقاطع البصري .

الصِّوارُ الأبيَضُ الأماميُّ **anterior white commissure**

يسمى أيضاً (Commissura alba) ، (Commissura ventralis alba) ، وهي حزمة

انظر تحت commissura palpebrarum .

الصِّوارُ الجَفْنيُّ الأنْفيّ **commissura palpebrarum nasalis**
(= صِوارُ الجَفْنَين الإنْسيّ) **(=commissura palpebrarum medialis)**

يسمى أيضاً الصوار الجفني الإنسي ، وهو الاتصال ما بين الجفن العلوي والسفلي على الجهة الإنسية .

الصِّوارُ الجَفْنيُّ الصُّدْغيّ **commissura palpebrarum temporalis**
(= صِوارُ الجَفْنَين الإنسيّ) **(=commissura palpebrarum medialis**

انظر تحت commissura palpebrarum lateralis .

الصِّوارُ الخَلْفيُّ المُخّيّ **commissura posterior cerebri TA**

يسمى أيضاً الصوار الخلفي ، وهو حزمة ليفية كبيرة تمر عبر الخط الناصف لما فوق المهاد إلى النقطة التي تنفتح فيها القناة الدماغية على البطين الثالث . يسمى أيضاً الصوار المهيدي وصوارفوق المهاد .

الصِّوارُ الخَلْفيُّ النُّخاعيّ **commissura posterior medullae spinalis TA**

تقاطع الألياف العصبية في الجهة الخلفية من النخاع .

الصِّوارُ المِنْقاريُّ لِلمُخ **commissura rostralis cerebri**

انظر تحت commissura anterior .

الصِّوارُ فَوقَ البَصَريِّ الظَّهْرانيُّ **commissura supraoptica dorsalis TA**

هو الشَّريط اللِيفيَّ الظهراني الأكثر مروراً عبر الخط الناصف للدماغ الظهراني إلى الحافة الذيلية للتصالب البصري .

انظر تحت supraoptic commissures .

الصِّوارُ فَوقَ البَصَريِّ البَطْنانيُّ **commissura supraoptica ventralis TA**

يسمى أيضاً الصوار البطناني فوق البصري ،

صوار الأكيمة العلوية **commissure of superior colliculus**
انظر تحت commissura colliculi superioris .

الصِّواران الفَرْجيَّان **commissures of vulva**
ملتقى الَشفرينَ الكبيرين في الأعلى والأسفل من الشق الفرجي .

صوارُ فوريل **Forel's commissure**
تَسمى أيضاً التَّصَالُبَةُ فَوْقَ الحُلَيْمات (Supramamillary decussation) ، وتصالبات السقيفة ، وهي النواة فوق الحليمية . وفي الطيور تمثل النهاية الذنبية للوطاء . كما تطلق على التقاطعات السقيفية البطنية (أو تقاطع النواة الحمراء الشوكية) للحزم الحمراء الشوكية والحمراء .

صوارُ غانسَر **Ganser's commissure**
(= الصِّوارُ فَوقَ البَصَريِّ الظَّهْراني) **(=dorsal supra optic commissure)**
انظر تَحت supra optic commissure .

الصوار السنجابي **gray commissure**
هي المادة المتوسطة المركزية للنخاع .
انظر تحت substantia intermedia centralis medullae spinalis .

الصوار السنجابي للحبل الشوكي **gray commissure of spinal cord**
هما الصوارين السنجابيين الأمامي والخلفي للحبل الشوكي معاً .
انظر تحت commissura grisea anterior/ posterior medullae spinalis .

الصوار السنجابي الأمامي للحبل الشوكي **gray commissure of spinal cord anterior**
انظر تحت commissura grisea anterior medullae spinalis .

الصوار السنجابي الأمامي/ الخلفي للحبل الشوكي **gray commissure cord anterior/ posterior of spinal**
انظر تحت commissura grisea anterior posterior medullae spinalis .

ضيقة من مادة بيضاء تتأخم مع الشق المتوسط الأمامي من الحبل الشوكي أمام الشق السنجابي ، ويتألف من ألياف عصبية تتقاطع لتمر إلى الجهة المقابلة من النخاع .

الصوار المخي الخلفي **cerebral commissure posterior**
انظر تحت commissura posterior .

الصوارُ فَوقَ التَّصالُبَة البَصَريَّة **chiasmatic supraoptic commissure**
يسمى أيضاً الصِّوارُ فَوقَ البَصَريِّ البَطْناني (Ventral supraoptic commissure) ، والواقع هناك ثلاث تسميات للتصالبات فوق البصرية التي تقع فوق التصالبة البصرية وخلفها وهي (Ganser's commissures) ، (Gudden's commissures) ، (Meynert's commissures) ، (Supraoptic commissure) .

صوار بصلة الدهليز **commissure of bulbs of vestibule**
انظر تحت commissura bulborum vestibuli .

صوار الأكيمة المذنبة **commissure of caudal colliculus**
هو الصوار الأكيمي السفلي .
انظر تحت commissura colliculi inferior .

صوار فوق المهاد **commissure of epithalamus**
انظر تحت commissura posterior .

صوارُ القَبْو **commissure of fornix**
اَنْظر تحت commissura fornicis .

صوارُ العنان **commissure of habenulae**
اَنْظر تَحت commissura habenularum .

صوار الأكيمة السفلية **commissure of inferior colliculus**
انظر تحت commissura inferiois colliculi .

صوارُ الشَّفَتَين **commissure of lips of mouth**
اَنْظر تحت labiorum oris commissura .

صوار الأكيمة المنقارية **commissure of rostral colliculus**
انظر تحت commissura colliculi superioris .

gray commissure of spinal cord dorsal **الصوار السنجابي الظهراني للحبل الشوكي**

انظر تحت commissura grisea posterior medullae spinalis .

gray commissure of spinal cord posterior **الصوار السنجابي الخلفي للحبل الشوكي**

انظر تحت commissura grisea posterior medullae spinalis .

great commissure **الصِّوارُ الكَبير**

يقصد به الجسم الثفني (Corpus callosum) ، ويسمى أيضاً (Commissure of cerebral hemispheres) ، ويمثل اللويحة الاتصالية الكبيرة للألياف العصبية الرابطة بين نصفي الكرتين المخيتين باستثناء معظم الفصين الصدغين اللذين يرتبطان بالصوار الأمامي .

Gudden's commissure **صوارُ غودن**

(=Commissura supraopticae inferior) **(=الصِّوارُ فَوقَ البَصَرِيِّ السُّفْلِيُّ)**

الصوارَ فوق البَصري البطناني أو السفلي .

hippocampal commissure **صوارُ الحُصَين**

(=commissura fornicis) **(= صوارُ القَبْو)**

انظر تحت commissura fornicis .

interthalamic commissura **الصِّوارُ بَينَ المِهادَين**

الألياف العصبية الرابطة داخلياً بين المهادين .

laryngeal commissure **الصِّوارُ الحَنْجَرِيُّ**

هو المنطقة الواصلة (الأمامية أو الخلفية) بين جانبي الحنجرة .

lateral commissure of eyelids **صوارُ الجَفْنَين الوَحْشِيُّ**

انظر تحت commissura lateralis palpebrarum .

lateral white commissure of spinal cord **الصِّوارُ الأَبْيَضُ الوَحْشِيُّ للنُّخَاع**

التصالبات الليفية العصبية في جانبي النخاع .

medial commissure of eyelids **صوارُ الجَفْنَين الإنْسِيُّ**

انظر تحت commissura medialis palpebrarum .

commissure Meynert's **صوارُ ماينَرت**

(= الصِّوارُ فَوقَ البَصَرِيِّ العُلْوِيُّ)

هو الصوار الظهري أو فوَق البصَري العلوي .

انظر تحت supraoptic commissures .

middle commissure of cerebrum **الصِّوارُ المُتَوَسِّطُ المُخِّيّ**

يسمى أيضاً الالْتصاقَةُ المِهاديَّةُ البَينيَّة (Adhesio interthalamica) ، (Commissura cinerea) ، (Commissura grisea) ، (Interthalamic adhesion) ، (Mmassa intermedia) ، وهي اتصالات متفاوتة بين الكتلتين المهاديتين عبر البطين الثالث وهي مفقودة في (20٪) من دماغ البشر .

optic commissure **الصِّوارُ البَصَرِيُّ**

منطقة تصالُب االألياف البصرية بين العصبين البصريين الأيمن والأيسر . ويسمى أيضاً التصالبة البصرية (Optic chisma)

posterior commissure **الصِّوارُ الخَلْفِيّ**

(=commisura posterior cerebri) **(= الصِّوارُ الخَلْفيُّ المُخِّيّ)**

انظر تحت commisura posterior .

posterior commissure of labia **الصِّوارُ الخَلْفِيُّ للشُّفْرَين**

rostral commissure **الصوار المنقاري**

superior commissure **الصِّوارُ العُلْوِيّ**

يسمى أيضاً الصِّوارُ فَوقَ البَصَرِيِّ العُلْوِيُّ (Commissura supraoptica superior) .

supraoptic commissure, dorsal **الصوار فوق البصري الظهري**

انظر تحت commissura supraoptica dorralis .

superoptic commissure, ventral **الصوار فوق البصري البطناني**

انظر تحت commissural supraoptica dorsalis .

supraoptic commissures **الأَصْوِرَةُ فَوقَ البَصَرِيَّة**


يستخدم لفصل الوريقات الملتصقة للصمام المترالي المتضيق .

1ـ حَجْزٌ commitment

2ـ إيداعٌ

3ـ التِزام

هو الالتزام المدني ، وهو الإجراء الشرعي الذي يمكن لشخص أن يحجز بشكل غير طوعي في المستشفى العقلي ، أو أن يخضع للمعالجة بالعيادات الخارجية .



بضع الصوار Comissurotomy

لجنَة committe

مجموعة من الأشخاص تكلف بأداء مهمة معينة .

اللَّجنَةُ الاستشاريَّةُ الإداريَّةُ management advisory committee

لجَنة تقدم خبراتها في الاستشارات الإدارية

اللَّجنَةُ الإقليميَّةُ regional committee

لجنة يتحدد عملها في إقليم معين دون غيره .

اللَّجنَةُ الاستشاريَّةُ الإقليميَّةُ regional consultative committee

لجنة تقدَم خبراتها على مستوى إقليمي معين .

لجنَة التَعْليم الصحيّ المتَحِد واعتِمَاده Committee on Allied health Education & Accreditation

لجنة معتمدة لتقرير منهاج التعليم الصحي الموحد وتقرير اعتماده رسمياً .

1ـ شائع common

2 ـ مُشْتَرَكٌ

3 ـ أصْلِيّ (في الأوعيَة)

هي على الأقل ثلاثة من حزم الألياف ذات التوضع الظهراني بالنسبة للتصالبة البصرية والتي ترافقت مع أسماء جودن (بطناني أو سفلي) وماينرت (ظهراني أو علوي) ، وجانسر (أمامي) ، والتي تم الإشارة إليها كأصورة لكن هي تصالبات بشكل محتمل واتصالاتها في الإنسان غير محددة . فقط الحزم البطنانية والظهرانية معروفة في التسميات التشريحية المعروفة .

انظر تحت commissura supraoptica dorsalis .

انظر تحت commissura supraoptica ventralis .

الصِّوارُ الأَبْيَض للنُّخَاع white commissure of spinal cord

منطقة التصالبات الليفية النخاعية في النخاع الشوكي .

الصوار الأبيض الأمامي للنخاع white commissuer of spinal cord, anterior

انظر تحت commissura alba anterior medullae spinalis .

الصوار الأبيض الظهراني للنخاع white commissure of spinal cord, dorsal

انظر تحت commissura alba posterior medullae spinalis .

الصوار الأبيض البطناني للنخاع white commissure of spinal, cord ventral

انظر تحت commissura alba anterior medullae spinalis .

رَفْوُ الصوار commissurorrhaphy

خياطة الأجزاء المكونة للصوار لإنقاص حجم الفتحة .

بَضْعُ الصوار commissurotomy

القطع الجراحي أو التمزيق الأصبعي للأجزاء المكونة للصوار لزيادة حجم الفتحة ، والتي تستخدم بشكل شائع لفصل الوريقات الملتصقة أو المتسمكة للصمام المترالي المتضيق .

بَضْعُ الصَّوارِ المترالي mitral commissurotomy

اتصال **communication**

في التشريح ربط بين مكونين تشريحيين كالأعصاب بالأوتار أو العضلات . وهو أيضاً ربط قناتين أو أي تركيب تشريحي مناسب للاتصال .

الاتِّصالُ الشِّرْيانِيُّ الوَرِيديُّ **arteriovenous communication**

ربط شريان بوريد كما يحدث في حالات الحاجة للديال الدموي .

رابطٌ اتصالِيٌّ **communications link**

وسيلة الربط بين جزئين يجب وصلهما أو الربط بينهما سواء في المعدات أو الوسائط .

أصْليّ (قبل التفرُّع) **communis TA**

مصطلح عام يشير إلى البناء الذي يعطي عدة فروع .

مُجْتَمَع **community**

هيئة الأفراد الذين يعيشون في منطقة محدودة أو يجمعهم اهتماماً عاماً أو منظمة عامة .

مُجْتَمَعٌ حَيَوي **biotic community**

مجتمع مَن الناس الذين يعيشون في منطقة محددة .

مُجْتَمَعٌ أَوْجي **climax community**

هي المجتمَع النهائي و المستقر و الناضج في تسلسل ، والتي تكون في توازن مع حالات البيئة و تتألف من مجموعة محددة من الأنواع النباتية و الحيوانية . التسلسل الداخلي للمجتمعات يسمى المجتمعات الاستيطانية (Sera) والمجتمعات الفردية الانتقالية بالمراحل الاستيطانية (Seral stges) .

مُجْتَمَعيٌّ المُرْتَكَز **community based**

أمر أو دراسة أو معطيات أو تخطيط يعتمد على المجتمع بشكل أساسي .

التَّخْطِيطُ المُجْتَمَعِيُّ المُرْتَكز **community based planning**

التخطيط المنطلق من أسس اجتماعية .

مَرْكَزٌ صِحِّيٌّ مُجْتَمَعِيٌّ **community health center**

يستعمل في مجالات كثيرة ومعان متعددة أهمها : في تشريح الشرايين ، يطلق على الشريان الأصلي قبل تفرعه ، وفي الأوردة والأقنية الصفراوية مما يجمع الفروع بمعنى متشرك لأنه يجمع أكثر من فرع ، ويستعمل بشكل عام في الإكلينيكيات بمعنى شائع .

القَناةُ المُشْتَرَكَةُ للصَّفْراء **common bile duct**

تسمى أيضاً قناة الصفراء (Ductus choledochus) ، وهي القناة التي تجمع الأوعية الصفراوية الدقيقة من الكبد والمرارة في قناة واحدة وتصب أخيراً مجتمعة مع قناة البنكرياس ثم في الاثنا عشري .

القانونُ العام **common law**

القانون الذي يتفرع عنه تشريعات وضوابط قانونية كثيرة .

ارْتِجاج **commotio**

اهتزاز شديد ، أو الصدمة التي تنتج عنها .

ارْتِجاجُ المُخّ **commotio cerebri**

اَنظر تحت concussion of brain .

ارْتِجاجُ الشَّبَكيَّة **commotio retinae**

وَذمة حول المنطقة البقعية للشبكية ، والناتجة عن خبطة وخيمة لكرة العين والتي تسبب في حدوث عتمة مركزية دائمة كنتيجة لتدمير الخاريط الحساسة في النقرة . تسمى أيضاً وذمة برلين (Berlin's edema) ، وارتجاج الشبكية .

ارْتِجاجُ النُّخاع **commotio spinalis**

اَنظر تحت concussion of the spinal cord .

سِرايَة **communicability**

انتقال العامل المرضي من المستودع أو الحامل إلى متلق أو ثوي جديد .

سارٍ (ساري) **communicable**

قابلية الانتقال من شخص أو نوع لآخر كمرض ساري أو معدي .

مُوَصِل **communicans**

يستخدم في التسميات التشريحية للإشارة إلى البناء المتصل كالعصب .

مُدِيْرُ العَلاَقَات العَامَّة **community relations director**

يسمى أيضاً (Public relations director) ، وهو القائم بشؤون الارتباط الاجتماعية والتواصل مع فعاليات المجتمع وربط العلاقات برؤساء المجتمع ومدراء الدوائر لتسهيل عمليات تقديم الخدمات من وإلى المجتمع .

مرفَقٌ سكَنِيّ مجْتَمَعِي **community residential facility**

مرفق وَطني للإقامة الجماعية الاجتماعية لمن ليس لهم مأوى من العجزة والمقعدين أو لتأمين الرعاية الصحية والنفسية من أفراد المجتمع .

مجتمع انتقالي **seral community**

انظر تحت stage .

مُجْتَمَعٌ مَرْحَلِيٌّ **serial community**

انتقال المجتمَع وفق الخطط المدروسة له مرحلياً وفق خطوات وليس دفعة واحدة لتحقيق هدف الارتقاء .

مُجْتَمَعٌ علاَجِيٌّ **therapeutic community**

مركز علاَجيّ عقلي تخصصي ووسط علاجي يشمل مجموعة من الموظفين ويعمل على تشجيع المرضى للعيش ضمن المعايير الاجتماعية .

مُبَلِّة كَهْرَبِيَّة **commutator**

مفتاح كهربي دوار تزود به بعض أنواع المحركات الكهربائية لتحويل اتجاه التيار دورياً حسبق المصدر المناسب له وبما يتوافق مع عمل المحرك .

علامة كومولي **Comolli's sign**

[علامة منسوبة للطبيب أنطونيو كومولي (Antonin comolli) ، وهو مشرح مرضي إيطالي ، ولد (1879)] وهي علامة في كسر الكتف .

انظر تحت sign .

مرض مرافق **comorbid**

له علاقة بمرض أو آلية إمراضية أخرى تحدث بشكل آني مع مرض آخر .

مركز صحي مصمم لخدمة المجتمع ككل وتقديم الخدمات الصحية له .

شَبَكَةُ صِحَّة المُجْتَمَع **community health network**

شبكة اجتماعية مترابطة بمؤسساتها المتكاملة لتقديم الخدمات الصحية الاجتماعية . وقد تكون هذه الشبكة متوفرة عبر الاتصالات وخدمات الإنترنت .

خَدَمَاتُ صِحَّة المُجْتَمَع **community health services**

الخدمات الصحية العالية التي تقدم بشكل متوفر وميسور للمؤمِّنين وغير المؤَمِّنين صحياً وللذين لا يمكنهم الوصول لخدمات الرعاية الصحية .

مُسْتَشْفَى مُجْتَمَعِي **community hospital**

مستشفى معدَّة لتقديم الخدمات لسائر أفراد المجتمع .

إشْرَاكُ المُجْتَمَع **community involvement**

دعوة المجتمع أو ممثلين عنه لوضع الخطط العامة لتقديم الخدمات الصحية المناسبة .

المَنْزِلُ الوَسِيط **community living facility**

يسمى أيضاً (Halfwayhouse) ، وهو مركز أو مقر ينقل إليه السجناء وغيرهم ممن يحتاجون لمرحلة انتقالية من التأهيل الاجتماعي للتأهب للاندماج بالمجتمع .

مَرْكَزُ الصِّحَّة النَّفْسِيَّة المُجْتَمَعِيّ **community Mental Health Center**

المركَز الصحي الذي يقدم خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالأمراض النفسية العقلية للمجتمع كله .

مُجْتَمَعِيُّ التَّوَجُّه **community oriented**

صفة الخدمات أو الرعاية والأعمال التي يقصد بها المجتمع كله ولا يخصص أحداً .

مَشَارَكَةُ المُجْتَمَع **community participation**

المشاركات الاجتماعية في تقديم الخدمات الجماعية أو التبرعات لدعم المرافق وتقديم الخبرات والمشاركة في اتخاذ القرارات .

القرص الحاسوبي القادر على تخزين المعلومات بشكل ثابت يمكن نقلها عليه وعرضها على أجهزة الحاسوب في الأوقات المناسبة .

الطَبَقة المكتنِزة (في بطانة الرحم) **compacta**

تسمى أيضاً (Stratum compactum) ، وهي الطبقة البطانية الرحمية السطحية من النسيج الساقط في الرحم ، والذي يتغلب فيه النسيج الغدي البيني .

compaction

1ـ رَصٌّ

2ـ انْحِشارٌ

3ـ تحاشُد

comorbidit **إمراضية مرافقة**

1ـ مرض أو حالة مرضية مرافقة .

2ـ الحالة المرضية المرافقة .

3ـ المدى الذي يحدث فيه مرضين أو اضطرابين معاً في جمهرة من الناس .


compact **مُكتنِز**

له بنية مكتنزة .

compact bone **عَظْمٌ مُكْتَنِز**

نوع من العظم في جسم الإنسان ، والذي يملك بنية مكتنزة .

compact disk **قُرْصٌ مُكْتَنِز**



Common bile duct القناة المشتركة للصفراء

الحَيِّزُ خارجَ الخَلَوِيّ **extracellular compartment**

الجزءَ من الجسم الذي تغمره السوائل خارج الخلايا ، وتتم فيه التبادلات الأيونية ، والطاقة بينه وبين الحيز داخل الخلايا .

الحَيِّزُ داخلَ الخَلَوِيّ **intracellular compartment**

هو الوسَط الداخلي للخلايا المتضمن الجبلة الخلوية وما تحتوي عليه من أجهزة وسوائل وأيونات .

الحَيِّزُ العَضَليُّ **muscular compartment**
(= جَوبَةٌ عَضَلِيَّة) **(=lacuna musculorum)**

انظر تحت lacuna musculorum .

الحيز العجاني السطحي **superficial perineal compartment**

انظر تحت compartimentum superficiale perinei .

الحَيِّزُ الوعائيُّ **vascular compartment**
(= جَوبَةٌ وعائيَّة) **(=lacuna vasorum)**

انظر تحت locuna vasorum .

compartmentalizatin **تحاوُز (الانقسام إلى أحياز)**

هو الانقسام الطبيعي ضمن الخلايا الناتج عن النفوذية الانتقائية للغشاء الخلوي الذي يحيط بكل من الأجزاء المنفصلة (المتقدرات واليحلول ومركب جولجي ، إلخ .) سامحةً لكل جزء منها لتنظيم محتوياتها . يسمى أيضاً (Compartmentation) .

compartmentation **تحاوُز**

انظر تحت compartmentalization .

compass **1 ـ فِرْجارٌ**
2 ـ مُوصِلة؛بُوصَلة

1 ـ يطلق على الفرجار الذي يمكنه رسم الدوائر بحسب نصف القطر المرغوب .

2 ـ جهاز البوصلة التي تحدد اتجاه الشمال المغناطيسي .

compatibility **توافق**

النوعية التي تجعلها متوافقة .

1 ـ مضاعفة للولادة في المواليد التوأمية حيث يكون هنالك تدخل تام للأقطاب الجنينية المتوجهة لكلا التوأمين ، لذلك يكون جوف الحوض الحقيقي ممتلأً مانعاً أي نزول آخر ؛ أي أنه انحشار .

2 ـ في علم الجنين ، خلال العملية التي تغير فيها القسيمات الأرومية شكلها وترصف نفسها بشكل متين تجاه بعضها بعضاً لتشكل كرة مرتصة من الخلايا التوتية .

compages **قفص**

أشياء تتمفصل مع بعضها البعض أو تتمفصل معاً .

القَفَصُ الصَّدْرِيُّ **compages thoracis TA**

الحيز الذي يَحدده جدار الصدر المؤلف من الأضلاع والعضلات الوربية ، ويحتوي على أهم جهازين حيويين هما الجهاز الرئوي التنفسي والجهاز القلبي الدوراني الأساسي .

انظر تحت skeleton thoracis .

comparascope **مِنْظارُ المقارَنة**

آداة متصلة إلى مجهر من أجل المقارنة ما بين مادتان صلبتان .

comparator **مُقارِنٌ**

مقياس ألوان بسيط يتألف من كتلة من الخشب مع ثقوب توضع فيها أنابيب الاختبار ليتم مقارنتها ، وثقوب مستعرضة يتم عبرها رؤية الألوان . يسمى أيضاً (Comparator block) .

compartimentum **حيز**

انظر تحت compartment .

الحيز العجاني السطحي **compartimentum perineisuper ficiale**

هو المنطقة ما بين الغشاء العجاني واللفافة العجانية السطحية . يسمى أيضاً الجيبة العجانية السطحية (Spatium superficiale perinei) والمكان العجاني السطحي (superficial perinael pouch) .

compartment **حَيِّز**

باحة مسيجة صغيرة داخل حيز كبير .

عن مثيله لأحد الكروموسومين X في الذكر الطبيعي .
انظر تحت lyon hypothesis .

compensator **مِعْواض**
أداة القيام بالمعاوضة في المعالجة الشعاعية .

compensatory **مُعاوِض**
يعاوض الخلل أو المفقود ، أي أنه يعيد التوازن المفقود .

competence **أَهْلِيَّة**
1ـ قدرة العضو أو الجزء لإنجاز أية وظيفة مطلوبة بشكل ملائم .
2ـ في علم الجنين ، قدرة الخلايا الجنينية للتمايز إلى أنماط الخلايا المحددة بواسطة المحرض .

embryonic competence **أهلية جنينية**
هي قدرة النسج الجنينية للاستجابة بشكل طبيعي لتأثير المحرض .

immunologic competence **أَهْلِيَّةٌ مَناعيَّة**
انَظر تحتَ immunocmpetence .

mental competence **أَهْلِيَّةٌ عَقْلِيَّة**
القَدرة العَقلية على الاستنتاج الصحيح وتجنب الأخطار .

competency **أَهْلِيَّة**
القدرة على التصرف الرشيد وتحمل المسؤوليات .

competent **مُؤَهَّل**
صفة القادر المؤهل على القيام بالأعمال الموكلة.

immunologically competent **مُؤَهَّلٌ مَناعياً**
أصبح بقدَرة مناعية كافية لإتقاء المرض .

competition **تنافس**
الظاهرة التي يتنافس فيه جزءان متشابها البنية على موضع ارتباط وحيد على جزيء ثالث .
انظر تحت competitive inhibition .

antigenic competition **تنافس مستضدي**
تبدل الاستجابة للمستمنع الناتج عن الإعطاء القريب أو الآني لإثنان من المستمنعين . تكون الاستجابة لأحدهما طبيعية بينما تكون

compatible **مُتَوَافِق**
1ـ قادر على التواجد بشكل منسجم ؛ يقال أن دوائين أو أكثر مناسبين من أجل الإعطاء معاً في الوقت نفسه بدون إبطال أو تفاقم تأثيراتهما .
2ـ إشارة إلى المعطي أو المتلقي للدم المنقول حيث لا يوجد هناك تفاعل لنقل الدم .
3ـ توافق نسجي .

Compazine **كومبازين**
هو الاسم التجاري لمستحضر مالات البروكلوربيرازين .

compensable **قابلٌ للمُعَاوَضَة**
الجهد الذي يمكن تحمله وتعويض الطاقة التي يحتاجها .

compensate **يُعاوِض**
عملية القيام بالتعويض من الطاقة .

compensated **مُعاوَض**
صفة المرض أو الجهد القابل للمعاوضة بعد أن تمت معاوضته .

compensation **مُعاوَضَة**
1ـ الموازنة بين أي خلل في البنية أو الوظيفة .
2ـ العملية الواعية ، أو بشكل أكثر توتراً ، هي الآلية الدفاعية غير الواعية التي يحاول من خلالها الشخص التعويض عن الأعواز الحقيقية أو الفيزيائية أو النفسية .
3ـ في وجود المرض ، المحافظة على الجريان الدموي المناسب دون أعراض ضائقية ، ويتم ذلك بالتصحيح للإحطام القلبي والدوراني كتسرع القلب والتضخم أوالتوسع القلبي ، وزيادة في الحجم الدموي باحتباس الصوديوم والماء .

broken compensation **انْهِيارُ المُعاوَضَة**
الوقوع بالفشل الوظيفي بعد عدم التمكن من تقديم الطاقة للقيام بالجهد المطلوب ، وذلك لنفاد مخزون الطاقة .

dosage compensation **مُعاوَضَةٌ بالمُعايَرَة**
في الوراثة ، هي الآلية التي بها يرد تأثير الكروموسومين X للأنثى الطبيعية ، ويتخلى

والكلوسترين والعامل الكلوي C3 ، والعامل المسرع للنخر والعامل المحدد المثلي ، والعامل المذيفن المثبط ، والمثبط C1 ، والبروتين الرابطC4 ، والبروتين تميم العامل الغشائي ، والبروتكتين ، والفيترونكتين . يحرض تفعيل السبيل الكلاسيكي الشلال الإنزيمي الذي يتألف من C1 و C4 وC2 .

المتممةC1 **C1complement**

هو العنصر الأول من السبيل الكلاسيكي لتفعيل المتممة ، وهو المعقد الجزيئي الخماسي المعتمد على الكالسيوم الذي يتألف من C1q وجزيئان هما C1r و C1s .

المتممةC1q **C1q complement**

الجزيء ذو الوحيدة السادس ، يتألف من 18 سلسلة عديدة ببتيد ، له شكل ستة أعواد متوازية تتسع تدريجياً نحو الخارج بعيداً عن بعضها البعض في نهاية كل واحدة منها لتنتهي في تنظيم يشبه تنظيم فرع الأزهار ، والرأس الكروي لكل عود منها يشبه زهرة التوليب . إن الارتباط ما بين الرؤوس و الأضداد (الجلوبولين المناعي M) ، أو IgG ، ويبتدئ السبيل الكلاسيكي للمتممة ، و الذي يستمر بالارتباط بالجزيئين C1r و C1s بواسطة C1q .

المتممة C1r **C1r complement**

هو المكون سيرين إستراز لل C1 في السبيل الكلاسيكي للمتممة ، والذي يفعل بشطر الرابطة ما بين C1r وجذع الجلوبولين المناعي الرابط لل C1q ، فعندما يتفعل يستطيع عندها شطر وتفعيل C1s يشار إلى الحالة المفعلة أحياناً بشكل نوعي بال C1r .

المتممة C1s **C1s complement**

إنزيم يشطر C4 إلى C4a ، C4b ، ويشطر C2 إلى C2a ، C2b ، وتتفعل بشطر الرابطة الببتيدية عندما تتفاعل C1 مع مفعلات السبيل الكلاسيكي . وتتثبط بواسطة مثبط C1 تسمى أيضاً C1 إستراز (G1 esterase) يشار للحالة المفعلة أحياناً بشكل نوعي بواسطة C1s .

الاستجابة للثاني مثبطة أو مكبوتة .

تنافسِيٌّ **competitive**

محاولة طرفين تحصيل هدف واحد من قبل أحدهما فقط .

خُطَّةٌ طِبِّيَّةٌ تَنَافُسِيَّة **competitive Medical Plan**

مِقياسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة **compimeter**

جهاز ذو عينيتين ومصباح شقي مصمم للفحص العيني العام ولقياس ورسم الساحة البصرية .

يَشْتَكي **complain**

فعل الشخص المريض أو المراجع بإظهار شكواه التي يعاني منها ويبينها للطبيب .

شَكْوَى **complaint**

انظر تحت symptom .

الشَّكْوَى الرَّئِيسيَّة **chief complaint**

الشكوى الرئيَسية ، أو الأعراض المتظاهر بها المريض أو مقدم الشكوى .

مُتممَة **complement**

مصطلح يستخدم في الأصل للعامل العطوب بالحرارة في المصل ، الذي يسبب الانحلال الخلوي المناعي ، وانحلال الخلايا المغلفة بالأضداد . يستخدم هذا المصطلح حالياً للإشارة للجهاز المتعلق بالوظيفة التي تتكون على الأقل من 20 بروتين مصلي متميز ومستقبلاتهم الخلوية والبروتينات المنظمة ذات العلاقة التي لا تكون تأثيراتها مقتصرة على الانحلال الخلوي المناعي فحسب ، وإنما أيضاً على وظائف بيولوجية أخرى تتضمن التفاعل التأقي والبلعمة الخلوية والطهاية الخلوية والانحلال الدموي . يحدث تفعيل المتممة بواسطة طريقتين مختلفتين ، السبيل الكلاسيكي (المعهود) والسبيل البديل . كل مكونات المتممة المصممة من C1 إلى C9 تشارك في السبيل الكلاسيكي ، بينما يفتقد السبيل البديل لعناصر المتممة C1 ، C2 و C4 ولكن يضاف على هذه العناصر B ، D والبروبيردين تتضمن البروتينات المنظمة العوامل H وI

الأخرى بواسطة شطر العوامل المتممة مشكلة الشـدفـة "b" مـثـالـه (C3b , C4b) ، بعض المؤلفين يشيـرون إلى هذه الشـدف الفـعـالة بال C2b وكذلك فإن الشدفة الذائبة الصغيرة C2a ، في هذه الحالة يشار إلى ال C3 و C5 كـونفيـرتاز بـ C4b2b و C4b2b3b على الترتيب .

المتممة C3 **C3 complement**


مكونة لكلا من السبيلين الكلاسيكي والبديل . يمكن أن تشطر بشكل عـفـوي في مـسـتـويات منخفضة أو بواسطة واحد من C3 كونفيـرتاز (C4b, 2a) ، أو (C3b, Bb) لـيـشـكـل (C3a و C3b) يتصاحب عوز C3 مع العدوى الجرثومية

المتممة C2 **C2 complement**

مكونة من السبيل الكلاسيكي للمتمـمة الذي يـرتـبط بـالـسـطـح الرابـط لـل C4b ، ويشطر C2 بواسطة C1s مـحـرراً شـدف C2b الصـغـيـرة ، وتترك C2a مـرتبط مع C4b لـيشكل السـبـيل الكلاسيكي C3 كونفيرتاز (C2a ، C4b) .

المتممة C2a **C2a complement**

مـقـوم من السـبـيـل الكلاسـيـكي C3 ، C5 كـونفيـرتاز [(C4b , C2a) ، و (C4b , 2a , 3b) بالترتيب] ، وهو يتولد بواسطة شطر C2 المرتبط مع C4b المتـواسـط بال C1s . وبـسـبـب كـون الشـدف الفـعـالة المتـولـدة في مـعظم الحـالات



Complement المتممة

كونفيرتاز ، والذي يتولد بإضافة البروبيردين إلى $C3b_n$,Bb .

المتممة C3d **C3d complement**

عامل نمو الخلايا البائية والذي يتولد بتعطيل C3b بواسطة العامل I و تميم عوامل مختلفة ، والتي تتضمن مستقبل المتممة 1 ، والبروتين تميم العامل الغشائي ، والعامل H ، والتي تتداخل مع مستقبل المتممة 2 على اللمفاوية البائية .

المتممة C4 **C4 complement**

هي مكونة للسبيل الكلاسيكي للمتممة ، والذي يربط C1 ويُشطر بواسطة C1s لتوليد الذيفان التأقي الصغير C4a ، والشدفة الفعالة الأكبر حجماً C4b .

المتممة C4a **C4a complement**

ذيفان تأقي ضعيف يتولد بواسطة شطر C4 بواسطة C1s في تفعيل السبيل الكلاسيكي للمتممة .

المتممة C4b **C4b complement**

مقوم السبيل الكلاسيكي C3 كونفيرتاز C4b,2a ، والذي يتولد بشطر C4 بواسطة C1s ، وبعدها ترتبط الشدفة C4b الفعالة مع C2 من أجل شطر C2 بواسطة C1s وهذا يعطل بواسطة العامل I في وجود البروتين الرابط لل C4 بالإضافة إلى ذلك فإن C4b يعتبر طاهية ، والذي يرتبط إلى نفس المستقبل مثل C3b .

المتممة C4b,2a **C4b,2a complement**

هو السبيل الكلاسيكي C3 كونفيرتاز ، والذي يشطر C3 إلى C3a ، C3b ، والمعقد المتشكل من C4b و C2a على السطوح الغشائية الخلوية في وجود المجنيزيوم (Mg^{2+}) .

انظر تحت C2a .

المتممة C4b,2a,3b **C4b,2a,3b complement**

هوالسبيل الكلاسيكي C5 كونفيرتاز ، والذي يشطر C5 إلى C5a وC5b يتشكل هذا المعقد بواسطة ارتباط ال C3b بال (C4b,2a) الرابط للغشاء الخلوي .

القيحية الوخيمة المتكررة .

المتممة C3a **C3a complement**

المولد للذيفان التأقي بالترافق مع C3b ، وعندما تشطر C3 بواسطة واحد من C3 كونفيرتاز .

المتممة C3b **C3b complement**

مقوم السبيل الكلاسيكي C5 كونفيرتاز والسبيل البديل C3 و C5 كونفيرتاز ، يتولد بواسطة C3 كونفيرتاز في كلا السبيلين و يتولد بشكل مستمر أيضاً في الدوران بكميات صغيرة مطلوبة لإبتداء السبيل البديل ، ويتثبط بواسطة العديد من المركبات كالعامل H ، والعامل I ، والبروتين تميم العامل الغشائي ، والعامل المسرع للنخر ، ومستقبل المتممة 1 . كذلك أيضاً C3b هو عامل طهاية يمتلك مستقبلات على الكريات الحمر ، واللمفاويات البائية ، والمحببات ، والوحيدات ، والبلاعم .

المتممة (C3b,Bb) **C3b,Bb complement**

هو السبيل البديل C3 كونفيرتاز ، والذي يشطر C3 إلى C3a و C3b ؛ ويتولد بواسطة هذا التفاعل العامل B والعامل D مع تراكم C3b على مفعلات السبيل البديل ، وهكذا يقي من التعطيل بواسطة العامل I والعامل H . وهو غير مستقر ما لم يضاف إليه البروبيردين .

انظر تحت complement .

المتممة C3b, Bb **$C3b_n$,Bb complement**

هو السبيل البديل C5 كونفيرتاز ، والذي يتولد بواسطة إضافة واحد أو أكثر من الشدف C3b إلى (C3b,Bb) ، وهو ليس ثابت حتى إضافة البروبيردين .

انظر تحت complement .

المتممة C3b,P,Bb **C3b,P,Bb complement**

هي الشكل الأكثر استقراراً للسبيل البديل C3 كونفيرتاز ، والذي يتولد بواسطة إضافة البروبيردين إلى (C3b,Bb) .

انظر تحت complement .

المتممة $C3b_n$, P, Bb **$C3b_n$,P ,Bb**

هو الشكل الأكثر استقراراً للسبيل البديل C5

الغشاء الخلوي . أحياناً يختصر (C5b-8) .

المتممة C5b,6,7,8,9 complement C5b,6,7,8,

المعقد المهاجم للغشاء الخلوي الكامل (العامل الحال الخلوي) لنظام المتممة ، والذي يتولد بواسطة إضافة جزيئات متعددة من ال C9 إلى ال C5b,6,7,8 ، ولهذا المعقد مركز محب للماء يتيح مروراً سريعاً للماء والإيونات عبر الغشاء الخلوي ، مسبباً إنحلالاً إسمولياً للخلية . أحياناً يشار إليه باختصار (C5b-9) أو (C5b-9n) .

المتممة C6 C6 complement

مكونة من المعقد المهاجم للغشاء الخلوي ، والتي ترتبط بواسطة C5b ليشكل C5b,6 .

المتممة C7 C7 complement

مكونة من المعقد المهاجم للغشاء الخلوي ، والتي يرتبط بواسطة C5b,6 ليشكل الوسيط المحب للدهن C5b,6,7 .

المتممة C8 C8 complement

مكونة من المعقد المهاجم للغشاء الخلوي ، يرتبط بواسطة C5b,6,7 المرتبط بالغشاء ليشكل ال C5b,6,7,8 الذي يتثبت على الغشاء الخلوي بواسطة C8 . بعدها يمكن C8 أن يسبب بلمرة C9 .

المتممةC9 C9 complement

مكونة من المعقد المهاجم للغشاء الخلوي . حيث ترتبط جزيئات متعددة بواسطة معقد C5b,6,7,8 وحيد ليشكل المعقد المهاجم للغشاء الخلوي النهائي . على الرغم من أن 3 إلى 4 جزيئات من C9 تكون كافية لفعالية حالة كاملة على العديد من الركائز ، فإن 12 إلى 15 جزيء تكون ضرورية لتشكل المسام كعكي الشكل الاعتيادي في الغشاء الخلوي . يستخدم C9n غالباً للإشارة إلى الجزيئات المتعددة C9 في المعقد المهاجم للغشاء الخلوي .

مُتَمَّةُ الكروموسومات ؛ المَجموعةُ الكاملَةُ منَ الكروموسومات chromosom complement

المتممة C5 C5 complement

مكون المتممة الذي يرتبط إلى العنصر C3b لكلا السبيلين الكلاسيكي والبديل C5 كونفيرتاز (C4b,2a,3b) و (C3bn,P,Bb) ، ويشطر أما بواسطة الكونفيرتاز إلى الذيفان التأقي الأصغر C5a و C5b المرتبط بالسطح الخلوي الأكبر ، وهو العنصر البادئ للمعقد الذي يهاجم الغشاء الخلوي .

المتممة C5a C5a complement

هو الذيفان التأقي والعامل الجاذب كيماوياً للأسسات والمعتدلات والخلايا البدينة والبالعات ، وتتولد البطانة في شطر ال C5 بواسطة ال C5 كونفيرتاز . وهو وسيط فعال موضعياً في الحالات الالتهابية وتحرض على تقلص العضلات الملس أيضاً .

المتممة C5b C5b complement

مقوم للمعقد المهاجم للغشاء ، والذي يتولد بواسطة شطر C5 بواسطة السبيل الكلاسيكي البديل C5كونفرتاز . ويمكن أن يتولد أيضاً بواسطة فعل البروتياز المصلية المحددة ، مثال : البلازمين والتريبسين .

المتممة C5b,6 C5b,6 complement

المعقد C5b وC6 المحبين للماء والمتشكلين في الخطوات الأولية من تشكل المعقد المهاجم للغشاء الخلوي . والذي يترافق بشكل مقلقل مع الغشاء الخلوي حتى يرتبط بواسطة C7 .

المتممةC5b,6,7 C5b,6,7 complement

معقد ثلاثي الجزيئات من C5b و C6 وC7 ، والتي ترتبط بالغشاء الخلوي في تشكيل معقد المهاجم للغشاء الخلوي . يمكن أن تثبط بارتباطها مع الفيترونستين ، والذي يعطي معقد معطل غير قادر على الارتباط بالغشاء الخلوي . يعتبر C5b,6,7 أيضاً عامل جاذب كيمائي للعدلات . أحياناً يختصر (C5b -7) .

المتممة C5b,6,7,8 C5b,6,7,8 complement

معقد يتولد بارتباط C8 مع C5b,6,7 المرتبط بالغشاء الخلوي . يسبب تسرب بطيء من

النـــــوويـــة الـوراثيـــة فــــي الــدنا (DNA) أو الـرنـا (RNA) .

1ـ مُتتمّ **complementary**

2ـ تتميميّ

3ـ مُتامِم

مـتـمـم لخلل ، أو للـمـسـاعـدة لعـمل ذلك ، (تتميمي) ، أي أنه إضافي .

تتامّ **complementation**

التـفاعـل ما بين مـوضـعين خلويين أو جـينين فيروسيين يدخـلان إلى نفس الخلية ، مثل هذه الخلية يمكن أن تكون وظيفية حتى من خلال كل مـوضع الجينات الحاملة للطفـرة ، الجين غيـر الوظيـفي . وهي تشـيـر إلى أن العـيب لـيس مثالي .

تَتامٌّ بَيْنَ الأَلائل **interallelic complementation**

انظر تحت intracistronic complementation .

تَتامٌّ بَيْنَ المَقْرُونَات (= تَتامٌّ بَيْنَ الجينات) **intercistronic complementation (=intergeniccomplementation)**

ترميم أساسي تام للوظيفة من النمط البري في اختبار المقرون ـ المفروق ، عندما تتوضع طفرتان في اثنان من السيسترونين المختلفين (جينات) .

تَتامٌّ داخِلَ السِّيسْتْرُونَات (= تَتامٌّ داخِلَ الجينات) **intracistronic complementation (=intragenic complementation)**

الترميم الجزَئي للوظيفة الذي يشاهد أحياناً في اختبار المقرون ـ المفروق عندما تتوضع طفرتين على مواضع مختلفة داخل نفس السيسترون .

مُتمَّم **complemented**

صفة العامل المتمم أو المكمل لنظيره .

انظر تحت complementarity .

تامّ **complete**

صـفـة تطلق في علـم المناعـة علـى الأضــداد الكاملة (Complete antibody) ، والتي تسـبب تراص الكريات الحـمراء عندما تـوهن بسـائل فيزيولوجي أو وسط بروتيني .

مَولودٌ بتمام الحَمْل **completely born**

تمثيل ترسيمي للسبيل الكلاسيكي للمتممة **Schematic representation of the classical complement pathway**

عـبـارة عن جـزيئـان من الجلوبـولين المناعي G (IgG) ، يصطلح تسميته بالمزدوجة واللذان يتحدان مع المحددات المستضدية المثلية الموجودة على سطح الكريات الحـمـر ، وتفعل عنصـر المتممة الأول C1 بواسطة التفاعل مع C1q (A) ويتـبع بواسطة C1r (B) C1s . الموضع الحـال للإستـر على C1s ، يفعل C4 ويشطره إلى C4b الذي يرتبط بسطح الكرية الحمراء (C) . بعدها يُفـعل نفس الموضع على C1s المتـمـم C2 ثم يشطره إلى C2a الذي يرتبط ب C4b (D) . المعـقـد C4b2a يفـعل C3 بشطره إلى C3b ، والذي يرتبط إلى الغشاء الخلوي للكرية الحمراء (E) يشطر المعقد C4b2a3b (C5 كونفيرتاز)C5 إلى C5a ، C5b ، وترتبط C5b ، C6 ، C7 إلى الكرية الحمراء (F) ويتلو التفعيل والارتباط إلى غشاء الكرية الحمراء بواسطة C8 و C9 بالتمزق الغشائي الخلوي (G) .

المتممة الحالة للدم الكاملة **total hemolytic complement**

هي (CH_{50}) (CH50) .

انظر تحت CH50 assay .

تثبيت المتمّمَة **complement fixation**

هو اختبـار مختـبري يدل على ارتباط أو ربط المتـمـمـة بالمعـقـد المتـشكل من تفـاعـل الضـد بالمستضد النوعي له ، وبما أنَّ المتممة تؤخذ من المصل فقط في حـال حدوث مثل هذا التـفاعل المناعي ، فـإنَّ كشف وجـود المتـمـمـة عند مـزج معلق من جراثيم معروفة مع مصل الشـخص يدل على وجود الأضداد .

مُتمّميّ **complemental**

متكامل (Complementary) .

تتامّ **complementarity**

درجـة ألـفـة وتكـامل المواضع المتناسـبـة بين المستضـد والضد أو النوكليدات في الأحماض

المزمن المعمم المترافق مع الحمى ، وفقد الوزن ، والاسهال المديد ، والإصابة بالأمراض الانتهازية ، ونقص المحببات وشذوذ اللمفاويات التائية المترافقة مع مرض الإيدز .

انظر تحت lymphadenopathy syndrome .

معقد تمزق الشريط السلوي — **amniotic band disruption complex**

انظر تحت amniotic band sequence .

المعقد اللوزي — **amygdaloid complex**

انظر تحت corpus amygdaloideum .

مُعَقَّدُ التَّصَلُّب الجانبيِّ الضُّمُوريِّ والبَارَكِنْسونيَّة وَالخَرَف — **amyotrophic lateral sclerosis-parkinsonism dementia complex**

هو اضطراب كَرومـوسومي جسدي سائد ، ويحدث بين أناس الكامورو في الجوام ويتميز بالترقي التدريجي للباركنسونية المترافقة مع الخرف ، والتصلب الجانبي الضموري المترقي .

مُرَكَّبٌ شاذٌّ — **anomalous complex**

في تخطيط القلب الكهربائي ، هو المركب الأذيني أو البطيني الشاذ الناتجين عن دفعة التوصيل الزائغة التي تحدث فوق طرق التوصيل الإضافية .

المُعَقَّدَ الضِّدِّيُّ المُسْتَضِدِّيُّ — **antigen-antibody complex**

هو المعقد المتشكل بواسطة الارتباط غير التساهمي للضد مع المستضد . يمكن لمعقدات الأضداد المتعلقة بأصناف الجلوبولين المناعي المحددة أن تفعل المتممة . معقدات الضد ـ مستضد هي وسائط لاستجابات المناعة من النمط الثالث (تفاعلات آرتوس وداء المصل وأمراض المعقد المناعي) . يسمى (Immune complex) ، خصوصاً في نقاش عمليات المرضي .

عُقْدَةُ القَلَق — **anxiety complex**

يسمى أيضاً قلق الخصاء (Castration anxiety) ، أو عقدة الخصاء (Castration complex) ، وتتجلى بعدة أشكال منها خوف المولود الذي يتم تسعة أشهر شمسية في الحياة الرحمية ، أي في تمام الحمل .

إتمام — **completion**

عملية القيام بتكميل ما هو ناقص ، كما يعني حدوث التكميل والوصول إلى التمام الكامل .

1 ـ عُقدَة (في الطب النَّفسِي) — **complex**

2 ـ مُعَقَّد (في الكيمْياءِ أو الأعْضاءِ أو الأمْراض)

3 ـ مُركَّب (في مَوجاتِ تخطيطِ كهربية القلبِ أو الدماغ)

1 ـ معقد أو مركب أو مجموعة أشياء مختلفة أو عوامل متعلقة ببعضها البعض ، متشابهة أو غير متشابهة ، مثال ذلك معقد الأعراض .

انظر تحت syndrome .

2 ـ متتالية .

3 ـ مجموعة من الأفكار المترابطة ، غير الواعية بشكل رئيسي ، والتي لها تواتر عاطفي شائع ، وتؤثر بشكل قوي على سلوك الفرد وموقفه .

4 ـ ذلك الجزء من مرتسم تخطيط القلب الكهربائي الذي يمثل انقباض الأذين والبطين .

مُرَكَّبٌ شاذٌّ — **abnormal complex**

أي مركب متلازمي مرضي في الإكلينيكيات . وفي المناعة : حدوث معقدات مناعية غير طبيعية كمعقدات المناعة الذاتية .

مُعَقَّدٌ مُجْهَض — **abortive complex**

معقد كيميائي مجهض قد يتشكل في الجسم بفعل بعض الأنزيمات إذا توفرت المواد اللازمة لتشكله .

مركب الأدرينوكروم مونوسيميكربارسون ساليسيلات الصوديوم — **adrenochrome monosemicarbazone sodium salicylate complex**

انظر تحت carbazochrome salicylate .

مركب عتاهة الإيدز — **AIDS dementia complex**

اعتلال الدماغ بفيروس نقص المناعة المكتسب .

المُعَقَّدُ المُرْتَبطُ بالإيدز — **AIDS-related complex**

معقد مؤلَف منَ العلامات والأعراض التي تمثل المرحلة الشديدة من الإصابة بفيروس عوز المناعة البشري ، وتتميز باعتلال العقد اللمفاوي

الْمُعَقَّدُ الابْيضاضِيُّ الطَّيرِيُّ **avian leukosis complex**

انظر تحت avian leukosis .

معقد الساركومة الطيري **avian sarcoma complex**

انظر تحت sarcoma .

مركب بيتا ـ جليكوزيداز **B - glycosidase complex**

المعقد الإنزيمي الذي يتألف من اللاكتاز والجلوكوزيل سيراميداز (فلوريزين هيدرولاز) الفعالين ، يحدثان في الحافة الفرشاتية الغشائي للمخاطية المعوية وحلمهة اللاكتاز بالإضافة إلى السيلوبيوز والسيلوتريبيوم . وهي عديدات ببتيد وحيدة تنشأ من الطلائع الأكبر مع موضعين محفزين من أجل الفعاليات الإنزيمية .

انظر تحت lactase deficiency .

الْمُعَقَّدُ القاعديُّ للمَشيميَّة **basal complex of choroid**

انظر تحت lamina basalis choroidease .

مُركَّبُ المَوجَة الدِّماغيَّة **brain wave complex**

مشاركة نوعية بين الموجات السريعة والبطيئة في مخطط الدماغ الكهربائي وبمقدار يكفي لجعلها ظاهرة معينة وليست عابرة .

مركب نازعة هيدروجين الحمض الكيتوني ألفا ذو السلسلة الفرعية **branched - chain - keto acid dehydrogenase complex**

معقد متعدد الإنزيمات المكون من نازعة الهيدروجين 3- ميثيل . 2- أوكسوبوتانوات (ليبوأميد) ونازعة الهيدروجين ديهيدروليبوأميد ، وناقلة الأسيل ديهيدروليبوأميد ، مع بيروفسفات الثيامين ، والحمض الشحمي ، وثنائي نوكليدتيد النيكوتيناميد والأدنين (NAD^+) ، وثنائي نوويد الفلافين والأدنين (FAD) ، وتميم الإنزيم A

الطفل من فقد أعضائه التناسلية من قبل أحد الأبوين المماثل له في الجنس نتيجة الشعور بالذنب إذا تشكلت لديه عقدة أوديب . أو خوف الذكر من فقد الأعضاء التناسلية كعقاب عن الرغبات الجنسية المحظورة .

مُعَقَّدٌ قِمِّيّ **apical complex**

معقدَ ذو بنية مستدقة للعضيات القمية المميزة للطفيلي الأبيكومبليكسان (Apicocomplexan) خلال بعض مراحل تطوره والذي يتألف بشكل عام من الحلقات القطبية والمخروطية والخيوط المكروية والمقيرع (الخيوط القوسية) والنبيبات الدقيقة تحت الجليدية . ويبدو أن وظيفتها كأداة للارتباط واختراق خلايا المضيف .

مُركَّبُ الأُذَين **atrial complex**

الموجة P في تخطيط القلب الكهربائي ، والتي تمثل الفعالية الكهربائية للأذيني .

المركب الأذيني المبتسر **atrial permature complex**

ضربة أذينية منتبذة وحيدة تظهر بشكل مبكر ، وتتظاهر في التخطيط القلبي الكهربائي بشكل موجة P شاذة مبكرة وعادةً مع زيادة طفيفة في الفاصلة PR . تحدث في القلب الطبيعي وأحياناً تترافق مع استخدام المنبهات ، لكن ممكن أن تترافق مع أمراض القلب البنيوية .

مركب الهروب(AV) الاتصالي الأذيني البطيني **atrioventricular junctional escape complex**

انظر تحت beat .

المركب المبتسر الاتصالي الأذيني البطيني **atrioventricular (AV) junctional premature complex**

ضربة منتبذة تنشأ مبكرة من الوصل الأذيني البطيني ، وتنتقل باتجاه كلاً من الأذينين والبطينين إذا لم يعوق النقل ، مسبباً موجة P مبكرة ، أو شاذة ، أو غائبة ومركب QRS يميل لأن يكون هو أيضاً مبكراً (مبتسراً) .

التوهُّمُ بسيطرة قوة خارجية على العقل .

عُقْدَةُ دَيانا **Diana complex**

رغبة الأنثى في اللاشعور بأن تصبح رجلاً .

مُركَّبٌ ثُنائيُّ الطَّور **diphasic complex**

المعقد أو المركب الذي يعمل بمرحلتين إيجابية وسلبية الانحراف ، أو ارتسام كهربائي له طور إيجابي فوق خط السواء وسلبي تحته .

مُعَقَّدُ الإكْزيمَة والرَّبْوِ وحُمَّى الكَلأ **EAHF complex (=Eczema, Asthma and Hay Fever complex)**

مُركَّبُ آيزنمَنْجر **Eisenmenger's complex**

(عيب فيَ الحاجز بين البطين وتراكب الأورطي وارتفاع التوتر الرئوي)

عيب في الحاجز بين البطينين مع فرط الضغط الرئوي الوخيم ، وضخامة البطين الأيمن مع زراق خاف أو صريح .

عُقْدَةُ إليكتْرا **Electra complex**

(= عَقْدة الأب)

(المقابل الأنثوي لعقدة أوديب)

المقابل الأنثوي لعقدة أوديب ، التي طبقت في الأصل فقط على الذكور ، وتتضمن حب البنات لآبائهن والغيرة والإستياء من أمهاتهن . يستخدم حالياً هذا المصطلح بشكل نادر حتى عقدة أوديب ، وتطبق على كلا الجنسين .

معقد الورم الحبيبي اليوزيني **eosinophilic granuloma complex**

مجموعة من الآفات الجلدية في القطط ، بسببيات غير معروفة ، لكن له علاقة بشكل صريح بمرض آخر ، يتميز بآفات على سطح الجلد و كثرة اليوزينيات في الأدمة . يوجد منه ثلاثة أنماط : القرحة اليوزينية الخفيفة على الشفة ، واللويحة اليوزينية الحكية المتحددة ، وعادةً ما توجد على البطن والمنطقة الإربية ، والورم الحبيبي الخطي والمتوضع عادةً على الفخذ أو قرب الفم .

مُركَّبٌ مُتَساوي الطَّور **equiphasic complex**

كعوامل مساعدة . يحفز اندماج المعقد أكسدة ونزع الكربوكسيل من مضاهئات الحمض الكيتوني للأحماض الأمينية متفرعة السلسلة ، وهي اللوسين ، والإيزولوسين والفالين . إن عوز أي من إنزيمات المعقد يسبب داء بول شراب القيقب .

عُقْدَةُ الأخ **brother complex**

تسمى أيضاً عقدة قابيل (Cain complex) ، وهي الغيرة الشديدة من الأخ حتى تصل الحالة إلى الكراهية .

عُقْدَةُ قابيل **Cain complex**

انظر تحت brother complex .

المُعَقَّدُ المِهْمازيّ **calcarine complex**

(= مِهْمازُ الطَّير) **(=calcar avis)**

انظر تحت calcar avis .

معقد كارني **Carney`s complex**

معقد أعراض لداء يورث بوراثة كروموسومية جسدية سائدة ، يتألف من أورام مخاطية في النسج الرخوة وتصبغ جلدي بقعي ، وأورام الغدة الكظرية ، والنخامية ، والخصية ، وأورام الشفانية في الأعصاب المحيطية (الطرفية) . يسمى أيضاً (Carney's syndrome) أو ثالوث كارني(Carney's triad) .

عُقْدَةُ الخِصاء **castration complex**

في نظرية التحليل النفسي ، هي الأفكار اللاواعية والدوافع ذات الجذور الناتجة عن الخوف من فقد الأعضاء التناسلية كعقاب عن الرغبات الجنسية المحظورة .

صوديوم معقد كلوروفيلين النحاس **chlorophyllin copper complex sodium**

هو الملح الصوديوم للكلوروفيلين المخلوب بالنحاس ، يطبق بشكل موضعي على الآفات الجلدية لنزع الرائحة ، ويعطى فموياً لنزع رائحة ، البول والبراز في فغر القولون وفغر اللفائفي والسلس البولي .

عُقْدَةُ كليرامبو ـ كاندنَيسكي **Clerambault-Kandinsky complex**


الجلوكوزالمرتبط ـ 1 ، 4 ألفا من النهايات اللامختزلة من ثنائية السكاريد ، وقليل البلمر (Oligomer) مثل المالتوز والأميلوز والأميلوبكتين والجليكوجين .

مُعَقَّدُ جولجي **Golgi complex**
(= **جهازُ جولجي** **(=Golgi apparatus)**
(في اَلخلية)

معقد تشبه بنيته الفنجان داخل الخلايا ، يتألف من عدة عناصر ، كل منها يتألف من عدد من الأكياس المسطحة (صهاريج) مع حويصلات وفجوات مرافقة . يعتبر مركب جولجي هي مواضع غشائية لتشكيل السلاسل الجانبية للبروتين السكري للكربوهيدرات وعديد السكاريد المخاطي ، وللعديد من المواد الأخرى . تهاجر الفجوات الإفرازية عبر الغشاء الخلوي وتحرر البروتينات السكرية وعديد السكاريد المخاطي ، لذلك فهو يلعب دوراً في الإفراز الداخلي والخارجي . أظهرت الدراسات الكيمائية الخلوية أنه يحتوي أيضاً على مواضع لتشكيل الجسيمات الحالة الأولية مع إعطاء زيادة في الجسيمات الطرفية للنطاف والكيسة الخيطية للهيدرا . يسمى أيضاً (Golgi appartus) .

H -2المعقد **H -2 complex**

مركب التوافق النسيجي الرئيسي الفأري .



Golgi complex معقد جولجي

المركب الذي تتساوي فيه الأطوار السلبية والإيجابية في السعة والعمق .

مُعَقَّدُ العامل التَّاسع **factor IX complex**

مسحوقَ جَاف عَقيم مجمد ، تتألف من جزء العامل التاسع النقي . بالإضافة إلى جزء العامل الثاني والسابع والعاشر المركز من البلازما الوريدية من معطي بشري سليم .

عُقْدَةُ الأب **father complex**

تسمى أيضاً عقدة إلكترا (Electra complex) ، هي الجانب الأنثوي من عقدة أوديب الذكورية ، وهي أن تحب الأنثى أباها وتغار عليه من أمها أثناء الطفولة فينعكس ذلك على علاقتها بالرجل بعد البلوغ .

معقد الداء التنفسي الهري **feline respiratory disease complex**

هو مجموعة من الإصابات الفيروسية المعدية للسبل التنفسية العلوية في القطط ، يتميز بالحمى والعطاس والسعال والإفرازات من الأنف والعينين . السبب الشائع له العدوى بالڤيروسات الحلئية (الفيروس الحلئي الأول الهري) أو الفيروسة الكأسية .

عُقْدَةُ الأُنوثَة **femininity complex**

في التحليل النفسي ، هي الخوف اللاشعوري عند الصبيان الذكور والرجال من خصائهم بيد الأم وما ينتج عن ذلك من رغبة الحصول على الأثداء والمهبل .

مُعَقَّدُ جون **Ghon complex**
(= **المُعَقَّدُ الأَوَّلِيُّ** **(=primary complex)**
في السُّل

انظر تحت primary complex .

مركب الجلوكوأميلاز **glucoamylase complex**

اثنان من المالتاز الصامد للحرارة في الإنسان ، ويعرف كألفا جلوكوزيد . يوصف على أنه معقد بسبب فعاليات الإنزيم المتشكل كعديد ببتيد وحيد والذي ينشطر ليشكل مثنوي مغاير فعال ضمن الحافة الفرشانية للمخاطية المعوية . يحفز فعاليات الإنزيم حلمهة ثمالات

(في انْزلاَق الفَقْرَة)
انزلاق اَلنواَتِىء الفقرية المتمفصلة للعمود الفقري .

junctional complex **مُرَكَّبٌ اتِّصالِيّ**
الترتيب داخل الخلوي بين الخلايا الظهارية العمودية المتجاورة ، بحيث تتألف من الروابط النطيقية والالتصاقات النطيقية والجسيمات الرابطة .

junctional premature complex **مركب اتصالي مبتسر**
المركب الأذيني البطيني الاتصالي المبتسر (atrioventricular junctional) .
انظر تحت premature complex .

juvenile nephronophthisis medullary cystic disease complex **معقد الداء الكيسي اللبي - سحاف الكلية الطفلي**
هو مصطلح يفضله بعض المؤلفين للإشارة إلى سحاف الكلية الطفلي العائلي ، اعتماداً و على أنه بالرغم من كون الأمراض تؤلف معقد له تظاهرات إكلينيكة متماثلة ، فإن نمط الوراثة وأعمار البدء تكون مختلفة تم تحديد أربعة متفاوتات مختلفة منه ، وهي الشكل الفردي ، وسحاف الكلية الطفلي العائلي ، والذي يورث بوراثة متنحية ، وخلل التنسج الشبكي الكلوي والذي يورث بوراثة متنحية ، ويترافق مع التهاب الشبكية الصباغي ، والداء الكيسي اللبي بالغي البدء ، ويورث بوراثة سائدة .

juxtaglomerular complex **مركب مجاور للكبيبة**
انظر تحت apparatus .

K complex **المعقد K**
اندفاع لموجات بطيئة عالية الفولطاج تُشاهد على تخطيط الدماغ الكهربي أثناء النوم . يمكن أن تحدث بشكل عفوي أو كاستجابة للمنبهات الحسية (السمعية عادةً) .

keto acid dehydrogenase complex **معقد نازعة الهيدروجين للحمض**

hapten-carrier complex **معقد الناشبة - الحامل**
المستضد المتشكل بواسطة اقتران الناشبة مع بروتين الحامل .

hemoglobin-haptoglobin - complex **مُعَقَّدُ الهيموجلوبين والهابْتوجلوبين**
معقد كيميائي يتألف من ارتباط الهابتوجلوبين (جلوبولين ألفا 2) الموجود في المصل مع الهيموجلوبين .

HLA complex (=histocompatibility leukocytic antigen complex) **مُعَقَد هَلا (= مُعَقَّدُ التَّوافُق النَّسيجيّ)**
انظر تحت HLA antigens .

immune complex **مُعَقَّدٌ مَناعيّ**
انظر تحت antigen - antibody .

inclusion complexes **مُعَقَّداتٌ اشْتمالِيَّة**
مكونات تكونَ فيها الجزيئات من نمط واحد محاطة بأجواف في شبيكة بلورية لمادة أخرى .

inferiority complex **عُقْدَةُ النَّقْص**
الشعور اللاواعي بعدم الكفاية أو الكفاءة ، والذي ينتج عنه الخوف أو كمعاوضة تفاقم العدوانية عند الشخص والتعبير عن الاستكبار والاستعلاء . وبالاستناد إلى فرضية آلفرد آدلر (Alfred Adler's) أن كل شخص يولد مع شعور بالنقص متأصل عن عوز نفسي أو فيزيائي حقيقي أو تخيلي ، وعلى أساس الطريقة التي تتناول بها عقدة النقص لدى المريض يتم تحديد السلوك .

interpolated ventricular premature complex **المركب البطيني المبتسر المندس**
هو المركب البطيني المبتسر الذي لا يستطيع إحصار توصيل الضربة للجيب التالي ، وهكذا لا يترافق مع فترة معاوضة .

Jocasta complex **عُقْدَةُ جوكاستا**
ارتباط الأم بولدها جنسياً بشكل شاذ بحيث تثبت وتركز شهوتها الجنسية على الولد .

jumped process complex **مُعَقَّدُ النَّاتِىء القافِز**

عُقْدَةُ لير **Lear complex**

ارتباط الأب بابنته بشكل شاذ ، بحيث يركز ويثبت شهوته على ابنته .

مُعَقَّدُ لُوتيمْباشر **Lutembacher's complex (MHC)**

شذوذ ولادي في القلب يتألف من عيب في الحاجز بين الأذينين مع تضيق المترالي .

انظر تحت syndrome .

مُعَقَّدُ التَّوافُق النَّسيجيِّ الكَبير **major histocompatibility complex (MHC)**

تحدد الأجناس بمستضدات التوافق النسجي الكبير ، توجد في كل الأنواع مجموعة من الجينات الأليلية المتعددة المرتبطة بشدة والمتوضعة في منطقة صغيرة على كروموسوم واحد . يرمز لها بالمعقد (HLA) في الإنسان والمعقد (H-2) في الفأر .

مُعَقَّدُ مُهاجَمَة الغشاء **membrane attack complex (MAC)**

هو معقد خماسي الجزيئات (C5b,6,7,8,9) ، حيث إنه يشكل العامل الحال للخلية في نظام المتممة .

انظر تحت complement .

مُعَقَّدُ ماينْبيرْج **Meyenburg's complex**

(ورم في قناة الصفراء)

انظر تحت bile duct hamartomas .

المُعَقَّدُ الوَجْنِيُّ العذاريُّ **molar-zygomatic complex**

إصابة العظمين الوجني والعذاري في آن واحد .

عُقْدَةُ الأُمّ **mother complex**

أحد أنماط عقدة أوديب التي يختلف تأثيرها بين الطفل الذكر والأنثى ، فهي تُولد عند الذكر عقدة الخصاء أو البحث عن الجنس ، وأما الجنس المغاير فلا يكون إلا نحو الأم أو من تشبهها من النساء . وأما تأثيرها على الأنثى فتتجلى بكراهية الأم وقد تصل إلى حد التخلص منها .

الكيتوني ـ ألفا

أي معقد إنزيم يحفز أكسدة ونزع كربوكسيل الحمض الكيتوني الألفاوي .

مُعَقَّدُ نازعَة هيدرَوجَين الكيتُوجلُوتارات ـ ألفا **ketoglutarate dehydrogenase complex**

معقد متعدد الإنزيمات يتألف من ثلاثة إنزيمات مميزة على الأقل وهي : نازعة هيدروجين الأوكسوجلوتارات (ليبوأميد) ، والديهيدروليبوأميد ـ S ـ ناقلة السكسينيل ، ونازعة هيدروجين الديهيدروليبوأميد . يحفز اندماج المعقد الأنزيمي كل تفاعلات الألفا ـ كيتو جلوتارات + تميم الإنزيم A + ثنائي نوكليوتيد النيكوتيناميد والأدنين (NAD^+) = سكسينيل تميم الإنزيم A نازعة هيدروجين ثنائي نوكليوتيد النيكوتين والأدنين المختزل + (CO_2) NADH إن بيروفسفات الثيامين ، وحمض الليبوليك ، وثنائي نوويد الفلافين والأدنين (FAD)كلها مطلوبة كعوامل تميمة للتفاعل . ويعتبر هذا التفاعل السابق جزء من دورة الحمض الثلاثي الكربوكسيل . إن عوز المكونة الأخيرة يسبب عوز في نازعة هيدروجين الليبوأميد .

مركب هيدرولاز فلوريزين اللاكتاز **lactase - phlorhizin hydrolase complex**

انظر تحت B- glycosidase complex .

المعقد LASV ـ فيروس التهاب السحايا والمشيميات اللمفاوي **LCMV-LASV complex**

المعقد (LCMV - LASV) هو مجموعة من الفيروسات المرتبطة بالمستضد العلاقة ، تتكون من فيروسات العالم القديم الرملية (فيروسات الإيبي ، واللاسا ، والتهاب السحايا والمشيميات اللمفاوي ، والموبالا والموبيا) . فيروسات اللاسا (حمى لاسا) ، وفيروسات التهاب السحايا والمشيميات اللمفاوية هي فيروسات ممرضة للإنسان .

المُعَقَّدُ الأَوَّلِيُّ **primary complex**

1ـ توليفةَ من الآفات المتنية الرئوية (بؤرة جون أو درنة جـون) ، وبؤرة العقدة اللمفاوية المتناسبة ، تحدث في التدرن الأولي ، وعادةً في الأطفال . ويمكن أن يتعرض لنخر خلوي ، وتكلس عرضي . يمكن أن تترافق آفات مشابهة مع العداوى بالمتفطرات الأخرى مع العداوى الفطرية مثل داء النوسجات والفطار الكرواني . يسمى أيضاً (Ghon complex) ، (Ranke complex) .

2ـ الآفة الجلدية الأولية في موضع العدوى في الجلد مثاله : القرح في الزهري (السفلس) ، والقرح الدرني .

مُعَقَّدُ التَّلْقيح الأَوَّليّ **primary inoculation complex**
(= المُعَقَّدُ الأَوَّلِيُّ) **(=primary tuberculous complex)**

انظر تحت tuberculosis .

مُعَقَّدٌ مُنْتِج **productive complex**

مجموعة المركبات التي تتدخل في إنتاجية معقد ما .

معقد نازعة الهيدروجين بيروفات **pyruvate dehydrogenase complex**

معقد عديد الإنزيم ، ويتألف على الأقل من ثلاثة إنزيمات متميزة وهي : نازعة هيدروجين البيروفات (ليبوأميد) ، والديهيدروليبوأميد ـ S ـ ناقلة الأسيتيل ، ونازعة هيدروجين ديهيدروليبوأميد . يتطلب لاندماج المعقد الإنزيمي تميم العامل بيروفسفات الثيامين ، وحمض الليبوليك ، وتميم الإنزيم A ، وثنائي نوويد الفلافين والأدنين (FAD) ، وثنائي نوكليوتيد النيكوتيناميد والأدنين (NAD) ، وهو يحفز تشكيل أسيتيل تميم الإنزيم A من البيروفات وتميم الإنزيم A مستخدماً (NAD^+) كمتقبل للإلكترون ويستخدم أسيتيل تميم الإنزيم A في تخليق الحمض الدهني ، من أجل الأستلة والأكسدة بواسطة دورة الحمض الثلاثي

مُعَقَّدُ مُحَرِّك العَين **oculomotor complex**

انظر تحت nucleus nervi oculomotorius .

عُقْدَةُ أوديب **Oedipus complex**
(= عُقْدَةُ الأُمّ) **(=mother complex)**

في النظرية النفسية ، هي مجموعة من المشاعر والصراع يحدث في الطفل خلال الطور الوذري (Phallic phase) ، من التطور الجنسي النفسي وينتج عن الإنجذاب الجنسي تجاه أحد الوالدين من الجنس المعاكس ، وتتضمن المشاعر العدائية تجاه أحد الوالدين من نفس الجنس .

المركب الزيتوني ، السفلي **olivary complex , inferior**

انظر تحت complexus olivaris inferior .

المركب الزيتوني ، العلوي **olivary complex, superior**

انظر تحت nucleus olivaris superior .

المركب الصماخي العظمي **osteomeatal complex**

المنطقة الواقعة في التجويف الأنفي بين المحارات المتوسطة والسفلية ، حيث يتم النزح من الجيوب الجبهية والغربالية والفكية .

مُعَقَّدُ الخَرَف والباركِنْسُونِيَّة **Parkinson-dementia complex**

ترافق الخَرَف وفقدان الذاكرة مع داء باركنسون .

المركب حول تحت اللسان **perihypoglossal complex**

انظر تحت nuclei perihypoglossales .

عُقْدَةُ الاضْطهاد **persecution complex**

شعور الشخص بأن الآخرين يكيدون له ويتآمرون عليه ، وهذا يولد عنده نوع من الشعور بالظلم والاضطهاد .

المُعَقَّدُ المَسَمِّيُّ **pore complex**

المسام النووي مع الحلقات ذات العلاقة معاً .

مركب المهاد النووي الخلفي **posterior nuclear complex of thalamus**

انظر تحت nuclei posteriores thalami .

يُظهر موجة مؤنفة دقيقة تشبه السفاة يتلوها موجة مقببة ، وتشاهد في الصرع الصغير واحتشاء العضلة القلبية الحاد في بعض الاتجاهات قرب القلبية .

مركب التهاب الرئة والأمعاء ـ التهاب الفم **stomatitis - pneumoenteritis complex**

انظر تحت peste des petits ruminants .

معقد إيزومالتاز ـ السكراز **sucrase - isomaltase complex**

معقد إنزيمي يتألف من فعالية السكراز و ألفا – دكستريناز (إيزومالتاز) ، يتواجدان في الحافة الفرشاتية للمخاطية المعوية مع هدرلة المالتوز بالإضافة إلى المالتوتريوز ، وبعض الروابط الجليكوزيدية . يُخلق هذا الإنزيم كعديد ببتيد وحيد ويُشطر ليشكل مثنوي مغاير ، كل منهما يمتلك موضع محفز منفصل .

انظر تحت sucrase - isomaltase deficiency .

عُقْدَةُ الاسْتِعْلاَء **superiority complex**

يطلق هذا المصطلح أحياناً على سلوكيات التعويض والاعتداد بالنفس والعدوانية ، وهي ترتبط بمعقد الدونية .

مُعَقَّدٌ أعراضيّ **symptom complex**

مجموعة أعراض تظهر كمجموعة مرتبطة مع بعضها وتسمى حالياً متلازمة (Syndrome) .

المُعَقَّدُ المَشْبَكيُّ الخَيطيُّ **synaptonemal complex**

بنية خيطية الشكل ثخينة ، والتي تتشكل خلال مرحلة دور الاقتبال (المشبكي) في الانقسام الفتيلي بواسطة التوأمة الداخلية للكروموسومات في مرحلة الترقق الكروموسومي التي تنفصل عن بعضها البعض بشكل غير متميز .

معقد تاكارايب **Tacaribe complex**

مجموعة من الفيروسات المرتبطة مستضدياً ، وتتألف من فيروسات العالم الحديث الرملية (فيروسات الأماباري ، والفليكسال ، والجواناريتو ، والجوانين ، والماشوبو ، والبارانا ، والبيشيند ، والتاكارايبو ، والتاميامي) .

الكربوكسيل . إن عوز أي مكون من هذا المعقد ينتج عنه احمضاض الدم اللاكتيكي ، والرنح ، وتأخر نفسي حركي .

انظر تحت lipoamide dehydrogenase deficiency .

المُرَكَّبُ QRS **QRS complex**

(في تخطيط كهربية القلب)

جزء من تخطيط القلب الكهربائي ، والذي يتألف من الموجات Q و R و S ، ومعاً تمثل نزع الاستقطاب البطيني .

انظر تحت electrocardiogram .

المركب QS **QS complex**

في تخطيط القلب الكهربائي ، وهو المركب QRS الذي فيه تعود الموجة Q إلى القيمة القاعدية ، ولكن دون أن ينتج موجة (R) إيجابية ؛ بمعنى آخر ، أن المركب البطيني الداخلي يكون سلبياً .

مُعَقَّدُ رانكه **Ranke's complex**

(= المُعَقَّدُ الأَوَّليُّ) **(=primary complex)**

انظر تحت primary complex .

المُعَقَّدُ الارْتِخائيُّ **relaxation complex**

عُقْدَةُ الجِنْس **sex complex**

تطلق في بعض الدراسات الوراثية على الكروموسومات التي تؤثر على تحديد الجنس وأمراضه الجنسية مثل المعقد الجنسي XXYY .

وتطلق في المراجع الغددية على المكونات الجنسية التشريحية والهرمونات الناظمة لها .

المعقد الجفافي **sicca complex**

انظر تحت primary sjögren's syndrome .

معقد حلقة المعلاق **sling ring complex**

تضيق رغامي ينتج عن متلازمة المعلاق الرئوي المتشارك مع حلقة غضروفية تامة التثبيت .

مُعَقَّدٌ ذَوَّاب **soluble complex**

المعقد الكيميائي القابل للذوبان إما في الماء أو الكحول أو الدهن .

مُرَكَّبُ السَّفاة والمَوجَة **spike-wave complex**

نموذج تخطيط الدماغ الكهربائي أو القلبي الذي

مجموعة فيتامينات تقدم مع بعضها كمعقد الفيتامين B المركب .

سَحْنَاء complexion

لون ومظهر جلد الوجه .

مُعَقَّد complexus

انظر تحت complex .

المُعَقَّدُ القاعديُّ للمَشيميَّةِ complexus basalis choroideae TA

انظر تحتَ lamina basalis choroideae .

المعقد الزيتوني السفلي complexus olivaris inferior

هي حزمة (شريط) مطوية من المادة الرمادية التي تحيط بلب أبيض (نقير النواة الزيتونية السفلية) والتي تعطي ارتفاع يسمى الزيتونة على البصلة . وهو معقد نووي يستقبل إسقاطات ثقيلة من الحبل الشوكي والدماغ المتوسط والقشرة الدماغية ، وتسقط منه ألياف بواسطة السويقة المخية السفلية بالجانب المقابل ، ومعظمها إلى المخيخ الحديث وبعضها إلى الدودة المخيخية . يسمى أيضاً (Nuclei Olivares inferiors) ، والنواة الزيتونية المذنبة (Caudal olivary nucler) .

المعقد المنبه القلبي complexus stimulans cordis

جهاز موصل للقلب عبارة عن نظام من الألياف العضلية المتخصصة تولد وتنقل بشكل سريع التنبيهات لدفعات القلب لتحدث تقلصات متناسقة ، تتألف من العقدة الجيبية الأذينية والعقدة الأذينية البطينية وحزمة هيس وتفرعات الحزمة اليمنى واليسرى ، والفروع تحت الشغاف لألياف بوركيني . ويسمى الجملة الناقلة القلبية (Systema conducens cordis) .

1ـ مُطاوَعَة compliance
2ـ إمْتِثَال (المريض)

1 ـ نمط الاستسلام للضغط أو القوة دون حدوث تمزق أو انقطاع .

2 ـ التعبير عن القدرة للخضوع للضغط بدون تمزق مثل قابلية التمدد الهواء أو السوائل المائلة

المُعَقَّدُ الحَالِبِيُّ المُثَلَّثِي (= الاتِّصَالُ الحَالِبِي المُثَلَّثِي) ureterotrigonal complex (=ureterotrigonal jution)

انظر تحت ureterovesical junction .

المُعَقَّدُ اليوروبيلينيُّ urobilin complex

المادة الافتراضيةَ المكونة من عدد من جزيئات اليوروبيلينوجين المرتبطة معاً والتي تمثل الشكل اليوروبيلينوجيني الموجود في الدم والنسج .

معقد VATER VATER complex

ترافق لا عشوائي للتشوهات الخلقية ، وتتألف من عيب فقري وعدم انثقاب الشرج والناسور الرغامي المريئي ، وخلل التنسج الكلوي والكعبري .

مركب المهاد البطناني الجانبي ventral lateral complex of thalamus

انظر تحت nuclei ventrales laterales thalami .

مركب المهاد البطناني الإنسي ventral medial complex of thalamus

انظر تحت nuclei ventrales mediales thalami .

مُرَكَّبٌ بُطَينيّ ventricular complex

عبارة عن المركب QRS والموجة T ، ويمثلان معاً الفعالية الكهربائية البطينية .

المركب المبتسر البطيني ventricular premature complex

ضربة متبذة تنشأ من البطينين وتنبه عضلة القلب بشكل باكر . تتميز بمركب QRS باكر وعريض وشاذ على نحو غريب مع قطعة ST ، وموجة T موجهة عكس المركب QRS ، وهي تكون عادةً بدون اعادة تنضيد العقدة الجيبية ، وأحياناً تكون ضربات مندمجة . يمكن أن تحدث في القلب الطبيعي ، ولكن غالباً ما تشير إلى مرض قلبي عضوي .

مركب المهاد القاعدي البطني ventrobasal complex of thalamus

انظر تحت nuclei ventrobasales thalami .

مُعَقَّدٌ فيتاميني vitamin complex

أو أمراض أخرى .

مُضاعَفَة (ج: مُضاعَفات) **complication**

1 ـ مرض أو أمراض تساير و ترافق مرض آخر .

2 ـ ترافق حدوث مرضين أو أكثر في نفس المريض (المريض نفسه) .

مُضاعَفَةٌ آجِلَة **delayed complication**

المضاعفة الّتي تحدث بعد مرور وقت من الزمن من ظهور المرض ، مثال تشمع الكبد بعد التهاب الكبد C .

مُضاعَفَةٌ عاجِلَة **immediate complication**

المضاعفة التيّ تحدث مباشرة مع ظهور المرض ، أو بعده بقليل كالرجفان البطيني بعد ظهور الاحتشاء القلبي مباشرة .

كومبيسللين VK **Compocillin - VK**

الاسم التجاري لمستحضر بوتاسيوم البنسيلين V .

كومبومر **compomer**

مادة الحشوة المركبة للمسندة الراتنجية الهجينة التي تحتوي على عناصر من زجاج مؤين ، بينما يحدث الشكل الأصلب يكون بتبلمر المسندة الراتنجية .

مُكَوِّن (ج: مُكَوِّنات) **component**

1 ـ عنصر أو جزء مكون .

2 ـ في طب الأعصاب ، سلسلة من العصبونات التي تشكل الجهاز الوظيفي لتوصيل الدفعات الواردة والصادرة في الآليات الجسمية والحشوية للجسم .

المُكَوِّنُ الأَمامِيّ (أسنان) **anterior component**

مصطلح أنجل (Angle's term) لقوة الدفع الأمامي التي تنتج عن التعشيق (التشابك) والسحن للسطوح الإطباقية المائلة والسطوح المائلة الإنسية للأسنان .

مُكَوِّناتُ المُتَمِّمَة **complement components**

انظر تحت complement .

المُكَوِّنُ النَّوعِيُّ لِلزُّمْرَة **group-specific component**

البروتين الرابط لفيتامين D ، وهو البروتين للأعضاء مثال ذلك : الرئة و المثانة البولية ، وتكون مقاسة بوحدة الحجم المتغير بالنسبة لوحدة الضغط المتغير . الرمز C هو مقلوب المرونة .

مُطاوِعَةٌ دِيناميكيَّة **dynamic compliance**

تقاس المطاوعَة في الوقت الذي يتمدد فيه العضو أو يتقلص . في الرئة هو قياس التغير في الحجم بالنسبة إلى التغير في ضغط النفخ (الانتفاخ) خلال تدفق الهواء إلى داخل وخارج الرئة .

مُطاوِعَةٌ حَرَكيَّة **motor compliance**

الاستجابة للأوامر الحركية كالطلب من المريض رفع قدم أو تحريك أصبع .

مُطاوِعَةٌ رِئَويَّة **pulmonary compliance**

تسمى أيضاً (Lung compliance) ، وهي قدرة الرئتين على الشد أثناء تبدلات الحجم متناسباً مع تبدلات الضغط الناجمة عن تغير ذلك الحجم . وتكون المطاوعة أكبر ما يكون في تبدلات الحجم المتوسطة بينما تكون أقل ما يكون في الحجوم الصغيرة والكبيرة جداً .

مُطاوِعَةٌ جَسَدِيَّة **somatic compliance**

تعبير عن مدَى تجاوب الجسد مع البيئة المحيطة به .

مُطاوِعَةٌ نوعيَّة **specific compliance**

المطاوعة النَوعية هي مطاوعة تركيب أو بنية ما مقسومة على حجمه الأولي ، وهي أكثر نوعية في الرئتين ، وتكون بقسمة المطاوعة الرئوية على السعة المتبقية الوظيفية .

مُطاوِعَةٌ استاتيكيَّة **static compliance**

تقاس المطاوعة في غياب أية حركة ، وعكسها هو المطاوعة ديناميكية .

يَتَسَبَّب في مُضاعَفات **complicate**

عامل يسبب ظهور مضاعفات على المرض أو المشكلة الأصلية .

1. مُعقَّد **complicated**

2. مَصْحُوبٌ بِمُضاعَفات

يختلط بالمضاعفات ، يترافق مع أذيات أو آفات

نظام مـجـمـوعي من العـصـبـونات الموصلة للدفعات المنبهة إلى المستفعلات الجسدية (العضلات الهيكلية) للجسم .

المُكَوِّنُ الحِسِّيُّ الجَسَدِيُّ **somatic sensory component**

نظام مَـجـمـوعي من العـصـبـونات الموصلة للدفعات المنبهة من المستقبلات الجسدية .

المُكَوِّنُ الحَرَكِيُّ الحَشَوِيُّ **splanchnic motor component**

نظام مَـجـمـوعي من العـصـبـونات الموصلة للدفعات المنبهة إلى المستفعلات الحشوية (العضلات القلبية ، العضلات الملساء والغدد)

المُكَوِّنُ الحِسِّيُّ الحَشَوِيُّ **splanchnic sensory component**


نظام مَـجـمـوعي من العـصـبـونات الموصلة للدفعات المنبهة من المستقبلات الحشوية .

المكون الحـــركي الحشوي **visceral motor component**

انظر تحت splanchnic motor component .

المكون الحسي الحشوي **visceral sensory component**

انظر تحت splanchnic sensory component .



Compomer كومبومر

compos mentis **سَليمُ العَقل**

compositae **كومبوسيتا**

عائلة كبيرة من الأعشاب المزهرة والشجيرات والأشجار الحاوية على رؤوس أزهار مركبة ، حيث يوجد عدد من الزهيرات في كل رأس . تعرف العديد من أجناسها مثل الأقحوان وعباد الشمس والهندباء البرية وكلها من هذه

المصلي للإستخدام الخاص في الدراسات الأنثروبولوجي (علم البشريات) ، وذلك بسبب الاختلافات الكبيرة في تواتر الجين في الإناس المختلفين .

المُكَوِّنُ (M) **M component**

في الورم النقوي المتعدد

(في الورم النقوي ، أو وجود الجلوبولين الكبروي في الدم) ، وهو الجلوبولين المناعي وحيد النسيلة الشاذ مع نمط رحلان كهربائي مميز ، يتواجد في أمصال المرضى المصابين باعتلال الخلايا البلازمية تتشكل بواسطة التكاثر المركز للخلايا المنتجة للجلوبولين المناعي .

مُكَوِّناتُ الإِطْباق **occlusion components**

العوامل المختلفة التي تدخل في حدوث الإطباق ، وهي الفكان العلوي والسفلي والجهاز العضلي العصبي . والتركيب أو البنى الداعمة للأسنان .

المكوِّنُ الترُومبُوبِلاسْتِينيُّ البلازْميُّ **plasma thromboplastin component (PTC)**

هو العامل التاسع (IX) .

انظر تحت coagulation factors .

المكون الإفرازي **secretory component**

هو ببتيد سكري ذو وزن جزيئي قدره (70.000) دالتون يتواجد في الجلوبولين المناعي A (IgA) ، الإفرازي ، لا يتخلق بواسطة الخلايا البلازمية المنتجة للجلوبولين المناعي A (IgA) ، وإنما يتم الإضافة عليه أثناء عبور (IgA) الظهارة ، ربما يكون هو المسؤول عن حماية (IgA) ، الإفرازي من هجوم الطليعة الحالة بعد الإفراز ، أو قد يلعب بعض الدور في عملية الإفراز . قد شوهد عوز المكون الإفرازي في بعض المرضى ، حيث يوجد نقص تام في (IgA) في الإفرازات الخارجية على الرغم من كون (IgA) المصلي طبيعي . يسمى أيضا (Secretory piece) .

المَكَوِّنُ الحَرَكِيُّ الجَسَدِيُّ **somatic motor component**

انظر تحت chain .

مُركَّبٌ انْضيافيّ **addition compound**

مركب يتَشكل باتحاد مركبين أو عنصرين أو أكثر .

مُركَّبٌ أليفاتيّ **aliphatic compound**

مركب ذو سَلسلة مفتوحة ، ولا يحتوي على روابط متعددة ، ولهذا فهو مركب مشبع .

انظر open chain .

مُركَّبُ APC **APC compound**

(مُرَكَّبُ الأَسْبيرين ، فيناسيتين ، كافين)

مستحضر لحمض الأسيتيل ساليسيليك والفيناسيتين وسيترات الكافيين .

مُركَّبٌ أروماتيّ **aromatic compound**

يسمى أيضاً مركب عطري ، هو مركب ذو سلسلة مغلقة حيث تحتوي الحلقة على روابط مضاعفة عديدة .

انظر تحت closed chain .

مُركَّباتُ البنْزين **benzene compounds**

انظر تحت aromatic copounds .

مُركَّب صِبْغَة الجَاويّ **benzoin tincture compound**

انظر تحت ticture .

مُركَّبٌ ثُنائيّ **binary compound**

مركب تتكون جزيئاته من ذرات لعنصرين اثنين فقط .

مُركَّباتٌ مُشبّكَة **clathrate compounds**

نمط من المعقد الاشتمالي ، حيث إن جزيئات النمط الواحد تحتبس داخل أجواف من مادة أخرى كداخل بنية شبكية بلورية أو جزيء كبير . يسمى أيضاً (Occlusion compounds) .

مُركَّبٌ مُغْلَقُ السِّلْسلَة **closed-chain compound**

انظر تحت chain .

مُركَّبُ قَطرَانِ الفَحْم **coal-tar compound**

مركب أسود سائل ثخين ينتج عن تقطير الفحم ويدخل في تركيبه البنزين والفينول

العائلة . تسمى أيضاً الزهرة النجمية .

مركب composite

1 ـ يتركب من أجزاء غير متشابهة .

2 ـ مركب مسندة الراتنج .

انظر تحت resin matrix composite .

مركب مسندة الراتنج **resin matrix composite**

راتنج تخليقي ، عادةً ذو قاعدة أكريلية حيث يضاف إليه نسبة عالية (حوالي 75 إلى 80٪) من مادة مالئة خاملة (مثل خرزات أو أعواد زجاجية أو مسحوق سيليكات البورو الزجاجية ، أو السيليكات الطبيعية) . تغلف الجزيئات المالئة بعامل تقارن ، بحيث يربطهم بالمسندة الراتنجية . يستخدم بشكل رئيسي في الإجراءات الترميمية السنية . يسمى أيضاً (Composite resin) .

تركيب composition

المكونات الداخلة في تكوين أو بنية الشيء .

تَرْكيبُ الجسْم **body composition**

البنى التي يتكون منها الجسم .

سَمادٌ مُخلَّط compost

السماء المؤلف من مجموعة مختلفة من المكونات الكيميائية أو الطبيعية .

خُشَاف compote

نوع من مربى الفواكه الكاملة المغطوسة بشراب سكري معد بتسخين الماء المضاف له السكر والقرفة وبعض المبشور من جوز الهند .

1. مُركَّبٌ 2. يُركِّب compound

1 ـ في الكيمياء ، هي مادة تتألف من عنصرين كيمائين متحدين أو أكثر .

2 ـ في علم الوراثة ، النمط الجيني الذي يكون فيه أليلان طافران مختلفان في نفس الموضع ، أو النمط الظاهري الناتج عن مثل ذلك النمط الجيني .

مُركَّبٌ لاحَلَقيّ **acyclic compound**

مركب ذو سَلسلة مفتوحة .

مُرَكَّبٌ دُهْنِيّ **fatty compound**

أي مادة ذات تكوين دهني كالأحماض الدهنية السائلة أو الجامدة ، ومنها زيت الزيتون والسمن .

مُرَكَّبُ جرينْيار **Grignard compound**

انظر تحتَ reagnt .

مُرَكَّبٌ مُتَغايرُ الحَلَقَاتِ **heterocyclic compound**

مادة كيميائية تحتوي على نواة حلقية الشكل تتألف من عناصر غير متشابهة .

مُرَكَّبَاتٌ عاليَةُ الطَّاقَةِ **high-energy compounds**

مركبات تحتوي على روابط عالية الطاقة ، بسبب كونه يتيح إعطاء مستويات عالية من الطاقة الحرة عند الحلمهة ، وتعتبر هذه المركبات أساسية لتزويد الكائنات الحية بالطاقة . تتضمن الأصناف الهامة حمض الأنهدريد (البلاماء) (مثال ذلك : ثلاثي فسفات الأدينوزين ، وأدينيلات الأمينوأسيل) وفسفات الإينول (مثال : بيروفات الفسفوإينول) ، والإستر الثيولي (مثال : أسيل تميم الإنزيم A) والفسفاجين (مثال : الفسفوكرياتين) . تسمى أيضاً (Energy rich compounds) .

مُرَكَّبُ هرلَر- شايِيه **Hurler-Scheie compound**

(= داء عديدات السَّكَاريدات المُخَاطِيَّة رَقْم 1) **(=mucopolysacch-aridosis 1)**

انظر تحت syndrome .

مُرَكَّبُ الطَّبْع **impression compound**

يسمى أيضاً (Modeling plastic) ، (Modeling composition) ، (Modeling compound) وهي مادة لدنة مطاوعة من راتينات صمغية مع الطباشير وتستعمل في تحضير الطبعات السنية التي يصنعها طبيب الأسنان لإرسالها إلى المختبر السني لتصنيع البدلات السنية أو تلبيسات الأسنان والجسور .

والأنثراسين ، ومنها يشتق عدد كبير من الأصبغة والأدوية والمركبات الصناعية التركيبية الأخرى ، ويتبقى الثمالةالمعروفة بزفت قطران الفحم الذي ترصف به الطرقات .

المُرَكَّبُ A **compound A**

هو المركب الكورتيزوني 11- دي هيدروكورتيكوستيرون ، (11-dehydrocorticosterone) .

المُرَكَّبُ E **compound E**

هو الكُورْتيزُون (Cortisone) .

المُرَكَّبُ F **compound F**

هو الكُورْتيزُول (Cortisol) .

كَسْرٌ مُرَكَّب **compound fracture**

حدوث أكثر من كسر في عظم واحد . وذهبت بعض المصادر إلى اعتباره الكسر المفتوح وهو الكسر الذي تمزق الجلد فوقه أو بَرَزَ الكسرُ منه .

مِجْهَرٌ مُرَكَّب **compound microscope**

المِجهر الذي يحتوي على عدستين مكبرتين أو أكثر .

مُرَكَّبٌ تكاثُفيّ **condensation compound**

مركب يتشكل باتحاد المواد مع فقد واحد أو أكثر من الجزيئات ، وعادةً تكون الجزيئات منخفضة الوزن الجزيئي مثل الماء و الأمونيا .

مُرَكَّبٌ حَلَقِي **cyclic compound**

مركب مغلَق السلسلة .

انظر تحت closed chain .

مُرَكَّبُ الدِّيازُو **diazo compound**

مركب يحتوي على الزمرة $-N_2-$.

مُرَكَّبٌ ماصٌّ للحَرارَة **endothermic compound**

مركب يتشكل بمعالجته بالحرارة الممتصة من الوسط المحيط به (البيئية) .

مُرَكَّبٌ غَنِيٌّ بالطَّاقَة **energy-rich compound**

انظر تحتَ high energy compounds .

مُرَكَّبٌ مُطْلِقٌ للحَرارَة **exothermic compound**

مركب يصاحب تشكله فقد في الحرارة إلى البيئة المحيطة .

انظر تحت chain .

مُركَّبٌ عُضْويّ **organic compound**
مركب من عَناصر كيمائية تحتوي على ذرات الكربون .

مُركَّبٌ عُضْوِيٌّ فلزِّيّ **organometallic compound**
مَركب يرتبط فيه الكربون بالمعدن .

مُركَّبٌ بَارافينيّ **paraffin compound**
المركب أو المَادة التي يدخل في تركيبها البرافين .

مُركَّباتٌ قُطْبيَّة **polar compounds**
مركبات يشَار إلى أن الإلكترونات فيها تتشابك بشكل غير متساو بواسطة ذرتين تشكلان رابطة ولذلك يمكن أن تعَمل كأقطاب مزدوجة أو في بعض الحالات كأيونات كاملة . وتتضمن الكحول والماء والأمونيا .

مُركَّبٌ أمونْيُوميٌّ رُباعيّ **quaternary ammonium compound**
انظر تحت tetraethylammonium .

مُركَّبٌ رُباعيّ **quaternary compound**
مركب يتألَف من أربعة عناصر .

مُركَّبٌ حَلَقيّ **ring compound**
انظر تحت closed chain .

مُركَّبٌ مُشْبَع **saturated compound**
مركب حيث تكون فيه القدرة الاتحادية لكل العناصر مشبعة .

مُركَّبٌ اسْتبْداليّ **substitution compound**
مركب يتَشكَل بواسطة استبدال أو استعاضة عناصر الجزيء بعناصر أخرى .

مُركَّبٌ ثُلاثيّ **ternary compound**
مركب يتألَف من ثلاثة عناصر .

مُركَّبٌ ثُلاثيّ **tertiary compound**
مركب ثلاَثي .

مُركَّبٌ لامُشْبَع **unsaturated compound**
حيث تكون فيه القدرة الاتحادية لكل العناصر غير مشبعة .
انظر تحت unsaturated .

مُركَّبٌ لاعُضْويّ **inorganic compound**
مركب لا يحتوي على عنصر الكربون .

مُركَّبٌ إسْويُّ الحَلَقات **isocyclic compound**
مادة كيميائية تحتوي على نويات حلقية الشكل تتكون من نفس العناصر في كل مكان .

مُركَّبُ الكُحول الإيزُوبْروبيليّ للدَّلْك **isopropyl alcohol rubbing compound**
مزيج متجانس من الكحول الإيثيلي والكحول البروبيلي ، والذي يستعمل للدلك الخارجي ، ويدخل في تركيب المواد التجميلية ، ولكنه سام بطريق الفم .

مُركَّبُ كِنْدال A **A Kendall's compound**
هو مركب 11- دي هيدروكورتيكوستيرول (11-dehydrocorticosterone) .

مُركَّبُ كِنْدال B **B Kendall's compound**
هو مركب الكورْتيكُوستيرون (Corticosterone) .

مُركَّبُ كِنْدال E **E Kendall's compound**
هو الكورَتيزون (Cortisone) .

مُركَّبُ كِنْدال F **Kendall's compound F**
هو الكورَتيزول (Cortisol) .

مُركَّبٌ مُنْخَفِضُ الطَّاقَة **low-energy compound**
مركبات تتيح مستويات منخفضة نسبياً من الطاقة الحرة عند الحلمهة مثل الأدينوزين أحادي فسفات الأدينوزين (AMP) ، والجلوكوز 1 ـ فسفات ، والجلوكوز 6 ـ فسفات .

مُركَّباتٌ لاقُطْبيَّة **nonpolar compounds**
مركبات يشارَ إلى أن إلكتروناتها بواسطة ذرتان منها تشكلان رابطة ، ولذلك فهي لا تتأين في المحاليل ، مثال ذلك : البارافين والأليفين والمركبات الحلقية .

مُركَّبٌ مُقْتَنَص **occlusion compound**
(= مُركَّبٌ مُشَبَّك) **(=clathrate compound)**
انظر تحت clathrate compound .

مركب مفتوح السلسلة **open - chain compound**

انظر تحت massage .

انْضغاطُ ذيْل الحصَان **cauda equina compression**
تعرَضَ الحزمة العصبية النخاعية السفلى إلى الانضغاط بسبب رضحي أو ورمي .

قَوْلَبَةٌ بالضَّغْط **compression moulding**
صنع الأشياء ضمن قوالب محددة مع تعريضها للتسخين والضغط لتأخذ شكل القالب الأساسي دون ترك أي فراغات ، وتكون المادة من النوع الذي يسيل بالحرارة ويجمد بعد التبريد والضغط .

انْضغاطُ الدِّماغ **compression of the brain**
انظَر تحت cerebral compression .

انْضغاطٌ إصْبَعيّ **digital compression**
انضَغاطَ الأوَعية الدموية بواسطة الأصابع من أجل التحقق من النزف .

انْضغاطٌ أَدَواتيّ **instrumental compression**
انضَغاط الأوَعية الدموية بواسطة الأدوات .

ضَغْطُ الوداجي **jugular compression**
تعرض الوريَد الوداجي للضغط سواء من منشأ خارجي أو داخلي .

انْضغاطُ جَذْرِ العَصَب **nerve root compression**
انفخَاخ العصب .

انْضغاطٌ هَوائيّ **pneumatic compression**
طَريقة تستَعمل لمعالجة قرحات الساق الوريدية .

انْضغاطُ الشِّرْيان الكُلْوي **renal artery compression**
تعرض الشريَان الكلوي للانضغاط الخارجي غالباً كالانضغاط بساق الحجاب ، ما يسبب إفراز الكلية لمواد رافعة للضغط ، وقد يترافق الانضغاط بورم كظري .

انْضغاطُ النُّخاع **spinal compression**
حَالة يمارس الضغط فيها على الحبل الشوكي بواسطة الورم ، أو الكسور الفقرية ، إلخ . تتضمن تظاهراته ـ التي تختلف بحسب موضع

شامِل **comprehensive**
صفة السعة والشمولية للشيء ، كالمعجم الشامل ، أو المادة ، أو الخدمة ذات الاستعمالات الواسعة غير المخصصة بصنف أو نموذج واحد .

الرِّعايَةُ الصِّحِّيَّةُ الشّاملَة **comprehensive health care**
الرعايَة التي تقدم الخدمات في شتى المجالات .

التَّخْطيطُ الصِّحِّيُّ الشّامل **comprehensive health planning**
التخطَيط الصحي الذي يشمل كافة المجالات الصحية .

1ـ يضْغط **compress**
2ـ رفادَة
رفادة من الشاش المطوي أو من مادة أخرى ، والتي تطبق مع الضغط ، وأحياناً تكون مشربة بالدواء ، يمكن أن تكون رطبة أو جافة ، دافئة أو باردة .

الهَواءُ المَضْغوط **compressed air**
هو الهواء السائل المتعرض لمزيد من الضغط الجوي الزائد لينقلب من الصفة الغازية إلى الصفة السائلة .

قابليَّة الانضِغاط **compressibility**
1 ـ قابلية المادة للتكثف أو للتناقص في الحجم .
2 ـ تناقص وحدة حجم المادة بواسطة زيادة وحدة الضغط .

1ـ تطبيْق ضَغط (كبْس) **compression**
2ـ انضِغاط
1 ـ فعل الضغط معاً ، وهو فعل يُبذل على جسم ما بواسطة قوة خارجية مطبقة حيث تميل إلى إنقاص حجمه وزيادة كثافته .
2 ـ في علم الجنين ، تقصير أو حذف (إلغاء) مراحل محددة خلال التطور .

الانضغاط المخي **cerebral compression**
حالة ينضغط فيها الدماغ بواسطة ورم ، أو كتلة ، أو خثرة دموية ، أو خراج . يسمى أيضاً (Compression of the brain) .

انْضغاطُ القَلْب **cardiac compression**

ضاغطُ ديشان **Deschamps' compressor**
(للشَرايين)
أداة للضغط المباشر على الشريان .

ضـاغطُ سـيـرت **Sehrt's compressor**
(=Sehrt clamp)
ملقط لضغط الأورطي .

ضاغطٌ مُطْلَق **shot compressor**
(ضَاغطُ مَيَزابَة الغُرَز الجراحيَّة)
ملقط َلضغط اَلغرز اَلجراَحية .
انظر تحت shotted suture .

ضاغِطة مُدرَّجَة **compressorium**
أداة لتطبيق الضغط بشكل تدريجي على الأشياء تحت الفحص المجهري .

مَنْقوص **compromised**
صفة الشي الضعيف الذي لا يقوم بوظيفته الكاملة ، كالمناعة المنقوصة عند المسنين .

مَنْقوصُ المَناعَة **immunologically compromised**
يسمى أيضاً (Immunocompromised) ، وهو الشخص منقوص المناعة إما بسبب تقدم العمر ، أو بسبب مرضي كالإصابة بڤيروس العوز المناعي البشري (ڤيروس الإيدز) (HIV) .

المُراقِبُ المالِيّ **comptroller**
يسمى أيضاً (Controller) ، وهو مفتش مالي يراقب الحسابات المالية على المحاسبين .

قَهْر **compulsion**
(=compulsive act)
1 ـ اندفاع مستمر ، و غير مقاوم لانجاز فعل غير رشيد أو غير مفيد ظاهرياً .
2 ـ فعل قهري أو شعائري ، الأفعال التكرارية والنمطية مثل غسل الأيدي وتنظيف الأسنان والعد والتحقق ، والتي ينشغل بها أو يتورط فيها الفرد من أجل الأغراض غير معروفة أو بشكل غير واعي .

قَهْرُ التَّحَقُّق **check compulsion**
إنَّ إجراء الفحوص والمراقبة القهرية المستمرة أصبحت من الأعراض السائدة في مرض أو ودرجة الضغط ـ الألم والمذل والاضطرابات الحسية والحركية .

ضاغِط (صِفة) **compressive**
صفة الشيء الذي يسبب الضغط على أشياء أخرى .

قُوَّةٌ ضاغطَة **compressive strength**
تطبيق قَوة تحقق ضغطاً على الأشياء ، كالأوعية لتوقيف نزف وعائي مثلاً .

إجْهَادٌ ضاغط **compressive stress**
أي كرب أو إجهاد نفسي يحقق ضغطاً على النفس ، كالكروب والشدات من المصائب المتلاحقة .

ضاغِط (اسْم) **compressor**
1 ـ أداة ضاغطة للأوعية .
2 ـ عضلة ضاغطة ، أو تضغط إلى الأسفل على جزء ما .

ضاغطٌ للهَواء **air compressor**
جهَاز يحول الهواء من الحالة الغازية إلى الحالة سائلة ، وذلك بتحقيق قوة ضاغطة عليه .

ضاغطُ الأورطي **aortic compressor**
جهَاز يحقق ضغطاً مؤقتاً على أحد قطع الأورطي (الصدري أو البطني) ، وذلك في حالات الصدمة النزفية أو التسليخ البطاني الأنورزم ، ثم يزال الضغط بعد إصلاح الخلل .

ضاغطَةُ المَنْخر **compressor naris**
(=اَلجُزْءُ المُسْتَعْرِضُ للعَضَلَة الأَنْفيَّة) **(=parstransversa musculinasalis)**
انظر تحت pars transversa musculi nasalis .

الضَّاغطَةُ الإحْليليَّة **compressor urethrae**
(=عَضَلَةُ اَلمَصرَّة الإحْليليَّة) **(=musculus sphincter urethrae)**
انظَر تحَت musculus sphincter urethrae .

الضَّاغطَةُ المَهْبليَّة **compressor vaginae**
(= العَضَلَةُ اَلبَصَليَّةُ الإسْفَنْجيَّة) **(=bulbospongiosus muscle)**
هيَ اَلعضَلة البصلية الإسفنجية في الإناث .
انظر تحت bulbospongiosus muscle .

هو وضع تصاميم هندسية أو خطط علاجية بمساعدة البرامج الحاسوبية .

التَّصْنيعُ بمعاوَنَة الحَاسوب — **computer aided manufacturing**

هو استَخدام الحاَسوب في الصناعة والإنتاج ، فيمكن مثلاً استخدام الحاسوب في تنفيذ صناعات دقيقة ورسوم فائقة الدقة تحتاج يدوياً لزمن طويل جداً بينما يقوم الحاسوب بتنفيذها بزمن قصير جداً .

الاخْتبَارُ بمُعَاوَنَة الحَاسوب — **computer aided testing**

هو تقيَيم نتائج الآحتبارات بسرعة إذا نُفذت بالطرق الحاسوبية ، وهو ما يساعد على تقييم نتائج الإجابات بسرعة هائلة مهما بلغ المتقدمين ، ومثالها حساب وتقييم نتائج انتخابات في دول يبلغ تعداد سكانها ملايين خلال وقت قصير جداً من الزمن .

عَتادُ الحَاسوب — **computer hardware**

المكونات الصلبة الأساسية في الحاسوب ، كالقرص الثابت ، وقطع الذاكرة الأساسية ، واللوحة الأم ، ولوحة المفاتيح لإدخال المعلومات .

بناءُ طراز بالحَاسُوب — **computer modeling**

وضعَ نمُوذج الحاسوب كبناء هندسي يحق المواصفات التي تطلب منه كحجمه ، وهل هو نقال أم ثابت ، وكبير أو صغير .

مطْرافُ الحاسوب — **computer terminal**

الأجهزة الطرفية للحاسب كالشاشة والآلة الطابعة .

حاسوبٌ دَفْتَريٌّ — **laptop computer**

هو الحاسوبَ النقال الذي يمكن حمله ، فيؤدي عمله في أي مكان . ويسمى أيضاً (Notebook computer) .

حاسوبٌ مَرْكَزيّ — **mainframe computer**

يسمى أيضاً (Big Iron) ، وهو الحاسوب الضخم المعد للشركات الضخمة والصناعات الثقيلة التي تحتاج لعمليات معقدة على

متلازمة الوسواس القهري .

قَهْرُ التَّجْميع — **collecting compulsion**

تجميع أشياء بشكل إلزامي أو قهري .

قَهْرٌ مُقنَّع — **masked compulsion**

وجود دوافع قهرية غير ظاهرة .

قَهْرُ التَّكْرار — **repetition compulsion**

مصطلح يستخدم في فرضيات التحليل النفسي ، هو الاندفاع لتكرار الفعل سابق له علاقة بالتجارب العاطفية ، أو السلوك الرض .

قَهْرُ التَّفْكير — **thinking compulsion**

الالتزام القهري بالتفكير .

قَهْريّ — compulsive

1 ـ يتعلق أو يتميز بالقهر .

2 ـ دقيق جامد وعنيد وغير حاسم ويشغل البال مع العمل . هي الخلات الشخصية الملحوظة في شخصية الفرد المصاحب باضطراب الوسواس القهري .

التَّصْويرُ المَقطعِيُّ المِحْوَريّ المحَوْسَب — computed axial tomography

طريقة متطورة محوسبة من طرق التصوير الشعاعي ، وفيها تجمع المعلومات التشريحية من الصور الملتقطة لمقطع مستعرض من الجسم في مستوى ما ، وتعالج حاسوبياً ، وتعرض كصورة صادرة عن الحاسوب وتتألف من مُعْطَيات منقولة عن الصور الشعاعية لكثير من الاتجاهات المتفاوتة من خلال مستوى الجسم .

شُعْبَةُ التَّصْويْر المقطعِي المحْوَري المحَوْسَب — computed axial tomography service

قسم من المستشفى يكون المسؤولاً عن القيام بالتصوير المقطعي المحوري المحوسب للمرضى .

الحَاسوب — computer

هو جهاز مبرمج وفق أنظمة وبرامج محددة لتسمح باستخدامه لتخزين المعلومات ومعالجتها وتصنيفها والبحث عنها في أي وقت .

التَّصْميمُ بمُعاونَة الحَاسَوب — **computer aided design**

مستويات واسعة ودولية ويحتمل تجميع معلومات هائلة من دول متعددة ، وهو ثابت وضخم ، ولا يمكن تحريكه من مكانه .

حاسوبٌ مكْرَوِيٌّ **micro-computer**

الحاسوبَ الصَغير الذي يمكن حمله باليد .

حاسوبٌ صغْرَوِيّ **mini-computer**

حاسوب صَغَير جداً يمكن حمله بالجيب ، ويؤدي أغراضاً وعمليات كبيرة ويحفظ معلومات هائلة .

الحاسوبُ العَصَبِيُّ **neural computer**

حاسوب يمكنُ ربطه على الدماغ ، ويستخدم لتقويم بعض الاضطربات العصبية الحسية أو المعرفية ، وقد بدأ العمل عليه منذ السبعينيات .

حاسوبُ المُفَكَّرة **notebook computer**

هو الحاسوب النقال الدفتري (Laptop computer) ، والذي يمكن للمستخدم حمله أينما ذهب .

حاسوبٌ شَخْصِيّ **personal computer**

الحاسوب الذيَ يستخدم للأغراض الشخصية سواء كان مكتبياً أو نقالاً ، على عكس الحواسيب الضخمة المخصصة لأعمال الشركات والمؤسسات الكبيرة .

مُحَوسَب **computerized**

تجرى عليه العمليات الحاسوبية .

التَّصْوِيرُ المَقْطَعِيُّ المِحْوَرِيُّ المُحَوسَبَ **computerized axial tomography**

انظَر تحَت computed axial tomography .

مَنْسَبُ الشِّدَّة المُحَوسَبَ **computerized severity index**

عبارة عن موسوعة حاسوبية مرمزة للأمراض حسب رموز منظمة الصحة العالمية لكل مرض ، وتسمى (ICD-9-CMSA) ، فيها يوجد ا لكل مرض رمز مؤلف من ستة أرقام يشير السادس منها إلى شدة المرض لدى المرضى المقيمين في المستشفيات بحسب المستشفى .

التَّصْوِيرُ الحَرارِيُّ المُحَوسَب **computerized thermography**

جهاز حديث منظم يختصر حالياً باسم (CRT) ، وهو (Computerized Regulatory Thermography) ، وهو دقيق ومرخص من (FDA 510K) ، ويستعمل لتقييم مدى كفاءة الجهاز الناظم في الجسم . ويمكنه تحديد مواضع الأمراض في أجهزة الجسم قبل باقي أجهزة التصوير الأخرى .

التَّصْوِيرُ المَقْطَعِيُّ المُحَوسَب **computerized tomography**

انظر تحت computed axial tomography .

سابقة بمعنى الاشْتِرَاك **con-**

كونالبومين **conalbumin**

(الجزء اللامتبلور من بياض البيض)

هو بروتين سكري ، والذي يتشكل من تحميض بياض البيض إلى باهاء 3.9 ، ويحتوي على 2.1٪ من المانوز و 0.7٪ من الجالاكتوز . ولهذا فهو الجزء اللامتبلور من ألبومين البيض .

متعلق بالجِسْم الصَّنَوبَرِيّ **conarial**

صفة منسوبة لكل ما له علاقة بالغدة الصنوبرية .

الجِسْمُ الصَّنَوبَرِيُّ **conarium**

(=pineal body)

يراد به ذلك الجزء التشريحي حدبي الشكل الموجود في الجزء الخلفي من الدماغ المركزي ، فهو جسم مفرد في الدماغ يشبه مخروط حبة الصنوبر ، ذو تركيب غدي يتألف من جريبات ذات خلايا ظهارية وبعض الكثافات الكلسية التي تسمى بالرمل الدماغي وتتلقى أليافاً عصبية ذاتية محيطية .

اعْتِزام **conation**

مصطلح في علم النفس ، بمعنى القدرة التي تدفع لانجاز جهد من أي نوع . أي أنه الميل الواعي للفعل .

اعْتِزامِيّ **conative**

يتعلق هذا المصطلح بالكفاح الأساسي للشخص كما يعبر عن الشخص في سلوكه وأفعاله .

إخْفاءُ المَولود **concealment of birth**

عدم الإعلام عن الولادة وتسجيلها رسمياً ، ويعتبر ذلك جريمة تختلف البلدان في عقوبتها .

1. يُدْرِك **conceive**

2. تحْمِلُ

1 ـ لتصبح حاملاً .

2 ـ يؤخذ في قبضة ، أو يقبض عليه ، أو يوضع في العقل (البال) ، يدرك .

1. رُكازَة **concentrate**

2. يُرَكِّزُ

1 ـ يجلبه أو يضعه في مركز معروف (شائع) ، أي أنه يجمع معاً في نقطة واحدة .

2 ـ زيادة قوته بواسطة انقاص كتلته ، كما هو الحال بتكثف الماء.

3 ـ دواء أو أي مستحضر قد تم تركيزه (تقوية مفعوله) بواسطة التبخير لأجزائه غير الفعالة .

ركازة بنزيل بنسليويل متعدد الليزين **benzylpenicilloyl polylysine concentrate**

هو محلول مركز من البنزيل بنسليلويل متعدد الليزين مع دارئ مناسب أو أكثر ، ويستخدم للمساعدة في تشخيص تحسس البنسلين .

ركازة اللاكتولوز **lactulose concentrate**

هو محلول سكري يُحضر من اللاكتوز ، ويتركب بشكل أساسي من اللاكتولوز مع كميات قليلة من اللاكتوز والجالاكتوز ، وكميات زهيدة من السكريات الأخرى ذات الصلة والماء .

رُكازَةُ الكَبد **liver concentrate**

هي مادةَ جافة غير مجزأة ناتجة عن الخلاصة المائية المشتقة من كبد الثدييات . تستخدم كمكون للدم .

رُكازَةُ البروتياز النَّباتي **plant protease concentrate**

هي رَكازة البروميلين ، وهو إنزيم حال للبروتين تشتق من نبات الأناناس . والذي تستخدم لانقاص الالتهاب والوذمة ، ولتسريع الترميم النسيجي .

كونافانين (كيمياء) **conavanine**

هو الحمض الأميني الأساسي والمستهلك في حبوب فول الصويا ، وتركيبه هو حمض ألفا ـ أمينو ـ جاما جوانيدين أوكسي بوتيريك .

كونكانافالينْ A **concanavalin A**

(مستخلص نباتي مضاد للأورام)

هو ليكتين يعزل من حبوب الزنجبيل . هو راصة دموية تتلصق الكريات الحمر الثدية ومحدث التفتل الذي ينبه اللمفاويات التائية بشكل سائد . يشار إليه باختصار (Con A) .

جَرْش (صيدلة) **concassation**

هو فعل تكسير الجذور أو الأخشاب إلى قطع صغيرة من أجل فعاليتها الأساسية التي يمكن أن يكون استخلاصها بهذه الطريقة أكثر سهولةً من المحاليل .

مُتسَلْسِل **concatemer**

يُسَلْسِل **concatenate**

يثبت أو يربط معاً كما في السلسلة .

1. الضَّمُّ **concatenation**

2. تسَلْسُل

سلسلة من الاحداثق أو الأشياء التي تحدث معاً أو في متوالية .

مُقعَّر **concave**

صفة للشيء الذي تملك سطح مدور ، ومنخفض إلى حد ما ، يشبه السطح الداخلي المجوف لقطعة من الكرة .

تقعُّر **concavity**

هي منطقة مجوفة خارجياً (للخارج) على السطح لعضو أو بناء آخر .

مُقعَّرة الوَجْهَين **concavoconcave**

(=biconcave)

صفة تدل على التقعر للسطحين المتعاكسين .

مُقعَّرة مُحدَّبَة **concavoconvex**

صفة تدل على شيء مقعر على سطح ومحدب على السطح المعاكس .

مُخْتَفٍ (مُختفِي) **concealed**

صفة لكل ما لا يظهر .

الذوائب المجموعة (العامة) في من البول . في الإنسان تقدر بحوالي 1200 ميلي أسمول/ كجم ماء ، وتكتب في شكل مختصر (MUC) .

التَّركيزُ الأَعْظَميُّ للخَلاَيا **MC concentration**


هو التركيز الأعظمي للخلايا ويكتب كذلك (Maximum cell concentration) .

التركيز الوسطي لهيموجلوبين الكرية **mean corpuscular hemoglobin concentration**

هو التركيز الوسطي لهيموجلوبين الكرية ، ويرمز له بالمختصر (MCHC) ، وهو متوسط تركيز الهيموجلوبين في الكرية الحمراء ، يعبر عنه بنسبة مئوية ، وهذا يعني جرام لكل ديسي لتر من الكريات الحمر ، ويستحصل عليه بتقسيم تركيز هيموجلوبين الدم (بالجرام/ ديسي لتر) . على الهيماتوكريت في (Hct/Hb= MCHC) : (L/L) .

التركيز السنخي الأصغري **minimal alveolar concentration**

هو التركيز السنخي من المادة المخدرة ، والتي تحت ضغط جوي يقدر بحوالي واحد جوي يمكن أن يُحدث توقف في 50٪ من الأشخاص الذين قد تعرضوا للمنبهات الضارة ، ويكتب في شكل مختصر(MAC) .



التصوير المقطعي المحوسب للدماغ
Computerized tomography of brain

رُكازَةٌ فيتامينيَّة **vitamin concentrate**

هي مستحضر دوائي مركز لفيتامين أو لفيتامينات متعددة .

تركيز concentration

1ـ زيادة في القوة (الشدة) بواسطة التبخير .
2ـ نسبة الكتلة أو الحجم للمذاب إلى كتلة أو حجم المحلول أو المذيب مقاساً بالمول أو المولية أو الكسر المولي .

تَرْكيزُ القُوَى **forces concentration**

توجيه القوى باتجاه واحد لتحقيق هدف معين .

تَرْكيزُ أيُونات الهيدْروجينَ **hydrogen ion concentration**

درَجة تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول ، وهي تتناسب عكسياً مع باهاء المحلول ، وتحسب من المعادلة : [H+] = 10 - pH .

التَّرْكيزُ الأيونيُّ **ionic concentration**

يشير إلى عَدد المولات الموجودة لأيون ما في وحدة الحجم من المحلول ، أو في وحدة الكتلة من المذيب .

التَّرْكيزُ المُحَدِّدُ الإسْويّ السَّوائل **limiting isorrheic concentration**

يدلّ عَلى الحد الأعلى للتركيز البولي ، والذي يمكن عنده المحافظة على حالة ثابتة مستقرة مع تنظيم فيزيولوجي فعال للمذاب وتوازن الماء ، ويكتب (LIC) .

التَّرْكيزُ الكُتْلَويُّ **mass concentration**

هو كتلة من مَقوم مادة ما مقسومة على حجم المزيج ، يقاس بالملي جرام (ملجرام) لكل لتر (mg/L) .

التَّرْكيزُ الأَعْظَميُّ للخَلاَيا (في مَستنبت) **maximum cell concentration**

هو العدد الأعظمي من المكروبات التي يمكن أن يُنتج في حجم معطى من المستنبت ، ويكتب في شكل مختصر(MC) .

التَّرْكيزُ البَوْليُّ الأَعْظَميُّ **maximum urinary concentration**

هو أعلىَ تركيز يمكن الوصول إليه من الذائبة أو

أيوني في حجم معين .

مُكثّفُ اتصَالاتِ **concentrator**

هو جهاز يوفر القدرة على جمع الاتصالات بطيئة السرعة .

مُتراكِز **concentric**

هو ما يملك مركز محدد ، والذي يمتد خارجياً بشكل متساوي في كل الاتجاهات من المركز المحدد .

دَوائرُ مُتَراكِزَة (مُتَّحِدَةُ المَرْكَز) **concentric circles**

مَفْهوم (ج:مَفاهيم) **concept**

صورة عن شيء موجود في الذهن .

مَفْهومُ الثَّبات **constancy concept**

يسمى أيضاً (Common metric) ، وهو حالة الاستقرار والاستمرارية على منوال واحد مع فروق في المفاهيم حسب مجال الاستخدام بين علم الوراثة وتطور الأجيال ، وغير ذلك .

مَفْهومُ المِرْسالِ الثَّاني **second messenger concept**

مَفْهومُ الذَّات **self concept**

هو الوعي الإدراكي الذاتي لمكونات الذات ، والتي تشتمل على الصورة البدنية والنفسية والاجتماعية ، ويمكنها أن تتأثر بالمواقف والعادات والمعتقدات والأفكار . ويمكن أن تساهم جميع هذه المكونات في بناء الشخصية ، ويسمى أيضاً هوية الذات (Self-identity) .

1. حَمْل **conception**

2. مَفْهوم

1 ـ بدء الحمل ، والذي يتميز بإخصاب بويضة بنطفة أو الحيوان المنوي ، وبتشكل اللاقحة المرئية .

2 ـ انظر تحت concept .

حَمْلٌ سابقٌ للزَّواج **premarital conception**

1. حَمْلِيّ **conceptive**

2. متعلق بالمفهوم

1 ـ قادر على أن يصبح حاملاً .

2 ـ يتعلق بالمفهوم .

التركيز الأدنى المبيد للجراثيم **minimal bactericidal concentration**

هو أقل تركيز للمضاد الحيوي المعطي واللازم لقتل كائن حي معين . يسمى أيضاً التركيز المميت الأدنى (Minimal leth concentration) ، ويكتب في شكل مختصر(MBC) .

التَّرْكيزُ المُثَبِّطُ الأَصْغَرِيّ (في مُسْتَنْبَت) **minimal inhibitory concentration**

هو أصغر أو أقل تركيز للمضاد الحيوي المعطى ، والقادر أن يثبط نمو كائن معين ، ويكتب في شكل مختصر (MIC) .

التَّركيزُ الأَصْغَرِيُّ الإِسْوِيُّ للسَّوائِل **minimal isorrheic concentration**

هو الحَد الأدنى من التركيز البولي ، والذي عنده يمكن الوصول إلى حالة ثابتة ومستقرة مع تنظيم فيزيولوجي فعال للتوازن بين المذاب والماء ، ويكتب في شكل مختصر(MLC) .

التَّرْكيزُ الأَصْغَرِيُّ المُميت **minimal lethal concentration**

يكتب في شكل مختصر (MIC) ، التركيز الأصغري القاتل للجراثيم .

انظر تحت minimal bactericidal concentration .

التَّرْكيزُ المولِيّ (= تَرْكيزُ المادَّة) **molar concentration (=substance concentration)**

هو تركيز المادة الذي يعبر عنه بمصطلح المولية ، ورمزه C .

انظر تحت molar .

تَرْكيزُ الإِجْهَاد **stress concentration**

يسمى أيضاً (Stress raisers) ، أو (Stress risers) وهو المكان الذي تتركز فيه الصدمة أو الضربة .

تَرْكيزُ المادَّة **substance concentration**

يراد به التركيز الجزيئي أو الموليّ (Molarity or Amount concentration ، Molar concentration) ، وهو قياس درجة تركيز ملح في محلول ، ما سواء كان بشكل جزيئي مركب أو

الجزء السفلي من الجدار الوحشي للتجويف الأنفي والغشاء المخاطي المغطي للصفيحة . يسمى أيضاً العظم الأسفنجي السفلي (Inferior spongy bone) والعظم المحاري السفلي (Inferior turbinate bone) .

المحارة الأنفية المتوسطة concha nasi media

هي الجزء الأسفل من الصفيحتين العظميتين اللتين تنتآن من الجدار الداخلي للتيه الغربالي والذي يفصل الصماخ العلوي عن الصماخ المتوسط للأنف . يغطي الغشاء المخاطي الصفيحة . يسمى أيضاً المحارة الغربالية السفلية (Inferior ethmoidal concha) والقرن الغربالي (Ethmoid cornu) والعظم المحاري المتوسط (Middle turbinate bone) والمحارة المتوسطة (Middle turbinate) .

المحارة الأنفية العلوية concha nasi superior

هي الجزء العلوي لصفيحتين عظمتين تنتآن من الجدار الداخلي للتيه الغربالي ، وتشكل الحد العلوي من الصماخ العلوي للأنف والغشاء المخاطي المغطي للصفيحة . يسمى أيضاً المحارة الغربالية العلوية (Superior ethmoidal concha) والعظم المحاري العلوي (Superior turbinate) ، والعظم الإسفنجي العلوي (Superior spongy bone) والمحارة العلوية (Superior turbinate) .

المحارة الأنفية العليا concha nasi suprema

هي صفيحة عظمية رقيقة تشاهد أحياناً تنتأ من الجدار الداخلي للمحارة الغربالية فوق المحارة الأنفية العظمية العلوية والغشاء المخاطي المغطي للصفيحة . يسمى أيضاً العظم المحاري الأعلى (Highest turbinate bone) ، والمحارة الغربالية العليا (Supreme ethmoidal concha) والمحارة العليا (Supreme turbinate) .

مَحارَةُ الأُذُن concha of auricle

تسمى أيضاً (Concha of ear) ، وتتمثل بأكبر تقعر ، وهي أرض الصيوان الأذني وتقع بين القسم الأمامي من حتار الأذن أو الحلزِّ وخاصة الوترة ، وتقسم إلى قسمين أحدَهَما علوي

مَفهوميّ conceptual

ما يتعلق بالمفاهيم وتفاوتها .

مَحْصولُ الحَمْل conceptus

هو حاصل أو مجموع ما يشتق من البويضة الملقحة (البيضة) في أية مرحلة تطورية من التلقيح وحتى الولادة ، وتتضمن الأغشية خارج جنينية بالإضافة إلى الجنين أو المضغة .

مَحارة (ج:مَحارات) concha (pl.conchae)

1 ـ القشرة .

انظر تحت shell .

2 ـ في التسميات التشريحية : هو الجزء أو البنية التي تشابه المحارة البحرية في الشكل .

مَحارَةُ الأُذُن concha auricularis TA

هو الجزء المجوف من الأذن الخارجية المنحني من الأمام بواسطة الزنمة ، ومن الخلف بواسطة الوترة .

مَحارَةٌ فُقَّاعِيَّة concha bullosa

هو عبارة عن توسع كيسي للمحارة الأنفية المتوسطة ، أحياناً يشاهد في التهاب الأنف المزمن .

المَحارَةُ الدَّمْعِيَّة concha lacrimalis

هي المحارة التي تنفتح القناة الدمعية تحتها .

المَحارَةُ الأَنْفِيَّةُ السُّفْلِيَّة concha nasalis inferior

انظر تحت concha nasi inferior .

المَحارَةُ الأَنْفِيَّةُ المُتَوَسِّطَة concha nasalis medi TA

انظر تحت concha nasi media .

المَحارَةُ الأَنْفِيَّةُ العُلْوِيَّة concha nasalis superior TA

انظر تحت concha nasi superior .

المَحارَةُ الأَنْفِيَّةُ العُلْيا concha nasalis suprema TA

انظر تحت concha nasi suprema .

المحارة الأنفية السفلية concha nasi inferior

هي صفيحة عظمية رقيقة مع حواف منحنية تتمفصل مع العظام الغربالية ، والفك العلوي ، والدمعي ، والحنكي ، وكذلك فهي تشكل

المَحارَةُ الأَنْفيَّةُ المُتَوسِّطَة middle nasal concha
(=concha nasalis media TA)
انظر تحت concha nasalis media TA .

المحارة الأنفية nasal concha

المحارة الأنفية السفلية nasal concha , inferior
انظر تحت cocha nasalis inferior .

المحارة الأنفية المتوسطة nasal concha , middle
انظر تحت concha nasalis media .

المحارة الأنفية العلوية nasal concha, superior
انظر تحت concha nasalis superior .

المحارة الأنفية العليا nasal concha, supreme
انظر تحت concha nasalis suprema .

المَحارَةُ الأَنْفيَّةُ القُرَينيَّة nasoturbinal concha
(=النَّابِرَةُ الأَنْفيَّة) (=agger nasi)
انظر تحت agger nasi .

مَحارَةُ الوَتَدي sphenoidal concha
هي زوج مَن العظيمات هرمية الشكل ، والتي تكون أشواكها بتماس مع صفيحة العظم الصخري المتوسطة وتشكل قاعدتها سقف تجويف الأنف ، وتسمى أيضاً (Bertin's bones) ، (Bertin's ossicles) ، (Sphenoidal turbinated bones) .

المَحارَةُ الأَنْفيَّةُ العُلْويَّة superior nasal concha
هي أعلى لُويحة عَظمية أسفنجية صغيرة ، والتي تبرز عن الجدار الجانبي الأنفي وتعزل الصماخ العلوي عن الردب الوتدي الغربالي ، وتسمى أيضاً محارة مورجاني (Morgagni's concha) ، (Superior concha) ، (Superior turbinated bone) .

المَحارَةُ الغِرْباليَّةُ العُلْيا supreme ethmoidal concha
تسمى أيضاً المحارة الأنفية العليا (Concha nasalis suprema) .
انظر تحت superior nasal concha .

مَحارات (ف: مَحارَة) conchae (sing.concha)
انظر تحت concha .

مَحاريُّ الشَكْل conchiform

ويسمى الزورقة (Cymba) ، وقسم سفلي يسمى التجويف (Cavum) .

مَحارَةُ القحْف concha of cranium
(=القُبَّة) (=calvaria)
انظر تحت calvaria .

مَحارَةُ الوَتَدي concha sphenoidalis TA
هي صفيحَة رقيقة ومنحنية من العظم الموجود في الجزء الأمامي والسفلي من جسم العظم الوتدي ، ويتشكل على الجزء الآخر جزء من سقف الجوف الأنفي . يسمى أيضاً العظم الوتدي المحاري (Sphenoturbinal bone) أو العظيمة (Ossicle) أو عظم بارتان (Bertin's bone) .

المحارة الغربالية السفلية ethmoidal concha , inferior
انظر تحت concha nasalis media .

المحارة الغربالية العلوية ethmoidal concha superior
انظر تحت concha nasalis superior .

المحارة الغربالية العليا ethmoidal concha supreme
انظر تحت concha nasalis suprema .

المَحارَةُ الغِرْباليَّةُ السُّفْليَّة inferior ethmoidal concha
هي صَفيحة أسفنجية رقيقة تتبارز من الجدار الوحشي للأنف وتعزل الصماخ العلوي عما تحته ، تسمى أيضاً المحارة الأنفية المتوسطة (Concha nasalis media) ، (Middle concha) .

المَحارَةُ القُرَينيَّةُ السُّفْليَّة inferior turbinate concha
هي صَفيحة أسفنجية رقيقة تتبارز من الجدار الوحشي للأنف ، وتعزل الصماخ المتوسط عن السفلي . وتتمفصل مع العظم الغربالي والفكي الدمعي والعظام الحنكية ، وتسمى أيضاً المَحارَةُ الأَنْفيَّةُ السُّفْليَّة (Concha nasalis inferior) ، (Inferior turbinated bone) ، (Turbinated body) .

مُوائِم **concordant**

1 ـ يُظهر نوع من توافق .

2 ـ يعود لأنواع قريبة العلاقة ببعضها . يطلق هذا المصطلح على نسج الزرع .

انظر تحت xenograft .

حَصاة **concrement (=calculus)**

لفظ يطلق على الحصاة ، وخصوصاً على الدرنة المتكلسة ، أو كتلة مشابهة لها .

1 ـ نُمُوٌّ مُتصاحِبٌ **concrescence**

2 ـ التِحامٌ مِلاطِيّ (لجذور الأسنان في سنين متجاورين)

1 ـ شيئان ينموان معاً ، وهو اتحاد أجزاء منفصلة أصلاً .

2 ـ في علم الجنين ، تساير وارتكاز الخلايا معاً .

3 ـ في طب الأسنان ، التحام لجذور اثنان من الأسنان المتجاورة ، وذلك بترسب الملاط .

1 ـ صَلْد **concrete**

2 ـ مَتين

3 ـ حَقيقِيّ

4 ـ خَرَسانَة

لهذه الكلمة عدة استعمالات بحسب المجال والسياق منها الاسمنت والمتانة والصلادة ومنها بمعنى حقيقي .

حَصاة **concretio (=calculus)**

انظر تحت calculus .

الْتِهابُ التَّأْمورِ الْمُتَحَصِّي **concretio cordis**

هو شكل من التهاب التأمور الالتصاقي ، حيث يكون التجويف التأموري منطمس ، والذي تظهر معه تكلسات في الصورة الشعاعية

الْتِهابُ التَّأْمورِ الْمُتَحَصِّي **concretio pericardis**

انظر تحت concretio cordis .

1 ـ حَصاة **concretion (=calculus)**

2 ـ قلَح (أسنان)

1 ـ حصاة أو كتلة غير عضوية في تجوف طبيعي ، أو في نسيج كائن حي ما .

2 ـ التحام شاذ لأجزاء متجاورة .

يشبه نصف محارة ثنائية المصراع .

كونكيُولين **conchiolin**

مادة شبيهة بالعظم تشكل قواقع الرخويات .

التِهابُ العَظم والنِّقي فِي عُمّالِ اللُّؤْلؤ **conchiolinost-eomyelitis**

هو الشكل من أشكال التهاب العظم والنقي الناتج عن استئصال غبار الأصداف ، والذي كثيراً ما يرى عمال صناعة الؤلؤ .

التِهابُ المَحارَة **conchitis**

مَحاريُّ الشَّكْل **conchoidal**

مِنْظارُ المَحارات **conchoscope**

منظار يستخدم من أجل فحص جدر التجويف الأنفي .

مِبْضَعُ المَحارات **conchotome**

انظر تحت turbinotome .

بَضْعُ المَحارَة **conchotomy**

انظر تحت turbinotomy .

دَوَرانُ العَيْنِ للدّاخِل **conclination (=intorsion)**

انظر تحت intorsion .

جازِم **conclusive**

أي بدون تردد ، وحاسم ، ومؤكد فيقال التشخيص الجازم (Conclusive diagnosis) ، والمقصود به المؤكد .

1 ـ طَبْخَة دَوائِيَّة (صيدلة) **concoction**

2 ـ عَمَلِيَّة الهَضْم

1 ـ مزج المواد الدوائية التي عادةً ما تحضر بمساعدة الحرارة .

2 ـ عملية الهضم .

انظر تحت digestive process .

تصاحُب **concomitance**

هو الترافق ، أو إضافي ، أو متحد مع آخر .

مُصاحِب **concomitant**

هو مصطلح بمعنى مرافق ، أو إضافي ، أو متحد مع آخر .

تواؤم **concordance**

لفظ يطلق في الوراثيات ، على نسبة حدوث خلة معينة في كلا الفردين لزوج من التوائم .

هو مراجعة عدة معلومات في الوقت ذاته ، وهو من العمليات الحاسوبية .

ارْتِجاج **concussion**

صدمة عنيفة أو التصادم ، والحالة التي تنتج عن مثل هذه الأذية .

ارْتجاجُ التَّعْجيل **acceleration concussion**

هي الضربة الناجمة عن جسم متسارع (أي متزايد السرعة) كضربة أفقية بندولية ، وهي غالباً ما تترك الجمجمة سليمة ، ويبقى ضغط السائل النخاعي طبيعياً .

ارْتجاجٌ هَوائيّ **air concussion**

انَظر تحت blast .

ارْتجاجُ الانْضغاط **compression concussion**

هو الارتجاج الذي يحدث نتيجة وقوع جسم بشكل ضاغط ونافذ للجمجمة ، والذي ويقع تأثيره الأكبر على مركز التنفس .

ارْتجاجُ الدِّماغ **concussion of the brain (=commotio cerebri)**

هو نقص الوعي كنتيجة لضربة على الرأس أو لحركة مفاجئة للدماغ خلال تحرك الرأس العنيف . في الارتجاج الخفيف يوجد فقد وعي عابر مع ضعف محتمل في الوظائف العقلية العليا ، مثل : فقد الذاكرة الراجعة ، وتقلقل في العواطف . في الارتجاج الشديد ، يوجد غياب وعي طويل الأمد مع ضعف في وظائف جذع الدماغ مثل فقد المنعكس التنفسي والفعالية الحركة الوعائية وتوسع الحدقات العابر .

ارْتجاجُ التِّيه **concussion of the labyrinth**

وينتج غالباً من رضح التيه ، وسببه عادةً انفجار يحدث قرب الأذن ، وينتج عنه طنين وصمم .

ارْتجاجُ الشَّبَكيَّة **concussion of the retina**

انَظر تحت commotio retinae .

ارْتجاجُ النُّخاع **concussion of the spinal cord**

هو خلل سوء وظيفة الحبل الشوكي العابر والناتج عن الأذيات الميكانيكية .

ارْتجاجُ البَطْن الهيدروليكيّ **hydraulic abdominal concussion**

3 ـ العملية التي يصبح فيها أقسى وأكثر صلابة .

حَصاةٌ هَضْميَّة **alvine concretion**

هو تكلس البراز مع تشكيل كتلة برازية جامدة متكلسة كثيراً ما تسد الأمعاء وتحتاج لعمل جراحي لاستخراجها ، ويؤهب لحدوثها الإمساك وقلة الحركة وخاصة عند المسنين .

حَصاةٌ شرْيانيَّة **arterial concretion**

تكلس في الجدار الوعائي ، والذي قد يظهر ويكتشف في الصورة الشعاعية .

حَصَاةٌ كلْسيَّة **calculous concretion**

انظر تحت articular calculus .

حَصاةٌ جِلْديَّة **cutaneous concretion**

ترسب بلورات حمض البول في الجلد وتشكل الطوفة (Tophi) ، وقد يكون تكوينها كلسياً أو من بلورات حمض البول .

حَصاةُ القُلْفَة **preputial concretion**

هي حصاة تتشكل تحت القلفة المحكمة ، وذلك بترسب الأملاح البولية على اللخن المتراكم .

حَصَياتٌ برُوسْتاتيَّة **prostatic concretions**

عبارة عن كتل مستديرة ، وغالباً صفائحية من مادة شبيهة بالنشواني ، والتي تتواجد في العديد من الأسناخ البروستاتية .

حَصَاةٌ توفيَّة **tophic concretion**

انظر تحت tophus .

تفكيرٌ واقِعِيّ **concretism**

وهو التفكير المنطلق من الواقع ، وليس من الخيال التصوري ، والمبني على وقائع حقيقية ، ويسمى أيضاً (Concrete thinking) .

مُسَايرُ التَّيَّار **concurrent**

هو الشيء الذي يحدث في نفس الوقت ، وبآن واحد .

مُعَالجَة مُتَزَامِنَة **concurrent process**

شكل من أشكال المعالجة المتلازمة ، كمعالجة الحاسب لعدة معلومات في الوقت ذاته .

المراجَعَة المتزامِنَة **concurrent review**

1. راصّ (أسنان) **condenser**

2. مُكثّفة (في البصريات)

1ـ وعاء أو جهاز من أجل تكثيف الغازات أو الأبخرة .

2ـ عدسة المجهر المتوضعة تماماً فوق المنبع الضوئي التي ترصف كل الضوء المتاح في حزمة واحدة .

3ـ جهاز يمكن بواسطته تكديس الشحنات الكهربائية ، ويتألف من سطحي تماس يفصل بينهما بواسطة عازل .

4ـ في طب الأسنان ، أداة تستخدم لحشي مادة الحشوة المرنة في داخل التجويف السني المحضر .

مُكَثِّفَةُ آبه (في المِجْهَر) **Abbe's condenser**

هو مصمم في الأصل على شكل توليفة عدستان مكثفتان تتوضعان تحت رف المجهر .

راصّ المُلْغَم **amalgam condenser**

هو جهاز رص حشوة الملغم في طب الأسنان .

راصّ آلِيّ (أسنان) **automatic condenser**
(=mechanical condenser)

انظر تحت mechanical condenser .

المكثفة ذات الفعل الراجع **back-action condenser**

هي مكثفة مع ساق لها شكل حرف U ، حيث أن القوة المطبقة تكون باتجاه الجراح (المشغل) . يسمى أيضاً المكثفة الاحتياطية (Reverse condenser) .

مُكَثِّفَةٌ قَلْبِيَّةُ الشَّكْل (في المِجْهَر) **cardioid condenser**

هو مكثفة قلبية الشكل ، نمط خاص من المكثفات لإضاءة العينة المفحوصة في الساحة المظلمة للمجهر .

مُكَثِّفَةُ السَّاحَة المُظْلَمة (في المجهر) **darkfield condenser**

هي مكثفة مع مركز توقيف ، والذي يسمح بتوليد مخروط مجوف من الضوء ، والتي تكون ذروته في مستوى العينة .

(تأثير التفجير داخل الماء)

هو أذية بطنية تحدث في شخص ما داخل الماء بواسطة انفجار عنيف تحت الماء .

ارْتجاجٌ رِئَوِيّ **pulmonary concussion**

هي الأذيّة الميكانيكية في الرئتين الناتج عن انفجار ما .

انظر تحت blast chest .

انظر تحت blast injury .

مِرْبات **concussor**

جهاز لتطبيق ضربات خفيفة على البدن .

1. تكثُّف **condensation**

2. تكاثف

3. رَصّ (أسنان)

1ـ فعل الاختلاص أو العملية التي يصبح فيها الشيء أكثر اكتنازاً و انضغاطاً .

2ـ حشو السن بمادة الحشوة في داخل التجوف السني المحضر سابقاً .

3ـ العملية العقلية التي يمثل فيها رمز واحد عدد من المكونات ، والتي تمثل كل العواطف (الانفعالات) المترافقة معها .

4ـ التحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة أو الصلبة ، أي تسييل الغاز .


رَصٌّ يَدَوِي **hand condensation**

هو رص المادة من الحشوة بطريقة يدوية في تطبيقات طب الأسنان .

رَصٌّ ميكانيكي **mechanical condensation**

هو رص المادة من الحشوة بطريقة ميكانيكية ، والتي تقوم بها الآلة في تطبيقات طب الأسنان .

رَصٌّ فَوقَ ـ صَوْتِي **ultrasonic condensation**



Prostatic concretions حصيات بروستاتية

هو وسيلة أو جهاز التكييف والتلاؤم .

مُكيِّفُ الهَواء **air conditioner**

هو جهاز تلطيف الهواء وتبديله .

مُكيِّفٌ للأنْسجَة **tissue conditioner**

هي مواد لَدْنة يدخل في تركيبها البولي إيثيل ميثاكريلات والإيتانول أو السيترات ، والتي تستعمل لتبطين الأسنان أو عزل النسج المتعرضة لحروف البدلات السنية فتقيها التخريش والرضح .

1ـ تكيُّفٌ **conditioning**

2ـ إشْراط

3ـ تكييفٌ

1ـ تعلم من كون أن المنبه لا يكون قادر بشكل أولي على استثارة استجابة معينة ، ولكنه يكتسب القدرة على فعل ذلك بواسطة الاقتران المتكرر مع منبه آخر يمكن أن يحدث تلك الاستجابة . يسمى أيضاً التكيف الكلاسيكي ، والتكيف الباڤلوڤي ، والتكيف الاستجابي .

2ـ في الفيزياء الطبية ، هو تحسن الحالة الفيزيائية مع تطبيق برنامج تدريب . يسمى أيضاً الكيمياء الفيزيائية (Physical chemistry) .

تكْييفُ الهَواء **air conditioning**

جعل الهواء مناسباً لراحة الجهاز التنفسي والجسم من ناحية الحرارة ونقص الملوثات ، وغناه بالأكسجين .

إشراط إكراهي **aversive conditioning**

التعلم من استخدام العقاب أو المنبهات المزعجة الأخرى المترافقة مع المشاعر السلبية وبطها بالاستجابات غير المرغوب فيها ، بحيث ينقص ذلك من تواتر تلك الاستجابات .

إشْراطٌ اجْتنابيّ **avoidance conditioning**

شكل من الإشراط الإستثابي ، حيث يتدرب الكائن الحي على تجنب استجابات أو منبهات معينة ، والتي تترافق مع عقابيل سلبية .

إشْراطٌ رُجْعانيّ **backward conditioning**

يحدث الإشراط الرجعاني عندما يحدث التنبيه مباشرة بعد التنبيه اللا إشراطي ، وتكون

راصٌ الرِّقاقَة **foil condenser**

هو جهاز رص الرقاقات المستخدمة في الحشوات أو التلبيسات السنية .

مكثفة قدمية **foot condenser**

هي مكثفة مع رأس (طرف) زاوي طويل قدمي الشكل .

مكثفة الذهب **gold condensor**

هي مكثفة لحشي مادة الحشوة الذهبية إلى داخل التجويف السني الترميمي المحضر .

راصٌ آليّ (أسنان) **mechanical condenser**

أداة مع نابض فعال بالهواء المضغوط ، أو بآلية كهربائية لحشي المادة الترميمية في التجويف السني المحضر عبر النفخ المتكرر . يسمى أيضاً راص أتوماتيكي (Automatic condenser) .

مُكَثِّفَةٌ قَطْعيَّة **paraboloid condenser**

(في مجهر الساحة المظلمة)

هو نمط خاص من المكثفات لإضاءة العينة في المجهر ذو الساحة المظلمة .

راصٌ هَوائيّ **pneumatic condenser**

نوع من الأجهزة التي تستخدم الضغط الهوائي ، فمثلاً تستخدم في عمليات رص الحشوات أو الرقاقات في طب الأسنان .

المكثفة الاحتياطية **reserve condenser**

انظر تحت back-action condenser .

تابل **condiment**

هي مواد حريفة تحرض الإفراز المعدي ، للعصارات الهاضمة أو ذات رائحة زكية تحرض الشهية للطعام ، وتزيل زنخ الدسم واللحم ، والجمع منها توابل (Condiments) .

1ـ شَرْط **condition**

2ـ حالة

3ـ يكيف

1ـ مُكيَّفٌ **conditioned**

2ـ مُتكيف

صفة تدل على التلائم مع المؤثرات الداخلية أو الخارجية .

مُكيف **conditioner**

هو القيام بالعمل وتنفيذه واقعياً .

مُواصَلة conductance

هي سعة الوصل ، أو القدرة على النقل ، وتقاس وحدة النقل الكهربائي بالسيمنس (وحدة الموصلية في النظام الدولي) .

مُواصَلَةُ المَسالك الهَوائِيَّة airway conductance

هو مقلوبَ مَقاومَةَ المسلك الهوائي يكون بقسمة تدفق الهواء على الفرق في الضغط ما بين الفم و الأسناخ .

مُواصَلَةُ المَدْخول input conductance

هي القدرة الناقلة للتنبيه العصبي بحسب التنبيه الداخلي لليف العصبي .

توصيلِيَّة conductibility

يطلق على نقل موجات الصوت ، والحرارة ، والدفعات العصبية ، أو الكهربية ، وهي الصفة المرتبطة بالقدرة التوصيلية أو ناقلية العصب وقدرته على نقل التنبيه .

تَوصيلِيَّةٌ نابِذَة centrifugal conductibility

هو النَقل المُتجه من المركز نحو المحيط .

تَوصيلِيَّةٌ جابِذَة centripetal conductibility

هو النَقل المُتَجه من المحيط نحو المركز .

مِقياسُ التَوْصيل conductimeter

هو الجهاز القادر على تسجيل وقياس التوصيلية العصبية .

توصيل conduction

انتقال موجات الصوت أو الحرارة أو النبضات العصبية أو الكهربائية .

انظر تحت system .

تَوصيلٌ زائغ aberrant conduction

هو توصيل قلبي عبر طرق شاذة للنقل القلبي ، وخصوصاً عبر النسيج البطيني .

تَوصيلٌ مُعَجَّل accelerated conduction

النقل المتسارع مع مرور الزمن .

تَوصيلٌ هَوائي aerial conduction

انظر تحت air conduction .

تَوصيلٌ هَوائيٌّ طَبْلِيّ aerotympanal conduction

الاستجابة فيه تثبيطية على خلاف الاستجابة الإشراطية الاعتيادية .

إشْراطٌ تَقْليدِيّ classical conditioning

(= إشْراطٌ اسْتِجابِيّ) (=respondent conditioning)

انظر تحت conditioning .

تكْييفٌ بيئيّ environmental conditioning

التلاؤمَ مَع الوسط المحيط .

إشْراطٌ أدَواتِيّ instrumental conditioning

(= إشْراطٌ اسْتِثابِيّ) (=operant conditioning)

هو التَعلم من تواتر الاستجابات الطوعية الخاصة ، والتي تتبدل بتطبيق العقابيل الإيجابية أو السلبية . يسمى أيضاً إشراط إستثابي (operant conditioning) .

إشْراطٌ اسْتِثابِيّ operant conditioning

(= إشْراطٌ أدَواتِيّ) (=instrumental conditioning)

انظر تحت instrumental conditioning .

إشراط بافلوف pavlovian conditioning

انظر تحت conditioning .

إشْراطٌ تَوكيدِيّ reinforcement conditioning

فيه تقترن الاستجابة بمكافأة (أو عقاب) في كل مرة تحدث فيها ، ولذلك يأتي وقت يصبح حدوثها أكثر تكراراً (أو أقل تكراراً) ، ويستخدم ذلك الاقتران السلوكي بالثواب والعقاب في تربية الطفل وغيره . ولتقويم هذه العلل السلوكية ، ويسمى أيضاً الإشراط الاستثابي (Operant conditioning) .

إشْراطٌ اسْتِجابِيّ respondent conditioning

انظر تحت conditioning .

عازِلٌ ذَكَرِيّ condom

هو غمد أو غطاء للقضيب يلبس قبل الجماع ؛ لمنع الحمل ، أوالإصابة بالعدوى .

conduct

1ـ يُوَصِل

2ـ يَتَصَرَّف

3ـ تَصَرُّف

تصبح النهايات العصبية لعصبون في تماس مع أجسام عصبونات متعددة ، والذي ينتج عنه تفريغ واسع الانتشار يتلو مدخول قليل نسبياً .

تَوصيلٌ عَظْميّ **bone conduction**

هو توصيلَ الصوت إلى الأذن الداخلية عبر عظام الجمجمة . يسمى أيضاً التوصيل القحفي ، والتوصيل العظمي الطبلي ، والتوصيل النسجي .

تَوصيلٌ قَلْبيّ **cardiac conduction**

هو النقل العصبي التوصيلي في الجهاز الناقل القلبي انطلاقاً من العقدة الجيبية إلى ألياف بوركيني .

تَوصيلٌ مُخْتَفٍ (مُخْتَفِي) **concealed conduction**

هو نفوذية غير كاملة للدفعات المنتشرة (المتوالدة) عبر جهاز النقل القلبي مثل التخطيط القلبي الكهربائي ، والذي لا يظهر دليل على حدوث النقل ، ولكن سلوك واحدة أو أكثر من النبضات التالية يظهر بعض التأثير إلى حد ما .

توصيل تراجعي مختفي **concealed retrograde conduction**

هو توصيل تراجعي يحصر في العقدة الأذينية البطنية ، بحيث لا تنتج موجة P إضافية ، ولكن تترك العقدة حروف للدفعة الجيبية الطبيعية التالية ، والتي تتظاهر بتطاول الفاصلة PR لتلك الضربة .

صَمَمٌ تَوصيلي **conduction deafness**

هو الصممَ الناجم عن آفة في الجهاز الناقل للذبذبات الصوتية عبر الأذن الظاهرة والمتوسطة حتى العصب السمعي ، ويمكن تشخيص نمط الصمم باختبارات السمع مثل اختبار رين واختبار ويبر والتخطيط السمعي .

تَوصيلٌ قحْفيّ **cranial conduction**

انظر تحت bone conduction .

تَوصيلٌ تَناقُصيّ **decremental conduction**

هو تأخر أو فَشل انتشار الدفعات في العقدة الأذينية البطنية الناتج عن تناقص مترقي في

هو توصيل الصوت إلى الأذن الداخلية عبر الهواء و غشاء الطبل .

تَوصيلٌ هَوائيّ **air conduction**

هو توصيلَ الصوت إلى الأذن الداخلية عبر مجرى السمع الظاهر والأذن الوسطى .

تَوصيلٌ شاذّ **anomalous conduction**

هو توصيل ونقل الدفعة الجيبية عبر طرق التوصيل الإضافية ، ولذا فهي تتجنب التأخير في المرور عبر العقدة الأذينية البطنية الطبيعية .

تَوصيلٌ تَقَدُّمي **anterograde conduction (=forward conduction)**

هو نقل الدفعات القلبية في الاتجاه الطبيعي من العقدة الجيبية إلى البطينين ، ويستخدم بشكل خاص لوصف التوصيل المتقدم عبر العقدة الأذينية البطنية . حيث يظهر المنظر البياني للجملة الناقلة القلبية توصيل تقدمي للدفعات القلبية .

تَوصيلٌ مُعاكسٌ للمَسِيرَة **antidromic conduction**

توصيل الدفعات العصبية باتجاه معاكس للاتجاه ، وهذا الطبيعي كما يحدث في دراسات التوصيل التجريبية . ويمكن أن تحدث بشكل طبيعي في بعض العصبونات للجذور الظهرانية للحبل الشوكي ، وعلى الرغم من أن الدلائل تشير إلى أن هذه الظاهرة يمكن حقيقةً أن تنتج عن النقل اللمساسي على العكس من النقل الراجع .

تَوصيلٌ أُذَينيّ **atrial conduction**

هو القدرةَ التوصيلية والناقلة ضمن الأذينين القلبيين . حتى العقدة الأذينية البطنية .

تَوصيلٌ أُذَينيٌّ بُطَينيّ **atrioventricular conduction**

هو القَدرة التوصيلية والناقلة عبر العقدة الأذينية البطينية وحزمة هيس حتى ألياف بوركيني العضلية القلبية .

تَوصيلٌ انْهياليّ **avalanche conduction**

توصيل الدَفعات العصبية التي تحدث عندما

يتم فيه نقل الدفعات من البطينين إلى الأذينين بشكل نوعي، ويسمى أيضاً توصيل بالطريق الراجع (Reterograde conduction).

التوصيل الحجمي **volume conduction**

مصطلح في تخطيط العضلات الكهربائي، ويدل على فقد فعل الكمون المقاس بسبب انتشار التيار بعيداً عن المصدر عبر الوسيط الناقل كالسائل خارج خلوي.

مُوَصِل **conductive**

هي صفة لكل ما يتعلق بالنقل أو التوصيل.

مُوَصِلِيَّة **conductivity**

هي سعة الجسم على نقل التدفق الكهربائي أو الحراري. وهو النقل لكل وحدة مساحة من سطح الجسم. وعندما يعبر عنها في رسوم توضيحية للموصلية الكهربائية فهي تكون مقلوب المقاومة.

مُوَصِّلِيَّةٌ كَهْرَبِيَّة **electrical conductivity**

هي القدرة على التوصيل الكهربي.

مُوَصِّلِيَّةٌ حَرارِيَّة **heat conductivity**

هي الموصلية التي تتعلق بالحرارة سواء عبر الأجسام الصلبة أو الهواء، وتسمى أيضاً (Thermal conductivity).

مُوَصِّلِيَّةٌ حَرارِيَّة **thermal conductivity**

انظر تحت heat conductivity.

قِياسُ المُوَصلِيَّة **conductometry**

هي عملية قياس الموصلية (الناقلية) بمقياس الموصلية.

مُوَصِل **conductor**

1 ـ هي مادة تمتلك خاصية الموصلية، أي أنها مادة تنقل الكهرباء.

2 ـ موجه متلم (Grooved director) للاستخدامات الجراحية.

مَجْرَى **conduit**

انظر تحت channel.

مَجْرَى لَفائفِيّ **ileal conduit**

هي مفاغَرَة جراحية لنهاية واحدة للحالبين ووصلها إلى قطعة منفصلة من اللفائفي، معدل ارتفاع، ومدى فعل الكمون لكي ينتشر عبر العقدة.

تَوصِيلٌ آجِل **delayed conduction**

هو انتشارٌ متباطىء للدفعات القلبية، والناتج عن فاصل أكبر من 0.2 ثانية بين التقلص (الانقباض) الأذيني والبطيني، وهذا يحدث في الدرجة الأولى من الإحصار القلبي.

تَوصِيلٌ لماسِيّ **ephaptic conduction**

هو توصيل الدفعات العصبية عبر اللماس (نقطة تماس جانبي)، ويعتبرهذا كمقابل للتوصيل المشبكي.

توصيلٌ قُدْمَانِيّ **forward conduction**

هو التوصيل المتجه أو المتقدم نحو الأمام بعكس الرجعاني الذي يتجه نحو المركز.

تَوصِيلٌ عَصَبِيّ **nervous conduction**

لفظ يطلق على عملية التوصيل التي تحدث في الأعصاب بناقلة الوسائط العصبية، ويختلف عن التوصيل الحراري والإشعاعي وغيرهما.

تَوصِيلٌ عَظْمِيٌّ طَبْلِيّ **osteotympanic conduction**

انظرَ تحت bone conduction.

تَوصِيلٌ رُجُوْعِيّ **retrograde conduction**

(تَوْصِيْلٌ بالطَّرِيْقِ الرَّاجِع)

هو نقلَ الدفعاتَ القلبيَة رجوعاً من البطينين باتجاه الأذينين، وخصوصاً التوصيل من العقدة الأذينية البطينية إلى الأذين.

تَوصِيلٌ قَفْزِيّ **saltatory conduction**

هو المرور السريع للكمون من عقدة (رانفييه) إلى عقدة لليف العصبي الماليني، ويتم ذلك عبر كامل طول الغشاء الخلوي.

تَوصِيلٌ مَشْبَكِيّ **synaptic conduction**

هو توصيل الدفعات العصبية عبر المشابك العصبية.

تَوصِيلٌ نَسِيجِيّ **tissue conduction**

انظر تحت bone conduction.

تَوصِيلٌ بُطَينِيٌّ أُذَيْنِي **ventriculoatrial conduction**

يشمل رأس الفك السفلي وعمود الفك السفلي والنقرة الجناحية للفك السفلي، وتسمى أيضاً (Processus condylaris) ، (Mandibular condyle) .

condylarthrosis **(=articulatio ellipsoidea)** — **مَفصِلٌ إهْليلجيّ**

انظر تحت articulatio ellipsoidea .

condyle — **لُقمَة**

هو نتوء (بروز) مستدير على العظم .

انظر تحت condylus .

condyle of humerus (=condylus humeri) — **لُقْمَةُ العَضُد**

انظر تحت condylus humeri .

condyle of mandible (=processus condylaris mandibulae) — **لُقْمَةُ الفَكِّ السُّفْلِيّ (= النَّاتِىءُ اللُّقْمِيُّ للفَكِّ السُّفْلِيّ)**

انظر تحت processus condylaris mandibulae .

condyle of metacarpal bone — **لُقْمَةُ عَظْمِ السِّنْع**

هي التوسعات المفصلية القاصية من الأمشاط، والتي تتمفصل مع النهايات الدانية من سلامية كل أصبع، وتسمى أيضاً رأس عَظْمِ السِّنْع (Caput ossis metacarpalis) .

condyle of scapula (=angulus lateralis scapulae) — **اللُّقْمَةُ الكَتِفيَّة (= زاويةُ الكَتِف الوَحْشيَّة)**

انظر تحت angulus lateralis scapulae .

extensor condyle of humerus (=epicondylus lateralis humeri) — **لُقْمَةُ العَضُد البَاسِطَة (= لُقَيمَةُ العَضُد الوَحْشيَّة)**

انظر تحت epicondylus lateralis humeri .

external condyle of femur (=condylus lateralis femoris) — **لُقْمَةُ الفَخذ الظَّاهِرَة (= لُقْمَةُ الفَخذ الوَحْشيَّة)**

انظر تحت condylus lateralis femoris .

وتستخدم النهاية الأخرى لتشكيل فغرة على جدار البطن .

انظر تحت ureteroileostomy .

conduplicato — **انطِواءٌ مُزدَوج (في الجَنين)**

conduplicato corporis — **انْطواءُ الجِسْمِ المُزْدَوج (في الجَنِين)**

هوَ التطور العفوي في الجنين .

condurangin — **كوندُورانْجين (مستخلص نباتي سام)**

واحد من اثنان من الجليكوزيد من الكوندرانجو، وإذا أعطي بكميات كبيرة فإنه يكون سام، لكن في الكميات الصغيرة فإنه يستخدم كدواء مر في المعالجة المثلية (وهي إعطاء مادة تولد أعراضاً لدى الشخص السوي مماثلة لتلك التي يقصد معالجتها) .

condurango — **كوندُرانجو (نبات)**

1 ـ هو نبات الكوندرانجو مارسدينيا (Marsdenia condurango) .

2 ـ لحاء نبات الكوندرانجو مارسدينيا، والذي يحتوي على مادة الكوندورانجين وهي مادة سامة بطبعها، ولكن قد تم استخدامه كدواء مر في المعالجة المثلية .

condylar — **لُقميّ**

يتعلق باللقيمة .

condylar canal — **قَناةٌ لُقْميَّة**

هي القناة التي تجتاز العظم القذالي خلف اللقيمتين على الجانبين، وتمرر الوريد المشبري في كل جانب، وتسمى أيضاً (Condyloid canal) ، (Canalis condylaris) ، (Posterior condyloid foramen) .

condylar foramen — **ثُقْبَةٌ لُقْميَّة**


هي الثقبة الموجودة أمام لقمتي العظم القذالي في الجانبين . ولذلك تسمى عند البشر (Anterior condylar foramen) .

انظر تحت anterior condylar foramen .

condylar mechanism — **آليَّةٌ لُقْميَّة**

condylar process — **النَّاتِئُ اللُّقْمي**

هوَ البروزَ المفصلي للشعبة الفكية، والذي



لقمة الفخذ الظاهرة
External condyle of femur

external condyle of humerus (=epicondylus lateralis humeri) — لُقْمَةُ العَضُد الظَّاهِرَة (= لُقَيمَةُ العَضُد الوَحْشِيَّة)
انظر تحت epicondylus lateralis humeri .

external condyle of tibia (=condylus lateralis tibiae) — لُقْمَةُ الظُّنْبوب الظَّاهِرَة (= لُقْمَةُ الظُّنْبوب الوَحْشِيَّة)
انظر تحت condylus lateralis tibiae .

fibular condyle of femur (=condylus lateralis femoris) — اللُّقْمَةُ الشَّظَوِيَّة للفَخذ (= لُقْمَةُ الفَخذ الوَحْشِيَّة)
انظر تحت condylus lateralis femoris .

flexor condyle of humerus (=epicondylus medialis humeri) — لُقْمَةُ العَضُد العَاطِفَة (= لُقَيمَةُ العَضُد الإِنْسِيَّة)
انظر تحت epicondylus medialis humeri .

internal condyle of femur (=condylus medialis femoris) — لُقْمَةُ الفَخذ الإِنْسِيَّة
انظر تحت condylus medialis femoris .

internal condyle of humerus (=epicondylus medialis humeri) — لُقْمَةُ العَضُد الإِنْسِيَّة (= لُقَيمَةُ العَضُد الإِنْسِيَّة)
انظر تحت epicondylus medialis humeri .

internal condyle of tibia (=condylus medialis tibiae) — لُقْمَةُ الظُّنْبوب الإِنْسِيَّة
انظر تحت condylus medialis tibiae .

lateral condyle of femur (=condylus lateralis femoris) — لُقْمَةُ الفَخذ الوَحْشِيَّة
انظر تحت condylus lateralis femoris .

lateral condyle of humerus — لُقْمَةُ العَضُد الوَحْشِيَّة
انظر تحت epicondylus lateralis humeri .

lateral condyle of tibia — لُقْمَةُ الظُّنْبوب الوَحْشِيَّة
انظر تحت condylus lateralis tibiae .

medial condyle of femur — لُقْمَةُ الفَخذ الإِنْسِيَّة
انظر تحت condylus medialis femoris .

medial condyle of humerus — لُقْمَةُ العَضُد الإِنْسِيَّة
انظر تحت epicondylus medialis humeri .

medial condyle of tibia — لُقْمَةُ الظُّنْبوب الإِنْسِيَّة
انظر تحت condylus medialis tibiae .

occipital condyle — لُقْمَةُ القَذالي
انظر تحت condylus occipitalis

radial condyle of humerus (=epicondylus lateralis humeri) — اللُّقْمَةُ الكُعْبُرِيَّة للعَضُد (= لُقَيمَةُ العَضُد الوَحْشِيَّة)
انظر تحت epicondylus lateralis humeri .

tibial condyle of femur — اللُّقْمَةُ الظُّنبوبِيَّة للفَخذ

وَرَمٌ لُقْمِي مُسَطَّح **condyloma latum**

ورم لقـمـومي مـسطح ، ورم لقـمـومي زهري منبـسط ، والذي يتوضع في المناطق المذحـية الدافئة و الرطبة ، وخصوصاً في منطقة الشرج والأعضـاء التناسليـة الظاهرة . ومن الممكن أن يصبح متـضـخماً ويتآكل ليكون كتلة رخوة وحمراء مع سطح دامع ، ورطب.

وَرَمٌ لُقْمِي مسَطَّح **flat condyloma (condyloma latum)**

انظر تحت condyloma latum .

وَرَمٌ لُقْمِي مُؤَنَّفٌ عِملاَق **giant condyloma acuminatum**

انظر تحت Buschke-Lowenstein tumor .

وَرَمٌ لُقْمِي مُدَبَّب **pointed condyloma (=condyloma acuminatum)**

هيناميات ثؤلولية في المناطق التناسلية وحول الشـرج ، وعلى الرغم من أن الآفات عـادةً مـا تكون قليلة العدد إلا أنها يمكن أن تتفاقم لتشكل كتل كبيرة قنبيطية الشكل . يسمى أيضاً (Papil-loma acuminatum) ، (Papilloma venereum) ، (Pointed wart) ، (Venereal wart) ، (Verruca acuminate) .

أورامٌ لقميَّة **condylomata**

هي جمع لكلمة (Condyloma) .

انظر تحت condyloma .

شَبِيهٌ بالوَرَم اللُقميّ **condylomatoid**

أي أنه لقـمـومي الشكل ، أو ورم لقـمـومي الشكل .

وُرامٌ لقميّ (كثرَةُ الأوْرَام اللُقميَّة) **condylomatosis**

وجود أورام لقـمومية (آفة جلدية ناتئة عـما حولها) متعددة .

متعلق بالوَرَم اللُقمي **condylomatous**

أي أنه من طبيعة الورم اللقمي .

قَطعُ اللُقمَة **condylotomy**

القطع (الشق) الجـراحي للقـمـة ، أو تقـسـيم اللقمة .

كونديلوكس **Condylox**

(= لُقْمَةُ الفَخذ الإنْسِيَّة) **(=condylus medialis femoris)**

انْظر تحت condylus medialis femoris .

اللُّقْمَةُ الزَّنْدِيَّة للعَضُد **ulnar condyle of humerus**

(= لُقَيمَةُ العَضُد الإنْسِيَّة) **(=epicondylus medialis humeri)**

انظر تحت epicondylus medialis humeri .

اسْتِئْصالُ اللُقمَة **condylectomy**

لقم (ف: لقمة) **condyli (sing.condylus)**

انظر تحت condylus .

لقميّ **condylicus**

يتعلق باللقمة .

اللُقَيمَى **condylion**

(نقطة تشريحية في القياسات البشرية)

هي النقطة الأكثر وحشية من سطح رأس الفك السفلي .

شِبْهُ لقميّ **condyloid**

شـبـه لقـمي أو برجـمي(Knuckle) ، (هو أحد مفاصل الأصابع) .

ناتيءٌ شِبْهُ لُقْمِي **condyloid process**

وَرَمٌ لَقمِي؛ لَقموم **condyloma**

(آفة جلدية ناتئة عما حولها)

1ـ انظر تحت condyloma acuminatum .

2ـ انظر تحت candyloma latum .

وَرَمٌ لُقْمِي مُؤَنَّف **condyloma acuminatum**

هو ورَم حليـمي مع لب مـركـزي من النسـيج الضـام في بنيـة تشـبـه الشـجـرة والتي تـغطي الظهارة ، وعادةً ما تتواجد على الغشاء المخاطي أو على الجلد للأعضـاء التناسليـة الظاهرة ، أو في منطقة مـا حول الشـرج . على الرغم من أن الآفـات عـادةً ما تكون قليلة العـدد إلا أنها يمكن أن تتفاقم لتشكل كتل كبيرة قنبيطية الشكل . يسـمى أيضـاً الثـؤلـول المؤنف (Acuminate) ، أوالثؤلول المنقـول جنسيـاً (Venereal wart) ، أو الحطاطـة الرطـبة أو المخـاطيـة (Moist papule) و الثؤلول المؤنف (Verruca acuminata) .

انظر تحت epicondylus medialis humeri .

لُقْمَةُ الظُّنْبوب الإِنْسيَّة — **condylus medialis tibiae TA**

هي اللقمة الإنسية للعضد ، والتي تمثلها البارزة المفصلية الإنسية على النهاية الدانية للظنبوب . تسمى أيضاً اللقمة الداخلية للظنبوب (Internal condyle of tibia) .

لُقْمَةُ القَذالي — **condylus occipitalis TA**

هي اللقمة القذالية ، وهي واحدة من النواتىء البيضوية على الأجزاء الوحشية للعظم القذالي ، وعلى جهة الثقبة العظمى للتمفصل مع الفهقة .

اللُّقْمَةُ الظُّنْبوبِيَّةُ للفَخذ (= لُقْمَةُ الفَخذ الإِنْسيَّة) — **condylus tibialis femoris (=condylus edialis femoris)**

انظَر تحت condylus medialis femoris .

مَخْروط (ج: مَخاريط) — **cone**

1 ـ شكل أو جسم صلب مع قاعدة دائرية والتي تتناقص وتستدق حتى تصل إلى نقطة .

2 ـ مخروط شبكي .

انظر تحت retinal cone .

3 ـ في الأشعة ، بنية مخروطية أو اسطوانية مفتوحة ترتبط فوق باب مسكن أنبوب الأشعة السينية ، و يستخدم كمساعد في تركيز حزمة الأشعاع على الحقل الهدف ، وكدليل للمسافة بين المصدر ـ الفلم ، ومصممة غالباً لتسديد الإشعاع الأولي و/ أو الأشعاع المبعثر ، و/ أو للاحتفاظ بالأقراص من أجل ترشيح إضافي .

4 ـ في معالجة قناة الجذر السنية ، مادة صلبة ذات شكل مستدق ، غالباً ما تكون مصنوعة من مادة الطبرخي (Gutta - percha) ، أو الفضة والتي تصاغ لتأخذ شكل جذر القناة .

5 ـ حلزون (قوقع) بحري من عائلة الغبيريات .

مَخْروطُ الجِسْمِ الطَّرَفيّ (للنطفة) — **acrosomal cone**

جسم محوري في النطفة بين الحبيبة الطرفية

الاسم التجاري لمستحضرات البودوفيلوكس .

لُقمَة (ج:لُقم) — **condylus (pl.condyli)**

هو نتوء مدور على العظم ، وعادةً للتمفصل مع عظم آخر .

لُقْمَةُ العَضُد — **condylus humeri TA**

هي النهاية القاصية من العضد ، والتي تتضمن الحفر المختلفة بالإضافة إلى البكرة والرؤيس .

لُقْمَةُ الفَخذ الوَحْشيَّة — **condylus lateralis femoris TA**

هما السَطحين الوحشيين في النهاية القاصية من الفخذ ، واللذان يتمفصلان مع السطوح العلوية لرأس الظنبوب ، تسمى أيضاً اللقمة الظاهرة أو الشظوية للفخذ (External condyle of femur) .

لُقْمَةُ العَضُد الوَحْشيَّة (= لُقَيمَةُ العَضُد الوَحْشيَّة) — **condylus laterali humeri (=epicondylus lateralis humeri)**

انظر تحت epicondylus lateralis humeri .

لُقْمَةُ الظُّنْبوب الوَحْشيَّة — **condylus lateralis tibiae TA**

هي اللقمة الوحشية للظنبوب البارزة المفصلية الوحشية على النهاية القاصية للظنبوب . تسمى أيضاً اللقمة الظاهرة للظنبوب (External codyle of tibia) .

لُقْمَةُ الفَخذ الإِنْسيَّة — **condylus medialis femoris TA**

هي اللقمة الأنسية للفخذ ، والتي يمثلها السطح الإنسي من السطحين على النهاية القاصية من الفخذ والمتمفصل مع السطوح العلوية لرأس الظنبوب . تسمى أيضاً اللقمة الداخلية أو الظنبوبية للفخذ (Internal or Tibial condyle of femur) واللقمة الظنبوبية الفخذية (condylus tibialis femoris) .

لُقْمَةُ العَضُد الإِنْسيَّة (= لُقَيمَةُ العَضُد الإِنْسيَّة) — **condylus medialis humeri (=epicondylus medialis humeri)**

منظر شعاعي للرئة في السحار السيليكي .

ectoplacental cone **مَخْروطُ المَشيمَة الظَّاهر**
(عند أجنة القَوَارِضَ)
تسمك الأرومة الغازية في الكيسة الأريمية في القوارض ، والتي تصبح الجزء الجنيني للمشيمة

elastic cone of larynx **مَخْروطُ الحَنْجَرَة المَرِن**
انظر تحت conus elasticus .

ether cone **مَخْروطُ الأثير**
جهاز يركب فوق الوجه من أجل إعطاء الأيثر بواسطة الإشتنشاق .

fertilization cone **مَخْروطُ الإخْصاب**
الانتفاخ (التضم) الهيولى للخلية البيضية (البيضة) عند موضع التماس مع النطفة (الحيوان المنوي) ، والذي يبتلع النطفة بشكل تدريجي ثم تبعد حاملة النطفة للداخل . يسمى أيضاً مخروط التجاذب (Attraction cone) .

fibrous cone **المَخْروطُ اللِّيفيّ**
هي مادة لِيفَية تشبه المروحة في قشرة الدماغ ويمنظر إشعاعي للمحفظة الداخلية ، ويسمى أيضاً الإكْليلُ المُتَشَعِّع (Corona radiate) ، (Radiate crown) .

growth cone **مَخْروطُ النُّمُو**
توسع بصلي في ذروة نمو الحوار العصبي .

gutta - percha cone **المخروط الطبرخي**
مخروط يستخدم في معالجة قناة الجذر السنية ، هو مخروط بلاستيكي ظليل للأشعة ، ويتركب من مادة الطبرخي بالتشارك مع مكونات أخرى ، والمتاح بقياسات عيارية مناسبة لأبعاد حشي مقوار جذر السن . والتي تستخدم لحشي وسد القناة بالاشتراك مع ملاط الختم . يسمى أيضاً النقطة الطبرخية (Gutta-percha point) .

Haller's cones (=lobuli epididymidis) **مَخاريطُ هالَّر (= الفُصَيصاتُ البَرْبَخِيَّة)**
انظر تحت lobuli epididymidis .

implantation cone **مَخْروطُ الانْغراس**
(للبويضة المُلقحة)

والنواة .

adjusting cones **مَخاريطُ الإحْكام**
مخروطانَ مفرغان يستخدمان لقياس المسافة بين محاور الرؤية عندما تكون متوازية .

antipodal cone **المَخْروطُ المُقابِلُ القُطْب**
(في الخلية)
مخروط الأشعة المقابلة لألياف المغزل للنجم المزدوج .

arterial cone (=conusarteriosus) **المَخْروطُ الشِّرْيانيُّ**
انظر تحت conus arteriosus .

attraction cone (=fertilization cone) **مَخْروطُ الجَذْب (= مَخْروطُ الإخْصاب)**
انظَر تحت fertilization cone .

bifurcation cone **مَخْروطُ الانْشعاب**
بنية مخروطية الشكل في مكان تشعب التغصنات .

cerebellar pressure cone **مَخْروطُ الانْضغاط المُخَيخيُّ**
تشوه في الدماغ ، والذي ينتج عن زيادة الضغط داخل القحف ومما يؤدي إلى ضغط اللوزة المخيخية إلى الأسفل لداخل القناة الشوكية .

cone of light **مَخْروطُ الضَّوء**
(في غشاء الطبلة)
هو الانعكاس مثلثي الشكل للضوء المشاهد على غشاء الطبل . يسمى أيضاً مخروط بوليتزر (Politzer's cone) ، والمنعكس الضوئي (Light reflex) .

cone socket instrument **أداةٌ ذاتُ مَخْروط ومَسْكَن**
أحد نماذج أدواتً الأسنان ، والتي تستخدم لتنظيف سطوح الأسنان وتكون مصنوعة عادة من الفولاذ الكربوني ، وهي سريعة التأكسد والتلف ، ولذا يجب الحرص عليها أثناء الاستعمال .

Dunham's cones **مَخاريطُ دَنْهام**

مَخْروطُ الهَيولَى العَضَلَيَّة **sarcoplasmic cone**
هي الكتلة المخروطية للهيولى العضلية في كل نهاية لنواة الألياف العضلية الملساء والقلبية .

مَخْروطٌ قَصير (أسنان) **short cone**
مصطلح يستخدم في مبحث التصوير الشعاعي السيني : وهو المخروط الأنبوبي أو المخروطي والذي من أحد وظائفه إقامة مسافة بين المصعد (الأنود) ـ الجلد لأكثر من (10) إلى (25) سنتي متر .

المخروط الفضي **silver cone**
انظر تحت point .

مَخْروطٌ جراحيّ **surgical cone**
هو نموذجَ من َالأقنعة الواقية للأنف والفم التي يستخدمها الجراحين عند القيام بالأعمال الجراحية .

مَخْروطُ انْضغاط الخَيمَة **tentorial pressure cone**
هي الخيمة المخيخية التي تتعرض للضغط والانفتاق وتهديد الحياة إذا ارتفع الضغط الدماغي بكتلة تحتل حيزاً في الدماغ .

المَخْروطُ النُّخاعيُّ الانْتهائيّ **terminal cone of spinal cord**
انظرَ تحتَ conus medullaris .

مَخْروطُ القراب الغَائر **theca interna cone**
ثخانة مخَروطَية للَخلايا القرابية في الجراب المبيضي بحيث تكون ذروته متجهة نحو سطح المبيض .

مَخاريطُ تَوأَميَّة **twin cones**
هي الخلايا اَلمخروطية للشبكية عندما تختلط خليتين معاً .

مَخروطُ تنْدالْ **Tyndall cone**
(مخروطَ ضوئي في تنظير الغروانيات)
هو مخروط الظلمة للضوء المبعثر ، والذي يشاهد عندما ترى المادة الغروانية على الزوايا اليمنى للحزمة الضوئية العرضية ، و ينتج عن تأثير تندال ، وهي تميز المواد الغروانية عن المواد البلورية .

انظر تحت axon hillock .

مَخْروطٌ طَويل (أسنان) **long cone**
مصطلح يستخدم في علم أشعة الأسنان ، فإنه يصمم مخروط أنبوبي لإقامة مسافة ممتد بين المصعد (الأنود) ـ الجلد ، والتي تقدر بحوالي من 10 إلى 25 سنتي متر أو أكثر .

المَخْروطُ النُّخاعيّ **medullary cone**
انظر تحت conus medullaris .

مَخْروطُ الرُّؤيَة **ocular cone**
(=visual cone)
هو المخروط الضوئي في العين ، والذي تكون قاعدته على القرنية وذروته على الشبكية .
يسمى أيضاً (Visual cone) .

مَخْروطٌ حُلَيمي **papillary cone**
هو تركيب مَن الأدمة الظاهرة ، والذي يكون حساس للضوء في السحالي ، وقد تكون مفقودة في الأفاعي .

مَخْروطُ الانْضغاط **pressure cone**
هي منطقة الانضغاط المطبقة بواسطة كتلة في الدماغ كما هي الحال في الانفتاق الشحمي ، أو الانفتاق خلال الخيمة .

المَخروطُ البَدْئيّ (في الكُلْوَة) **primitive cone**
هو التنظيم الَشبيه بالمخروط للنبيبات الجامعة في الكلية .

مَخْروطُ الشَّبَكيَّة **retinal cone**
هي خلايا بصَرية مسؤولة عن الضوء والرؤية الملونة والرؤية الحادة . وهي التي تكون نهاياتها المشبكية عريضة ومسطحة السويقة . تكون القطع التغضنية خارج النقرة قصيرة نسبياً وذات ثخانة مع ذرى مدورة كليلة . وخلال النقرة تستطيل القطع وتضيق ولتشبه العصيات . يوجد حوالي 6 إلى 7 مليون مخروط ، والذي يتركز حوالي 10٪ منها في النقرة ، والباقي تتوزع بشكل متجانس فوق ما تبقى من الشبكية . تسمى أيضاً المخروط (Cone) ، والخلية المخروطية (Cone cell) ، والمخروط البصري (Visual cone) .

يسمى أيضاً (Fabulation) .

confectio — **أنبَج؛ دَواءٌ مُحلَّى**

هو أي مستحضر دوائي تصنيعي يحضر مع الدواء ويكون ممزوجاً بالعسل أو الشراب الحلو ، ويستعمل أحياناً كسواغ في خليط الدواء ، ويسمى أيضاً (Confectionis) ، (Conserve) ، (Electuary) .

confection — **دَواءٌ مُحلَّى؛ أنبَج**

هو مادة حافظة مشربة بالدواء ، أو نوع من الحلوى ، أو لعوق (مستحضر صيدلاني) .

confection of senna — **أَنْبَجُ السَّنا المَكّي**

هو ملين خفيف يحتوي على بودرة السنامكي مع مكونات أخرى .

Daemocrites' confection — **أَنْبَجُ دِيمُوقْراطس**

نوع من الدواء المحلى بطريقة ديموقراطس .

conference — **1ـ مُؤْتَمَرٌ**
2ـ مُدارَسَة

التقاء مجموعة من الباحثين لتداول موضوع أو عدة مواضيع يتفقون عليها .

clinicopathological conference — **المُدارَسَةُ الإكلينيكية الباثولُوجيَّة**

مؤتمر يعقد لبحث مواضيع إكلينيكية باثولوجية

confertus (=confluent) — **مُتَماد (مُتَمادي)**

متقارب أو متماد .

confidence — **مَوثوقيَّة**

توصف الموثوقية بشكل عام على أنها حالة مؤكدة لا تحتمل الشك سواء كانت فرضية أو عمل يعتبر هو الأجدى والأنفع ، ومنه موثوقية الذات.

confidentiality — **كِتمان؛ سِريَّة**

هو مبدأ في الأخلاقيات الطبية يعتبر أن المعلومات الخاصة بالمريض التي يظهرها لأفراد الرعاية الصحية هي سرية و مقتصرة على من ومتى يمكن كشفها لطرف ثالث ، وعادةً ما يتوجب أن يأخذ مقدم الرعاية الصحية الإذن من المريض لعمل مثل ذلك الكشف .

ureteral cone — **المَخْروطُ الحالبيُّ**

هي الجزء المخروطي العلوي من الحالب ، والذي يمتلىء بالبول في المعدلات العادية من التدفق البولي خلال طور الراحة للحويضة الكلوية ، ويفرغ خلال طور الفعالية .

visual cone — **1ـ مَخْروطُ الرُّؤْيَة**
2ـ مَخروطُ الشَّبَكيَّة

1ـ انظر تحت ocular cone .

2ـ انظر تحت retinal cone .

cone- — **سابقة بمعنى الاشْتِراك**

طليعة مصطلحية تعطيه معنى التشارك .

cone-nose (=Reduviidae) — **الخَطماء (فصيلة مِنَ الحَشَرات)**

انظر تحت cone-nose bug .

Conestron — **كونيسترون**

هو الاسم التجاري لمستحضر الإستروجينات المقترنة .

conexus (pl.conexus) — **وُصيلة (ج: وَصائِل)**

انظر تحت conexus .

conexus intertendineus TA — **الوَصيلَةُ بَيْنَ الأَوْتار**

هي حزم ليفية تمر مائلة بين الأوتار الالتحامية لباسطات الأصابع على ظهر اليد ، وهو مصطلح رسمي بديل للعبارة (Connexus intertendineus) وتسمى أيضاً (Intertendinous connections) ، (Juncturae tendinum) .

conexus interthalamicus — **الوَصيلَةُ المِهادِيَّةُ البَيْنِيَّة**

coney — **مخروطَي**

انظر تحت hyrax .

confabulation — **تخْريف**

الامتلاء غير الواعي لفجوات في الذاكرة بحقائق مصطنعة وخبرات ، والتي تترافق غالباً مع آلية إمراضية عضوية . وهو يختلف عن الكذب ، وحيث أن المريض ليس لديه قصد من الكذب والخداع ، كما يعتقد أن تصديق أحداث هذه الذاكرة المصطنعة هي أحداث حقيقية .

متساويين في الكراهية .

صراعٌ أساسيّ **basic conflict**

اَلصراع حوَل الأمور الجوهرية المختلف عليها .

صراعٌ مَرْكَزِيّ **central conflict**

كل مشكلة يقع فيها الصراع بالمواجهة بين الأطراف الأساسية الداخلة في المشكلة .

تَضارُبُ المَصالح **conflict of interest**

اختلاف مصالح المتصارعين على هدف معين

صراعٌ خارجَ النَّفْس **extrapsychic conflict**

صَراع ما بين أمنيات الأشخاص أو متطلباتهم والتوقعات أو الرغبات عند الآخرين .

الصراع داخل الشخصية **intrapersonal conflict**

هو الصراع النفسي الداخلي .

انظر تحت intrapsychic conflict .

صراعٌ داخلَ النَّفْس **intrapsychic conflict**

هو الصَراع ما بين الأمنيات أو الدفعات أو الحاجات أو الأفكار أو المتطلبات غير المتوافقة وغير الواعية غالباً والموجودة داخل ذهن الفرد .

يسمى أيضاً (Intrapersonal conflict) .

مَقرَن **confluence**

1 ـ مكان الجري معاً ، أو التقاء المجرى أو النهر .

2 ـ في علم الجنين ، تدفق الخلايا ، وهي من مكونات عملية تكون المعيدة (هي المرحلة التالية للأريمة ، عندما ما تصبح بنية على شكل الكوب مجوفة ، ولها ثلاث طبقات من الخلايا) .

مَقْرَنُ الجُيوب **confluence of sinuses**

انظر تحت confluens sinuum .

مَقرَن **confluens**

انظر تحت confluence .

مُقْرَنُ الجُيُوب **confluens sinuum TA**

هو النقطة المتوسعة من مقرن الجيوب السهمية العلوية والمستقيمة والقفوية والجيبين المستعرضين للأم الجافية المنغرز في انخفاض في جهة واحدة من الناشزة القفوية الداخلية .

يسمى أيضاً (Torcular Herophili) .

مُتماد (مُتمادي) **confluent**

تهايُؤ (كيمياء) **configuration**

هو تنظيم الأجزاء ككل ، وفي الكيمياء ، هو التنظيم الفراغي للذرات في الجزيء ، تلك الخاصية التي تميز المركب من مصاوغه الفراغي .

تَهايُؤٌ مَقْرون **cis configuration**

مصطلح يستخدم في الوراثيات ، هو تنظيم لموضعين مورثيين ، خصوصاً الألائل الكاذبة ، والتي تتواجد على الزوج المماثل من الكروموسوم نفسه .

تَهايُؤٌ مَفْروق **trans configuration**

مصطلح يستخدم في الوراثيات ، وهو تنظيم موضعين مورثيين أو أكثر ، خصوصاً الألائل الكاذبة ، والمتواجدة على الزوج المماثل من الكروموسوم نفسه .

ماخِض **confined**

المرأة الحامل في فترة المخاض .

مَخاض **confinement**

عمليات قذف الجنين خلال مراحل الولادة . ويبدأ فجأة بعد انتهاء فترة الحمل في الحالات الطبيعية . ويسمى أيضاً (Parturiency) ، (Lying-in) .

صراع **conflict**

في الطب النفسي ، هو الصراع غير الواعي غالباً الذي ينشأ من تصادم الدفعات غير المتوافقة أو المتضادة ، أو الأمنيات أو الدوافع أو الطلبات الخارجية .

صراعُ المَرْغوبَيْن **approach-approach conflict**

اَلصراع الذي ينتج عن هدفين متاحين يكونان مرغوبين لكن غير متوافقين .

صراعُ المَرْغوب وَالمَكْروه **approach-avoidance conflict**

صراع ينتج عن هدف وحيد له كلا التسلسلات أو النوعيات المرغوبة وغير المرغوبة .

صراعُ المَكْروهَيْن **avoidance-avoidance conflict**

الصراع الذي ينتج عن الرغبة لتجنب بديلين

هذه الأمور . وهي تقنية علاجية تظهر أين يتوجب حدوث التغير ، وتظهر أيضاً موضع الكمون الهدام .

1 ـ تخليط **confusion**

2 ـ التِباس

هو اضطراب التوجه بالنسبة للزمان أو المكان أو الأشخاص ، أحياناً يترافق مع اضطراب الوعي .

تَخْليطٌ صَرْعيّ **epileptic confusion**

هو اضطرابَ التوجه بالنسبة للزمان أو المكان أو الأشخاص ، والذي يترافق مع الصرع .

تَخْليطٌ عَقْلي **mental confusion**

عدم التركيز والفهم وخلط المعاني دون ترابط أو عدم إدراك الزمان والمكان والمقاصد .

تخليطِيّ **confusional**

يتعلق ، أو يتميز ، أو ينتج عن التخليط .

1 ـ تعقُّد **congelation**

2 ـ انجماد

3 ـ عَضَّة الصَّقيع

مُجانِس (من نفس الجنس) **congener**

1 ـ شيء لصيق العلاقة بشيء آخر ، كعضو في نفس الجنس ، أو عضلة تملك نفس الوظيفة كأخرى أو مركب كيمائي لصيق العلاقة بمركب آخر في التركيب أو الفعل الشبيه ، أو تأثيرات مناهضة ، أو شيء يشتق من نفس المصدر أو الوحدة .

2 ـ منتج ثانوي في التخمر الكحولي والذي يساعد في تحديد تركيب المنتج النهائي .

مُجانِس (من نفس الجنس) **congeneric**

مجانس ، يتعلق بالتجانس .

مُجانِس (من نفس الجنس) **congenerous**

يملك فعل أو وظيفة مشتركة ، والذي يشتق من نفس المصدر .

مُسانِجٌ مُشْتَرك **congenic**

(= مُجانِس) **(=coisogeneic)**

شيء يتعلق بذريتين قريبتين من الحيوانات تكون متماثلة وراثياً باستثناء موضع وحيد ، أو يصبح مندمجاً ، ليس منعزلاً أو متفاصلاً .

مُبائِر (متشارك بالبؤرة) **confocal**

يملك نفس البؤرة .

هَيئَة **conformation**

الشكل الخاص لكيان ما . في الكيمياء ، هو التنظيم الفراغي للذرات في الجزيء الذي ينتج عن الدوران حول الروابط الوحيدة ، الخاصية التي تميز مختلف المركبات المشاكلات (المشاكلات المصاوغة) من بعضها البعض .

1 ـ مِشْكال **conformer**

2 ـ مُركَّبٌ مُشاكِل

1 ـ أي زمرة من البنى التي تنتج بواسطة الدورانات حول الروابط الوحيدة في الجزيء .

2 ـ جهاز يغطي سطح كرة العين المزروعة ، ويستخدم بشكل تال للاستئصال التام للمحافظة على الشكل اَلملتحمي القبوي بشكل أولي قبل البديل التجميلي المناسب .

مِشْكالٌ رَقَبيّ **neck conformer**

(في حروَق الرقبة)

مفند **confounder**

هو متغير ثالث يمكنه أن يحرف العلاقة الإحصائية بين متغيرين تحت أو المراقبة ، أو الملاحظة .

تفنيد **confounding**

هو التداخل بواسطة متغير ثالث ليحرف الترافق المدروس ما بين متغيرين اثنين آخرين ، وبسبب العلاقة القوية لكليهما مع المتغيرات الأخرى ، فإن العلاقة بين عاملين سببيين مثل تلك التي يتشارك فيها الأفراد لا يمكن فصلها عن بعضها .

سَحْق **confrication**

سحق الدواء إلى مكوناته الأصلية ليصبح في شكل مسحوق .

مُجابَهَة (طب نفسي) **confrontation**

هو فعل المواجهة ، أو التدابير المعدة لمجابهة المواقف الخاصة بشخص ما و مواطن الضعف فيه ، وهو السبيل المدرك والعقابيل التالية المؤثرة في السلوك ، أو في تسببه لتدابير أخرى لمواجهة

1761 . ولذلك كانوا يعالجونها بوضع كمادات باردة على الجبين .

احْتقانٌ وَظيفيّ **functional congestion**

هي زيادة التَوعي الدموي ، وتدفق الدم إلى العضو خلال تأدية وظيفته .

احْتقانٌ رُكوديّ **hypostatic congestion**

احتقان الجزء الأسفل من عضو ما بسبب فعل الجاذبية الأرضية ، ذلك عندما يضعف الدوران الدموي بشكل كبير .

احْتقانٌ شَلَلِيٌّ عَصَبيّ **neuroparalytic congestion**

الاحتَقان الذي ينتج عن شلل العصب المحرك الوعائي لتلك المنطقة المحتقنة .

احْتقانٌ تَوَتُّرِيٌّ عَصَبيّ **neurotonic congestion**

هو الاحتقان الناتج عادةً عن تهييج الأعصاب الموسعة للأوعية .

احْتقانٌ لافاعل **passive congestion**

هو احتقان جزء ناتج عن انسداد المخارج أمام الدم من هذا الجزء . يسمى أيضاً الاحتقان الوريدي (Venous congestion) .

احْتقانٌ فيزْيولُوجيّ **physiologic congestion**

انظر تحت functional congestion .

احْتقانٌ رئَويّ **pulmonary congestion**

تحفل الأوعية الرئوية مع رشح (ارتشاح) السوائل إلى داخل الأسناخ الرئوية و الفراغات الخلالية (وذمة رئوية) . تحدث في المرض القلبي والعداوى والأذيات المعينة .

احْتقانُ الكُلْيَة **renal congestion**

هو فرط توعي وركود دوراني ووذمة في الكلية ، والذي وقد يحدث فيها الخبن نتيجة انسداد السبل البولية .

احْتقانٌ وَريديّ **venous congestion**

انظر تحت passive congstion .

congestive **احتِقانيّ**

يتعلق أو يتميز أو ينتج عن الاحتقان .

خُراجٌ احْتقانيّ **congestive abscess**

هو الخراج الذي يتكون نتيجة ركود الدم في بعض المواضع النوعية ، حيث أن اختلافاتها الوراثية يعبر عنها في نفس الخلفية الوراثية . وتُنتج الذرية المسانجة بواسطة تزاوج غير الأقارب ، ثم تطرح الخلفية الموريثة بواسطة العديد من الأجيال من التزاوجات التبادلية في الوقت الذي يحتفظ بالاختلافات الوراثية المطلوبة بإنتقاء النسل . يسمى أيضاً (Coisogenic) .

congenital **خِلقِيّ**

يشير إلى صفة أو مرض يتواجد عند أو عادةً قبل الولادة ، وبشكل خاص ، يشير إلى الحالات التي تتواجد عند الولادة ، بصرف النظر عن المسببات .

congenitus **خِلقِيّ**

موجود منذ بدء تكون الخلقة في المرحلة الجنينية .

congested **مُحتَقِن**

محمل بالدم بشكل زائد ، فرط حمل مع الدم ، كما يشاهد في حالة الاحتقان .

congestin **كونجستين**

(مادة رافعة للضغط تشتق من الشقائق البحرية)

مادة سامة تشتق من لوامس شقائق النعمان البحرية ، إذ أنه عندما يحقن في الكلاب يسبب احتقان شديد في الأوعية الطحالية والنزف . يسمى في الأصل كونجيستين (Actinocongestin) .

congestion **احتِقان**

تراكم زائد أو شاذ للسوائل ، وكذلك للدم في بعض الأجزاء .

احْتقانٌ فاعل **active congestion**

هو تراكم الدم في جزء من الجسم على حساب توسع التجويف على إمداد الأوعية الدموية بالدم .

احْتقانُ الدِّمَاغ **cerebral congestion**

هو توسع وتكاثر الأوعية في الدماغ ، أو حدوث ركود دموي ووذمة . وقد ذكر كسبب للسكتات الدماغية من قبل مورغاني عام

تَلاَزُبُ عُنُق الرَّحم **conglutination of cervix**

مُلزِبَة **conglutinin**

هو بروتين مصلي بقري اللاجلوبولين المناعي ، والذي يكدس المعقدات المناعية مع فعالية مستلزمة (C3b معطل) ، وذلك في وجود كايتونات ثنائية التكافؤ . قد تم استخدامها كنظام مشعر ، وكبديل لتثبيت المتممة ، وفي الاختبارات المصلية ، وفي تحديد المعقدات المناعية . ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن لا تلتبس مع الراصات المناعية . تسمى أيضاً (Bovine clloid) .

ملزبة أو راصة مناعية **immune conglutinin**

انظر تحت immunoconglutinin .

مُستَلزِب **conglutinogen**

هي قدرة معقدات مناعية معينة للتفاعل مع الراصة الناتج عن تثبيت عناصر المتممة (C3) ، والتعطيل التالي لل (C3b) بواسطة العامل I (سمي سابقاً العامل المنشط للمستلزمة) .

أليف لحمرة الكونجو **congphilic**

يتلون بحمرة الكونجو .

مُلتقى **congress**

اجتماع الخبراء أو المسؤولين لتداول أمورهامة .

جماع **sexual congress**

اَلجماع بين رجل وامرأة بشكل حقيقي ، وذلك بإيلاج الذكر في المهبل حتى القذف وبلوغ الرعشة أو ذروة الجماع . ويسمى أيضاً (Coitus) ، (Congressus) .

جماع **congressus**

انظر تحت sexual congress .

مُنسَجِم **congruent**

متناغم ومتفق بين الطرفين .

مُطابِقٌ **congruous**

متماثل تماماً .

مَخاريط (ف: مَخروط) **coni (sing.conus)**

انظر تحت conus .

تحَصي المَرارَة **coniasis**

تشكل حصيات في المرارة .

المنطقة المحتقنة ، وكثيراً ما يخفي ورماً في المنطقة تحته .

فَشَلُ القَلْب الاحْتقاني **congestive heart failure**

فَشَلَ القلب الناجم عن تجمع الدم بداخله ، والذي يؤدي إلى تمدد العضلة القلبية ، وما يتبع ذلك من فشلها .

جالون **congius (=gallon)**

وتكتب باختصار في شكل C أو cong .

كرَويُّ الشَّكل **conglobate**

يشكل كتلة أو لزنة مدورة . والذي يقال عن غدد معينة أو عن تشكل العد (Acne) .

تكوُّر (أخذ شكل الكرة) **conglobation**

هو فعل تشكل ، أو الحالة التي تكون فيها المادة متشكلة على شكل كتلة مدورة .

مُكوَّم **conglomerate**

متراكب على بعض بعضاً .

كونجلوتين (بروتين نباتي) **conglutin**

هو بروتين يستخرج من اللوز أو من حبوب النباتات البقلية المتنوعة .

مُلزِب **conglutinant**

يحث على الالتحام كما هي الحال في حواف الجرح .

تلازُب (تراكم والتصاق النسج) **conglutinatio**

انظر تحت conglutination

تَلازُبُ الفُوهَة الظَّاهِرَة (لعُنُق الرَّحم) **conglutinatio orificii externi**

هو تلاَزبَ الفوهَة الظَاهرة لعنق الرحم ، وهي حالة في الولادة لا ترتخي فيها الألياف الدائرية حول فوهة عنق الرحم ، وعدم توسع العنق .

تلازُب (تراكم والتصاق النسج) **conglutination**

1ـ تراص بواسطة الراصة ، أو الراصة المناعية للجراثيم ، أو الكريات الحمر في وجود الأضداد النوعية أو مكونات المتممة .

2ـ التصاق شاذ .

انظر تحت adhesion .

هو انتاج الغبيرات التاليكية المتمفصلة - (Thallic arthric conidiogenesis) ، وفيها تتشكل الغبيرات من الجدار الداخلي للخلايا المنتجة للغبيرات فقط .

انتاج الغبيرات معوي التنسج **enteroblastic conidiogenesis**

ويستخدم فيها الجزء الداخلي من الجدار الخلوي فقط في تشكيل الغبيرة .

انتاج الغبيرات شمولي التنسج **holoblastic conidiogenesis**

تتشكل فيها الغبيرات من كلا جداري الخلية المنتجة للغبيرات ، ويسمى أيضاً انتاج الغبيرات التاليكية المتمفصلة .

انتاج الغبيرات التاليكي الشمولي **holothallic conidiogenesis**

يحدث فيه أن جزء واحد من الخلايا المنتجة للغبيرات لا يتمفصل ليشكل الغبيرة .

انتاج الغبيرات التاليكي ـ المتمفصل **thallic-arthric conidiogenesis**

هو انتاج الغبيرات التاليكي ، حيث يتم فيها تشكل العديد من الغبيرات بواسطة الانفصال عند الحاجز ، يتم فيها تمييز نمطين اثنين هما : انتاج الغبيرات معوي التمفصل وشمولي التمفصل .

انتاج الغبيرات التاليكي **thallic conidiogenesis**

يحدث فيها أن كامل الخلية الأبوية تصبح غبيرة مع تشكل الحاجز بدون تضخم أو نمو جديد ، يتم فيها تمييز نمطين وهما : انتاج الغبيرات التاليكي الشمولي والتاليكي المتمفصل .

منتج للغبيرات **conidiogenous**

الورم الغبيري **conidioma**

هي بنية متخصصة متعددة الخوطي الفطرية حاملة أو المنتجة للغبيرات .

حاملُ الغُبَيْرات **conidiophore**

فرع الأفطورة من الفطر الذي يحمل الغبيرات .

حامل الغبيرات المحدد **determinate conidiophore**

مَخْروطِيّ **conic**

انظر تحت conical .

مَخْروطِيّ **conical**

غبيرات **conidia**

غُبَيْرات (ف:غُبَيْرَة) **conidia (sing.conidium)**

عائلة بطنيات الأرجل من رتبة بطنيات الأرجل الجديدة ، والتي تعيش في مياه المحيط الدافئة . بعض أفرادها من جنس القونس (جنس من الرخويات) وذات عضات سامة .

غُبَيْرِيّ **conidial**

1 ـ يتعلق بطبيعة الغبيرات .

2 ـ حامل الغبيرات .

المُسْتَغْبِرَة (جِنْسٌ مِنَ الفطريّات) **Conidiobolus**

جنس من الفطريات من عائلة الحاشوريات (فصيلة فطريات من رتبة الحاشوراوات) ، والتي تملك القليل من الحواجز في الأفطورة ، وتنتج القليل من الأبواغ اللاقحية ، والعديد من الأبواغ المتدثرة ، وعدد كبير من الغبيرات التي تُقذف من تلك الأبواغ الغبيرية .

المُسْتَغْبِرَةُ المُكَلَّلَة **Conidiobolus coronatus**

هي عَادةً فطور رمامة ، لكن أحياناً تسبب داء الحاشوريات في الإنسان والخيل .

المُسْتَغْبِرَةُ المُتَنافِرَة **Conidiobolus incongruus**

تلك التي تم عزلها من بعض حالات داء الحاشوريات البشرية .

انتاج الغبيرات **conidiogenesis**

هو تطور الغبيرات ، والنمطان الأساسيان لذلك هما انتاج الغبيرات البرعمي (Blastic) والتاليكي (Thallic) .

انتاج الغبيرات التنسجي **blastic conidigenesis**

حيث أن الخوط الفطرية المخصبة أو الخلايا المنتجة للغبيرات تتضخم أو تقذف خارجها لتشكل الغبيرات قبل تحديدها بواسطة الحواجز . هناك نمطان اثنان لابد من التمييز بينهما هما : انتاج الغبيرات شمولي التنسج والداخلي التنسج .

انتاج الغبيرات معوي التمفصل **enteroarthric conidiogenesis**

هو حامل الغبيرات الذي لا يستمر نموه بعد بدء تشكل الغبيرات .

indeterminate conidiophore — **حامل الغبيرات غير المحدد**

هو حامل الغبيرات الذي يستمر بالنمو الطولي كلما استمر بالتبوغ .

macronematous conidiophore — **حامل الغبيرات كبروي الخيط**

هو حامل الغبيرات المختلف مورفولوجياً عن الخوط الفطرية الخاصة به بشكل ملحوظ .

micronematous conidiophore — **حامل الغبيرات صغروي الخيط**

هو حامل الغبيرات مورفولوجياً شكلياً مشابهة للخوط الفطرية الخاصة به .

Conidiosporales — **الطَوقيَّات**

هي فطور المبيضات البيضاء التي تكثر بعد استعمال المضادات الحيوية أو لدى الأشخاص المصابين بالسكري ، وتسبب لدى النساء التهاب المهبل ذات المفرزات حليبية الشكل . تسمى أيضاً (Moniliales) .

conidiospore — **بَوغ غُبَيريّ**

انظر تحت condium .

conidium (pl.conidia) — **غُبَيرة (ج: غُبَيرات)**
(بوغ لاجنسي في الفطريات)

هو بوغ لا جنسي في الفطريات ساقط (يسقط عند النضج) ، والذي يتشكل بواسطة التبرعم أو الانفصال عن قمة حامل الغبيرات . تسمى أيضاً البوغ الغبيري (conidiospore) والبوغ الخارجي (Exospore) .

coniine — **كونيين (مادة سامة)**

هو قلواني سام يتواجد في الشوكران الأبقع (Conium maculatum) ، ويسبب تهيجاً معدياً معوياً و شللاً ، مع فشل تنفسي في العديد من الأنواع الحيوانية ، ويشمل الانسان أيضاً .

coniocortex — **القِشرَةُ الغُبَيريَّة**
(=Koniocortex)

هي مناطق من القشرة الدماغية التي تتميز بنضج الطبقة الحبيبية العميقة منها ، وتسمى أيضاً (Koniocortex) .

coniofibrosis — **سُحارٌ تليُّفيّ**

هو تغبر الرئة بمواد معدنية أو كلسية أو سيليكية ، والتي تثير وتسبب تليف النسيج الرئوي بعد مرحلة من التغبر غير قابلة للعكوس .

coniology — **عِلمُ الغُبار**

هو الدراسة العلمية للغبار ومؤثراته وتأثيراته على حياة النبات والحيوان .

coniolymphstasis — **سُحارٌ ركوديّ لِمفِي**

هو شكل من تغبر الرئة الناتج عن الغبار ، والذي يعمل على احصار الأوعية اللمفاوية .

coniometer — **مِقياسُ الغُبار**
(=konometer)

انظر تحت konimeter .

coniophage — **بَلعَمُ الغُبار**

هو البلعم الذي يبتلع جزيئات الغبار .

coniosis — **سُحار**

هو حالة مرضية ناتجة عن استنشاق الغبار ، مثل السحار القطني أو تغبر الرئة .

Coniosporium — **المتغابرة (جِنسٌ من الفطريَات)**

انظر تحت cryptostroma .

Coniosporium corticale — **المُتَغابِرَةُ القِشْرِيَّة**

coniosporosis — **داءُ المُتغابرات**

هو داء لحاء القيقب (Male bark disease) .

coniotomy — **بَضْعُ المَخروط المَرن للحَنْجَرَة**
(=cricothyrotomy) — **(= بَضْعُ الغُضْروف الحَلَقِي الدَّرَقيّ)**

انظر تحت cricothyrotomy .

coniotoxicosis — **سُحارٌ غُباريّ**

هو شكل من تغبر الرئة ، وفيه تؤثر المهيجات على النسج مباشرة .

Conium — **الشَّوكرانُ الكبير**
(جِنسٌ مِنَ النَّبات من الفصيلة الخيمية)

جنس من النباتات من عائلة الخيميات .

Conium maculatum — **الشَّوكَرانُ الأَبْقَع**

المُتَقارِنُ المائل **conjugata diagonalis**

هو قَطر مَـدخل الحـوض ، وهي المسـافـة من السطح الخلفي للعانة إلى قمة الطنف العجزي . يسـمى أيضـاً القطر المتـقـارن المائل (Diagonal conjugate diameter) .

المتقارن الحوضي الظاهر **conjugata externa pelvis**

هو المسافة من الانخفاض تحت الشوكة القطنية الأخيرة إلى الحافة العلوية للعانة . يسمى أيضاً القطر المتـقـارن الظاهر (External conjugate diameter) وقـطـر أو خـط بـوديـلـوك (Baudelocque's diameter or line) .

المُتَقارِنُ الحَقيقيُّ **conjugata vera**

انظر تحت conjugata anatomica .

المُتَقارِنُ التَّوليديُّ الحَقيقيُّ **conjugata vera obstetrica**

انظر تحت obstetric conjugate diameter .

مُتقارن (من أقطار الحوض) **conjugate**

1 ـ المسافة بين نقطتين متقابلتين نوعيتين على محيط المدخل الحوضي . يسمى أيضاً القطر المتقارن و المتقارن الحوضي .

2 ـ انظر تحت conjugate anatomica .

3 ـ منتج بالاقتران الكيميائي .

المُتَقارِنُ التَّشْريحيُّ **anatomic conjugate**

انظر تحت conjugate anatomica .

المُتَقارِنُ المائل **diagonal conjugate**

انظر تحت diagonal conjugate diameter .

المُتَقارِنُ الظَّاهر **external conjugate**

انظر تحت conjugate externa pelvis .

المُتَقارِنُ الغائر **internal conjugate**

هو المتقارن الحوضي التشريحي .

انظر تحت conjugate anatomica pelvis .

المُتَقارِنُ التَّوليديُّ **obstetric conjugate**

هو القطر التوليدي المتقارن .

انظر تحت obstetric conjugate diameter .

المتقارن الحوضي **pelvic conjugate**

انظر تحت conjugate .

الشوكران السام .

انظر تحت hemlock .

اسْتِئْصالٌ مَخْروطِيّ **conization**

اسـتـئـصـال (نزع) مـخـروط من النسـيج ، كالاستئصال الجزئي لعنق الرحم .

اسْتِئْصالٌ مَخْروطيٌّ بُروديّ **cold conization**

هو استئصال مخروط من النسيج ، مثل الذي يجرى بواسطة مشرط بارد ، والذي يقابله المخثر الكهربي .

استئصال مخروطي ليزري **laser conization**

استئصال مخروط من النسيج ، والذي يجرى بواسطة حزمة من الليزر .

اتصاليّ **conjoint**

صفـة لكل ما يصف الاتصال أو الالتحام بين شيئين .

زواجيّ **conjugal**

يتعلق بالزواج ، أو يتعلق بالزوج و الزوجة .

حُقوقُ الزَّوجيّة **conjugal rights**

مُقترن **conjugant**

يشـيـر إلى كل زوج من الكائنات الحـيـة أو الأعراس خلال عملية الإقتران ، وبعد الانفصال يُعـرف كل واحـد عندها بسـابق الإقـتـران (Exconjugant) .

مُتقارن (من أقطار الحوض) **conjugata TA**

1 ـ انظر تحت conjugate .

2 ـ انظر تحت conjugate anatomica pelvis .

المُتَقارِنُ التَّشْريحيُّ **conjugata anatomica**

هوالقطر الأمـامي الخلفي لمدخل الحـوض (الفتحة العلوية للحوض) ، وتقاس من الحافة العلوية للإرتفـاق العـاني إلى الزاوية الفـقـرية العجزية . يسمى أيضاً المتقارن الحوضي الحقيقي (Cnjugata vera pelvis) ، والقـطـر الأمـامي الخلفي (Anteroposterior diameter) ، أو المتقارن للحـوض ، والقطر التـشـريحي الـداخلي ، أو المتـقـارن التشـريحي ، والمتـقـارن التـشـريحي الداخلي أو الحـقـيقي (Anatomical, Internal or True conjugate diameter) .

من القرنية ، ويسمى أيضاً (Tunica conjunctiva bulbi) .

مُلْتَحمَةُ القَرْنيَّة **corneal conjunctiva**

طبقة القرنية الظهارية اللاوعائية المخططة .

مُلْتَحمَةُ العيَن **ocular conjunctiva**

مُلْتَحَمَةُ الجَفْن **palpebral conjunctiva**

الغشَاء المخاطي الملتحمي الذي يبطن الجفنين من الداخل المتماس مع كرة العين .

مُلْتَحمَةُ الصُّلْبَة **scleral conjunctiva**

الغشَاء الملتحمي الوعائي الذي يغطي صلبة العين من الجهة الأمامية ولا يمتد فوق القرنية .

مُلتحمِيّ **conjunctival**

يتعلق بالملتحمة .

رأب الملتحِمة **conjunctiviplasty**


انظر تحت conjnuctivoplasty .

التِهابُ الملتحِمة **conjunctivitis**

هو عادةً يتألف من تبيغ ملتحمي مترافق مع النجيج .

التِهابُ المُلْتَحمَة السَّفْعيُّ **actinic conjunctivitis**

هو التهاب الملتحمة ، والذي ينتج عن الأشعة فوق البنفسجية (السعفي) ، كما هو الحال في ضوء كليج ، أو المصابيح العلاجية أو مشاعل الأسيتيلين .



Conjunctiva الملتحمة

التِهابُ المُلْتَحمَة المُعْدي الحادُّ **acute contagious conjunctivitis**

هو التهاب ملتحمة قيحي مخاطي وبائي تسببه المستدميات المصرية (Haemophilus

المُتَقارنُ الحَقيقيُّ **true conjugate**

انظر تحت conjugate anatomica .

اقتِران **conjugation**

1 ـ فعل الاقتران معاً أو الحالة التي يكون فيها مقترناً .

2 ـ العملية الجنسية المشاهدة في الجراثيم ، أو الأوالي المهدبة ، وبعض الفطور ، والتي يتم فيها تبادل المادة النووية خلال الالتحام المؤقت للخليتين (المقترنين) في الوراثيات الجرثومية ، هو شكل من التوالد الجنسي حيث تقدم الجرثومة المعطية (الذكر) بعض أو كل الدنا الخاص به (في شكل رتل استنساخي) إلى المتلقي للمستقبل (الأنثى) ، والتي بعدها تضمن المعلومات الوراثية (الجينية) المختلفة في كروموسوماتها الخاصة بواسطة التأشب وتمرير الرتل المأشب إلى نسله بالتنسخ وفي الأوالي المهدبة ، يتبادل النمطين المتزاوجين المنفصلين المادة النووية الدقيقة وبعدها ينفصلا ، وتصبح كل منهما خلية مخصبة . في بعض الفطريات ، تتضمن العملية التحام الأعراس ، وينتج عنه اتحاد مادتهما النووية وتشكيل اللاقحة .

3 ـ في الكيمياء ، الارتباط ما بين مركبين لانتاج مركب آخر ، مثل تلك التوليفة من المنتج السام مع بعض المادة في الجسم لتشكيل منتج مزيل للسمية ، والذي يمكن طرحها بعد ذلك ، أو الربط بين الأضداد وحيدة النسيلة النوعية للورم والأدوية السامة للخلايا في المعالجة المناعية .

اقْترانُ العَيْنَين **conjugation of the eyes**

المُلتَحِمَة **conjunctiva**

هي الغشاء الرقيق الذي يبطن الأجفان (الملتحمة الجفنية) ، والذي يغطي السطح المعرض للصلبة (الملتحمة البصلية أو العينية) . يسمى أيضاً الملتحمة الغلالية (Tunica conjunctiva) .

مُلْتَحمَةُ المُقْلَة **bulbar conjunctiva**

هو غشاء الملتحمة الذي يغطي كرة العين من الناحية الأمامية ، وهي الصلبة والطبقة الظهارية

هو التهاب الملتحمة الأرجي من النمط العاجل ، والناتج عن المستأرجات المنقولة بالهواء كغبار الطلع ، والغبار ، وشعر الحيوانات .

atropine conjunctivitis **اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ الأَتْروبِينيُّ**

هو التهاب الملتحمة الجريبي بسبب الاستخدام المستمر للأتروبين .

blennorrheal conjunctivitis **اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ السَّيَلانِيُّ**

انظر تحت gonorrheal conjunctivitis .

calcareous conjunctivitis **اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ**

(=conjunctivitis putrificans) **(= اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ التَّفَسُّخِيُّ)**

انظر تحت conjunctivitis putrificans .

catarrhal conjunctivitis **اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ النَّزْلِيُّ**

هو التهاب الملتحمة المعدي مع تبيغ خفيف فقط و مفرزات مخاطية . يمكن أن يكون تالياً لالتهاب الملتحمة النزلي ، أو كنتيجة لإجهاد العين أو الغبار أو إبهار العين بالضوء أو الأهداب الناشبة .

catarrhal conjunctivitis, acute **التهاب الملتحمة النزلي الحاد**

هو التهاب الملتحمة العدوائي الحاد ، والذي يترافق مع البرد أو النزلة ، ويتميز بتبيغ ووذمة وفقدان الشفوفية مع مفرزات مخاطية أو مخاطية قيحية . يسمى أيضاً التهاب الملتحمة المخاطي القيحي (Mucopurulent conjunctivitis) ، والتهاب الملتحمة البسيط (Simple conjunctivitis) ، والتهاب الملتحمة البسيط الحاد (Simple acute conjunctivitis) .

catarrhal conjunctivitis, chronic **التهاب الملتحمة النزلي المزمن**

هو التهاب الملتحمة المزمن الخفيف مع تبيغ خفيف فقط ومفرزات مخاطية . يمكن أن يكون تالياً لالتهاب الملتحمة النزلي الحاد ، أو كنتيجة aegyptius) ، والذي يحدث في الربيع مع نفس الأعراض كما هي الحال في التهاب الملتحمة النزلي . يسمى أيضاً بالرمد الساري (Pinkeye).

acute follicular conjunctivitis **اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ الجُرَيبيُّ الحادُّ**

هو شكل يتميز بارتشاح كثيف موضعي بالنسيج اللمفاوي ، والذي يحدث كاستجابة للتهيج .

acute hemorrhagic conjunctivitis **اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ النَّزْفِيُّ الحادُّ**

هو مَرض شديد العدوى ، قد وجد ترافقه مع بعض الأوبئة كعامل سببي مع الفيروسات المعوية ، ويتميز بالنزف تحت الملتحمة ، والذي يتراوح ما بين الحبرة الدقيقة إلى النزف المتمادي وبالتورم المفاجىء للأجفان ، والاحتقان ، والاحمرار ، والألم في العين .

allergic conjunctivitis **اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ الأَرَجِيُّ**

انظر تحت hay fever .

anaphylactic conjunctivitis **اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ التَّأَقِيُّ**

التهاب ملتحمة تحسسي شديد .

انظر تحت hay fever .

angular conjunctivitis **اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ الزَّاوِيُّ**

هو التهاب الملتحمة ، والذي يتميز بالاحمرار في موق العين(Canthi) ، وعادة ينتج من الإصابة بعصيات موراكس أكسنفيلد (Morax - Axenfeld conjunctivitis) ، أو المكورات العنقودية المذهبة . يسمى أيضاً التهاب الملتحمة بالعصيات المزدوجة (Diplobacillarey conjunctivitis) والتهاب الملتحمة لموراكس أكسنفيلد (Morax-Axenfeld conjunctivitis) .

arc-flash conjunctivitis **اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ الوَمْضِيُّ**

انظر تحت actinic conjunctivitis .

atopic conjunctivitis **اَلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ التَّأَتُّبِيُّ**

انظـــر تحـــت pseudomembranous conjunctivitis .

الْتهابُ الْمُلْتحمةَ الخُنَاقيّ — **diphtheritic conjunctivitis**

هو التَهـاب الملتحمـة الغشـائي الـذي يحدث كعدوى بدئية ناتجة عن لخناق السبل أو كإصابة ثانوية لخناق السبل التنفسية .

الْتهابُ الْمُلْتَحمَةَ النَّاجمُ عَن العُصَيَّات المُزْدَوَجَة — **diplobacillary conjunctivitis**

انظر تحت angular conjunctivitis .

الْتهابُ الْمُلْتحمَةُ الإكْـزِيمي — **eczematous conjunctivitis**

انظَر تحتَ phyctenular conjunctivitis .

الْتهابُ الْمُلْتحمَةَ المصْريّ (= التَراخوما ؛الحَثَر) — **Egyptian conjunctivitis (=trachoma)**

انظر تحت trachoma .

الْتهابُ الْمُلْتحمة الوبَائيّ — **epidemic conjunctivitis**

انظر تحت acute contagious conjunctivitis .

الْتهابُ الْمُلْتحمَة الجُرَيبيّ — **follicular conjunctivitis**

هو شكل يتـميـز بارتشـاح كـثـيف مـوضـعي بالنسيج اللمفاوي ، والذي يحدث كاستجابة للتهيج .

الْتهابُ الْمُلْتحمَة الوهْجيّ — **glare conjunctivitis**

التهـاب الملتـحمـة الضـوئي المبـهـر ؛ أي بسبب تعرض الملتحمة للضوء الشديد المفاجئ .

الْتهابُ الْمُلْتَحمَة النَّاجمُ عَن المُكَوَّرات البُنَّيَّة — **gonococcal conjunctivitis**

هو شكل وخيم من التهاب الملتحمة الناتج عن العدوى بالمكورات البنية ، يتميز بتورم شـديد للملتـحـمـة والأجـفـان ، وبإفـرازات قـيـحـيـة غزيرة . تكون العدوى ثنائية الجـانب في المواليد الجدد الذين يكتسبون العدوى عن طريق المرور خلال المهبل المصـاب بتلك العدوى . وهو عادةً أحـادي الجـانب فـي البـالغـين الذين يكتـسبـون لإجـهـاد العين ، أو تغـبـرها ، أو لإبهـار العين ، أو بسبب الأهداب الناشبة .

الْتهابُ الْمُلْتَحمَة الكيمْيائيّ — **chemical conjunctivitis**

هو التـهـاب الملتـحـمـة الناتج عن التـعـرض للمهيجات الكيمائية .

الْتهابُ الْمُلْتَحمَة النَّدْبيّ — **cicatricial conjunctivitis**

هو الَتهاب الملتحمة الذي يترك آثاراً نـدبية على الغشاء المخاطي للملتحمة .

الْتهابُ الْمُلْتَحمَة النَّخْريّ — **conjunctivitis arida**

هَو التـهـابَ المَلتـحـمَة والقـرنية الجـاف الذي يحدث غالباً بعوز القيتامين A .

الْتهابُ الْمُلْتحمَة الدَّوائيّ — **conjunctivitis medicamentosa**

هو التَهاب الملتحمة الناتج عن المعالجة الدوائية .

الْتهابُ الْمُلْتَحمَة العَدْوائيّ النَّخْريّ — **conjunctivitis necroticans infectiosus**

هو التهـاب الملتحـمة القيحي النخري وحيد الجـانب ، والـذي يتـميـز ببقع بيـضـاء صـغـيـرة منتشـرة مرتفعة في الملتحمة الجفنية و القبو مع تورم في نفس الجـانب للعقـد اللمـفاوية أمـام صيـوان الأذن ، والنكفة ، وتحت الفك العلوي . يسـمى أيضـاً التـهـاب الملتـحـمـة لبـاشـوف (Pascheff's conjunctivitis) .

الْتهابُ الْمُلْتَحمَة العَقد — **conjunctivitis nodosa**

اَنظر تحت ophthalmia nodosa .

الْتهابُ الْمُلْتَحمَة التَّفَسُّخيّ — **conjunctivitis petrificans**

نوع منَ التهاب الملتحمة المتميز بتشكل ترسبات من الحـصـيـات الطبـاشـيـرية في الملتـحـمـة ، والمتـرافق مع النخـر . يسـمى أيضـاً التـهـاب الملتحمة الكلسي (Calcareous conjuctivitis) ، والمحصي (Lithiasis conjunctivitis) ، واليوراتي (Uratic conjuctivitis) .

الْتهابُ الْمُلْتَحمَة الخانوقي — **croupous conjunctivitis**

التهاب الملتحمة بسبب جرثومي قابل للعدوى والانتقال السرائي .

التهاب الملتحمة لكوتش ـ ويكس **Koch-Weeks conjunctivitis**

انظر تحت acute contagious conjnctivitis .

اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةَ باليَرَقَات **larval conjunctivitis**

التهاب الملتحمة المحصي **lithiasis conjunctivitis**

انظر تحت conjunctivitis petrificans .

اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةَ الَمِيبومي **meibomian conjunctivitis**

هو التَهاب الملتحمية العيني ، والذي يرافق التهاب غدد ميبوميوس مع تورم الصفيحات الظفرية ، مع وجود إفرازات دهنية مزبدة .

اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةَ الَغشائيُّ **membranous conjunctivitis**

هو التهاب الملتحمة الوخيم ، ويتميز بوجود غشاء على السطح الداخلي للأجفان ، يتشكل بواسطة النضحة الليفية الغزيرة من الردبة وعند محاولة إزالتها تترك سطح نزفي خام . تسببها العديد من الجراثيم وتتضمن الوتديات الخناقية والمكورات العقدية والبنية والرئوية .

اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةَ النَّاجِمُ عَن الْمُكَوَّرَاتَ السَّحَائِيَّة **meningococcus conjunctivitis**

هو التهاب الملتَحمة الّذي يحدث كمضاعفة لالتهاب السحايا الدماغي النخاعي الوبائي .

اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةَ اَلْمُلَيسائيُّ **molluscum conjunctivitis**

هو التهَاب الملتحمة الذي يحدث كمضاعفة للمليساء السارية (آفة جلدية) .

اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةَ النَّاجِمُ عَن العُصَيَّاتَ الْمُزْدَوَجَة لُموراكس اكسَنفيلد **Morax-Axenfeld's conjunctivitis**

(= اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةُ النَّاجِمُ عن العُصَيَّات الْمُزْدَوَجَة) **(=diplobacillary conjunctivitis)**

العدوى بالتلقيح الذاتي إلى العين من أماكن مصابة بالمكورات البنية مثل التهاب الإحليل البني لديهم أو لدى غيرهم . يسمى أيضاً التهاب الملتحمة السيلاني (Blennorrheal conjunctivivtis) ، والبني السيلاني (Gonoblennorrhea conjunctivitis) ، والرمد العيني البني والرمد العيني الوليدي .

اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةَ النَّاجِمُ عَن الْمُكَوَّرات البُنِّيَّة **gonorrheal conjunctivitis**

التهاب ملتحمي قيحي والعامل المسبب له النيسريات البنية ويحدث في سياق التلوث لدى المصاب بالسيلان البني .

اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةَ الحُبَيبيّ (= التَراخوما ؛ الحَثَر) **granular conjunctivitis (=trachoma)**

انظر تحت trachoma .

اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةَ الضُخَاميُّ **hypertrophic conjunctivitis**

التهاب ملتحمي يحدث فيه تضخم الملتحمة ، ومنه شكل حاد وآخر مزمن .

اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةَ اَلاشْتماليُّ **inclusion conjunctivitis**

هو التَهاب الملتحمة المتسبب عن كائنات حية (المتدثرة الحثرية) لزمرة الداء الببغائي ـ الورم الحبيبي اللمفي المنقول جنسياً ـ الحثري . يؤثر بشكل بدئي على المواليد الجدد مبتدئاً في شكل التهاب الملتحمة القيحي الحاد ، والذي يصل لحد تضخم حليمي للملتحمة الجفنية . يسمى أيضاً التهاب الملتحمة السيلاني الاشتمالي (Inclusion blnnorrhea conjunctivitis) ، والتهاب الملتحمة المسبحي (Swimming pool conjunctivitis) .

التهاب الملتحمة الرضيعي **infantile purulent conjunctivitis**

انظر تحت ophthalmia neonatorum .

اَلْتهابُ الْمُلْتَحِمَةَ العَدْوائيُّ **infectious conjunctivitis**

التهاب في الملتحمة يشبه التهاب الملتحمة الغشائي باستثناء أن الغشاء يمكن إزالته دون رضح الظهارة ، وبالإضافة إلى كونه يمكن أن ينتج عن العدوى الجرثومية إلا أنه يمكن أن يتسبب عن عوامل سمية أو أرجية ، أو العدوى بالفيروسات المختلفة . يسمى أيضاً التهاب الملتحمة الخانوقي (Croupous conjunetivitis) .

purulent conjunctivitis **اَلْتهابُ المُلْتَحمَة اَلقَيحيّ**

هو التهاب الملتحمة الحاد ، والذي يتسبب عن الجراثيم أو الفيروسات ، وخصوصاً المكورات البنية والسحائية ولرئوية والعقدية ، ويتميز بالتهاب شديد في الملتحمة وإفرازات غزيرة قيحية .

scrofular conjunctivitis (=phlyctenular conjunctivitis) **اَلْتهابُ المُلْتَحمَة اَلسُّلِّيّ (= اَلْتهابُ المُلْتَحمَة النُّفاطِيّ)**

انظر تحت phlyctenular conjunctivitis .

shipyard conjunctivitis (=epidemic keratoconjunctivitis) **اَلْتهابُ مُلْتَحمَة عُمَّال أحْواضَ السُّفُن (= اَلْتهابُ المُلْتَحمَة والقَرْنِيَّة الوَبائيّ)**

انظر تحت vernal conjunctivitis .

simple conjunctivitis **التهاب الملتحمة البسيط**

انظر تحت acute catarrhal conjunctivitis .

spring conjunctivitis **اَلْتهابُ المُلْتَحمَة الرَّبيعيّ**

اَنظر تحت vernal conjunctivitis .

squirrel-plague conjunctivitis **اَلْتهابُ المُلْتَحمَة بَطَاعون السَّناجِب**

هو اَلْتهابُ المُلْتَحمَة النَّاجِمُ عن التُّولاريمِيَّات (Conjunctivitis tularensis) ، (Tularemic conjunctivitis) ، والعامل المسبب له الفرانسيسيلة التولارية ، وينتقل إلى الإنسان بطريق الجرذان والقوارض الأخرى ، ويتصف بالكدمات والقرحات النخرية وضخامة العقد اللمفية الناحية .

انظر تحت angular conjunctivitis .

mucopurulent conjunctivitis **التهاب الملتحمة المخاطي القيحي**

انظر تحت acute catarrhal conjunctivitis .

neonatal conjunctivitis **التهاب الملتحمة الوليدي**

انظر تحت ophthalmia neonatorum .

nodular conjunctivitis **اَلْتهابُ المُلْتَحمَة اَلعُقَيديّ**

هو التهاب الملتحمة بعد العمليات الجراحية عادة ، وعامله السببي هو المتفطرات ، ويكون بشكل خراجات صغيرة .

Parinaud's conjunctivitis **اَلْتهابُ المُلْتَحمَة بَحسب بارينو**

(يرافق أمراضاً معدية أخري)

انظر تحت parinaud's oculoglandular syndrome .

Pascheff's conjunctivitis (=conjunctivitis necroticans infectiosa) **اَلْتهابُ المُلْتَحمَة بَحسب باشوف (= اَلْتهابُ المُلْتَحمَة العَدْوَائيّ النَّخَرِيّ)**

انظر تحت mecrotic infectious conjunctivitis .

phlyctenular conjunctivitis **اَلْتهابُ المُلْتَحمَة اَلنُّفاطيّ**

هو التهاب يتميز بظهور حويصلات صغيرة أو قرحات ، تحاط كل منها بمنطقة محمرة . يسمى أيضاً التهاب الملتحمة الأكزيمي (Eczematous conjunctivitis) والتهاب الملتحمة السلي (Sacrfular conjunctivitis) .

انظر تحت phlycten .

prairie conjunctivitis **اَلْتهابُ المُلْتَحمَة اَلبَراريّ**

هو التهاب الملتحمة المزمن ، والذي يتصف بوجود بقع التهابية صغيرة بيضاء في ملتحمة الجفن السفلي .

pseudomembranous conjunctivitis **اَلْتهابُ المُلْتَحمَة اَلغشائيّ الكاذِب**

conjunctivodacryo-cystostomy مُفاغرة مُلتحميَّة مَدْمَعيَّة

هي المفـاغـرة الجراحيـة مـا بين الكيس الـدمعي مباشرة مع الكيس الملتحمي .

conjunctivoma وَرَمٌ مُلتحِميّ

هو ورم على حساب الأجفان يتركب من نسيج ملتحمي .

conjunctivoplasty رَأبُ المُلتحمَة

هو ترميم الخلل أو العيب في الملتحمة بواسطة الجراحة التجميلية .

conjunctivorhinostomy مُفاغرَة مُلتحميَّة أنفيَّة

هو التصحيح الجراحي لإنسداد القناة الدمعية التام ، وذلك بإجراء مفاغرة دمعية أنفية بخياطة السدائل الخلفية وتسليخ اللحيمة مع المحافظة على الملتحمة .

Conn's syndrome متلازمة كون

[متلازمة منسوبة للطبيب جيروم كون (Jerome W.Conn) ، وهو اختصاصي الطب الباطني ، ولد عام 1907] ، وهي فرط الألدستيرونية الأولى .

انظر تحت primary aldosteronism .

connatal مُوَلِديّ

يحدث أثناء الولادة . ويسمى أيضاً (Conate) .

connate مُوَلِديّ

يحدث أثناء الولادة . ويسمى (Conatal) .

connection وَصل

1 ـ فعل الوصل أو الحالة التي يكون فيها متصلاً .

2 ـ أي شيء يصل (وصيلة) .

clamp connection وَصْلٌ مِلْقاطيّ

هو فرعٌ أنبوبي قصير يصل خلية الخوط الفطري بأخرى ، والتي تتشكل بالاندماج خلال الانقسام الخلوي في بعض الفطور الدعامية ، وتعمل في نقل النواتين المتأخيتين للخلية الأبوية إلى الخلية الجديدة المتشكلة .

intertendinous connections الوصلات بين الأوتار

swimming pool conjunctivitis اِلْتِهابُ المُلْتَحِمَة المَسْبَحِيّ

انظر تحت inclusion conjunctivitis .

trachomatous conjunctivitis اِلْتِهابُ المُلْتَحِمَة الحَثَرِيّ ؛ اِلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ التَراخومي

انظر تحت trachoma .

tularemic conjunctivitis اِلْتِهابُ المُلْتَحِمَة النّاجِمُ عن التُولاريميّات

(=conjunctivitis tularensis)

انظر تحت oculoglandular tularemia .

uratic conjunctivitis اِلْتِهابُ المُلْتَحِمَة اليوراتيّ

انظر تحت conjunctivitis petrificans .

vaccinial conjunctivitis التهاب الملتحمة الوقسي

هو التهاب الملتحمة التالي للقاح .

vernal conjunctivitis اِلْتِهابُ المُلْتَحِمَة الرَّبيعيّ

هو التهاب المَلتحِمَة ثنائي الجانب فصلي الحدوث ، ولأسباب مجهولة يصيب الأطفال خصوصاً الذكور . وفيه تتطور الحطاطات المسطحة والنضحة الهلامية الكثيفة على الملتحمة ، وخاصة على السطح الداخلي للجفن العلوي مع حكة رهاب الضوء . تكون الحالة عادةً محددة ذاتياً ، لكن يمكن أن تصبح شديدة إذا تطور توعي للقرنية والقرحات . يسمى أيضاً النزلة الربيعية(Vernal catarrh) والرمد الربيعي (Spring ophthalmia) .

viral conjunctivitis اِلْتِهابُ المُلْتَحِمَة الفَيْروسيّ

هو حدوث تبدلات التهابية في الغشاء الملتحمي العيني بسبب الإصابة بفيروس ما .

welders' conjunctivitis اِلْتِهابُ مُلْتَحِمَة عُمّال اللَّحّام

انظر تحت actinic conjunctivitis .

Widmark's conjunctivitis اِلْتِهابُ المُلْتَحِمَة الفيدْماركيّ

هو احتقان الملتحمة الرصغية السفلى مع أحياناً ترقط خفيف للقرنية .

انظر تحت major connector .

غرزة كونيل **Connell's suture**

[غـرزة منسـوبة لـلجـراح فـرانك جـريجـوري كـونيل (Frank Gregory connell) ، جـراح أمريكي ، 1875-1968] . وتستخدم في مفاغرة الأمعاء .

انظر تحت suture .

كونيكسون **connexon**

هي الوحدة الوظيفية للموصل الفجوي ، وهي منظومة سداسية الشكل لبروتينات الغشاء التي تشغل منطقة محيط التجويف المركزي ، والتي ترتبط مع أجزائها التابعة لها في الخلية المجاورة لتـشكل المسـامـات داخل الخلوية للمـوصل الفجوي .

وُصيلة (بنية تشريحية رابطة) **connexus**

الوُصـيـلَةُ بَيْنَ الوَتَرِيَّة **connexus intertendineus TA**

هي أشرطة ضيقة تمتد بشكل مائل بين الأوتار المنغرزة للعضلات باسطة الأصابع لظهر اليد . تسـمى أيضـاً المواصل الوترية (Juncturae tendinum) والوصـلات الوترية (Tendinous junctions) .

الوصيلة المهادية البينية **connexus interthalamicus**

انظر تحت adhesion inter thalamica .

مخروطي **cono-**

سابقة تشير إلى العلاقة بالمخروط ، أو إلى بنية شبيهة بالمخروط .

شِبْهُ المخروط **conoid**

1 ـ يشبه أو له شكل المخروط .

2 ـ منطقة مجوفة كثيفة الإلكترونات تحاط بحلقات قطبية و تتألف من نبيبات دقيقة ملتفة حلزونية تشكل جزءاً من معقد القمي للأوالي معقدة القمة(Apicocomplexan) .

شِبْهُ مَخْرُوط شتُورْم **Sturm's conoid**

(سير الضوء في اللابؤرية)

هي الأشكال المتغيرة لصور انتشار النقطة في

انظر تحت connexus intertendinei .

الوَصْلُ المهاديُّ المُخَطَّطِيُّ **thalamostriate connection**

هناك أكثر من رابط ينشأ عن النواة المركزية الإنسية ، والنوى الحزمية المجاورة ، والنوى الصفيحية الداخلية ، ويربط بين هذه المراكز والجهاز المهادي المخططي .

ضامّ **connective**

صفة الشيء الرابط أو الذي يحقق الاتصال والربط بين الأشياء ومنه النسيج الضام .

نَسِيجٌ ضامّ **connective tissue**

هو النسيج الذي يملأ الفراغات النسيجية بين الأعضاء لتأمين حمايتها من الرضوح المباشرة وتأمين ترويتها . وهو نسيج شبكي داعم لنسج الأحياء الأخرى ويتكون من نسيج ليفي ومادة أساسية وخلايا متعددة ومتنوعة ، ويسمى أيضاً (Tela conjunctiva) ، (Interstitial tissue) .

وُصيلة (ج:وُصائل) **connector**

1 ـ أي شيء يقدم صلة للوصل أو الربط ما بين غرضين أو وحدتين منفصلتين .

2 ـ جزء البدلة السنية المثبتة جزئياً ، والتي تربط المثبات والجاسرة (السن الجسرية) . يمكن أن تكون صلبة أو غير صلبة .

وُصيلَةٌ كَبيرَة **major connector**

هي وحدة صلبة من البدلة السنية المتحركة جزئياً ، والتي تعمل كهيكل يربط البدلة في جهة واحدة من القوس السنية مع تلك الموجودة في الجهة الثانية ، وكذلك مع كل المكونات الأخرى التي ترتبط معها . تسمى أيضاً وصيلة السرج (Saddle connector) .

وُصيلَةٌ صَغيرَة **minor connector**

هو الرابطة التي تصل ما بين الوصيلة الكبيرة أو أساس البدلة السنية الجزئية مع الوحدات الأخرى من البدلة السنية مثل المشبكات والمثبتات غير المباشرة والسندات الإطباقية .

تسمى أيضاً سلك الوصيلة (Connector bor) .

وُصيلَةٌ سَرْجِيَّة **saddle connector**

Conradi)، وهو طبيب ألماني في القرن العشرين] .

انظر تحت chondrodysplasia punctata .

Conradi's line **خط كونرادي**

[خط منسوب للطبيب أندريه كريستان كونرادي (Andreas Christian Conradi)، وهو طبيب نرويجي 1809-1869] .

انظر تحت line .

Conray **كونراي**

هو الاسم التجاري لمستحضر ميجلومين الأيوثالامات (Iothalamate meglumine) .

consanguineous **ذو قرْبَى**

مرتبط بصلة دم، أو صاحب قرابة .

consanguinity **قرْبَى**

مرتبط بصلة دم، أو صاحب قرابة .

conscience **1. حيُّ الضَّمير**

2. الضَّميرُ

مصطلح غير تقني يدل على المكونات الأخلاقية للعقل، ويكاد يقترب من المفهوم الاعتيادي للأنا العليا في التحليل النفسي، رغم أن الأنا العليا تختلف عن مفهوم الضمير في كونها تتعلق باللاوعي أو اللاشعور .

conscious **واعٍ (واعي)**

1 ـ إدراك الشخص لنفسه ولأفعاله ولمحيطه .

2 ـ حالة من التنبه أو الإدراك تتميز بالاستجابة للمنبهات الخارجية .

3 ـ الجزء من العقل الذي يظل على الدوام في نطاق الإدراك، وهو أحد أنظمة نموذج فرويد للعقل الطبوجرافي .

انظر تحت preconscious .

انظر تحت unconscious .

consciousness **وَعْي**

1 ـ حالة كون المرء واعياً ومتنبهاً ومدركاً ومتكيفاً ومتجاوباً مع محيطه؛ ومتمتعاً بأحاسيس مرهفة وسليمة .

2 ـ الوعي الذاتي بنواحي معالجة المعرفة ومحتويات العقل .

الأشكال المختلفة من اللابؤرية . يمكن أن تكون الصورة قطعاً ناقصاً، أو دائرة، أو خطاً حاداً .

conomyoidin **كونوميُودين**

(مادة في المخاريط الشبكية في العين)

هي المادة الجبلية داخل مخاريط الشبكية التي تتمدد وتتقلص تحت تأثير الضوء، وتكون مسببةً دورية (زيحان) المخاريط .

conophthalmus **تمَخْرُط العَين**

(=staphyloma corneae) **(= عِنَبَة قرَنِيَّة)**

انظر تحت staphyloma corneae .

Conopodina **كونوبودينا**

هي رتبة من الأوالي الأميبية (رتبة الأميباوات، تحت صنف الأميبات العارية)، والتي تتميز بوجود الأشكال الإصبعية أو الحلمية، وعادة تكون كليلة وتكون تحت الأقدام الكاذبة غير المتفرعة بشكل طبيعي، تنتج غالباً من الفص الهياليني العريض . نظيرة الأميبة هي ممثل لهذا الجنس .

Conorhinus **مَخْروطِيَّةُ الأنْف (جِنسٌ مِنَ الحَشَرات)**

هي جنس من الحشرات، والذي سمي شكلياً من عائلة الرضوفيات (فصيلة من الحشرات نصفيات الجناح)، حالياً تأخذ مكانها في جنس المسترغلة (Panstrongylus)، والفسفس (جنس البق) .

conquinine **كينيدين (دواء)**

(=quinidine)

انظر تحت quinidine .

Conradi-Hunermann syndrome **متلازمة كونرادي-هنرمان**

[متلازمة منسوبة للطبيب إيراخ كونرادي (Erich Conradi)، والطبيب كارل هنرمان (Carl Hunermann)، وهما طبيبان ألمان في القرن العشرين] .

انظر تحت syndrome .

Conradi's disease **داء كونرادي**

(syndrome) **(متلازمة كونرادي)**

[داء منسوب للطبيب إيريك كونرادي (Erich

مُتتابِعٌ **consecutive**

مصطلح بمعنى متتال أو متلاحق .

اتفاقِي **consensual**

مصطلح متعلق بالإثارة الناتجة عن تنبيه المنعكسات ، ويستخدم خاصة في وصف الاستجابة المتشابهة لكل من بؤبؤي (حدقة) العينين عند تنبيه أحدهما فقط .

مُوافقة **consent**

1 ـ القبول أو إعطاء الإذن .

2 ـ الإقرار بالقبول أو بإعطاء الإذن

مُوافَقَةٌ مُستَنيرَة **informed consent**

هو إذن طوعي يعطيه الشخص أو ولي أمره للمشاركة في دراسة أو بحث أو لتلقي الرعاية الطبية بعد أن يتلقى كافة المعلومات المتعلقة بالهدف والوسائل والآليات والفوائد والمخاطر .

مُحافظة **conservation**

مفهوم الحفاظ على الصحة ، أو استعادة الوظيفة ، أو ترميم الأعضاء بوسائل غير جذرية .

تحفُّظِيّ **conservative**

مخصص للحفاظ على الصحة أو استعادة

3 ـ المجموع الحالي للخبرات التي يدركها شخص ما أو مجموعة ما في أي وقت من الأوقات .

4 ـ في التحليل النفسي بمعنى الضمير .

وَعيٌ جَماعيّ **collective consciousness**

المعتقدات المشتركة التي توحد المجتمع .

مدرك للقولون **colon consciousness**

الحالة التي يشعر فيها المريض بالقولون وبنشاطه ، وغالباً ما يكون نتيجة اضطراب في منعكس التغوط ، مما يقتضي وجود إمساك مزمن .

مُزْدَوجُ الوَعْي **double consciousness**

مصطلح لوصف فرد ذي شخصية متعددة الأوجه .

مُزْدَوجُ الوَعْي **dual consciousness**


مصطلح لوصف فرد ذي شخصية متعددة الثقافات .

وَعيٌ إدْراكيّ **noetic consciousness**

مصطلح في الفلسفة يتعلق بالفكر البديهي .

تهدِيءٌ واعٍ **conscious-sedation**

تهدئة المريض مع بقائه واعياً .



Connective tissue as a part of body tissues النسيج الضام كجزء من أنسجة الجسم

دامِل consolidant

1ـ يساعد على الشفاء أو التحام الأجزاء .

2ـ عامل يساعد على الشفاء أو التحام الأجزاء .

1ـ استِحْصاف consolidation

2ـ دَمْجٌ

3ـ اندِمالٌ

4ـ تصلُّد

1ـ التقسية ؛ وهي عملية التحول إلى حالة صلبة ، كما في تصلب الرئة بفعل امتلاء فجواتها الهوائية نتيجة الالتهاب الرئوي .

2ـ استحصاف : عملية ثبات المعلومات في الذهن .

مُمازِج consolute

أي أنه تام الاختلاط .

خَرْخَرة رَنّانة consonation

اتحاد consortium

ارتباط بين شخصيات ، أو جهات ، أو شركات ، أو حكومات للمشاركة في نشاط مشترك ، أو لتوحيد جهودها للتوصل إلى هدف مشترك .

مُتعايِشات consorts

مُناوِع conspecific

1ـ يدل على أو يشير إلى نفس النوع .

2ـ ينتمي إلى نفس النوع .

ذَرورٌ جِلْدِيّ conspersus

مادة أو دواء يستخدم بشكل ذرور على سطح الجلد .

ثبات constancy

1ـ حالة بقاء الشيء مستقراً .

الثبات الخلوي cell constancy

مثال بالغ التطرف عن تطور متنوع الأشكال لأحد الأنواع ، والذي ينتج عنه أفراد يتصفون جميعاً بامتلاكهم نفس عدد الخلايا في الأنسجة المتقابلة التي تؤدي نفس الوظيفة .

ثبات العينة object constancy

القدرة على اعتبار الشيء غير قابل للتغير حتى عند اختلاف ظروف الدراسة .

الوظيفة أو ترميم البنى بوسائل غير جذرية كالجراحة المحافظة .

انظر تحت radical .

حُفْرَةٌ سِنِّيَّةٌ تَحَفُّظِيَّة conservative cavity

حفرة سنية تصمم بحيث تستهلك أقل مقدار ممكن من نسيج السن .

طِبُّ الأَسْنانِ التَّحَفُّظِيّ conservative dentistry

هو قسم من طب الأسنان يتناول الحفاظ على صحة الأسنان واستعادة وظيفتها وترميمها بوسائل تركز على عدم التفريط بمقدار كبير من نسيج السن ، وغالباً دون الحاجة إلى معالجات جذرية مثل علاج أقنية الجذور .

مُعالَجَةٌ تَحَفُّظِيَّة conservative treatment

من أشكال المعالجات غير الجذرية التي يعتمد عليها الطب التحفظي في المحافظة على الصحة ، أو استعادة وظيفة الأعضاء ، أو ترميمها .

1ـ يحْفَظ conserve (= confection)

2 ـ أنْبَج (ج: أنابِجات)

1ـ معجون أو لعوق أو مستحضر صيدلاني بشكل الحلوى .

2ـ إجراءات المحافظة على مادة أو نسيج ما .

يَعْتَبِر (يفكر جديا في) consider

يدرس كافة الجوانب المتعلقة بمسألة ما .

اعتِبارات considerations

كافة المعطيات التي ينبغي تناولها بالدراسة والتفكير فيما يتعلق بمسألة معينة .

كِتاباتٌ طِبيَّة تراثيَّة consilia

مصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية التي تعني النصيحة ، ويدل على كتابات طبية تراثية تتضمن نصائح تتعلق بأمراض معينة .

اتساق consistency

هو الترابط المنطقي بين الأجزاء ؛ أو هو الارتباط بين الأحداث المتعاقبة والنتائج .

اتساق التقديرات consistency of an estimator

خاصية الاقتراب من قيم سكانية معينة عند تزايد قيمة العينة إلى اللانهاية .

ثابِتَةُ التَّلاشي **decay constant**

اَلجزء من عدد ذرات النوكليدات المشعة الذي يتـلاشى في وحـدة الزمن ، تسـمى أيضـاً ثابتـة التـفكك (Disintegration constant) ، أو ثابتـة النشاط الإشعاعي (Radioactive constant) .

ثابِتَةُ مُخَلِّل الكَهْرَباء **dielectric constant**

هَو مقياسَ لقدرة وحدة حجم معين من المادة على تـخزين الطـاقة الكهـربائية السـاكنة عند تطبيق فـولطية بمقدار وحدة معينة ؛ أي أنه قدرة تلك المادة على مقـاومة تكون حقل كـهـربائي ضـمنهـا . وهي النسـبـة بين مـواسـعـة المكثف الكهربائي ، والتي تشتمل على المادة وبين نفس المكثف الكربائي عند احتوائها على الفـراغ فقط كمخلل للكهرباء . رمزها k .

ثابِتَةُ الانْتشار **diffusion constant**

ثابَتَةُ التَّلاَشي **disintegration constant**

اَنظر تحت decay constant .

ثابِتَةُ التَّفارُق **dissociation constant**

هَي ثابتة توازن تتعلق بالتركـيزات ، وتعبر عن تفـارق الجزيء أو الذرة إلى مكوناتها . رمـزها Kd ، وتسـمى أيضـاً ثابتـة التـأين (Ionization constant) .

انظر تحت acidic dissociation constant .

انظر تحت base dissociation constant .

ثابِتَةُ التَّوازُن **equilibrium constant**

هَي ثابتـة ، رمـزها K أو Keq ، والتي تـصف كميات المتفاعلات ونواتج التفاعل الكيميائي في حـالة التـوازن ، وفي درجـة حـرارة ثابتـة ؛ ترتبط تقنياً بالأنشطة الحركية الحرارية ، وتقدر عادة باستعمال التركيزات (ويرمز إليها أحياناً برمـز Kc) ، وتعـرف بأنهـا مـعـادلة لمعـادلة التـفـاعل . ويمكن تقديرها في الغـازات بقيـم الضغط الجزئية بدل التركيزات (وعندها يرمز إليها بالرمز Kp) .

انظر تحت dissociation constant .

ثابِتَةُ فارادي (كهرباء) **Faraday's constant**

انظر تحت faraday .

2 ـ انظر تحت permanence .

1. ثابت **constant**

2. ثابتة (ج: ثوابت)

1 ـ لا يتخرب ، يبقى دون تغيير .

2 ـ معلومة أو قيمة أو حقيقة أو مبدأ غير قابل للتغيير .

ثابِتَةٌ مُطْلَقَة **absolute constant**

قَيمة ثابتة لا تتبدل مع تبدل باقي المعطيات .

ثابتة الامتصاص **absorption constant**

ثابِتَـةُ آمْبـار **Ambard's constant**

هَي قيمة ثابتة تعتمد في دراسة وظائف الكلية .

ثابتة التفارق الحمضي **acid dissociation constant**

ثابتـة الانفـصـال التي تعـبـر عن تأين الحـمض . رمـزها Ka لحـمض مـا ، رمـزة HA ، فـتكون المعادلة $ka=\frac{[H^+]\ [A^-]}{[HA]}$.

ثابِتَةُ تَرابُطِيَّة **association constant**

هو مقـياس لمدى الارتبـاط العكوس بين نوعين من الجزيئات .

ثابِتَةُ أفُوجادْرُو **Avogadro's constant**

يعبر عن عدد الجزيئات في مول من المادة .

انظر تحت number .

ثابتة التفارق الأساسي **base dissociation constant**

هي ثابتة الانفصال التي تعبر عن تأين الأساس . رمزها Kb لأساس ما BOH ، وتكتب كالآتي :

$$kb=\frac{[B^+]\ [oH^-]}{[BOH]}$$

ثابِتَةُ تَرابُطِيَّة **binding constant**

اَنظر تحت association constant .

ثابتة بولتزمان **Boltzmann's constant**

هي ثابتة الغاز مقسمة على عدد أفوجادرو ؛ ($1.38066*10^{-23}$) جول لكل كالفين رمزها k .

ثابِتَةُ التَّجاذُب **constant of gravitation**

اَنظر تحت gravitation constant .

المَنْطَقَةُ الثَّابِتَة **constant region**

ثابتة المعدل في اتجاه الأمام هي kf ، وفي الاتجاه الراجع kr ، وتسمى أيضاً ثابتة السرعة (Velocity rate) .

ثابتةُ التَّثَفُّل **sedimentation constant**

أنظر تحت coefficient .

ثابتة ناتج الذوبانية **solubility product constant**

هي ثابتة توازن مشتقة (Ksp) للتوازن الحاصل بين مركب قليل الذوبانية ، وبين المحلول المشبع بهذا المركب . ولضآلة الكمية الذائبة من المركب ، يعتبر تركيزه ثابتاً وتعادل Ksp حاصل ضرب ثابتة التوازن K في التركيز الأصلي للمركب ، وبذلك فهي تعادل الناتج الأيوني . تسبب تركيزات الأيونا العالية الترسيب .

ثابتةُ اليُوريْا **surea constan**

ثابَتة السرعة **velocity constant**

انظر تحت rate constant .

مُعقَّد **constellation**

انظر تحت complex .

يُحدِثُ الإمْساك **constipate**

مَريضٌ بالإمِساك **constipated**

إمساك **constipation**


صعوبة ، أو ندرةعدد مرات إفراغ البراز .

إمْساكٌ وَنائيّ **atonic constipation**

إمساك ينتج عن وني الأمعاء .

إمْساكٌ مَعديٌّ صائميّ **gastrojejunal constipation**

إمساك ينتج عن تثبيط انعكاسي ، والذي يحدث بفعل مرض في السبيل الهضمي .



تصلد الرئة **Lung consolidation**

ثابتة الغاز **gas constant**

هي ثابتة التناسب في قانون الغاز النموذجي ؛ وهي تساوي (8.3144) جول لكل كالفين مول ، أو(1.987 سعر حراري) كالوري لكل كالفين مول ورمزها R .

ثابتَةُ التَّجاذُب **gravitational constant**

ثابتة التناسب في قانون الجاذبية ، والتي تساوي $(6.67*10^{-11})$ ، ورمزها G .

ثابتة التأين **ionization constant**

انظر تحت dissociation constant .

ثابتَةُلابيك (كهرباء) **Lapicque's constant**

تساوي العدد (0.37) ، الذي يستعمل لتحويل المقاومة غير التحريضية إلى معادلات التيار المباشر .

ثابتَةُ ميخائيلس **Michaelis constant**

هي ثابتة تمثل تركيز المادة عندما تكون سرعة التفاعل المحفز بالإنزيم أسرع من السرعة القصوى بمقدار النصف ؛ رمزها Km أو KM .

انظر تحتً Michaelis - Menten equation .

ثابتَةُ نيوتُن للتَّجاذُب **Newtonian constant of gravitation**

انظر تحت gravitational constant .

ثابتَةُ بلانَك **Planck's constant**

هي ثابتة في نظرية الكم ، رمزها h ، وتمثل النسبة بين طاقة كم من الإشعاع إلى تواتر ذلك الكم ، وتعادل قيمة h $(6.626X10^{-34})$ جول في الثانية . تسمى أيضاً ثابتة الكم . (Quantum constant) .

ثابتَةُ الكَمّ **quantum constant**

أنظر تحت Planck's constant .

ثابتَةُ النَّشاط الإشْعاعي **radioactive constant**

أنظر تحت decay constant .

ثابتة المعدل **rate constant**

هي ثابتة تناسب ، ورمزها k ، وتتعلق بمعدل خطوة واحدة من التفاعل بالنسبة إلى تركيزات المتفاعلات . مثال ذلك في التفاعل ، $(aA+bB \leftrightarrows yY+zZ)$ ، والمعدل $(Y) = K[A]^a [B]^b$ تكون

يسبب تضيقاً .

1ـ تضْييقٌ **constriction**
2ـ ضيق
3ـ تضيُّق

جزء أو موضع متضيق .
انظر تحت stricture .

تَضيُّقٌ قمِّيٌّ (أسنان) **apical constriction**
تناقصَ قطر القناة الجذرية عند قمة الجذر .

تَضيُّقٌ إثْناعَشْريٌّ بوابيٌّ **duodenopyloric constriction**
التضَيق الذي يميز نقطة التحام المعدة والإثنا عشري .

التَّضيُّقُ الأوَّليّ **primary constriction**
هو القسيم المركزي في الكروموسوم .
انظر تحت centromere .

تَضيُّقُ البَوَّاب **pyloric constriction**
تضيق في منطقة البواب .

تَضيُّق رانْفيه **Ranvier's constriction**
هي عقدة رانفيه في الليف العصبي .
انظر تحت node of Ranvier .

التَّضيُّقُ الثَّانَويّ (في الكرومَوسوم) **secondary constriction**
1 ـ في علم الوراثة : هي المنطقة المتضيقة متغايرة الكروماتين من الأذرع القصيرة من الكروموسومات الجسدية طرفية القسيم المركزي ، والتي يرتبط عندها الساتل .
2 ـ قسيم مركزي غير وظيفي في كروموسوم ثنائي القسيم المركزي .

1ـ تضيُّقيّ **constrictive**
2ـ مُضيِّقٌ

يسبب التضيق أو يبدي ميلاً للتضيق .

1ـ مُضيِّقة **constrictor**
2ـ مَصرَّة

هو العامل المسبب للتضيق ، مثل عضلة أو أداة يمكن أن تعمل على تضييق جزء ما .

المُضيِّقَةُ البَرْزَخيَّةُ الحَلْقيَّة **constrictor isthmi faucium**

إمْساكٌ مُسْتَقيميّ **proctogenous constipation**
إمساك ينتج عن شذوذ في منعكس التبرز ، والذي يؤدي إلى عدم تنبه الدفعات لكتل البراز الموجودة في المستقيم للدفعات ، والتي تؤدي إلى إفراغها من المستقيم .

إمْساكٌ تَشنُّجيّ **spastic constipation**
إمساك يتميز بتضيق تشنجي في قسم من الأمعاء ، والذي يشاهد في حالات الوهن العصبي أو التسمم بالرصاص .

مُقوِّم **constituent**
هي أحد العناصر الأساسية في المركب .

1ـ بنيَة **constitution**
2ـ دستور

1 ـ تركيبة الجسم أو أهبته الوظيفية بحسب ما تحددها المؤهلات الجينية والكيميائية الحيوية والفيزيولوجية للفرد ، والمتأثرة إلى حد بعيد بالعوامل البيئية .
انظر تحت diathesis .
2 ـ في الكيمياء : الذرات المكونة للجزيء وطريقة ارتباطها ، والخصائص التي تميز الجزيء عن مصاوغاته البنيوية .
انظر تحت configuration .

بِنْيَةٌ لَمْفيَّة **lymphatic constitution**
حالَةٌ من فرط تنسج الجهاز اللمفي .

بِنْيَةُ الاعْتلال العَصَبيّ **neuropathic constitutio**

بِنْيَةُ العُصَاب الوعائيّ **vasoneurotic constitution**

1ـ بنيَويّ **constitutional**
2ـ دُستوريّ

1 ـ شامل لكامل بنية الجسم ، أي أنه ليس موضعياً .
2 ـ متعلق بالدستور أو بالبنية .

بنيَويّ **constitutive**
يجري إنتاجه بشكل مستمر أو بكميات ثابتة ، بغض النظر عن الظروف أو المتطلبات البيئية .
انظر تحت inducible .

يُضيِّق **constrict**

استِشاريّ **consultative**

متعلق بالاستشارة الطبية .

مُستَهلِك **consumer**

الشخص الذي يدفع المال مقابل الحصول على السلع أو الخدمات ، بما فيها الخدمات الطبية .

مَنْسَبُ الأَسْعارِ لِلمُسْتَهْلِك **consumer price index**

قياس لمعدل أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك ، وهو يقيس تبدل الأسعار في منطقة معينة قياساً إلى أسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات في تلك المنطقة .

جِماعُ العُرْس **consummation**

اول جماع يحدث بعد الزواج .

1ـ سُلّ **consumption**
2ـ اسْتِهلاك

1 ـ فعل الاستهلاك ، أو عملية أن يستهلك الشيء .

2ـ إتلاف الجسم من خلال استهلاكه .

3ـ تسمية قديمة للسل .

سُلٌّ ذَريع **galloping consumption**

تسمية قديمة لشكل من أشكال السل .

اسْتِهْلاكٌ تَرَفيّ **luxus consumption**

اَستهلاك للكماليات والسلع الترفيهية .

1ـ اسْتِهلاكيّ **consumptive**
2ـ مَسْلول

1ـ متعلق بالاستهلاك .

2ـ تسمية قديمة لوصف المصاب بالسل .

انظر تحت tubercular .

1ـ مستأرِج تماسي **contact**
2ـ مُخالِطة
3ـ تَماسّ

1ـ تلامس متبادل بين جسمين أو عضوين .

2ـ شخص على درجة كافية من القرب من مصاب بالعدوى إلى درجة تجعله عرضة لانتقال المادة المعدية .

3ـ مستأرج تماسي contactant .

مُخالَطَةٌ كافِيَة **adequate contact**

هي العَضَلَةُ الحَنَكيَّةُ اللِّسانيَّة .

مُضَيِّقَةُ المَنْخَر **constrictor naris**

هي الجُزْءُ المُسْتَعْرِضُ للعَضَلَة الأَنْفيَّة .

انظر تحت pars transversa musculi nasalis .

المُضَيِّقَةُ الإحْليليَّة **constrictor urethrea**

هي العَضَلَةُ المَصَرَّةُ الإحليليَّة .

انظر تحت musculus sphincter urethrae .

المُضَيِّقَةُ المَهْبليَّة **constrictor vaginae**

هي العَضَلَةُ البَصَليَّةُ الإسْفَنْجيَّةُ الأُنْثَويَّة (Musculus bulbospngiosus) .

ابْتِنائيّ **constructive**

في الفيزيولوجيا ، متعلق بأي من عمليات البناء .

انظر تحت anabolic .

1ـ يَسْتَشير،يَسْتَنْصِح **consult**
2ـ يُشير

يتشاور مع طبيب آخر بشأن حالة ما .

1ـ طَبيبٌ اسْتِشاريّ (في بريطانيا) **consultant**
2ـ مُشاوِر

يستدعى طبيب لتقديم النصيحة أو المشورة .

اسْتِشاريُّ المُسْتَشْفَى **hospital consultant**

دَرجة وظيفية يشغلها طبيب استشاري في مستشفى .

طَبيبٌ اسْتِشاريّ **medical consultant**

طبيب عَلى دَرجة من الدراية في مجال طبي معين بحيث يُستدعى لتقديم النصيحة أو المشورة .

1 ـ مُشاوَرَة **consultation**
2ـ اِسْتِشارَة

تداول الآراء بين طبيبين أو أكثر فيما يخص تشخيص ، أو علاج حالة معينة .

مُشاوِرةٌ بُلْدانيَّة **intercountry consultation**

هو التنسيقَ والتداول للآراء بين ممثلين لبلدان مختلفة .

مُشاوِرةٌ أقاليميَّة **inter-regional consultation**

هو التنسيقَ والتداول للآراء بين ممثلين لأقاليم مختلفة .

للعدوى ، وذلك عن طريق التماس المادي .

مُخالَطَةٌ مُباشِرَة **immediate contact**

انظر تحت direct contact .

مُخالَطَةٌ لامُباشِرَة **indirect contact**

انتقال العدوَى إلى شخص قابل للإصابة بواسطة نواقل ، أو عن طريق الهواء بواسطة الغبار ، أو في نوى القطيرات ؛ تسمى أيضاً (Mediate contac) .

تماس أولي (أسنان) **initial contact**

انظر تحت initial occlusal contact .

تماس إطباقي أولي (أسنان) **initial occlusal contact**

في طب الأسنان : هو أول تماس إطباقي طبيعي غير منحرف ، وتداخل بين الحدبات والذي يحدث عند تقارب الأسنان العلوية والسفلية . وذلك يتحقق في الإطباق المثالي في وضعية الإطباق المركزي . يسمى أيضاً (Initial contact) .

تَماسٌ إطْباقيٌّ اعتراضيٌ (أسنان) **interceptive occlusal contact**


في طب الأسنان : هو تلامس أولي للأسنان الذي يوقفها أو يحرفها من حركة الفك السفلي الطبيعية .

مُخالَطَةٌ صَميميَّة **intimate contact**

مُخالَطَةٌ لامُباشِرَة **mediate contact**

انظر تحت indirect contact .

تَماسٌ لَحْظِيٌّ **momentary contact**



Pyloric constriction تضيق البواب

هي مخالطة تحدث بدرجة كافية للتوصل إلى نتيجة معينة .

مُخالَطَةٌ عاطفيَّة **affective contact**

تَماسٌ مُوازِنٌ (أسنان) **balancing contact**

في طب الأسنان : هو التماس الحادث بين السطوح الإطباقية للأسنان (في التسنين الطبيعي أو الاصطناعي) في الجانب المقابل للتماس الشغال .

تَماسٌ تامّ (أسنان) **complete contact**

في طب الأسنان : هو التماس كامل السطح الداني لسن ما مع كامل السطح الداني لسن المجاور .

عَدَسَةٌ لاصِقَة **contact lens**

عدسة رقيقة تصنع من مادة بلاستيكية متينة ، والتي توضع على العين مباشرة بغرض تصحيح البصر . تستعمل كبديل للنظارة الطبية ، أو ـ عندما تكون ملونة ـ لأغراض تجميلية أحياناً .

نُقْطَةُ التَّماس (أسنان) **contact point**

في طب الأسنان : هي نقطة التلامس بين سنين متجاورتين .

تماس منحرف (أسنان) **deflective contact**

انظر تحت deflective occlusal contact .

تَماسٌ إطْباقيٌّ مَعيب (أسنان) **defective occlusal contact**

في طب الأسنان : هو تماس إطباقي غير سوي .

تَماسٌ إطْباقيٌّ مُنْحَرِف (أسنان) **deflective occlusal contact**

في طب الأسنان : هو حالة تداخل بين الأسنان ، والتي تجعل الفك السفلي ينحرف عن مسار إطباقه الطبيعي عندما يتحرك باتجاه العلاقة المركزية للفكين ، أو يتسبب في دوران أو انزلاق بدلة الأسنان عن مرتكزها القاعدي . يسمى أيضاً تماس منحرف (Deflective contact) ، أو تعارض حدبي (Cuspal interference) .

مُخالَطَةٌ مُباشِرَة **direct contact**

انتقال العدوى من شخص مصاب بالعدوى أو مستودع للعدوى إلى شخص آخر لديه قابلية

. (Contology)

انظر تحت contact lenses .

المخالِطون **contacts**

أشخاص على درجة كافية من القرب من مصاب بالعدوى إلى درجة تجعلهم عرضة لانتقال المواد المعدية .

عَدْوَى؛ سِرَايَة **contagion**

1 ـ انتقال المرض من شخص مصاب إلى آخر .

2 ـ مرض معد .

عَدْوَى مُباشِرَة **direct contagion**

هي عدوى تحدث نتيجة التعرض مباشرة للعامل الممرض . تسمى أيضاً (Immediate contagion) .

عَدْوَى مُباشِرَة **immediate contagion**

انظر تحت direct contagion .

عَدْوَى لامُباشِرَة **mediate contagion**

هي عدوى تحدث نتيجة التعرض لعامل ينقل أو يحمل العامل الممرض .

عَدْوَى نَفْسانِيَّة **psychic contagion**

هو انتقال الأعراض السيكولوجية بفعل التأثير العقلي .

إعْدائِيَّة **contagiosity**

هي خاصية كون المرض معدياً .

مُعْدٍ (مُعْدِي) **contagious**

هي صفة لكون المرض قادراً على الانتقال من شخص إلى آخر ، مما يكسبه صفة المرض المعدي أو الساري .

انظر تحت infectious .

احْتِواء **containment**

لفظ يأتي ليحمل معنى الاشتمال ، أي أن جزء صغير يُشتمل بداخل جزء أكبر .

مُلَوِّث (ج: مُلوِّثات) **contaminant**

عامل يسبب التلوث .

مُلَوِّثٌ غذائيّ **food contaminant**

عامل يَسبِّب تلوث الأغذية .

تَلَوُّث **contamination**

1 ـ وجود أي مادة أو كائن حي يجعل

تَماسٌ إطْباقيّ (أسنان) **occlusal contact**

في طب الأسنان : هو تلامس الأسنان العلوية والسفلية عند انغلاق الفكين في حالة الإطباق الاعتيادي .

تَماسٌ إطْباقيٌّ مُبْتَسَر (أسنان) **premature occlusal contact**

في طب الأسنان : هو تلامس أو تداخل إطباقي يحدث قبل الوصول إلى وضعية متوازنة وثابتة بين الفكين ، والذي يحدث إما في وضع العلاقة المركزية أو الإطباق المركزي ، أو في مكان ما بين هذين الوضعين .

تُماسٌ دان (داني) (أسنان) **proximal contact**

في طب الأسنان : تلامس الأسطح الدانية لسنين متجاورتين . يسمى أيضاً (Proximate contact) .

تَماسٌ دان (داني) (أسنان) **proximate contact**

انظر تحت proximal contact .

تَماسٌ ضَعيف (أسنان) **weak contact**

في طب الأسنان : هو تماس الأسنان بحيث يكون السطح الداني لأحد السنين بالكاد يحقق تلامس مع السطح الداني للسن المجاورة ، مما يتسبب في انحشار الطعام بين السنين .

تَماسٌ شَغَّال (أسنان) **working contact**

في طب الأسنان : هو تلامس الأسنان العلوية والسفلية (في التسنين الطبيعي أو الصناعي على الناحية التي يتحرك الفك السفلي باتجاهها أثناء المضغ .

مُستأرِجٌ تَماسيّ **contactant**

هو مستأرج قادر على استثارة تحسس من النمط التماسي الآجل في بشرة الإنسان أو الحيوان عقب نوبة أو نوبتين من التماس .

تِقَنِيُّ العَدَسات اللاصِقة **contactologist**

هو فني يعمل في مجال العدسات اللاصقة . يسمى أيضاً (Contologist) .

عِلْمُ العَدَسات اللاصِقة **contactology**

العلم المتعلق بفن تصنيع وتجهيز وملائمة العدسات اللاصقة . يسمى أيضاً

حَصْرُ البَول **urinary continence**
هو القدرة على استبقاء محتويات المثانة حتى تصبح الظروف مواتية للتبول .

1ـ قارَّة **continent**
2ـ حَصُورٌ
هو صفة أن يكون قادراً على الامتناع عن الخضوع للدوافع الطبيعية ، مثل الرغبة الجنسية ، أو على مقاومة الرغبة الملحة في التغوط أو التبول .

1ـ تَصادُف **contingency**
2ـ طارِئ
لفظ بمعنى حادثة غير متوقعة ؛ أي وقوع حادثة ما بطريق المصادفة .

مُستَمِرّ **continual**
متصف بالاستمرار .
انظر تحت continuance .

اسْتِمْرارِيَّة **continuance**
هي حالة عدم الانقطاع .

1ـ مُطبِق **continued**
2ـ مُستَمِرّ
لا يطرأ عليه تباطؤ أو تعثر أو انقطاع .

حُمَّى مُطْبِقَة **continued fever**
هي حمى مستمرة دون هدأة أو تراجع أو تحسن .

مُراجَعَةُ الإقامَةِ المُسْتَمِرَّة **continued stay review**
هي جزء من آلية إدارة الخدمات ، والتي فيها يهتم بتقييم الاحتياجات الطبية وكفاءة الخدمات المتعلقة بالرعاية الطبية للمرضى الذين يتلقون العلاج في المشافي .

مُجْتَمَعاتُ العِنايَةِ المُسْتَمِرَّةِ بالمُتَقاعِدين **retirement continuing care communities**
هي مجتمعات توفر العناية المستمرة للمتقاعدين .

التَّعْليمُ الطبيُّ المُستَمِرُّ **continuing medical education**
هو نظام تعليمي يضمن للأطباء الذين يمارسون مهنة الطب أن يتلقوا المعلومات الطبية المستحضر مشوباً وغير نقي .
2ـ التلطيخ أو التلويث بمادة دونية ، كما في إدخال كائنات حية إلى جرح ، أو طرح مياه الصرف الصحي في مجرى مائي .
3ـ تجميع المواد المشعة في أماكن حيث لا يكون وجودها مرغوباً فيه ، وبخاصة حيث قد يكون وجودها ضاراً أو حيث قد يشكل خطراً إشعاعياً

مَضْمُون **content**
ما هو موجود أو محتوى داخل شيء ما .

مَضْمُونُ الحُلُم **dream content**

مَضْمُونٌ كامن **latent content**
في نظرية فرَويد : هو المعنى الخفي واللاشعوري لتمثيل رمزي ، مثل حلم أو تخيل ، وذلك في مقابل المضمون الظاهر .

مَضْمُونٌ ظاهر **manifest content**
في نظرية فرَويد : هو محتوى الحلم أو التخيل كما يعبر عنه الشخص أو كما يتذكره ، وحيث يكون المضمون الكامن متخفياً أو مشوهاً بفعل الإحلال أو التكثيف أو الترامز أو الإسقاط أو الإحصاف الثانوي ، والإحصاف هو إنتاج معقدات من عناصر بسيطة .

مُحْتَوَيات ؛ مَضامِيْن **contents**
صيغة الجمع من مضمون ويسمى أيضاً (Content) .
انظر تحت contact .

تَجاوُر **contiguity**
هو تقارب وثيق أو لصيق ؛ وهي خاصية كون الأشياء متجاورة .

مُجاوِر **contiguous**
شيء ملامس ، أو يكاد يكون ملامساً .

حَصَر **continence**
هو القدرة على الامتناع عن الخضوع للرغبات ، كما في ضبط النفس فيما يتعلق بالإباحية الجنسية .

حَصْرُ الغائط **fecal continence**
هو القدرةَ على استبقاء محتويات القولون حتى تصبح الظروف مواتية للتغوط .

العـدسـات اللاصـقـة . يسـمـى أيضـاً (Contactology) .

انظر تحت contact lens .

contortion **التِواء**

انثناء عضو أو بنية بصورة غير طبيعية .

contour **كِفاف، حياط**

1 ـ الشكل العام أو المحيط الخارجي الطبيعي لجسم أو لعضو .

2 ـ يشكل مادة صلبة وفق خطوط معينة مطلوبة .

contour lines of Owen **كفافُ خُيوط أوين**

هي خطوط مجهرية تشاهد أحياناً في عاج السن ، والتي تقابل الانحناءات الثانوية للأنابيب العاجية .

gum contour **كفافُ اللِّثَة**

في طب الأسنان : هي الهيئة الخارجية لمادة قاعدة البدلة في المنطقة المحيطة بأعناق الأسنان .

height of contour **ارْتِفاعُ الكفاف (أسنان)**

انظر تحت height .

tooth contour **كفافُ السِّنّ (أسنان)**

هو خط وهمي يحيط بالسن ، ويتوافق مع أكبر محيط لتاج السن .

contoured **مُكَيَّفُ الحَوافي**

يتصف سطحه أو محيطه بالتموج وعدم الانتظام ، وهي صفة تطلق على المستعمرات الجرثومية .

contouring **تكييفُ الحَوافي (أسنان)**

في طب الأسنان : هي عملية تشكيل الكفاف أو الحواف .

contouring pliers **زَرَدِيَّةُ تكفيفِ الحَوَافي (أسنان)**

هي أداة تستعمل في عملية تكييف الحواف .

occlusal contouring **تكفيفُ الحَوافي الإِطْباقيَّة (أسنان)**

في طب الأسنان : هو التصحيح والتعديل عن طريق سحل الشذوذات الكبيرة من الأسطح الإطباقية للأسنان .

المستجدة ، وأن يطلعوا على التطورات في علوم الطب المختلفة .

continuity **استِمْرار**

خاصية المضي دون انقطاع أو انفصال .

continuity of care **استْمْرارُ العنايَة**

هو نموذج للمواصفات القياسية للسجلات الصحية .

continuous **مُستَمِرّ**

لا يتصف بالانقطاع .

انظر تحت variable .

continuous bar retainer **مثْبِتة العَارِضَة المُسْتَمِرَّة**

في طب الأسنان : هي عارضة معدنية تستند عادة على الأسطح اللسانية للأسنان الأمامية لتساعد على الاستقرار ، وتعمل كمثبتة غير مباشرة ، أو تساعد على ثبات الامتداد الوحشي لجهاز جزئي متحرك . تسمى أيضاً عارضة كينيدي (Kennedy's Bar) .

continuous clasp **مشبكَةٌ مُستَمِرَّة**

في طب الأسنان : هي عارضة معدنية تستند عادة على السطح اللساني للأسنان لتساعد على الاستقرار وتعمل كمثبتة غير مباشرة .

continuous quality improvement **تَحْسينُ النَّوعيَّة المُستَمِرّ**

هو نظام إداري يهتم بضمان كفاءة عالية مستمرة ومتطورة للخدمات الصحية .

continuous gum denture **بدْلَةٌ سِنِّيَّة لِثَويَةٌ مُستَمِرَّة**

في طب الأسنان : هي بدلة اصطناعية تشتمل على أسنان خزفية ، وتكون قاعدتها من الخزف الذي يصب على قاعدة بلاتينية رقيقة . وهي لم تعد مستخدمة في الوقت الحاضر .

contologist **تِقَنِيُّ العَدَسَاتِ اللاصِقَة**

هو فني يعمل في مجال العدسات اللاصقة . يسمى أيضاً (Contactologist) .

contology **عِلْمُ العَدَسَاتِ اللاصِقَة**

هو العلم المتعلق بفن تصنيع وتجهيز وملائمة

انظر تحت device .

IUD for emergency contraception — **لَوْلَبُ مَنْعِ الحَمْلِ التَّدارُكِيّ**

شكل من أشكال لولب منع الحـمل ، والذي يسـتـعمل بعد الجـماع بهـدف الحيلولة دون حدوث الحمل .

contraceptive — **مانِعُ الحَمْل**

1 ـ ما يستخدم لإنقاص فرص حدوث الحمل أو للحيلولة دون حدوثه .

2 ـ عـامل يسـتـخـدم لإنقـاص فـرص حـدوث الحمل أو لمنع حدوثه .

barrier contraceptive — **مانِعُ الحَمْلِ الحائل**

هي أداة لمنع الحـمل ، مثل العـازل الذكـري أو العـازل الأنثـوي ، والتي تـشكل حـاجـزاً يمنع النطاف من دخول التجـويف البطاني الرحمي والبوقين .

chemical contraceptive — **مانع الحمل الكيميائي**

هو عامل قاتل للنطاف ، والذي يتم إدخاله إلى المهـبل قبل الجـمـاع للحـيلولة دون حـدوث الحمل .

combined injectable contraceptives — **مانعاتُ الحَمْلِ المُشْتَرِكَةُ المُعْطاةُ بالحَقْن**

هي حقن شهرية مكونة من مزيج من هرموني البروجستيرون والإستراديول ، والتي تعطى لتثبيط الخصوبة والحيلولة دون حدوث الحمل .

emergency contraceptive pills — **حُبوبُ مَنْعِ الحَمْلِ التَّدارُكِي**

هي أدوية تعطى عن طريق الفم بعـد الجـمـاع بهـدف الحـيـلولة دون حـدوث الحـمل ، والتي تعمل على منع الإباضة ، أو منع الإخصاب ، أو منع انغراس البيضة الملقحة في بطانة الرحم .

intrauterine contraceptive — **مانِعُ الحَمْلِ الرَّحمي**

انظر تحت device .

low dose combined oral contraceptives — **مانعاتُ الحَمْلِ المُرَكَّبَةُ المُنْخَفِضَةُ الجُرْعة المُعْطاةُ بالفَم**

انظر تحت adjustment .

contra- — **1 ـ سابقة بمعنى التَّضادّ**
2 ـ سابقة بمعنى التَّقابُل

سابقة تستخدم بمعنى ضد أو مقابل .

contra-angle — **التَّزَوِّي المقابل**

هو شكل من أشكال تزوي الأدوات الجـراحيـة بحيث يقترب طرفها العامل من المحور الطولي لجسم الأداة ، وقـد يتطلب ذلك انثنـاءين ، أو ثلاثة أو أكثر ، أو زوايا متعددة على طول عنيق الأداة .


contra-aperture — **فتحة مُقابلة**

هي فتحة ثانية تفتح في الخراج لتسهيل تفريغ محتوياته .

contra-bevel — **تجْليفٌ مُقابِل (في طب الأسنان)**

1 ـ هي الزاوية بين النصل القاطع وقاعدة الجيب حـول السني التي تمكن النصل من أن يفـصل الظهارة الميزابية عن الظهارة الخارجية .

2 ـ عند تحـضيـر حـفـرة في السن : هـو جلف خـارجي يمتـد إلى الحـدبة الشـدقـيـة أو الحـدبة اللسانية لعمل حشوة داخل التاج .



مثبتة العارضة المستمرة
Continuous bar retainer

contraception — **مَنْعُ الحَمْل**

منع حدوث الحمل أو التحبيل (Impregnation)

intrauterine contraception — **منع الحمل داخل الرحم**

منع حدوث الحمل باستعمال أداة يتم إدخالها داخل الرحم .

صفة للشيء الذي يمتلك القدرة على التقلص أو يميل إلى التقلص كاستجابة لمنبه مناسب .

قلوصيَّة **contractility**

هي خاصية قدرة الشيء على أن يصبح أقصر استجابة لتنبيه مناسب .

قَلوصيَّةُ القَلْب **cardiac contractility**

هي الخاصية داخلية المنشأ التي تتمتع بها الخلايا والأنسجة القلبية ، والتي تمكنها من أن تصبح أقصر طولاً استجابة للتنبيه الملائم . وتتنوع أشكال القلوصية القلبية ، ومع ذلك فهي تقع تحت سيطرة الجهاز العصبي المستقل ، وتتأثر كذلك بعوامل أخرى مثل ، ظروف التحميل ؛ وتؤدي التغيرات في القلوصية إلى تغيرات في قوة تقلص القلب . ويمكن تقديرها عن طريق العلاقة بين حجم وضغط نهاية الانقباض ، أو التغير في أي من الضغط أو الحجم بالنسبة للزمن ، تسمى أيضاً الحالة المؤثرة في التقلص العضلي (Inotropic state) .

قَلوصيَّةٌ جلْفانيَّة **galvanic contractility**

انظر تحت galvanocontractility .

القَلوصيَّةُ الذَّاتيَّةُ للعَضَلَة **idiomuscular contractility**

هي القلوصية التي تختص بها العضلات التالفة أو المتنكسة .

القَلوصيَّةُ العَصَبيَّةُ للعَضَلَة **neuromuscular contractility**

هي القلوصية الطبيعية للعضلات ، في مقابل القلوصية الذاتية للعضلات .

تقلُّص **contraction**

1 ـ جعل الطول أقصر أو الحجم أصغر ؛ وذلك فيما يتعلق بتقلص العضلات ، فإن هذا الاصطلاح يعني تقاصر طول العضلة أو نشوء توتر عضلي .

2 ـ تقاصر أو تضاؤل باثولوجي مرضي .

3 ـ مقاربة غير طبيعية لبنى الفك العلوي أو الفك السفلي من الخط الناصف .

تَقَلُّصٌ هَوائيّ **aerobic contraction**

هو نظام دوائي مانع للحمل يعطى عن طريق الفم ، والتي يمكن أن تتألف من مزيج هرموني هو البروجيستين ، والدروسبيرينون والإيثينيل إستراديول ، والتي يعطى لمدة 24 يوماً من كل شهر متبوعاً بأربعة أيام من الحبوب الخالية من الهرمون .

مانعُ الحَمْل الفَمَويّ **oral contraceptive**

هو مركب ، هرموني في العادة ، والذي يعطى عن طريق الفم لمنع الإباضة وحدوث الحمل .

1. عَقد **contract**

2. يتقلَصُ

1 ـ يجعل شيئاً ما ، عضلة مثلاً ، أقصر طولاً أو أصغر حجماً .

2 ـ يكتسب أو يتحمل .

إدارةُ العُقُود **contract management**

هي إدارة تختص بالنظر في العقود ومتابعة تنفيذها .

عَقْدُ الارْتِباط **contract of adhesion**

هو عقد منحاز إلى طرف من طرفي التعاقد بصورة توحي أنه لا يعكس رضا الطرفين التام .

طَبيبٌ مُتَعاقِد **contract physician**

هو طبيب يَعمل مع جهة أو مؤسسة وفق عقد محدد .

خِدْمَةٌ تَعاقُديَّة **contract service**

خدمة تؤدَى وفق شروط محددة في عقد بين الجهات المتعاقدة .

عَقْدٌ اسْتِبْعادِيٌّ **exclusive contract**

عقد يتيح لجهة معينة تقدم الاختصاص بتقديم خدمة معينة أو احتكار سلعة معينة .

عَقْدُ التَّأمين **indemnity contract**

عقد تتعهد جهة معينة بموجبه بتعويض الجهة المتعاقدة الثانية عن خسائر محددة يمكن أن تلحق بها .

عَقْدُ الخِدْمَة **service contract**

عقد يحدد شروط وأحكام الخدمة المتفق على تأديتها بين الجهات المتعاقدة .

قلوص **contractile**

تَقَلُّصُ الفَتْحِ المَهْبِطِي — **cathodal opening contraction**

تَقَلُّصٌ نَدْبِيّ — **cicatricial contraction**

انظر تحت wound contraction .

تَقَلُّصٌ رَمَعِيّ — **clonic contraction**

انظر تحت clonus .

تَقَلُّصُ الغَلْق — **closing contraction**

تقلص متراكز — **concentric contraction**

تقلص يؤدي إلى القصر ؛ لأنه يتجه إلى المركز .

انظر تحت shortening contraction .

تَقَلُّصُ دُوبْويتْران — **Dupuytren's contraction**

انظر تحت Dupuytren's contracture .

تقلص مبتعد عن المركز — **eccentric contraction**

هو تقلص يؤدي إلى الإطالة ، حيث أنه يبتعد عن المركز ، ويتسبب في تباعد نهايتي العضلة .

تَقَلُّصٌ بُطَيْنِيٌّ هُرُوبِيّ — **escaped ventricular contraction**

هي نَبْضة بطينية هروبية .

تَقَلُّصُ دُوبْويتْران الكاذِب — **false Dupuytren's contraction**

تَقَلُّصٌ رَحِمِيٌّ كاذِب — **false uterine contraction**

تَقَلُّصَاتٌ لُيَيفِيَّة — **fibrillary contractions**

هي تقلصاتَ شاذة تلقائية تحدث بالتتابع في حزم مختلفة من ألياف عضلة مريضة .

تَقَلُّصُ النَّقْرِ الأَمامِيّ — **front tap contraction**

هو تقلص يَحدثُ بتأثير النقر الأمامي على وتر العضلة .

تَقَلُّصٌ تَوَتُّرِيٌّ جِلْفانِيّ — **galvanotonic contraction**

هو تقلص يحدث تحت تأثير تيار جلفاني .

تَقَلُّصُ جاوَر — **Gower's contraction**

انظر تحت front tap contraction .

تَقَلُّصاتُ هيكْس — **Hick's contractions**

انظر تحت Braxton Hicks contractions .

تَقَلُّصٌ مَخْصُور — **hourglass contraction**

تقاصر أو تضاؤل يحدث في وجود الهواء .

تَقَلُّصٌ لاهَوائِيّ — **anaerobic contraction**

تقاصر أو تضاؤل يحدث في غياب الهواء .

تَقَلُّصُ الغَلْق المَصْعَدِي — **anodal closure contraction**

تَقَلُّصُ الفَتْح المَصْعَدِي — **anodal opening contraction**

تَقَلُّصٌ أُذَيْنِيّ — **atrial contraction**

تقلص يحدث في الأذين .

تقلص أذيني مبتسر — **atrial premature contraction**

انظر تحت complex .

تقلص وصلي أذيني بطيني مبتسر — **atrioventricular (AV) junctional premature contraction**

هي نبضة متنبذة تنشأ بشكل مبتسر من المركب الوصلي الأذيني البطيني .

تَقَلُّصٌ بُطَيْنِيٌّ تلقائيّ — **automatic ventricular contraction**

هي نبضة بطينية هروبية .

تَقَلُّصُ عُنُق المَثانَة — **bladder neck contraction**

تَقَلُّصاتُ براكستون هيكْس — **Braxton Hicks contractions**

هي تقلصاتَ رحمية خفيفة غير منتظمة وغير مؤلمة - في العادة - تحدث أثناء الحمل في النصف الثاني ، وتزداد شدتها وتواترها تدريجياً لتصبح أكثر انتظاماً في نهاية الأثلوث الثالث من الحمل . تسمى أيضاً تقلصات هيكس (Hick's contractions) .

تَقَلُّصُ القَلْب — **cardiac contraction**

تَقَلُّصٌ رُسْغِيٌّ قَدَمِيّ — **carpopedal contraction**

هي الحالَة التي تَنتج عن التقاصر المزمن لعضلات أصابع اليدين وأصابع القدمين والذراعين والرجلين ، والذي يحدث في الكزاز .

تَقَلُّصُ الغَلْق المَهْبِطي — **cathodal closure contraction**

تَقَلُّصٌ بِتَمَدُّدُ العَضَلِ **myotatic contraction**
هو تقلص أو تهيج العضلة الذي يحدث بتأثير الشد المنفعل الفجائي ، أو بتأثير النقر على وتر العضلة . يسمى أيضاً منعكس الشد (Stretch reflex) ، أو المنعكس الوتري (Tendon reflex) .

تَقَلُّصُ الفَتْح **opening contraction**

تَقَلُّصٌ راحِيّ **palmar contraction**
انظر تحت Dupuytren's contracture .

تَقَلُّصٌ تَناقُضِيّ **paradoxical contraction**
هو تقلص العضلة الناتج عن المقاربة المنفعلة لنهايتيها .

تَقَلُّصٌ وَضْعِيّ **postural contraction**
هي حالة التوتر والتقلص العضليين التي تبلغ الحد الكافي للمحافظة على وضع الجسم .

تَقَلُّصٌ مُبْتَسِر **premature contraction**
انظر تحت extrasystole .

تَقَلُّصٌ روماتزميّ **rheumatic contraction**
هو تقلص أو قصر في العضلة الناتج عن الإصابة بالروماتزم .

تَقَلُّصٌ تَقَطُّعِيّ **segmentation contraction**
انظر تحت movement .

تَقَلُّصُ التَّقْصير **shortening contraction**
هو تقلص عضلي يتسبب في تقارب نهايتي العضلة ، كما يحدث عند مد طرف مشدود . يسمى أيضاً تقلص متراكز (Concentric contraction) .

تقلص مبتسر فوق البطين **supraventricular premature contraction**
هي نبضة منتبذة تنشأ بشكل مبتسر من بؤرة داخل الأذين أو الوصل الأذيني البطيني ، مثل المركب الأذيني المبتسر أو المركب الوصلي الأذيني البطيني المبتسر .

تَقَلُّصٌ تَكَزُّزِيّ **tetanic contraction**
هو تقلص مستديم في العضلة دون فواصل ارتخاء ويحدث غالباً في المريء في الإصابة بالكزاز ؛ يسمى أيضاً تقلص توتري (Tonic contraction) .

هو تقلص عضو ما (مثل المعدة أو الرحم) عند أو بالقرب من وسطه ، أو بشكل يشبه الساعة الرملية .

تَقَلُّصُ الجوع **hunger contraction**
هو احساس بالتقلص الذي يحدث في المعدة في حالة الجوع .

تَقَلُّصٌ عَضَليٌّ ذاتيّ **idiomuscular contraction**
هو تقلص يَنشأ في عضلة تالفة أو مزالة العصب وذلك بفعل تنبيه كهربائي مباشر .


تَقَلُّصٌ إسْويُّ القِيَاس **isometric contraction**
هو تقلص العضلة دون تقاصر ملموس ، أو تغير في الطول الممتد بين منشأ العضلة ومرتكزها .

تَقَلُّصٌ إسْويُّ التَّوَتُّر **isotonic contraction**
هو تقلص العضلة دون تغير ملموس في قوة التقلص ؛ وفيه يتضاءل الطول بين منشأ العضلة ومرتكزها .

تقلص وصلي مبتسر **junctional premature contraction**
انظر تحت atrioventricular junctional premature complex .

تَقَلُّصُ التَّطْويل **lengthening contraction**
هو تقلص عضلي يتسبب في تباعد نهايتي العضلة ، كما هو الحال عند ثني أحد الأطراف بالإكراه . يسمى أيضاً تقلص متراكز (Eccentric contraction) .

تَقَلُّصٌ رَمَعِيٌّ عَضَليٌّ **myoclonic contraction**
انظر تحت clonus .



Dupuytren's contraction تقلص دوبويتران

الانثنائي الذي يمكن أن يصيب أصابع القدم نتيجة إصابة اللفافة الأخمصية .

تَقَفُّعٌ ذو منشأ خارجَ الهَرَمِيّ — **extrapyramidal contracture**

تَقَفُّعُ الثَّني — **flexion contracture**

تَقَفُّعٌ مُفْرِطُ التَّوَتُّر — **hypertonic contracture**

تَقَفُّعٌ هستيريّ — **hysterical contracture**

تَقَفُّعٌ إقْفاريّ — **ischemic contracture**

تقفعَ وتنكس عضلة ما بسبب تطبيق ضغط ، والذي يؤثر على دوران الدم فيها ، كما هو الحال عند تطبيق عصابة ضيقة على الشريان المغذي للعضلة أو عند الإصابة أو التعرض للبرد .

تَقَفُّعٌ بتَمَدُّدِ العَضَلِ — **myotatic contracture**

تَقَفُّعٌ عُضْوَيّ — **organic contracture**

تقفع يتصف بكونه دائماً ومستمراً .

تَقَفُّعٌ تالٍ لالْتِهاب سِنْجابِيَّةِ النُّخاع — **postpoliomyelitic contracture**

أي تشوه يصيب أحد المفاصل في أعقاب هجمة من التهاب سنجابية الدماغ ، والذي يحدث نتيجة شلل كامل أو جزئي في عضلة أو مجموعة عضلات ، والذي يسمح بالاستعمال المفرط للعضلة أو مجموعة العضلات المقابلة ، كما يحدث في تقفع الثني الذي يصيب الركبة والشلل الذي يصيب المجموعة العضلية للعضلة رباعية الرؤوس .

تَقَفُّعٌ تالٍ لحَقْنِ الفيراترين — **veratrin contracture**

تقفع يَحدث في أعقاب حقن الفيراترين ، والفيراترين هي مادة سامة تستخرج من النبات (كانت تستخدم لعلاج التهاب المفصل) .

تَقَفُّعُ فُولْكمانْ — **Volkmann's contracture**

تقفع أصابع اليدين وأحياناً الرسغ بعد إصابة وخيمة في/ أو بالقرب من المرفق ، أو سوء استخدام العاصبة بشكل يعيق إمداد العضلات بالدم . وقد تنشأ ظاهرة مماثلة في القسم السفلي من الساق أو القدم في أعقاب أذية وعائية

انظر تحت tetanus .

تَقَلُّصٌ تَوَتُّريّ — **tone contraction**

انظر تحت tetanus .

تَقَلُّصٌ تَوَتُّريّ — **tonic contraction**

انظر تحت tetanus .

تَقَلُّصٌ نَفْضيّ — **twitch contraction**

انظر تحت twitch .

تَقَلُّصٌ رَحِميّ — **uterine contraction**

تقلص يَحدث في عضلات الرحم ، والذي يحدث بشكل واضح أثناء الولادة .

تقلص بطيني مبتسر — **ventricular premature contraction**

انظر تحت complex .

تقلص الجرح — **wound contraction**

هو الانكماش أوالانغلاق التلقائي لجروح الجلد المفتوحة .

تعاقديّ — contractual

يتصف بكونه مبنياً على تعاقد بين طرفين أو أكثر .

تَعْديلُ حِسَابَاتِ التَّعاقُدِ — **contractual adjustment**

تعديل يتم بموجبه تخفيض الرسوم إلى الحد المتفق عليه مع شركة التأمين .

اتِّفاقُ خِدْمَةٍ تعاقُدِيّ — **contractual service agreement**

اتفاقٌ على تقديم خدمة معينة وفق شروط وأحكام محددة بعقد .

تقفُّع — contracture

حالة من المقاومة الشديدة الثابتة للشد المنفعل للعضلة ، والناتجة عن تليف الأنسجة التي تدعم العضلة أو المفصل ، أو عن اضطرابات في الألياف العضلية .

تَقَفُّعُ نَدْبَةِ الحَرْق — **burn scar contracture**

تَقَفُّعُ دُوبْوِيْتران — **Dupuytren's contracture**

هو تقاصرَ طول اللفافة الراحية ، وزيادة ثخانتها وتليفها بما يؤدي إلى تشوه انثنائي في أصابع اليد . وتطلق هذه التسمية أيضاً على التشوه

1ـ مصطلح يستعمل لوصف الجانب المكبوت من الشخصية، والذي يشتمل على الصفات التي تتبع عادة الجنس المقابل.
2ـ يبدي صفات جنسية ثانوية تخص الجنس المقابل، ويسمى أيضاً مغاير الجنس (Heterosexual).

تبايُن (أشعة) **contrast**
هي درجة اختلاف المناطق القاتمة والمناطق الفاتحة من الصورة من حيث الكثافة البصرية.
وفي الأشعة: هو اختلاف الكثافة البصرية الناتج عن اختلاف درجة الإشفاف للأشعة، أو درجة نفوذية شيء ما للأشعة.

تَبايُنُ الفِلْم **film contrast**
درجة التباين الكامنة في الفلم.

تَبايُنٌ عالٍ (عالي) **high contrast**
انظر تحتَ short-scale contrast.

تَبايُنُ الصُّورَة **image contrast**
هو مجال درجات اللون الرمادي على فلم الأشعة، ويؤثر ازدياد أو تناقص هذا المجال على التمايز البصري للمظاهر الشعاعية الموجودة على الفلم.

تَبايُنٌ طَويلُ المِقْياس **long-scale contrast**
هو ازدياد مجَال درجات اللون الرمادي على فلم الأشعة، مما يحد من التمايز في كثافة المظاهر الشعاعية لمعالم بنيوية متباينة نسبياً، ويسمى أيضاً تباين منخفض (Low contrast).

تَبايُنٌ مُنْخَفِض **low contrast**
انظر تحتَ long-scale contrast.

تَبايُنٌ قَصيرُ المِقْياس **short-scale contrast**
هو تناقص في مجال درجات اللون الرمادي على فلم الأشعة، مما يحسن من درجة التمايز البصري المتعلق بكثافة المظاهر الإشعاعية لمعالم لبنيات معينة أو لمكونات بنية معينة، يسمى أيضاً تباين عال (High contrast).

تَبايُنٌ مُتَوَاقِت **simultaneous contrast**

تباين الشيء **subject contrast**
هو تباين ناتج عن اختلاف في درجة امتصاص

مشابهة تصيب عضلات الساق. يسمى أيضاً ضمور عضلي إقفاري (Ischemic muscular atrophy)، أو متلازمة فولكمان (Volkmann's syndrome).

تَمْديدٌ مُقابِل **contraextension**
انظر تحت counterextension.

كَسْرٌ مُقابِلٌ للصَّدْمَة **contrafissura**
هو كسر يحدث في الجانب المقابل للجانب الذي تعرض للصدمة.

كَسْرٌ مُقابِلٌ للصَّدْمَة **contrafissure**
هو كسر يحدث في الجانب المقابل للجانب الذي تعرض للصدمة.

شَقٌّ مُقابِل **contraincision**
هو شق يعمل في الجانب المقابل لتسهيل عملية التفريغ.

مانِعُ الاسْتِعْمال **contraindicant**
هو ما يجعل نوعاً معيناً من العلاج يعتبر غير ملائم أو غير مناسب.

مَمْنوعُ الاسْتِعْمال **contraindicated**
نوع أو شكل معين من أشكال العلاج يعتبر غير مناسب أو غير ملائم.

مانِعُ الاسْتِعْمال **contraindication**
(ج: مَوانِعُ الاسْتِعْمال)
أية حالة، وبخاصة أية حالة مرضية، يكون شكل معين أو نوع معين من أنواع العلاج غير مناسب أو غير ملائم لها.

مُضادُّ الإفرازِ الجُزَيري **contrainsular**
كل ما هو ذو تأثير مثبط لإفراز الأنسولين من البنكرياس.

متعلق بالجانِبِ المقابِل **contralateral**
يتوضع في أو يؤثر على أو يتعلق بالجانب المقابل، وذلك في مقابل بنفس الجانب (Ipsilateral).

مُضادُّ الخَزَل **contraparetic**
ما يمنع حدوث الخزل.

1ـ متعلق بالجِنْسِ المقابل **contrasexual**
2ـ مُتَّصِلٌ بالجِنْسِ المقابل

الأشعة من مختلف أجزاء الشيء الخاضع للتصوير الإشعاعي .

تَبايُنٌ مُتَتابِع **successive contrast**

1ـ مُضادُ التَّنْبيه (صِفة) **contrastimulant**
2ـ مُخمِد

1ـ ذو تأثير معراض أو مضاد للتنبيه .
2ـ دواء مخمد .

إدْمانُ الأدْويَةِ المُخمِدة **contrastimulism**

هو الاستعمال المنتظم للأدوية أو الطبائق المضادة للتنبيه .

مُضادُ التَّنْبيه **contrastimulus**

هو العلاج أو القوة أو العامل المضاد للتنبيه .

مُعاكِسُ التَّدْوير **contraversive**

لاإرادِيّ **contravolitional**

انظر تحت involuntary .

رَجْعُ الضَّرْبَة **contrecoup**

هي أذية تحدث بسبب ضربة تصيب منطقة أخرى ، وبخاصة فيما يتعلق بالدماغ ، كما في حالة الكسر الناتج عن ضربة راجعة على الجمجمة .

مُلاعَبَة **contrectation**

هي عملية اللمس والمداعبة وبخاصة فيما يتعلق بالملاعبة السابقة للجماع .

1ـ يُكافِح **control**
2ـ تَضْبيط
3ـ شاهِدٌ
4ـ مُراقَبَة
5ـ يَضْبِط
6ـ حكَم
7 ـ مُكافَحة

1ـ تنظيم الضوابط المتعلقة بأمور معينة أو بأحداث معينة .
2ـ المعيار الذي يمكن على أساسه تقييم ملاحظات اختبارية معينة .
انظر تحت negative control .
انظر تحت positive control .
3ـ مريض أو مجموعة مختلفة عن المرضى موضع الدراسة (مجموعة العلاج أو مجموعة دراسة الحالة) من حيث عدم إصابتهم بالمرض أو عدم تلقيهم للعلاج أو النظام الدوائي ؛ وبخلاف ذلك تتشابه مجموعة المراقبة ومجموعة العلاج في أمور تسمح أو تسهل إمكانية المقارنة بينهما .
4ـ في علم النفس : عملية الضبط والتنظيم الواعي للدوافع وكبت الغرائز والعواطف .

تَضْبيطُ اللابُؤَرِيَّة **astigmatism control**

تَضْبيطٌ بالبَغيض **aversive control**
(معالجة نفسية)

في العلاج السلوكي : هو استعمال تنبيه غير مستحب لتغيير سلوك غير مرغوب فيه .

تَضْبيطُ السُّلوك **behavior control**

مُكافَحَةٌ بَيولوجيَّة **biologic control**

تَحْديدُ النَّسْل **birth control**

هو الحد المتعمد من الإنجاب بوسائل مصممة للحد من الخصوبة ولمنع الحمل .
انظر تحت contraception .

مُكافَحَةُ الأمْراضِ السَّارِيَة **communicable diseases control**

هي الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الأمراض السارية ، والقضاء عليها .

لائِحَةُ التَّحَكُّم **control menu**

هي مجموعة من الاختيارات الموجودة على لوحة التحكم .

لَوْحَةُ التَّحَكُّم **control panel**

هي لوحة توضع عليها مفاتيح التحكم .



تقفع ڤولكمان **Volkmann's contracture**

في عملية اختبارية لدراسة شيء ما : هي عينة من ذلك الشيء ذات قيم محددة معلومة يمكن استخدامها كأساس مرجعي .

مُراقَبَةُ الجودَة **quality control**

هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان الحفاظ على مستوى عال من جودة السلع أو كفاءة الخدمات .

تَضْبيطٌ انْعكاسيّ **reflex control**

التحكمَ بالفعاليات العضلية عن طريق التدفعات العصبية التي تنتقل إلى العضلات بواسطة إحدى الأقواس الانعكاسية التي تحافظ على الفعل الانعكاسي .

عينة مراقبة اختبار شيك **Schick test control**

هو ذيفان الخناق المعطل بالحرارة ، والذي يستعمل كعينة مراقبة في اختبار شيك . كان يعرف سابقاً باسم ذيفان الخناق التشخيصي المعطل (Inactivated dignostic diphtheria-toxin) .

التَّحكُّمُ بالجِنْس **sex control**

استخدام وسائل إصطناعية لضبط واختبار جنس مواليد المستقبل .

مُكافَحَةُ الدُّخان **smoke control**

تَضْبيطٌ اجْتماعيّ **social control**

تَضْبَيطٌ بالمُنَبِّه **stimulus control**

هو أي تأثير تمارسه البيئة على السلوك .

تَضْبيطٌ تَآزُريّ **synergic control**

التحكم بالأفكار **thought control**

هو شكل من أشكال وهام التحكم ، والذي يتم فيه الاقتناع بأن أفكار المرء هي ليست أفكاره الشخصية بل أنها مستمدة من شخص آخر أو من مصدر خارجي آخر .

تَضْبيطٌ تَوَتُّري **tonic control**

هي دفعاتَ عصبية تنتقل إلى السبيل المشترك النهائي عبر القوس الانعكاسية ، للمحافظة على توتر العضلة .

تَضْبيطٌ دهْليزيٌّ توازُنيّ **vestibuloequilibratory control**

مُكافَحَةُ أمْراض الإسْهال **diarrheal diseases control**

الإجراءات الصحية والتنظيمية المتبعة للحد من انتشار الأمراض الإسهالية ومعالجتها .

تَضْبيطٌ ارْتجاعيّ **feedback control**

هي آلية ضَبطَ سيكولوجية تعمل على تنظيم العمليات الاستقلابية للخلية ، وبالتالي على المحافظة على بيئة داخلية مستقرة ، حيث يؤدي تراكم ناتج تفاعل ما إلى خفض معدل الإنتاج ، أو يؤدي عوز ذلك الناتج إلى زيادة معدل الإنتاج .

تَضْبيطٌ دَقيق **fine control**

جهازُ التَّحكُّم بالقَدَم (أسنان) **foot control**

جَهاز يستعمَل لتشغيل وحدة معالجة الأسنان ومثقاب الأسنان ، يتم التحكم فيه عن طريق القدم .

تَضْبيطٌ ديناميكيٌّ ذاتيّ **idiodynamic control**

هي تدفعاتَ (دفعاتَ) عصبية من خلايا العمود السنجابي البطناني ونوى الدماغ الحركية ، والتي تعمل على إبقاء العضلات في حالتها الاغتذائية الطبيعية .

مُكافَحَةٌ تكامُليَّةٌ للهَوام **integrated pest control**

التَّحكُّمُ بالفكْر **mind control**

انظر تحت brainwashing .

التحكم الحركي **motor control**

هو انتقال التدفعات (الدفعات) العصبية بشكل منتظم من القشرة الحركية إلى الوحدات الحركية ، مما ينتج عنه تقلصات عضلية متناغمة

عينة المراقبة السالبة **negative control**

هي عملية مخبرية مماثلة من كل النواحي لعملية اختبارية التي تطبق على العينة باستثناء ناحية غياب أحد العوامل قيد الدراسة والاختبار .

مُكافَحَةُ الضَّوضاء **noise control**

هي الوسائل الفاعلة أو المنفعلة لتخفيف انتقال الضوضاء .

عينة المراقبة الموجبة **positive control**

يَرُضُّ **contuse**

انظر تحت bruise .

رَضّ **contusion**

هي أذية لجزء ما والتي تكون غير مترافقة بتمزق الجلد ، وإنما مترافقة بنزيف تحت الجلد . تسمى أيضاً كدمة(Bruise) .

رَضٌّ الدِّماغ **brain contusion**

رض وفقد للوعي ، والذي يحدث نتيجة رضح مباشر يصيب الرأس ، غالباً ما يكون مترافقاً بكسر في الجمجمة .

انظر تحت concussion of the brain .

رَضُّ رَجْعِ الضَّرْبَة **contrecoup contusion**

هو رض يَحدث بسبب ضربة توجه إلى جانب من الرأس فينتج عنها أذية في نصف الكرة المخية في الجانب المقابل بفعل انتقال قوة الضربة .

رَضُّ النُّخاع **contusion of spinal cord**

هي أذية عضوية للنخاع ، والتي تنتج عن ضربة تصيب العمود الفقري ، وتؤدي إلى تعطل مؤقت أو دائم لوظائف الجزء الذي يقع إلى الأسفل من موضع الإصابة .

انظر تحت concussion of spinal cord .

رض عضلة القلب **myocardial contusion**

هو رض القلب ، والذي يحدث في الغالب بفعل الاصطدام بمقود السيارة أو الاصطدام بشيء كليل آخر . قد ينتج عن مثل هذا النوع من الرضح عدم انتظام ضربات القلب .

راضّ **contusive**

مسبب للكدمة .

مَخْروطِيٌّ **conular**

القُونُس (جنس من الرخويات) **Conus**

هو جنس من الحلزونات البحرية من الفصيلة المخروطية (Conidae) تعد كل من القونس الجغرافية (Conus geographicus) ، والقونس النسيجية (Conus textile) . أنواعاً لاحمة تعيش في المحيطات المدارية ، والتي تقتل الأسماك عن طريق فتح ثقب فيها بواسطة خرطومها وحقنها السم . قد تتسبب أحياناً في

هي دفعات عصبية من الأنفاق الهلالية والكييس والقريبة ، والتي تعمل على المحافظة على توازن الجسم .

تَضْبيطٌ إراديّ **volitional control**

هي دفعَات من المنطقة الحركية من قشرة المخ ، والتي تتحكم في عمل العضلات تحت تأثير الإرادة تسمى أيضاً (Voluntary control) .

تَضْبيطٌ إراديّ **voluntary control**

انظر تحت volitional control .

ذو شاهِد **controlled**

كل ما يمكن مقارنته بعينة مقابلة قياسية .

تَجْرِبَةٌ ذاتُ شَوَاهد **controlled experiment**

هيَ تجربة تتم فيها مقارنة النتائج بالنتائج المستحصلة من تطبيق نفس ظروف التجربة على عينة مقابلة قياسية .

مَوادٌّ مقيدة **controlled substances**

هي مواد يمنع تداولها إلا بموجب إذن خاص من أشخاص مصرح لهم .

قانون المواد المقيدة **Controlled Substances Act**

هو قانون اتحادي صدر في الولايات المتحدة عام 1970 ، والذي ينظم وصف وإعطاء الأدوية ذات التأثير النفسي ، بما فيها المخدرات ، ضمن خمس فئات بحسب قالبيتها للتسبب في الإدمان ، وقبولها الدوائي ، وقدرتها على التسبب في الاعتماد على العقاقير ؛ كما يؤسس القانون الأنظمة والضوابط اللازمة لتصنيع وتخزين ونقل الأدوية من كل تلك الفئات . ونجد ضمن الأدوية التي يغطيها ذلك القانون كل من الأفيون ومشتقاته ، والأفيونيات ، والأدوية المسببة للهلوسة ، والأدوية المخمدة والمنبهة .

المراقِبُ الماليُّ **controller**

هو الشخص الذي يشرف على الحسابات والكشوف المالية لجهة ما .

يُكدِم **contund**

يسبب كدمة .

انظر تحت bruise .

انظر تحت conus medullaris .

مَخْروطُ الشُّرود **distraction conus**

هي منطقة بيضاء هلالية عند الحافة الصدغية لحليمة العصب البصري ، والتي تشاهد أحياناً بواسطة منظار العين في العين الحسرية . يسمى أيضاً مخروط الحسر (Myopic conus) .

مَخْروطُ الحَسَر **myopic conus**

انظر تحت distraction conus .

مَخْروطُ الشَّدِّ المُفْرط **supertraction conus**

هي حلقة رمادية أو مصفرة على الجانب الأنفي للحليمة البصرية ، والتي تشاهد أحياناً بواسطة منظار العين ، وبخاصة في العين الحسرية .

نقاهَة **convalescence**

هي مرحلة الشفاء التي تعقب هجمة من المرض أو عملية جراحية أو أذية .

ناقِه **convalescent**

1 ـ يتصف أو يتعلق بالنقاهة .

2 ـ المريض الذي يتعافى من مرض أو عملية جراحية أو أذية .

زَنْبقُ الوادِي **Convallaria**

هو نَباتٌ منَ الزَنْبَقيَّات .

حَمْلان **convection**

هو نقل الحرارة عبر السوائل أو الغازات من خلال دوران محمول بالحركة الإجمالية للجزيئات المسخنة باتجاه مناطق أكثر برودة .

انظر تحت convection current .

مُلاءمَة **convenience**

هي حالة كون الظروف مناسبة لتحقيق النجاح وتوفير الوقت والطاقة وتجنب الإحباط والفشل .

1 ـ عُرْفٌ **convention**

2 ـ اتِفاقٌ

1 ـ اتفاقية تعقد بحسب القانون الدولي ، عادة ما تكون أطرافها من الدول أو الهيئات الدولية .

2 ـ مجموعة من المعايير والقيم الاجتماعية المقبولة والمتعارف عليها من قبل مجتمع معين .

اعْتِياديّ **conventional**

قتل البشر بنفس الطريقة .

مَخْروط (ج:مَخاريط) **conus (pl.coni)**

1 ـ مخروط : هي تسمية تشريحية عامة لبنية تشبه المخروط في شكلها ، و (Coni) هي الكلمة التي تطلق على العموم وعلى صيغة الجمع وتعني مخاريط .

2 ـ عنبة خلفية في العين الحسرية .

مَخاريطُ البَرَبْخ **coni epididymidis TA**

هي تسمية بديلة لفصيصات البربخ (Lobuli epididymidis) .

المَخاريطُ الوعائيَّة **coni vasculosi**

هي فصيصاتَ البربخ .

انظر تحت lobuli epididymidis .

المَخْروطُ الشِّرْيانيّ **conus arteriosus TA**

هو الجزء الأمامي الخلفي من البطين الأيمن القلبي ، والذي يفصله العرف فوق البطين عن باقي البطين ، والذي يتصل بالجذع الرئوي ليشكل مجرى تدفق الدم في البطين الأيمن . يسمى أيضاً (Infundibulum) .

المَخْروطُ المَارِنُ للحَنْجَرَة **conus elasticus laryngis TA**

1 ـ المخروط المارن : هو الجزء الوحشي المزدوج من الغشاء الليفي المارن للحنجرة ، والذي يمتد صعوداً في ثخانات متوازية من الغضروف الحلقي إلى الأربطة الصوتية . يسمى أيضاً الرباط الحلقي الدرقي الوحشي (Lateral cricothyroid ligament) ، أو (Cricothyroid) ، أو الغشاء الحلقي الدرقي أو الغشاء الحلقي الصوتي (Cricovocal membrane) ، أو الغشاء الحلقي الصوتي (Membrana cricovocalis) .

المَخْروطُ النُّخاعي **conus medullaris TA**

هي النهاية السَفلية مخروطية الشكل للنخاع الشوكي على مستوى الفقرات القطنية العلوية ، يسمى أيضاً المخروط الانتهائي (Conus terminalis) ، أو المخروط الانتهائي للنخاع (Terminal cone of spinal cord) .

المَخْروطُ الانْتِهائيّ **conus terminalis**

الحسي المتعدد (Multisensory convergence) .

التقارب الحسي المتعدد **multisensory convergence**

انظر تحت multimodal convergence .

نُقْطَةُ التَّقارُبِ القَريبَة **near point of convergence**

هي نقطة تقاطع خطوط الإبصار عند التقارب الأقصى .

تَقارُبٌ سَلْبيّ **negative convergence**

هو تجانحٌ، أو تباعد المحاور البصرية باتجاه الخارج .

تَقارُبٌ إيجابيّ **positive convergence**

هو انحرافُ المحاور البصرية باتجاه الداخل .

تَقارُبٌ دانٍ (داني) **proximal convergence**

هو التقاربُ الذي يثيره الشعور بقرب الشيء .

تَقارُبٌ تَوَتُّري **tonic convergence**

هو التقاربُ الذي يتحقق استمراره بفضل توتر العضلة المستقيمة الإنسية للمقلة في وضعيتها الأولية .

مُتقارِب **convergent**

هو الشيء الذي يتلاقى أو يميل باتجاه نقطة مشتركة .

مِقياسُ التَّقارُب **convergiometer**

هي أداة لقياس الحول الخافي .

مِنْوالٌ تحاوريّ ؛ نمَط تخاطبيّ **conversational mode**

طريقة كونفرس **Converse method**

[طريقة منسوبة للجراح جون ماركيز كونفرس (John Marquis Converse)، وهو جراح تجميل أمريكي، (1909-1981)] .

انظر تحت method .

1ـ تحْويل 2ـ تظاهُرٌ **conversion**

1ـ الانتقال من شكل إلى شكل آخر أو من حالة إلى حالة أخرى .

2ـ آلية دفاع لا شعورية تتلخص في أن يتحول القلق الناتج عن صراع داخل النفس، ويجري

عادي أو شائع أو تقليدي أو متعارف عليه .

خَليْطَةٌ اعْتياديّة **conventional alloy**

هَي خَليطَةَ معروفة المكونات لا تدخل في تركيبها عناصر جديدة .

الذَّاكرة التَّقليدية (في الحاسوب) **conventional memory**

هو جزء من ذاكرة الحواسيب المتوافقة مع أنظمة (IBM) .

تقارُب **convergence**

1ـ في علم التطور : هو نشوء أو تطور بنيات أو عضويات متماثلة في أصانيف غير مترابطة .

2ـ في علم الأجنة : هي حركة الخلايا من المحيط باتجاه الخط الناصف أثناء تكون المعيدة (Gastrulation) .

3ـ في الفيزيولوجيا البصرية : هو الميلان المتناسق لخطي الإبصار المستقيمين باتجاه نقطة التثبيت المشتركة أو نقطة التثبيت بعينها .

4ـ في طب الأعصاب : استثارة عصبون حسي واحد بتدفعات واردة من عصبونات متعددة أخرى، وبخاصة في الجهاز العصبي المركزي .

تَقارُبٌ تَكَيُّفيّ **accommodative convergence**

هو القسمَ من التقارب الذي يتحقق باستثارة التكيف .

مدى التقارب **amplitude of convergence**

انظر تحت amplitude .

نُقْطَةُ التَّقارُبِ البَعيدَة **far point of convergence**

هي نقطة تقاطع خطوط الإبصار عند التقارب الأدنى .

التَّقارُبُ الانْدماجيُّ **fusional convergence**

هو التقاربَ الناتج عن محاولة الإبقاء على التنبيه البصري على نقرة كل من العينين .

التقارب متعدد الدوارج **multimodal convergence**

في طب الأعصاب : هو التقارب الذي يحدث حين تكون الدفعات القادمة من عصبونات النماذج الحسية مختلفة . يسمى أيضاً التقارب

ذو سطح مستدير متبارز بعض الشيء ، يشبه قطعاً من السطح الخارجي لكرة .

تحدُّب **convexity**

1 ـ حالة أن يبدي الشيء تحدباً .

2 ـ منطقة مستديرة متبارزة بعض الشيء على سطح عضو ما أوبنية ما .

تحدُّبُ القاعِدة **convexobasia**

تشوه في العظم القذالي بحيث يكون مثنياً إلى الأمام بفعل العمود الفقري ، والذي يشاهد في سياق التهاب العظم المشوه .

مُحدَّبٌ مُقعَّر **convexoconcave**

ذو وجه محدب وآخر مقعر .

مُحدَّبُ الوَجهَين **convexoconvex**

ذو سطحين متقابلين محدبين .

نقل **conveyance**

تبديل الموضع أو المكان .

مُلفّف **convoluted**

مطوي بشكل لفافة .

تلفيف **convolution**

هو التواء غير منتظم ، أو بروز ملتو ناتج عن انثناء البنية على بعضها .

انظر تحت gyri cerebri .

تَلْفيفُ بروكا **Broca's convolution**

هو التلفيف الجبهي السفلي في نصف الكرة الأيسر للمخ . يسمى أيضاً (Broca's gyrus) ، أو (Broca's region) .

تَلاَفيفُ المُخ **convolutions of cerebrum**

انظر تحت gyri cerebri .

تَلْفيفُ هيشل **Heschl's convolution**

هو التَّلْفيفُ الصُّدْغيُّ المُسْتَعْرِضُ الأماميُّ .

انظر تحت gyri temporales transversi .

التَّلْفيفُ القَذاليُّ الصُّدْغيُّ **occipitotemporal convolution**

هو إما التلفيف القذالي الصدغي الوحشي ، أو التلفيف القذالي الصدغي الإنسي .

انظر تحت gyrus occipitotemporalis medialis .

مُحدَّب **convex**

تعبير عنه بمظهر رمزي جسدي .

انظر تحت conversion disorder .

تحويل داخلي **internal conversion**

في تلاشي المصاوغ : هي مرحلة انتقالية بين حالتي من الطاقة النووية ، والتي لا تتصف بإطلاق فوتون بل تنتقل الطاقة بدل ذلك إلى مدار الإلكترون الداخلي والذي يجري قذفه من الذرة .

كونفيرتاز **convertase**

هو إنزيم ينتمي إلى جملة المتممة ، والذي ينشط مكونات معينة من النظام .

كُونْفيرْتاز C3 **C3 convertase**

هو إنزيم يشطر مكون المتممة C3 ، إلى C3a وC3b ؛ والكونفيرتاز C3 في السبيل الكلاسيكي (التقليدي) هو C4b,2a ، أما إنزيمات كونفيرتاز C3 في السبيل البديل فهي C3b,Bb ، وC3b,P,Bb .

انظر تحت complement .

كونفيرتاز طليعة منشط **C3 proactivator convertaseC3**

الاسم القديم للعامل D .

كونفيرتازC5 **C5 convertase**

هو إنزيم يشطر مكون المتممة C5 إلى C5a وC5b ؛ والكونفيرتاز C5 في السبيل الكلاسيكي(التقليدي) هو C4b,2a,3b ، أما إنزيمات الكونفيرتاز في السبيل البديل فهي C3bn,Bb و C3bn,P,Bb .

انظر تحت complement .

مُحوّل **converter**

أداة أو جهاز يستخدم للتغيير من شكل إلى شكل آخر ، أو من حالة إلى حالة أخرى ، كما في المحول الذي يحول التيار الكهربي من فولطية معينة إلى تيار من فولطية مختلفة .

كونفرتين **convertin**

هو الشكل المنشط من عامل التخثر السابع .

انظر تحت coagulation factors .

Zuckerkandl's convolution **تَلْفيفُ زوكركاندل**

هي التَّلْفيفُ جَنيبُ الانْتهائيُّ .

انظر تحت gyrus paraterminalis .

convolutional **تلفيفيّ**

يشير إلى أو يتعلق بالتلفيف أو التلافيف .

convolutionary **تلفيفيّ**

يشير إلى أو يتعلق بالتلفيف أو التلافيف .

Convolvulaceae **المحموديات**

نبات من فصيلة مجد الصباح ، وهي فصيلة كبيرة من النباتات تشتمل على نباتات معترشة وأعشاب وشجيرات وأشجار . من أجناسها ذات الأهمية الطبية كل من اللبلاب (Convolvulus) ، والديداء (Ipomoea) .

Convolvulus **اللَّبْلاب**

جنس من نباتات مزهرة من فصيلة المحموديات ، والذي يستوطن تركيا ومناطق الشرق الأوسط المجاورة . أحد أنواعه هو المحمودة (Convolvulus) التي يستفاد من جذرها في صناعة الأدوية .

Convolvulus scammonia **السَّقَمُونْيا ؛ المَحْمودَة**

نوع من اللبلاب ، والذي يستفاد من جذوره في صناعة الأدوية .

convulsant **مُسَبِّبٌ للاخْتلاج**

1 ـ يسبب أو يؤدي إلى الاختلاج .

2 ـ عامل يسبب الاختلاج .

convulsibility **الاسْتِعداد للاخْتِلاج**

لفظ يدل على إمكانية الإصابة بالاختلاج .

convulsion **اخْتِلاج**

1 ـ تقلص عنيف لا إرادي ، أو سلسلة من التقلصات التي تصيب العضلات الإرادية .

2 ـ انظر تحت seizure .

audiogenic convulsion **اخْتلاجٌ سَمْعيُّ المَنْشَأ**

نوع من الاختلاج الذي يحدث غالباً نتيجة للتعرض لمؤثر سمعي .

central convulsion **اخْتلاجٌ مَرْكَزيُّ المَنْشَأ**

اختلاج لا يستثار بأي سبب خارجي ، بل يحدث نتيجة آفة في الجهاز العصبي المركزي . يسمى أيضاً اختلاج مجهول السبب (Essential convulsion) .

choreic convulsion **اخْتلاجٌ رَقَصيّ**

clonic convulsion **اخْتلاجٌ رَمَعي**

اختلاج يتصف بتناوب تقلص وارتخاء العضلات .

coordinate convulsion **اخْتلاجٌ مُتَناسق**

crowing convulsion **اخْتلاجٌ شَهيقيّ**

هو تَشَنُّجُ الحَنْجَرَة الصَّريريّ .

انظر تحت laryngismus stridulus .

epileptiform convulsion **اخْتلاجٌ صَرْعيُّ الشَّكْل**

essential convulsion **اخْتلاجٌ مَجْهُولُ السَّبَب**

هو اخْتلاجٌ مَرْكَزيُّ المَنْشَأ .

انظر تحت central convulsion .

febrile convulsion **اخْتلاجٌ حُمَّويّ**

هو شكل من أشكال الاختلاجات المصاحبة للحمى الشديدة ، والذي يحدث عند الرضع والأطفال . يسمى أيضاً (Hyper- pyrexic convulsion) ، أو (Hyperthermal con- vulsion) .

hyperpyrexic convulsion **اخْتلاجٌ حُمَّويّ**

انظر تحت febrile convulsion .

hyperthermic convulsion **اخْتلاجٌ حُمَّويّ**

انظر تحت febrile convulsion .

hysterical convulsion **اخْتلاجٌ هستيري**

هي اختلاجات من مصدر نفسي المنشأ ، كما في اضطراب التحويل . يسمى أيضاً اختلاج هستيري الشكل (Hysteroid convulsion) .

انظر تحت hysteroepilepsy .

hysteroid convulsion **اخْتلاجٌ هستيريُّ الشَّكْل**

انظر تحت hysterical convulsion .

infantile convulsion **اخْتلاجٌ طفْلي**

local convulsion **اخْتلاجٌ مَوْضعي**

هو تشنج بسيط يصيب عضلة واحدة ، أو جزءاً واحـداً ، أو عـضـواً واحـداً ، كـمـا في صـرع جاكسون .

mimetic convulsion **اخْتلاَجٌ إيمائيّ**

هَو التشنجَ الوجهي .

انظر تحت tic .

mimic convulsion **اخْتلاَجٌ إيمَائيٌّ**

هَو التشَنج الَوجهي .

انظر تحت tic .

oscillating convulsion **اخْتلاَجٌ مُتَذَبَذب**

puerperal convulsion **اخْتلاَجٌ نفاسيّ**

هَي تشنَجاتَ لا إرادية تصيب النساء قبيل ، أو أثناء ، أو في أعقاب الولادة .

salaam convulsion **اخْتلاَجٌ سَلاَمي**

هَي التشنجاتَ الطفلية .

انظر تحت infantile spasms .

spontaneous convulsion **اخْتلاَجٌ عَفْوِيٌّ**

suffocative convulsion **اخْتلاَجٌ خانِق**

tetanic convulsion **اخْتلاَجٌ تَكَزُّزِيّ**

هَو تشنج توتَري لا يترافق بفقد الوعي .

انظر تحت tetanus .

انظر تحت tetany .

tonic convulsion **اخْتلاَجٌ تَوَتُّري**

هَو تقلص اَلعضـلات لفـتـرات زمنية طويلة ، والذي يحدث نتيجة التفريغ الصرعي .

toxic convulsion **اخْتلاَجٌ تَسَمُّمي**

traumatic convulsion **اخْتلاَجٌ رَضْحَي**

uremic convulsion **اخْتلاَجٌ يوريمي**

هَو اختلاج يَحدث بسبب اليوريمية ، أو احتباس المواد التي ينبـغي طرحــهـا من الدم بواسطة الكلية .

convulsivant **مُسَبِّبٌ للاخْتلاج**

انظر تحت convulsant .

convulsive **1ـ مُسَبِّبٌ للاخْتلاج**

2ـ اخْتلاجيّ

يشير إلى ، أو يتعلق بالاختلاج ، أو ذو طبيعة اختلاجية .

cool **مُعْتَدِلُ البُرُوْدَة**

غير دافئ .

Cooley's anemia **فَقْرُدَم كولي**

[فقر دم منسوب للطبيب توماس بنتون كولي (Thomas Benton Cooley) ، وهو اختصاصي طب الأطفال أمريكي الجنسية 1871-1945] .

انظر تحت thalassemia .

Coolidge tube **أنبوب كوليدج**

[أنبوب منسوب للفيزيائي وليام ديفيد كوليدج (William David Coolidge) ، وهو اختصاصي فـيـزياء أمـريكي الجنسية 1873-1977] ، وهو أنبوب يستخدم لتوليد الأشعة السينية .

انظر تحت tube .

cooling **تَبْرِيد**

هي عملية خفض درجة الحرارة ، وبخاصة فيما يتعلق بدرجة حرارة أجسام المرضى وحيوانات التجارب .

انظر تحت hypothermia .

peritoneal cooling **تَبْرِيدٌ صِفاقِيّ**

pleural cooling **تَبْرِيدٌ جَنْبِيٌّ**

Coomb's test **اخْتِبارُ كومس**

[اختـبـار منسوب للطبـيب روبرت رويسـتـون آمـــوس كـــومس (Rorbert Royston Amos Coombs) ، وهو اختصاصي مناعيات بريطاني الجنسية ، مولود عام 1921] .

انظر تحت antiglobulintest .



Convulsion **اختــلاج**

Cooper's breast, fascia, etc. **ثدي كوبر، لفافة كوبر، إلخ**

[لفافة او ثدي منسوب للسير أستلي باستون كوبر (Sir Astley Paston Cooper) ، وهو جراح *إنجليزي ، 1768-1841]* ، وهي لفافة المشمرة (Fascia Cremasterica) ، وكذلك هو الثدي الهيوج بحسب كوبر والذي يطلق على ألم الثدي العصبي .

انظر تحت breast .

انظر تحت fascia .

cooperation **تعاوُن**

هو تضافر وتنسيق الجهود في سبيل الوصول إلى هدف معين .

cooperative **تعاوُنيّ**

يتصف بالتعاون (تضافر وتنسيق الجهود في سبيل الوصول إل هدف معين) .

cooperative services **خَدَماتٌ تَعاوُنيَّة**

هي خدماتَ تشترك في تقديمها طوعاً عدة جهات تعمل معاً على تحقيق أهدافها المشتركة التي ترمي إلى التوصل إليها من خلال تقديم تلك الخدمات .

Cooperativity **تعاونية**

هي ظاهرة التغير في التحام اللجائن المتلاحقة عند التحام لجين أولي بإنزيم ، أو مستقبلة ، أو أي جزيء آخر ذي مواقع ارتباط متعددة ، كما يحدث كثيراً في حالة الإنزيمات التي تبدي تفارغاً .

negative cooperativity **تعاونية سالبة**

هي تعاونية تكون فيها ثابتة التفارق لارتباط كل لجين على التوالي أعلى من سابقه بحيث تتناقص ألفة الالتحام باطراد .

positive coopperativity **تعاونية موجبة**

هي تعاونية تكون فيها ثابتة التفارق لارتباط كل لجين على التوالي أقل من سابقه بحيث تتزايد ألفة الالتحام باطراد .

Cooperia **الكوبَريَّة**

هي جنس من الديدان المسودة من فصيلة الأسطونيات الشعرية . تعتبر الكوبرية الوارمة (Cooperia oncophora) والكوبرية المشطية (Cooperia pectinata) والكوبرية المنقطة (Cooperia punctata) طفيليات تتواجد في الأمعاء الدقيقة للماشية والحيوانات المجترة الأخرى .

Cooperia oncophora **الكوبَريَّةُ الوارمَة**

انظر تحت Cooperia .

Cooperia pectinata **الكوبَريَّةُ المُشْطيَّة**

انظر تحت Cooperia .

Cooperia punctata **الكوبَريَّةُ المُنَقَّطَة**

انظر تحت Cooperia .

cooperiasis **داء الكوبرية**

هي إصابة الحيوانات المجترة بعدوى الطفيليات من جنس الكوبرية .

cooperid **كوبَريَّة**

هي دودة مسودة طفيلية من جنس الكوبرية .

Coopernail's sign **علامة كوبرنيل**

[علامة منسوبة للطبيب جورج بيتر كوبرنيل (George Peter Coopernail) ، وهو طبيب *أمريكي ، 1876-1962]* .

انظر تحت sign .

coordinate **إحداثي**

واحدة من مجموعة أرقام والتي تحدد موقع نقطة ما في الفراغ .

coordination **1ـ تنسيق**
2ـ تناسُق

هو العمل المتناغم للأعضاء والأجزاء المتساندة ؛ ويستخدم هذا المصطلح تحديداً لوصف عمل الجهاز الحركي للدماغ والمسؤول عن تنظيم العمل المشترك لمجموعات معينة من العضلات ؛ بحيث تؤدي استجابات تلاؤمية مفيدة .

coordination of benefits **تَنْسيقُ المَنافع**

هي صيغة تعاقدية تسهل تضافر الجهود على صعيد جمع المعلومات وإدارة وإعداد الكشوف المتعلقة بالتأمين الصحي .

(Vincent Cope، وهو جراح إنجليزي، عاش ما بين 1881-1974] ، وهي عـلامة القطنية (Psoas sign) في التهاب بالزائدة .
انظر تحت sign .

copepod **جادِف**
أي حيوان من رتبة الجوادف (Copepoda) .

Copepoda **الجَوادِف**
رتبـة من الحيـوانات المفـصلية الدقـيقـة مائية المستوطن من صنف القشريات ، والذي يعمل بعضها كثوي وسيط للدودة المسودة المسماة العوساء (Diphyllobothrium) ، وبعضـها الآخر كـثـوي للـدودة الشـريطيـة المسـمـاة التنينة (Dracunculus) ؛ وقـد يـؤدي ابتـلاع الجـوادف المصابة بعـدوى الطور اليرقي المبكر من لولبية الرحم المانسونية إلى إصابة البشر بداء المكفنات (Sparganosis) .

Copernicia **كوبِرْنيكِيَّة**
هو جنس من النخيل يستوطن الأمريكيتين . من أنواعها الكرنوبة التي تستوطن أمريكا الجنوبية وتنتج شمع الكرنوبة .

coping **قَوْب (أسنان)**
في طب الأسنان : هي قلنسـوة مـعـدنيـة ذات شكل مخروطي مبتور ترتكز على سن طبيعية محضرة ، وتعمل كدعـمة لبدلات الأسنان . تسمى أيضاً (Cope) ، وتسمى أيضاً كشتبان (Thimble) .

long coping **قُوْبٌ طَويل**
short coping **قُوْبٌ قَصير**
transfer coping **قُوْبٌ نَقْليّ**
في طبّ الأسنان : هو غطاء أو قلنســـوة من المعـدن أو الراتين الأكـريليكي التي تسـتـعـمل لتثبيت قالب داخل الطبعة .

copiopia **إرْهاقُ البَصَر**
هو إجهاد يصيب العين من سوء الاستعمال ، أو الإفراط في العمل .

coplanarity **اشْتِراكٌ في المَستَوَى**
هي حـالة وقـوع أكـثـر من شيء في مسـتـوى

coordinator **مُنَسِّق**
هو الشخص الذي يقوم بعملية التنسيق .

health coordinator **مُنَسِّقٌ صِحِّيّ**
هو الشخص الذي يشرف على كفاءة الخدمات الصـحـيـة من خـلال تنسـيق الأعـمـال الإدارية للمؤسسة الصحية .

co-ossification **تَلاحُمٌ تَعَظُّمِيّ**
هي عـملـية أو حـالة التـحـام جـزئين مـعـاً بفعل التعظم .

co-ossify **يَتَلاحَمُ بالتَّعَظُّم**
أي يلحم الجزئين معاً بواسطة التعظم .

copaiba **كُبَيْباء**
هي عصارة راتينية نباتية .

copal **كابال**
اسم تجـاري لعـدد من المواد الهـامـة التي تتنوع كثيراً في مصادرها وخواصهـا ؛ تم الحصـول على أنواع الكابال الأولية من أشجار تنمو في المنطقـة المدارية من أمـريكا . وهي تدخل في صناعـة العـديد من أنواع الورنيش والملاط ، وتستعمل في طب الأسنان في مركبات الصوغ وفي ورنيش حفر الأسنان .

coparaffinate **كوبارافينات**
هي مزيج من الأحماض الإيزوبارافينية غير الذوابة في الماء والمتعادلة بأمينات هيدروكسي بنزيل دي ألكيل أيزوأكتيل ؛ والتي تستعمل كمضاد للعدوى الجلدية .

copayment **المُشارَكَة في التَّسْديد**
قيام فرد أو جهة أو مؤسسة بتحمل جزء من الأتعاب أو التكاليف .

cope **قَوْب (أسنان)**
1 ـ في طب الأسنان : هو النصف العلوي من حوجلة تستعمل في فن القولبة ؛ وتطبق في طب الأسنان التعويضي على القسم العلوي أو المجوف من حوجلة البدلة السنية .
2 ـ انظر تحت coping .

Cope's sign **علامة كوب**
[عـلامـة منسوبة للسـيـر فنسنت كـوب (Sir

0.092 ميجا إلكترون فولت) ؛ والذي يستعمل في المعالجة الإشعاعية ، وفي التصوير ، والدراسات الحركية للقوائف وقياس الجرعات .

أسيتو أرسنيت النحاس **copper acetoarsenite**

مسحوق أخضر زمردي ، يستحصل عليه من تفاعل أرسنيت الصوديوم ، وسلفات الصوديوم ، وحمض الأسيتيك ؛ ويؤدي ابتلاعه إلى التسمم ، وهو يستعمل كمبيد حشري ومادة لحفظ الأخشاب . يسمى أيضاً أخضر باريس (Paris green) .

طَوقٌ نُحاسيّ **copper band**

انظر تحت copper ring .

سيترات النحاس **copper citrate**

انظر تحت cupric citrate .

انظر تحت citrate .

خَطٌّ نُحاسيّ (في اللثة) **copper line**

هو خط مَخضر أو أرجواني على حافة اللثة يشاهد في حالات التسمم بالنحاس .

حَلَقَةٌ نُحاسيَّة **copper ring**

هو أنبوب رَقيق من النحاس يستخدم ليحوي ويدعم مادة الطبعة ، ويمكن استعماله كتاج مؤقت على الأرحاء أو كمسندة طوقية عند حشو الأرحاء .

سلفات النحاس **copper sulfate**

انظر تحت cupric sulfate .

انظر تحت sulfate .

زاجٌ أخْضَر **copperas**

هو سلفات الحديدوز التجارية ، والتي تستعمل كمطهر ومزيل للروائح .

انظر تحت ferrous sulfate .

انظر تحت ferrous .

نحاسِيَّةُ الرَّأس **copperhead**

1 ـ الاجكسترودون كونترتركس (Agkistrodon contortrix) حية سامة من الحيات التي تقطن الولايات المتحدة ، وهي ذات جسم بني نحاسي مخطط بخطوط قاتمة . تسمى أيضاً واحد .

مُشتَرِكُ المستَوى **coplanary**

هي وقوع عدة أشياء في مستوى واحد .

بَلمَرٌ مُشتَرك **copolymer**

هو بلمر يحتوي على مواحيد من أكثر من نوع .

البلمر المشترك 1 **Copolymer 1**

اسم تجاري لعديد ببتيد تخليقي ، والذي يتكون من ألانين ، وحمض الجلوتاميك ، والليسين وتيروزين . وهو يشابه البروتين المياليني القاعدي ، ويستعمل تجريبياً في علاج التصلب المتعدد الناكس والمهتدئ (الهدأة) ، ويعطى تحت الجلد .

النُّحَاس **copper**

هو معدن طروق لونه مائل إلى الحمرة ، رقمه الذري 29 ، ووزنه الذري 63.54 ، رمزه Cu ، أملاحه سامة . ويعد النحاس عنصراً أساسياً في الغذاء ، ويدخل في تركيب العديد من البروتينات بما فيها السيرولوبلازمين ، ووالإرثروكوبرين ، وأكسيداز السيتوكروم c ، والتيروزيناز . يمكن أن يؤدي عوز النحاس ، وهو أمر نادر الحدوث ، إلى فَقْرُ الدَّم النَّاقص الصِّباغ الصَّغيرُ الكُرَيَّات ، وقلة العَدلاَت ، وتغيراتَ في العظام . بينما يؤدي تراكمه المفرط في الجسم إلى التسمم بالنحاس .

النحاس 64 **64copper**

هو نظير مشع للنحاس ، كتلته الذرية 64 ، وعمر النصف 12.70 ساعة . تنبعث منه البوزترونات (طاقة 0.657 ميجا إلكترون فولت) ، وجزيئات بيتا (طاقة 0.571 ميجا إلكترون فولت) ، وأشعة جاما (طاقة 1.34 ميجا إلكترون فولت) ؛ ويستعمل في تفرس الدماغ .

النحاس 67 **copper 67**

هو نظير مشع للنحاس ، كتلته الذرية 67 ، وعمر النصف 2.58 يوماً ، تنبعث منه جزيئات بيتا (طاقة 0.395 ، 0.484 و 0.577 ميجا إلكترون فولت) ، وأشعة جاما (طاقة 0.185 ،

هي كائنات حية تعيش في البراز .

شَبَقٌ برازيّ **coprolagnia**

هي إثارة جنسية تحدث بالترافق مع البراز أو التبرز .

بُذاء **coprolalia**

هو الاستعمال القهري والمتكرر للغة (بذيئة) ، وبخاصة استعمال ألفاظ تتعلق بالبراز ؛ كما يشاهد في بعض حالات الفصام ومتلازمة جيل دي لاتوريت (عرات وجهية وأعراض عصابية) . يسمى أيضاً (Coprophrasia) .

هَوَسُ البُذاء **coprolalomania**

هي حالة مرضية تتصف بالبذاء .

تحَصي البراز **coprolith**

انظر تحت fecalith .

عِلمُ البراز **coprology**

انظر تحت scatology .

وَرَمٌ برازيّ **coproma**

انظر تحت stercoroma .

هَوَسُ البراز **copromania**

هو الاهتمام المرضي بالبراز .

الغائطِيَّة **Copromastix**

هو جنس من الحيوانات الأولية المستوطنة للبراز من رتبة السوطاوات صنف السَّوائطُ الحَيَوانيَّة ، له أربع سياط أمامية متساوية الطَول وسَوط ذيلي .

الغائطيَّةُ **Copromastix**

البْرُوفاتسيكيَّة **prowazeki**

نوع من الغائطية يتواجد في براز الجرذان والبشر في البرازيل .

السَّلَحِيَّة **Copromonas**

هي جِنسٌ مِنَ الحَيَوانات الأوالي السَّوطيَّة .

السَّلْحِيَّةُ الرَّقيقَة **Copromonas subtilis**

انظر تحت copromonac .

الجِلاّلات **Coprophaga**

قِسْمٌ مِنَ الحَشَرات الْمُغَمَّدَة الجَناح .

أكلُ البراز **coprophagia**

انظر تحت coprophagy .

حية المرتفعات .

2 ـ القصاص المتعجرفة (Denisonia superba) ، وهي حية شديدة السمية توجد في أستراليا وجزر سليمان .

سَلَسُ البراز **copracrasia**

مصطلح للدلالة على عدم القدرة على التحكم في إفراغ البراز .

مُسَهلٌ شديد **copragogue**

هو عامل يسبب الإسهال الشديد .

انظر تحت cathartic .

مُرَسِبَةٌ مشاركة **coprecipitin**

هو مرسبة تشترك مع مرسبة ثانية أخرى ، أو أكثر في نفس المصل .

قيءُ البراز **copremesis**

هو تقيؤ المادة البرازية .

كوبرين **coprine**

هو أحد مشتقات حمض الجلوتاميك ، والذي يوجد في فطر (Coprinus atramentarius) الصالح للأكل . مستقلبه الفعال هو هيدرات السيكلوبروبانون .

كوبرنيس **Coprinus**

تسمى قلنسوات الحبر ، وهي جنس من المشروم من فصيلة (Agaricales) أحد أنواعها الصالحة للأكل هو (Coprinus atramentarius) ، وهو يحوي على مادة الكوبرين التي تسبب استجابة سامة شبيهة بثنائي السلفيرام في وجود الكحول .

سابقة بمعنى البراز **copro-**

هي صيغة ملحقة تشير إلى ما يتعلق بالبراز .

ضِدٌ برازيّ **coproantibody**

ضد يوجد في البراز ، وغالباً ما يكون من نوع الجلوبيولين المناعي A (IgA) الإفرازي .

المكوّرَة البرازيَّة **Coprococcus**

هو جنس من الجراثيم الذي يتكون من مكورات لاهوائية موجبة الجرام ، يُعزل أحياناً من العينات البشرية .

مُعايِشُ البراز **coprocolous**

خـفـيف ، وارتـفـاع مـعـدلات كـوبروبـرفـيـرين الكريات الحمراء .

الكوبروبُرفيريَّة الوراثية **hereditary coproporphyria**

هي برفيرية كـبدية تنتقل عبر خلة سائدة متعلقة بالكروموسوم الجسدي ، والتي تتسم بهجمات متكررة من خلل الأجهزة الهضمية والعصبية الشبيه لما يحدث في البرفيرية الحادة المتقطعة ، وأحـيانـاً بـحـسـاسـيـة ضـوئـيـة جلدية . ويفـرز كـوبروبرفيرين III بشكل مستمر في البراز ، ويفـرز حـمض D - أمـينوليـفـيـولينيك ، والبروفوبيلينوجين بشكل متقطع في البول . ينتج المرض عن عـوز جـزئي في وظـيـفـة الأكسيداز المولد للكوبروفيرين .

كوبرُوبُرفيرين **coproporphyrin**

هو البرفيرين الناتج عن أكسدة جسور المثيلين في مولد الكوبروبرفيرين . يفرز الكوبروبرفيرين III في البـراز والبـول في الكـوبروبرفـيـرية الوراثيـة ، وبخاصـة وقت الهـجـمـات الحـادة ؛ ويفرز الكوبروبرفيرين I في البراز والبول في الكـوبروبرفـيـريـة الخلقـيـة المولدة للكريات الحمر .

مُولِّدُ الكوبرُوبُرفيرين **coproporphyrinogen**

هو مولد البرفيرين الذي يكون لكل حلقة بيرول فيـه سلسلة مـيثـيل جـانبـية واحـدة ، وسلسلة بربيونات جانبية واحدة ؛ ويتكون من خلال نزع الكربوكـسـيـل الـتـأكـسـدي من مـولد اليـوروبرفـيـرين . يمكـن أن توجـد أربعـة مصاوغات محتملة من هذا المركب إلا أن اثنين منهـا فـقط يوجـدان بشكل طبـيـعي : النمط I وIII ، ويعمل الأخير كوسيط وظيفي للتخليق البيـولوجي للهيم فيمـا ينتج الأول من تفاعل جانبي مجهض .

أكسيداز مُولِّدُ الكوبرُوبُرفيرين **coproporphyrinogen oxidase**

هو إنزيم من صنف الإنزيمات المؤكسدة المختزلة ، والتي تحفـزتحول مولد الكوبروبرفيرين III إلى

آكِلُ البراز **coprophagous**

هو ما يتغذى على البراز أو الروث .

آكِلُ البراز **coprophagy**

هو الابتلاع الاعتيادي للروث أو البراز .

أليفُ البراز **coprophil**

هو مكروب أليف للبراز .

1ـ أليف البراز **coprophile**

2ـ مهووس بالبراز

1ـ مكروب أليف للبراز .

2ـ في طب النفس : مهووس بالبراز .

1ـ هَوَسُ البراز **coprophilia**

2ـ شَبَقٌ برازيّ (طب نفسي)

هو اهتمـام يصل إلى حد الاستحواذ بالبراز أو القذارة ، وبخاصـة فيمـا يتعلق بالخطل الجنسي الذي ترتبط الإثارة الجنسية فيه بالبراز .

شبق بالبراز **coprophiliac**

انظر تحت coprophilic .

1ـ مَهْووسٌ بالبراز (طب نفسي) **coprophilic**

2ـ أليفُ البراز (من المكروبات)

يتصف أو يتسم بالشبق البرازي .

1ـ مَهْووسٌ بالبراز (طب نفسي) **coprophilous**

2ـ أليفُ البراز (من المكروبات)

كائن حي يعيش أو ينمو على البراز أو الروث أو في المـيـاه الملوثة بالبـراز ؛ وهـو مـا تـتـصـف به مكروبات وفطريات مـعـينة . يسـمى أيضـاً (Coprophilic) .

1ـ رُهابُ التَبَرُّز **coprophobia**

2ـ رُهابُ البراز (طب نفسي)

هو اشمئزاز غير طبيعي من البراز أو التبرز .

بُذاء **coprophrasia**

انظر تحت coprolalia .

الكوبرُوبُرفيريَّة **coproporphyria**

هو وجود الكوبروبرفيرين في البراز .

الكوبرُوبُرفيريَّة المكونة للكريات الحمر **erythropoietic coproporphyria**

هي برفـيـرية مكونة للكريات الحـمـر شـديدة الندرة ، والتي تتصف بتحسس ضوئي جلدي

هو الاتحـاد الجنسي بين الذكـر والأنثى ؛ وهي العملية التي تنتقل بموجبها النطاف من الذكر إلى الأنثى ؛ ويستعمل هذا المصطلح تحديداً عند الحيوانات من دون البشر .

عَدَسَةٌ شَبِيهَةٌ بِزُجاجَةِ السَّاعَة **coquille**

عدسة أو قطعة زجاجية ذات ثخانة موحدة شبيهة بزجاجة الساعة .

قلب **cor TA**

القلب هو العضو العضلي المسؤول والذي يحافظ على دوران الدم .

قَلْبٌ مُتَشَحِّم **cor adiposum**

انظر تحت fatty heart .

القَلْبُ الشِّرْيانيّ **cor arteriosum**

انظر تحت left heart .

قَلْبٌ ذُو مَسْكَنَيْن **cor biloculare**

هو شذوذ خلقي يتصف بعدم تكون الحواجز بين الأذينين وبين البطينين ، مما يجعل القلب مكوناً من حجرتين (أذين واحد وبطين واحد) ، وصمام أذيني بطيني مشترك .

قَلْبٌ بَقَرِيّ **cor bovinum**

هو قلبٌ متضخم بشكل بالغ نتيجة تضخم أو توسع البطين الأيسر ؛ يسمى أيضاً (Cor tau- rinum) ، و (bovine heart) ، و (Ox heart) .

القَلْبُ الأَيْمَن **cor dextrum**

انظر تحت right heart .

قَلْبٌ أَزْغَب **cor hirsutum**

انظر تحت cor villosum .

قَلْبٌ نَوَّاسِيّ **cor pendulum**

قَلْبٌ ثُلاثِيُّ المَساكِن **cor pseudotriloculare**

الكاذِبَةِ ثُنائِيُّ الأُذَيْنَيْن **biatriatum**

قَلْبٌ رِئَوِيّ حاد **cor pulmonale, acute**

هو تحميل مفرط للبطين الأيمن بسبب فرط ضغط الدم الرئوي ، والذي ينتج عادة عن انصمام رئوي حاد .

قَلْبٌ رِئَوِيّ مزمن **cor pulmonale, chronic**

هو مَرَض قلبي يتصف بضخامة البطين الأيمن وأحياناً توسع البطين تبعاً لوجود مرض يؤثر

مولد البروتوبرفيرين IX ، ويحدث هذا التفاعل في المتقدرات ، ويعتبر جزءاً من مسلك التخليق البيولوجي للهيم . ويؤدي عوز هذا الإنزيم ، وهو خلة سائدة متعلقة بالكروموسوم الجسدي ، إلى الكوبروبرفيرية الوراثية .

بِيلَةٌ كُوبْرُوبُرفيرينِيَّة **coproporphyrinuria**

وجود الكوبروبرفيرين في البول .

كُوبْرُوسْتانُول **coprostanol**

هو ستيرول مشبع يوجد في البراز ، يتكون بواسطة اختزال الجراثيم للكوليستيرول في الأمعاء . يسمى أيضاً كوبروستيرول (Coprosterol) ، وكوبروستيرين (Coprosterin) .

انْحِشارُ الغائِط **coprostasis**

انحشار البراز في الأمعاء .

رُهابُ الإِمْساك **coprostasophobia**

الخوف غير الطبيعي من الإمساك .

كوبروستيرين **coprosterin**

انظر تحت coprostanol .

كُوبْرُوسْتيرول **coprosterol**

انظر تحت coprostanol .

أَوالي بِرازِيَّة **coprozoa**

هي حيوانات أولية توجد في المادة البرازية خارج الجسم ، إلا انها لا تستوطن الأمعاء .

مُسْتَوطِنُ البِراز **coprozoic**

صفة للمكروبات التي تعيش في المادة البرازية أو توجد في المادة البرازية .

القِبْطِيس **Coptis**

جنس من النباتات .

حِباك **copula**

1 ـ أية بنية تشريحية رابطة أو جزء رابط .

2 ـ حباك اللسان (Copula lingua) .

حِباكُ اللِّسان **copula linguae**

هو تبارز بطناني ناصف في اللسان الجنيني يتكون من اتحاد الأقواس البلعومية الثانية ؛ ويمثل جذر اللسان المستقبلي .

جماع **copulation**

على بنية أو وظيفة الرئتين ، باستثناء الاضطرابات الرئوية الناتجة عن مرض قلبي خلقي ، أو أمراض تؤثر بشكل رئيسي على الناحية اليسرى من القلب .

القَلْبُ الأَيسَر **cor sinistrum**

انظر تحت left heart .

قَلْبٌ بَقَرِيّ **cor taurinum**

انظر تحت cor bovinum .

قَلْبٌ ثُلاَثِيُّ الأَذينات **cor triatriatum**

هو شذوذ خلقي يحدث بسبب فشل ارتشاف الوريد الرئوي الأصلي الجنيني ، مما يسبب انقسام الأذين الأيسر بواسطة حجاب ليفي عضلي ، وتستقبل الحجرة الخلفية العلوية العائد الوريدي الرئوي فيما تتصل الحجرة الأمامية السفلية بلاحقة الأذين السفلي والفوهة المترالية . قد تتضاءل الفوهة بين الحجرتين أو تنعدم ، مما يسبب انسداداً وريدياً رئوياً .

قَلْبٌ ثُلاَثِيُّ المَسَاكِن **cor triloculare**

انظر تحت three chambered heart .

قَلْبٌ ثُلاَثِيُّ المَسَاكِن **cor triloculare**
ثُنائِيُّ الأَذَيْنَين **biatriatum**

هو شذوذ خلقي ينتج عن فشل تكون الحاجز بين البطينين ، مما يؤدي إلى أن يحتوي القلب على أذينين اثنين وبطين واحد .

قَلْبٌ ثُلاَثِيُّ المَسَاكِن **cor triloculare**
ثُنائِيُّ البُطَيْنَين **biventriculare**

هو شذوذ نمائي ينتج عن فشل تكون الحاجز بين الأذينين ، مما يؤدي إلى أن يحتوي القلب على أذين واحد وبطينين اثنين .

القَلْبُ الوَرِيدِيّ **cor venosum**

انظر تحت right heart .

قَلْبٌ أَزْغَب **cor villosum**

قلب يرى في الانصباب التاموري .

سابقة بمعنى الاشتراك **cor-**

انظر تحت con .

زُغباوات **coracidia**

صيغة الجمع من زغباء (Coracidium) .

انظر تحت coracidium .

زُغباء **coracidium**

هو الجنين المفرد الأسطواني المهدب الذي يسبح أو يزحف بمفرده للدودة الشريطية من رتبة العوسانية .

غرابيٌّ أخرَميّ **coracoacromial**

هو كل ما يتعلق بالناتئ الغرابي والناتئ الأخرمي .

1 ـ غرابيٌّ عَضُديّ **coracobrachialis**
2 ـ الغرابيَّة العَضُديَّة

1 ـ العضلة الغرابية العضدية .

2 ـ متعلق بالناتئ الغرابي والعضد .

غرابيٌّ ترْقويّ **coracoclavicular**

متعلق بالناتئ الغرابي والترقوة .

غرابيٌّ عَضُديّ **coracohumeral**

متعلق بالناتئ الغرابي والعضد .

غرابيٌّ لاميّ **coracohyoid**

متعلق بالناتئ الغرابي والعظم اللامي .

الغرابيُّ **coracoid**

1 ـ ذو شكل يشبه منقار الغراب .

2 ـ الناتئ الغرابي ، أو الناتئ الغرابي للكتف (Processus coracoideus scapulae) .



قلب ثلاثي الأذينات Cor triatriatum

Bergmann's cords **حبال بريجمان**

هي السُّطورُ النُّخاعيَّةُ للبُطَين الرَّابع (Striae medullares ventriculi quarti) .

انظر تحت stria .

Billroth's cords **حبالُ بيلروث**

هي حبالُ اللُّبِّ الأَحْمَر (Red pulp cords) في الطحال .

cord blood **دَمُ السَّرَر**

هو دَمُ الحَبْل السُّرِّي .

dental cord **حَبْلٌ سِنِّيّ**

هي كَتلة من الخلايا شبيهة بالحبل ينشأ منها عضو الميناء .

dental engine cord **حَبْلُ المُحرِّك السِّنِّي**

هو خيط يَدير في بعض وحدات معالجة الأسنان مسننات تحريك المثقب السني .

enamel cord **حَبْلٌ مينائي**

هو امتداد عمودي من العقدة المينائية في السن الآخذ بالنمو ، والذي يصل العقدة المينائية بالظهارة السنية الخارجية ، وهي بنية مؤقتة تختفي قبل أن يبدأ تشكل الميناء .

false vocal cord **الحَبْلُ الصَّوتيُّ الكاذب**

انظر تحت plica vestibularis .

farcy cords **حبال الرعام**

هي أوعية لمفية متضخمة تشاهد في سياق الرعام ؛ تسمى أيضاً أنابيب الرعام (Farcy pipes) .

Ferrein's cords **حَبْلا فيرَّان**

هما الثنيتان الصوتيتان .

انظر تحت plicae vocales .

ganglionated cord **حَبْلٌ عُقَدِيّ**

هو الجذع الوتدي .

انظر تحت truncus sympathicus .

genital cord **الحَبْلُ التَّناسُليُّ**

في الجنين : هو الجزء الذنبي الملتحم عند الخط الناصف من الحرفين البوليين التناسليين ، ويحتوي كل منهما على قناة الكُلْوَة الجَنينيَّة

coracoiditis **التِهابُ الغرابي**

هي حالة مؤلمة تصيب منطقة الكتف والناتئ الغرابي ، وتترافق بضمور العضلة الدالية ، وتنسب إلى أذية الناتئ الغرابي .

coracoradialis **الغرابيَّة الكعبُريَّة**

هي الرَّأسُ القَصيرُ لذات الرَّأسَين العَضُديَّة .

coracoulnaris **الغرابيَّة الزَّنديَّة**

هي الألياف التابعة للعضلة ذات الرأسين العضدية والتي ترتبط بلفافة الساعد .

coralliform **مَرْجانِيُّ الشَّكل**

ذو شكل يشبه المرجان ؛ أو متشعب مثل المرجان .

corallin **كورالين**

كاشف مختبري .

انظر تحت aurin .

yellow corallin **الكورالين الأصفر**

هو ملح الصوديوم من كاشف الأورين ، والذي يوجد على شكل كتل صفراء ذات بريق مائل إلى الخضرة ، والتي تتحول إلى اللون الأحمر عند ذوبانها ؛ تسمى أيضاً أصفر الكورالين (Corallin yellow) .

coralloid **مَرْجانِيُّ الشَّكل**

انظر تحت coralliform .

Coramine **كورامين**

اسم تجاري لأحد مستحضرات النيكثاميد (Nikethamide) .

Corbus' disease **داء كوربس**

[داء منسوب للطبيب بد كلارك كوربس (Budd Clarke) ، وهو طبيب مسالك بولية ـ أمريكي الجنسية ، 1954-1876] ، وهو التهاب الحشفة الغنغريني .

انظر تحت balanitis gangraenosa .

corasthm **حُمَّى الكلأ**

انظر تحت hay fever .

cord **حَبْل**

أية بنية طويلة مرنة ذات مقطع دائري .

انظر تحت chorda .

الحَبْلُ المائلُ لمَفْصِل المِرْفَق — **oblique cord of elbow joint**

هو الحَبْلُ الغشائيُّ المائلُ بَينَ عَظْمَي السَّاعد .

انظر تحت chorda obliqua membranae inter-osseae antebrachii .

الحبالُ المُوَلِّدَةُ للبُيوض — **ovigerous cords**

هي حبال الشبكة للمبيض البدئي ، والتي تتحول إلى البيوض وجريباتها .

حبال فلوغر — **Pfluger's cords**

هي الأنابيب المبيضية .

أنظر تحت ovarian tubes .

الحَبْلُ الخَلْفيُّ — **posterior cord**

هي الحُزْمَةُ الخلفية للضَّفيرَةِ العَضُدِيَّة

انظر تحت fasciculus posterior plexus brachialis .

حَبْلٌ مِزْماريّ — **psalterial cord**

هو السَّطْرُ الوعائيُّ للقَنَاة القَوْقَعِيَّة .

انظر تحت stria vascularis ductus cochlearis .

حبالُ اللُّبِّ الأحْمَر — **red pulp cords**

هي كتل اللب الأحمر في الطحال ؛ تسمى أيضاً حبال بيلروث (Billroth's cords) ، والحبال الطحالية (Splenic cords) .

حبالُ الشَّبَكَة — **rete cords**

هي طيقان من الخلايا البدئية لنخاع الغدد التناسلية الجنينية ، والتي تتصل ببعض نبيبات الكلوة الجنينية المتوسطة ، والتي تنمو منها الشبكة المبيضية والشبكة الخصوية ، تسمى أيضاً الحبال النخاعية (Medullary cords) ، والحبال الجنسية (sex cords) .

حبال التبعيد — **retraction cords**

في طب الأسنان : هي خيوط مغمسة في مادة كيمائية أو دوائية ، والتي تستعمل في جراحة الأسنان لتبعيد اللثة .

حبل صلد — **scirrhous cord**

هي ضخامة ليفية مزمنة في جدعة (النهاية القاصية من الطرف المبتور) الحبل المنوي عند الحصان المخصي الناتجة عن عدوى جرثومية ، المُوَسَّطَة وقناةُ الكُلْوَة الجَنينيَّة المُوَسَّطَة الإضافيَّة .

حَبْل تبعيد اللثة — **gingival retraction cord**

انظر تحت retraction cord .

الحَبْلُ الرَّسَنيّ — **gubernacular cord**

هي بنية في الخصية .

انظر تحت chorda gubernaculum .

الحبالُ الكَبِديَّة — **hepatic cords**

هي صفائح تفاغرية من الخلايا الكبدية ، والتي تتوضع بشكل شعاعي متجه باتجاه الخارج انطلاقاً من الوريد المركزي وتكون متن الفصيص الكبدي ؛ وتسمى أيضاً حبال الخلايا الكبدية (Hepatic cell cords) .

الحَبْلُ الوَحْشِيُّ — **lateral cord**

هي الحُزْمَةُ الوَحْشِيَّةُ للضَّفيرَةِ العَضُدِيَّة (Fasciculus lateralis plexus brachialis) .

الحَبْلُ القَطَنيُّ العَجُزِيُّ — **lumbosacral cord**

الحبالُ اللِّمْفِيَّة — **lymph cords**

انظر تحت medullary cords .

الحَبْلُ الإنْسيُّ — **medial cord**

هي الحُزْمَةُ الإنسية للضَّفيرَةِ العَضُدِيَّة .

انظر تحت fasciculus medialis plexus brachialis .

الحبالُ النُّخاعيَّة — **medullary cords**

1 ـ هي طيقان من نسيج لمفاني كثيف محاطة بجيوب نخاع العقدة اللمفية ، تسمى أيضاً الحبال اللمفية (Lymph cords) .

2 ـ انظر تحت rete cords .

الحَبْلُ الأنْفيُّ الدَّمْعيُّ — **nasolacrimal cord**

الحَبْلُ المُوَلِّدُ للكُلْوَة — **nephrogenic cord**

هو جزء متطاول شبيه بالحبل يمتد من الحرف البولي التناسلي ، ويتكون من صفائح القطاع الكلوي الملتحمة أو التي لم تنفصل أصلاً ، والتي تنشأ منها نبيبات الكلوة الجنينية المتوسطة وجزء من نبيبات الكلوة التالية .

حَبْلٌ عَصَبيّ — **nerve cord**

طاق من الألياف العصبية ، مثل الحبل السيسائي ، . . . إلخ .

والتي تمتد بشكل مستعرض عبر الزاوية السفلية للجيب السهمي العلوي .

حَبْلِيّ **cordal**

بنية متعلقة بحبل ، ويطلق هذا الوصف تحديداً للإشارة إلى الحبل الصوتي (الثنية الصوتية) .

كوردارون **Cordarone**

اسم تجاري لأحد مستحضرات الأميودارون (Amiodarone) .

قلبيُّ الشكل **cordate**

1ـ قطعُ الحَبل الصَّوتِي **cordectomy**

2ـ قطعُ النُّخاع

هو استئصال جزء منحبل أو كل الحبل ، مثل الحبل الصوتي أو النخاع .

1ـ مُنْعِش **cordial**

2ـ مُنَبِّهٌ للقلب

مشروب كحولي معطر (أروماتي) .

1ـ مُنْعِش **cordiale**

2ـ قلبيّ

3ـ مُنَبِّهٌ للقلب

4ـ حَميميّ

انظر تحت cordial .

قلبيُّ الشكل **cordiform**

شكله يشبه القلب .

بيلة نتروجينية **cording-up**

انظر تحت azoturia .

التهابُ الحَبْل المَنَوي **corditi**

بزل الحبل **cordocentesis**

هو بزل الوريد السري عن طريق الجلد مع التوجيه باستخدام مخطط الصدى للحصول على عينة دموية من الجنين . يسمى أيضاً اعتيان الحبل السري عن طريق الجلد (Percutaneous umbilical cord sampling) .

تثبيتُ الحَبْل الصَّوتي **cordopexy**

عملية إزاحة الحبل الصوتي باتجاه الخارج في شلل الحبل الصوتي ثنائي الجانب .

1ـ قطع الحبل الصوتي **cordotomy**

2ـ قطع النخاع

والتي تترافق بنجيج القيح ، وأحياناً بتكون كتلة شبيهة بالورم ذات جيوب معددة دامعة (راشحة) .

حبالٌ جنسيَّة **sex cords**

اَنظر تحتَ rete cords .

الحبالُ الجنْسيَّة **sexual cords**

هَي النبيبَاتَ الناقلة للمني في الجنين في مراحله المبكرة .

الحَبْلُ المَنَويُّ **spermatic cord**

انظر تحتَ funiculus spermaticus .

النُّخاع **spinal cord**

انظر تحت medulla spinalis .

الحبالُ الطِّحاليَّة **splenic cords**

اَنظر تحت red pulp cords .

حبالُ الخُصْيَة **testis cords**

هَي حبال الشبكة في الخصية الجنينية .

الحَبْلُ الصوتيُّ الحَقيقيُّ **true vocal cord**

انظر تحت plica vocalis .

الحَبْلُ السُّرِّيُّ ؛السَّرَرُ **umbilical cord**

هو البنية المرنة التي تربط سرة الجنين بالمشيمة ، وتسمح بمرور الشرايين والوريد السري . يبلغ طوله عند الطفل حديث الولادة قرابة 50 سنتي متر . يبدأ تكونه في الأسبوع الجنيني السابع من السويقة الموصلة ، ويحتوي على القناة السرية المساريقية (السويقة المحية) وكل السقاء . يسمى أيضاً (Funiculus umbilicalis) ، (Chorda umbilicalis) .

حَبْلُ فايتْبريخْت **Weitbrecht's cord**

هوالحَبْلُ الغشائيُّ المائلُ بَينَ عَظْمَي السَّاعد . انظر تحتَ chorda obliqua membranae interosseae antebrachii .

حبالُ وايلد **Wilde's cords**

هو السُّطورُ المُسْتَعْرِضَةُ للجسْم الثَّفَني . انظر تحت striae transversae corporis callosi .

حبالُ ويليسْ **Willis' cords**

هي أشرطة ليفية عديدة (الترابيق الجافوية) ،

هو نوع من الذباب المورم (يعرف باسم ذبابة تومبو) ، ويوجد في أفريقيا ، والتي تنقب يرقاته (دودة كايور) تحت جلد البشر والحيوانات الأخرى مسببة داء النغف .

لُبّ **core**

1ـ الجزء المركزي من أي شيء ، مثل الكتلة المركزية من المادة النخرية في الدمل (Boil) .

2ـ قضيب حديدي يلف حوله سلك لتشكيل وشيعة تحريض أو مغناطيس كهربي .

3ـ الجزء المركزي من الفيريون ، ويتكون من الحمض النووي وأحياناً البروتين .

4ـ انظر تحت cast core .

لُبٌّ مَصْبوب **cast core**

هي قطعة معدنية مصبوبة ، ومزودة بوتد في قناة الجذر غالباً ، والتي تصمم لدعم وتثبيت تاج سن اصطناعي .

قَالَبُ لُبِّيُّ الشَّكْل **cast form core**

هو قالب مصبوب بحيث يتخذ شكل القناة اللبية .

سابقة بمعنى الحدَقة **core-**

سابقة تشير إلى ما يتعلق بحدقة العين .

انظر تحت irido .

غَلَقُ القزحيَّة **coreclisis**

انظر تحت iridencleisis .

1ـ توَسُّعُ الحدَقة **corectasis**

2ـ توسيعُ الحدَقة

هي عملية توسيع الحدقة (Pupil) .

مِبْضَعُ القزحيَّة **corectome**

هي أداة قاطعة تستعمل في بضع القزحية .

مَرْكَزَةُ الحدَقة **corectomedialysis**

هي عملية تكوين حدقة اصطناعية عن طريق فصل القزحية عن الرباط الهدبي .

قطعُ القزحيَّة **corectomy**

انظر تحت iridectomy .

حدَقة مُنتبَذَة **corectopia**

هو توضع شاذ للحدقة .

افتِكاكُ القزحيَّة **coredialysis**

1ـ قطع أحد الحبال الصوتية .

2ـ انقطاع في السَّبيل النُّخاعيُّ المهاديُّ الوَحْشيّ ، عادة في الربعية الأمامية الوَحشيَة ، لمعالجة حالة من الألم المستعصي . يسمى أيضاً (Chordotomy) .

قطع الحبل المفتوح **open cordotomy**

هو قطع الحبل الذي يجرى بطريق الشق المفتوح ؛ وقد استبدلت هذه الطريقة اليوم على نطاق واسع بقطع الحبل عن طريق الجلد .

قطع الحبل عن طريق الجلد **percutaneous cordotomy**

قطع الحبل الذي يجرى باستخدام مساري كهربية يتم توجيهها بواسطة الأشعة مع تقنيات التوجيه اللمسي ؛ ومن ضمن الطرق المستعملة كل من العنقية الوحشية المرتفعة والعنقية (الرقبية) الخلفية المرتفعة ، والعنقية الأمامية المنخفضة .

كوردران **Cordran**

اسم تجاري لأحد مستحضرات الفلوراندرينوليد (Flurandrenolide) ، وهو دواء مضاد للالتهاب الجلدي .

التَّبُوتيَّة **Cordyceps**

هي جنس من الفطريات من فصيلة الدبوسيات ؛ بعض أنواعها تسبب أمراضاً مميتة لليسروع (يرقانة الفراشة) .

النَّبُوتيَّةُ الصِّينيَّة **Cordyceps sinensis**

هو طفيلي من يرقات الحشرات ؛ التي تستعمل في الطب الصيني كدواء مخثر . تسمى أيضاً الكراواة الصينية (Sphaeria sinensis) .

الذُّبابُ المورِّم **Cordylobia**

هو جنس من الذباب من فصيلة الخوتعيات . أحد أنواعها هو الذباب المورم الشره للبشر (ذبابة تومبو) ، والذي يوجد في أفريقيا وتنقب يرقاته (دودة كايور) تحت جلد البشر والحيوانات الأخرى مسببة داء النغف (Myiasis)

الذُّبابُ المُورِّمُ الشَّرِهُ للبَشَر **Cordylobia anthropophaga**

تضيُّقُ الحدَقة **corestenoma**

هي حالة تضيق غير طبيعية للحدقة .

تَضيُّقُ الحَدَقَة الخِلْقيّ **corestenoma congenitum**

حالةٌ خلقيـة تنغلق فيهـا الحدقة جـزئياً بفعل قـمعولات (نتوء شـاذ) ، والتي تتـلاقى مـخلفة وراءها فتحات صغيرة .

الكانِسَة **Corethra**

هو جنس من البعوض .

انظر تحت Chaoborus .

مَرْكَزَةُ الحدَقة **coretomedialysis**

انظر تحت coretomedialysis .

بَضْعُ القزَحيَّة **coretomy**

انظر تحت iridectomy .

كورجارد **Corgard**

علامة تجارية لأحد مستحضرات نادولول (دواء مضاد للأدرينيات) .

كوري¹ **Cori¹**

[كارل فـردينـاند كوري *(Carl Ferdinand Cori)*]

هو طبيب وعالم كيمياء حيوي أمريكي تشيكي المولد ، عـاش فـي الفتـرة مـا بين *1896-1984* ؛ حاز بالاشتراك مع زوجته جيرتي ثيريزا رانديتز كـوري *(Gerty Theresa Radnitz Cori)* ، ومع برناردو ألبـــرتـو هوسي *(Bernardo Alberto Houssay)* ، علـى جـــائزة نوبـل فـي الطـب والفيزيولوجيا لعام *1947*] ، لاكتشافهم التحول التحفيزي للجليكوجين إلى حمض اللاكتيك .

كوري² **Cori²**

[جيرتي ثيريزا رانديتز كـوري *(Gerty Theresa Radnitz Cori)* : وهي طـبيـبـة وعـالمة كـيـمـيـاء حيوية أمريكية تشيكية المولد عاشت في الفترة مـا بين *1896-1957* ، حـازت بالاشـتـراك مع زوجها كارل فـردينـاند كوري *(Corl Ferdinand Cori)* ومع برناردو ألبـرتو هوسي *(Bernardo Alberto Houssay)* ، على جائزة نوبل في الطب والفيزيولوجيا لعام *1947*] ، لاكتشافهم التحول التحفيزي للجليكوجين إلى حمض اللاكتيك .

هو الفصل الجراحي للحافة الخارجية للقزحية عن الجسم الهدبي .

1ـ توسُّعُ الحدَقةِ **corediastasis**

2ـ توسيعُ الحدَقة

هي عملية توسيع الحدقة ، أو الحالة التي تكون فيها الحدقة متوسعة .

كوريجونين **coregonin**

هو بروتامين يتم الحـصــول عليــه من نطاف السمك الأبيض .

افتِكاكُ الحدَقة (من الالتصاقات) **corelysis**

التخريب الجراحي للحدقة ؛ وبخاصة ما يتعلق بالفصل الجراحي بين التصاقات الحافة الحدقية للقزحية والعدسة .

كورميم **coremium**

انظر تحت synnema .

تفصيلُ الحدَقة **coremorphosis**

التشكيل الجراحي لحدقة اصطناعية .

غلَقُ القزَحيَّة **corenclisis**

عمل جراحي عيني لمعالجة الزرق .

انظر تحت iridencleisis .

مِقياسُ الحدَقة **coreometer**

انظر تحت pupillometer .

قِياسُ الحدَقة **coreometry**

انظر تحت pupillometry .

مِلقطُ القزَحيَّة **coreoncion**

هي أداة تستعمل في جراحات القزحية .

رأبُ القزَحيَّة **coreoplasty**

هي أي عملية جراحية تجرى على القزحية .

توضيعُ الحدَقة **corepexy**

افتِتاحُ الحدَقة **corepraxy**

تميمُ الكاظمَة **corepressor**

جزيء صغير يتحد مع جزيء صميم الكاظمة البـروتيني لـتـشكيل مـادة فعـالة ، والتي ترتبط بدورها بجين شـغـال ، فـتـثـبط تخليق أحـد الإنزيمات . وتعتبر هذه الآلية تحكماً سلبياً في أنظمة الإنزيمات المحرضة .

coriin **كريين (كيمياء)**

في الكيمياء : هي مادة نحصل عليها من معالجة النسيج الضام الليفي بالقلويات .

corium TA **أدَمَة**

تسمية بديلة لمصطلح الأدمة (Dermis) .

gingival corium **أَدَمَةٌ لِثَوِيَّة**

هو النَّسِيج الضام ، أو الصفيحة الخاصة للثة .

lingual corium **أَدَمَةٌ لسانيَّة**

هو النَّسِيج الضام ، أو الصفيحة الخاصة باللسان .

cork **فلِيْن**

هو مادة من منشأ نباتي تتمتع بمرونة وكثافة تجعلها صالحة للاستعمال في العديد من الاستخدامات الصناعية .

corm **جُعْثُن (جنس نبات من الأبصال)**

امتداد شبيه بالبصلة صلب من جذع النبات تحت الأرض .

Cormack **كورماك**

هو *[آلان ماك ليود (Allan Macleod) ، وهو عالم فيزياء أمريكي مولود في جنوب أفريقيا ، ولد عام 1924 ، فاز بالاشتراك مع جودفري نيوبولد هاونسفيلد (Godfrey Newbold Hounsfield) ، بجائزة نوبل للطب والفيزيولوجيا عام 1979]* ، لعملهما في تطوير التَّصْوِيرُ المَقْطَعِيُّ المِحْوَرِيُّ المُحَوسَب .

cormethasone **كورْميثازون**

دواء مضاد موضعي للالتهاب .

corn **1ـ قرْنٌ**
2ـ ذُرَة
3ـ مِسْمارُ القدم

1ـ ثخانة متقرنة في الطبقة المتقرنة لجلد أصابع القدمين ، والتي تنتج عن الاحتكاك والضغط اللذين تسببهما الأحذية أو الجوارب الضيقة . وهي تكون كتلة مخروطية رأسها تتجه داخل الأدمة ، وتسبب الألم والالتهاب . ويوجد منه نوعان : مسمار القدم القاسي ، ومسمار القدم الطري . يسمى أيضاً الثفن (Clavus) .

Cori cycle, disease, ester **دورة كوري، داء كوري، إستر كوري**

[دورة منسوبة للطبيب كارل فرديناند كوري (Carl Ferdinand Cori) والطبية جيرتي ثيريزا راندنيتز كوري (Gerty Theresa Radnitz Cori)] توليد حمض اللبن من السكر في العضلات .

انظر تحت cycle .
انظر تحت glycogen storage disease type III .
انظر تحت glucose 1-phosphate .

coriaceous **جلدِي**

أي أنه يشبه الجلد ؛ أو جلدي وخشن ؛ وهي صفة للمزارع الجرثومية .

coriamyrtin **كورياميرتين**

جليكوزيد سام من الإهابية (جنس من النباتات من الفصيلة السذابية) ذو خواص منبهة عصبية ، والذي يسبب الاختلاجات والموت عند الإنسان والحيوانات الأخرى .

coriander **الكُزْبَرَة**

1ـ جنس نبات من الفصيلة الخيمية .
2ـ الثمرة الناضجة المجففة من الكوريندريم المزروع (Coriandrum Sativum) ، والذي يستعمل كمنكه وكمصدر لزيت الكزبرة .

Coriandrum **الكوريندريم**

جنس من النباتات من الفصيلة الخيمية ، والذي يضم الكزبرة ، والتي تستعمل كمنكه ومصدر لزيت الكزبرة .

Coriaria **الإهابيَّة**

جنس من الأشجار والشجيرات من الفصيلة السذابية ، والذي يستوطن أوروبا وآسيا . تحتوي معظم أنواعه على ذيفان كورياميرتين الذي يسبب القيء والاختلاج والموت عند الإنسان والحيوانات الأخرى . كما تشتهر تلك النباتات باحتوائها على الأصباغ ومواد الدباغة .

Corid **كوريد**

العلامة التجارية لأحد مستحضرات الأمبروليوم (Amprolium) .

بترقط دقيق شبيه بالغبار أو الدقيق .

قَرْنِيَّةٌ كُرَوِيَّة **cornea globata**

هي ضخامة القرنية .

انظر تحت megalocornea .

قَرْنِيَّةٌ كُرَوِيَّة **cornea globosa**

هي ضخامة القرنية .

انظر تحت megalocornea .

قَرْنِيَّةٌ مُنَقَّطَة **cornea guttata**

هي حالة تنكسية تصيب القرنية نتيجة حثل الخلايا البطانية ؛ تسمى أيضاً حَثَلُ بطانَةَ القَرْنِيَّة (Dystrophia endothelialis corneae) .

الصُّلْبَة **cornea opaca**

هو الغلاف الصلب للعين .

تَسَطُّحُ القَرْنِيَّة **cornea plana**

هو التسطحَ الخلقي للقرنية .

عَتامَةُ القَرْنِيَّة الدُّوَيرِيَّة **cornea verticillata**

هي دُوَّارَةُ فلايشر .

انظر تحت Fleischer's vortex .

قَرْنِيَّةٌ مُسَطَّحَة **flat cornea**

هو شكل القرنية عندما تكون الحجرة العينية ضحلة ، أو عندما تكون مقلة العين ضامرة .

قَرْنِيَّةٌ بَيضَوِيَّة **oval cornea**

قَرْنِيَّةٌ مَخْرُوطِيَّة **sugar-loaf cornea**

هو تمخرط القَرنية .

انظر تحت keratoconus .

قَرْنَوِيّ؛قَرْنِيّ **corneal**

أي أنه يتعلق بالقرنية .

التِهابُ القَرْنِيَّة **corneitis**

انظر تحت keratitis .

كورنيليا دي لانج **Cornelia de Lange**

انظر تحت de Lange .

التِصاقٌ جَفْنِيٌّ قَرْنَوِيّ **corneoblepharon**

هو التصاق بين الجفن والقرنية .

خلايا قرنوية **corneocyte**

هي بقايا الخلايا الكيراتينية التي تطرحها الطبقة المتقرنة .

التِهابُ القَرْنِيَّةِ والقُزَحِيَّة **corneoiritis**

2 ـ انظر تحت (Zea mays) .

3 ـ بذور أنواع معينة من نباتات الحبوب ، وبخاصة (Zea mays) ، والتي تستعمل في إطعام كل من الإنسان والحيوانات .

انظر تحت corn oil .

4 ـ كدمة على أخمص قدم الحصان بين جدار العقب وبين العارضة .

5 ـ منطقة محددة من فرط التقران في أخمص قدم الكلاب ، والتي تكون حساسة للضغط .

زَيتُ الذُّرَة **corn oil**

انظر تحت oil .

مِسْمارٌ صُلْب **hard corn**

هو نوع قاس من مسمار القدم ، والذي يشاهد على السطح الخارجي لإصبع القدم الصغرى ، أو السطح العلوي لأصابع القدم ؛ ويسمى أيضاً الثفن القاسي (Clavus durus) ، أو (Heloma durum) .

مِسْمارٌ رِخْو **soft corn**

هو نوع من مسمار القدم ، يتواجد بين أصابع القدم ، ويظل طرياً (ليناً) بفعل الرطوبة ؛ يسمى أيضاً الثفن اللين (Clavus mollis) ، أو (Heloma molle) .

حُرَّمُ الحِنْطَة **corn cockle**

انظر تحت Agrostemma githago .

القَرْنِيَّة **cornea TA**

هي تلك البنية الشفافة التي تكون الجزء الأمامي من صلبة العين . وتتكون من خمس طبقات : (1) ظهارة القرنية الأمامية ، التي تكون متمادية مع ظهارة الملتحمة . (2) الطبقة الأمامية المحددة (غشاء باومان) . (3) المادة المخصوصة أو السدى . (4) الطبقة الخلفية المحددة (غشاء ديسيميت) . (5) بطانة غرفة العين الأمامية .

قَرْنِيَّةٌ مَخْرُوطِيَّة **conical cornea**

هو تمخرط القَرنية .

انظر تحت keratoconus .

تَنَكُّسُ القَرْنِيَّة الدَّقيقيّ **cornea farinata**

هو تنكس شيخوخي يصيب القرنية ويتصف

هو التهاب يصيب كل من القرنية والقزحية .

corneosclera **القَرْنِيَّة والصُّلْبَة**

هما القرنية والصلبة بوصفهما على أنهما يشكلان عضواً واحداً .

corneoscleral **قَرْنَويّ صُلبَويّ؛ قَرْنِيّ صُلبيّ**

يصيب أو يشير إلى كل من القرنية والصلبة .

corneosclerectomy **اسْتِئْصَالُ قَرْنَوِيّ صُلبَوِيّ**

هو استئصال كل من القرنية والصلبة .

corneous **قَرْنَويّ؛ قَرْنِيّ**

شبيه بالقرن أو قرني ؛ أو مكون من الكيراتين .

corner **زاويَة**

نقطة تلاقي خطين أو سطحين أو جزئين .

mouth corner **زاوِيَةُ الفَم**

هَو ملتقى الشفتين أو الصوار .

Corner-Allen test, unit **اختبار كورنر-آلان؛ وحدة كورنر-آلان**

[اختبار منسوب للطبيب جورج واشنطن كورنر *(George Wahington Corner)*، وهو عالم تشريح أمريكي ، 1889-1981 ؛ والطبيب ويلارد ميرون آلآن *(Willard Myron Allen)*، وهو طبيب أمراض نساء أمريكي ، ولد عام 1904] .

انظر تحت test .

cornet **قُرَين**

Cornet's forceps **ملقط كورنيت**

هو ملقط لحمل السواتر في المختبرات .

corneum **المُتَقرِّنَة**

هي الطبقة المتقرنة البشروية ، والطبقة المتقرنة الظرفية .

انظر تحت stratum corneum epidermidis .

انظر تحت stratum corneum unguis .

corniculate **قُرَيْنِيُّ الشَّكْل**

شكله يشبه القرن الصغير .

corniculum **1- الغُضْرُوف القُرَيْنِيّ 2- قُرَين**

انظر تحت cartilago corniculata .

cornification **تَقَرُّن**

1- التحول إلى كيراتين أو إلى مادة قرنية .

2- تحول البشرة إلى النمط المطبق الحرشفي .

cornified **مُتَقرِّن**

متحول إلى نسيج قرني (كيراتين) .

cornoid **قَرْنِيُّ الشَّكْل؛ قَرْنَاوِيّ**

أي أنه يشبه القرن .

انظر تحت lamella .

cornu (pl.cornua) **قَرْن (ج: قرون)**

1- انظر تحت horn .

2- بروز ، أو قمعول يشبه القرن .

3- في المسميات التشريحية : بنية شكلها يشبه القرن .

coccygeal cornu **قَرْنُ العُصْعُص**

انظر تحت cornu coccygeum .

cornu Ammonis **قَرْنُ آمون**

هو الحصين .

انظر تحت hippocampus .

cornu anterius medullae spinalis TA **القَرْنُ الأمامِيُّ للنُّخاع**

هو الشكل الشبيه بالقرن الذي يبدو عليه العمود الأمامي للنخاع في المقطع المستعرض . يسمى أيضاً القرن البطناني للنخاع (Ventral horn of spinal cord) .

cornu anterius ventriculi lateralis TA **القَرْنُ الأماميُّ للبُطَين الوَحْشي**

تسمية بديلة لمصطلح القرن الجبهي للبطين الوحشي (cornu frontale ventriculi lateralis) .

cornu cervi **قَرْنُ الوَعْل**



التهاب القرنية والقزحية Corneoiritis

انظر تحت cornu temporale ventriculi lateralis .

القَرْنُ الوَحْشِيُّ للنُّخاع **cornu laterale medullae spinalis TA**

هو الشكل الشبيه بالقرن الذي يبدو عليه العمود المتوسط للنخاع في المقطع المستعرض .

انظر تحت columna intermedia medullae spinalis .

القَرْنُ الكَبِيرُ للعَظْمِ اللاميّ **cornu majus ossis hyoidei TA**

هو بروز عظمي يمتد إلى الخلف والأعلى على كل من جانبي جسم العظم اللامي .

القَرْنُ الصَّغِير للعَظْمِ اللاميّ **cornu minus ossis hyoidei TA**

هو تبارز مخروطي صغير يبرز علوياً على كل من جانبي العظم اللامي عند زاوية الاتصال بين الجسم والقرن الكبير .

القَرْنُ القَذَاليّ للبُطَين الوَحْشيّ **cornu occipitale ventriculi lateralis TA**

هو الجزء من البَطين الوحشي الذي يمتد باتجاه الخلف انطلاقاً من الجزء المركزي إلى داخل الفص القذالي ؛ يسمى أيضاً (Cornu posterior ventriculi lateralis) ، القرن الخلفي للبطين الوحشي (Posterior horn of lateral ventricle) .

القَرْنُ الخَلْفيُّ للنُّخاع **cornu posterius medullae spinalis TA**

هو الشكل الشبيه بالقرن الذي يبدو عليه العمود الخلفي للنخاع في المقطع المستعرض . يسمى أيضاً (Cornu dorsale medullae spinalis) ، والقرن الظهراني للنخاع . (Dorsal horn of spinal cord) .

القَرْنُ الخَلْفيُّ للبُطَين الوَحْشيّ **cornu posterius ventriculi lateralis TA**

هو القَرْنُ القَذَاليّ للبُطَين الوَحْشيّ .

انظر تحت cornu occipitale ventriculi lateralis .

قَرْنُ العُصْعُص **cornu coccygeale TA**

انظر تحت cornu coccygeum .

قَرْنُ العُصْعُص **cornu coccygeum TA**

هو أحد الناتئين الرديميين المفصليين للعصعص ، واللذين يتمفصلان مع قرون العجز .

قَرْنُ العُصْعُص **cornu coccyx**

هو أحد الناتئين الرديميين المفصليين للعصعص ، واللذين يتمفصلان مع قرون العجز .

قَرْنٌ جِلْديّ **cornu cutaneum**

انظر تحت cutaneous horn .

القَرْنُ الظَّهْرانيُّ للنُّخاع **cornu dorsale medullae spinalis TA**

هو القرن الخلفي للنخاع .

انظر تحت cornu posterius medullae spinalis .

القرن الجبهي للبطين الوحشي **cornu frontale ventriculi lateralis**

هو الجزء من البطين الوحشي الذي يمتد باتجاه الأمام انطلاقاً من الجزء المركزي إلى داخل الفص الجبهي . يسمى أيضاً القرن الأمامي للبطين الوحشي . (Anterior horn of lateral ventricle) ، (Cornu anterius ventriculi lateralis) .

القَرْنُ السُّفْليُّ للغُضْروفَ الدَّرَقي **cornu inferius cartilaginis thyroideae TA**

هو الامتدادَ السفلَي للحافة الخلفية للغضروف الدرقي .

القَرْنُ السُّفْليُّ للحافَة المُنْجَلِيَّة **cornu inferius marginis falciformis TA**

هو الطرف الوحشي من الحافة المنجلية للفرجة الصافنية ، والذي يمتد عمقاً حتى الوريد الصافن . يسمى أيضاً الساق السفلية للحافة المنجلية (Crus inferius marginis falciformis) .

القَرْنُ السُّفْليُّ للبُطَين الوَحْشيّ **cornu inferius ventriculi lateralis TA**

هو القرن الصدَغي للبطين الوحشي .

قَرْنُ العَجُز **cornu sacrale TA**

هو أحـد النتـوئين الشـبـيـهين بالخطاف اللذين يمتدان للأسفل من قوس أخر فقرة عجزية ؛ يسمى أيضاً البارزة العصعصية (Coccygeal eminence) .

القَرْنُ العُلْويُّ للغُضْروفَ الدَّرَقيّ **cornu superius cartilaginis thyroideae TA**

هو الامتداد العلوي للحافة الخلفية للغضروف الدرقي .

القَرْنُ العُلْويُّ للحافة المُنْجَليَّة **cornu superius marginis falciformis TA**

هو النهَايَة الدَانية للحافة المنجلية للفرجة الصافنية ؛ وتسمى أيضاً الساق العلوية للحافة المنجلية (Crus superius marginis falciformis) ، ورباط سكاربا (Ligament of Scarpa) .

القرن الصدغي للبطين الوحشي **cornu temporale ventriculi lateralis**


هو الجزء من البطين الوحشي الذي يمتد للأسفل انطلاقاً من الجزء المركزي خلف المهاد إلى داخل الفص الصدغي ؛ يسمى أيضاً القَرْنُ السُّفْليُّ للغُضْروف الدَّرَقي (Cornu inferius ventriculi lateralis) ، أو (Inferior horn of lateral ventricle) .

القَرْنُ المَحْروق **cornu ustum**

قَرْن الرَّحم **cornu uteri TA**

هو إحـدَى النهايتين المستديرتين الكليلتين العلويتين الوحشيتين لجسم الرحم ، والتي تقع عند مدخل الأنبوب الرحمي .

القرن البطناني للنخاع **cornu ventrale medullae spinalis**



Cornu coccygeum قرن العصعص

قرانيا **Cornus**

شجر من الفصيلة القرنية .

سابقة بمعنى الحدَقة **coro-**

انظر تحت core .

غَلْقُ الحدَقة **coroclisis**

انظر تحت coreclisis .

1ـ توَسُّعُ الحدَقةِ **coroctasis**

2ـ توسيعُ الحدَقة

انظر تحت corectasis .

1ـ توَسُّعُ الحدَقةِ **corodiastasis**

2ـ توسيعُ الحدَقة

انظر تحت corediastasis .

التَّوْيج (في الزَّهرة) **corolla**

هي مجموعة الوريقات الداخلية من كأس الزهرة ، والتي تسمى الأقسام المخصوصة ، ومنها البتلات .

مِقياسُ الحدَقة **corometer**

انظر تحت pupillometer .

1 ـ إكليل (ج: أكاليل) **corona (pl.coronae)**

2ـ تاج (ج: تيجان) **(pl.coronas)**

في التسمية التشريحية تطلق على التبارزات الشبيهة بالتاج أو على البنى التطويقية .

إكْليلُ الرَّأس **corona capitis**

اَلإكْليلُ الهَدَبيُّ **corona ciliaris TA**

هي المنطقة من السطح الأمامي الداخلي للجسم الهدبي في العين ، والتي تنبعث منها الاستطالات الهدبية ؛ تسمى أيضاً الجُزْءُ الْمُتَثَنِّي مِنَ الجِسْمِ الهَدَبيّ (Pars plicata corporis ciliaris) .

التَّاجُ الإكلينيكي (للسِّن) **corona clinica TA**

هو القسم من السن الذي يعلو الجذر الإكلينيكي ، أي القسم الذي تنكشف عنه اللثة فيكون ظاهراً في الفم ؛ يسمى أيضاً التاج خارج السنخ (Extra-alveolar crown) .

تاجُ السِّنّ **corona dentis TA**

هو الجزء العلوي من السن ، والذي يتصل مع الجزء السفلي من الجذر عند منطقة عنق الملتقى

هو القرن الأمامي للنخاع .

انظر تحت cornu anterius medullae spinalis .

القَرْنُ الغرْبالي **ethmoid cornu**

هي المَحَارَةُ الأَنْفيَّةُ الْمُتَوَسِّطَة .

انظر تحت concha nasalis media .

قَرْنُ العَجزُ **sacral cornu**

انظر تحت cornu sacrale .

قرْنان؛قرون (ف: قرْن) **cornua (sing.cornu)**

صيغة المثنى أو الجمع من قرن (Cornu) .

قُرونُ الغُضْروف الدرَقي **cornua cartilaginis thyroideae**

هو القَرْنُ السُّفْليُّ للغُضْروف الدَّرَقي ، والقَرْنُ العُلْويُّ للغُضْرَوف الدَّرَقيّ .

انظر تحت cornu inferius cartilaginis thyroideae .

انظر تحت cornu superius cartilaginis thyroideae .

قُرونُ النُّخاع **cornua of spinal cord**

هي البنى قرنية الشكل التي تشاهد في المقطع المستعرض للنخاع ، وهم القَرْنُ الأماميُّ للنُّخاع ، والقَرْنُ الوَحْشيُّ للنُّخاع ، والقَرْنُ الخَلْفيُّ للنُّخاع .

انظر تحت cornu anterius medullae spinalis .

انظر تحت cornu laterale medullae spinalis .

انظر تحت cornu posterius medullae spinalis .

قُرونُ العَظْم اللامي **cornua ossis hyoidei**

هو القَرْنُ الكَبيرُ للعَظْمِ اللاميّ ، والقَرْنُ الصَّغيرُ للعَظْم اللاميّ .

انظر تحت cornu majus ossis hyoidei .

انظر تحت cornu minus ossis hyoidei .

قرْنيّ **cornual**

متعلق بالقرن أو بالقرون .

قرْنيّ **cornuate**

متعلق بالقرن أو بالقرون .

قرْنيّ صِواريّ **cornucommissural**

متعلق بالقرن والصوار .

يطلق على السطح، أو المقطع الطولاني الذي يمر عبر الجسم بزوايا متعامدة مع المستوى الناصف. يسمى أيضاً (Coronalis).

العَظْمُ الجَبْهِيُّ **coronale**

1ـ النقطة من الدرز الإكليلي الواقعة عند القطر الجبهي الأعظم.

2ـ انظر تحت os frontale.

1ـ إكليليّ **coronalis TA**

2ـ تاجيّ

هو التسمية التشريحية العامة التي تشير إلى توضع بنية ما في اتجاه الدرز الإكليلي.

انظر تحت coronal.

الْتِهابُ الشِّرْيانِ التّاجِيّ **coronaritis**

اَلْتِهابُ فوهَةِ الشِّرْيانِ التَّاجِيّ **ostial coronaritis**

تاجيّ؛ إكليليّ **coronary**

أي أنه يحيط بالشيء إحاطة الإكليل؛ وهو مصطلح يطلق على الأوعية الدموية والأعصاب والأربطة... إلخ، وعادة ما يطلق هذا الوصف على الشرايين التي تروي العضلة القلبية، وبالتالي على الأمراض المرتبطة بها.

الشِّرْيانُ التَّاجِيُّ **coronary artery**

هو أحد الشرايين التي تزود عضلة القلب بالدم.

طُعْمُ مَجازَةِ الشِّرْيانِ التَّاجِيّ **coronary artery bypass graft**

هي عملية جراحية تجرى في سياق معالجة الذبحة، والحد من خطر الموت الناتج عن أمراض الشرايين التاجية.

وَحْدَةُ العِنايَةِ التَّاجِيَّة **coronary care unit**

هي وحدة من وحدات المستشفى والمتخصصة في العناية بأمراض القلب، وبخاصة أمراض القلب التاجية غير المستقرة، التي تتطلب عناية ومعالجة مستمرين.

فَشَلٌ تاجِيّ **coronary failure**

هو فشل الدوران التاجي في تزويد عضلة القلب والأنسجة المحيطة بالتغذية الدموية الملائمة. يسمى أيضاً مَرَضُ القَلْبِ التَّاجِيّ

الميناني الملاطي، وينتهي عند السطوح الطاحنة للأرحاء والضواحك أو عند الحواف القاطعة للقواطع. يسمى أيضاً التاج التشريحي (Anatomical crown) أو التاج السني (Dental crown).

إكْليلُ الحَشَفَة **corona glandis penis TA**

هي الحافة المستديرة الدانية من حشفة القضيب، والتي يفصلها عنق الحشفة عن الجسم الكهفي.

إكْليلُ الحَشَفَة **corona of glans penis**

انظر تحت corona glandis penis.

الإكْليلُ المُتَشَعِّع **corona radiata TA**

1ـ التاج الشعاعي المكون من الألياف البارزة التي تمتد من المحفظة الداخلية إلى كل جزء من قشرة المخ.

2ـ الطبقة الكاسية المكونة من خلايا جريبية متطاولة بصورة شعاعية، والتي تحيط بالمنطقة الشفافة لخلية بيضية ثانوية أو بيضة ثانوية.

الإكْليلُ الزُّهْرِيُّ **corona veneris**

حلقة من قرحات الزهري التي تتوضع حول الجبهة، وتمتد في بعض الأحيان عميقاً لتصيب عظام الرأس.

تاجُ السِّن **dental corona**

انظر تحت corona dentis.

إكْليلُ زين **Zinn's corona**

هي الحَلَقَةُ الوعائيَّةُ للعَصَبِ البَصَري.

انظر تحت circulus vasculosus nervi optici.

إكليلِيّاً؛ مُتَّجِهٌ نَحْوَ الإكليل **coronad**

باتجاه تاج الرأس، أو باتجاه التاج.

1 ـ أكاليل (ف: إكليل) **coronae**

2ـ تيجان (ف: تاج)

صيغة المضاف والجمع من تاج أو إكليل (Corona).

إكليليّ **coronal**

1ـ يتعلق بتاج الرأس أو تاج السن أو أي تاج آخر.

2ـ أي بنية باتجاه الدرز التاجية؛ وهو وصف

وحساسة لمذيبات الشحوم ، والمنظفات ، والأشعة فوق البنفسجية ، والمطهرات ، والحرارة . يحدث تنسخ الفيروس في الهيولى ، ويحدث التجمع عن طريق التبرعم ، الذي يتم عادة عبر الأغشية داخل الهيولية ؛ وتنطلق الفيريونات عن طريق الإيماس ، أو عن طريق تخرب الخلايا . وتنتقل الفيروسات بوسائل ميكانيكية بما فيها الجسيمات المنقولة بالهواء ، والمعدات الملوثة ، والتماس مع أشخاص مصابين بالعدوى .

الفيروسة المكلّلة **Coronavirus**

سميت هذه الفيروسات بالمكللة تبعاً لمنظر الفيريونات الخاصة بها كما تشاهد بالصور المجهرية الإلكترونية . هي جنس من الفيروسات من فصيلة الفيروسات الإكليلية تسبب أمراضاً تنفسية ، وأحياناً التهاب المعدة والأمعاء عند الإنسان ، وتسبب التهاب الكبد والتهاب المعدة والأمعاء ، والتهاب الدماغ والأمراض التنفسية عند الحيوانات الأخرى . وتسبب إسهال الولدان عند الحملان والعجول حديثة الولادة .

الفيروسة المكللة **coronavirus**

أي فيروسة من الفيروسات التي تنتمي إلى فصيلة الفيروسات الإكليلية .

النّاتئُ المنقاري للفكّ السُّفليّ **corone**

انظر تحت coronoideus processus mandibulae .

الجانُ التّمْساويّ **Coronella austriaca**

نوع من الحيات .

قاضِي التّحْقيق **coroner**

الشخص الذي يتولى التحقيق في حالات الموت الناتج عن العنف أو حالات الموت المفاجىء ، أو الناتج عن أسباب غير واضحة .

1ـ أطرَة (في الحِصان) **coronet**

2ـ تويج

هو الشريط التاجي ، وبخاصة عند الحصان .

الكليلى **coronion**

هو قمّةُ النّاتيء الإكْليليّ في الفَكّ السُّفْلِي .

(Coronary heart disease) .

مَرَضُ القَلْبِ التَّاجِيّ **coronary heart disease**

انظر تحت coronary failure .

قُصورٌ تاجيّ **coronary insufficiency**

عدم كفايَة التغذية الدموية التي يوفرها الدوران التاجي لعضلة القلب .

انْسدادُ التّاجيّ **coronary occlusion**

الانسداد التّام أو الكلي لجريان الدم في أحد الشرايين التاجية .

الضَّفيرَةُ التَّاجيَّة **coronary plexus**

هي الضفيرة المعدية العلوية .

انظر تحت superior gastric plexus .

تَصَلُّبُ التَّاجيّ **coronary sclerosis**

هو تصلب أحَد الشرايين التاجية .

الجَيبُ التَّاجيُّ **coronary sinus**

هو الجزء الانتهائي من الوريد القلبي الكبير .

خُثارُ التَّاجيّ **coronary thrombosis**

هو خثار يعترض الدوران الدموي التاجي .

الوَريدُ التَّاجيُّ **coronary vein**

أي من الأوردة التي تنزح الدم من نسيج العضلة القلبية وتصب في الجيب التاجي .

الفيروسات الإكليلية **Coronaviridae**

وهي الفيروسات المكللة (Coronavirus) ، والفيروسات الثورية (Torovirus) هي فصيلة من الفيروسات الرنوية ذات الفيريون متعدد الأشكال ، والذي يتراوح قطره بين (120-160) نانومتر ، ويتكون من غشاء يحتوي على الشحم ، وقسيمات فولفية (في بنية) ضخمة تحيط بقفيصة منواة حلزونية (في الفيروسات المكللة) أو أنبوبية (في الفروسات الثورية) . يتكون المجموع الجيني من جزيء رنا مفرد وحيد الطاق موجب الاتجاه مُذَيَّلٌ بعَديد الأدينيلات (وزنه الجزيئي) ($6.1\text{-}5.5\times10^6$) ، وحجمه يقارب 30 كيلو قاعدة لدى عند الفيروسات المكللة ، -30 لدى الفيروسات الثورية تحتوي تلك الفيروسات على عديدات الببتيد البنيوية الثلاثة الكبرى ، وهي مقاومة للتربسين ،

تحقيق هذه الأهداف .

شَرِكَة **corporation**

هو تجمع لمجموعة من الأفراد في إطار قانوني ، والذي يجعل المؤسسة الناتجة عن تجمعهم كياناً مستقلاً من الناحية القانونية عن الأفراد المكونين لها .

شَرِكَةٌ اسْتِثْمارِيَّة **corporation for profit**

هِي شَرِكَة تهدف إلى تحقيق الربح من خلال أعمالها ونشاطاتها .

شَرِكَةُ الهَيْئَةِ الطِّبِّيَّة **medical staff corporation**

هِي شركة تمثل أفراد الهيئة الطبية .

شَرِكَةٌ لانَفْعِيَّة **nonprofit corporation**

هِي شركة لا توزع عائدات نشاطها على المالكين ، أو حملة الأسهم بل تستثمر تلك العائدات في تحقيق أهدافها .

الشَّرِكَةُ الأُمّ **parent corporation**

هِيَ شركة تملك حصة في شركة ثانية أو أكثر ، وتكون حصتها في تلك الشركات كبيرة بما يسمح لها بالسيطرة عليها .

شَرِكَةٌ مِهْنِيَّة **professional corporation**

هِي شَرِكَة تعمل في مجال مهني معين بموجب تراخيص معينة من السلطات .

شَرِكَةُ خَدَمَات **service corporation**

هِي شركة تعمل في مجال الخدمات .

شَرِكَةٌ فَرْعِيَّة **subsidiary corporation**

هِي شَرِكَة تسيطر عليها شركة أكبر وأقوى .

جِسْمِيّ **corporeal**

أي بنية متعلقة بالجسم .

مُؤَثِّرٌ فِي الجِسْم **corporic**

يؤثر في الجسم أو في جسم العضو .

1ـ هَيْئَة **corps**

2ـ جِسْم

1 ـ هيئة ذات نظام معين ، أو مجموعة من الأفراد .

2 ـ بمعنى جسم .

أَجْسامٌ مُدَوَّرَة **corps ronds**

اسم دارييه (Darier's name) لوصف الأجسام

التِهابُ الأطرَة **coronitis**

التهاب الشريط التاجي أو الوسادة ، وبخاصة عند الحصان .

إكليليّ قاعِدِيّ **coronobasilar**

نسبة إلى التاج والقاعدة معاً .

إكليليّ وَجْهِيّ **coronofacial**

نسبة إلى التاج والوجه معاً .

إكليلانيّ **coronoid**

1 ـ ذو شكل يشبه منقار الغراب .

2 ـ ذو شكل يشبه التاج .

اسْتِئْصالُ النّاتِئِ المِنقاري **coronoidectomy**

البتر الجراحي للناتئ المنقاري للفك السفلي .

بضع النّاتِئِ المِنقاري **coronoidotomy**

القطع الجراحي للناتئ المنقاري للفك السفلي وذلك بغرض إعادة التشكيل .

رَأْبُ التّاج (أسنان) **coronoplasty**

تعديل شكل تاج السن .

إزاحَةُ الحَدَقَة **coroparelcysis**

الإزاحة الجانبية للحدقة ، وذلك في عتامة القرنية الجزئية بهدف وضعها تحت المنطقة الشفافة .

رَأْبُ القُزَحِيَّة **coroplasty**

انظر تحت coreoplasty .

تَنْظيرُ الحَدَقَة **coroscopy**

هو تنظير الشبكية .

انظر تحت retinoscopy .

بَضْعُ القُزَحِيَّة **corotomy**

هو القطع الجراحي للقزحية .

انظر تحت iridectomy .

رُوتينٌ مشارك **co-routine**

أَجْسام **corpora**

صيغة الجمع من جسم (Corpus) .

جِسْمِيّ **corporal**

انظر تحت corporeal .

تَخْطيطٌ مُشْتَرَك **corporate planning**

هو قيام الشركة بتحديد أهدافها ، ووضع خطط يتعلق بالموارد والوسائل التي ستعتمد عليها في

الأجْسامُ المُبَرْقَشَةَ (Corpora versicolorata) .

أجْسامُ آرانْتيُوسْ **corpora arantii**

هي أجسامَ موجودة في صمام الأورطي .

أجْسامٌ رَتَقيَّة **corpora atretica**

هي الجريبَات المبيضية التي لا تصل إلى مرحلة النضج ، وإنما تصاب بالتنكس .

الجسْمان التَّوْأمان **corpora bigemina**

1ـ جسَمان في دماغ الفقاريات من غير الثدييات يقابلان الأكيمات العلوية عند الفقاريات . يسميان أيضاً الفصان البصريان (Optic lobes) .

2ـ جسمان في دماغ جنين الإنسان ينقسمان لاحقاً ليكونا الأجسام رباعية التوائم .

الأجْسامُ الصُّفْر **corpora flava**

صيغة الجمع من الجسم الأصفر .

انظر تحت corpus luteum .

الأجْسامُ الصَّفْراءُ الرَّتقاء **corpora lutea atretica**

أجسام صفراء طرأت عليها تبدلات تنكسية .

أجْسامٌ رُزِّيَّة **corpora oryzoide**

انظر تحت rice bodies .

الأجْسامُ حَوْلَ الأورطي **corpor paraaortica TA**

هي مقتلفات (قسم منفصل عن العضو) من الخلايا الغدية من منشأ ودي (خلايا أليفة الكروم) ، والتي توجد قرب العقد الودية على امتداد الأورطي في التجويف البطني ؛ والتي تعمل كمستقبلات كيميائية مستجيبة لتراكيز أيونات الأكسجين ، وثنائي أكسيد الكربون ، والهيدروجين ، بما يساعد على تنظيم التنفس . تسمى أيضاً أجسام زوكيركاندل (Zuckerkandl's bodies) ، أو الكبب الأورطية (Glomera aortica) .

الأجْسامُ الرُّباعيَّةُ التَّوائم **corpora quadrigemina**

الأكيمة المتقارية والذيلية من سقف الدماغ المتوسط باعتبارهما معاً .

المستديرة وتكون ثنائية الحافة ، والمشاهدة في التقران الجريبي (Keratosis follicularis) .

الهَيئَةُ الطِّبِّيَّة **medical corps**

هو الضباط الأطباء في الجيش ، أو في سلاح البحرية ، ويشملون كبير الأطباء والمدراء الطبيين والمفتشين الطبيين والأطباء ومساعديهم .

جُثَّة **corpse**

هو جسم ميت ؛ ويطلق هذا المصطلح تحديداً على جسم الإنسان عقب الموت بوقت قصير .

انفضاج **corpulency**

بدانة مفرطة .

انظر تحت obesity .

جِسْم (ج: أجْسام) **corpus (pl.corpora)**

1 ـ الجسم ؛ وهو كتلة متفاصلة (منعزلة) من المواد ، مثل النسيج المتخصص .

2ـ في التسميات التشريحية : هو كامل جسم الكائن الحي ، أو الجزء الرئيسي من القسم التشريحي ، أو من بنية تشريحية ، أو من عضو .

الأجسام المجنحة (السهمية) **corpora allata**

هي مجموعة من الغدد الصغيرة الصماء في رؤوس الحشرات خلف الدماغ مباشرة ، والتي تثبط الاستحالة (Metamorphosis) عن طريق إفراز الهرمون اليفعي .

أجْسامٌ نَشَويَّة **corpora amylacea**

هي كتل هيالينية ، صغيرة قعدة ، موجبة الشيف للحمض البيريودي ، ويتراوح قطرها بين 5-50 نانومتر ، وتشتق من الخلايا المتنكسة ، أو من المفرزات المثخنة ، وتتكون من نواة مركزية محاطة بصفائح متراكزة . وتوجد في البروستاتة والدبق العصبي والأسناخ الرئوية ، ويزداد عددها مع التقدم في السن ؛ ولا تعرف أهميتها على وجه الدقة . تسمى أيضاً الأجْسامُ النَّشَوانيَّة (Amylaceous bodies) ، أو الجُسَيمات النَّشَويَّة (Amylaceous corpuscles)، أو (Amyloid bodies) ، أو (Amyloid corpuscles) ، أو جسيمات غروانية (Colloid corpuscles) أو

هي كتلة كبيرة من الدهن الواقعة ظهرانياً للفافة الكلوية ، وتسمى أيضاً الجسم المجاور للكلية (Paranephhric body) ، أو الدهن المجاور للكلية (Paranephric fat) .

الجسم الشحمي أمام لسان المزمار **corpus adiposum preepiglotticum TA**

هي كتلة من نسيج دهني ، والذي يفصل السطح الأمامي السفلي للسان المزمار عن الغضروف الدرقي والغشاء الدرقي اللامي .

الجِسْمُ الأَبْيَض **corpus albicans TA**

هَو نسيج ليفي أبيض يتشكل كبديل للجسم الأصفر المتراجع (المرتد) في المبيض في النصف الثاني من الحمل ، أو مباشرة في أعقاب الإباضة عندما لا يحدث الحمل ؛ يسمى أيضاً الجسم الليفي (Corpus fibrosum) .

جِسْمٌ أَجْنَبِيّ **corpus alienum**

أي جسم غريب أجنبي عن جسم الإنسان .

الجِسْمُ اللَّوزِيُّ **corpus amygdaloideum TA**

هَو مركب صَغير بيضوي الشكل من النوى في الدماغ المغطى جزئياً بالقشرة الكمثرية عند ذروة الفص الصدغي ، والتي تقع إلى الأمام من القرن السفلي للبطين الوحشي للدماغ ؛ وهو جزء من الجهاز الحوفي ويصنف على أنه جزء من النوى القاعدية . ويقسم الجسم اللوزي إلى مجموعتين رئيسيتين من النوى المتواجدة في الجزئين القاعدي الوحشي ، والقشري الإنسي (الجُزْءُ القاعديُّ الوَحْشيُّ للجسْم اللَّوزيّ ، والجُزْءُ القشْرَيُّ الإنْسيُّ للَجسْم اللَّوزَيّ) ، وَفي منطقة قَليلَة التمايز ، فَي المنطقَة اللوزية الأمامية . وله اتصالات شمية كما أنه مرتبط بشكل تبادلي مع القشرة الحوفية ، ويرسل أليافاً إلى كل من الحصين والحاجز والمهاد وبخاصة إلى الوطاء . يسمى أيضاً اللوزة (Amygdala) ، أو المركب اللوزي (Amgdaloid complex) ، أو النواة اللوزية (Nucleus amygdalaer) .

الجِسْمُ الشَّرجيُّ العُصْعُصِي **corpus anococcygeal**

أَجْسامُ سانتوريني **corpora santoriana**

هي الغَضاريفُ القُرَينيَّة .

انظر تحت corpora santoriana .

الأَجْسامُ المُبَرْقَشَة **corpora versicolorata**

هي الأَجْسامُ النَشَوِيَّة .

انظر تحت corpora amylacea .

الجِسْمُ الشَّحْميُّ الشِّدْقيُّ **corpus adiposum buccae TA**

هي الوسادة الدهنية الشدقية ؛ وهي كتلة محفظة من الدهن داخل الخد ، والتي يفصلها فلح وجهي عن اللفافة تحت الجلد ، وتقع بين الماضغة والسطح الخارجي للعضلات المبوقة ؛ وتكون واضحة بشكل مميز عند الأطفال حديثي الولادة ويقال إنها تساعد في عملية المص . تسمى أيضاً وسادة المص (Sucking cushion) ، أو (Sucking pad) ، أو (Suctorial pad) .

الجِسْمُ الشَحْميُّ للحُفْرَة الإسكيَّة المُسْتَقيمَيَّة **corpus adiposum fossae ischiorectalis TA**

هو الجسَم الدهني للحفرة الإسكية المستقيمية ، وهي وسادة دهنية تشاهد في الحفرة الإسكية المستقيمية .

الجِسْمُ الشَّحْميُّ تَحْتَ الرَّضَفَة **corpus adiposum infrapatellare**

هي كتلة من نسيج دهني ليفي والتي توجد تحت الرضفة في الزاوية بين السطح العميق للرباط الرضفي والظنبوب . تسمى أيضاً الوسادة الدهنية خلف الرضفة (Retropatellar fat pad).

الجِسْمُ الشَّحْميُّ الحَجاجيُّ **corpus adiposum orbitae TA**

هي كتلة من نسيج دهني توجد في القسم الخلفي من الحجاج حول العصب البصري والعضلات والأوعية خارج المقلة . تسمى أيضاً الدهن خلف الحجاج (Retrobullr fat) .

الجسم الشحمي المجاور للكلية **corpus adiposum pararenale TA**

المشيمية والقزحية ؛ ويتكون من الإكليل الهدبي ، والاستطالات ، والطيات الهدبية ، والدويرة الهدبية ، والعضلة الهدبية والصفيحة القاعدية . يسمى أيضاً (Corpus ciliaris) .

الجسْمُ الهَدَبِيُّ **corpus ciliaris**

انَظر تحت corpus ciliare .

جسم الترقوة **corpus claviculae**

هو الجزء المركزي الطويل المنحني من الترقوة ، والممتد بين النهايتين الأخرمية والقصية .

جسْمُ البَظْر **corpus clitoridis TA**

هَو الجـزء الرئيـسي من البظر ، والمكون من التحام الجسمين الكهفيين اللذين يتوضعان باتجاه الأمام في قاع دهليز المهبل .

الجسْمُ العُصْعُصِيُّ **corpus coccygeum**

هَي الكبة العصعَصية .

انظر تحت glomus coccygeum .

جسْمُ الضِّلْع **corpus costae TA**

هَو الجزء من الضلع الممتد بين حدبة الضلع المتوضعة ظهرانياً ، وبين نهايته البطنانية ؛ يسمى أيضاً جَدْلُ الضِّلْع (Shaft of rib) .

الجسْمُ المُخَيخيُّ المُسَنَّن **corpus dentatum cerebelli**

هي النَّواةُ المُسَنَّنَة .

انظر تحت nucleus dentatus .

الجسْمُ الزَّيتونيِ المُسَنَّن **corpus dentatum olivae**

هي النَّواةُ الزَّيتونيَّة .

انظر تحت nucleus olivaris .

جسْمُ البَرْبَخ **corpus epididymidis TA**

هَو الجـزء الأوسط من البـربخ ، والمتكون من تلفيفات القناة البربخية المفردة .

الجسْمُ الفَخذيّ **corpus femoris**

هو جسم عظم الفخذ .

الجسْمُ اللِّيفي **corpus fibrosum**

هَو الجسْمُ الأَبْيَض .

انظر تَحت corpus albicans .

جسْمُ الشَّظيَّة **corpus fibulae TA**

هو شريط ليفي يصل الألياف الخلفية للمصرة الشرجية بالعصعص .

جسْمُ العَقِبيّ **corpus calcanei**

هَو جسمَ عظم العقب (Calcneus) .

الجِسْمُ الثَّفَنيُّ **corpus callosum TA**

هَو كتلة مَقوسة من المادة البيضاء ، والتي توجد في أعماق الشق الطولاني ، وتتكون من ثلاث طبقات من الألياف ، والطبقة المركزية منها تتكون أساساً من ألياف مستعرضة تصل بين نصفي الكرة المخية ؛ وتسمى أقسامها الفرعية بالترتيب من الأمام إلى الخلف : المنصة والركبة والجذع والشريط . يسمى أيضاً الصِّوارُ الدِّماغِيُّ الكَبير (Commissura magna cerebri) .

الجسْمُ الكَهْفِيُّ لَلبَظْر (الأَيْمَنُ أو الأَيسَرُ) **corpus cavernosum clitoridis dextrum/sinistrm TA**

هو عمود من نسيج ناعظ يوجد على كل من جـانبي البظر (الأيمن والأيسر) ، واللذان يلتحمان ليكونا جسم البظر .

الجسْمُ الكَهْفِيُّ لَلقَضيب **corpus cavernosum penis TA**

هو أحد الأعمدة المكونة من نسيج ناعظ ، والتي تكون بدورها ظهر وجانبي القضيب . تسمى أيضاً جسم القضيب الإسفنجي (Spongy body of penis) .

الجسْمُ الكَهْفِيُّ لإحْلِيْل الذَّكَر **corpus cavernosum urethrae virilis**

هَو الجَسْمُ الاسْفَنْجِيُّ للقَضَيب .

انظر تحت corpus spongiosum penis .

جسْمُ المُخَيخ **corpus cerebelli TA**

هَو القسم الرئيسي من المخيخ ، والذي يتكون من نصفي الكرة المخيخية المتصلين بالشريط الناصف المسمى الدودة .

انظر تحت cerebellum .

الجسْمُ الهَدَبِيُّ **corpus ciliare TA**

هَو الجزء الكثيف من الغلالة الوعائية للعين إلى الأمام من الحاشية المشرشرة ، والذي يصل بين

الوحشية الواقعة تحته ، والمتوضع إلى الناحية الوحشية مباشرة من الجسم الركبي . وهو يوصل الدفعات البصرية من القناة البصرية إلى القشرة المهمازية ، ويربط المدخلات البصرية بالدماغ المتوسط القريب . يسمى أيضاً السرير البصري(Optic thalamus) .

الجسْمُ الرُّكْبِيُّ الإِنْسِيُّ **corpus geniculatum mediale TA**

هَو تَبَارز من المهاد التالي الناتج من النواة الركبية الإنسية الواقعة تحته ، والمتوضع إلى الناحية الوحشية مباشرة من الأكيمة العلوية ، وهو يوصل الدفعات السمعية من الفتيل الوحشي إلى القشرة السمعية .

جسْمُ الغُدَّةِ البَصَلِيَّةِ الإِحْليلِيَّة **corpus glandulae bulbourethralis**

هو الغُدَّةُ البَصَلِيَّةُ الإحْليلِيَّة .

انظر تحت glandulae bulbourethralis

جسْمُ الغُدَّة العَرَقِيَّة **corpus glandulae sudoriferae TA**

هو القَسم الإفرازي الملتف من الغدة العرقية ، والذي يشاهد في الجزء العميق من الأدمة . ويسمى أيضاً ملف الغدة العرقية (Coil of the sweat gland) ، أو عنيبة الغدة العرقية (Acinus of the sweat gland) .

جسْمُ غُدَّةِ البروسْتاتَة **corpus glandulare prostatae**

هي المادة الغدية للبروستاتة .

انظر تحت substantia glandularis prostatae .

الجسْمُ الغُدِّيُّ **corpus glandulosum**

الجَسْمُ النَّازف **corpus hemorrhagicum**

1ـ جريبَ مبيضي يحتوي على الدم .

2ـ جسم أصفر يحتوي على خثرة دموية .

جسْمُ هَيمور **corpus Highmori**

هَو مَنْصفُ الخُصْيَة .

انظر تحَت mediastinum testis .

جسْمُ العَضُدِيّ **corpus humeri TA**

هَو جسم عَظم العضد ، وهو الجزء المركزي

هو الجزء الجوهري من جدل الشظية ؛ ويسمى أيضاً جدل الشظية (Shaft of fibula) .

الجسْمُ المُخْمَل **corpus fimbriatum**

هَو خَمَلُ الحُصَين .

انظر تحت fimbria hippocampi .

الجسْمُ الخَمَليُّ للحُصَيْن **corpus fimbriatum hippocampi**

هو خَمَلُ الحُصَين .

انظر تحت fimbria hippocampi .

الجسْمُ القَبْوِيُّ **corpus fornicis TA**


هَو الجزء الأوسط من قبو المخ ، ويتكون من التحام النصفين الجانبيين تحت الجسم الثفني .

جسْمُ المَعِدَة **corpus gastricum TA**

هَو الجزء من المعدة بين القاع والجزء البوابي ؛ وتسمى أيضاً (Body of stomach) و (Corpus ventriculare) ، و(Corpus ventriculi) .

الجسْمُ الرُّكْبِيُّ الوَحْشِيُّ **corpus geniculatum laterale TA**

هو تبارزَ من المهاد التالي الناتج من النواة الركبية



Corpus femoris الجسم الفخذي

جِسْمُ الثَّدْيِ **corpus mammae TA**

هي الكتلة الرئيسية من الخلايا الثديية ، باستثناء العناصر الغدية ، والتي تكون في ثخانتها القصوى تحت الحلمة ، أو في ثخانتها الدنيا عند المحيط .

الجِسْمُ الحَلَمِيُّ **corpus mamillare TA**

أي من الكتلتين الصغيرتين الكرويتين المتجاورتين الواقعتين في الحيز بين السويقتين بالقرب من المادة المثقبة الخلفية في المنطقة الوطائية الخلفية ، ويتكون من نواتين رئيسيتين ، وحشية وإنسية ، وتكدسات صغيرة مرافقة من المادة السنجابية . وهو يكون قسماً من الجهاز الحوفي .

جِسْمُ الفَكِّ السُّفْلِيِّ **corpus mandibulae TA**

هو الجزء الأفقي الطويل الشبيه بحدوة الفرس من الفك السفلي .

جِسْمُ الفَكِّ العُلْوِيِّ **corpus maxillae TA**

هو الجزء المركزي الكبير من الفك العلوي ، وشكله هرمي إلى حد ما ، تتصل به أربعة نواتئ ؛ ويحتوي بداخله على الجيب الفكي .

الجِسْمُ النُّخاعِيُّ لِلمُخَيخ **corpus medullare cerebelli TA**

هي المادة البيضاء في المخيخ ؛ تسمى أيضاً المركز النخاعي للمخيخ (Medullary center of cerebellum) .

الجِسْمُ النُّخاعِيُّ لِلدُّودَة **corpus medullare vermis**

هي شَجَرَةُ الحَياة المُخَيخِيَّة .

انظر تحت arbor vitae cerebelli .

جِسْمُ السِّنْع **corpus metacarpale TA**

هو جسم عظم السنع .

جِسْمُ المِشْط **corpus metatarsalis TA**

هو جسم عظم المشط .

الجِسْمُ المُخاطِيّ **corpus mucosum**

هي الطَّبَقَةُ المُخاطيَّة .

انظر تحت stratum mucosum .

جِسْمُ النَّواةِ المُذَنَّبَة **corpus nuclei caudati TA**

الطويل من عظم العضد ؛ يسمى أيضاً جدل العضد (Shaft of humerus) .

الجِسْمُ الوِطَائِيُّ **corpus hypothalamicum**

هي النَّواةُ تَحْتَ المِهادِيَّة .

انظر تحت nucleus subthalamicus .

جِسْمُ السَّنْدان **corpus incudis TA**

هو الجزء المركزي من السندان ، والذي يحتوي على التكهف (الوجيه المقابل للمطرقة) الذي يتمفصل فيه رأس المطرقة .

الجِسْمُ بَيْنَ السُّوَيقَتَين **corpus interpedunculare**

هي النَّواةُ بَيْنَ السُّوَيقَتَين .

انظر تحت nucleus interpeduncularis .

جِسْمُ اللِّسان **corpus linguae TA**

هو الجزء الأمامي الكبير من اللسان ، والواقع في قاع الفم .

الجِسْمُ الأَصْفَر **corpus luteum TA**

هي كتلة غدية صفراء في المبيض تتشكل من جريب مبيضي بالغ لمرحلة النضج ، وقد أطلق بويضته ؛ إذا حدث إخصاب للبويضة ، يزداد حجم الجسم الأصفر ويستمر موجوداً لعدة أشهر ، ويسمى أيضاً الجسم الأصفر الحقيقي (True corpus luteum) ، أو الجسم الأصفر الحملي (Corpus luteum of pregnancy) ، أو (Corpus luteum gravidiatis) ؛ أما إذا لم يحدث الحمل ، فيتنكس الجسم الأصفر ويضمر يسمى الجسم الأصفر الكاذب (False corpus luteum) أو (Corpus luteum of menstruation) ، أو الجسم الأصفر الطمثي (Corpus luteum menstruationis) يفرز الجسم الأصفر البروجستيرون . يقابله الجسم الأبيض .

جِسْمُ لويزي **corpus Luysii**

هي النَّواةُ تَحْتَ المِهاد .

انظر تحت nucleus subthalamicus .

جِسْمُ مالبيجي **corpus malpighii**

هي طَبَقَةُ مالْبيجي .

انظر تحت stratum malpighii .

(Shaft of أو جــدل عـظم المشط ، metatarsle)
. metatarsal bone)

جسْمُ عَظْمِ المشْط **corpus ossis metatarsi TA**
انظر تحت corpus ossis metatarsalis .

جسْمُ عَظْمِ العانَة **corpus ossis pubis TA**
هي الكتلة العظمية غير المنتظمة من عظم العانة التي تتـوضع على امـتداد المسـتـوى الناصف ، وتـتـمـفـصـل مع الجـزء المماثـل من عظم العـانة المقـابل . ويمتـد منه الرأدان العلـوي والسـفـلي لعظم العانة .

جسْمُ العظْمِ الوتَدي **corpus ossis sphenoidalis TA**
هو الجـزء المركـزي النردي من العظـم الوتدي ، والذي يتصل به الجناحان الصـغيران والجـناحان الكبيران والنواتئ الجناحية . يسمى أيضاً الجسم الوتدي (Corpus sphynoidale) .

الجسْمُ العَنَميّ **corpus pampiniforme**
انظر تحت epoophoron .

جسْمُ البَنْكرْياس **corpus pancreatis TA**
هو الجـزءَ الموشـوري المثلثي من البنكـرياس ، والذي يمتـد من العنق في اليمين إلى الذيل في اليسار .

جسْمُ القَضيب **corpus penis TA**
هو الجزء الحر من القضـيب بين جذر القضيب والحشفة ، يتكون أساساً من الجسمين الكهفيين المزدوجين والجسم الإسفنجي المفرد للقضيب ، يسمى أيضاً جدل القضيب (Shaft of penis) .

الجسم العجاني **corpus perineale TA**
هي الكتلة الليفية العضلية في المستوى المنصف للعـجـان ، حيث تـتـقـارب وتـتلاقى العضـلات البصلية الإسفنجية ، والمصرة الظاهرة للشرج ، والرافعتين الشرجيتين ، والعضلتين العجانيتين المستعرضتين العميقتين ، والعضلتين العجانيتين المستعـرضتين السطحيتين ؛ يسمى أيضاً المركز العجاني (Centrum perinei) أو الوتر العجاني المركزي (Centrum tendineum perinei) .

هو الجزء من النواة الذنبية الذي يستند إلى قاع الجزء المركزي للبطين الوحشي للدماغ ، ويمتد باتجاه الخلف انطلاقاً من الرأس وانتهاء بالذيل .

جسْمُ أوكن **corpus of Oken**
هي الكُلْوَةُ الجَنينيَّةُ المُوَسَّطَة .
انظر تحت mesonephros .

جسْمُ العَظْمِ اللاَّمي **corpus ossis hyoidei TA**
هو الجزء المركزيَ من العظم اللامي الذي تتصل به القرون الكبيرة والصغيرة ؛ يسمى أيضاً قاعدة اللامي (Basihyal) ، أو (Basihyoid) .

جسْمُ عَظْمِ الحَرْقَفَة **corpus ossis ilii TA**
هو الجزء السفلي من الحرقفة ، والذي يشكل ما يكاد يصل إلى الخـمـسين العلويين من الحق المنخمص .

جسْمُ عَظْمِ الحَرْقَفَة **corpus ossis ilium**
هو الجزء السفلي من الحرقفة ، والذي يشكل ما يكاد يصل إلى الخـمـسين العلويين من الحق المنخمص .

جسْمُ العَظْمِ الإسْكي **corpus ossis ischii TA**
هو الجـزء الموشـوري الشـخين غـيـر المنتظم من العظم الإسكي . والتي تساهم نهايته العلوية في تكوين الحق المنخـمص ، ويبـرز من نهـايتـه السفلية رأد النواتئ الإسكية . وهو يمثل ما كان يعرف سابقاً باسم الرأد العلوي .

جسْمُ عَظْمِ السِّنْع **corpus ossis metacarpalis TA**
هو الجـزء المركـزي الطويل من عـظم السنع . يسـمى أيضـاً الجـسم السنعي (Corpus metacarpale) ، أو جـدل عظم السنع (Shaft of metacarpal bone) .

جسْمُ عَظْمِ السِّنْع **corpus ossis metacarpai TA**
انظر تحت corpus ossis metacarpalis .

جسْمُ عَظْمِ المشْط **corpus ossis metatarsalis TA**
هو الجـزء المركـزي الطويل من عظم المشط . يسـمى أيضـاً الجـسم المشطي (Corpus

يوجد فيه الإحليل ؛ ويكون امتداده الوحشي حشفة القضيب . يسمى أيضاً الجسم الكهفي لإحليل الذكر (Corpus cavernosum urethrae virilis) أو الجسم الإسفنجي لإحليل الذكر (Spongy body of male urethra) .

الجِسْمُ الاسْفَنْجِيُّ لِلإِحْلِيل الأُنْثَوِيّ **corpus spongiosum urethrae muliebris**

جِسْمُ القَصّ **corpus sterni TA**

هَو القسم الثاني ، أو القسم الرئيسي (الجوهري) من القص ، والواقع بين القبضة في الأعلى والناتئ الرهابي في الأسفل ؛ يسمى أيضاً (Gladiolus) .

الجِسْمُ المُخَطَّط **corpus striatum TA**

هَو أحد مكونات النواة القاعدية ؛ وتحديداً الكتلة تحت القشرية من المادة السنجابية والبيضاء إلى الأمام ، والوحشي من المهاد في كل من نصفي الكرة المخية . تكون المادة السنجابية في هذه البنية مرتبة في كتلتين رئيسيتين هما ، النواة الذنبية والنواة العدسية ؛ ويشتق الاسم من المظهر المخطط لمقطع هذه المنطقة ، والذي ينتج عن وجود أشرطة واصلة من المادة السنجابية التي تعبر من إحدى هاتين النواتين إلى الأخرى مروراً بالطرف الأمامي للمحفظة الغائرة .

الجِسْمُ تَحْتَ المِهاد **corpus subthalamicum**

هَي النَّواةُ تَحْتَ المِهاد .

انظر تحت nucleus subthalamicus .

جِسْمُ الكَاحِل **corpus tali TA**

هَو الجزء الذي يكاد يكون رباعي الجوانب من الكاحل ، والذي توجد عليه أسطح متعددة للتمفصل مع كل من العظم العقبي والظنبوب والشظية .

جِسْمُ الظُّنْبوب **corpus tibiae TA**

هَو الجزء المركزي الطويل من الظنبوب ؛ يسمى أيضاً جدل الظنبوب (Shaft of tibia) .

جِسْمُ الظُّنْبوب **corpus tibiale TA**

اَلجزء المركزي الطويل من الظنبوب ؛ يسمى

جِسْمُ سُلاَمى إِصْبَع اليَد **corpus phalangis digitorum manus TA**

هَو الجزء المركزي الطويل من سلامى إصبع اليد ؛ يسمى أيضاً جدل سلامى إصبع اليد (Shaft of phalanx of hand) .

جِسْمُ سُلاَمى إِصْبَع القَدَم **corpus phalangis digitorum pedis TA**

هَو الجزء المركزي الطويل من سلامى إصبع القدم ؛ يسمى أيضاً جدل سلامى إصبع القدم (Shaft of phalanx of foot) .

الجِسْمُ الصَّنَوبَرِيُّ **corpus pineale TA**

تَسمية بديلَة لمصطلح الغدة الصنوبرية (Glandula pinealis) .

الجِسْمُ الجِسْرِيُّ البَصَلِيُّ **corpus pontobulbare**

الجِسْمُ الهَرَمِيُّ البَصَلِيّ **corpus pyramidale medullae**

هو هَرَمُ البَصَلَة .

انظر تحت pyramis medulla oblongata .

جِسْمُ الكُعْبُرَة **corpus radii TA**

هَو الجزء المركزي الطويل من الكعبرة ؛ يسمى أيضاً جدل الكعبرة (Shaft of radius) .

الجِسْمُ المَرَسِيُّ الشَّكل **corpus restiforme**

هَي السُّوَيقَةُ السُّفْلِيَّةُ للمُخَيخ ، أو السويقة الذيلية للمخيخ .

انظر تحت pedunculus cerebellaris inferior .

انظر تحت pedunculus cerebellaris caudalis .

الجِسْمُ المُعَيَّنِيّ **corpus rhomboidale**

هَي النَّواةُ الذنبية والنواة المسننة .

انظر تحت nucleus caudalis .

انظر تحت nucleus dentatus .

جسم الوتدي **corpus sphenoidale**

هو جسم العظم الوتدي .

انظر تحت corpus ossis sphenoidalis .

الجِسْمُ الاسْفَنْجِيُّ لِلقَضيب **corpus spongiosum penis TA**

هو العمود المتكون من نسيج ناعظ ، والذي يشكل السطح الإحليلي للقضيب ، والذي

أيضاً جدل الظنبوب (Shaft of tibia) .

جِسْمُ المُنْحَرِفي **corpus trapezoideum TA**

هي كتلة منَ الألياف المستعرضة التي تمتد عبر الجزء المركزي من الجسر ، وتكون مسلك العصب القوقعي .

الجِسْمُ القَمْحِيّ **corpus triticeum**

هو الغُضْروفُ القَمْحِيّ في الحنجرة .

انظر تحت cartilago triticea .

جِسْمُ الزَّنْد **corpus ulnae TA**

هو الجزء المركزي الطويل من الزند ؛ ويسمى أيضاً جدل الزند (Shaft of ulna) .

جِسْمُ الظُّفُر **corpus unguis TA**

هو الجزء الكبير المكشوف الوحشي من ظفر الإصبع .

جِسْمُ الرَّحِم **corpus uteri TA**

هو الجزء من الرحم الواقع فوق البرزخ وتحت فوهات الأنابيب الرحمية .

جِسْمُ المَعِدَة **corpus ventriculare TA**

انظر تحت corpus gastricum .

جِسْمُ المَعِدَة **corpus ventriculi TA**

انظر تحت corpus gastricum .

جِسْمُ الفِقْرَة **corpus vertebrae TA**

هو جسم الفقرة الذي يتكون من المركز ، والمفصل العصبي المركزي المتعظم ، وجزء من الأقواس الفقرية ، ووجيهات التمفصل مع رؤوس الأضلاع . يسمى أيضاً (Vertebral body) .

جِسْمُ الفِقْرَة **corpus vertebrale TA**

انظر تحت corpus vertebrae .

جسم المرارة **corpus vesicae biliaris TA**

هو الجزء من المرارة الواقع بين القاع والعنق ؛ يسمى أيضاً (Corpus vesicae felleae) ، (corpus felleae) .

جِسْمُ المَرارَة **corpus vesicae felleae TA**

انظر تحت corpus vesicae biliaris .

جِسْمُ المَثانَة **corpus vesicae urinariae TA**

هو الجزء من المثانة الواقع بين القمة والقاع .

جِسْمُ الحُوَيصِلَة المَنَوِيَّة **corpus vesiculae seminalis**

الجِسْمُ الزُّجاجي **corpus vitreum TA**

هو الهلام الشفاف الذي يملأ الجزء الداخلي من مقلة العين بين العدسة والشبكية ؛ يسمى أيضاً (Hyaloid body) ، أو (Humor crystallinus) ، أو الخلط البلوري (Crystalline humor) ، أو الخلط الزجاجي (Vitreous humor) .

جِسْمُ وولف **corpus Wolffi**

هو الكُلْوَةُ الجَنينيَّةُ المُوَسَّطَة .

انظر تحت mesonephros .

قطعُ الجِسْمِ الثَّفَنِي **corpuscallostomy**

هو القطع الجراحي لألياف الجسم الثفني ، وهي عملية تجرى لتسهيل الوصول إلى بنى البطين الثالث ؛ وكانت تستخدم في السابق لعلاج الصرع المعند .

1 ـ كُرَيَّة (ج: كُرَيَّات) **corpuscle**

2 ـ جُسَيْم (ج: جُسَيْمات)

أي جسم صغير أو أية كتلة صغيرة .

انظر تحت corpusculum .

جُسَيْماتُ أَلْزهايمَر **Alzheimer's corpuscles**

هي جسيمات تتواجد في الخلايا قليلة التغصنات في الدماغ .

جُسَيْماتٌ نَشَوِيَّة **amylaceous corpuscles**

انظر تحت corpora amylacea .

جُسَيْماتٌ نَشَوانِيَّة **amyloid corpuscles**

انظر تحت corpora amylacea .

جُسَيْماتٌ مَفْصِلِيَّة **articular corpuscles**

هي نوع من الجَسيمات الصفاحية التي توجد في المفاصل .

جُسَيْمٌ مِحْوَرِيّ **axile corpuscle**

هو الجزء المركزي في الجسيم اللمسي .

جُسَيْمٌ مِحْوَرِيّ **axis corpuscle**

هو الجزء المركزي في الجسيم اللمسي .

جُسَيْماتُ بابيس ـ ايرنيست **Babès-Ernst corpuscles**

هي حُبَيْباتٌ مُتَبَدِّلَةُ اللَّون .

ويبدو أنها خلايا بلعمية من الغدة الثديية ، وتتواجد في الأسبوعين الأولين بعد الولادة . تسمى أيضاً أجسام دون (Donne's bodies) ، أو جسيمات دون (Donne's corpuscles) .

compound granular corpuscle **جسيمات حبيبية مركبة**
انظر تحت gitter cell .

concentric corpuscle **جُسَيمٌ مُتَراكِز**
هو تجمع خلوي في لب التوتة .
انظر تحت Hassell's corpuscle .

corneal corpuscles **جسيمات قَرْنَويَّة**
هي خلايا نسَيج ضام نجمية الشكل توجد ضمن الفراغات القرنية ؛ تسمى أيضاً جسيمات توينبي (Tonbee's corpuscles) أو جسيمات فيرشو (Virchow's corpuscles) .

Dogiel's corpuscle **جُسَيمٌ دُوجيل**
هو الجسيم التَناسلي .
انظر تحت genital corpuscle .

Donne's corpuscles **جُسَيماتُ دون**
هي جُسَيماتٌ لبَئِيَّة .
انظر تحت colostrum corpuscles .

Drysdale's corpuscles **كُرَيَّاتُ درايزديل**
هي خلايا درايزديل في سائل الكيسة المبيضية .

dust corpuscles **جُسَيماتٌ غُبارِيَّة**
هي غُبَيراتٌ دَمَوِيَّة .
انظر تحت hemoconia .

Eichhorst's corpuscles **جُسَيماتُ آيخهُورِسْت**
هي كريات حمراء صغيرة تشاهد في فقر الدم الوبيل .

genital corpuscles **جُسَيماتٌ تَناسُلِيَّة**
هو نوع من جسَيم صفاحي يوجد في الأغشية المخاطية التناسلية في الجلد حول الحلمات ؛ يسمى أيضاً (Corpuscula genitalia) .

ghost corpuscle **كُرَيَّةٌ شَبَحِيَّة**
انظر تحتَ phantom corpuscle .

Gierke's corpuscles **جُسَيماتُ جيركه**

انظر تحت metachromatic granules .

basal corpuscle **جُسَيمٌ قاعديّ**
انظر تحتَ basal body .

Bennet's large corpuscles **جُسَيماتُ بينيه الكَبيرَة**
خلايا ظهارية شحمية في الكيس المبيضي .

Bennet's small corpuscles **جُسَيماتُ بينيه الصَّغيرَة**

blood corpuscles **كُرَيَّاتُ الدَّم**
انظر تحت cell .

bone corpuscle **كُرَيَّةٌ عَظْمِيَّة**
انظر تحتَ bone cell .

bridge corpuscle **جُسَيمٌ رابط**
انظر تحتَ desmosome .

bulboid corpuscles **جُسَيمات بَصَلَيَّةُ الشَّكْل**
انظر تحت corpusculum bulboideum .

cartilage corpuscle **كُرَيَّةٌ غُضْروفيَّة**
انظر تحت cartilage cell .

cement corpuscle **كُرَيَّةٌ مِلاطِيَّة**
انظر تحتَ cementocyte .

chorea corpuscles **جُسَيماتٌ رَقَصِيَّة**
هو اسم يطلق على أجسام هيالينية مستديرة غريبة ، وصفاحية بشكل كثيف وسهلة الانكسار بشكل كبير ، توجد في الأغماد المحيطة بأوعية الأجسام المخططة والمحفظة الداخلية في داء الرقص .

chromophil corpuscle **جُسَيمٌ صَبوغ**
هو جسْمُ نيسْل .
انظر تحتَ Nissl's body .

chyle corpuscle **كُرَيَّةٌ كَيلوسيَّة**
لمفاويات توجد في الكيلوس .

colloid corpuscles **جُسَيماتٌ غَرَوانية**
هي أجْسامٌ نَشَوِيَّة .
انظر تحت corpora amylacea .

colostrum corpuscles **جُسَيماتٌ لبَئِيَّة**
أجسام كبيرَة مستديرة وتوجد في اللبأ ، وتحتوي على قطيرات من الدهن وأحياناً على نواة ؛

جُسَيم كَراوزَة **Krause's corpuscle**
هو الجسيم بصلي الشكل .
انظر تحت corpusculum bulboideum .

جُسَيم صُفاحيّ **lamellar corpuscle**
انظر تحت corpusculum lamellosum .

جُسَيم صُفاحيّ **lamellated corpuscle**
انظر تحت corpusculum lamellosum .

خَلاَيا لانْجرهانْس النَّجْميَّة **Langerhans's stellate corpuscles**

جسيماَت لافيران **Laveran's corpuscles**
هي المتصورات .
انظر تحت plasmodia .

جُسَيماتُ ليبر **Leber's corpuscles**
هي جسيمات هاسل .
انظر تحت Hassal's corpuscles .

الجُسَيم اللِّساني **lingual corpuscle**
هو عـصب حَسي انتهـائي محفظ ينتهي في الحليمات اللسانية .

جُسَيماتُ لُوستُورفَر **Lostorfer's corpuscles**
هي أجسام حبيبية تشاهد في الدم عند المصابين بالزهري ؛ تسمى أيضاً أجسام لوستورفر (Lostorfer's bodies) .

كُرَيَّاتٌ لِمْفيَّة **lymph corpuscles**
هي اللمَفَاويات الموجودة في اللمف .

كُرَيَّاتٌ لِمْفاويَّة **lymphoid corpuscles**
هي اللمَفاوِيَات الموجودة في الأنسجة .

جُسَيماتُ مالْبيجي الكُلْويَّة **malpighian corpuscles of kidney**
هيَ الجسيماتَ الكلوية .
انظر تحت corpuscula renis .

جُسَيماتُ مالْبيجي الطِّحاليَّة **malpighian corpuscles of spleen**
هيَ العقيدات اللَمفية الطحالية .
انظر تحت noduli lymphoidei splenici .

جُسَيم مازُّوني **Mazzoni's corpuscle**
هي الجسيمَ البصلي .
انظر تحت corpusculum bulboideum .

هي جسيمات هاسل .
انظر تحت Hassal's corpuscles .

جُسَيماتُ جلُوجه **Gluge's corpuscles**
هي جسيمات حبيبية تشاهد في النسيج العصبي المريض .

جُسَيماتُ جولجي ـ مازُّوني **Golgi-Mazzoni corpuscles**
هي جسيمات لمسية توجد في النسيج تحت الجلد في أطراف أصابع اليدين ، والتي تماثل جسيمات باتشيني إلا أنها تبدي صفاحات أقل ومخروط أكبر نسبياً ، وتكون الألياف العصبية المنطمرة فيها ذات تشعب أكثر اتساعاً .

جُسَيماتُ جولْجي **Golgi's corpuscles**
هو عُضْوُ جولْجي الوَتَري .
انظر تحت Golgi's tendon organ .

جُسَيْمات جراندري **Grandry's corpuscles**
هي نهايات حسية لمسية .
انظر تحت Merkel's corpuscles .

جُسَيَمُاتُ جوارْنيري **Guarnieri's corpuscles**
جسيمات ترى في داء الكَلَب .
انظر تحت body .

جُسَيماتُ هاسل **Guarnieri's corpuscles**
هي أجسام كروية أو بيضوية توجد في لب التوتة ، تتكون من صفائف متراكزة من الخلايا الظهارية التي تحتوي على الكيراتوهيالين (القرنية الهيالينية) ، وحزم من الخيوط الهيولية . تسمى أيضاً أجسام هاسل (Hassal's bodies) ، أو الجسيمات المتراكزة (Concentric corpuscles) ، أو جسيمات ليبر (Leber's corpuscles) أو جسيمات التوتة (Thymus corpuscles) .

جُسَيماتُ هربْسْت **Herbst's corpuscles**
هي أعضاءَ انتهائية حسية غريبة في جلد المنقار وفي الغشاء المخاطي للسان عند البط .

جُسَيماتُ ياوُرْسكي **Jaworski's corpuscles**
هي أجسام مخاطيَة حلزونية توجد في إفرازات المعدة في فرط الكلورهيدرية .

(جسيمات صفاحية) أكثر استطالة وأقل صفاحية من الجسيمات الباتشينية ؛ توجد في الشعرات الأنفية وبشرة الأنف ، وفي المحافظ المفصلية ، وفي السفاق ، وفي الموصلات العضلية الوترية ، وتكون مترافقة بأعضاء جولجي الوترية . وهي تستجيب لشد العضلات وللضغط الخفيف . تسمى أيضاً المستقبلات باتشينية الشكل (Paciniform receptors) .

Paschen's corpuscles **جُسَيماتُ باشن**

انظر تحت body .

Paterson's corpuscles **جُسَيماتُ باترسون**

هي أَجْسامٌ مُلَيسائيَّة .

انظر تحت molluscum bodies .

pessary corpuscle **كُرَيَّةٌ فَرْزَجيَّة**

انظر تحت cell .

phantom corpuscle **كُرَيَّةٌ شَبَحيَّة**

وتسمى أيضاً جسيم تراوبه (Traube's corpuscle) .

polar corpuscle **جُسَيمٌ قُطْبِيّ**

انظر تحت polar body .

Purkinje's corpuscles **خَلايا بوركينيي**

هي خلايا في قشر المخيخ .

pus corpuscle **كُرَيَّةٌ قَيحيَّة**

Rainey's corpuscle **جُسَيم ريني**

أي من الأثاريف هلالية أو موزية الشكل وحيدة النواة ، والتي توجد في الكيسة العضلية في داء المتكيسات العضلية .

red blood corpuscle **كُرَيَّةُ الدَّمِ الحَمْراء**

انظر تحت erythrocyte .

red corpuscle **كُرَيَّةٌ حَمْراء**

انظر تحت erythrocyte .

renal corpuscles **جُسَيماتٌ كُلْوِيَّة**

انظر تحت corpuscula renis .

reticulated corpuscle **كُرَيَّةٌ مُشَبَّكَة**

انظر تحت reticulocyte .

Rohl's marginal corpuscles **جُسَيماتُ رول الهامشيَّة**

meconium corpuscles **جُسَيماتٌ عقْيِيَّة**

هي خلايا ظَهَارية تحتوي على حبيبات صفراء خشنة ، تشاهد في القسم الوحشي من المعي الدقيق عند الجنين .

Meissner's corpuscle **جُسَيم مايسنَر**

هو الجسيم اللمسي .

انظر تحت corpusculum tactus .

Merkel's corpuscle **جُسَيم ميرْكل**

انظر تحت cell .

Miescher's corpuscles **جُسَيماتُ مايشر**

هي كِيْساتُ البَوغيَّات اللَّحْميَّة .

انظر تحت sarcosporidian cysts .

milk corpuscles **جُسَيماتُ اللَّبَن**

molluscous corpuscles **جُسَيماتٌ مُلَيسائيَّة**

mucous corpuscles **جُسَيماتٌ مُخاطيَّة**

هي أجسام تشبهَ الكريات البيض ، والتي توجد في المخاط .

nerve corpuscles **جُسَيماتٌ عَصَبيَّة**

Norris corpuscles **جُسَيماتُ نوريس**

هي كريات دم حمراء مزالة اللون .

انظر تحت hypochromic erythrocyte .

Nunn's gorged corpuscle's **جُسَيماتُ نان الحَلْقيَّة**

هي خلايا ظهارية شحمية في الكيسة المبيضية . تسمى أيضاً جُسَيماتُ بينيه الكَبيرَة (Bennet's large corpuscles) .

pacchionian corpuscles **جسيمات باكيوني**

هي تَحبُّباتُ العَنْكَبوتيَّة .

انظر تحت granulationes arachnoideae .

Pacini's corpuscles **جُسَيماتُ باتشيني**

هي جسيمات صفاحية .

انظر تحت corpusculum lamellosum .

Pacinian corpuscles **الجسيمات الباتشينية**

انظر تحت corpusculum lamellosum .

paciniform corpuscles **جسيمات باتشينية الشكل**

هي نهايات عصبية صفاحية سريعة التأقلم

جُسَيم ذَوقي **taste corpuscle**
هو كُؤَيسَةُ الذَّوق .
انظر تحت caliculus gustatorius .

جُسَيْمَاتٌ وَتَرِيَّة **tendon corpuscles**
هي خلايا مسَطحة في النسيج الضام تشاهد في صفوف بين الحزم الرئيسية لجميع الأوتار .

جُسَيمات العَصَب الانْتِهائيَّة **terminal nerve corpuscles**
انـظـر تحـت corpusculum nervosum terminale .

جُسَيماتٌ توتيَّة **thymus corpuscles**
هي جُسَيماتُ هاسل .
انظر تحت Hassell's corpuscles .

جُسَيمات تيمُوفيف **Timofeew's corpuscles**
هي نوع متَخصَص من الجسيمات الصفاحية ، والذي يوجد في الطبقة تحت المخاطية من الجزء الغشائي والجزء البروستاتي من الإحليل .

جُسَيم لَمسي **touch corpuscles**
انظر تحت corpsculum tactus .

جُسَيمات تُوينبي **Toynbee's corpuscles**
هي جسيمات قرنية .
انظر تحت corneal corpuscles .

جُسَيم تراوبه **Traube's corpuscle**
هي الجسيم الشبَحي .

هي أجسام صغيرة تشاهد على حواف كريات الدم الحمراء عند الحيوانات بعد إعطائها المواد التي تستخدم في العلاج الكيميائي .

جُسَيم رُفيني **Ruffini's corpuscles**
هو نوع منَ الجسيم الصفاحي في الأدمة ، والذي يتكيف ببطء مع إحساسات الضغط المستمر . يسمى أيضاً أسطوانة رافيني (Ruffini's cylinder) ، أو نهاية رافيني (Ruffini's ending) .

جسيم لعابي **salivary corpuscle**
هي كرية دم بيضاء هاجرت عبر الظهارة الفموية ، وامتزجت باللعاب .


جُسَيم شفالبه **Schwalbe's corpuscle**
هي كُؤَيسَةُ الذَّوق .
انظر تحت caliculus gustatorius .

كُرَيَّةٌ مُحَسَّسَة **sensitized corpuscle**

جسيم ظلِّي **shadow corpuscle**
هو الجَسيم الشبَحي .
انظر تحت phantom corpuscle .

جُسَيمٌ طحاليّ **splenic corpuscle**
هي العقَيداتَ اللمفية الطحالية .
انظر تحت noduli lymphoidei splenici .

جُسَيم لَمسي **tactile corpuscle**
انظر تحت corpusculum tactus .



Renal corpuscles الجسيمات الكلوية

جُسَيماتٌ بَصَلِيَّةُ الشَّكْلِ **corpuscula bulbiformia**

انظر تحت corpusculum bulboideum .

جُسَيماتٌ بَصَلِيَّةُ الشَّكْلِ **corpuscula bulboidea**

انظر تحت corpusculum bulboideum .

جُسَيماتٌ تَناسُلِيَّة **corpuscula genitalia**

انظر تحت corpusculum genitale .

جُسَيماتٌ صُفَاحِيَّة **corpuscula lamellosa**

انظر تحت corpusculum lamellosum .

جُسَيماتٌ عَصَبِيَّةٌ مِفْصلِيَّة **corpuscula nervorum articularia**

انظر تحت articular corpuscle .

جُسَيماتٌ عَصَبِيَّةٌ تناسُلِيَّة **corpuscula nervorum genitalia**

انظر تحت genital corpuscle .

جُسَيماتٌ عَصَبِيَّةٌ انْتهائِيَّة **corpuscula nervorum terminalia**

انظر تحت corpusculum nervosum terminale .

جُسَيماتٌ عَصَبِيَّةٌ لامُحْفَظَة **corpuscula nervosa incapsulata**

هي جسيمات عصبية انتهائية غير محاطة بمحفظة ليفية .

انظر تحت free nerve endings .

جُسَيماتٌ عَصَبِيَّةٌ انْتهائِيَّة **corpuscula nervosa terminalia**

انظر تحت corpusculum nervosum terminale .

جُسَيماتٌ كُلْوِيَّة **corpuscula renis**

هي أجسام تكَون بداية الكليون ، والتي يتشكل كل منها من لمة (Tuft) من الشعيرات (الكبيبية) ، والمحاطة بجزء متسع من النبيب الكلوي (المحفظة الكبيبية) ؛ تسمى أيضاً الجسيمات المالبيجية (Malpighian corpuscles) ، أو عنيبة مالبيجي الكلوية (Acinus renalis malpighii) ، أو (Acinus renis malpighii) ، أو أجسام مالبيجي الكلوية

انظر تحت phantom corpuscle .

جُسَيماتُ ترُولْتش **Troltsch's corpuscles**

هي أحياز في النسيج الضام ، والتي تحتوي على خلايا بطانية ، وتبدو وكأنها أجسام كرية بين الألياف ذات المظهر الشعاعي في الغشاء الطبلي .

جُسَيماتٌ تيفيَّة **typhic corpuscles**

هي خلايا مَصابة بالتنكس ، والتي تشاهد في لطخات باير في الحمى التيفية .

جُسَيماتُ فالنتين **Valentin's corpuscles**

هي أجسام نَشوانية صغيرة ، والتي تشاهد أحياناً في النسيج العصبي .

جُسيم فاتر ـ باتشيني **Vater-Pacini corpuscles**

هي جسيمات صفاحية .

انظر تحت corpusculum lamellosum .

جُسَيم فاتر **Vater's corpuscle**

هي جسيمات صفاحية .

انظر تحت corpusculum lamellosum .

جُسَيماتُ فيرخوف **Virchow's corpuscles**

هي جسيمات قرنية .

انظر تحت corneal corpuscles .

جُسَيماتُ فاجنر **Wagner's corpuscles**

هي جُسَيماتٌ لَمسيَّة .

انظر تحت corpuscula tactus .

جُسَيماتُ ويبر **Weber's corpuscle**

هي القُرَيبَةُ البرُوسْتاتيَّة .

انظر تحت utriculus prostaticus .

كُرَيَّاتُ الدَّمِ البَيضاء **white blood corpuscles**

انظر تحت leukocyte .

كُرَيَّةٌ بَيضاء **white corpuscle**

انظر تحت leukocyte .

corpuscula — جُسَيمات (ف: جُسَيم)

صيغة الجمع من جسيم (Corpusculum) .

انظر تحت Corpusculum .

جُسَيماتٌ مَفْصلِيَّة **corpuscula articularia**

انظر تحت articular corpuscle .

corpusculum nervosum terminale **جسيم عصبي انتهائي**

هي نهاية عصبية حسية تتميز بمحفظة ليفية متفاوتة الثخانة تتمادى مع غمد الليف العصبي .

يسمى أيضاً البصلة الانتهائية (End bulb) ، أو نهاية عصبية محفظة (Encapsulated nerve ending) .

corpusculum renale TA **جُسَيمٌ كُلْويّ**

انظر تحت corpuscula renis .

corpusculum tactus TA **جُسَيم لَمسي**

نوع من النهايات العصبية المحفظة متوسطة الحجم التي توجد في الجلد ، وبخاصة في راحة اليد وأخمص القدم ؛ يسمى أيضاً خلية لمسية (Tactile cell) أو (Touch cell) ، أو جسيم لمسي (Touch courpuscle) ، أو جسيم مايسنر (Meissner's corpuscle) .

corpusculum triticeum **الجُسَيمُ القَمْحيّ**

انظر تحت cartilago triticea .

correction **1ـ تَصْليحٌ**

2ـ تَصْحيح

هو إعادة الشيء إلى وضعه الصحيح ، كما في استعمال العدسات لتحسين الإبصار ، أو التعديلات الكيفية التي يتم إدخالها على القيم أو الأدوات عند إجراء العمليات الاختبارية .

corrective **1ـ تَصْليحِيّ**

2ـ مُصْلِحٌ

متعلق بالتصليح أو التصحيح أو التقويم .

corrector **مُصْلِح**

ما يقوم بالتصحيح أو وضع الشيء في وضعه الصحيح .

function corrector **مُصْلِحٌ وَظيفيّ** (أسنان)

طبيقة تقويمية نزوعة تعمل على استخدام القوى العضلية الفموية والوجهية في تحريك الأسنان ، وبالتالي في احتمال تبديل العلاقة بين القوسين السنيتين ؛ تسمى أيضاً طبيقة فرنكل (Fraenkel appliance) .

(Malpighian bodies of kidney) .

corpuscular **1ـ كُرَيويّ**

2ـ جُسَيمِيٌّ

يتعلق بالجسيمات أو يشير إلى الجسيمات .

corpusculum **جُسَيم**

هي كتلة صغيرة أو جسم صغير ؛ يستعمل كاصطلاح عام في التسميات التشريحية للإشارة إلى كتل معينة صغيرة معزولة من نسج تخصصي ، وبخاصة في النسيج العصبي .

corpusculum articulare TA **جُسَيم مَفْصلي**

انظر تحت articular corpuscle

corpusculum bulboideum bulboideum **جُسَيم بَصَلي الشَّكْل**

هو نوع من النهايات العصبية الصغيرة المحفظة التي توجد في الجلد والأغشية المخاطية والملتحمة في مستويات عديدة ؛ ويعتقد أنها تقوم إما بوظيفة المستقبلات الحرارية للبرودة أو المستقبلات سريعة التكيف . تسمى أيضاً بصلة كراوزه (Bulb of Krause) ، أو جسيم كراوزه (Krause's corpuscle) ، أو البصلة الانتهائية (End bulb) .

corpusculum genitale **جسيم تناسلي**

انظر تحت genital corpuscle .

corpusculum lamellosum **جسيم صفاحي**

هو نوع من النهايات العصبية الكبيرة المحفظة الحساسة للضغط والاهتزاز ؛ وهي أكثر النهايات العصبية تعقيداً ، وتوجد في جميع مناطق الجسم . يسمى أيضاً جسيم باتشيني (Pacini's corpuscles) ، أو (Pacinian corpuscle) ، أو جسيم فاتر (Vater's corpuscle) ، أو جسيم فاتر ـ باتشيني (Vater-Pacini corpuscle)

corpusculum nervorum acapsulatum **جُسَيم عَصَبي لا مُحَفَّظ**

هو جسيم عصبي انتهائي غير محاط بمحفظة ليفية .

انظر تحت free nerve endings .

أفريقيا عرف فيها المرض أول مرة] .
انظر تحت disease .

شَرِيطُ كوريغان **Corrigan line**

[شريط منسوب للسير دومينيك كوريجان (Dominic John Corridan) ، وهو طبيب أيرلندي عاش ما بين 1802-1880] وهو خط قرمزي فوق اللثة يشاهد في حالات الانسمام النحاسي .
انظر تحت line .

تَصْليح **corrigendum**

هو تصحيح خطأ في عمل مطبوع بعد الانتهاء من طباعته عن طريق إضافة صفحة أو صفحات تشتمل على التصحيح .

1ـ مُصَلِّح **corrigent**
2ـ مُلَطِّف

1ـ ما يقوم بتعديل الأشياء لتصبح أخف أو ألطف .
2ـ أي عامل يعدل أو يلطف فعل دواء بالغ القوة ، أو الشدة ، أو يحسن مذاقه .

كورين (مركب شبيه بالهيموجلوبين) **corrin**

مركب ذو صيغة بشكل حلقة تترابيرول (Tetapyrrole) ، والتي تشبه صيغة حلقة البرفيرين المشاهدة في مركب الهيموجلوبين ، إلا أن زوج الحلقات فيه يرتبطان بشكل مباشر ، وليس من خلال جسر الميثلين ، كما يرتبط الكوبالت بذرات النتروجين الأربعة الداخلية . يحتوي الكوبالامين على صيغة الكورين الحلقية .

كوريني **corrinoid**

هو مركب ؛ مثل الكوبالامين ، يشتمل على صيغة الكورين الحلقية .

يتآكل **corrode**

1ـ يسبب التآكل .
2ـ يصاب بالتآكل .

اتْتِكال **corrosion**

1ـ التخرب التدريجي لمعدن أو لخليطة بفعل التفاعل الكهربي الكيميائي ، أو لأنسجة الجسم

1ـ ترابُط **correlation**
2ـ علاقة

هي الدرجة التي ترتبط معها ظاهرة ما أو متغير عشوائي ما بظاهرة أو متغير آخر ، أو درجة احتمال التنبؤ بتلك الظاهرة ، أو ذلك المتغير اعتماداً على ظاهرة أخرى أو متغير آخر . في الإحصاء : يشير هذا المصطلح عادة إلى درجة احتمال وجود علاقة خطية قابلة للتنبؤ بين متغيرات عشوائية ، بحيث يمكن قياسها من خلال معمل ترابط . يمكن للترابط أن تكون موجباً (دون أن تزيد قيمته عن 1) حين تتزايد المتغيرات معاً أو تتناقص معاً ؛ أو سالباً (دون أن تقل قيمته عن -1) عندما يتزايد أحد المتغيرات عند تناقص الآخر أو بالعكس ؛ وتساوي قيمته صفراً عندما لا يؤثر التغير في أحد المتغيرات على المتغير الآخر .

1ـ مُناسَبَة **correspondence**
2ـ مُراسَلَة

حالة كون الأشياء في اتفاق أو توافق .

مُناسَبَةٌ شَبَكِيَّةٌ شاذَّة **anomalous retinal correspondence**

هي الحالة التي ترتبط فيها نقاط متباينة من شبكيتي العينين ببعضهما بشكل محسوس . ويرمز إلى هذه الحالة اختصاراً بالحروف (ARC) .

مُناسَبَةٌ شَبَكِيَّةٌ انْسِجامِيَّة **harmonious retinal correspondence**

هيَ الحَالَة التي ترتبط فيها نقاط متوافقة من شبكيتي العينين ببعضهما بشكل محسوس . ويرمز إلى هذه الحالة اختصاراً بالحروف (NRC) .

مناسبة شبكية **retinal correspondence**

هي العلاقة بين نقاط متوافقة من شبكيتي العينين بحيث يؤدي التنبيه المتزامن إلى توليد الإحساس بشيء مرئي واحد .

داء المَمر **Corridor disease**

[داء منسوب إلى الممر ، وهي منطقة في جنوب

1 ـ الطبقة الخارجية ، مثل لحاء الشجرة ، أو غلاف الثمرة .
2 ـ الطبقة الخارجية من عضو ما داخل المحفظة ، أو جزء ما في الجسم ، بوصفها بنية متميزة عن المادة الداخلية .
3 ـ الطبقة الخارجية للمادة السنجابية للدماغ .

قِشْرَةُ الكُظْر **adrenal cortex**
انظر تحت cortex glandulae suprarenalis .

القِشْرَةُ غَيْرُ المُحبَّبَة **agranular cortex**
نَوع من القشرة التي توجد في بعض أجزاء القشرة الحديثة ، وتتكون من طبقات حبيبية رقيقة جداً ؛ وتشاهد في المنطقة الحركية من التلفيف أمام المركزي ، وفي أماكن أخرى .

القِشْرَةُ التَّرابُطِيَّة **association cortex**

القَشْرَةُ المِهْمازِيَّة **calcarine cortex**
هي الباحَة المخَططة .
انظر تحت area striata .

القِشْرَةُ المُخَيخيَّة **cerebellar cortex**
انظر تحت cortex cerebelli .

قِشْرَةُ المُخ **cerebral cortex**
انظر تحت cortex cerebri .

القِشْرَةُ الحِزامِيَّة **cingulate cortex**
هو التَّلْفيفُ الحِزامِيّ .
انظر تحت gyrus cinguli .

القِشْرَةُ المُخَيخيَّة **cortex cerebellaris TA**
انظر تحت cortex cerebelli .

قشرة المخيخ **cortex cerebelli**
هي المادة السنجابية السطحية في المخيخ ؛ والتي تتكون من ثلاث طبقات : الطبقة الجزيئية ، والطبقة الحبيبية ، والطبقة البوركينية . تسمى أيضاً (Cortex cerebellaris) .

قِشْرَةُ المُخ **cortex cerebralis TA**
انظر تحت cortex cerebri .

قشرة المخ **cortex cerebri**
هي الطبقة أو الغلالة الرقيقة (حوالي 3 ملي متر) من المادة السنجابية في كل من نصفي الكرة المخية ، والتي تتطوى بشكل تلافيف بفعل حمض قوي أو مادة قلوية قوية .
2 ـ التسبب في عملية التآكل .

أكّال **corrosive**
1 ـ يسبب ، أو قادر على التسبب في الائتكال .
2 ـ مادة تسبب الائتكال .
3 ـ مادة كاوية أو محدثة للخشارة .

ائتِكالِيَّة **corrosivity**
القدرة على التسبب في حدوث الائتكال ، أو درجة الائتكال التي يمكن التسبب بها .

تغَضُّن **corrugation**
تسبب التجعد .

مُغَضِّن **corrugator**
ما يتجعد أو يسبب التجعد ؛ وغالباً هي عضلة تسبب التجعد مثل العضلة المغضنة للحاجب (Corrugator supercilii) .

القرصان **corsair**
أي من الحشرات العاضة الرضوفية من جنس القتماء (Melanolestes) .

مِشَدّ **corset**
جهيزة تستخدم في طب العظام لتحيط بجزء ما وتدعمه ، كتلك المستعملة في بعض أذيات أو تشوهات النخاع .
انظر تحت spinal orthosis .

كورتات **Cortate**
علامة تجارية لأحد مستحضرات أسيتات الديوكسي كورتيكوستيرون (Desoxy corticosterone acetate) .

كورت-دوم **Cort-Dome**
العلامة التجارية لأحد مستحضرات الهيدروكورتيزون (Hydrocortisone) .

كورتيف **Cortef**
علامة تجارية لأحد مستحضرات الهيدروكورتيزون .

كورتينيما **Cortenema**
علامة تجارية لأحد مستحضرات الهيدروكورتيزون .

قِشْرَة (ج:قِشْرات) **cortex (pl.corticis)**

يســـمى أيضـــاً (Cortex nodi lymphatici) ، أو المادة القـشـرية للعـقـدة اللمـفـيـة (Cortical substance of lymph node) .

cortex of cerebellum **القِشْرَةُ المُخَيخيَّة**
اَنظر تحت cortex cerebelli .

cortex of cerebrum **قِشْرَةُ المُخ**
انظر تحت cortex cerebri .

cortex of kidney **قِشْرَةُ الكُلْيَة**
انظر تحت renal cortex .

cortex of thymus **قِشْرَةُ التُّوتَة**
انظر تحت cortex thymi .

cortex renalis **قِشْرَةُ الكُلْيَة**
انظر تحت renal cortex .

cortex renis TA **قِشْرَةُ الكُلْيَة**
انظر تحت renal cortex .

cortex thymi **قِشْرَةُ التُّوتَة**
هو الجـزء الخـارجي من كل من فـصـيـصـات التوتة ؛ ويتكون بشكل رئيسي من اللمفاويات (الخلايا التوتية) المتراصة والذي يحيط باللب .

entorhinal cortex **القِشْرَةُ الشَّمِّيَّةُ الدَّاخليَّة**

fetal adrenal cortex **قشرة الكظر الجنينية**
المنطقة الجنينية لقشرة الكظر .

granular cortex **القشرة المحببة**
انظر تحت koniocortex .

heterogenetic cortex **القِشْرَةُ المُتَغايِرَةُ المَنْشأ**
هي القشْرَةُ العريقة .
انظر تحت allocortex .

heterotypical cortex **قِشْرَةٌ مُغايِرَةُ النَّمَط**
هي القشْرَةُ العريقة .
انظر تحت allocortex .

homotypical cortex **قِشْرَةٌ مُماثِلَةُ النَّمَط**
هي القشْرَةُ الإسوية .
انظر تحت isocortex .

motor cortex **القِشْرَةُ الحَرَكيَّة**
اَنظر تحت area .

nonolfactory cortex **القِشْرَةُ اللاشَمِّيَّة**
تفصلها عن بعضها أتلام . وهي مسؤولة عن الوظائف العـقلية العليا ، والحركية العامة ، والوظائف الحشوية ، والإدراك ، والاستجابات السلوكـيــة ، والربط ، والتنســيق بين هذه الوظائف . وقد وضعت لها تصانيف عديدة : فقـد قسمت إلى القشرة البدائية ، والقشرة القديمة ، والقشرة الحديثة تبعاً للاختلافات المتعلقة بتطور السلالات والمتعلقة بتنشؤ الأفـراد ؛ وقسمت إلى مناطق وظيفية مثل المناطق الحركية والمناطق المستقبلة الرئيسية ومناطق الربط ؛ وإلى مناطق تبعـاً لوجـود طبقات الخلايا الستة (القشرة الإسوية) ، أو بحسب الأعداد المتنوعة من ترتيبات الخلايا ، وكطبقات الألياف (القشرة العريقة) . تسمى أيضاً طبقات القشرة (Cortex cerebralis) أو البالة (Pallium) .
انظر تحت layers of cerebral cortex .

cortex glandulae suprarenalis TA **قِشْرَةُ الكُظْر**
هي الطبقة الخارجية ذات اللون المائل إلى الصفرة ، والتي تشكل الجزء الأكبر من الغدة الكظرية ، وتتكون من المنطقة الكبيبية ، والمنطقة الحزمية ، والمنطقة الشبكية ؛ وهي تفرز ، بتأثير إطلاق الغدة الرئوية للكورتيكوتروبين ، العديد من الهرمونات الستيرويدية . تسمى أيضاً (Adrenal cortex) ، أو (Suprarenal cortex) .

cortex lentis TA **قِشْرَةُ العَدَسَة**
هو الجزء الخارجي الطري من عدسة العين ؛ تسمى أيضاً المادة القشرية للعدسة (Substantia corticalis lentis) ، أو (Cortical substance of lens) .

cortex nodi lymphatici TA **قِشْرَةُ العُقْدَة اللِّمْفيَّة**
انظر تحت cortex nodi lymphoidei .

cortex nodi lymphoidei **قِشْرَةُ العُقْدَة اللِّمْفيَّة**
هو الجزء الخارجي من العقدة ، والذي يتكون أساساً من نسيج لمفي كثيف وجريبات لمفية ؛

يسـمى خط جـيناري . تسـمى أيضـاً المنطقـة المخططة في المنطقة البصرية الأولى (Striate area of first visual area) .

القِشْرَةُ الحَرَكِيَّةُ الإِضافِيَّة **supplementary motor cortex**

قِشْرَةُ الكُظْر **suprarenal cortex**

انظر تحت cortex glandulae suprarenalis .

القِشْرَةُ البَصَرِيَّة **visual cortex**

هي المنطقة من الفص القـذالي من قـشـرة المخ المسـؤولة عن الإبصـار ؛ وتتكون من المنطقـة البـصـرية الأولى أو القـشـرة المخططة (منطقـة برودمان 17) ، وطبقـتين أخريتين هما المنطقة البـصرية الثانيـة ، أو البـاحـة المجـاورة للقشـرة المخططة (منطقة برودمان 18) ، والمنطقة البصرية الثالثة ، أو الباحة حول القشرة المخططة (منطقة برودمان 19) .

القِشْرَةُ البَصَرِيَّةُ الحِسيَّة **visuosensory cortex**

كورتَيكسون **cortexone**

هو 11- ديوكسي كورتيكوستيرون .

انظر تحت 11- deoxycorticosterone .

قوس كورتي؛ قناة كورتي؛ خلايا كورتي، إلخ **Corti's arch, canal, cells, organ, etc.**

[قوس أو قناة أو خلايا منسوبة لـلطبيب ألفونسو كـورتي (Alfonso Corti) ، وهو عـالم تشـريح إيطالي ، عاش ما بين 1822-1888] .

انظر تحت arch .

انظر تحت canal .

انظر تحت fiber .

انظر تحت organ .

انـظـر تحـت ductus tectoria membrana cochlearis .

انظر تحت organum spirale .

قِشْرِيّ كظريّ **cortiadrenal**

يتعلق بقشر الكظر .

قِشْرِيّ **cortical**

يتعلق بالقشـرة أو ذو طبـيعـة تشبـه القـشـرة أو اللحاء ، ويطلق على النسيج الخارجي للعظم .

هي القِشْرَةُ الجَديْدَة .

انظر تحت neocortex .

القِشْرَةُ الشَّمِّيَّة **olfactory cortex**

هي القشرة البدائية .

انظر تحت archicortex .

قِشْرَةُ المَبِيض **ovary cortex**

هي الطبقـة الكثيـفـة من السدى المكتنز الذي يشكل النطاق المحيطي حول لب المبيض ، حيث تنطوي الجريبات المبيضية .

القِشْرَةُ حَولَ اللَّوزَة **periamygdaloid cortex**

القِشْرَةُ الكُمَّثْرِيَّةُ **piriform cortex**

قِشرة الفص الكمثري ، أو المنطقة الكمثرية .

القِشْرَةُ الحَرَكِيَّةُ أمامَ المَرْكَزِيَّة **precentral motor cortex**

القِشْرَةُ أمامَ الحَرَكِيَّة **premotor cortex**

القِشْرَةُ أمامَ الكُمَّثْرِيَّة **prepiriform cortex**

القِشْرَةُ المَرْحَلِيَّة **provisional cortex**

هي المنطقة الجَنينية لقشرة الكظر .

قِشْرَةُ الكُلْيَة **renal cortex**

هي الجـزء الخـارجي من مـادة الكليـة ، ويتكون أساساً من كبيات ومن نبيبـات ملففـة ؛ تسمى أيضـاً المادة القشـرية للكلية (Cortical substance of kidney) .

القِشْرَةُ البَصَرِيَّةُ الثَّانَوِيَّة **secondary visual cortex**

القِشْرَةُ الحِسِّيَّةُ الحَرَكِيَّة **sensorimotor cortex**

القِشْرَةُ الحِسِّيَّة **sensory cortex**

القِشْرَةُ الحِسِّيَّةُ الجَسَدِيَّة **somatosensory cortex**

القِشْرَةُ الحِسِّيَّةُ الجَسَدِيَّة **somesthetic cortex**

هي المنطقة الحسية الحركية .

انظر تحت somatosensory area .

القِشْرَةُ المُخَطَّطَة **striate cortex**

هي منطقـة برودمـان 17 : والتي تمثل الجزء من الفص القـذالي من القـشرة المخيـة الذي يسـتقبل أليـاف التشـعع البصـري من الجسم الركـبي ، ويعتـبر المنطقـة الرئيسـية المستـقبلة للإبصـار ؛ وتكتسب اسمها من وجود الخط الواضح الذي

انظر تحت topectomy .

قِشْرات (ف:قِشْرَة) **cortices (sing.cortex)**

صيغة الجمع من قشرة (Cortex) .

انظر تحت cortex .

مُبْتَعِدٌ عنْ القِشْرَة **corticifugal**

أي شيء يتجـه مبتـعداً عن القـشـرة المخية ، أو يوصل الدفعات العصبية بعيداً عنها .

مُتَجِهٌ نَحْوَ القِشْرَة **corticipetal**

أي شيء يتجه إلى القشرة المخية أو يوصل إليها .

سابقة بمعنى القِشْرَة **cortico-**

صيغة تتصل بالمصطلحات لتفيد معنى العـلاقة بالقشرة .

صَفيحَةٌ قِشْرِيَّة **cortical plate**

هي الطبَـقـة السطحـية الخارجـية لعظم النتوء السنخي .

قَطْعُ العَظْم القِشْري **corticalosteotomy**


قطع العظم من خلال قشرة العظم عند قاعدة القطعة السنخية السنية ، وتجرى هذه العملية بهدف إضعاف مقاومة العظم لتطبيق القوى التقويمية .

ذو قِشْرَة **corticate**

له قشرة أو لحاء .

قَطْعُ القِشْرَة **corticectomy**

استئصال جزء من قشرة المخ .



Visual cortex القشرة البصرية

يربط بينهما .

corticopallidal **قِشْرِيٌّ شاحِبِيّ**

متعلق بكل من قشرة المخ والكرة الشاحبة .

corticopeduncular **قِشْرِيٌّ سُوَيقِيّ**

متعلق بالقشرة وسويقات الدماغ .

corticopetal **مُتَّجِهٌ نَحْوَ القِشْرَة**

انظر تحت corticipetal .

corticopleuritis **التِهابُ الجَنْبَةِ الحَشَوِيَّة**

الْتِهابُ الجَنَبَةِ الرِّئَوِيّ .

انظَر تحت pulmonary pleurisy .

corticopontine **قِشْرِيٌّ جِسْرِيّ**

يتعلق بكل من قشرة المخ والجسر ، أو يربط بينهما .

corticopontocerebellar **قِشْرِيٌّ جِسْرِيٌّ مُخَيخِيّ**

يتعلق بكل من قشرة المخ والجسر والمخيخ ، أو يربط بينهما .

corticorubral **قِشْرِيٌّ حَمْراوِيّ**

متعلق بكل من قشرة المخ والنواة الحمراء .

corticospinal **قِشْرِيٌّ نُخاعِيّ**

يتعلق بكل من قشرة الدماغ والنخاع أو يربط بينهما .

corticosteroid **كورتيكوستيرويد**

أي من الستيرويدات التي تمتلك 21 ذرة كربون ، و التي تفرزها قشرة الكظر (بما فيها الهرمونات الجنسية ذات المنشأ الكظري) استجابة للهرمون الموجه لقشرة الكظر (ACTH) الذي تفرزه الغدة النخامية أو هرمون الأنجيوتنسين II . وتقسم ، بحسب وظائفها البيولوجية الأساسية ، إلى مجموعتين رئيسيتين : القشراني السكري التي تؤثر بشكل أساسي على استقلاب الكربوهيدرات والدهن والبروتين ، والقشرانيات المعدنية التي تؤثر على تنظيم الأيونات وتوازن الماء . وتؤدي بعض الكورتيكوستيرويدات الوظيفتين معاً بدرجات متفاوتة ، فيما يقوم بعضها الآخر بإحدى الوظيفتين فحسب . وتستعمل الكورتيكوستيرويدات إكلينيكياً في معالجة

corticoadrenal **قِشْرِيٌّ كُظْرِيّ**

يتعلق بقشر الكظر .

انظر تحت adrenocortical .

corticoafferent **قِشْرِيٌّ وارِد**

وارد إلى القشرة المخية .

انظر تحت corticocipetal .

corticoautonomic **قِشْرِيٌّ مُستَقِلِيّ**

مصطلح يشير إلى العلاقة بين والوظائف المستقلة ، وبين مناطق محددة من القشرة المخية .

corticobulbar **قِشْرِيٌّ بَصَلِيّ**

مصطلح يشير إلى العلاقة بين القشرة المخية ، والبصلة أو جذع الدماغ .

corticocancellous **قشري إسفنجي**

مصطلح يشير إلى نسيج عظمي يضم عناصر من كلا نوعي العظم القشري والإسفنجي .

corticocerebellar **قِشْرِيٌّ مُخَيْخِيّ**

مصطلح يشير إلى قشرة المخيخ ، أو إلى علاقة بين قشرة المخ والمخيخ .

corticodiencephalic **متعلق بالقِشْرَةِ و الدماغ البَيْنِيّ**

يتعلق بكل من قشرة المخ والدماغ البيني ، أو يربط بينهما .

corticoefferent **قِشْرِيٌّ صادِر**

أي إنه صادر عن القشرة المخية .

انظر تحت corticifugal .

corticofugal **مُبْتَعِدٌ عَنْ القِشْرَة**

انظر تحت corticifugal .

corticohypothalamic **قِشْرِيٌّ وِطائِيّ**

متعلق بالقشرة والوطاء .

corticoid **قِشْرانِيّ**

1 ـ ذو طبيعة قشرية أو مظهر قشري .

2 ـ كورتيكوستيرويد .

corticolipotrope **موجه قشرى**

انظر تحت corticotroph .

Corticomesencephalic **قِشْرِيٌّ دِماغِيٌّ مُتَوَسِّطِيّ**

يتعلق بكل من قشرة المخ والدماغ المتوسط ، أو

عـوز 18- هيـدروكـسـيـلاز (18- hydroxylase deficiency) .

أكسيجيناز 18- كورتيكوستيرون الأحادية **corticosterone18- monooxygenase**

هو إنزيم من صنف الإنزيمات المؤكسدة المختزلة ، والذي يساهم في تفعيل عملية إضافة الهيدروكسيل إلى الكورتيكوستيرويدات في الموضع 18 ، ثم أكسدة المركبات الوسيطة 18-هيدروكسي ، وهي من مراحل التخليق الحيوي للألدوستيرون . يصنف هذان التفاعلان أحياناً على أنهما تفاعلين مستقلين ، الأول : هو إضافة الهيدروكسيل ، والثاني : هو الأكسدة ؛ وقد تمت دراسة الشذوذات التي يمكن أن تطرأ على كل منهما ، وجرت تسميتها باسم عوز أكسيداز ميثيل الكُورْتيكُوستيرُون من النوع الأول (I) ، أو من النوع الثاني (II) قد يكون هذا الإنزيم أحد مظاهر فاعلية أكسيجيناز 11- بيتاستيرويد الاحادية .

قِشْرِيٌّ مُخَطَّطِيّ **corticostriate**

متعلق بكل من قشرة المخ والجسم المخطط .

قِشْرِيٌّ مُخَطَّطِيٌّ نخاعِيّ **corticostriatospinal**

متعلق بكل من قشرة المخ والجسم المخطط والنخاع .

وَرَمُ قِشْرَةِ الكظر **corticosuprarenaloma**

كورتيكوتنسين **corticotensin**

عديد ببتيد منخفض الوزن الجزيئي تتم تنقيته من الخلاصة الكلوية ، والذي يبدي خواصاً قابضة للأوعية الدموية عندما يُعطى عن طريق الوريد .

قِشْرِيٌّ مِهادِيّ **corticothalamic**

يتعلق بكل من قشرة المخ والمهاد أو يربط بينهما .

مُوَجِهٌ قِشْرِيّ **corticotrope**

انظر تحت corticotroph .

مُوَجِهٌ قِشْرِيّ **corticotroph**

خلية صغيرة نجمية غير منتظمة أليفة الحمض من النخامية الغدية ، والتي تحتوي على حبيبات الإعاضة عن الهرمونات ، ولتثبيط إفراز (ACTH) من الجزء الأمامي من الغدة النخامية ، وكمضادات للأورام وكعوامل مضادة للأرجية ومضادة للالتهاب ، ولتثبيط الاستجابات المناعية . تسمى أيضاً (Adrenocorticoid steroid) ، أو (Adrenal cortical steroid) ، أو ستيرويد قشر الكظر (Adrenocortical steroid) ، أو الستيرويد القشري (Corticoid steroid) أو هرمون قشر الكظر (Adrenocortical hormone) ، أو هرمون قشري (Cortical hormone) .

كورتيكوستيرون **corticosterone**

هو قشراني سكري متوسط الفاعلية ، له خواص تساعد على المحافظة على الحياة عند الحيوانات التي أخضعت لاستئصال الكظر ، وفاعليات عديدة أخرى متعلقة بقشر الكظر . له تأثيرات تماثل تأثيرات الكورتيزول باستثناء عدم كونه مضاداً للالتهاب . كما يبدي بعض خواص القشرانيات المعدنية .

أكسيداز ميثيل الكورتيكوستيرون **corticosterone methyl oxidase**

هو أكسيجيناز 18- كورتيكوستيرون الأحادية (Corticosterone 18 - monooxygenase) .

عوز أكسيداز ميثيل الكورتيكوستيرون **corticosterone methyl oxidase deficiency**

هو اضطراب يتعلق بتوليد الستيرويد ، والذي يتسبب فيه عوز أكسيجيناز 18- كورتيكوستيرون الأحادية ، ويقوم بتعطيل التخليق الحيوي للألدوستيرون ؛ مما يؤدي إلى إضاعة الملح . ويحدث في شكل نوعين : النوع الأول : يؤدي فيه تناقص تفاعل إضافة الهيدروكسيل إلى الكورتيكوستيرون إلى تراكم الكورتيكوستيرون ، والديوكسي كورتيكوستيرون ، والنوع الثاني : الذي يؤدي فيه نقص أكسدة المركب الوسيط 18- هيدروكسي إلى ارتفاع معدلات هذا المركب ، ومعدلات الكورتيكوستيرون . ويسمى أيضاً

لِمْفُ عُضْوِ كورتي **cortilymph**

هو السائل الذي يملأ المسافات بين الخلوية في عضو كورتي ؛ وهو يماثل اللمف المحيطي في تركيبه .

كورتين **cortin**

هو خلاصة قشر الكظر .

كورتيناريسيا **Cortinariaceae**

هو فصيلة من الفطر (من رتبة الجاريقون) . بعض أنواعها صالحة للأكل ، إلا أن الجنس جالورينا والذي يحتوي على ذيفان الأيما (Amatoxins) ، وهي ذيفانات قد تكون مميتة .

كورتيناريس **Cortinarius**

جنس ضخم من الفطر ، والذي يضم أنواعاً صالحة للأكل ؛ بعض أنواعه التي توجد في أوروبا واليابان تحتوي على ذيفانات أورلين (Orelline) ، وأورلانين (Orellanine) .

كورتيزول **cortisol**

هو القشراني السكري الطبيعي الرئيسي الذي يتم تخليقه في المنطقة الحزمية من قشر الكظر ؛ ويؤثر على استقلاب الجلوكوز والبروتين والدهون ، وله خواص قشرانية معدنية هامة . كما أنه ينظم كذلك عمل جهاز المناعة ، ويؤثر على العديد من الوظائف الأخرى . يشار إليه عادة باسم الهيدروكورتيزون ، وذلك عندما يستعمل في المجال الصيدلاني .

انظر تحت hydrocortisone .

كورتيزون **cortisone**

هو قشراني سكري طبيعي يمكن أن يتحول بعملية الاستقلاب إلى كورتيزول . يفرز قشر الكظر عند الإنسان كميات ضئيلة منه ؛ أما الجزء الأكبر من الكورتيزون الموجود في البلازما المحيطية (الطرفية) فينتج عن الكورتيزول من خلال تفاعل عكوس . يحدث الهرمون التخليقي آثاره الدوائية من خلال تحوله عن طريق الاستقلاب إلى كورتيزول .

كورتيزون أسيتات **cortisone acetate**

إفرازية صغيرة متفرقة ، وتفرز الهرمون الموجه لقشر الكظر ، وهرمون بيتا إندورفين الذي يتم اشتقاقه من طليعة هرمون كبير يسمى طليعة أوبيوميلانوكورتين . يسمى أيضاً (Cortico-trope) أو (Corticotroph-lipotroph) ، أو موجه قشري منمي للشحم (Corticolipotrope) ، أو خلية موجهة قشرية (Cortiotrope cell) ، أو (Corticotroph cell) .

مُنَمِّي القِشْرَة **corticotrophic**

انظر تحت adrenocorticotropic .

المُنَمِّيَة القِشْرِيَّة **corticotrophin**

1 ـ الموجهة القشرية .

انظر تحت corticotropin .

2 ـ الهرمون الموجه لقشر الكظر .

انظر تحت adrenocorticotropin hormone .

موجه قشري منمي للشحم **corticotroph-lipotroph**

انظر تحت corticotroph .

مُوَجِّهُ للقِشْرَة **corticotropic**

انظر تحت adrenocorticotropic .

المُوَجِّهَة القِشْرِيَّة **corticotropin**

1 ـ مستحضر من الهرمون الموجه لقشر الكظر المستخلص من الحيوانات ، والذي يعطى عن طريق الوريد للاختبار التشخيصي لوظيفة قشر الكظر ، ويعطى تحت الجلد أو في العضل كمضاد للقيء في معالجات السرطان الكيميائية ويعطى كمضاد للاختلاج . يسمى أيضاً (Acor-tan) ، أو (Cticotrophin) أو (Adrenocorticot-rophin) ، أو (Adrenocorticotrophin) .

2 ـ الهرمون الموجه لقشر الكظر .

ورم الموجهة القشرية الغدي **corticotropinoma**

انظر تحت corticotroph adenoma .

كورتيفير **Cortifair**

علامة تجارية لأحد مستحضرات هيدروكورتيزون (Hydrocortisone) ، وهو كورتيكوستيرويد له فاعلية منخفضة ، يستعمل موضعياً .

Corvisart's disease **داء كورفيزار**

[داء منسوب للطبيب جان نيكولا كورفيزار باريون مـاريه (Baron jean Nicolas corvisart des Marets)، وهو طبيب فرنسي، وقد كان طبيب نابليون الشخصي، عـاش ما بين 1755-1821].

انظر تحت disease .

corybantiasm **هَذَيانٌ هِياجيّ**

انظر تحت corybantism .

corybantism **هَذَيانٌ هِياجِيّ**

هذيان مسعور أثناء اليقظة مصحوب بهلاوس مخيفة .

corydaline **كوريدالين**

هو قلواني يستخلص من نباتات من الفصيلة القبرية ؛ والذي يستعمل عند الإنسان كمدر للبول ومقوّ ، إلا أنه يمكن أن يسبب الإسهال ، وهناك احتمال لحدوث اختلاجات مميتة عند حيوانات أخرى .

Corydalis **القبَّريَّة**

جنس ضخم من النباتات العشبية التي توجد في المناخات المعتدلة . تحتوي بعض أنواعه على مادة بالبوكابنين (Bulbocapnine) التي تسبب السمية العصبية في الحيوانات .

انظر تحت bulbocapnine experiment .

corydalis **القبرية**

1 ـ أي نبات من جنس القبرية .

2 ـ الدرنة المجففة لنبات القبرية الكندية ، والتي تحتوي على مادة بيكوكولين ، وقلويات إيزوكوينولون أخرى بما فيها الكوريدالين ، والبالبوكابنين ، والكوريتيوبرين .

corymb **عِذق**

هو تجمع للآفات بشكل يشبه العنقود .

corymbiform **عِذقِيُّ الشَّكل**

هو تجمع بشكل عذق ، وهو مصطلح يستخدم في وصف الآفات التي تتجمع حول آفة مفردة عادة ما تكون أكبر حجماً ، كما في السعفة المبرقشة أو الزهري التالي في مراحله المتأخرة .

هو إستر للكورتيزون ، والذي يبدأ تأثيره ببطء إلا أنه يستمر لفترة طويلة ، يستعمل في علاجات الإعاضة في حالات قصور الكظر ، وكمضاد للالتهاب ، ومثبط للمناعة في سياق العديد من الاضطرابات ؛ يعطى عن طريق الفم أو عن طريق العضل .

cortivazol **كورْتيفازول**

هو ستيرويد قشراني اصطناعي .

cortodoxone **كورْتودُوكسون**

هو مركب ستيرويدي .

Cortone **كورتون**

علامة تجارية لأحد مستحضرات أسيتات الكورتيزون (Cortisone acetate) .

Cortril **كورتريل**

علامة تجارية لأحد مستحضرات الهيدروكورتيزون (Hydrocortisone) ، وله فاعلية منخفضة ، يستخدم موضعياً .

Cortrophin **كورتروفين**

علامة تجارية لأحد مستحضرات الكورتيكوتروبين (Corticotropin) .

Cortrosyn **كورتروسين**

علامة تجارية لأحد مستحضرات كوسنتروبين (Cosyntropin) (دواء اختباري لفشل الكظر) .

corundum **سامور**

(مادة قاسية تستعمل في طب الأسنان)

أحد أنواع أكسيد الألومينيوم الموجود في الطبيعة ؛ والذي يستعمل في طب الأسنان كمادة ساحلة في دولاب السحل ، أو في القميعة التي تركب على شياق (حامل الاقراص) في المحرك السني .

انظر تحت emery .

coruscation **رُؤْيَة التَّوماض**

هو إحساس براق ، كمثل رؤية ومیض أمام العين .

Corvert **كورفيرت**

علامة تجارية لأحد مستحضرات أسيتات الإيبيوتيليد (Ibutilide acetate) .

انظر تحت Rhadococcus .

الوتَدِيَّةُ التَّناسُلِيَّة — **Corynebacterium genitalium**

هو نوعَ يرتبط بعداوى الجهاز البولي التناسلي عند البشر .

الوتَدِيَّةُ الحُبَيبيَّة — **Corynebacterium granulosum**

هو البِّرُوبْيُونيَّةُ الحُبَيبيَّة .

انظر تحت Propionibacterium granulosum .

الوتَدِيَّةُ الحالَّةُ للدَّم — **Corynebacterium haemolyticum**

انظر تحت arcanobacterium haemolyticum .

الوتَدِيَّةُ الهُوفْمانيَّة — **Corynebacterium hofmannii**

هو الوتَدِيَّةُ الخُنَاقِيَّةُ الكاذبَة .

انظر تحت Corynebacterium pseudodiphtheriticum .

الوتَدِيَّةُ المُنْتِنَةُ للأَطْفالَ — **Corynebacterium infantisepticum**

هو اللِّيستَرِيَّةُ المُستَوحِدَة .

انظر تحت Listeria monocytogenes .

الوتدية الكوتشرية — **Corynebacterium kutscheri**

هو نوع يسبب عداوى خافية وظاهرة عند الفئران والجرذان .

الوتَدِيَّةُ المُسْتَدِقَّة — **Corynebacterium minutissimum**

هو نوعَ غير واضح الروابط ، والذي يسبب الوذح (Erythrasma) عند الإنسان ، وهي عدوى في ثنيات الجلد .

الوتَدِيَّةُ المُنْتِنَةُ للفئْرانَ — **Corynebacterium murisepticum**

هيَ عصيات شبيهة بالخناق تتسبب في إصابة الفئران بإنتان دموي ، إلا أنها غير ممرضة على ما يبدو عند حيوانات أخرى .

الوتَدِيَّةُ المُنْخِّرَة — **Corynebacterium necrophorum**

عِذقِيُّ الشَّكل — **corymbose**

انظر تحت corymbiform .

الوتديات — **Corynebacteria**

صيغة الجمع من الوتدية (Corynebacterium) .

الوتَدِيَّات — **Corynebacteriaceae**

في أنظمة التصنيف القديمة : هي فصيلة من الجراثيم من وتديات الشكل ، والتي تتصل بالشعيات بصلة قرابة ، وتتكون من الأجناس الفصلاء والسلوزية والوتدية والشعرية الحمرانية والليسترية والجريثمة .

الوتدِيَّة — **Corynebacterium**

هو جنس جَراثيم منَ الوَتَديَّات ، والتي تتكون من أعواد مستقيمة إلى مَنحنية قليلاً ، غير متحركة ، وغير متبوغة موجبة الجرام . وهذه الكائنات الحية موجبة الكاتالاز تصطبغ بشكل غير منتظم ، وتكون حبيبية أحياناً ، وقد تتجمع في مجموعات زاوية أو سياجية . وهي واسعة الانتشار في الطبيعة وتشتمل على طفيليات وكائنات ممرضة حيوانية وبشرية ، وكائنات ممرضة نباتية ، وكائنات غير ممرضة .

الوتَدِيَّةُ العُدِّيَّة — **Corynebacterium acnes**

هيَ البُرُوبْيُونيَّةُ العُدِّيَّة (Propionibacterium) .

انظر تحت acnes .

الوتَدِيَّةُ الخُنَاقِيَّة — **Corynebacterium diphtheriae**

هو العَامل الممرض النوعي في الخناق الذي يسبب أيضاً عداوى جلدية . تقسم هذه الكائنات بحسب خواص مزارعها إلى أنماط بيولوجية هي : هينة ومتوسطة ووخيمة ، دون أن يكون لذلك علاقة بمدى قدرتها على إحداث المرض . تنتج معظم سلالاتها ذيفانات خارجية . تسمى أيضاً عصيات كليبس لوفلر (Klebs-Loffler bacillus) .

وتدية شبيه الخناق — **Corynebacterium diphtheroides**

انظر تحت Eubacterium lentum .

الوتَدِيَّةُ الخَيليَّة — **Corynebacterium equi**

الوَتَدِيَّةُ السُّلِّيَّةُ الكَاذِبَةُ Corynebacterium pseudotuberculosis

هو نوعٌ ممرض مفرز للذيفان يشاهد في الحيوانات الدنيا. يسبب التهاب العقد اللمفية الجبني، والخراجات والعداوى المقيحة المزمنة، وبخاصة عند الخراف والماعز، والعد المعدي عند الخيول. قد يصاب البشر بالمرض نتيجة ملامسة الطعام الملوث أو الحيوانات المصابة بالعدوى. تسمى أيضاً الوَتَدِيَّةُ السُّلِّيَّةُ الكاذِبَةُ الغَنَمِيَّة (Corynebacterium pseudotuberculo-sis-ovis)، أو عصية برايز نوكار (Preisz-Nocard bacillus).

الوَتَدِيَّةُ السُّلِّيَّةُ الكاذِبَةُ الغَنَمِيَّة Corynebacterium pseudotuberculosis-ovis

هي الوَتَدِيَّةُ السُّلِّيَّةُ الكاذِبَة.

انظر تحت Corynebacterium pseudotuberculosis.

الوَتَدِيَّةُ المُقَيِّحَة Corynebacterium pyogenes

نوعٌ مولد للذيفان على علاقة وثيقة بالمكورات العقدية من المجموعة G، والتي تسبب الآفات المقيحة عند الماشية والأغنام والخنازير، والتهاب الجلد الفوتي عند الأغنام، وعنونة القدم عند الخنازير، وقد تم عزلها من بعض حالات التهاب البلعوم والآفات الجلدية عند البشر.

الوَتَدِيَّةُ الكُلْوِيَّة Corynebacterium renale

هو نوع يسبب التهاب الحويضة والكلية البقري المعدي عند المواشي، والتهاب القلفة والحشفة المتوطن بالحيوانات عند الخراف.

الوَتَدِيَّةُ المُخَطَّطَة Corynebacterium striatum

الوَتَدِيَّةُ المُسْتَرِقَّة Corynebacterium tenuis

هو نوع شبيهٌ بالنوكاردية ـ غير واضح الانتماء ـ يعتبر العامل الممرض المسبب لداء الفطريات الشعرية الإبطي (Trichomycosis axillaris).

الوَتَدِيَّةُ المُقَرِّحَة Corynebacterium ulcerans

هو نوع مولد للذيفان غير واضح الانتماء، والذي يسبب عداوى بلعومية أنفية عند البشر

هي المِغْزَلِيَّةُ المُنْخِرَة.

انظر تحت Fusobacterium necrophorum.

الوَتَدِيَّةُ الغَنَمِيَّة Corynebacterium ovis

هي الوَتَدِيَّةُ السُّلِّيَّةُ الكاذِبَة.

انظر تحت Corynebacterium pseudotuberculosis.

الوَتَدِيَّةُ الصُّغَيرَة Corynebacterium parvulum

هي اللِّيسْتَرِيَّةُ المُسْتَوحِدَة.

انظر تحت Listeria monocytogenes.

الوَتَدِيَّةُ الصَّغيرة Corynebacterium parvum


1 ـ هي البْرُوبْيُونِيَّةُ العُدِّيَّة (Propionibacterium acnes).

2 ـ مستحضر من الوتدية الصغيرة (البروبيونية العدية) المقتولة بالحرارة والمعاملة بالفورمالدهيد، والذي يعطى عن طريق الفم أو حقناً كعلاج مناعي تجريبي في السرطان، ويكون عادة مترافقاً بالعلاج الكيميائي التقليدي. ويبدو أنه يعمل من خلال تنشيط البلاعم كما يظهر أنه يثبط وظيفة الخلايا التائية.

الوَتَدِيَّةُ الخُنَاقِيَّةُ الكاذِبَة Corynebacterium pseudodiphtheriticum

هو نوعٌ يوجد عادة في القناة التنفسية، يشبه كثيراً الوتدية الخناقية إلا أنه لا يفرز الذيفان؛ ويتصرف أحياناً كعامل ممرض انتهازي. تسمى أيضاً الوتدية الهوفمانية (Corynebacterium hofmannii)، أو عصية هوفمان (Hoffmann's bacillus).

الوَتَدِيَّةُ المَنْسَلِيَّةُ الكاذِبَة Corynebacterium pseudogenitalium



الوتدية Corynebacterium

هو نوع يسبب الورم الفطري الحقيقي .

كوريتوبيرين **corytuberine**

هو قلواني بلوري من الكوريدالين التجاري .

زكام **coryza**

هو التهاب الأنف الحاد .

زُكامٌ أَرَجِيّ **allergic coryza**

هو التهابُ الأنف الحاد الأرجي .

زُكامٌ نَتِن **coryza foetida**

انظر تحت ozena .

زُكامٌ مودِم **coryza oedematosa**

زُكامٌ مُعْدٍ للطَّير **infectious avian coryza**

هو مرضٌ تنفسي حاد يصيب الدجاج ، ويتصف بنجيج أنفي وعطاس وتوذم الوجه ، تسببه المستدمية نظيرة الدجاجية . قد تصيب العدوى القناة التنفسية السفلية أحياناً .

الفيروسة الزُكاميَّة **coryzavirus**

انظر تحت rhinovirus .

يُحَسِّسُ تحسيساً مُشتركاً **cosensitize**

اي أنه يتحسس لعاملين محسسين أو أكثر .

كوسميجين **Cosmegen**

علامة تجارية لأحد مستحضرات داكتينوميسين (Dactinomycin) ، وهو مضاد حيوي مضاد للأورام .

انظر تحت dactinomycin .

التجميل **cosmesis**

1 ـ المحافظة على الجمال الجسمي ، أو ترميمه ، أو منح ذلك الجمال .

2 ـ التصحيح الجراحي لعيب بدني مشوِّه .

مُزَوِّق (ج: مُزَوِّقات) **cosmetic**

1 ـ متعلق بالتجميل .

2 ـ مستحضر تجميلي أو مادة تجميلية .

كَوْنيّ **cosmic**

أي أنه عالمي ، واسع إلى أبعد حد .

كوزميد **cosmid**

هو ناقل يتكون من الدنا (DNA) بشكل بلازميدة معبأة في أنبوب الاختبار داخل عاثية ، والتي تستخدم في استنساخ قطع كبيرة تصل

والتهاب الثدي عند الماشية .

الوَتَدِيَّةُ الحُوَيصليَّة **Corynebacterium vesiculare**

هو الزَّائفَةُ الحُوَيصليَّة .

انظر تحت pseudomonas vesicularis .

الوَتَدِيَّةُ الجُفافيَّة **Corynebacterium xerose**

انظرَ تحت Corynebacterium xerosis .

الوَتَدِيَّةُ الجُفافيَّة **Corynebacterium xerosis**

هو نوع ممرض انتهازي يشاهد في الكيس الملتحمي ، وعلى الجلد والأغشية المخاطية عند البشر .

الوتدية **corynobacterium**

1 ـ أي عضو من فصيلة الوتديات أو من جنس الوتدية .

2 ـ جرثومة تتصف بمظهر وتدي الشكل في مرحلة من مراحل تطورها في الأوساط الصناعية .

انظر تحت coryneform bacteria .

الوتدية من المجموعة 3 **group 3 corynebacterium**

انظر تحت Eubacterirum lentum .

الوتدية من المجموعة JK **group JK corynebacterium**

هي زمرة من الجراثيم الممرضة شبه الخناقية التي تستنبت من دم وأنسجة وعداوى جروح الأشخاص مكبوتي المناعة .

وتديَّات الشَّكل **Coryneform**

هي زمرة من الجراثيم عديمة الأبواغ موجبة الجرام ذات الشكل العصوي غير المنتظم ، والتي تضم أجناس الفصلاء والسلوزية والوتدية .

وَتديَّة الشَّكل **coryneform**

هي ذات مظهر يشبه الهراوة .

وتدية البوائغ **Corynespora**

جنس واسع الانتشار من الفطور الناقصة من رتبة الطوقيات الشكلية .

وتدية البوائغ الشريطانية **Corynespora cassicola**

زائداً عليها الربح المتفق عليه .

نظامُ إدارَة نَوعيَّة التَّكْلفَة — cost quality management system

انزياحُ التَّكْلفَة — cost shifting

هي طريقة لخفض تكاليف المرضى الداخليين عن طريق تزويدهم بجزء من الخدمات الصحية في العيادات الخارجية .

تَعْويضٌ مَبْنيٌّ عَلَى التَّكْلفَة — cost-based reimbursement

التَّكْلفَةُ المُبَاشَرَة — direct cost

تكلفة تستخدم بشكل مباشر في إنتاج سلعة ما أو خدمة ما .

التَّكْلفَةُ الفِعْليَّةُ — effective cost

التَّكْلفَةُ الثَّابتَة — fixed cost

هي مصاريف تجارية لا ترتبط بتغير حجم الأنشطة التجارية ، مثل الرواتب الشهرية الثابتة ، أو أجور العقارات الثابتة ، إلخ .

التَّكْلفَةُ اللامُباشرَة — indirect cost

هي مصاريف لا ترتبط مباشرة بتكاليف الإنتاج ، مثل الضرائب والمصاريف الإدارية وتكاليف الأمن ، إلخ .

التَّكْلفَةُ الهامشيَّة — marginal cost

هو التبدل في التكلفة الإجمالية للإنتاج عند زيادة عدد الوحدات التي يتم إنتاجها .

تكْلفَةٌ مُتَغيِّرَة — variable cost

هي النفقات التي تتغير بحسب تغير حجم العمل أو النشاط التجاري .

ضِلَع (ج:أضلاع) — costa TA (pl.costae)

1 ـ أي واحد من الأقواس العظمية المرنة المزدوجة ، التي يبلغ عددها اثنا عشر ضلع على كل من الجانبين (الأضلاع من الأولى إلى الثانية عشرة) ، والتي تمتد من الفقرات الصدرية إلى المنطقة الأمامية من الجذع . وهي تؤلف القسم الأعظم من الهيكل العظمي الصدري . تسمى الأضلاع العلوية السبعة (من الأولى إلى السابعة) بالأضلاع الحقيقية ، وتتصل من الأمام بالقص ؛ أما الخمسة السفلية (من الثامنة إلى

إلى 50 كيلو قاعدة من شدف الدنا .

تكلِفة (ج:تكاليف) — cost

هي كمية الوقت أو النقود ، إلخ . المطلوبة أو المستهلكة .

التَّكْلفَةُ المَسْمُوحُ بهَا — allowable cost

التَّكْلفَةُ الرَّأسْماليَّة — capital cost

التكلفة الإجمالية المطلوبة للوصول بالمشروع إلى حالة الإنتاج التجاري .

تَخْصيصُ التَّكْلفَة — cost allocation

طريقة لتقدير تكلفة نشاط ما .

التَّكْلفَةُ المَسْمُوحُ بها — cost allowance

طريقة لتقييم قيمة الاستهلاك .

تَحليلُ مَنَافع التَّكْلفَة — cost benefit analysis

طريقة لتقييم حالة مشروع ما من خلال المقارنة بين التكلفة المرصودة ، والعوائد المتوقعة .

نسْبَةُ مَنَافع التَّكْلفَة — cost benefit ratio

هو مؤشر يستخدم في تحليل منافع التكلفة ، والذي يقيس العلاقة بين التكلفة المخصصة للمشروع وعوائده المتوقعة .

مَرْكَزُ التَّكْلفَة — cost center

هي الأقسام التي تعتبر تكاليفها إضافة على تكاليف المؤسسة إلا أنها تعود بنفع غير مباشر على الشركة ، مثل الأبحاث والتطوير والتسويق وخدمة المستهلك .

احْتواءُ التَّكْلفَة — cost containment

إدارة وترشيد استخدام الموارد بشكل يحقق أعلى درجة من الكفاءة والفاعلية .

التَّحكُّمُ بالتَّكْلفَة — cost control

هي الخطوات التي تتخذها الإدارة لضمان أن يتم تحقيق أهداف المشروع ضمن التكاليف المخصصة له .

إدارَةُ التَّكْلفَة للفَرْد الوَاحد — cost per-case-management

عَقْدٌ بتَكْلفَة إضَافيَّة — cost plus contract

هو عقد يقضي بأن يحصل المقاول عند إنجاز العمل على تعويض يعادل التكلفة التي أنفقها

الثانية عشرة) فتسمى بالأضلاع الكاذبة ، ولا تتصل مباشرة بالقص .

2ـ الجزء العظمي من الضلع .

3ـ بنية بشكل قضيب تمتد على طول قاعدة الغشاء المتموج في بعض الأوالي الحيوانية السوطية مثل المشعرة .

ضِلْعٌ رَقَبِيَّة **costa cervicalis TA**

هو ضلع زائدة تنشأ من فقرة رقبية ، عادة ما تكون الفقرة السابعة وهي مُتَلاَزِمَةُ العَضَلَة الأَخْمَعِيَّة الأماميَّة .

انظر تحَت scalenus syndrome .

انظر تحت cervical rib syndrome .

ضِلْعٌ سائبَة **costa fluctuantis**

اَنظر تحَت costae fluctuantes .

الضِّلْعُ الأَوْلَى ؛ النَّاحِرَة **costa fluctuantis**

هو الضلع العلوي فيَ كل من الجانبين .

الضلع الثانية **costa secunda**

هو الضلع التي تقع إلى الأسفل مباشرة من الضلع الأولى في كل من الجانبين .

ضلع كاذبة **costa spuria TA**

انظر تحت costae supriae .

ضلع حقيقية **costae vera TA**

انظر تحت costae verae .

أَضْلاع **costae TA**

صيغة الجمع من ضلع (Costa) .

الأَضْلاَعُ السَّائِبَة ؛ الأَخْلاَف **costae fluctuantes TA**

هما الضلعان الأخيران في كل من الجانبين (الضلع الحادية عشرة والضلع الثانية عشرة) ، واللذان لا يكون لهما في الحالة الاعتيادية ارتباط في الجهة البطنانية . تسمى أيضاً الأضلاع الفقرية (Vertebral ribs) .

الأَضْلاَعُ الكاذبَة **costae spuriae**

هم الأضلاع الخمسة السفلية في كل جانب (الأضلاع من الثامنة وحتى الثانية عشرة) . والتي تتصل النهايات البطنانية للثلاثة العلوية منها بالغضاريف القصية للأضلاع المجاورة التي تقع فوقها ، أما الحافة البطنانية للضلعين السفليين (الحادية عشرة والثانية عشرة) فليس لها أي ارتباط .

الأَضْلاَعُ الحَقيقيَّة **costae vera**

هم الأضلاع السبعة العلوية في كل من الجانبين (الضلع الأولى وحتى السابعة) ، والتي تتصل بجوانب القص بواسطة غضاريفها القصية . تسمى أيضاً الأضلاع القصية (Sternal ribs) ، أو الأضلاع الفقرية القصية (Vertebrosternal ribs) .

ضِلعِيّ **costal**

متعلق بضلع أو بالأضلاع .

أَلمٌ ضِلعِيّ **costalgia**

1ـ ألم في الأضلاع .

2ـ ألم في العضلات الضلعية ؛ يسمى أيضاً وجع الجنبة (Pleurodynia) .

ضِلعِيّ **costalis TA**

اصطلاح يستخدم في المسميات التشريحية للدلالة على علاقة مع ضلع .

مُضَلَّع **costate**

بنية ذي أضلاع .

قطعُ الضلَع **costatectomy**

انظر تحت costectomy

قطعُ الضلَع **costectomy**

هي عملية استئصال الضلع ، أو قطع الضلع .

متلازمة كوستن **Costen's syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب جيمس براي كوستن (James Bray Costen) ، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة أمريكي ، عاش ما بين 1895-1962] .

انظر تحت syndrome .

غُضْروفُ الضِلَع **costicartilage**

ضِلعِيٌّ رَقبِيّ **costicervical**

اي شيء متعلق بالعنق والضلع أو متصل بهما .

حامِلُ الضلَع **costiferous**

اي أنه يحمل ضلعاً ، كما في حالة الفقرات الصدرية في الإنسان .

ضِلعِيُّ الشَّكل **costiform**

متعلق بالأضلاع والفقرات القطنية .

costomediastinal **ضِلعِيٌّ مَنْصِفِيّ**

متعلق بالأضلاع والخط الناصف .

costophrenic **ضِلعِيٌّ حجابِيّ**

متعلق بالأضلاع والحجاب .

costoplasty **رَأْبُ الضِّلَع**

عملية ترميم الضلع .

costopleural **ضِلعِيٌّ جَنْبِيّ**

متعلق بالأضلاع والجنبة .

costopneumopexy **تثبيت الرئة بالضلع**

costopulmonary **ضِلعِيٌّ رئوِيّ**

متعلق بالأضلاع والرئة .

costoscapular **ضِلعِيٌّ كَتِفِيّ**

متعلق بالأضلاع والكتف .

costoscapularis **الضلعِيَّة الكتِفِيَّة**

هي العَضَلَةُ المَنْشارِيَّةُ الأمامِيَّة (Musculus serratus anterior) .

costosternal **ضِلعِيٌّ قصيّ**

متعلق بالضلع وبالقص .

costosternoplasty **رَأْبٌ ضِلعِيٌّ قصيّ**


أسلوب جراحي لإصلاح الصدر القمعي .

costosuperior **ضِلعِيٌّ علوِيّ**

متعلق بالأضلاع العلوية .

costotome **مِبْضَعُ الضلَع**

سكين يستخدم لقطع الأضلاع أو الغضاريف الضلعية .



Costa cervicalis ضلع رقبية

شكله يشبه الضلع .

costispinal **ضِلعِيٌّ سِيسَائِيّ**

متعلق بالأضلاع والسيساء أو متصل بهما .

costive **1ـ مُحْدِثٌ للإمْساك**
2ـ مصاب بالإمْساك

1ـ متعلق بالتسبب بإحداث الإمساك ، أو متصف بإحداث الإمساك .

2ـ عامل يثبط الحركية المعوية .

costiveness **إمْساك**

انظر تحت constipation .

costo- **سابقة بمعنى الضلَع**

سابقة تشير إلى العلاقة بالأضلاع .

costoabdominal **ضِلعِيٌّ بَطنِيّ**

متعلق بالأضلاع والبطن .

costoarticular **ضِلعِيٌّ مَفْصِلِيّ**

متعلق بمفاصل الأضلاع .

costocentral **ضِلعِيٌّ فِقرِيّ**

متعلق بضلع وبجسم الفقرة .

costocervicalis **الضلعِيَّة الرَّقبِيَّة**

هي العَضَلَةُ الحَرْقَفِيَّةُ الضِّلْعِيَّةُ الرَّقَبِيَّة (Musculus iliocostalis cervicis) .

costochondral **ضِلعِيٌّ غُضْرُوفِيّ**

أي أنه متعلق بضلع وغضروفه .

costoclavicular **ضِلعِيٌّ تَرْقوِيّ**

متعلق بالأضلاع والترقوة .

costocoracoid **ضِلعِيٌّ غرابِيّ**

متعلق بالأضلاع والناتئ الغرابي .

costodiaphragmatic **ضِلعِيٌّ حجابِيّ**

متعلق بالأضلاع والحجاب .

costogenic **ضِلعِيُّ المَنْشَأ**

أي أنه ينشأ من ضلع ، وبخاصة من عيب في نقي الأضلاع .

costohumeral **ضِلعِيٌّ عَضُدِيّ**

متعلق بالأضلاع والعضد .

costoinferior **ضِلعِيٌّ سُفْلِيّ**

متعلق بالأضلاع السفلية .

costolumbar **ضِلعِيٌّ قَطَنِيّ**

انظر تحت coagulation factors .

cotinine **كوتينين**

هو المستقلب البولي الرئيسي للنيكوتين .

cotinine fumarate **فُومارات الكُوتينين**

هو دواء مضاد للاكتئاب ، صيغته الكيميائية $(C10H12N20)_2$ .C4H4O4 .

cotranine **كُوتْرانين**

هو مادة مرقئة .

cotransfection **تعداء مشترك**

هو تعداء متواقت بوجود جزيئي حمض نووي منفصلين وغير مرتبطين ، قد يحتوي أحدهما على جين يمكن مقايسته بسهولة واستخدامه كواصمة .

cotransport **انتقال متواقت**

هو ارتباط انتقال مادة ما عبر الغشاء بانتقال مادة أخرى مختلفة في نفس الاتجاه .

انظر تحت countertransport .

Cotrel-Dubosset rod instrumentation, **كوتريل-دوبوسيه ، عود مجموعة أدوات**

[مجموعة أدوات ، أو عود منسوب للطبيب إيف كوتريل (Yves Cotrel) ، وهو جراح عظام فرنسي ، من القرن العشرين ؛ والطبيب دوبوسيه (J. Dubousset) ، وهو جراح عظام فرنسي ، من القرن العشرين] .

انظر تحت instrumentation .

انظر تحت rod .

co-trimoxazole **كوتريمُوكسازول**

توليفة من تريميثوبريم (Trimethoprim) (دواء مضاد للجراثيم) ، والسلفاميثوكسازول (Sulfamethoxazole) مطهر للمجاري البولية .

Cotte's operation **عملية كوته**

[عملية منسوبة للطبيب جاستون كوته (Gaston Cotte) ، وهو جراح عظام فرنسي ، عاش ما بين 1879-1951] .

انظر تحت operation .

Cotting operation **عملية كوتنج**

[عملية منسوبة للطبيب بنجامين إدينج كوتنج

costotomy **قطعُ الضلع**

قطع أو بضع الضلع أو الغضروف الضلعي .

costotransverse **ضِلعِيٌّ مُسْتَعْرِضِيّ**

أي أنه واقع بين الأضلاع والنواتئ المستعرضة لإحدى الفقرات .

costotransversectomy **قطعٌ ضِلعِيّ مُسْتَعْرِضِيّ**

استئصال جزء من الضلع مع الناتئ المستعرض لإحدى الفقرات .

costovertebral **ضِلعِيٌّ فِقَرِيّ**

متعلق بالضلع والفقرة .

costoxiphoid **ضِلعِيٌّ رَهابَوِيّ**

يصل بين الأضلاع والناتئ الرهابي .

cosyntropin **كوسِنْتْرُوبين**

هو عديد ببتيد تخليقي مطابق للأحماض الأمينية الأربعة والعشرين الأولى للكورتيكوتروبين ، وله نفس الخواص الموجهة القشرية للكورتيكوتروبين إلا أنه يفتقد إلى خاصية الإرجية ؛ يستعمل في تشخيص قصور قشر الكظر من خلال استجابة كورتيزول البلازما عقب حقنه تحت الجلد ، أو في العضل ، أو في الوريد .

cot **1ـ كوت**

2ـ غِمْدُ الإصْبَع

هو غمد للإصبع والذي يستخدم لمنع تفريغ الكهرباء الساكنة .

Cotard's syndrome **متلازمة كوتار**

[متلازمة منسوبة للطبيب جول كوتار (Jules Cotard) ، وهو عالم أعصاب فرنسي ، 1840-1887] ، وهو زور مصحوب باضطرابات نفسية .

انظر تحت syndrome .

Cotazym **كوتازيم**

علامة تجارية لأحد مستحضرات الليباز البنكرياسية (Pancrelipase) .

cothromboplastin **تميم الثرومبوبلاستين**

هو العامل السابع من عوامل التخثر .

(Benjamin Eddy Cotting)، وهو جـــــراح أمريكي، عاش ما بين [1812-1898].
انظر تحت operation.

cotton **قطن**

هي مادة من المواد التي تصنع منها المنسوجات والتي تستحصل من أشعار بذور نوع أو أكثر من نوع من نبتة القطن الزراعية.

absorbable cotton **قطن قابل للامتصاص**

هو سلولوز مؤكسد (Oxidized cellulose).

absorbent cotton **قُطْنٌ ماصّ**

هو قطن منقى.
انظر تحت purified cotton.

boric acid cotton **قُطْنُ حَمْضِ البُوريك**

هو قطن مغَموس في حمض البوريك، والذي يستعمل في التطهير، وفي أنظمة مكافحة الحشرات.

collodion cotton **قُطْنُ الكولوديون**

هو البيرُوكْسيلين (Pyroxylin).

cotton box **عُلْبَةُ القُطْن**

هو وعاء يُوضع فيه القطن الطبي.

cotton holder **ممْسَكُ القُطْن**

هو الوعـاء الذي يوضع فـيـه القطن الطبي للاستعمال في عيادة الأسنان.

cotton pellet **كُرَيَّةٌ قُطْنيَّة**

هي قطعة مكورة صغيرة من القطن تستعمل في طب الأسنان.

cotton pellet dispenser **مُوَزِّعُ كُرَيَّاتِ القُطْن**

هو الوعاء الذي يتوضع فـيه الكريات القطنية للاستعمال في عيادة الأسنان.

cotton toll **لُفافَةُ قُطْن**

هي لفـائف أسطوانيـة من القطن المضـغـوط، والتي تستعمل لعزل السن عن التلوث باللعاب وحفظه جافاً أثناء المعالجة السنية.

gun cotton **قُطْنُ التَّفْجير**

هو البيرُوكْسيلين (Pyroxylin).

purified cotton **قُطْنٌ مُنَقًّى**

هو قطن تمت تنقيته وتخليصه من المواد الدهنية وتبييضه وتعقيمه؛ والذي يستعمل في الضمادات الجراحية. يسمى أيضاً قطن ماص (Absorbent cotton)، وكـذلك قطن مـعـقـم (Gossypium asepticum)، أو قطن منقى (Gossypium pirificatum).

salicylated cotton **قُطْنٌ ساليسيلاتيّ**

هو قطن منقىً مشبع بحمض الساليسيليك، والذي يستعمل كضماد مضاد مطهر.

soluble gun cotton **قُطْنُ التَّفْجيرِ الذَّوَّاب**

هو البيرُوكْسَيلين (Pyroxylin).

styptic cotton **قُطْنٌ قابِض**

هو قطَن مغموس في محلول قابض ومجفف.

cotton seed oil **زَيتُ بِزْرِ القطن**

زيت يستخلص من بذور القطن.

cottonmouth **أفعى مائية**

هو الغطرب المائي (جنس من الأفاعي المائية).
انظر تحت water moccasin.

cottonpox **الجُدَرِيُّ الصَّغير**

انظر تحت variola minor.

cottonseed **بزور القطن**

هو بذور الأنواع الزراعيـة من شـجـرة القطن الكرسف (Gossy pium)، وهي مـصـدر زيت بزر القطن. وكثيراً ما تستخدم في صناعة الكعك أو تغذية المواشي، وذلك بعد تحضيرها بحيث يتم التخلص من ذيفان الجوسيبول (مضاد للخصوبة)، والذي يمكن أن يسبب التسمم ببزور القطن.

cotton-wool **قطن طبي**

هو قطن خام غير ماص، ويطلق أحياناً على الشكل الماص المحضر بإزالة زيت بزر القطن.

Cotungo's disease **داء كوتوينو**

[دواء منسـوب للطبـيب دومـينيكو فـيليسي أنتونيو كوتوينو (Demenico Felice Antonio Cotugno)، وهو عالم تشريح إيطالي، عاش ما بين [1736-1822] وهو النسى؛ عـرف النسا (Sciatica).

فِلْقة (ج:فِلْقات) **cotyledon**

1ـ ورقة البذرة في جنين النبات .

2ـ أي من الأقسام الفرعية للسطح الرحمي للمشيمة ثنائية القرص .

3ـ إحدى المناطق الملفوفة في مشيمة المجترات .

سُمُّ الطَّفْلَق **cotyledontoxin**

هو مادة لا بلورية متعادلة غير قلوانية ، وغير جليكوزيدية ، وغير نيتروجينية ، وهي سامة للإنسان وللحيوانات الأخرى ، تستحصل من عدة أنواع من جنس الطفلق .

انظر تحت krimpsiekte .

الخَيفانة (طفيليات) **Cotylogonimus**

انظر تحت Heterophyes .

حُقيّ **cotyloid**

1ـ ذو شكل يشبه الفنجان أو الكوب .

2ـ يتعلق بالتجويف الحقي .

الحقّاء **Cotylophoron**

هي جنس ديدان من المثقوبات من فصيلة الفوهانيات ، والتي تعدي كرش وأمعاء المجترات ، وتسبب إصابتها بداء الفوهانيات (Paramphistomiasis) .

حُقيٌّ عانِيّ **cotylopubic**

كل ما يتعلق بالجوف الحقي وعظم العانة .

حُقيٌّ عَجُزيّ **cotylosacral**

كل ما يتعلق بالجوف الحقي والعجز .

نَمَطٌ مُشارِك **cotype**

أية سلالة من المكروبات (من نفس الأصنوفة) ، باستثناء المزرعة النمطية ، من مجموعة عالم الجراثيم الذي بادر إلى وضع الأصنوفة .

النَّجيل **couch grass**

هو نوع شائع من العشب يوجد في أوربا وآسيا وشمال أفريقيا . كان يستعمل قديماً في المداواة المعتمدة على الأعشاب ، وبخاصة لعلاج أمراض المثانة .

إضْجاعُ العَدَسَة (في السَّاد العَينِي) **couching**

سُعال **cough**

1ـ اندفاع مفاجئ صاخب للهواء من الرئتين ،

انظر تحت Cotunnius .

مسال كوتوينوس، **Cotunnius' aqueduct,**

قناة كوتوينوس، عصب كوتوينوس، **canal,**

حيز كوتوينوس **nerve, space**

[مسأل ، أو قناة ، أو حيز منسوب للطبيب دومينيكو كوتوينو (كوتوينوس) (Domenico) (Cotugno) (Cotunnius) ، وحيز كوتوينوس (في التيه الغشائي) ، مسال كوتوينوس (المسال الدهليزي) ، وعصب كوتوينوس (العصب الأنفي الحنكي)] .

انظر تحت aqueduct .

انظر تحت canal .

انظر تحت nerve .

انظر تحت space .

تَسَمُّمٌ بالسُّمانَى **coturnism**

هو تسمم غذائي ينتج عن تناول لحوم الطيور الأوروبية المهاجرة من جنس السمانى ، ويتصف بأعراض مثل صعوبة التنفس ، وخلل النطق ، والغثيان ، والضعف ، وفقد الإحساس في الرجلين ، والشلل الجزئي ، وقد يتسبب أحياناً في الموت . ولا يعرف الذيفان المسبب لهذه الحالة والذي يوجد في بعض تلك الطيور وليس جميعها .

السمانى **Coturnix**

هو جنس من الطيور من فصيلة الدجاجيات ، يشمل السمانى الأوروبية المهاجرة التي يمكن أن تكون لحومها سامة .

انظر تحت coturnism .

توأم **co-twin**

هو التوأم ، وتستخدم هذه الصيغة عادة في دراسة التوائم للإشارة إلى أزواج التوائم .

الحُقُّ **cotyle**

انظر تحت acetabulum .

الطَّفْلَق **Cotyledon**

هو جنس من نبات عشبي يوجد في أفريقيا الجنوبية ؛ تحتوي العديد من أنواعه على سم الطفلق .

سُعالٌ سَطْحيٌّ مُتَقَطِّع **hacking cough**
هو سعال ضعيف سطحي متكرر قصير . يسمى أيضاً سعال خفيف (Tussiculation) .

سعال كلابي **kennel cough**
هو التهاب الرغامى والقصبات المعدي عند الكلاب .

سُعالٌ ميكانيكيّ **mechanical cough**
هو طرد الهواء من الرئتين نتيجة استعمال مفشاش ، بصورة تشبه في آثارها السعال الطبيعي .

سُعالُ الطَّحَّانين **miller's cough**
هو سعال يصيب الطحانين نتيجة استنشاق غبار الطحين .

سُعالٌ شاهوقيّ **minute gun cough**
انظر تحت pertussis .

سُعالٌ رَطْب **moist cough**
هو سعال مصحوب بطرد البلغم .

سُعالُ مُورتُون **Morton's cough**
هو سعال مستمر ينتهي بالقيء في السل الرئوي .

سُعالٌ انْتيابيّ **paroxysmal cough**
هي مرحلة من مراحل السعال الشاهوقي . انظر تحت pertussis .

سُعالُ بريفيه **privet cough**
هو سعال أرجي يشاهد في الصين ، وينسب إلى طلع نبات جنبة الرباط (Privet) .

سُعالٌ مُنْتِجٌ للبَلْغَم **productive cough**
هو سعال يفيد في إزالة المواد من القناة التنفسية . يسمى أيضاً سعال رطب (Wet cough) .

سعال ذو منشأ نفسي **psychogenic cough**
انظر تحت habit cough .

سُعالٌ انْعكاسيّ **reflex cough**
هو سعال ناتج عن تهيج عضو في منطقة بعيدة .

سُعالٌ مَعديٌّ المُنْعكَس **stomach cough**
هو سعال يحدث نتيجة جزر أحماض المعدة يحدث عادة بهدف تخليص سبل الرئتين الهوائية من المواد الغريبة ؛ يسمى أيضاً (Tusss) انظر تحت reflex .
2 ـ عملية إخراج الهواء بتلك الصورة .

سُعالٌ أُمْدَميّ **aneurysmal cough**
هو السعال المرافق للأنورزم الأورطية ، ويكون مصحوباً أحياناً بشلل أحد الحبال الصوتية .

سُعالٌ بَالْميّ **Balme's cough**
هو سعال يشتد عند الاضطجاع بسبب انسداد البلعوم الأنفي .

سُعالٌ نُباحيّ **barking cough**
هو سعال يصيب الأطفال يشبه النباح ، يحدث في سياق الخانوق وفي حالات مرضية أخرى .

سُعالٌ نُحاسيّ **brassy cough**
هو سعال معدني يشبه النباح يحدث نتيجة التهاب في الرغامى .

سُعالٌ ديكيّ ؛ شاهوق **chin cough**
انظر تحت pertussis .

سُعالٌ انْضغاطيّ **compression cough**

نُباح **dog cough**
انظر تحت compression cough .

سُعالٌ جافّ **dry cough**
هو سعال غير مصحوب بطرد البلغم .

سُعالٌ أُذُنيٌّ المُنْعكَس **ear cough**
هو سعال انعكاسي ناتج عن تهيج عصب أرنولد ، بفعل مرض في الأذن .

سُعالٌ بسَبَب خَارجَ الرئَة **extrapulmonary cough**

سُعالٌ نُحاسيّ **gander cough**
انظر تحت brassy cough .

سعال تعوّدي **habit cough**
هو سعال ، يحدث عند الأطفال عادة ، لا يكون ناتجاً عن سبب جسمي ؛ ويكون سعالاً جافاً غير مصحوب بأعراض أخرى ، يحدث أثناء اليقظة ، وغالباً ما يستمر لعدة أسابيع ، ولا يستجيب للأدوية . يسمى أيضاً سعال ذو منشأ نفسي (Psychogenic cough) .

هو حمض يستخلص من الكومارين ، والذي يمكن تحويله بسهولة إلى حمض الساليسيليك .

كومارين **coumarin**

1 ـ مادة أساسية ذات طعم مروورائحة تشبه رائحة حبوب الفانيلا ، تستخلص من حبوب نبات التونكا والبرسيم الحلو ونباتات أخرى ، وتحضر صناعياً . وتحتوي على الديكومارول ، وهو عامل يثبط التخليق الكبدي لعوامل التخثر المعتمدة على فيتامين K (بروثرومبين ، والعوامل VII ، IX و X) ، ويستعمل عدد من مشتقاتها على نطاق واسع كمضادات للتخثر في معالجة الاضطرابات التي تشتمل على تخثر الدم بصورة غير طبيعية ، كما في التهاب الوريد الخثري ، أو الانصمام الرئوي ، أو بعض الأمراض القلبية .

2 ـ أي من مشتقات الكومارين ، أو أي مركب كيميائي له خصائص تشبه الكومارين .

كوميرميسين **coumermycin**

عامل مضاد للجراثيم .

مَجْلِس **council**

لجنة متعددة المهام تشرف على الإدارة والتنظيم .

مَجْلِسُ وزراءِ الصحَّة العَرب **council of Arab Ministers of Health**

مَجْلِسُ الشَّهادات **council of certification**

مَجْلِسُ التَّصْنيفِ الإكلينيكي **council of clinical classification**

أجسام كاونسلمان (آفات كاونسلمان) **Councilman's bodies (lesions)**

[أجسام منسوبة للطبيب وليام توماس كاونسلمان (William Thomas Councilman) ، وهو عالم باثولوجيا أمريكي ، عاش ما بين 1854-1933] هي أجسام في الخلايا الكبدية الملتهبة .

انظر تحت body .

1 ـ يَنْصَح **counsel**

2 ـ نُصْحٌ

إلى المريء .

سُعالُ سَيدنْهام **Sydenham's cough**

هو سعال هستيري .

سُعالُ ذَوَّاقَة الشَّاي **tea tasters' cough**

سُعالُ تَهْييجَ ثُلاَثيِّ التَّوائم **trigeminal cough**

هو سعال ينتج عن تهيج ألياف العصب مثلث التوائم المتوزعة في الحلق ، والأنف ، وصماخ الأذن الخارجي .

سُعالٌ رَطْب **wet cough**

انظر تحت productive cough .

سُعالٌ ديكيّ ؛ شاهوق **whooping cough**

انظر تحت pertussis .

سُعالٌ شَتَويّ **winter cough**

هو التهابُ قصبات مزمن يحدث في الشتاء .

كولومْ (وحدة الشحنة الكهربية) **coulomb**

[نسبة إلى شارل أوجستين كولوم (Charles Augustin de Colulomb) ، وهو عالم فيزياء فرنسي ، *عاش مابين 1736-1806]* وهي رمز الشحنة الكهربائية بحسب نظام الوحدات العالمي (SI) ، وتعرف على أنها الشحنة المنتقلة عبر السطح عند مرور تيار مقداره أمبير واحد لمدة ثانية واحدة ، وتعادل ($6.25X10^8$) إلكترون . رمزها C .

عدّاد كولتر **Coulter counter**

[عداد منسوب للمهندس ولاس كولتر (Wallace H.Coulter) وهو مهندس أمريكي ، *من القرن العشرين]* وهو عداد إلكتروني للخلايا .

انظر تحت counter .

كومادين **Coumadin**

علامة تجارية لأحد مستحضرات وارفارين صوديوم (Warfarin Sodium) .

كوماميسين **coumamycin**

هو عامل مضاد للجراثيم .

انظر تحت coumermycin .

حمض الكوماريك **coumaric acid**

والكوبالامين . يسمى أيضاً عد فصوص العدلات (Neutrophil lobe count) .

عد كريات الدم **blood cell count**

انظر تحت blood count .

عَدٌّ دَمَويّ **blood count**

هو تحديد عدد العناصر المتشكلة في واحد من الملي متر مكعب من الدم ؛ وقد يكون عد الدم كاملاً أو قد يقتصر على قياس أحد العناصر المتشكلة . ويتم العد إما يدوياً باستخدام عدادة الكريات ، أو آلياً باستخدام عداد جريان الكريات ، أو عداد كولتر ، أو أي وسائل أخرى .

عَدٌّ دَمَويٌّ شامل **complete blood count**

هو سلسلة من الاختبارات التي يتم إجراؤها على الدم المحيطي ، وتشمل عدد الكريات الحمراء ، ومناسب الكريات الحمراء ، وعدد الكريات البيض وأحياناً عدد الصفيحات .

عَدٌّ تَفْريقيّ **differential count**

انظر تحت differential blood count .

عد دموي تفريقي **differential blood count**

هو عد الكريات البيض التفريقي .

انظر تحت differential leukocyte count .

عَدُّ الصُّفَيحات المُباشر **direct platelet count**

هو تحديد عدد الصفيحات الدموية في عينة من الدم عن طريق الفحص المباشر تحت المجهر .

عد الكريات الحمر **eryhthrocyte count**

هو تحديد عدد الكريات الحمر في وحدة حجمية من الدم ، والذي جرى تمديده باستعمال محلول إسوي التوتر ، وذلك باستعمال عداد أوتوماتيكي (آلي) مثل عداد جريان الكريات . يسمى أيضاً عد خلايا الدم الحمراء (Red blood cell count) .

عَدٌّ الخَيْطيّات واللاخَيطيّات **filament-nonfilament count**

في عد الكريات البيض التفريقي : هو تحديد عدد الكريات البيض اليافعة والكريات البيض الناضجة .

1 ـ يقدم المشورة ، وبخاصة في المجالات القانونية أو في مجالات الصحة النفسية أو السلوكية .

2 ـ المستشار الذي يرجع إليه لتقديم المشورة .

مُستَنْصِح **counselee**

هو الشخص الذي يتلقى الاستنصاح أو المشورة .

استِنْصاح **counseling**

هو المساعدة والمشورة المقدمة من قبل شخص اختصاصي في التغلب على الصعوبات الشخصية ، وبخاصة في المجالات النفسية والسلوكية .

مُستَنْصَح **counseller**

هو شخص اختصاصي يقدم النصيحة والمشورة ، وبخاصة في المجالات القانونية أو في المجالات السلوكية والنفسية .

count

1 ـ يَعُدُّ

2 ـ عِدَّة

3 ـ عَدٌّ

هو الحساب الرقمي ، أو المدلول الرقمي .

عَدُّ آديس **Addis count**

هو تحديد عدد كريات الدم الحمراء ، وكريات الدم البيضاء ، والخلايا الظهارية ، والأسطوانات الظهارية ، وكمية البروتين في قسامة (Aliquot) عينة بول على مدى 12 ساعة ، و الذي يفيد في تشخيص ومعالجة أمراض الكلية .

عدُّ آرْنيت **Arneth count**

هي طريقة لتحديد نسبة العدلات لدى جمهرة ، والتي يتراوح جميع أعداد فصوصها أو قطعها النووية بين الواحد والخمسة ؛ وعادة ما تزيد نسبة العدلات التي تشتمل على فصين أو ثلاثة فصوص على 75٪ . وتشاهد زيادة نسبة العدلات ذوات الفصوص الأقل ، وهو ما يسمى عادة الانزياح نحو اليسار ، في العداوى الجرثومية ، فيما تشاهد زيادة نسبة العدلات متعددة قطع النواة ، وهو ما يسمى الانزياح نحو اليمين ، في حالات عوز الفولات

لطاخة دموية ثم تحديد عدد الصفيحات قياساً إلى عدد الكريات الحمراء .

عَدُّ خلايا الدم الحَمْراء **red blood cell count**

انظر تحت eryhthrocyte count .

عد الخلايا الحمراء **red cell count**

انظر تحت eryhthrocyte count .

عَدُّ الكُرَيَّات الشَّبَكيَّة **reticulocyte count**

هو حسابَ عددَ الكريات الشبكية في واحد ملي متر مكعب واحد من الدم المحيطي ، حيث تعرض النتيجة بشكل عدد مطلق أو بشكل نسبة مئوية من عدد الكريات البيض . وهذه إحدى الوسائل التي تستخدم في تقدير حالة نشاط نقي العظم في تكوين الكريات الحمراء .

عد اللمفاويات الشامل **total lymphocyte count**

هو اختبار يمكن أن يفيد في الدلالة على حالة التغذية ونتائجها .

عَدُّ الخَلايَا العَيوشَة **viable cell count**

عد خلايا الدم البيضاء **White blood cell count**

انظر تحت leukocyte count .

عد الخلايا البيضاء **White cell count**

انظر تحت leukocyte count .

عَدَّة بالدَّقيقة **count per minute**

هو عدد مرات حدوث أمر معين في الدقيقة الواحدة .

1 ـ مُقابِل (أسنان) **counter**

2 ـ ضِدٌّ

3 ـ عَدَّادٌ

4 ـ نضَدٌ

هو أداة أو جهاز تحسب بواسطته القيم العددية ؛ وفي الأشعة : هو جهيزة لترقيم الأحداث المؤينة .

عَدَّادُ الكُرَيَّات البَيضاء التَّفْرِيقيُّ الآلِيُّ **automated differential leukocytic counter**

عَدُّ الصُّفَيحات اللاَّمُباشر **indirect platelet count**

هو عد الصفيحات بوسائل أكثر دقة من العد المباشر ، والتي تشمل استعمال عدادة الكريات ، أو العد الإلكتروني .

عد الكريات البيض **leukocyte count**

هو تحديد عدد الكريات البيض في وحدة حجمية من الدم ، ويجرى ذلك عادة بعد حل الكريات الحمر ، ثم تمديد الدم ؛ ويتم العد إما يدوياً باستخدام عدادة الكريات أو إلكترونياً . يسمى عد الكريات البيض الشامل (Total leukocyte count) ، عد الكريات البيض التفريقي (Differential leukocyte count) ويسمى أيضاً عد خلايا الدم البضاء (White blood cell count) ، أو عد الخلايا البيضاء (White cell count) .

عد الكريات البيض التفريقي **differential leukocyte count**

هو عد الكريات البيض بصورة تظهر نسب كل نوع من أنواعها المختلفة . وذلك في مقابل عد الكريات البيض الشامل .

عد الكريات البيض الشامل **complete leukocyte count**

هو عد الكريات البيض بصورة تظهر العدد الإجمالي لجميع أنماط الكريات البيض في حجم معين من الدم . وذلك في مقابل عد الكريات البيض التفريقي (Differential leukocyte count) .

عد فصوص العدلات **neutrophil lobe count**

انظر تحت Arneth count .

عَدُّ الطُّفَيلِيَّات **parasite count**

عد الصفيَحات **platelet count**

هو تحديد عدد الصفيحات في واحد ملي متر مكعب من الدم ؛ ويمكن لعد الصفيحات أن يكون مباشراً باستخدام عدادة الكريات والمجهر ، أو غير مباشر بحساب النسبة بين عدد الصفيحات ، وعدد كريات الدم الحمراء في

سابقة بمعنى التَّضَادّ **counter-**

سابقة تفيد معنى التضاد .

تضادّ **counteraction**

انظر تحت antagonism .

1ـ مُوَازَنَة **counterbalance**

2ـ يُوازِنُ

مصطلح يدل على معنى معاوضة أو موازنة .

مُوازَنَةٌ كُلْوِيَّة **renal counterbalance**

هي ضخامَة تعويضية تصيب الكلية الطبيعية ، أو جزءاً من الكلية ، والذي يترافق بميل الكلية الثانية المريضة إلى البقاء في حالة من الضمور النسبي .

منع الخواطر السيئة **countercathexis**

كبت الخواطر السيئة .

انظر تحت anticathexis .

1ـ إشْراطٌ مُعاكِس **counterconditioning**

2ـ تكْييفٌ مُضادّ

أي من تقنيات التكيف التي تستعمل لاستبدال استجابة شرطية سلبية لمنبه ما باستجابة إيجابية .

تيَّارٌ مُعاكِس **countercurrent**

تيار يجري في اتجاه معاكس .

انظر تحت mechanism .

تيَّارٌ مُعاكِسٌ **counter-current**

تيار يجري في اتجاه معاكس .

انظر تحت mechanism .

مُضادُّ الاكْتِئاب **counterdepressant**

انظر تحت antidepressant .

قالَبٌ مُعاكِس **counterdie**

هي الصورة السلبية للقالب ، والتي تصنع عادة من معدن ذي درجة ذوبان أخفض من معدن القالب الأصلي .

رَحلانٌ كَهْرَبِيٌّ مُعاكِس **counterelectrophoresis**

هو رَحَلانٌ كَهْرَبائِيٌّ مَناعِيٌّ مُعاكس .

انظر تحت counterimmunoelectrophoresis .

1ـ جر معاكس **counterextension**

2ـ تمْديدٌ مُقابل

عَدَّادُ كُولْتَر **Coulter counter**

هي أداة آلية إلكترونية يجري بها عد مكونات الدم اعتماداً على مبدأ يقضي بأن الخلايا هي نواقل رديئة التوصيل الكهربائي بالمقارنة مع المحلول الملحي .

عَضَّةٌ مُقابِلَة (أسنان) **counter bite**

هي العضَة التي تقابل العضة المأخوذة للأسنان في أحد الفكين .

عَدَّادُ جايجر **Geiger counter**

هو عداد للإشعاع الذي يستخدم أنبوباً مملوءاً بالغاز للدلالة على وجود جسيمات مؤينة ؛ ولا يمكن تحديد نوع أو طاقة الجسيم ؛ لأن درجة التأين الحادثة لا ترتبط بالنوع أو بالطاقة . وهو عداد شديد الحساسية للجسيمات إلا أنه غير حساس نسبياً لأشعة جاما والأشعة السينية .

عَدَّادُ جايجر ـ مولَر **Geiger-Muller counter**

انظر تحت Geiger counter .

عَدَّادٌ تَناسُبِيّ **proportional counter**

هو عداد مملوء بالغاز ، والذي يستخدم في التحري عن الإشعاع بحيث يكون النبض المتولد فيه متناسباً مع عدد الأيونات المتشكلة في الغاز بواسطة الجسيمات المؤينة الأولية ؛ وبذلك يمكن الاستفادة منه في التمييز بين الأنواع ومستويات الطاقة المختلفة من الإشعاع .

عَدَّادُ كيبيك **Quebec bacteria**

مُسْتَعْمَرات الجَراثيم **colony counter**

عَدَّادُ الوَمَضان **scintillation counter**

هو أداة للدلالة على انبعاث جسيمات مؤينة ، والتي تسمح بتحديد تركيز النظائر المشعة في الجسم ، أو في مواد أخرى ؛ ويتم امتصاص الإشعاع من قبل أنواع معينة من البلورات أو السوائل التي تصدر تبعاً لذلك ومضات قصيرة من الضوء يتم تحسسها وتضخيمها من قبل أنبوب مكثف للضوء ويتم احتسابها إذا كانت واقعة ضمن مجال محدد مسبقاً للخواص المتعلقة بالطاقة والخاصة بالنظير المشع موضع الاستقصاء .

يخشاها المرء ، أو كان يخشاها في السابق ، بصورة إرادية أو لا واعية .

متعلق بتتبُّع المَرْهوبات **counterphobic**

أي شيء متعلق أو منسوب إلى تتبع المرهوبات .

سمٌّ مُضادّ **counterpoison**

هو سم يتم إعطاؤه لمعاكسة فعل سم آخر .

مُعاكِسة النَّبَضان **counterpulsation**

هي تقنية تهدف إلى زيادة كفاءة الدوران وتقليل عمل القلب ، من خلال مزامنة قوة أداة ضخ خارجية مع انقباض وانبساط القلب .

مُعاكسةُ النَّبَضان بالبَالون داخلَ الأورطي **intra-aortic balloon counterpulsation**

هو دعم الدوَران بواسطة بالون يتم إدخاله إلى الأورطي الصدري ، والذي ينفخ أثناء الانبساط (مما يزيد من ضغط التروية القلبية) ويفرغ أثناء الانقباض ، مما يؤدي إلى إنقاص الحمولة التلوية وتحسين الوظيفة القلبية .

بَزْلٌ مُقابل **counterpuncture**

انظر تحت counteropening .

صَدْمَةٌ مُضادَّة **countershock**

هي صدمة بتيار مباشر عالي الشدة ، والتي توجه إلى القلب لمقاطعة الرجفان البطيني ، وإعادة التزامن إلى النشاط الكهربائي .

ثقبٌ مَشْطوب **countersink**

هو انخفاض سني مشطوب الحوافي .

مُلَوِّنٌ مُباين **counterstain**

هو ملون يستخدم لزيادة توضيح وتمييز ملون آخر .

إيحاءٌ مُضادّ **countersuggestion**

هو تقنية في العلاج النفسي تعتمد على أن يقوم المعالج قصداً بإيحاء معاكس لنيته الحقيقية .

جَرٌّ مُعاكِس **countertraction**

جر مقابل لجر في اتجاه معاكس ، والذي يستخدم لمعالجة الكسور .

إنقال مقابل **countertransference**

في التحليل النفسي : هي استجابة إنقالية يبديها المحلل النفسي ، أو المعالج النفسي تجاه المريض ،

1 ـ جر معاكس لمعالجة الكسور (Countertraction) .

2 ـ تمديد مقابل ، وذلك في صناعة البدلات السنية .

رَحلانٌ كَهْرَبائِيٌّ مُناعِيٌّ مُعاكِس **counterimmuno electrophoresis**

هو انتشار مناعي كهربائي أحادي البعد ؛ وهي تقنية توضع فيها الأضداد والمستضدات في آبار منفصلة داخل صفيحة الأجار ، وتوجه بحيث يقترب أحدها من الآخر عن طريق تطبيق حقل كهربائي ، حيث أن الهلام يكون مشحوناً بدرجة باهاء (PH) بين نقطتي تساوي الكهربية للضد والمستضد . وهذا الاختبار أكثر سرعة وحساسية من الانتشار الكهربائي المزدوج ، وهو مفيد بشكل خاص في حالة المستضدات بطيئة الانتشار في الهلام . اختصاره (CIE) ، يسمى أيضاً رحلان كهربائي مناعي معاكس التيار (Countercurrent immunoelectrophoresis) .

شَقٌّ مُقابل **counterincision**

هو شق ثان يتم عمله عادة لتسهيل التفريغ ، وأحياناً لتخفيف الضغط عن حواف جرح نظيف في مرحلة الانغلاق .

كبتُ الطاقةِ النَّفسيَّة **counterinvestment**

هي كبت الخواطر السيئة .

انظر تحت anticathexis .

مُهَيِّجٌ مُقابل **counterirritant**

1 ـ إثارة التهييج المقابل .

2 ـ أي عامل يحدث التهييج المقابل .

تَهْييجٌ مُقابل **counterirritation**

هو تهييج سطحي يتم إحداثه في جزء من الجسم بهدف تخفيف التهييج الحادث في الجزء الآخر .

فتحَةٌ مقابِلة **counteropening**

هو شق ثان يتم عمله متقاطعاً مع الشق السابق لتسهيل التفريغ .

تتبُّعُ المَرْهوبات **counterphobia**

هو حالة السعي للوصول إلى حالات أو أشياء

احْتِقانُ الدِّماغ **coup de sang**

ضَرْبَةُ الشَّمْس **coup de soleil**

انظر تحت sunstroke .

دَفْعَةً دَفْعَة **coup sur coup**

هو إعطاء الدواء على دفعات صغيرة بفواصل زمنية قصيرة لضمان التأثير السريع أو الكامل أو المستمر اختصارها (CSC) .

ضَرْبَةُ السَّيْف **en coup de sabre**

هي آفة خطية ، والتي تشاهد في سياق تصلب الجلد ، وتصيب المنطقة الجبهية أو الجبهية الجدارية من الجبهة وفروة الرأس ؛ وغالباً ما تترافق بضمور نصف الوجه .

قَرْعٌ تسَمُّعِيّ **couphonia**

1ـ مُزْدَوِجَة **couple**

2ـ يقترِنُ

3ـ زوجان

1ـ قوتان متساويتان تؤثران عل شيء ما في اتجاهين متوازيين ومتعاكسين .

2ـ منطقة تلامس بين معدنين غير متماثلين ، يحدث فيها فرق في الجهد الكهربائي .

زوج **couplet**

انظر تحت pair .

تقارُنٌ **coupling**

1ـ ارتباط شيئين معاً .

2ـ في علم الوراثة : هو حدوث الأليلين الطافرين موضع الاهتمام في نفس الكروموسوم في زيجوت متغايرة مزدوجة .

3ـ في طب القلب : هو الحدوث المتعاقب لانقباضة قلبية طبيعية متبوعة بانقباضة مبتسرة .



عداد جايجر **Geiger counter**

أو بلفظ آخر : هي استجابة عاطفية تكون بوجه عام انعكاساً لحاجات وصراعات المحلل الداخلية الذاتية إلا أنها في نفس الوقت قد تكون استجابة لسلوك المستهلك .

انظر تحت transference .

انتقال متقابل **countertransport**

هو الانتقال المتزامن لمادتين عبر أحد الأغشية في اتجاهين متعاكسين ، ويتم ذلك إما بواسطة نفس الناقل أو بواسطة نواقل مختلفة مرتبطة ببعضها البعض من الناحية الكيميائية الحيوية . ويقابل هذا المصطلح كل من التنادل المتعاكس (Antiport) ، وانتقال متواقت (Cotransport) .

الانتقال المتقابل للصوديوم والليثيوم **sodium-lithium countertransport**

هو مسلك انتقالي تدخل من خلاله أيونات الصوديوم إلى الكريات الحمراء وتخرج أيونات الليثيوم منها بغاية تحقيق توازن الصوديوم في الخلايا ، وفي البلازما .

عد **counting**

هي عملية العد .

عد ومضان السائل **liquid scintillation counting**

هو تحديد تركيز النظائر المشعة في جسم ، أو عينة ما بواسطة عداد الومضان ، والذي يستخدم كمكشاف سائلاً عضوياً ، والذي يمكنه أن يصدر نبضات من الضوء عند تسليط الأشعة عليه .

مُستَشْفى رِيفِيّ **country hospital**

هي مستشفى مجهز للتعامل مع الاحتياجات الصحية للمناطق الريفية .

ضَرْبَة **coup**

هي ضربة ، أو صدمة (Stroke) .

ضَرْبَةُ السَّوط **coup de fouet**

هو تمزق العضلة الأخمصية ، والمترافق بألم حاد يتسبب في الإعاقة .

ضَرْبَةُ السَّيْف **coup de sabre**

انظر تحت en coup de sabre .

الانسدادي) .
انظر تحت law .

متلازمة **Courvoisier**
كورفوازييه ـ تيرييه **Terrier syndrome**
[متلازمة منسوبة للطبيب ل ـ ج كورفوازييه (Ludwig Georg Courvoisier) ، وهو ولويس *فليكس تيرييه (Louis Felix Terrier)* ، وهو جراح فرنسي ، *عاش ما بين 1908-1837]* ، وهو يرقان مع توسع المرارة .
انظر تحت syndrome .

طريقة كوتار **Coutard's method**
[طريقة منسوبة للطبيب هنري كوتار (Henri Coutard) ، وهو طبيب أشعة فرنسي في *الولايات المتحدة ،عاش ما بين 1950-1876]* .
انظر تحت method .

نِفاسُ البَعْل **couvade**
هو تقليد في بعض المجتمعات ، والذي بموجبه يختلق الزوج المرض أثناء فترات المخاض والنفاس عند زوجته .

رحم كوفلير **Couvelaire uterus**
[رحم منسوب للطبيب ألكسندر كوفلير (Alexander Couvelaire) ، وهو طبيب توليد فرنسي ، *عاش ما بين 1948-1873]* وهو السكتة الرحمية المشيمية .
انظر تحت uteroplacental apoplexy .

جُلطة خارجَ الوعاء **couvercle**
انظر تحت hematoma .

حاضِنَة **couveuse**
انظر تحت incubator .

تكافؤ تساهُمِيّ **covalence**
1 ـ عدد أزواج الإلكترونات التي يمكن للذرة أن تشارك بها مع ذرات أخرى .
2 ـ ارتباط كيمائي واحد أو أكثر يحصل نتيجة تشارك الذرات بأزواج الإلكترونات .

رابطٌ تساهُمِيّ **covalent bond**
انظر تحت bond .

تبايُنٌ مُشْتَرك **covariance**

تَقارُنُ الاسْتِثارَة والتَّقَلُّص **excitation-contraction coupling**
هو تقارن جهد الفعل للتقلص العضلي بفعل أيونات الكالسيوم ، والتي تنتشر بسرعة في الليفات العضلية ، وتحفز التفاعلات الكيمائية التي توجه الانزلاق القلوص لليفات الأكتين والميوسين .

تَقارُنٌ ثابت **fixed coupling**
تقارن تَكون الانقباضات القلبية المبتسرة فيه ، التالية للانقباضات الطبيعية بفواصل متطابقة .

تقارن متغير **variable coupling**
هو تقارن لا تكون الفواصل فيه بين الانقباضات الخارجية والانقباضات الجيبية السابقة لها منتظمة .

1 ـ دَعَث (ألم عضلي) **courbature**
2 ـ داءُ الغَوَّاص

كورنان **Cournand**
هو *[أندريه فريدريك (Andre Fréderic)* عالم *فيزيولوجيا أمريكي ـ فرنسي المولد ، ولد عام 1895 ؛ فاز بجائزة نوبل للطب والفيزياء لعام 1956 بالمشاركة مع فيرنر ثيودور أوتو فروسمان (Werner Theodor otto Forssmann)* وديكنسون *(Dickinson)* وودروف ريتشاردز *(Woodruff Richards)]* الأصغر لتطويرهم اللقثطرة القلبية .

1 ـ مُقرَّر **course**
2 ـ مَساق
1 ـ مسلك أو مسار .
2 ـ اتجاه الحركة .
3 ـ برنامج للتعلم .
4 ـ جزء من وجبة الطعام .

الحَيْض **courses**

قانون كورفوازييه **Courvoisier's law (sign)**
[قانون منسوب للجراح لودفيج جيورج كورفوازييه (Ludwig Georg Courvoisier) ، وهو جراح سويسري ، *[1843-1918 uha lhfdk* وعلامة كورفوازييه (علامة في اليرقان

2 ـ أشعـار قرون الميقونة ، والتي تسبب حكة شديدة ، وتستعمل طبياً كطارد للديدان ، ومضاد للتهيج ، ولا بد أن تكون ممزوجة ببعض السواغات كالعسل وتستخدم أحياناً كأنها (مسحوق الحكة) في بعض ألعاب المزاح .

Cowden disease **داء كاودن**

[داء منسوب لعائلة كاودن (Cowden) ، وهو اسم العائلة لأول مصاب تمت دراسة حالته] .

انظر تحت disease .

Cowdria **الكَودَريَّة**

[نسبة إلى إدمند فنسنت كاودري (Edmund Vincent Cowdry) ، وهو عالم تشريح ، وعالم حيوان أمريكي ، عاش ما بين 1888-1975] ، وهي جنس من الجراثيم من قبيلة الإيرليخيات ، فصيلة الريكتسيات ، رتبة الريكتساوات ، والتي تشاهد في هيولى الخلايا البطانية الوعائية عند المجترات .

Cowdria ruminantium **الكَودَريَّةُ المُجْتَرِّيَّة**

هو العَامل الممرض المسبب لداء القلب المائي عند الخراف والماعز والمواشي ، وهو غير ممرض للبشر .

cowdriosis **داءُ الكَودَريَّات**

هو داء القلب المائي .

انظر تحت heartwater .

Cowen's sign **علامة كوين**

[علامة منسوبة للطبيب ج . ب كوين (J. P Cowen) ، وهو طبيب عيون أمريكي ، من القرن العشرين] .

انظر تحت sign .

cowl **سَلَى الرَّأس**

انظر تحت caul .

cowperian **كوبر**

هو ما تمت تسميته من قبل أو على شرف وليام كوبر (Willian Cowper) .

cowperitis **التِهابُ غُدَّةِ كوْبَر**

التهاب غدة كوبر (الغدة البصلية الإحليلية) (Glandula bulbourethralis) .

في علم الإحصاء : هو قياس ميل متغيرين عشوائيين للتغير بشكل مترافق : أي أنه هو القيمة المتوقعة لنتاج التبدلات المترابطة في قيم المتغيرين . وقد تكون هذه القيمة موجبة : إذا كان المتغيران يتناقصان أو يتزايدان معاً ، أو سالبة : إذا كان تزايد أحد المتغيرين يترافق بتناقص الآخر ، أو صفراً : عندما لا يتأثر تبدل أحد المتغيرين بتبدل الآخر .

covariant **مُتَغَيِّرٌ مُشارِك**

في علم الإحصاء : هو متغير مرتبط بمتغير آخر .

covariate **مُتَغَيِّرٌ مُشارِك**

في علم الإحصاء : هو متغير مرتبط بمتغير آخر .

cover **1 ـ مُتَغَيِّرٌ مُشارِك**

2 ـ اِستيْعاب

3 ـ يُغَطي

4 ـ غِطاءٌ

1 ـ يوفر الحماية ، كما في حال الوقاية .

2 ـ الوقاية التي يتم توفيرها بالصورة المتاحة .

headrest cover **غِطاءُ مَسْنَد الرَّأس** (أسنان)

غطاء يوضَع على مسندة الرأس الخاص بوحدة معالجة الأسنان .

coverage **تَغْطِيَة**

استيعاب

covered **مُغَطَّى**

1 ـ محاط بغطاء .

2 ـ موفر له الحماية أو الوقاية .

covered charge **الرُّسومُ المُغَطَّاة**

coverglass **ساتِرَة (ج: سَواتِر)**

هي صفيحة زجاجية رقيقة تغطي مزرعة ، أو عينة معدة للفحص المجهري . تكتب أيضاً بشكل (Cover glass) .

coverslip **ساتِرَة (ج: سَواتِر)**

انظر تحت coverglass .

cowage **مَيْقونَة**

1 ـ هي الموقونة الحاكة (Mucuna pruriens) : وهو نوع من الأعشاب .

Cowper's gland, ligament **غُدَّةٌ كَوْبَر، رباط كوبر**

[رباط أو غـدة منسـوبة للجـراح وليـام كـوبر (Willian Cowper) ، وهو جــراح إنجليــزي ، عـاش ما بين 1709-1666] وهي الغدة البـصلية الإحليلية ، ويطلق على اللفافة العانية أو الرباط العاني .

انظر تحت glandula bulbourethralis .

انظر تحت fascia pectinea .

cowpox **وَقس (جُدَرِيُّ البَقَر)**

1 ـ مـرض جلدي خـفيف الشـدة يشـفى ذاتيـاً يصيب البقر المنتج للحليب ، ويقتصر أساساً على الضـرع والحلمـات ، ويسـببـه فـيـروس الوقس ، ويمكن أن يتسبب الحلابون (Milkers) في نقله إلى الحيوانات غير المصابة بالعدوى .

2 ـ عـدوى البـشر بنفس الفـيـروس ، وتحـدث العدوى عـادة بشكل عـرضي ، كـمـا هو الحال عند حلب حـيـوان مـصـاب ؛ وتظهـر الآفـات الأولية ، أو الحـويصلات ، على الأصابع ، وقد تتـمـزق وتنتشـر إلى اليـدين أو المناطق المجاورة ، وعـادة مـا تشـفى دون أن تـخلف ندوباً . وقـد تترافق بوذمة موضعية والتهاب الأوعية اللمفية والتهـاب العقد اللمفية مع أو بدون حمى . وينبغي عدم الخلط بين الوقس ، ونظير الوقس (Paravaccinia) وكـان إدوارد جـينر (Edward Jenner) هو أول من وضح كيفية عمل اللقاح (Vaccination) عندمـا أظهـر أن التلقـيح بمواد مستحصلة من آفات وقس البقر يمكن أن يمنح مناعة ضد الجدري .

Cox proportional hazards **مخاطر كوكس التناسبية**

[مـخـاطر منسـوب للعـالم ديفيـد روكـسبي كـوكس (David Roxbee Cox) ، وهو عـالم إحصاء بريطاني ، ولد عام 1924] .

انظر تحت model .

coxa TA **وَرِك**

1 ـ الورك .

2 ـ مفصل الورك .

انظر تحت articulatio coxae .

coxa adducta **وَرِكٌ فَحْجاء**

انَظر تحت coxa vara .

coxa flexa **وَرِكٌ فَحْجاء**

انَظر تحت coxa vara .

coxa magna **وَرِكٌ كَبيرَة**

هي حـالة تتـسم بتـوسع رأس وعنق عظم الفخذ .

coxa plana **وَرِكٌ سَطْحاء**

هو داء عظمي غـضـروفي يصـيب المشـاشـة الرؤيسية لعظم الفخذ ؛ داء عظمي غضروفي .

انظر تحت osteochondrosis .

coxa valga **وَرِكٌ رَوحاء**

هـو تشـــوه في الورك بحـــيث تكون الزاوية المتشكلة بين محـور رأس وعنق عظم الفـخذ ، ومحور جدل عظم الفخذ مادته زيادته .

coxa vara **وَرِكٌ فَحْجاء**

هـو تشـــوه في الورك بحـــيث تكون الزاوية المتشكلة بين محـور رأس وعنق عظم الفـخذ ، ومحور جدل عظم الفخذ مادته ناقصة . يسمى أيضاً (Coxa adducta) ، (Coxa flexa) .

coxa vara luxans **وَرِكٌ فَحْجاءُ خَلْعيَّة**

هو شق في عنق عظم الفخذ مع انخلاع رأس العظم كنتيجة للورك الحجاء .

coxal **وَرِكِيّ**

منسوب إلى الورك .

coxalgia **أَلمُ الوَرِك**

1 ـ ألم مفصل الورك .

2 ـ ألم الورك .

coxankylometer **مِقياسُ مَيَلانِ الوَرِك**

هي طريقة لقياس الزاوية بين محور رأس وعنق عظم الفخذ ومحور جدل العظم .

coxarthria **التِهابُ مَفْصِلِ الوَرِك**

انظر تحت coxitis .

coxarthritis **التِهابُ مَفْصِلِ الوَرِك**


انظر تحت coxitis .

وَركِيٌّ فَخِذِيّ **coxofemoral**

أي أنه يتعلق بالورك والفخذ .

فتحُ مَفصِلِ الورك **coxotomy**

هو استئصال جزء من مفصل الورك .



الوقس (جدري البقر) **Cowpox**

سُلُّ الوَرك **coxotuberculosis**

هو مرض سلي في مفصل الورك .

الفَيروسَة الكوكساكِيَّة **coxsackievirus**

[ڤيروس منسوب إلى كوكساكي في نيويورك حيث جرى اكتشاف الڤيروس لأول مرة] أي من عناصر مجموعة الڤيروسات المتغايرة من جنس الڤيروس المعوي ، والتي تسبب عند الإنسان مرضاً يشابه التهاب سنجابية النخاع ، أو شلل الأطفال غير أنه لا يترافق بالشلل ، وكذلك يسبب مرضاً مصحوباً بالحمى والطفح . ويمكن فصله إلى مجموعتين : المجموعة (A 23) نمطاً مصلياً : الأنماط من 1-22 ، والنمط 24 ، أما النمط 23 فيماثل الڤيروسة الإيكوية (g) ، وتسبب آفات تنكسية في العضلات المخططة ، والمجموعة B وتشتمل على (6 أنماط مصلية) ، وتسبب التهاب السحايا الرقيقة عند صغار الفئران . كما تم التعرف على

فطارُ الوَرك **coxarthrocace**

هو مرض فطري في مفصل الورك .

اعتِلالُ الوَرك **coxarthropathy**

هو مرض في مفصل الورك .

فُصالُ الوَرك **coxarthrosis**

هو مرض مفصلي تنكسي ، أو فصال عظمي في مفصل الورك .

الكوكسيلَة **Coxiella**

[نسبة إلى هيرالد راي كوكس (Herad Rae Cox) ، وهو عالم جراثيم أمريكي ، ولد عام 1907] ، وهي جنس من الجراثيم من قبيلة الريكتسائيات ، فصيلة الريكتسيات ، رتبة الريكتساوات ، والتي تشاهد على شكل عيدان قصيرة في فجوات خلايا الثوي . وقد تم إثبات وجود هذه الأحياء في العديد من الثدييات والقراد في أنحاء العالم ، وتم عزلها من حليب ومشيمة المواشي والخراف والماعز المصابة بالعدوى ، وكذلك من صوف الخراف المصابة .

الكُوكْسيلَّةُ البُورنيتيَّة **Coxiella burnetii**

هي العامل المسبِّب لحمى Q ، والتي تنتقل بواسطة القراد من أنواع القرشومة واللبود وناخس الجلد واليغموش . عادة ما يصاب البشر بالعدوى نتيجة استنشاق الغبار والضبوب الصادر عن المواشي ، ومن الصوف الملوث في معامل الأنسجة . تسمى أيضاً الريكتسية البورنيتية والريكتسية الديابورية .

التِهابُ الوَرك **coxitis**

هو التهاب مفصل الورك ، ويسمى أيضاً (Coxarthritis) .

اَلْتِهابُ الوَرَك العابر **coxitis fugax**

هو التهابٌ عابر حَميد في مفصل الورك .

اَلْتِهابُ الوَرَك الشَّيخوخيّ **senile coxitis**

هو التهابٌ تنكسي في مَفصل الورك .

اَلْتِهابُ الوَرَك العابر **transient coxitis**

اَنظر تحت coxitis fugax .

أَلَمُ الوَرك **coxodynia**

انظر تحت coxalgia .

الأمامي من الحافر) .

كَرْكَرَة **crackle**

انظر تحت rale .

كَراكِرُ جَنْبِيَّةٌ **pleural crackles**

هو صَوتَ حاد وقصير من الجنبة .

مَقفص **cradle**

قفص يحيط بسرير المريض ؛ لتوفير الحرارة أو البرودة أو لحماية الأعضاء المصابة من ملامسة ملاءات السرير .

مَقْفَصٌ كَهْرَبِيّ **electric cradle**

هو مقفص بَشكل القبة أو النفق مزود بمصابيح كهربائية ، والذي يوضع بهدف توفير الحرارة لجسد المريض .

مَقْفَصٌ حَرارِيّ **heat cradle**

هو المَقْفَصُ الكَهْرَبِيّ .

انظر تحت electric cradle

مَقْفَصٌ ثَلْجِيّ **ice cradle**

هو جهاز لخفض حرارة جسد المريض .

اختبار كرافت **Craft's test**

[اختبار منسوب للطبيب ليو ملفيل كرافت (Leo Melville Crafts) ، وهو طبيب أعصاب أمريكي ، عاش ما بين 1838-1863] .

انظر تحت test .

نظيرة الأميبة **Craigia**

[نسبة إلى تشارلز فرانكلين كريج (Charles Franklin Craig) ، وهو جراح في الجيش الأمريكي ، عاش ما بين 1872-1950] نظيرة الأميبة (Paramoeba) ، وهي جنس من الحيوانات الأوالي .

انظر تحت Paramoeba .

جبيرة كريمي **Cramer's splint**

[جبيرة منسوبة للطبيب فريدريك كريمر (Friedrich Cramer) ، وهو جراح ألماني ، عاش ما بين 1847-1903] ، وهي جبيرة سلمية .

انظر تحت splint .

مَعَص **cramp**

هو تقلص عضلي تشنجي مؤلم ؛ وبخاصة عدد آخر من الأنماط المصلي . تكتب أيضاً بشكل (Coxsackie virus) .

القَيُّوط **coyote**

نوع من الذئاب .

القيوطيلو **coyotillo**

هي شجيرة من فصيلة النبق المسهل ، والتي تتواجد في الجزء الجنوبي الغربي من الولايات المتحدة والمكسيك ، وثمره يكون ساماً .

انظر تحت Karwinskia humboldtiana .

كوزار **Cozaar**

علامة تجارية لأحد مستحضرات لوسارتان البوتاسيوم (Losartan Potassium) .

تميمُ الزَّيماز **cozymase**

رمز الكروم **Cr**

انظر تحت chromium .

قَمْلُ العانة **crab**

1 ـ هو سرطان البحر : أي من الرخويات من رتبة عشاريات الأرجل (Decapoda) .

2 ـ هو لفظ عامي يطلق على قمل العانة (Phthirus pubis) .

فلع **crack**

1 ـ صدع أو كسر أو شق غير كامل .

2 ـ شقق الحافر .

انظر تحت sand crack .

تشقق الحافر **hoof wall crack**

انظر تحت sand crack .

تشقق اليربعة **quarter crack**

هو تشقق في الحافر يحدث في اليربعة (الجزء الإنسي من الحافر) .

تشقق الحافر **sand crack**

شق يحدث في المستوى الأرضي من حافر الفرس ، والذي يسبب العرج أحياناً ، وله نوعان : تشقق اليربعة (Quarter Crack) وتشقق السنبك(Toe crack) . يسمى أيضاً (Hoof wall crack) .

تشقق السنبك **toe crack**

هو تشقق في الحافر يحدث في السنبك (الجزء

اليد المفرط في الكتابة ؛ يسمى أيضاً (Writers' أو تشنج الكتاب (Graphospasm) أو شلل (Scrivener's palsy) ، أو spasm) الكتاب (Writers' paralysis) ، أو معص الكتاب (Paralysis notariorum) .

Cramton's muscle **عضلة كرامبتون**

[عضلة منسوبة للسير فيليب كرامبتون (Sir Philip Crampton) ، وهو جراح أيرلندي ، عاش ما بين 1777-1858] ، وهو القسم الأمامي من العضلة الهدنية في الطيور .

انظر تحت muscle .

Crampton's test **اختبار كرامبتون**

[اختبار منسوب للطبيب تشارلز وارد كرامبتون (Charles Ward Crampton) ، وهو طبيب أمريكي ، عاش ما بين 1864-1877] ، وهو قياس فرق الضغط والنبض بين الوقوف والاضطجاع .

انظر تحت test .

crani- **سابقة بمعنى القِحْف**

craniad **نَحْوَ القِحْف**

رأسياً ، باتجاه الرأس .

cranial **قِحْفِيّ**

1 ـ متعلق بالقحف .

2 ـ باتجاه النهاية الرأسية للجسم ، وهو مرادف لمصطلح بمعنى علوي (Superior) عند البشر وذوات القدمين الأخرى . ويستخدم بمعنى مصطلح أمامي (Anterior) أحياناً كمرادف عند رباعيات الأقدام . ويرادفه كذلك مصطلح رأسي (Cephalic) .

cranial index **المَنْسَبُ القِحْفِيُّ**

هو المنسَبَ الرأسي (Cephalic index) ؛ وهو نسبة أقصى عرض إلى أقصى طول للرأس مضروباً في مئة .

cranialis TA **قِحْفِيّ**

انظر تحت cranial .

craniamphitomy **قطعُ كِفافِ القِحْف**

هو إجراء قطع على كامل قطر الجمجمة بهدف

التشنج الوتري .

accessory cramp **مَعَصُ العَصَب الإضافي**

هو صعر تشنجي ناتج عن آفة في العصب الإضافي .

heat cramp **مَعَصُ الحَر**

هو شكل من أشكال الإنهاك الحراري ، والذي يترافق فيه التشنج العضلي بألم وتوسع في الحدقة وضعف في النبض ؛ ويشاهد عند الأشخاص الذين يعملون في ظروف الحرارة الشديدة (الوقادون في الباخرة أو القاطرة ، وعمال المناجم ، وعمال قطع الأخشاب) ويفقدون كميات كبيرة من الماء والأملاح . يسمى أيضاً داء إيدسال (Edsall's disease) .

intermittent cramp **مَعَصٌ مُتَقَطِّع**

menstrual cramp **مَعَصُ الطَّمْث**

miners' cramp **مَعَصُ عُمَّال المَناجم**

هو معص الحر .

انظر تحت heat cramp .

muscle cramp **مَعَصٌ عَضَلِيّ**

musicians' cramp **مَعَصُ الموسيقيِّين**

nocturnal cramp **مَعَصٌ لَيْلِيّ**

occupational cramp **مَعَصٌ مِهْنِيّ**

pianists' cramp **مَعَصُ ضَارِبِي البيانُو**

professional cramp **مَعَصٌ مِهْنِيّ**

recumbency cramp **مَعَصُ الاسْتِلْقاء**

هو تشنج عضلات الأرجل أو الأقدام عند الراحة أو أثناء النوم الخفيف .

shaving cramp **مَعَصُ الحِلاقَة**

stoker's cramp **مَعَصُ العَامِلِينَ بالمَواقِد**

هو معص الحر .

انظر تحت heat cramp .

tailors' cramp **مَعَصُ الخَيَّاطِين**

violinist cramp **مَعَصُ عازِف الكَمان**

writers' cramp **مَعَصُ الكُتَّاب**

هو معص عضلي يصيب اليد ، وهو نوع من خلل التوتر البؤري الذي ينتج عن استعمال

هو خَلَلُ التَّعَظُّمِ التَّرْقُوِيِّ القحْفِيّ .
انظر تحت cleidocranial dysostosis .

craniodidymus **ذو القِحْفَيْن**
هو جنين مسخ ذو رأسين .

craniofacial **قِحْفِيٌّ وَجْهِيّ**
أي شيء متعلق بالقحف والوجه .

craniofacial angle **زاوِيةٌ قِحْفِيَّةٌ وَجْهِيَّة**
هي الزاوية ما بينَ المحور القاعدي القحفي والمحور الوجهي القاعدي عند الدرز الوتدي المصفوي .

craniofacial dysjunction **شُذُوذُ الاتِّصَال القحْفِيّ الوَجْهِي**
هو شذوذ التحام الدرز القحفي الوجهي .

craniofacial notch **ثُلْمَةٌ قِحْفِيَّةٌ وَجْهِيَّة**
هي ثلمة على الحاجز العظمي بين التجويفين الأنفي والحجاجي .

craniofenestria **تَنَوفُذُ القِحْف**
هو تطور قبة جمجمة الجنين بشكل معيب بحيث لا يتشكل العظم في بعض المناطق . يقابله مصطلح تجوب القحف (Craniolacunia) .

craniognomy **دراسة شكل الرَّأس**

craniograph **مِرْسامُ القِحْف**
جهيزة تستعمل لرسم حدود الجمجمة .

craniography **توصيفُ القِحْف**
هو دراسة الجمجمة باستعمال الصور الفوتوجرافية والجداول ، . . . إلخ .

craniolacunia **تَجَوُّبُ القِحْف**
هو تطور قبة جمجمة الجنين بصورة معيبة بحيث توجد مناطق منخفضة على سطحها الداخلي . يقابله مصطلح تَنَوفُذُ القِحْف (Craniofenestria)

craniology **عِلمُ الجَماجِم**
الدراسة العلمية للجماجم .

craniomalacia **تَلَيُّنُ القِحْف**
هو القوام الطري (اللين) غير الطبيعي للجمجمة .

craniomandibular **قِحْفِيٌّ فكيٌّ سُفْلِيّ**

تخفيف الضغط .

Craniata **القِحْفِيَّات**
هي شعيبة من الحبليات ، والتي تشمل أنواعاً ذات جمجمة وعمود سيسائي حقيقيين ؛ وتسمى كذلك الفقاريات .

craniectomy **قطعُ القِحْف**
هو استئصال جزء من الجمجمة .

cranii **قحفي**
صيغة الإضافة إلى القحف .

cranio- **سابقة بمعنى القِحْف**
صيغة سابقة تشير إلى علاقة بالقحف أو الجمجمة .

cranioacromial **قِحْفِيٌّ أَخْرَمِيّ**
متعلق بالقحف والأخرم .

cranioaural **قِحْفِيٌّ أُذُنِيّ**
متعلق بالقحف والأذن .

craniobuccal **قِحْفِيٌّ فَمَوِيّ**
متعلق بالقحف والفم .

craniocaudal **رَأْسِيٌّ ذَنَبِيّ**
هو متعلق بالرأس والذنب .

craniocele **قِيلَة قِحْفِيَّة**
هو قيلة دماغية .
انظر تحت encephalocele .

craniocerebral **قِحْفِيٌّ مُخِّي**
متعلق بالقحف والمخ .

cranioclasis **شَدْخُ القِحْف (الجَنيني)**
عملية كسر رأس الجنين باستعمال المشداخ .

cranioclast **مِشْداخُ القِحْف**
هو أداة جراحية تشبه الملقط ، والتي كانت تستعمل لكسر رأس الجنين تمهيداً لاستخراجه في الولادات المتعسرة .

cranioclasty **حَجُّ القِحْف**
انظر تحت craniotomy .

craniocleidal **قِحْفِيٌّ تَرْقُوِيّ**
متعلق بالقحف والترقوة .

craniocleido-dysostosis **شُذُوذُ التَّعَظُّم التَّرْقُوِيُّ القِحْفِيُّ**

وَرَمٌ قِحْفِيٌّ بُلعومِيّ **craniopharyngioma**

هو ورم ينشأ من بقايا خلوية أصلها من السويقة النخامية أو من جيبة راتكه ، والتي كثيراً ما ترتبط بتزايد الضغط داخل القحف ، وبظهور ترسبات كلسية في محفظة الورم أو في الورم نفسه . كما قد يحدث قصور في الهرمونات النخامية . يسمى أيضاً ورم القناة القحفية البلعومية (Craniopharyngeal duct tumor) ، أو ورم راتكه (Rathke's tumor) ، أو ورم جيبة راتكه (Rathke's pouch tumor) ، أو الكيسة فوق السرج (Suprasellar cyst) ، أو الورم الميناني النخامي (Pituitary adamantinoma) ، أو الورم الأرومي الميناني (Ameloblastoma) .

ماسِكُ القِحْف **craniophore**

هي جهيزة للإمساك بالجمجمة أثناء قياس أبعادها وزواياها .

رَأْبُ القِحْف **cranioplasty**

أية جراحة رأبية تجرى على الجمجمة ؛ وهي التصحيح الجراحي لعيوب في الجمجمة .

بَزْلُ القِحْف **craniopuncture**

هو بزل الرأس .

انظر تحت cephalocentesis

انشِقاقُ القِحْفِ والسيساء **craniorachischisis**

هو شق خلقي في الجمجمة والعمود السيسائي .

انظر تحت cranium bifidum .

انظر تحت spina bifida .

انْشقاقُ القحْفِ والسِّيساءَ التَّامُّ **craniorachischisis-totalis**

قِحْفِيٌّ عَجُزِيٌّ **craniosacral**

1 ـ يتعلق بالقحف والعجز .

2 ـ يتعلق بالعصب اللاودي .

انشِقاقُ القِحْف **cranioschisis**

انظر تحت cranium bifidum .

تَصَلُّبُ القِحْف **cranioscleroses**

هي ثخانة عظام الجمجمة .

أي شيء متعلق بالقحف والفك السفلي .

قيلةٌ سِحائِيَّةٌ قِحْفِيَّة **craniomeningocele**

انظر تحت cranial meningocele .

مِقياسُ القِحْف **craniometer**

أداة للقياس في عملية قياس القحف .

متعلق بقِياسِ القِحْف **craniometric**

متعلق بقياس القحف .

قِياسُ القِحْف **craniometry**

هي المقايسة العلمية لأبعاد عظام الجمجمة والوجه .

مُتَّحِدُ القِحْفين **craniopagus**

هما توأمان ملتصقان برأسيهما ؛ يسمى أيضاً متحد الرأسين (Cephalopagus) .

مُتَّحِدُ الجَبْهَتَين **craniopagus frontalis**

أي أنه متحد القحفين بمعنى أنه يلتصق رأساه عند الجبهتين .

مُتَّحِدُ القَذالَين **craniopagus occipitalis**

أيَ أنه متحد القحفين بمعنى أنه يلتصق رأساه عند المنطقة القذالية .

مُتَّحِدُ القِحْفَين الطُّفَيلِيّ **craniopagus parasiticus**

أي أنهَ متحد القحفين بمعنى أنه يلتصق فيه الرأس الطفيلي بالرأس الأكبر والأقرب إلى الطبيعي .

مُتَّحِدُ العَظْمَين الجِدَارِيَّين **craniopagus parietalis**

أيَ أنهَ متحد القحفين بمعنى أنه يلتصق رأساه عند المنطقة الجدارية .

اعتِلالٌ قِحْفِيّ **craniopathy**

أي مرض يصيب الجمجمة .

اعتلال قحفي استقلابي **metabolic craniopathy**

هو حالة تتسم بآفات تصيب قبة الجمجمة ، والتي تترافق بتبدلات استقلابية متعددة وصداع وبدانة ، واضطرابات بصرية ملحوظة .

قِحْفِيٌّ بُلعومِيّ **craniopharyngeal**

متعلق بالقحف والبلعوم .

craniotome **مِحْجاج**

أداة تستخدم في حج القحف .

craniotomy **حَجُّ القِحْف**

أية عملية تجرى على القحف ، أي بضع أو شق يجرى على القحف .

craniotonoscopy **قَرْعُ القِحْفِ التَّسَمُّعِيُّ**

craniotopography **طُبُجْرافِيَّةُ القِحْف**

هي دراسة العلاقة بين سطح الجمجمة ، ومختلف أجزاء الدماغ الواقع تحتها .

craniotractor **ساحِبَةُ الرَّأس (الجنيني)**

craniotrypesis **نَقْبُ القِحْف**

craniotympanic **قِحْفِيٌّ طَبْلِيّ**

أي شيء متعلق بالقحف والطبل معاً .

craniovertebral **قِحْفِيٌّ فِقْرِيّ**

أي شيء متعلق بالقحف والعمود الفقري معاً .

cranitis **الْتِهابُ القِحْف**

هو التهاب عظام الجمجمة .

cranium TA **قِحْف**

هو الجزء الكبير المستدير العلوي من الجمجمة ، والذي يغلف الدماغ ويتكون من العظام القحفية .

انظر تحت ossa cranii .

cerebral cranium **القِحْفُ المُخِّيُّ**

هَي أجزاء عظام الرأس التي تشترك في تشكيل قبة الجمجمة .

cranium bifidum **قِحْفٌ مَشْقُوق**

هي تكون غير مكتمل لقبة القحف ، مع نماء معيب للدماغ وغالباً ما يتصاحب مع قيلة دماغية ، أو قيلة سحائية . يسمى أيضاً الانشقاق القحفي (Cranioschisis) .

cranium bifidum occultum **قِحْفٌ مَشْقُوقٌ خَفِيّ**

هو فلح خلقي في قبة الجمجمة ، والذي لا يكون مترافقاً بشذوذ في الدماغ أو في السحايا ، ويكتشف ذلك من خلال التصوير الشعاعي .

cranium cerebrale **القِحْفُ المُخِّيُّ**

هَي أجزاء عظام الرأس التي تشترك في تشكيل قبة



Craniorachischisis **انشقاق القحف و السيساء**

cranioscopy **تَنْظيرُ القِحْف**

هو فحص الجمجمة التشخيصي .

craniospinal **قِحْفِيٌّ سِيسائِيّ**

أي شيء متعلق بالقحف والعمود الفقري .

craniostenosis **تَضَيُّقُ القِحْف**

تشوه في الجمجمة ناتج عن تعظم الدروز الباكر ، والذي يؤدي إلى إعاقة نمو الجمجمة ؛ وتعتمد طبيعة التشوه على الدروز المشمولة بهذا المرض .

craniostosis **تَعَظُّمُ الدُّروزِ الباكِر**

انظر تحت craniosynostosis .

craniosynostosis **تَعَظُّمُ الدُّروزِ الباكِر**

هو انغلاق دروز الجمجمة في أوقات سابقة لأوانها ، مما يتسبب في تشوهات ، مثل تسنم الرأس ، أو تزورق الرأس . يسمى أيضاً (Craniostosis) .

craniotabes **تابِسٌ قِحْفِيّ**

هو نقص في تمعدن الجمجمة مع طراوة غير طبيعية في العظم ، وغالباً ما تحدث في العظم القذالي والعظم الجداري على طول الدروز اللامية .

المعالجة بالحَمَّاماتِ المَعْدِنِيَّة **craunotherapy**

هو المُعالجَةُ باستعمال الحَمَّامات المَعْدنيّة .

رَبْطَة عُنُق **cravat**

رباط يربط على الرقبة ، ويعمل بثني قطعة قماش مثلثة من الذروة باتجاه القاعدة ، وتستخدم للزينة غالباً .

حوصلة **craw**

هو معدة الطائر .

كرُو-كرُو **craw-craw**

هو مرض جلدي إفريقي اسم داء كلابية الذنب (Onchocerciasis) في غرب أفريقيا .

تَنَمُّل **crawling**

هو النملان .

انظر تحت formication .

تَجَزُّع **crazing**

هو ظهور شروخ دقيقة على سطوح الأسنان الصناعية أو الطبيعية ، أو البورسلان ، أو قواعد البدلات السنية الراتينية .

البروتينُ المُتفاعِلُ C **C-reactive protein**

1ـ كريم (رهيم) **cream**

2ـ قِشْدَة

1ـ هو الجزء الدهني أو الزيتي من الحليب أو اللبن والذي يحضر منه الزبدة ، أو أي مزيج سائل له نفس القوام .

2ـ في المستحضرات الصيدلانية : مستحلب شبه صلب من نوع زيت في الماء ، أو من نوع ماء في الزيت ، عادة ما يستخدم موضعياً .

الرهيم البارد **cold cream**

مستحضر من ناطف الحوت والشمع الأبيض والزيت المعدني وبورات الصوديوم والماء المقطر ، والذي يستعمل كمطهرٍ موضعي للتهيجات الجلدية الخفيفة وكقاعدة مرهم مستحلب من نوع الماء في الزيت .

رهيم الدينيستيرول **dienestrol cream**

هو خليط من الدينيسترول في أساس قابل للمزج بالماء ؛ والذي يستعمل موضعياً لتأثيره الإستروجيني في علاج التهاب الفرج والمهبل

الجمجمة .

القحْفُ الحَشَوِيّ **cranium viscerale**

هِي أجزاء عظام الرأس التي تشترك في تكوين هيكل الوجه .

انظر تحت facial bones .

القحْفُ الحَشَوِيّ **visceral cranium**

هِي أجزاء عظام الرأس التي تشترك في تكوين هيكل الوجه .

انظر تحت facial bones .

النَّاجِذَة **cranter**

هي الرَّحَى الثَّالثَة (ضرس العقل) .

نهم **crapulent**

ناتج عن الإفراط في الأكل أو الشرب ؛ يسمى أيضاً (Crapulous) .

انظر تحت hyperalimentation .

نهم **crapulous**

شخص أو فرد مفرط في الأكل أو الشرب .

فلْعٌ كبير **craquele**

تدْريبٌ خاطِف **crash training**

لاحقة بمعنى مزيج **crasia**

صيغة لاحقة تشير إلى معنى خليط من عدة عناصر .

جُلْطَة **crassamentum**

انظر تحت clot .

أقنَة **crater**

هي منطقة انخفاض مستديرة محاطة بحافة مرتفعة .

أُقْنَةٌ لِثَوِيَّة **gingival crater**

انخفَاض في اللثة الملاصقة ، والذي يحدث بسبب تلف تنخري في الحليمة .

أقنَويُّ الشَّكل **crateriform**

منخفض أو مجوف بشكل الصحن .

تأقين؛حَفْرُ الأقنَة **craterization**

هي عملية استئصال قطعة أقنوية الشكل من العظم .

عِلمُ الحَمَّاماتِ المَعْدِنِيَّة **craunology**

انظر تحت crenology .

غَضَنٌ قِرْدِيّ **simian crease**

هو غَضَنٌ واحد منفرد معترض في راحة اليد ، والذي يتشكل من التحام التغضنات الراحية الدانية والوحشية ؛ كثيراً ما يشاهد في الاظطرابات الخلقية مثل متلازمة داون ، وفي أحيان نادرة عند الأشخاص الطبيعيين ؛ يسمى أيضاً الخط القردي (Simian line) .

غَضَنُ سِيدْني **Sydney crease**

خط معترَض في راحة اليد .

كريوزوت **creasote**

انظر تحت creosote .

لَحْمِيّ **creatic**

طعام من لحوم الحيوانات .

كِرْياتيناز (إنزيم) **creatinase**

هو إنزيم أميدوهيدرولاز ، والذي يحفز تحول الكرياتين إلى ساركوزين ويوريا .

كِرْياتين **creatine**

هو حمض أميني يتكون من مثيلة حَمْضُ الجوانيدِيُنُوآسيتيك ، والذي يتواجد في أنسجة الفقاريات ، وخاصة في العضلات . ويعتبر الكرياتين المفسفر أحد صيغ التخزين الهامة للفسفات ذي الطاقة العالية ، وهو مصدر طاقة لتقلص العضلات .

كينازُ الكرْياتين **creatine kinase**

هو إنزيمَ منشط بالمغنيزيوم (Mg^{+2}) من صنف الإنزيمات الناقلة ، والذي يحفز فسفرة الكرياتين بواسطة ثلاثي فسفات الأدينوزين (ATP) لتشكيل الفسفوكرياتين . يعمل هذا التفاعل عملياً على تخزين طاقة (ATP) بشكل فسفكرياتين في أنسجة العضلات والدماغ ، ويقوم بالمحافظة على ثبات نسبة (ATP) ؛ العضلات أثناء القيام بالنشاط العضلي . ويتواجد بشكل ثلاثة نظائر إنزيمات لكل منها مكوِّنين يتألفان من وحيدتين M (عضلية) وB (دماغية) . يوجد كينازُ الكرْياتين 1(CK_1) (BB) أساساً في الدماغ ، وكينازُ الكرْياتين 2 (MB) (CK_2) في العضلة القلبية ، وكَيناز الكرْياتين 3

التالي للإياس ، والتهاب الفرج والمهبل الشيوخي والحكة الفرجية الناتجة عن تبدلات ضمورية في ظهارة الفرج ، وعسر الجماع المرافق لضمور الظهارة الفرجية ، وقبيل الجراحة الرأبية الحوضية عند الحالات التالية للإياس .

رهيم الكريات البيض **leukocytic cream**

هي الغلالة الشهباء .

انظر تحت buffy coat .

رهيم موينيهان **Moynihan's cream**

هو خليط يحتوي مقداراً من كربونات البزموت في 1000:1 محلول مائي من يوديد الزئبق كافياً للحصول على معجون كثيف ؛ والذي يستعمل كضماد للجروح .

رهيم الدردي **cream of tartar**

انظر تحت potassium bitratrate .

كريمالين **Creamalin**

علامة تجارية لأحد مستحضرات هيدروكسيد الألمنيوم (Aluminum hydroxide) .

مِقياسُ القِشْدَة **creamometer**

غَضَن **crease**

هو خط أو انخفاض خطي طفيف (في التسميات التشريحية) .

غضن شحمة الأذن **ear lobe crease**

غضن مائل في الأذن ، والذي يصاحب التقدم في السن ، إذا وجد عند الأشخاص الأصغر سناً قد يكون علامة على مرض الشرايين التاجية .

غَضَنُ الثَّنْيَة **flexion crease**

أي من الأخاديد الطبيعية التي تمتد عبر راحة اليد ، والتي توافق مواضع انثناء اليد ، وتفصل بين الطيات النسيجية ، يشاهد وجود غضن واحد معترض (قردي) في شذوذات خلقية معينة .

الغَضَنُ الأَلْوِيُّ الفَخذِيُّ **gluteofemoral crease**

الغَضَنُ الحَرْقَفِيُّ الفَخذِيُّ **iliofemoral crease**

غَضَنُ الرَّاحَة **palmar crease**

هو غضن الثنية .

انظر تحت flexion crease .

(مناورة كريديه) (maneuver)

[طريقة منسوبة للطبيب كارل سيجموند فرانز كريديه (Karl Sigmund Franz Cerde)، وهو طبيب أمرض نساء ألماني] .

انظر تحت method .

اعتِماد **credentialling**

هي الآلية التي تعتمد لتقدير كفاءة العاملين في المجالات المهنية الاختصاصية .

أوراقُ الاعتِماد **credentials**

هي وثائق تثبت كفاءة الشخص ، وأهليته للقيام بالمهام المطلوبة منه .

لجنَةُ أوراقِ الاعْتِماد **credentials commitee**

هي اللجنَة التي تدرس أوراق الاعتماد ، وتقرر أهلية الشخص للمنصب أو المهمة .

زَحْفٌ **creep**

1 ـ هو انسياب بطيء يحدث على مدى فترة من الوقت لمادة تتعرض لإجهاد يفوق حدود مرونتها ، وغالباً ما يرجع ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة ؛ وقد تحدث هذه الظاهرة لمواد الأسنان الموجودة في الفم .

2 ـ الإجهاد المتعلق بالوقت لنسيج ما أو لجسم ما نتيجة تطبيق ضغط ما في مستوى معين والمحافظة عليه في ذلك المستوى .

زاحِف **creeping**

المُشمَرة **cremaster**

هي العضلة المشمرة .

انظر تحت musculuis cremaster .

المُشَمِّرَةُ الدَّاخلِيَّةُ لِهِنْلي **internal cremaster of Henleinternal**

هيَ أَلياف من رسن الخصية ، والمتداخلة في عناصر من الحبل المنوي الجنيني .

مُشَمْرِيّ **cremasteric**

متعلق بالمشمرة .

حَرْقُ الجُثَث **cremation**

حرق أو ترميد أجسام الموتى .

مَحْرَقَةُ الجُثَث **crematorium**

مؤسسة تقوم بحرق الجثث .

في العضلات الهيكلية (CK_3) (MM) . ويفيد التحديد التفريقي لنظائر الإنزيمات في الأغراض التشخيصية الإكلينيكية . اختصاره CK .

فُسْفاتُ الكِرْياتين **creatine phosphate**

انظر phosphocreatine .

فُسْفُوكيناز الكِرْياتين **creatine phosphokinase**

هو الاسم القديم لكيناز الكِرْياتين ، ويرمز له اختصاراً (CPK) .

فَرْطُ الكِرْياتين في الدَّم **creatinemia**

زيادة معدل الكرياتين في الدم .

كِرْياتينيناز (إنزيم) **creatininase**

هو إنزيم أميدوهيدرولاز ، والذي يحفز تحول الكرياتينين إلى كرياتين .

كِرْياتينين **creatinine**

1 ـ الأنهيدريد الحلقي للكرياتين ، والذي يتشكل كناتج نهائي لتحلل الفسفوكرياتين ، ويفرغ في البول ؛ ويستعمل قياس معدلات إفراغه كمؤشر تشخيصي على وظيفة الكلية ، والكتلة العضلية ، ويمكن استخدامه لتبسيط المقايسات الإكلينيكية الأخرى .

2 ـ مستحضر من الكرياتينين ، والذي يستعمل كعامل ذو حجم في عملية التجفيف بالتجميد .

بيلة كِرْياتينيَّة **creatinuria**

هو زيادة تركيز الكرياتين في البول .

تبَرُّزُ الأَلْيافِ العَضَلِيَّة **creatorrhea**

هو وجود ألياف عضلية غير مهضومة في البراز .

تسَمُّمٌ باللَّحْم **creatotoxism**

كرياتوكسيكون **creatoxicon**

هو السُّمُّ اللَّحْميّ .

انظر تحت kreotoxicon .

سُمٌّ لحْمِيّ **creatoxin**

انظر تحت kreotoxin .

دارُ حَضانَةٍ نَهارِيّ **créche**

دار حضانة نهاري للرضع .

طريقة كريديه **Crede's method**

crenate **1ـ مُفرَّض**
2ـ يُفرِضُ
انظر تحت crenated .

crenated **مُفرَّض**
مفرز أو مثلم .

crenation **تفرُّض**
1ـ تكون ثلمة غير طبيعية على حافة كرية دم حمراء .
انظر تحت burr cell .
2 ـ المظهر المتلم للكرية الحمراء ، والناتج عن انكماشها في أعقاب تعليقها في محلول مفرط التوتر . يقابله مصطلح الشواك (Echinosis) ويسمى أيضاً (Crenulation) .

crenilabrin **كرينيلابرين (كيمياء حيوية)**
هو بروتامين يستحصل عليه من نطاف نوع من الأسماك .

crenocyte **كُريَّة مُفرَّضَة**
هي كرية حمراء شائكة .
انظر تحت burr cell .

crenocytosis **وُجودُ الكُريَّاتِ المُفرَّضَة**
وجود الكريات الحمراء الشائكة في الدم ؛ وهو ما يطلق عليه الشواك (Echinosis) .

crenology **عِلمُ المِياهِ المَعْدِنِيَّة**
هو دراسة الخواص والنواحي المتعلقة بالمياه المعدنية .

Crenosoma **الفرضاء**
جنس من الديدان المسودة من الفصيلة الفرضاءية (Crenosomatidae) .

Crenosoma vulpis **الفَرْضاءُ الذِّئْبيَّة**
دودة رئوية تَعدي الكلاب واللواحم الأخرى .

Crenosomatidae **الفرضاءية**
فصيلة من المسودات ، والتي تتضمن أجناس الفرضاء (Crenosoma) ، و -Troglostrongy) lus) ، وتعدي كثير من أنواعها الرئة والشعيبات عند الكلاب والقطط .

crenotherapy **المعالجَة بالمِياهِ المَعْدِنِيَّة**
هو المعالجة باستخدام المياه المعدنية .

cremnocele **فتقٌ مَهْبِليٌّ شُفْريّ**
انظر تحت vaginolabial hernia .

cremnophobia **رُهابُ المَهاوي**

Cremophor **كريموفور**
علامة تجارية لعدد من مركبات البوليوكسيل (Polyoxyl) ، والتي تستعمل كنواقل للشحم لتحضير الأدوية بشكل مستحلبات أو محاليل .

cremor **كريم؛ رَهيم**
انظر تحت cream .

cremor tartari **رهيم الدردي**
انظر potassium bitratrate .

crena TA (pl.crenae) **فُرْضَة (ج:فرَضات)**
ثلمة أو فلج .

crena analis **فُرْضَةُ الشَّرَج ؛النَّاق**
هو الفلج بين الأليتين حيث تقع فتحة الشرج . من مسمياته الأخرى الفلج الشرجي (Anal cleft) ، أو (Clunial cleft) ، أو الفلح الألوي (Gluteal cleft) ، أو (Natal cleft) ، أو فرضة الشرج (Crena ani) ، أو الفرضة بين الأليتين (Crena interglutealis) ، أو الفرضة الألوية (Crena clunium) ، أو التَّلَمُ الألَويّ (Gluteal furrow) ، أو مشق الشرج (Rima ani) ، أو المشق الألوي (Rima clunium) .

crena ani TA **فُرْضَةُ الشَّرَج ؛ النَّاق**
انظر تحت crena analis .

crena clunium **النَّاق**
هو فرضة الفرج .
انظر تحت crena analis .

crena cordis **الفُرْضَةُ القَلْبيَّة**
هو التَّلَم بَيْنَ البُطَيْنَين الأمامِيُّ .
انظر تحت sulcus interventricularis anterior .

crena interglutealis **الفرضة بين الألوية**
هو مصطلح بديل للناق (فرضة الشرج) .
انظر تحت crena analis .

crenae (sing.crena) **فُرْضات (ف:فرْضَة)**
صيغة الجمع من فرضة (Gena) .
انظر تحت crena .

2 ـ فرقعة .
انظر تحت crepitation .
3 ـ خشخشة فرقعية .
انظر تحت crepitantrale .

فَرْقَعَةٌ مَفْصِليَّة **articular crepitus**
انظر تحت joint crepitus .

فَرْقَعَةٌ عَظْمِيَّة **bony crepitus**
هو صوتَ الطقطقة الذي ينتج عن احتكاك قطعتين من عظم مكسور .

فَرْقَعَةُ التَّصَلُّد **crepitus indux**
هو خشخشة فرقعية ، أو صوت طقطقة يسمع في سياق الالتهاب الرئوي في بداية عملية تصلد الرئة .

فَرْقَعَةُ الإِبْلاَل **crepitus redux**
هي فرقَعة تسمع في طور الإبلال من الالتهاب الرئوي .

فَرْقَعَةٌ رَحِمية **crepitus uteri**

فَرْقَعَةٌ كاذِبَة **false crepitus**
انظر تحتَ joint crepitus .

فَرْقَعَةٌ مَفْصَليَّة **joint crepitus**
هو شعورَ الحزيز الناتج عن احتكاك الأسطح الزليلية الجافة للمفاصل ؛ تسمى أيضاً (Articular crepitus) .

فَرْقَعَةٌ حَريريَّة **silken crepitus**
هو شعورَ يشبه الشعور المتولد عن احتكاك قطعتين من الحرير بين الأصابع ، والذي يحس به المريض عند تحريك مفصل مصاب بالموه المفصلي .

غَلَسِيّ **crepuscular**
(=twilight)
1 ـ يشير إلى الغلس ، والغلس هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح وقد تشير هنا للفترة بين النوم واليقظة ، كما في حالة غلسية .
2 ـ ينشط أثناء الغلس ، كما هو حال بعض الحيوانات مثل الخفاش .

هِلال **crescent**
1 ـ شكله يشبه القمر حديث الظهور .

اللَّحْمَاء **Crenothrix**
جِنْسٌ مِنَ الجَراثيم .

تَفَرُّض **crenulation**
انظر تحت crenation .

أَكْلُ اللُّحوم **creophagism**
انظر تحت carnivore .

أَكْلُ اللُّحوم **creophagy**
انظر تحت carnivore .

كريوزول **creosol**
هو سائل زيتي عديم اللون ، يمثل الأثير الميثيلي لميثيل الكاتيكول ، أحد مكونات الكريوزوت الفعالة .

كريوزوت **creosote**
سائل كاسر (انكساري) زيتي لونه مائل إلى الصفرة ، يتكون من مزيج من الفينولات المستحصلة من تقطير قار الخشب ، وبخاصة خشب الزان . كان يستعمل في السابق كمقشع ومطهر خارجي ، أما الآن فيستعمل بشكل أساسي كمادة لحفظ الأخشاب ، ويستعمل في طب الأسنان كمُطَهِّرٌ وَمُضادٌّ لاحْتقان لُبِّ السِّن . وقد تسبب الأخشاب المعالَجَة حَديثاً بالكريوزوت تهيجاً جلدياً عند الحيوانات ، أو تقرحاً في المريء إذا قامت بمضغه .

كريُوتوكسين؛ سُمُّ اللَّحْم **creotoxin**
انظر تحت kreotoxin .

التَّسَمُّمُ اللَّحْمِيُّ **creotoxism**
انظر تحت kreotoxism .

فَرْقَعِيّ **crepitant**
يصدر صوت خشخشة أو طقطقة .

فَرْقَعَة **crepitation**
1 ـ صوت يشبه الصوت الذي ينبعث عند إلقاء ملح في النار .
انظر تحت crepitant rale .
2 ـ الصوت الذي يصدر عند احتكاك نهايات العظم المكسور .

فَرْقَعَة **crepitus**
1 ـ إطلاق الأرياح من الأمعاء .

اللساني للفك السفلي ، والجزء المجاور من قاع الفم .

crescentic **هِلالِيّ**

أي بنية يماثل شكلها الهلال .

cresol **كريزول**

هو سائل يستحصل من قطران الفحم يحتوي على ما لا يزيد عن (5٪) فينول ، يتراوح ما بين أن يكون عديم اللون إلى الأصفر أو البني أو الوردي ، وهو سام للبشر ، ولعديد من الحيوانات الأخرى ؛ وهو مزيج آكال من ثلاثة أشكال متناظرة وهو مطهر أكثر قوة من الفينول . واستخدامه الرئيسي هو في تعقيم الأدوات والأطباق والأوعية والأغراض الأخرى غير الحية . يسمى أيضاً حمض الكريسيليك (Cresylic acid) أو ثلاثي الكريزول .

cresolphthalein **كريزول فثالئين**

هو مُشْعِرٌ حَمْضِيٌّ قاعديّ يكون عديم اللون في درجة باهاء 7.2 ، ويَصْبح لونه أحمر في درجة باهاء 8.8 .

cresomania **هَوَسُ الثَّراء**

هو هوس مرضي بامتلاك ثروة ضخمة .

cresorcin **كريزورسين**

مشتق بلوري من الكريزول (Cresol) .

cresorcinol **كريزورسين**

هو دواء مرخ للعضلات .
انظر تحت cresorcin .

cresoxydiol **كريزوكسي ديول**

هو الميفينيزين (دواء مرخ للعضلات الهيكلية) .
انظر تحت mephenesin .

cresoxypropanediol **كريزوكسي بروبان ديول**

هو الميفينيزين .
انظر تحت mephenesin .

crest **عُرْف (ج: أعْراف)**

بروز ، أو بنية بارزة ، أو حرف ، وبخاصة ما يبرز من عظم أو حافة .
انظر تحت crista .
انظر تحت ridge .

2 ـ بنية بشكل هلال .

articular crescent **هلالٌ مَفْصِليّ**

غضروف لَيفي مفصلي هلالي الشكل .

crescents of Giannuzzi **أهِلَّةُ جانُوتسي**

هي رقع هلالية الشكل من الخلايا المصلية ، والتي تحيط بالنبيبات المخاطية في الغدد المصلية المخاطية ، وتتكون من الخلايا الألبومينية الأكثر عدداً مدفوعة إلى النهايات العمياء من الأجزاء الانتهائية ، أو إلى تجيب خارجي كيسي . تسمى أيضاً أهلَّةُ هايدنْهاين (Demilunes of Heidenhain) ، أو أجسام جانوتسي (Giannuzzi's bodies) ، أو خلايا جانوتسي (Giannuzzi's cells) ، أو أهلة جانوتسي (Giannuzzi's demilunes) ، أو (Crescent cells) ، أو الخلايا الهلالية (Demilune cells) أو الخلايا الهامشية (Marginal cells) أو الأجسام الهلالية (Semilunar bodies) .

crescents of spinal cord **أهِلَّةُ النُّخاع**

epithelial crescent **هلالٌ ظهاريّ**

هي كتلة من الخلايا ذات شكل هلالي إلى حد ما تقع بين اللمة الكبيبية ، وباطن محفظة بومان في التهاب الكلية الكبيبي .

gray crescent **هلالٌ سِنْجابيّ**

هي منطقة تشاهد في بعض بيوض البرمائيات ينحسر منها الصباغ ؛ وتقع بالاتجاه الظهراني والمقابل لنقطة دخول النطفة ، وتشكل أول علامة ظاهرة على المحور الظهراني البطناني .

malarial crescent **هلالٌ مَلارِيّ**

عرسيات المتصورة المنجلية ؛ وقد تكون مذكرة (عرسية مكروية) ، أو مؤنثة (عرسية كبروية) . تسمى أيضاً الأجسام السوطية (Flagellated bodies) .

myopic crescent **هلالٌ حَسَرِيّ**

هي عنبة هلالية خلفية تشاهد في قاع العين في الحسر .

sublingual crescent **الهلالُ تَحْتَ اللِّساني**

هي المنطقة هلالية الشكل المتشكلة من الجدار

acoustic crest **العُرْفُ السَّمْعِيّ**

هو العُرْفُ الأَمْبوليُّ .

انظر تحت crista ampullaris .

acousticofacial crest **العُرْفُ السَّمْعِيُّ الوَجْهِيُّ**

هو كتلة الخَلايا الجنينَية التي تنمو منها عقد الأعصاب القحفية السابع والثامن .

alveolar crest **العُرْفُ السِّنْخِيُّ**

هو هامش العَظم المكتنز الواقع على الحافة التاجية للسنخ السني .

ampullar crest **العُرْفُ الأَمْبوليُّ**

انظر تحت crista ampullaris .

ampullary crest **العُرْفُ الأَمْبوليُّ**

انظر تحت crista ampullaris .

anterior crest of fibula **العُرْفُ الأَماميُّ للشَّظِيَّة**

هي الحافةُ الأَماميَّةُ لِلشَّظِيَّة .

انظر تحت margo anterior fibulae .

anterior crest of tibia **العُرْفُ الأَماميُّ للظُّنْبوب**

هي الحَافَةُ الأَماميَّةُ للظُّنْبُوب .

انظر تحت margo anterior tibiae .

anterior intertrochanteric crest **العُرْفُ الأَماميُّ بينَ المُدْوَرَين**

الخَطُّ بَينَ المُدْوَرَين .

انظر تحت linea intertrochanterica .

anterior lacrimal crest **العُرْفُ الدَّمْعِيُّ الأَماميُّ**

انظر تحت crista lacrimalis anterior .

anterior obturator crest **عُرْفُ الحُدَيْبَةِ المُسدَّةِ الأَمامَيُّ**

انظر تحت crista obturatoria .

arcuate crest of arytenoid cartilage **العُرْفُ المُقَوَّسُ للغُضْروف الطِّرْجهاليُّ**

انظر تحت crista arcuata cartilaginis arytenoideae .

articular sacral crest **العُرْفُ المَفْصليُّ للعَجُز**

هو العُرْفُ الإِنْسِي للعَجُز .

انظر تحت crista sacralis medialis .

basilar crest **العُرْفُ القاعديُّ**

basilar crest of cochlear duct **العرف القاعَدَي للقناة القوقعية**

انظر تحت crista basilaris ductus cochlearis .

basilar crest of occipital bone **العُرْفُ القاعديُّ للعَظْمِ القَذَالِي**

هي الحَديبة البَلعومية .

انظر تحت tuberculum pharyngeum .

buccinator crest **عُرْفُ المُبَوِّقَة**


انظر تحت crista buccinatoria .

cerebral crests of cranial bone **الأَعْرافُ المُخِّيَّةُ للقحْف**

هيَ الملاحم المخية لعظام القحف .

انظر تحت juga cerebralia ossium cranii .

انظر تحت jugum .



Myopic crescent الهلال الحسري

conchal crest of body of maxilla **العُرْفُ المَحاريُّ للفَكِّ العُلْوِيّ**

انظر تحت crista conchalis corporis maxillae .

conchal crest of palatine bone **العُرْفُ المَحاريُّ لعَظْمِ الحَنَك**

انظر تحت crista conchalis ossis palatine .

crest of cochlear window **عُرْفُ نافذَةَ القَوقَعَة**

انظر تحت crista fenestrae cochleae .

crest of greater tubercle of humerus **عُرْفُ الأَحْدوبَةِ الكَبيرَةِ لِعَظْمِ العَضُد**

انظر تحت crista tuberculi majoris .

crest of hypotrochanteric fossa **عُرْفُ الحُفْرَةِ تَحْتَ المُدَوَّر**

هي الأَحْدوبَةُ الأَلَوِيَّةُ الفَخِذِيَّة .

انظر تحت tuberositas glutea femoris .

crest of ilium **العُرْفُ الحَرْقَفِيُّ**

انظر تحت crista iliaca .

crest of larger tubercle **عُرْفُ الحُدَيْبَةِ الكَبيرَة**

انظر تحت crista tuberculi majoris .

crest of lesser tubercle **عُرْفُ الحُدَيْبَةِ الصُّغيرَة**

انظر تحت crista tuberculi minoris

crest of little head of rib **عُرْفُ الرَّأسِ الصَّغيرِ للضِّلْع**

انظر تحت crista capitis costae .

crest of matrix of nail **عُرْفُ مَطْرِسِ الظُّفُر**

انظر تحت crista matricis unguis .

crest of neck of rib **عُرْفُ عُنُقِ الضِّلْع**

انظر تحت crista colli costae .

crest of palatine bone **عُرْفُ العَظْمِ الحَنَكي**

انظر تحت crista palatine .

crest of pubis **عُرْفُ العانَة**

انظر تحت crista pubica .

crest of ridge **عُرْفُ الحَرْف**

crest of smaller tubercle **عُرْفُ الحُدَيْبَةِ الصُّغيرَة**

انظر تحت crista tuberculi minoris .

crest of spinous processus of sacrum **عُرْفُ النّاتِىءِ الشَّوكِيِّ للعَجُز**

هو عرف العجز الناصف .

انظر تحت crista sarcalis mediana .

crest of supinator muscle **عُرْفُ العَضَلَةِ الباسِطَة**

انظر تحت crista musculi supinatoris .

crest of vestibule **عُرْفُ الدِّهْليز**

انظر تحت crista vestibule .

cross crest **العُرْفُ الصَّليبيُّ**

deltoid crest **العُرْفُ الدّالِّيُّ**

هي الأَحْدوبَةُ الدّالِّيَّةُ للعَضُد .

انظر تحت tuberositas deltoidea humeri .

dental crest **عُرْفٌ سِنِّيّ**

هي حافة الفك العلوي التي تمر بمحاذاة النواتىء السنخية لعظام الفك العلوي الجنينية .

dermal crest **عُرْفٌ جِلْدِيّ**

ethmoid crest of maxilla **العُرْفُ الغِرْبالِيُّ للفَكِّ العُلْوِيّ**

انظر تحت crista ethmoidalis maxillae .

ethmoid crest of palatine bone **العُرْفُ الغِرْبالِيُّ لِعَظْمِ الحَنَك**

انظر تحت crista ethmoidalis ossis palatine .

external frontal crest **العُرْفُ الجَبْهِيُّ الظّاهِر**

هو الخَطُّ الصُّدْغِيُّ للعَظْمِ الجَبْهِيّ .

انظر تحت linea temporalis ossis frontalis .

external mental crest **العُرْفُ الذَّقَنِيُّ الظّاهِر**

هي النّاشِزَةُ الذَّقَنِيَّة .

انظر تحت protuberantia mentalis .

external occipital crest **العُرْفُ القَذالِيُّ الظّاهِر**

انظر تحت crista occipitalis externa .

external sacral crest **العُرْفُ الظّاهِرُ للعَجُز**

هو العُرْفُ الوَحشي للعَجُز .

انظر تحت crista sacralis lateralis .

female urethral crest **عُرْفُ الإحْليلِ الأُنْثَوي**

انظر تحت crista urethralis .

femoral crest **العُرْفُ الفَخِذِيّ**

هو الخَطُّ الخَشِنُ لِعَظْمِ الفَخِذ .

انظر تحت linea aspera femoris .

fimbriated crest **العُرْفُ المُخَمَّلي**

هي الثَّنِيَّةُ المُخَمَّلَة .

انظر تحت plica fimbriata .

frontal crest **العُرْفُ الجَبْهِيُّ**

هو العُرْفُ فَوقَ البُطَين .
انظر تحت crista supraventricularis .

inguinal crest **العُرُفُ الأُرْبيُّ**
هو تبارز عَلى جدار الجسم الأربي عند الجنين ، والذي يشارك في تشكيل رسن الخصية .

intermediate sacral crest **العُرُفُ العَجُزيُّ الأوسَط**
هو العُرْفُ الإنسي للعَجُز .
انظر تحت crista sacralis medialis .

internal frontal crest **العُرُفُ الجَبْهِيُّ البَاطن**
هو العُرُفُ الجَبْهيّ .
انظر تحت crista frontalis .

internal occipital crest **العُرُفُ القَذاليُّ البَاطن**
انظر تحت crista occipitalis interna .

interosseous crest of fibula **العُرُفُ الشَّظَويُّ بَينَ العظام**
هو الحَافَةُ الشَّظَويَّةُ بَينَ العظام .
انظر تحت margo interosseus fibulae .

interosseous crest of radius **العُرُفُ الكُعْبُريُّ بَينَ العظام**
هو الحَافَةُ الكُعْبُريَّةُ بَينَ العظام .
انظر تحت margo interosseus radii .

interosseous crest of tibia **العُرُفُ الظُّنْبوبيُّ بينَ العظام**
هو الحَافَةُ الظُّنْبوبيَّةُ بَينَ العظام .
انظر تحت margo interosseus tibiae .

interosseous crest of ulna **العُرُفُ الزَّنْديُّ بَينَ العظامَ**
هو الحَافَةُ الزَّنْديَّةُ بَينَ العظام .
انظر تحت margo interosseus ulnae .

intertrochanteric crest **العُرُفُ بَينَ المَدْوَرَين**
انظر تحت crista intertrochanterica .

jugular crest of greater wing of sphenoid bone **العُرُفُ الوداجيُّ للجَناحِ الكَبِيرِ للعَظْمِ الوَتَديّ**
هي الحَافَةُ الوَجْنيَّةُ للجَناحِ الكَبير .
انظر تحت margo zygomaticus alae majoris .

انظر تحت crista frontalis .

ganglionic crest **العُرْفُ العُقْديّ (في الجنين)**

gingival crest **العُرْفُ اللِّثَويّ**
هي الحافة التاجية للثة .

glandular crest of larynx **العُرْفُ الغُدِّيُّ للحَنْجَرَة**
هو الرِّباطُ الدِّهْليزيُّ .
انظر تحت ligamentum vestibulare .

gluteal crest **العُرْفُ الأَلْويّ**
هو الأُحْدوبَةُ الأَلْويَّةُ الفَخذيَّة .
انظر تحت tuberositas glutea femoris .

iliac crest **العرف الحرقفي**
انظر تحت crista iliaca .

iliopectineal crest of iliac bone **العُرْفُ الحَرْقَفيُّ العانيُّ للعَظْمِ الحَرْقَفيّ**
هو الخَطُّ المُقَوَّسُ للعَظْمِ الحَرْقَفي .
انظر تحت linea arcuata ossis ilii .

iliopectineal crest of pelvis **العُرْفُ الحَرْقَفيُّ العانيُّ للحَوَض**
هو الخَطُّ الانْتِهائيُّ للحَوَض .
انظر تحت linea terminales pelvis .

iliopectineal crest of pubis **العُرْفُ الحَرْقَفيُّ للعَانَة**
هو البارزَةُ الحَرْقَفيَّةُ العانيَّة .
انظر تحت eminentia iliopubica .

inferior turbinal crest of maxilla **العُرْفُ المَحاريُّ السُّفْليُّ للفَكِّ العُلْويِّ**
هو العُرْفُ المَحاريُّ للفَكِّ العُلْويِّ .
انظر تحت crista conchalis maxillae .

inferior turbinal crest of palatine bone **العُرْفُ المَحاريُّ السُّفْليُّ لعَظْمِ الحَنَك**
هو العُرْفُ الغِرْباليُّ لعظم الحنك .
انظر تحت crista ethmoidalis ossis palatini

infratemporal crest **العُرْفُ تَحْتَ الصُّدْغ**
انظر تحت crista infratemporalis .

infundibuloventri - cular crest **العُرْفُ القِمْعيُّ البُطَينيّ**

lateral crest of fibula **العُرْفُ الوَحْشِيُّ للشَّظِيَّة**
هي الحافةُ الخَلْفيَّةُ للشَّظيَّة .
انظر تحت margo posterior fibulae .

lateral sacral crest **العُرْفُ الوَحْشِيُّ للعَجُز**
انظر تحت crista sacralis lateralis .

lateral supracondylar crest of humerus **العُرْفُ فَوقَ اللُّقْمَةِ الوَحْشيَّة للعَضُد**
انظر تحت crista supraepicondylaris lateralis humeri .

lateral supraepicondylar crest of humerus **العُرْفُ فَوقَ اللُّقيمَة الوَحْشيَة للعَضُد**
انظر تحت crista supraepicondylaris lateralis humeri .

malar crest of greater wing of sphenoid bones **العُرْفُ الوَجْنِيُّ للجَناح الكَبير للعَظْم الوَتَديّ**
هي الحافةُ الوَجْنيَّةُ للجَناح الكَبير .
انظر تحت margo zygomaticus alae majoris .

male urethral crest **عُرْفُ الإحْليل الذَّكَري**
انظر تحت crista urethralis .

medial crest of fibula **العُرْفُ الإنْسيُّ للشَّظيَّة**
انظر تحت crista medialis fibulae .

medial sacral crest **العُرْفُ الإنْسيُّ للعَجُز**
انظر تحت crista sacralis medialis .

median sacral crest **العُرْفُ الإنْسيُّ للعَجُز**
انظر تحت crista sacralis medialis .

medial supracondylar crest of humerus **العُرْفُ فَوقَ اللُّقْمَة الإنْسيَّة للعَضُد**
انظر تحت crista supraepicondylaris medialis humeri .

medial supraepicondylar crest of humerus **العُرْفُ فَوقَ اللُّقيمَة الإنْسيَّة للعَضُد**
انظر تحت crista supraepicondylaris medialis humeri .

mitochondrial crests **أعْرافُ المُتَقَدِّرات**
هي طيات داخلية معقدة في تجويف المتقدرة ، والتي تنشأ من غشاء خارج التجويف .

nasal crest of maxilla **العُرْفُ الأنْفيُّ للفَكِّ العُلْوِيّ**
انظر تحت crista nasalis maxillae .

nasal crest of palatine bone **العُرْفُ الأنْفيُّ لعَظْم الحَنَك**
انظر تحت crista nasalis ossis palatine .

nasopalatine crest **العُرْفُ الحَنكيُّ الأنْفيّ**
هو العُرْفُ الحَنَكيُّ .
انظر تحت palatine crest .

neural crest **العُرْفُ العَصَبيُّ**
هو شريط خَلَوي يقع إلى الظهراني الوحشي من الأنبوب العصبي ، والذي تنشأ منه العقد القحفية والنخاعية وبنيات عديدة أخرى .

orbital crest **عُرْفُ الحَجاج**
هو الحافة فوق الحجاجية للعظم الجبهي .
انظر تحت margo supraorbitalis ossis frontalis .

orbitonasal crest **العُرْفُ الحَجاجيُّ الأنْفيُّ**

palatine crest **العُرْفُ الحَنَكيُّ**
انظر تحت crista palatine .

pectineal crest of femur **العُرْفُ المِشْطيُّ للفَخِذ**
هو الخَطُّ المِشْطيُّ للفَخذي .
انظر تحت linea pectinea femoris .

pharyngeal crest of occipital bone **العُرْفُ البُلْعوميُّ للعَظْم القذاليّ**
هي الحَديبَة البَلعومية .
انظر تحت tuberculum pharyngeum .

posterior lacrimal crest **العُرْفُ الدَّمْعيُّ الخَلْفيُّ**
انظر تحت crista lacrimalis posterior .

pubic crest **عُرْفُ العانَة**

هو العُرْفُ الغرْباليُّ لعظم الحنك .
انظر تحت crista ethmoidalis ossis palatini .

عُرْفُ العَضَلَة الباسطَة **supinator crest**
انظر تحت crista musculi supinatoris .

العُرْفُ فَوقَ الخُشَّاء **supramastoid crest**
انظر تحت crista supramastoidea .

العُرْفُ فَوقَ الصِّماخ **suprameatal crest**
هو العُرْفُ فَوقَ الخُشَّاء .
انظر تحت supramastoid crest .

العُرْفُ فَوقَ البُطَين **supraventricular crest**
هو العُرْفُ فَوقَ البُطَين .
انظر تحت crista supraventricularis .

العُرْفُ الصُّدْغيُّ للعَظْم الجَبْهي **temporal crest of frontal bone**
هو الخَطُّ الصُّدْغيُّ للعظم الجَبْهيُّ .
انظر تحت linea temporalis frontalis .

العُرْفُ الانْتهائيُّ للأُذَين الأيْمَن **terminal crest of right atrium**
انظر تحت crista terminalis atrii dextri .

العُرْفُ الظُّنْبوبيُّ **tibial crest**
هي الحَافَةُ الأَماميَّةُ للظُّنْبُوب .
انظر تحت margo anterior tibiae .

العُرْفُ المُسْتَعْرِضُ للصِّماخِ البَاطِن للأُذُن **transverse crest of internal auditory meatus**
انظر تحت crista transversa meati acustici in-terni .

العُرْفُ المُثَلَّثيّ (أسنان) **triangular crest**

عُرْفُ الثُّلاثَيّ التَّوائم **trigeminal crest**
هي كتلة الخلايا الجنينية التي تنمو منها عقدة العصب ثلاثي التوائم .

العُرْفُ الزَّنْديّ **ulnar crest**
هي الحافةُ الزَّنْديَّةُ بَينَ العظام .
انظر تحت margo interosseus ulnae .

العُرْفُ الوَجْنيُّ للجَنَاح الكَبير للعَظْم الوتَدي **zygomatic crest of greater wing of sphenoid bone**

عرف الكعبرة **radial crest**
هي الحافَةُ بَينَ العَظْميَّة للكُعْبُرَة .
انظر تحت margo interosseus radii TA .

العُرْفُ الخَشِنُ لعَظْم اللفَخذ **rough crest of femur**
هو الخَطُّ الخَشَنُ لعَظْم الفَخْذ .
انظر تحت linea aspera femoris .

العُرْفُ العَجُزي **sacral crest**
هو العُرْفُ الإنْسيُّ للعَجُز .
انظر تحت crista sacralis mediana .

العُرْفُ المَنَوي **seminal crest**
هي الأُكَيمَةُ المَنويَّة .
انظر تحت colliculus seminalis .

عُرْفُ الوتَدي **sphenoidal crest**
انظر تحت crista sphenoidalis .

عُرْفُ راوبه الشَّوكيّ **spinal crest of Rauber**
النَّاتئُ الشَّوكيُّ الفَقَريّ .
انظَر تحت processus spinosus vertebrarum .

العرف الحلزوني **spiral crest**
هي الشَّفَةُ الدِّهْليزيَّةُ لحُوفِ الصَّفيحَة الحَلَزُونيَّة .
انظر تحت labium limbi vestibulare laminae spiralis .

العرف الحلزوني للقوقعة **spiral crest of cochlea**
هو العرف القاعدي للقناة القوقعية .
انظر تحت crista basilaris ductus cochlearis .

العرف الحلزوني للقناة القوقعية **spiral crest of cochlear duct**
هو العرف القاعدي للقناة القوقعية .
انظر تحت crista basilaris ductus cochlearis .

العُرْفُ المَحاريُّ العُلْويُّ للفك العلوي **superior turbinal crest of maxilla**
هو العُرْفُ الغرْباليُّ للفَكِّ العُلْويِّ .
انظر تحت crista ethmoidalis maxillae .

العُرْفُ المَحاريُّ العُلْويُّ لعَظْم الحَنَك **superior turbinal crest of palatine bone**

هي الحافَةُ الوَجْنيَّةُ للجَناح الكَبير .
انظر تحت margo zygomatica alae majoris .

سلفات الكريستوميسين — **crestomycin sulfate**

هي سلفات بَارُومُومِيسين (Paromomycin sulfate) وهو مضاد حيوي .

زرقة الكريزيل — **cresyl blue**

دواء معقم للأدوات .

بَنَفْسَجيَّة الكريزيل — **cresyl violet**

ملوِّن .

حمض الكريزيليك — **cresylic acid**

هو الكريزول .
انظر تحت cresol .

طباشير — **creta (=chalk)**

هو الطباشير أو الحوار .

فدْم — **cretin**

شخص مصاب بالفدامة (Certinism) .

فدامَة — **cretinism**

هي حالة مزمنة تحدث نتيجة قصور درقي وخيم ؛ وتبدأ اعراضها بالظهور مع نهاية مرحلة الطفولة ، وتتضمن توقف النمو البدني (القذامة) ، والتخلف العقلي ، وحثل العظام والأجزاء الطرية (اللينة) ، ونقص الاستقلاب الأساسي .

فَدامَةُ انْعدام الدَّرَقيَّة — **athyreotic cretinism**

هي فدامَة نَاتجة عَن عدم تنسج الدرق أو تخرب الدرق عند الجنين أثناء وجوده في الرحم ؛ تسمى أيضاً فَدامَةٌ فَرْدانيَّةٌ لاَدُراقيَّة (Sporadic nongoitrous cretinism) .

فَدامَةُ انْعدام الدَّرَقيَّة — **athyrotic cretinism**

انظر تحت athyreotic cretinism .

فَدامَةٌ مُتَوَطِّنَة — **endemic cretinism**

هي شكل من أشكال الفدامة ، والذي يشاهد في المناطق التي ينتشر فيها الدراق المتوطن ؛ والنوعان الرئيسيان لهذا الشكل هما الفدامة العصبية (Neurolog) والفدامة الوذمية المخاطية .

فَدامَةٌ دُراقيَّة — **goitrous cretinism**

فدامة وذمية مخاطية — **myxedematous cretinism**

هي نوع غير شائع من الفدامة المتوطنة ، والذي يترافق بتأخر في نمو العظام الطويلة ووذمة مخاطية ودراق أحياناً ، إلا أن المشاكل العصبية المرافقة له تكون أقل مما هو عليه الحال في الفدامة العصبية .

فدامة عصبية — **neurologi cretinism**

هي الشكل المعتاد من الفدامة المتوطنة ، والذي يتسم بتأخر نمو العظام الطويلة وشكوى عصبية مثل البكامة والتأخر العقلي والشناج والدراق في بعض الأحيان ، إلا أنه لا يترافق بوذمة مخاطية . المصطلح المقابل لهذا المصطلح هو فدامة وذمية مخاطية (Myxedematous cretinism) .

فَدامَةٌ عَفْوِيَّةٌ — **spontaneous cretinism**

هي فَدامَةٌ فَرْدانيَّة .
انظر تحت sporadic cretinism .

فَدامَةٌ فَرْدانيَّة — **sporadic cretinism**

هي فدامة تصيب شخصاً لا ينحدر من سلالة من المصابين بها ، ولا يقطن منطقة يكون الدراق متوطناً فيها .

فَدامَةٌ فَرْدانيَّةٌ دُراقيَّة — **sporadic goitrous cretinism**

هي حالة مرتبطة بمحددات وراثية ، والتي تترافق فيها ضخامة الغدة الدرقية مع عوز التخليق الحيوي ، وبالتالي نقص المخزون من هرمون الدرق في الدوران الدموي .

فَدامَةٌ فَرْدانيَّةٌ لادُراقيَّة — **sporadic nongoitrous cretinism**

هي فَدَامَةُ انْعدام الدَّرَقيَّة .
انظر تحت athyreotic cretinism .

فداميّ — **cretinistic**

صفة للشخص المصاب بالفدامة .

1ـ شُبيهُ الفدامَة — **cretinoid**
2ـ شُبيهُ الفدْم

1ـ شبيه بالشخص المصاب بالفدامة .

مَهْدُ جاكسون (أسنان) **Jackson crib**

انظر تحت appliance .

مَهْدٌ لِسانيّ **tongue crib**

المعلف **cribbing**

عادة عصبية عند بعض الخيول ، والتي تتمثل في الإمساك بالمذود (معلف الدابة) بواسطة الأسنان الأمامية مع تقوس الرقبة والإتيان بحركات في الرأس غير طبيعية ، وابتلاع كميات من الهواء ؛ يسمى أيضاً (Crib-biting) أو بلع الهواء (Windsucking) .

عض المهد **crib-biting**

انظر تحت cribbing .

مَصافِي (ف:مِصفاة) **cribra (sing.cribrum)**

صيغة الجمع من مصفاة (Cribrum) .

مِصفَويّ **cribral**

متعلق بالمصفاة أو بنية بشكل الغربال .

مِصفَويّ **cribrate**

صفة تطلق على أي شيء مُثقب كما الحال بالغربال .

1ـ غَرْبَلَة **cribration**

2ـ تثقُب

1ـ صفة كون الشيء مثقباً .

2ـ عملية أو فعل الغربلة أو التمرير من خلال الغربال ، كما في تحضير الأدوية .

مِصفَويُّ الشَكل **cribriform**

تطلق على ما هو مثقب بفتحات صغيرة كالغربال .

الصَّفيحَةُ المِصفَوِيَّة **cribriform plate**

هو الصَّفيحَةُ المَصْفَوِيَّةُ للعَظْمِ الغِرْبالِيّ .

انظر تحت lamina cribrosa ossis ethmoid-alis .

مِصفَويُّ الشَكل **cribrose**

ذو شكل يشبه المصفاة .

مِصفَاة (ج:مَصافٍ) **cribrum (pl.cribra)**

أي بنية بشكل الغربال .

الثُّقوبُ المِصفَوِيَّةُ بحسب َويلكر **cribra orbitalia of Welcker**

2ـ شبيه بالفدامة .

فدْم **cretinous**

مصاب بالفدامة .

داء كروتزفلد ـ ياكوب **Creutzfeldt-Jakob disease**

[داء منسوب للطبيب هانز جيرهارد كروتزفلد (Hans Gerhard Creutzfeldt) ، وهو طبيب أمراض نفسية ألماني المولد ،عاش ما بين 1885-1964 ؛ والطبيب ألفونسو ماريا ياكوب (Alfons Maria Jakob) ، وهو طبيب أمراض نفسية ألماني المولد ، عاش مابين 1884-1931] ، وهو الاعتلال الدماغي الفيروسي الإسفنجي .

انظر تحت disease .

فلع **crevice**

لفظ يطلق على الشق الطولي .

فَلْعٌ لِثَوِيّ **gingival crevice**

هي تَرَفة (مسقاة يشرب بها) ضحلة أو شق ضحل يحيط بتاج السن التشريحي ؛ ويعتبر بعض الأطباء أن الفلع اللثوي هو نفسه التَلَمٌ اللثَويّ فيما يعتبره أطباء آخرون كياناً مختلفاً ومَتَميزاً . يسمى أيضاً المسافة تحت اللثوية (Subgingival space) .

فلعِيّ **crevicular**

مصطلح للدلالة على الفلع ، وبخاصة الفلع اللثوي .

المُواء(مُتلازمة) **cri du chat (syndrome)**

هي متلازمة مرضية يعاني المريض فيها تخلف عقلي مع صوت يشبه مواء القطة .

انظر تحت syndrome .

مَهْد **crib**

1ـ أية بنية شبيهة بالرف أو المهد .

2ـ إرساء نزوع من طبيقة تقويم الأسنان .

3ـ طبيقة تقويمية تستخدم في مكافحة العادات السيئة .

مَهْدُ آدم (أسنان) **Adam crib**

مَهْدٌ سريري إكلينيكي **clinical crib**

مهد يوضع فيه الأطفال للملاحظة .

والطرجهالية ، أو يربط بينها .

حِلقِيّ مَريئِيّ **cricoesophageal**

يتعلق بالغضروف الحلقي والمريء .

حِلقِيّ لامِيّ **cricohyoid**

يتعلق بكل من الغضروف الحلقي والعظم اللامي .

حِلقِيّ **cricoid**

1 ـ يشبه الخاتم ، بشكل الخاتم .

2 ـ الغضروف الحلقي .

انظر تحت cricoid carilage .

قطعُ الغُضْروفِ الحلَقِيّ **cricoidectomy**

استئصال الغضروف الحلقي .

وَجعُ الغُضْروفِ الحلقِي **cricoidynia**

ألم في الغضروف الحلقي .

حِلقِيّ بُلعومِيّ **cricopharyngeal**

يتعلق بكل من الغضروف الحلقي والبلعوم .

حِلقِيّ دَرَقِيّ **cricothyroid**

يتعلق بكل من الغضاريف الحلقية والدرقية ، أو يصل بينها .

بَضْعُ الغِشاءِ الحلَقِي والدَّرَقِي **cricothyroidotomy**

انظر تحت cricothyrotomy .

cricothyrotomy

1 ـ بَضْعُ الحلَقِي والدَّرَقِي

2 ـ بَضْعُ الغِشاءِ الحلَقِي والدَّرَقِي

هو بضع للرغامى ، والذي يشتمل على شق الجلد والغشاء الحلقي الدرقي لتأمين مسلك هوائي واضح ، وذلك في معالجة انسدادالمجرى التنفسي العلوي الإسعافية . يسمى أيضاً بَضْعُ الحَنْجَرَة السُّفْلي ّ (Inferior laryngotomy) ، أو البَضْعُ بَينَ الغُضْرُوفَيْن الحلَقيَّيْن (Intercricothyrotomy) ، أو بَضْعُ الغَشَاءَ الحَلَقِيّ الدَّرَقِيّ (Thyrocricotomy) .

بَضْعُ الحلَقِي **cricotomy**

بضع الغضروف الحلقي .

بَضْعُ الحلَقِي والرُّغامَى **cricotracheotomy**

بضع الرغامى مع شق الغضروف الحلقي .

حِلقِيّ حَبْلِيّ **cricovocal**

متعلق بالغضروف الحلقي والحبال الصوتية .

هي الثقوب الحجاجية .

القَداديَّات **Cricetidae**

هي فَصيلَةٌ منَ القَوارض .

القدادية **Cricetulus**

جنس من القوارض من فصيلة الميوريدا (Muridae) ، وهو واحد من أجناس الهمستر (Hamsters)ويعتبر القداد السنجابي(Cricetutus griseus) هو الهمستر الصيني .

القَداد **Cricetus**

هو جنس من القوارض من فصيلة الميوريدا (Muridae) ، وهو واحد من أجناس الهمستر . ويعتبر القداد القدادي (Cricetus cricetus) هو الهمستر الأوروبي .

القَدَادُ السِّنْجابيّ **Cricetus grisens**

هو الهمستر الصيني (European hamster) ، وهو نوع من القوارض .

علامة كرايتون ـ براون **Crichton-Browne's sign**

[علامة منسوبة للسير جيمس كرايتون ـ براون (Sir James Crichton - Browne) ، وهو طبيب اسكتلندي المولد ، عاش ما بين 1840-1938]

هي علامة في الشلل العام .

انظر تحت sign .

كريك **Crick**

[هو فرانسيس هاري كومبتون كريك (Francis Harry Compton) ، عالم بيولوجيا بريطاني المولد ، ولد عام 1916 ، حصل بالاشتراك مع موريس ولكنز (Maurice Wilkins) وجيمس دوي واتسون (James Dewey Watson) على جائزة نوبل في الطب والفيزيولوجيا عام 1962] . لاكتشافاتهم المتعلقة بالبنية الجزيئية للأحماض النووية ، وأهميتها في نقل المعلومات في الكائنات الحية .

إدْل **crick**

أَلَمٌ عَضَلِيٌّ في العُنُق .

حِلقِيّ طِرْجِهالِيّ **cricoarytenoid**

يتعلق بكل من الغضاريف الحلقية

crinology **عِلمُ الإفراز**

crinophagy **أكل الشعر**

هو الهضم داخل الخلوي لمحتويات الفجوات الإفرازية (الببتيدات والبروتينات) بعد التحام الفجوات مع اليحلولات .

crinose **مُشَعَّر**

مغطى بطبقة من الشعر .

Crinum **زَنْبَقِيَّة**

هو جنس من النباتات من فصيلة النرجسيات . أحد أنواعها هي الزنبقية الآسيوية (Crinum asiaticum) ، وهي نوع هندي لجذوره خواص تشبه نبات العنصل ، أو بصل الفار .

cripple **1 ـ كسيحٌ؛ عاجِز**
2 ـ مُسَبِّبٌ للعَجْز

perceptual cripple **عاجزُ الإدْراك**

crippling **مُسَبِّبٌ للعَجْز**

crisantaspase **كريسانتاسباز**

المصطلح البريطاني المقابل لمصطلح أسْباراجيناز (Asparaginase) .

crisis **نَوْبَة (ج:نوبات؛ نوَب)**

1 ـ نقطة تحول المرض إلى الأفضل أو إلى الأسوأ ؛ وبخاصة عندما يكون التحول مفاجئاً وباتجاه التحسن عادة في سياق المرض الحاد . وينتهي المرض بنوبة عندما يتظاهر الشفاء بتناقص مفاجئ وواضح في شدة الأعراض .

2 ـ اشتداد انتيابي مفاجئ في حدة الأعراض في سياق المرض .

addisonian crisis **نَوبَةٌ أديسونيَّة**

هو نَوبَةٌ كُظْرِيَّة .

انظر تحت adrenal crisis .

adolescent crisis **نَوبَةُ المُراهَقَة**

adrenal crisis **نَوبَةٌ كُظْرِيَّة**

حدوثَ قصور مفاجئ في قشر الكظر ، أو تدهور مفاجئ في داء أديسون ؛ ومن علامات هذه النوبة كل من فقد الشهية والقيء ، والألم البطني ، والخمول ، والارتباك ، والضعف الشديد ، وفقد الماء والصوديوم عن طريق

Crigler-Najjar syndrome **متلازمة كريجلر ـ نجار**

[متلازمة منسوبة للطبيب جون فيلدينج كريجلر الأصغر (John Fielding Crigler) ، وهو طبيب أطفال أمريكي ، ولد عام 1919 ؛ والطبيب فيكتور أسعد نجار (Victor Assad Najjar) ، وهو اختصاصي مكروبيولوجيا أمريكي لبناني المولد ، ولد عام 1914] ، وهو يرقان خلقي دون انحلال الدم العائلي .

انظر تحت syndrome .

criminalism **التَّزعَة للإجْرام**

ميل الشخص إلى القيام بتصرفات إجرامية .

criminalistics **الطبُّ الشَّرعِيّ**

هو لفظ يطلق على الطب الجنائي (Forensic medicine) .

criminology **عِلمُ الإجْرام**

الدراسة العلمية للجريمة والمجرمين .

crines **أشْعار**

صيغة الجمع من شعرة (Crinis) .

crinin **كرينين**

هي مادة منشطة لإفراز الغدد .

crinis (pl.crines) **1 ـ شَعَر**
2 ـ شَعْرَة

crinis capitis **شَعْرُ الرَّأس**

الشعر الذي يغطي الرأس ، والفروة .

crinis pubis **شَعْرُ العانَة**

الشعر الذي ينمو على منطقة العانة .



Cricoid cartilage الغضروف الحلقي

نَوبَةٌ بَطْنِيَّة **celiac crisis**

هي هَجمة من الإسهال الوخيم المائي ، والقيء ، والتي تتسبب في حدوث التجفاف والحماض المعاوض ، تحدث أحياناً في الشكل الطفلي من الإسهال غير المداري .

نَوبَةٌ دماغيَّة **cerebral crisis**

نَوبَةٌ كُولينِيَّة **cholinergic crisis**

هو ضعف عضلي سببه إحصار إزالة الاستقطاب الناتج عن جرعة زائدة من العوامل المضادة للكولينستيراز ، والتي تستخدم في الوهن العضلي الوبيل ؛ وهي تشبه نوبة الوهن العضلي إلا انها تختلف عنها في بعض النواحي .

نَوبَةٌ بَظْرِيَّة **clitoris crisis**

هي هجمة من الإثارة الجنسية تحدث عند النساء المصابات بالتابس الظهري .

نَوبَةُ تَفَتُّت الغَرَوانيَّات **colloidoclastic crisis**

انظر تحت colloidoclasia .

نَوبَةُ انْعدام الكُرَيَّات **deglobulinization crisis**

هي حَالةٌ تلاحظ في فقر الدم الخلقي كروي الخلايا ، وتتسم إكلينيكياً بالظهور الحاد للحمى والألم البطني والقيء ، وتترافق هذه الأعراض بقلة الشبكيات وقلة الكريات البيض وقلة الصفيحات وقلة أرومات الحمر .

نَوبَةُ ديتيل **Dietl's crisis**

هي هَجمة مفاجئة حادة من الألم الكلوي أو الألم المعدي ، مع نوافض وحمى وغثيان وقيء ، وانهيار عام ؛ يقال أنها ترجع إلى التفاف الكلية جزئياً حول عنيقتها .

نَوبَةُ وَجَع البَطْن **enteralgic crisis**

نَوبَةٌ كاذبَة **false crisis**

انظر تحت pseudocrisis .

نَوبَةٌ حُمَّى **febrile crisis**

هي هجمة من النوافض والحمى والتعرق .

نَوبَةٌ مَعديَّة **gastric crisis**

هي اشتداد حدة الألم البطني في التابس الظهري .

الكلية ، وانخفاض ضغط الدم الذي يمكن أن يتطور إلى صدمة ومن ثم ، في حال عدم تلقي العلاج ، إلى الموت . تسمى أيضاً قصور قشر الكظر الحاد (Acute adrenocortical insufficiency) ، ومتلازمة بيرناد ـ سرجان (Bernard-Serent syndrome) .

نَوبَةٌ شَبيهَةٌ بالتَّأَق **anaphylactoid crisis**

انظر تحت reaction .

نَوبَةُ انْعدَام التَّنَسُّج **aplastic crisis**

هي مَن أكثر أنماط نوبات الخلية المنجلية شيوعاً . وهي حالة عابرة تتسم باختفاء أرومات الكريات الحمراء بشكل فجائي من نقي العظم . وتحدث هذه الحالة تحت تأثير العديد من الظروف ، بما فيها بعض الحالات ، والعداوى الحالة للعظم .

نَوبَةٌ رَبْوِيَّة **asthmatic crisis**

نَوبَةٌ مُستَقلِّيَّة **autonomic crisis**

نَوبَةٌ صَفْرَاوِيَّة **biliary crisis**

نَوبَةٌ أَرومِيَّة **blast crisis**

هو استحَالة مفاجئة وخيمة تحول ابيضاض الدم النقوي إلى مسار أكثر عدوانية ؛ حيث تزداد نسبة الخلايا الأرومية بشكل سريع ، وتتخذ الأعراض الإكلينيكية مظهراً يشبه ابيضاض الدم النقوي الحاد .

نَوبَةٌ دَمَوِيَّة **blood crisis**

نَوبَةُ جذْعِ الدِّماغ **brainstem crisis**

نَوبَةٌ قَصَبِيَّة **bronchial crisis**

اشتداد الزلة في سياق حالة التابس الظهري .

نوبة سرطاوية **carcinoid crisis**

هجمة نوبية من المتلازمة السرطاوية .

نَوبَةٌ قَلْبِيَّة **cardiac crisis**

هو اشتداد وخيم في خفقان القلب ، والذي يحدث في التابس الظهري .

نَوبَةٌ جُمْدِيَّة **cataplectic crisis**

نوبة الرجوع التوتي **catathymic crisis**

هو فعل منفرد غير متكرر من أفعال العنف الناتج عن التوتر أو الكرب فوق المحتمل .

من التابس الظهري .

نوبة فقر الدم ضخم الأرومات **megaloblastic crisis**
هو فقر الدم ضخم الأرومات الذي ينتج عن عوز حمض الفوليك ، والذي يشاهد عند المرضى المصابين بكثرة الكريات الحمر الكروية الوراثية بعد نوبة انعدام التنسج أو بعد الحمل .

نَوبَةُ الوَهَن العَضَلي **myasthenic crisis**
هو الظهور المفاجئ لزلة تنفسية ، والتي تستدعي دعماً تنفسياً في سياق الوهن العضلي الوبيل ؛ وتكون مثل هذه النوبة عادة عابرة ، تستنر لبضعة أيام ، وتترافق بالحمى .

نَوبَةٌ شَنيعَة **nefast crisis**
هو الظهور المفاجئ لأعراض شديدة وغير متوقعة في سياق داءُ المُلْتَويات المُسبِّبُ لليَرَقان الاختباري .

نَوبَةٌ كُلْوِيَّة **nephralgic crisis**
هو اشتَداد الألم في الحالب في سياق التابس الظهري .

نَوبَةٌ نتْريتيَّةُ الشَّكْل **nitritoid crisis**

نَوبَةٌ عَينِيَّة **ocular crisis**
هي هَجمة مفاجئة من الألم الشديد في العين مترافقة بدمعان ، ورهاب الضوء ، . . . إلخ .

نَوبَةُ شُخوص البَصَر **oculogyric crisis**
هي نوبة تحدث في سياق التهاب الدماغ الوبائي ، أو البَارْكنْسُونيَّةُ التاليَةُ لالْتهاب الدِّماغ ، أو في أعقاب استخدام بَعض العَوامل المضادة للذهان ؛ حيث تصبح مقلة العين ثابتة على وضعية واحدة ، عادة ما تكون ملتفة باتجاه الأعلى ، لمدة تتراوح ما بين عدة دقائق إلى عدة ساعات .

نَوبَةٌ بَارْكنْسونيَّة **parkinsonian crisis**
هي حالَة تشاَهد أحياناً في الباركنسونية ، والتي تشابه ظاهرياً خَرَس تَعَذُّر الحَركَة أو الغَيبوبَة السَهَريَّة ، وحيث يستلقي المريض بشكل متيبِّس وبلا حراك ، ولا يقوم بأي تواصل عفوي .

نَوبَةُ الوَليد الجِنْسيَّة **genital crisis of newborn**
هي حالَة تتَسم بفرط تنسج الأثداء ، وتودق المخاطية المهبلية ، والنزف المهبلي أحياناً ، وذلك بتأثير الإستروجينات الواردة عن طريق المشيمة .

نَوبَةٌ زَرَقيَّةٌ هَدَبيَّة **glaucomatocyclitic crisis**
هو شكل أحادي الجانب وناكس وغير شائع نسبياً من أشكال الزرق الثانوي مفتوح الزاوية ، والذي يستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين ، ونادراً ما يسبب أذى مستديماً للقرص البصري أو لآليات التدفق . وتتظاهر النوبة بارتفاع الضغط داخل المقلة وانخفاض ملحوظ في آليات التدفق ، مع وجود الحد الأدنى من العلامات والأعراض الالتهابية .

نَوبَةُ انْحلال الدَّم **hemolytic crisis**
هي شكل نَادر من أشكال نوبة الخلايا المنجلية ، والتي يحدث فيها تخرب حاد للكريات الحمراء ، ومن ثم يؤدي إلى اليرقان .

نَوبَةٌ كَبديَّة **hepatic crisis**
هجمة ألم شديد في منطقة الكبد .

نَوبَةُ فَرْط التَّوَتُّر الوُدِّي **hypersympathicotonic crisis**

نَوبَةُ فَرْط الضَّغْط **hypertensive crisis**
ارتفاع مفَاجئ وبدرجة خطيرة في ضغط الدم .

نَوبَةٌ هسْتيريَّة **hysterical crisis**

نَوبَةُ الشُّعُور بالوَحْدَة **identity crisis**
هي فترة من فترات التطور السيكولوجي للفرد ، والتي تحدث عادة خلال المراهقة ، وتتظاهر عادة بفقد الشعور بالتماثل والاستمرارية التاريخية مع ذات المرء ، وبالارتباك فيما يتعلق بالقيم أو عدم القدرة على تقبل التصورات الفردية التي يتوقعها المجتمع من الشخص .

نَوبَةٌ معَويَّة **intestinal crisis**
انظر تحت gastric crisis .

نَوبَةٌ حَنْجَريَّة **laryngeal crisis**
هو تشنج انتيابي في الحنجرة في المراحل الأولى

نَوبَةٌ قُرَيبيَّة **utricular crisis**

نَوبَةٌ مُبْهَمِيَّة **vagal crisis**

نوبة وعائيَة انسدادية **vaso-occlusive crisis**

هو نوع من أنواع نوبة الخلايا المنجلية ، والذي يحدث فيه ألم شديد نتيجة الاحتشاءات التي قد تحدث في العظام أو المفاصل أو الرئتين أو الكبد أو الطحال أو الكلية أو العين أو الجهاز العصبي المركزي .

نَوبَةٌ مَثانِيَّة **vesical crisis**

هي نوبَة شديدة من الألم ، والتي تحدث في المثانة في حالات التابس الظهري .

نَوبَةٌ حَشَوِيَّة **visceral crisis**

هو اشتداد للألم البارق في أي من الأحشاء ، والذي يحدث في حالات التابس الظهري .

نَفَضانٌ عَضَلِيٌّ زاحِفٌ **crispation**

هي تقلصات عضلية خفيفة اختلاجية أو تشنجية ، والتي تعطي شعوراً زاحفاً .

نَفَضانٌ عَضَلِيٌّ زاحِفٌ **crispatura**

انظر تحت crispation .

عُرْف (ج: أعْراف) **crista TA (pl.cristae)**

هو بروز أو بنية بارزة ، أو حرف ، وبخاصة ما يبرز من عظم أو حافة عظم .

انظر تحت crest .

انظر تحت ridge .

العُرْفُ السَّمْعِيّ **crista acustica**

هو العُرْفُ الأَمْبوليُّ .

انظر تحت crista ampullaris .

العُرْفُ الأَمْبوليُّ **crista ampullaris TA**

هو الجزء الأكثر تبارزاً من الثخانة الموضعية للغشاء الذي يغلف أمبولات القنوات الهلالية والمغطى بظهارة عصبية تحتوي على نهايات العصب الدهليزي . يسمى أيضاً (Crista acustica) ، والعرف السمعي (Acoustic crest) .

العُرْفُ الشَّظَوِيُّ الأَمامِيّ **crista anterior fibulae**

نَوباتُ بل **Pel's crises**

هي النَوبات العينية في التابس الظهري .

نَوبَةٌ بُلْعومِيَّة **pharyngeal crisis**

هي هجمَة مفاجئة تحدث في التابس الظهري ، وتتميز بأحاسيس غريبة في البلعوم مع حركات بلع لا إرادية .

نَوبَةٌ مُسْتَقيمِيَّة **rectal crisis**

هي نوبة شَديدة من الألم المستقيمي ، والتي تترافق مع التابس الظهري .

نَوبَةٌ كُلْوِيَّة **renal crisis**

هي هجَمة من الألم تشابه تلك المصاحبة للمغص الكلوي ، وتحدث في التابس .

نَوبَةُ نَفاد المِلْح **salt-depletion crisis**

انظر تحت syndrome .

نَوبَةُ فقْدان المِلْح **salt-depletion crisis**

انظر تحت syndrome .

نوبة الخلايا المنجلية **sickle cell crisis**

هو مصطلح واسع يستخدم لوصف العديد من الحالات الحادة المختلفة التي تحدث في سياق داء مرض الخلايا المنجلية ، بما فيها نوبة انعدام التنسج ونوبة انحلال الدم والنوبة الوعائية الانسدادية .

نَوبَةٌ تابِسيَّة **tabetic crisis**

هو اشتَداد الألم واضطراب الوظائف في سياق التابس الظهري .

نَوبَةٌ صَدْرِيَّة **thoracic crisis**

هي هجمَة ألم تشابه تلك التي تحدث في سياق الذَبْحَة الصَدْرِيَّة الوعائيَّة الحَرَكيَّة ، إلا أنها تتميز عنها بتقلصات تَشنَجية لعَضلات الصدر والذراعين وذلك في التابس الظهري .

نَوبَةٌ دَرَقِيَّةٌ **thyroid crisis**

هي زيادة مفاجئة وخطيرة في أعراض التسمم الدرقي . تسمى أيضاً العاصفة الدرقية (thyroid storm) ، أو عاصفة التسمم الدرقي (Thyrotoxic storm) .

نَوبَةُ التَّسَمُّم الدَّرَقِيَّة **thyrotoxic crisis**

انظر تحت thyroid crisis .

(Ridge of neck of rib) .

العُرْفُ المَحاريُّ لجسم الفَكِّ العُلْويِّ **crista conchalis corporis maxillae TA**

هو حرف مائل عَلى السطح الأنفي لجسم الفك العلوي ، والواقع إلى الأمام مباشرة من التلم الدمعي ، والذي يتمفصل مع المحارة الأنفية السفلية ؛ يسمى أيضاً العُرْفُ المَحاريُّ السُّفْليُّ لِلفَكِّ العُلْويِّ (Inferior turbinal crest of maxilla) .

العُرْفُ المَحاريُّ لعَظْمِ الحَنَكَ **crista conchalis ossis palatini TA**

هو حرف مستعرض حاد يقع بالقرب من حافة عظم الحنك ، والذي يتمفصل مع المحارة السفلية ؛ ويسمى أيضاً العُرْفُ المَحاريُّ السُّفْليُّ لَعَظْمِ الحَنَكِ (Inferior turbinal crest of palatine bone) .

العُرْفُ المُقَسَّم **crista dividens**

هو حَوفُ الثُّقْبَة البَيْضيَّة (Limbus foraminis ovalis) .

العُرْفُ الغرْباليُّ للفَكِّ العُلْويَ **crista ethmoidalis maxillae TA**

هو حرف مَائل منخفض على السطح الإنسي للناتئ الأمامي للفك العلوي ، والذي يتمفصل مع المحارة الأنفية الوسطى ؛ يسمى أيضاً العُرْفُ المَحاريُّ العُلْويُّ لِلفك العلوي (Superior turbinal crest of maxilla) .

العُرْفُ الغرْباليُّ لعَظْمِ الحَنَكَ **crista ethmoidalis ossis palatini TA**

هو حرف يقع بالقرب من النهاية العلوية للسطح الإنسي لعظم الحنك ، والذي يتمفصل مع المحارة الوسطى ؛ يسمى أيضاً العُرْفُ المَحاريُّ العُلْويُّ لِعَظْمِ الحَنَكِ (Superior turbinal crest of palatine bone) .

العُرْفُ المُنْجَليّ **crista falciformis**

هو العرَف المستعرض للصِّماخ السَّمْعيّ البَاطن .

انظر تحت crista transversa meati acutici

هي الحافَةُ الأماميَّةُ للشَّظيَّة .

انظر تحت margo anterior fibulae .

العُرْفُ الأَماميُّ للظُّنْبوب **crista anterior tibiae**

هي حافَةُ الظُّنْبوب الأَماميَّة .

انظر تحت margo anterior tibiae .

العُرْفُ المُقَوَّسُ للغُضْروف الطِّرْجهالي **crista arcuata cartilaginis arytenoideae TA**

هو حرف عَلى السَطَح الخارجي للغضروف الطرجهالي بين الوهدة المثلثية ، والوهدة الطولانية .

العُرْفُ القاعديُّ لقَناة القَوْقَعَة **crista basilaris ductus cochlearis TA**

هو تَبارز مثلثي من الرباط الحلزوني للقوقعة ، والذي يوفر مرتكزاً للغشاء القاعدي . يسمى أيضاً العُرْفُ الحَلَزونيُّ لقناة القَوقَعَة (Crista spiralis ductus cochlearis) ، أو العُرْفُ الحَلَزونيُّ للقَوقَعَة (crista spiralis cochleae) .

عُرْفُ المُبَوِّقَة **crista buccinatoria**

هو حرف يمتد من قاعدة الناتئ الإكليلي للفك السفلي حتى نقطة تقع بالقرب من الرحى الأخيرة ، والذي يوفر مرتكزاً للعضلة المبوقة .

عُرْفُ رأسِ الضِّلْع **crista capitis costae TA**

هو عرف أفقي يقسم السطح المفصلي لرأس الضلع إلى وجيهين (Facets) ؛ للتمفصل مع الانخفاض الموجود على على جسمي فقرتين متجاورتين ؛ يسمى أيضاً عرف الرأس الصغير للضلع (Crest of little head of rib) ، أو البارزَةُ الإسْفينيَّةُ لرأس الضِّلْع (Cuneiform eminence of head of rib) ، أو الحَرْفُ بَينَ المَفَاصل لرأس الضِّلْع (Interarticular ridge of head of rib) .

عُرْفُ رأس الضِّلْع **crista capituli costae**

انظر تحت crista capitis costae .

عُرْفُ عُنُق الضِّلْع **crista colli costae TA**

هو عرف على الحافة العلوية لعنق الضلع ، والذي يوفر مرتكزاً للرِّباطُ الضِّلْعيّ المُسْتَعْرضيّ الأمامي ؛ يسمى أيضاً حرف عنق الضَلع

هو الحافَةُ الكُعْبُرِيَّةُ بَينَ العظام .
انظر تحت margo interosseus radii .

العُرْفُ الظُّنْبوبِيُّ بَيْنَ العظام **crista interossea tibiae**
هو الحافة الظنبوبية بين العظام .
انظر تحت margo interosseous tibiae .

العُرْفُ الزَّنْدِيُّ بَيْنَ العظامَ **crista interossea ulnae**
هو الحافَةُ الزَّنْدِيَّةُ بَينَ العظام .
انظر تحت margo interosseous ulnae .

العُرْفُ بَيْنَ المَدْوَرَين **crista intertrochanterica TA**
هو حرف بارز يمتد بشكل مائل باتجاه الأسفل من قمة المدور الأكبر على السطح الخلفي لعنق عظم الفخذ إلى المدور الأصغر ؛ يسمى أيضاً الحَرْفُ بين المَدْوَرَين (Intertrochanteric ridge) ، أو (Linea intertrochanterica posterior) ، أو الخَطُّ الخَلْفيُّ بَينَ المَدْوَرَين (Posterior inter- trochanteric line) .

العُرْفُ الدَّمْعِيُّ الأماميُّ **crista lacrimalis anterior TA**
هو الحافة الوحشية للتلم الواقع على الحد الخلفي للناتئ الجبهي للفك العلوي .

العُرْفُ الدَّمْعِيُّ الخَلْفيُّ **crista lacrimalis posterior TA**
هو حَرف عمودي يقسم السطح الوحشي أو الحجاجي للعظم الدمعي إلى قسمين ، ويكون أحد حواف حفرة الكيس الدمعي .

العُرْفُ الوَحْشِيُّ للشَّظِيَّة **crista lateralis fibulae**
هو الحافَةُ الخَلْفِيَّةُ للشَّظِيَّة .
انظر تحت margo posterior fibulae .

عُرْفٌ هامشيّ **crista marginalis TA**
هو أحدَ الأعراف المتبارزة المحدبة التي تكون الحواف الإنسية والوحشية للسطوح الإطباقية للأسنان الخلفية ، والسطوح اللسانية للأسنان الأمامية .

interni .

العُرْفُ الفَخذيّ **crista femoris**
هو الخَطُّ الخَشِنُ للفَخْذي .
انظر تحت linea aspera femoris .

عُرْفُ نافذَةَ القَوقَعَةَ **crista fenestrae cochleae TA**
هي الصفيحة العظمية التي تبرز من النافذة القوقعية (المستديرة) للأذن الوسطى .

عُرْفُ الجَبْهي **crista frontalis TA**
هو الحرف الإنسي ، والذي يقع على السطح الداخلي للعظم الجبهي ، ويمتد باتجاه الأعلى من الثقبة العوراء ليتحد مع تَلَم الجَيب السَّهْميِّ العُلْويِّ ؛ يسمى أيضاً العرف الجبهيَ الداخلَي (Internal frontal crest) .

عُرْفُ الدِّيك **crista galli TA**
هو حرف ثخين مثلثي يبرز باتجاه الأعلى من الصحيفة المصفوية للعظم الغربالي ويرتكز عليه منجل المخ .

عُرْفُ الحتار **crista helicis**
هو ساقُ حتار الأُذُن .
انظر تحت crus helicis .

العُرْفُ الحَرْقَفيُّ **crista iliaca TA**
هو الحد العلوي الثخين المتوسع للحرقفة ؛ يسمى أيضاً (Crest of ilium) .

العُرْفُ الحَرْقَفيُّ **crista ilii**
انظر تحت crista iliaca .

العُرْفُ تَحْتَ الصُّدْغ **crista infratemporalis TA**
هو عرف يقسم السطح الصدغي للجناح الكبير للعظم الوتدي إلى جزء علوي صدغي وجزء سفلي تحت صدغي .

العُرْفُ الشَّظَوِيُّ بَيْنَ العظام **crista interossea fibulae**
هو الحَافَةُ الشَّظَوِيَّةُ بَيْنَ العظام .
انظر تحت margo interosseus fibulae .

العُرْفُ الكُعْبُرِيُّ بَيْنَ العظام **crista interossea radii**

هو عرف عظمي متنوع الأشكال يمتد أحياناً من الناشزة القذالية الخارجية باتجاه الثقبة العظمى ؛ يسمى أيضاً الخط القفوي الناصف (Median nuchal line) ، أو الخط القفوي المتوسط (Middle nuchal line) .

العُرْفُ القَذالِيُّ الباطِن **crista occipitalis interna TA**

حرَف ناصف على السطح الداخلي للعظم القذالي ، والذي يمتد من نقطة منتصف البارزة الصليبية إلى الثقبة العظمية .

عُرْفُ الحَنَك **crista palatina TA**

هو عرف معترض على عظم الحنك ، والذي يقع على مسافة قريبة إلى الأمام من الحافة الخلفية .

عُرْفُ العانَة **crista pubica TA**

هي الحافة الأمامية الثخينة الخشنة لجسم عظم العانة .

العُرْفُ العَجُزِيُّ المفصلي **crista sacralis articularis**

هو العُرْفُ العَجُزِيُّ الإنْسِيُّ .

انظر تحت crista sacralis medialis .

العُرْفُ العَجُزِيُّ المُتَوَسِّط **crista sacralis intermedia TA**

هو العُرْفُ العَجُزِيُّ الإنْسِيُّ .

انظر تحت crista sacralis medialis .

العُرْفُ العَجُزِيُّ الوَحْشِيُّ **crista sacralis lateralis TA**

أي من مجموعتي الحدبات الواقعة إلى الوحشي من الثقبات العجزية الظهرانية ، والتي تمثل النواتئ المستعرضة للفقرات العجزية ؛ تسمى أيضاً العرف العجزي الخارجي (External sacral crest) .

العُرْفُ العَجُزِيُّ الإنْسِيُّ **crista sacralis media**

انظر تحت crista sacralis mediana .

العُرْفُ العَجُزِيُّ الإنْسِيُّ **crista sacralis medialis**

أيَ مَن العرفين غير المحددين الواقعين إلى

عُرْفُ مَطْرِس الظُّفُر **crista matricis unguis**

هو حرفَ طوَلاني وعائي في مطرس الظفر .

عُرْفُ الشَّظِيَّة الإنْسِيُّ **crista medialis fibulae TA**

هوَ العَرف الطويل على السطح الخلفي لجسم الشظية ، والذي يفصل منشأ العضلة الظنبوبية الخلفية عن منشأ العَضَلَةُ المُثْنِيَةُ الطَّوِيلَةُ لإبْهام القَدَم ؛ يسمى أيضاً خَط الشظية المَائِلَ (Oblique line of fibula) ، أو الحد الخلفي الداخلي للشظية (Posterointernal border of fibula) .

عُرْفُ العَضَلَة الباسطَة **crista musculi supinatoris TA**

هو حَرف قوي يكون الحافة الخلفية لحفرة الباسطة تحت الثُّلْمَة الكُعْبُرِيَّة للزَّنْد ، ويشترك معها في توفير مرتكز للعضلَة الباسطة ؛ يسمى أيضاً عرف الباسطة (Supinator crest) ، أو حرف الباسطة (Supinator ridge) .

العُرْفُ الأَنْفِيُّ للفَكِّ العُلْوِيِّ **crista nasalis maxillae TA**

هو حرف يبَرز على طول الحافة الإنسية للناتئ الحنكي للفك العلوي ، والذي تتمفصل معه الميكعة .

العُرْفُ الأَنْفِيُّ لعَظْم الحَنَك **crista nasalis ossis palatini TA**

هو حَرف ثخين يبرز باتجاه الأعلى من الجزء الإنسي للصفيحة الأفقية لعظم الحنك ، ويتمفصل مع الجزء الخلفي للميكعة .

عُرْفُ الحُدَيْبَة المُسدَّة **crista obturatoria TA**

هي الحافة السفلية للرأد الخلفي لعظم العانة ، وهو حرف قوي من العظم يبدأ قرب الحدبة العانية ، ويمتد إلى القسم الأمامي من الفجوة الموجودة في حافة الحق ، ليكون قسماً من محيط الثقبة السدادية ، ويوفر مرتكزاً للغشاء السدادي .

العُرْفُ القَذَالِيُّ الظَّاهِر **crista occipitalis externa TA**

الإنسي مباشرة من الثقب العجزية الظهرانية ، واللذين يتكونان من التحام النواتئ المفصلية للفقرات العجزية ؛ يسمى أيضاً العرف المفصلي العجزي (Articular sacral crest) .

العُرْفُ العَجُزيُّ الناصف **crista sacralis mediana TA**

هو حرف ناصف على السطح الظهراني للعجز ، والذي يتكون من بقايا النواتئ الشوكية للفقرات العجزية الأربعة العلوية ؛ يسمى أيضاً العرف العجزي (Sacral crest) ، أو عرف النواتئ الشوكية العجزية (Crest of spinous prosesses of sacrum) ، أو الحرف الحدبي للعجز (Tubercular ridge of sacrum) .

العُرْفُ الوَتَديُّ **crista sphenoidalis TA**

هو حرف نَاصف على السطح الأمامي لجسم العظم الوتدي ، والذي يتمفصل مع الصَّفيحَة المُعامدَة للعَظْم الغرْباليّ .

العُرْفُ الحَلَزونيُّ **crista spiralis**

هي الشَّفَةُ الدِّهْليزيَّةُ للحُوف .

انظر تحت labium limbi vestibulare .

العُرْفُ الحَلَزونيُّ للقَوقَعَة **crista spiralis cochleae TA**

انظر تحت crista basilaris ductus cochlearis .

العُرْفُ الحَلَزونيُّ للقَناة القوقَعيَة **crista spiralis ductus cochlearis**

تسمية بديلة لمصطلح العرف القاعدي لقناة القوقعة (Crista basilaris ductus cochlearis) .

العُرْفُ فَوقَ اللُّقيمَةالوَحْشيَّة للعَضُد **crista supraepicondylaris lateralis humeri TA**

هو حرف متبارز (بارز) منحن على السطح الوحشي للعضد ، والذي يوفر مرتكزاً من الأمام للعضلات العضدية الكعبرية ، والكُعْبُريَّة الطَّويلَة الباسطَة للرُّسْغ ؛ يسمى أيضاً العُرْفُ فَوقَ اللُّقْمَةِ الوَحْشيَّة للعَضُد (Crista supracondylaris lateralis humeri) ، أو العرف الوحشي فوق اللقمي (Lateral supracondylar crest) ، أو الحرف الوحشي فوق اللقمي للعضد (Lateral supracondylar ridge of humerus) .

العُرْفُ فَوقَ اللُّقيمَةِ الإنْسيَّة للعَضُدِ **crista supraepicondylaris medialis humeri TA**

هو حرف متبارز منحن على السطح الناصف للعضد ، والذي يوفر مرتكزاً من الأمام للعضلة ، العضدية ومن الخلف للرأس الإنسي للعضلة ثلاثية الرؤوس ؛ يسمى أيضاً العُرْفُ فَوقَ اللُّقْمَةِ الإنْسيَّةِ للعَضُدِ (Crista supracondylaris medialis humeri) ، أو العرف الإنسي فوق اللقمي (Medial supracondylar crest) ، أو الحرف الإنسي فوق اللقمي للعضد (Medial supracondylar ridge of humerus) .

العرف فوق الخشاء **crista supramastoidea**

هو حرف على العظم الصدغي ، والذي يعتبر امتداداً للحد العلوي للجذر الخلفي للناتئ الوجني للعظم الصدغي .

العُرْفُ فَوقَ البُطَين **crista supraventricularis TA**

هو حرف على السطح الداخلي للبطين الأيمن للقلب ، والذي يشكل علامة على المخروط الشرياني أو مسال التدفق من بقية البطين الأيمن ، والذي يعرف باسم مسلك التدفق (In-flow tract) ، ويسمى أيضاً (Infundibuloventricular crest) .

العُرْفُ الصُّدْغيُّ **crista temporalis**

هو الخَطُّ الصُّدْغيُّ للعَظْمِ الجَبْهيِّ .

انظر تحت linea temporalis ossis frontalis .

العُرْفُ الصُّدْغيُّ للفك السفليّ **crista temporalis mandibulae**

هو حرف على الجانب الإنسي من الناتئ الإكليلي ، والذي يمتد من جوار قمة الناتئ المنقاري إلى مستوى الرحى الأخيرة ، وكذلك فهو يوفر مرتكزاً للعضلة الصدغية .

العُرْفُ الانْتهائيُّ للأُذَين الأيمَن **crista terminalis atrii dextri TA**

ridge) bicipital ، أو حـــــرف ذات الـرأسين الخلفي (Posterior bicipital ridge) .

عُرْفُ الحُدَيْبَة الصَّغِيْرَة **crista tuberculi minoris TA**

هو بروز على الحدبة الصغيرة لعظم الفخذ ، والذي يشكل إحدى شفتي التلم بين الحدبات ؛ يسمى أيضاً (Crest of smaller tubercle) ، أو حرف ذات الرأسين الأمامي (Anterior bicipital ridge) ، أو حرف ذات الرأسين الداخلي (Internal bicipital ridge) .

عُرْفُ الطَّبْلَة **crista tympanica**

هو حرف على الحلقة الطبلية .

العرف الزندي **crista ulnae**

هي الحافةُ الزَّنْدِيَّةُ بَينَ العظام .

انظر تحت margo interosseus ulnae .

عُرْفُ الإحْلِيل الأُنْثَوِيّ **crista urethralis femininae TA**

هي طَية طولانية بارزة على المخاطية على طول الجدار الخلفي للإحليل ؛ تسمى أيضاً (Crista urethralis muliebris) أو الأُكَيْمَةُ العُنُقِيَّةُ لإحْلِيْل الأُنْثَى بحسب بَاركوف (Cervical colliculus of female urethra of Barkow) .

عُرْفُ الإحْلِيل الذَّكَرِيّ **crista urethralis masculinae TA**

هو ارتفاع ناصف يتبارز على طول الجدار الخلفي للإحليل ويقع بين الجيوب البروستاتية ؛ ويسمى أيضاً (Crista urethralis virilis) .

عُرْفُ الإحْلِيل الأُنْثَــوَي **crista urethralis femininae TA**

انظر تحت crista urethralis femininae .

عُرْفُ الإحْلِيل الذَّكَرَي **crista urethralis virilis**

انظر تحت crista urethralis masculinae .

عُرْفُ الدِّهْلِيز **crista vestibuli TA**

هو حـرف بين الرَّدْب الكُرَوِيّ للدِّهْلِيز ، والرَّدْب الإهْلِيلَجِيّ للدِّهْلِيز ، وَالذي ينقسم في الخلف ليحيط بالرَّدْب القَوقَعِيّ للدِّهْلِيز .

هو حرف على السطح الباطن للأذين الأيمن من القلب ، والذي يقع إلى يمين الوريدين الأجوفين العلوي والسفلي ، ويفصل جيب الوريد الكهفي عن الأذين المخصوص والأذينة . وترتبط عضلات الأذين الأيمن الممشطية بهذا العرف . وهو يتوافق مع تلم على السطح الخارجي يسمى التلم الانتهائي ؛ يسمى أيضاً الشريطة الانتهائية (Taenia terminalis) .

العُرْفُ المُسْتَعْرِض للصماخ السَمعي الباطن **crista transversa meati acustici interni TA**

هو حرف عظمي يقسم قاع الصماخ السمعي الباطن إلى حفرتين علوية وسفلية ؛ يسمى أيضاً العُرْفُ المِنْجَلِيّ (Crista falciformis) .

العُرْفُ المُسْتَعْرِض **crista transversalis TA**

هو عرف متبارز يسير بشكل مستعرض على السطح الإطباقي للرحى السفلية ؛ ليربط بين قمم الحدبات الخدية واللسانية ويستمر مع الحدبات الخدية واللسانية وقد يتظاهر بشكل تبارز مستمر أو قد يكون مقطوعاً عند منتصفه تقريباً بشكل حاد .

العُرْفُ المُثَلَّثِيّ **crista triangularis TA**

هو حرف يهبط من قمم حدبات الأرحاء والضواحك باتجاه الجزء المركزي من السطح الإطباقي ؛ ويستمد تسميته من أن المنحدرات الواقعة على كل من جانبي الحرف تشبه سطحي مثلث .

انظر تحت oblique ridge .

انظر تحت crista transversalis .

عُرْفُ الحُدَيْبَة الكَبِيْرَة **crista tuberculi majoris TA**

هو بروز على الحدبة الكبيرة لعظم الفخذ ، والذي يشكل إحدى شفتي التلم بين الحدبات ؛ يسمى أيضاً (Crest of large tubercle) ، أو الحرف الصدري (Pectoral ridge) ، أو حرف ذات الرأسين الظاهر (External bicipital ridge) ، أو حرف ذات الرأسين الخارجي (outer

أربعة منها أو أكثر إيجابية ، فإن ذلك يعتبر مؤشراً على ارتفاع كبير في احتمال أن يكون المرض مميتاً .

criterion (pl.criteria) **معْيار (ج: مَعايير)**

هو تلك المقياس الذي يعتمد في تقييم شيء ما .

crith **كريث**

هي وَحْدَةُ أوزان الغازات ، والتي تعادل وزن لير من غاز الهيدروَجين في درجة حرارة 0 درجة مئوية ، وتحت ضغط يعادل ضغط عمود من الزئبق ارتفاعه 760 ملي متر .

Crithidia **الشُّعْروريَّة**

هي جنس من الحيوانات الأولية الطفيلية من السوطيات (من رتيبة المثقبية (Trypanosomantina) ، ورتبة الحراكات (Kinetoplastida) ، والتي تتواجد في الأقنية الهضمية لمفصليات الأرجل وعدد من اللافقاريات الأخرى . يشبه الشكل البالغ منها شكل المشوقيات إلا أن سوطها ينشأ من منشأ الحركة أمام النواة مباشرة ، ويرتبط بالجسم بواسطة غشاء متموج . تمر الشعرورية أثناء دورة حياتها بأطوار الشعرورة والمشيقة .

crithidia **شُعْرورَة (ج:شَعارير)**

1 ـ أي حيوان أولي من جنس الشعرورية .

2 ـ انظر تحت epimastigote .

crithidial **شُعْروريّ**

1 ـ نسبة إلى جنس الشعرورية .

2 ـ نسبة إلى طور مورفولوجي من دورة حياة أوالي حيواني هو الطفحة مثقبية المنشأ (Trypanosomid) من جنس الشعرورية .

انظر تحت epimastigote .

critical

1 ـ بُحْرانِيّ

2 ـ حَديّ

3 ـ حَرِجٌ

4 ـ نوبيّ

1 ـ يتعلق بنوبة أو ذو طبيعة نوبية .

2 ـ يتعلق بكارثة أو حالة مرضية تنذر

cristae TA (sing.crista) **أعْراف (ف:عُرْف)**

صيغة الجمع والإضافة من عرف (Crista) .

cristae cutis TA **الأعْرافُ الجِلْدِيَّة**

هي طيـاتٌ من الجلد ، والتي تنتج عن بروز حليمات الأدمة في راحة اليد أو أخمص القدم ، وتشكل بصمات أصابع اليد أو القدم المميزة للفرد .

cristae mitochondriales **أعْرافُ المُتَقَدَّرات**

هي طيات داخلية عديدة معترضة ضيقة على الغشاء الداخلي للمتقدرات .

mitochondrial cristae **أعْرافُ المُتَقَدِّرات**

هي طيات داخلية عديدة معترضة ضيقة على الغشاء الداخلي للمتقدرات .

cristal **عُرْفِيّ**

أي شيء يتعلق بعرف أو بحرف .

cristate **مُضَلَّع**

هو المخدد (Ridged) .

Cristispira **العَرْفاء**

هي جِنْسُ جَراثيمَ مِنَ المُلْتَوِيات .

cristobalite **كريستوبالَيت**

هو شكل بللوري شفاف من السيليكا ، والذي يستعمل في طب الأسنان في قولبة الكساء ؛ وذلك لما يتمتع به من قدرة كبيرة على استيعاب التمدد الحراري ، ومقاومة للتحطم بفعل الحرارة .

criteria (sing.criterion) **مَعايير (ف:مِعْيار)**

صيغة الجمع من معيار (Criterion) .

انظر تحت criterion .

Ranson's criteria **معايير رانسون**

هي مجموعة من إحدى عشرة علامة ، والتي يتم قياس خمس منها عند دخول المريض إلى المستشفى ، ويتم قياس الست الباقية في الساعات الثمانية والأربعين التالية للدخول ، وذلك لتقييم مدى شدة التهاب البنكرياس الحاد . إذا كانت هناك ثلاث علامات منها أو أكثر إيجابية ، فيعتبر ذلك مؤشراً على احتمال وجود مضاعفات جهازية . أما إذا كانت هناك

علامة تجارية لأحد مستحضرات إندينافير سلفات (Indinavir Sulfate) ، وهو يمتلك خواص مثبطة للبروتياز ، ويستخدم كمضاد للفيروس القهقهري (Reterevirus) .

crocein **كرُوسِئِين**

هي أي ملون من سلسلة الملونات ذات اللون الأحمر الفاقع .

crocidismus **نَتفُ الدثار**

هي حركات لاإرادية في الحُمَّى الشديدة .

انظر تحت floccillation .

crocidolite **كروكيدولايت**

هي سيليكات صوديوم حديدوز الحديديك من الأميانت ، وهو من المجموعة المتقالبة ، ذو لون مائل إلى الزرقة ، ويستعمل في الأغراض الصناعية ، إلا أن استعماله بات محظوراً حالياً لأنه يسبب داء الأميانت ، وأنواعاً معينة السرطان مثل ورم المتوسطة (Mesotheliomas) يسمى أيضاً الأميانت الأزرق .

بخطر الموت .

3 ـ يتوفر بمقدار يكفي لاعتباره نقطة تحول ، كما في الكتلة الحرجة (Critical mass) ، أو تركيز حرج (Critical concentration) .

critical care **الرِّعايَةُ الحَرِجَة**

هو فرع مِنَ الطب يختص بأنظمة دعم الحياة ، أو دعم الأعضاء عند المرضى الذين يكونون في حالة من المرض الشديد ، والذين يحتاجون إلى مراقبة ومتابعة وعناية مشددة .

critical care nurse **مُمَرِّضَةُ الرِّعايَةِ الحَرِجَة**

هي ممرضة تعمَل فيَ الرعاية الحرجة .

critical care physician **طَبيبُ الرِّعايَةِ الحَرِجَة**


هو طبيب يعمَل فَي الرعاية الحرجة .

critical care unit **وَحْدَةُ الرِّعايَةِ الحَرِجَة**

هو القسم مِنَ المَستشفى الذي تتوفر فيه أنظمة الرعاية الحرجة .

critical path **مَسَارٌ حَرِجٌ**

Crixivan **كريكسيفان**



Crista temporalis **العرف الصدغي**

أمريكي ، ولد عام 1906] .
انظر تحت method .

متلازمة كرونكايت ـ كندا **Cronkhite-Canada syndrome**
[متلازمة منسوبة للطبيب ليونارد وولزي كرونكايت (Leonard Wolsey Canada) ، وهو اختصاصي طب باطني أمريكي ، ولد عام 1919 ؛ والطبيب ويلما جين كندا (Wilma Jeanne canade) ، هو اختصاصي أشعة أمريكي ، من القرن العشرين] ، وهي سلائل معوية عائلية مع تبدلات جلدية .
انظر تحت syndrome .

تبدلات كروك **Crooke's changes**
تبدلات [منسوبة للطبيب آرثر كارليتون كروك (Arthur Carleton Crook) ، وهو اختصاصي باثولوجيا بريطاني ، ولد عام 1905] ، وهو تنكس هياليني في حبيبات خلايا النخامية الامامية في داء كوشينج .
انظر تحت Crooke's hyaline degeneration .

حيز كروكس **Crookes' space**
[حيز منسوب إلى السير وليام كروكس (Sir William Crookes) ، وهو عالم فيزياء بريطاني ، عاش ما بين 1832-1919] ، وهو الحيز المهبطي المظلم .
انظر تحت spsce .

الحَوصلَة **crop**
1 ـ عند الطيور : هي توسع في المريء عند قاعدة العنق ، والذي يخزن فيه الطعام مؤقتاً ، ويتم تليينه من خلال تناول الماء قبل بدء عملية الهضم ؛ يتم بعد ذلك تمرير الطعام عبر مقدم المعدة إلى القانصة .
2 ـ عضو مماثل عند حشرات معينة ، وعند دودة الأرض ، ولافقاريات أخرى .

كرُوبرُوباميد **cropropamide**
هو دَواءٌ مُسكِّنٌ ومُنَشِّطٌ تَنَفُّسِيّ .

متلازمة كروس **Cross syndrome**
[متلازمة منسوبة للطبيب هارولد يوجيني

زَعفَران **crocus**
انظر تحت saffron .

كرُوفيلِيكون A **crofiliconA**
هي مادة كارهة للماء من مواد العدسات اللاصقة .

داءُ كرون **Crohn's disease**
[داء منسوب للطبيب بويرل برنار كرون (Burrill Bernad Crohn) ، وهو طبيب أمريكي ، عاش ما بين 1884-1983] ، هو داء الورم الحبيبي الالتهابي الهضمي المزمن .
انظر تحت disease .

كرُومُوجليكات **cromoglycate**
هو أحد أملاح حمض الكروموجليسيك ؛ وتحديداً هو ملح الصوديوم من ذلك المركب ، والذي يعرف باسم كرومولين الصوديوم ، ويستعمل في علاج الربو القصبي .

حمض الكروموجليسيك **cromoglycic acid**
تسمية بديلة لمصطلح كرومولين (Cromolyn) .
انظر تحت cromolyn .

كرُومُولين **cromolyn**
هو مثبط لإفراز الهيستامين ووسائط فرط التحسس العاجل الأخرى من الخلايا البدينة ؛ والذي يستعمل بصيغة كرومولين صوديوم عن طريق الاستنشاق للوقاية من الربو القصبي . يسمى أيضاً حمض الكروموجليسيك (Cromoglycic acid) .

كرومولين صوديوم **cromolyn sodium**
هو ملح الصوديوم من حمض الكروموجليسيك ، والذي يؤثر في إفراز الهيستامين الأرجي ؛ يعطى بطريق الاستنشاق في العلاج الوقائي من الربو القصبي والتهاب الأنف المرافق للأرجية ، وكمحلول عيني للوقاية من التهاب الملتحمة الأرجي ولعلاج تلك الحالة .

طريقة كرونين **cronin method**
[طريقة منسوبة للجراح توماس ديلون كرونين (Thomas Dillon Cronin) ، وهو جراح تجميل

بعد التلوين بنيترات الفضة .

صلبان فضية **silver crosses**

هي صُلْبانُ رانفييه .

انظر تحت Ranvier's crosses .

هَجينٌ ثُلاثيُّ الخلائل **trihybrid cross**

هَجينٌ ثُنائيٌّ الخلائل **two-factor cross**

تأشب يتضمن واصمتين جينيتين .

صليب أصفر **yellow cross**

هو سلفيد ثنائي الكلور ثنائي الأثيل (Dichlorodiethyl sulfide) ، والذي يطلق عليه غاز الخردل .

هَجونِيَّة **crossability**

لفظ للدلالة على قابليَّةُ التَّهْجين .

هَجون **crossable**

يطلق على كل ما هو قابلٌ للتَّهْجين .

تراصٌ مُتصالِب **cross-agglutination**

إطْباقٌ مُتصالِب (أسنان) **crossbite**

(شذوذ في العلاقة الجانبية للفكين)

هو شكل من أشكال سوء الإطباق حيث تكون الأسنان السفلية في وضعية انقلاب خدي بالنسبة للأسنان العلوية (أو في وضعية انقلاب لساني تام بالنسبة للمنطقة الخلفية) في الجانبين معاً ، أو في أحد الجانبين أو في سنين متقابلتين فحسب ، وبحيث لا تكون السطوح الإطباقية المتقابلة في الوضع الإطباقي المعتاد . تكتب أيضاً (Cross bite) ، وكذلك (X-bite) .

إطْباقٌ مُتَصالبٌ أَماميّ (أسنان) **anterior crossbite**

هي حالة من الإطباق المتصالب بحيث تكون فيها القواطع العلوية الدائمة أو المؤقتة في وضعية لسانية بالنسبة للقواطع السفلية .

إطْباقٌ مُتَصالبٌ شدْقِيّ (أسنان) **buccal crossbite**

هي حالة من الإطباق المتصالب تكون فيها الرحى العلوية في وضعية خدية بالنسبة لمقابلتها السفلية .

كروس *(Harold Eugen Cross)* ، وهو طبيب أمريكي ، ولد عام *1937]* .

انظر تحت syndrome

1 ـ عَرْضِيّ **cross**

2 ـ يُهَجِّن

3 ـ هَجين

4 ـ مُتصالِب

5 ـ صَليب

1 ـ أية هيئة أو بنية على شكل صليب .

2 ـ أي كائن حي ينتج من التهجين ؛ أو إحدى وسائل التهجين .

صَليبٌ تَرْقُوِيّ **clavicular cross**

عَضَّةٌ مُتَصالِبَة (أسنان) **cross bite**

هي حالة مِن سوء إطباق الأسنان ، والتي تكون فيها العلاقة الشفوية اللسانية ، أو العلاقة الخدية اللسانية للأسنان المتقابلة مخالفة للوضع الطبيعي .

أَسْنانٌ بِدَبُّوس مُتَصالب **cross pin teeth**

هي أسنان صِنَاعية ذات دبابيس متعامدة مع محورها الطولي ، والتي تثبت في البدلة المتحركة الجزئية أو الكلية .

مَقْطَعٌ عَرَضِيّ **cross section**

انظر تحت cross-section .

مثقب مُعْتَرِض التَّصالُب (أسنان) **cross-cut bur**

هَجينٌ ثُنائيُّ الخلائل **dihybrid cross**

هَجينٌ أُحاديُّ الخَلَّة **monohybrid cross**

تَصالُبٌ عاثَوِيّ **phage cross**

1 ـ عاثية (فيروس حال للجراثيم) تمتلك جينين من أبوين أو أكثر من العاثيات نتيجة عدوى العاثيات الآباء لخلية جرثومية واحدة ؛ وهي نتيجة لعملية التأشب .

2 ـ عملية تكوين التصالب العاثوي .

هَجينٌ مُتَعَدِّدُ الخلائل **polyhybrid cross**

صُلْبانُ رانفْييه **Ranvier's crosses**

علامات (وَصمات) قاتمة صليبية الشكل على عقد رانفييه ، والتي تشاهد في المقاطع الطولية

إخصابٌ مُتصالِب — **cross-fertilization**

إطلاقٌ مُتصالِب — **cross-firing**

(في المعالجةِ الإشْعاعيَّة)

تصالُبُ القَدَمَيْن — **crossfoot**

هو الحَنَفُ الفَحَجيّ .

انظر تحت talipes varus .

تعابُر — **crossing over**

هو تبادل المادة الجينية بين شقَّي الكروموسوم اللامُتَآخيين لأزواج الكروموسومات المتماثلة أثناء طور التثخن في الانقسام الانتصافي الأول ، والذي ينتج عنه توليفات جينية جديدة . يسمى أيضاً (Chiasmatypy) .

آصِرَةٌ مُتصالِبَة — **cross-link**

هي الروابط الكيميائية التي تنتج عن الربط التصالبي (Cross linking) .

ربط تصالبي — **cross-linking**

هو إنشاء روابط كيميائية بين سلاسل من جزيئات البلمر ، مما ينتج شبكة واحدة أكثر قوة وأقل انحلالية .

انظر تحت cross-linked polymer .

اخْتِبارُ التَّوافُق — **crossmatch**

1 ـ اختبار التوافق بين دم المانح والمتلقي ، والذي يتم إجراؤه قبل عملية نقل الدم : حيث توضع كريات دم حمراء من المانح في مصل مأخوذ من المتلقي (اختبار التوافق الكبير) ، وكريات دم حمراء من المتلقي في مصل من المانح (اختبار التوافق الصغير) ، وتضاف أضداد الجلوبولين لزيادة التفاعلية ؛ ويؤشر حدوث انحلال في الدم أو التراص إلى عدم التوافق .

2 ـ اختبار لوجود أضداد سامة في مصل متلق محتمل للطعم لمستضدات أنسجة المانح : بحيث توضع لمفاويات من المانح في مصل مأخوذ من المتلقي ؛ ويؤشر حدوث انحلال للخلايا إلى عدم التوافق ، وإلى احتمال حدوث رفض حاد مفرط للطعم . يسمى أيضاً اختبار التوافق السابق للطعم (Pretransplant crossmatch) ، وكذلك اختبار (HLA) للتوافق

إطْباقٌ مُتَصالِبٌ لِسانيّ (أسنان) — **lingual crossbite**

هو إطباق متصالب تكون فيه الرحى العلوية أو السفلية في وضعية لسانية بالنسبة لمقابلتها .

إطْباقٌ مُتَصالِبٌ خَلْفِيّ (أسنان) — **posterior crossbite**

هو إطباق متصالب تتوضع فيه سن خلفية واحدة أو أكثر في علاقة غير طبيعية مع السن المقابلة من القوس السنية المقابلة ؛ وقد يكون هذا الإطباق المتصلب شدقياً أو لاسانياً ، وقد يترافق بانزياح الفك السفلي .

إطْباقٌ مُتَصالِبٌ مِقَصِّيّ (أسْنان) — **scissors-bite crossbite**

هو إطباق متصالب تكون فيه القوس السنية السفلية بكاملها في وضعية لسانية بالنسبة للقوس السنية العلوية .

إطْباقٌ مُتَصالِبٌ مِقَصِّيّ (أسْنان) — **telescoping crossbite**

انظُر تحت scissors-bite crossbite .

هُجين — **crossbred**

نتاج عملية التهجين .

تَهْجين — **crossbreeding**

تزاوج حيوانات أونباتات من سلالات ، أو من أنواع مختلفة .

جُسورٌ تصالبيَّة — **cross-bridges**

في حزم الليفات العضلية من النوع A ، هي تضافر الألياف الثخينة والرقيقة لتشكيل التخططات الغامقة .

لِبْسَةُ الجِنْسِ الآخَر — **cross-dressing**

هو ارتداء الملابس المخصصة أو المميزة للجنس الآخر (Transvestism) .

مُتصالِب — **crossed**

هو مشكل أو مرتب على شكل صليب ، أي أنه متقاطع .

حَوَلٌ إنْسيّ — **cross-eye**

هو الحول الداخلي .

انظر تحت esotropia .

(HLA crossmatch) تكتب أيضاً (Croos match) ، أو (Cross-match) .

crossmatching **اختِبارُ التَّوافُق**

عملية إجراء اختبار التوافق .

crossmatching test **اختِبارُ التَّوافُق**

انظر تحت crossmatch .

crossover **1 ـ مأشوبٌ تعابُريّ**
2 ـ تعابُرٌ

1 ـ ناتج التبادل المتصالب للمادة الجينية بين الكروموسومات .
انظر تحت crossing over .
2 ـ انظر تحت trial .

cross-reaction **تفاعُلٌ مُتصالِب**

انظر تحت reaction .

cross-reactivation **تنشيطٌ مُتصالِب**

تنشيط جسيم ڤيروسي عاطل بواسطة جسيم ڤيروسي آخر نشط ، أو عاطل في نفس الخلية .

cross-reactive **مُتصالِبُ التَّفاعُل**
(في المناعيات)

cross-reactivity **تفاعُلِيَّةٌ مُتصالِبَة**

هي الدرجة التي يشارك فيها الضد أو المستضد في التفاعلات المتصالبة .

cross-resistance **مقاومة متصالبة**

هي مقاومة لأدوية متعددة .
انظر تحت resistance .

cross-section **مَقطعٌ عَرْضِيّ**

هو مقطع يقطع الجسم في مستوى متعامد مع محوره الطولي .

cross-sensitization **تحَسيسٌ مُتصالِب**

هو التحسس لمادة تستثار عند تعرضها لمادة ثانية ، والتي تحتوي على مستضدات متصالبة التفاعل .

crosstalk **تفاوض متصالب**

في طب القلب : هو الاستشعار غير الصحيح للتنبيه الأذيني بآلية الاستشعار البطيني ، والذي يشاهد عادة في حالات الناظمة ثنائية الحجرات .

cross-tolerance **تحَمُّلٌ مُتصالِب**

هو امتداد تحمل مادة معينة إلى مواد أخرى من نفس الصنف ، بما في ذلك مواد لم يتعرض لها الجسم سابقاً .

crossway **معبر؛ تقاطع**

هو الممر الذي يسلكه شيء ما .
انظر تحت decussation .

Crotalaria **نطش**

هو جنس ضخم من الأعشاب البقلية ، والذي تنمو معظم أنواعه في المناخ الدافئ أو المداري ؛ والتي تحتوي العديد من أنواعه على قلوانيات البيروليزيدين مثل أحادي الكروتالين (الحربش) ، والذي يمكن أن يسبب التسمم بنبات النطش عند الحيوانات التي تتناول تلك الأعشاب .



تصالب القدمين Cross foot

crotalid **حرْبِشٌ**

1 ـ أي من الحيات من فصيلة الحرابيش ؛ وهي أفعى الشقوق السامة .
2 ـ يتعلق أو ينتمي إلى فصيلة الحرابيش .

Crotalidae **الحَرابيش**

هي فصيلة من الحيات السامة ، وهي أفعى الشقوق السامة ، والتي تتميز بأنياب أمامية متحركة مجوفة ، وانخفاض أو شق بين المنخر والعين . تصنف أحياناً على أنها فُصيلة من الأفعويات ويطلق عليها تسمية الحربشية (Crotalinae) وتشمل أجناس مثل الغطرب (Agkistrodon) ، والدساسة (Bothrops) ، و

هي أداة لاستخلاص الجنين الميت .

كرُوتيثاميد **crotethamide**

هو دَواءٌ مُسكِّن .

كروتين **crotin**

هي مادة سامَّة نباتية المنشأ تستخلص من حب الملوك (Croton tiglium) ، وهو جنس نبات من الفَرْبيُونيَّات ، وتسبب التَّسَمُّمُ بِنَبَات حَبِّ المُلوك .

حَبُّ الملوك **Croton**

هو جنْس نَبات شجيري منَ الفَرْبيُونيَّات ، والذيَ يشيع استِّخدام بعضهَا كنباتات للزينة . وتستعمل أنواع معينة منها لأغراض طبية في المكسيك وأمريكا الجنوبية فيما تعتبر أنواع أخرى منها سامة للإنسان وللماشية لاحتوائها على زيت حب الملوك السام .

الصُّرْصورُ الجِرْمانيُّ **Croton bug**

حمض الكروتونيك **crotonic acid**

حمض دهني غير مشبع صيغته الكيميائي (CH3CHbCHCOOH) ، والذي يوجد في زيت حب الملوك .

التَّسَمُّمُ بِنَبَاتِ حَب الملوك **crotonism**

هو تسمم يصيب البشر وحيوانات أخرى من جراء تناول زيت حب الملوك ، ويتسم بحرقة في الفم وفي بعض الأحيان قيء وإسهال ومغص شديدين ؛ قد يترافق أحياناً بصداع ونيمومة ودوار وإعياء ووهط وأخيراً الموت بتأثير فشل دوراني أو تنفسي .

كرُوتوكسين **crotoxin**

هي مادة بلورية سامة عصبية من المكونات الأساسية لزعاف الأفعى الصلالة المسماة بالحربش الرهيب (Crotalus terrificus) .

المعالجَة بالمِياهِ المَعْدِنِيَّة **crounotherapy**

انظر تحت crenotherapy .

خانوق **croup**

هي حالة تنتج عن انسداد حاد جزئي للمسلك الهوائي العلوي ، أكثر ما يشاهد عند الرضع

، (Crotalus) والحربش ، (Calloselasma) والقصاص (Lachesis) ، و (Sistrurus) ، ومقبضية الذيل (Trimeresurus) .

كروتالين **crotalin**

هو بروتين في زعاف الحيات .

الكروتالينية **Crotalinae**

اسم يطلق على فصيلة حيات الحرابيش عندما تصنف على أنها فصيلة فرعية من الأفعويات .

حِرْبِش **crotaline**

هو نَوعٌ منَ الحَيَّات .

انظر تحتَ crotalid .

تَسَمُّمٌ بِنَبَاتِ النَّطش **crotalism**

هو احتقان ونزيف في الكبد والطحال مع هزال وضعف وذهول ، والذي يشاهد عند الحيوانات التي تتناول نباتات من جنس النطش ، بسبب احتوائها على قلوانيات البيروليزيدين السامة مثل أحادي الكروتالين . يسمى أيضاً داء العجيزة (Bottom disease) ، أو داء كمبرلي عند الخيول (Kimberley horse disease) ، أو داء التجوال (Walkabout disease) .

كرُوتالوتوكسين **crotalotoxin**

هي مادة سامة في زعاف الحيَّات .

الحِرْبِش **Crotalus**

هو جنس من الحيات الصلالة السامة من فصيلة الحرابيش ، والتي توجد العديد من أنواعها في أمريكا الشمالية .

كرُوتامين **crotamine**

هي مادة سامة توجد في زُعاف بعض أنواع الحَيَّات من جنس الحربش .

كرُوتاميتون **crotamiton**

هو دواء مضاد للجرب يوجد على شكل سائل زيتي أصفر فاتح اللون يطبق على الجلد موضعياً .

الصُّدَيغَى **crotaphion**

هي نقطة قحفية قياسية توجد على ذروة الجناح الكبير للعظم الوتدي .

صِنَّارة **crotchet**

(Octave Crouzon)، وهو طبيب أعصاب فرنسي، عاش ما بين [1846-1938]، هو خَلَلُ التَّعَظُّم القحفيِّ الوَجْهِيّ.
انظر تحت craniofacial dysostosis.

Crowe-Fukase syndrome **متلازمة كراو - فوكاس**

[متلازمة منسوبة للطبيب ر. س. كراو (R.S.Crow)، وهو طبيب بريطاني من القرن العشرين، والطبيب ماسايتشي فوكاس (Masaichi Fukase)، وهو طبيب ياباني من القرن العشرين]، وهي متلازمة (POEMS) اعتلال الأعصاب، وضخامة الأعضاء، والاعتلال الصماوي والاعتلال الجلوبليني وحيد النسيلة، والتغيرات الجليدية.
انظر تحت syndrome.

crowding **رَصَص (الأسْنان)**

هي الحالة التي تكون فيها الأسنان مزدحمة، وتقع في وضعيات مثل التراكب أو الانزياح في اتجاهات مختلفة أو الالتفاف، ... إلخ.

Crowe's sign **علامة كراو**

[علامة منسوبة للطبيب فرانك. و. كراو (Frank W.Crowe)، وهو طبيب أمريكي من القرن العشرين].
انظر تحت sign.

crown **تاج (أسنان)**

1 ـ هو الجزء الواقع في أعلى العضو أو البنية، مثل قمة الرأس، أو الجزء الأعلى من السن (تاج السن).
انظر تحت anatomical crown.
انظر تحت physiological crown.
2 ـ تاج اصطناعي artificial crown.

acrylic crown **تاجٌ أكْريليكيّ**

في طب الأسنان: هو تاج مصنوع من مادة أكريليكية، والذي يستعمل في الغالب كتاج مؤقت.

acrylic veneer crown **تاجٌ ذُو كسْوَةٍ أكْريليكيَّة**

هو تاج مَعدَني مغطّىً بطبقة رقيقة من مادة والأطفال؛ من سماته سعال نباحي رنان، وبحة في الصوت، وصرير معند. قد تحدث الحالة بتأثير عدوى فيروسية (بواسطة فيروس نَظير الأنفلونزا عادة)، أو عدوى جرثومية (عادةَ بواسطة العنقودية الذهبية، أو العقدية الرئوية أو العقدية المقيحة)، أو عوامل غريب، أو جسم غريب أو ورم (نمو جديد للخلايا).

allergic croup **خانوقٌ أرَجيّ**

انسداد جزئي للمسالك الهوائية العلوية بسبب أرجي المنشأ.

bronchial croup **خانوقٌ قَصَبيّ**

هو التهاب الرغامى.
انظر تحت tracheitis

catarrhal croup **خانوقٌ نَزْليّ**

diphtheritic croup **خانوقٌ خُنَاقيّ**

false croup **خانوقٌ كاذِب**

هو تَشَنُّجُ الحَنْجَرَة الصَّريريّ.
انظر تحت laringismus stridulus.

fibrinous croup **خانوقٌ فِبْرينيّ**

infectious croup **خانوقٌ عَدْوَائيٌّ**

membranous croup **خانوقٌ غشائيّ**

هو التهاب الرغامى الجرثومي.

pseudomembranous croup **خانوقٌ غشائيٌّ كاذب**

هو خانوقٌ غشائيّ.
انظر تحت membranous croup.

spasmodic croup **خانوقٌ تَشَنُّجيّ**

هو تَشَنُّجُ الحَنْجَرَة الصَّريريّ.
انظر تحت laringismus stridulus.

tetanic croup **خانوقٌ تَكَزُّزِيّ**

croupous **خانوقيّ**

متعلق بالخانوق، أو مشابه للخانوق.

croupy **1 ـ مصاب بالخانوق**
2 ـ خانوقيّ

مصاب بالخانوق، أو مماثل للخانوق.

Crouzon's disease **داء كروزون**

[هو داء منسوب للطبيب أوكتاف كروزون

هو تاجٌ ذو كِسْوَة جُزْئِيَّة .
انظر تحت partial veneer crown .

تاج سيلولويد **celluloid crown**
هو تاج مؤقت اصطناعي مصنوع من السيلولوي ، والذي د يسهل تصنيع تاج مؤقت أثناء عمليات المعالجات السنية التعويضية .

تاجٌ هَدَبِيّ **ciliary crown**
هو الإِكْلِيلُ الهَدَبِيُّ .
انظر تحت corona ciliaris .

تاجٌ سَرِيرِيّ (إكلينيكي) **clinical crown**
انظر تحتَ corona clinica .

تاجٌ طَوقِيّ **collar crown**
هو تاجَ اصطناعي يثبت بواسطة طويق معدني إلى سطح سن طبيعية .

تاجٌ كامل **complete crown**
انظر تحَت full crown .

تاج ذو كسوة كاملة **complete veneer crown**
هو ترميم مكون من المعدن والخزف أو الراتين الأكريليكي ، والذي يعيد ترميم الشكل التشريحي لكامل أسطح التاج الإكلينيكي ، وينطبق هذا على سن أو جذر محضر .

على شكل التَّاج **crown form**
هو غلاف شفاف على هيئة تاج ، والذي يستعمل في عمل التاج المؤقت من الأكريليك بعد تحضير السن .

نازِعَةُ التَّاج **crown remover**
هَي أداة لنزع التيجان الاصطناعية من الأسنان .

خازِعَةُ التَّاج **crown slitter**
هيَ أداة تستعمل لشق التيجان الاصطناعية .



artificial crown تاجٌ اِصْطِناعِيّ

أكريليكية .

تاجٌ كاملُ الصَّب **all cast crown**
هو تاجَ يصنع بكامله بواسطة عملية الصب .

تاجٌ تَشْرِيحِيّ **anatomical crown**
هو تاج السِّن أو قسم السن المغطى بالميناء .
انظر تحت corona dentis .

تاجٌ اصْطناعِيّ **artificial crown**
هو ترميم يصنع من مادة قد تقتصر على المعدن فقط ، أو من معدن مع كسوة خزفية أو راتينية ، أو قد تقتصر على الخزف أو الراتين ، والتي تهدف إلى التعويض عن كامل الشكل السطحي لتاج السن الإكلينيكي ؛ وقد يُثبت التاج على جدعة سن محضرة ، أو على سن معاد بناؤها جزئياً بواسطة قالب معدني مصبوب ، أو إلى وتد وقلب معدنيين مصبوبين ، أو قد يتم إلصاقه على بنية السن المتبقية . تطلق عليه التسمية الدارجة غطاء أو قلنسوة (Cap) .

تاجٌ ذُو سَطْح طاحِن مَصْبوب **banded cast-cusp crown**

تاجٌ شَبِيهٌ بالسَّلَّة **basket crown**
هو تاج اصطناعي ذهبي يتم تهيئته ليلائم سناً طبيعية مزال منها أقل مقدار ممكن من الأنسجة ، ويستمد تسميته من حقيقة أن تثبيت السن يُدعم بشريط معدني لساني رقيق يشبه في شكله قبضة السلة .

تاجٌ جَرَسِيّ **bell crown**
هو تاج سَن قطر سطحه الإطباقي أكبر من المعتاد بالنسبة لقطر عنق التاج .

تاج بونول **Bonwill crown**
هو تاج خزفي اصطناعي يثبت على جذر السن بواسطة محلزن معدني مجدول ينفذ من خلال فتحة في الخزف ، وتشد عليه حزقة .

تاجٌ ذُو قَلَنْسُوَة **cap crown**
هو تاج ذو صدَفة .
انظر تحت shell crown .

تَاجُ كارمايكل **Carmichael crown**

تاجٌ ذُو مِسْنَدَة **matrix crown**

هو تاجَ اصطناعي ذو قالب معدني .

تاجٌ مَفْتوحُ الوَجْه **open-face crown**

تاج ذهبي يغطي المنطقة العنقية الشفوية أو الشدقية إلى جانب السطوح اللسانية والدانية والإطباقية ، أو الحد القاطع للأسنان الأمامية ، بحيث يبقى السطح الشدقي أو الشفوي للسن الطبيعية مكشوفاً من خلال الفتحة . يسمى أيضاً تاجٌ نصْفُ قَلَنْسُويٍّ (Half-cap crown) .

تاج الحشوةَ المصبوبة **overlay crown**

هو تاج اصطناعي معدني مصبوب يقولب على تاج طبيعي محضر لدعم الجدران الموجودة حول حشوة مصبوبة عندما لا تكون بالقوة أو الثخانة الكافية لتحمل الجهود الإطباقية ، بحيث يبقى السطح الشفوي للتاج الطبيعي مكشوفاً لأغراض تجميلية .

تاجٌ مُغَطًّى جزئيًّا بكسْوَة خَزَفيَّة **partial veneer crown**

هوَ تاجٌ قشْرِيٌّ جُزْئيّ .

انظر تحت three-quarter crown .

تاجٌ فيزيُولُوجيّ **physiological crown**

هو القسم المكشوف من السن والواقع فوق الحافة العنقية للثة . قد يشمل كل القسم المغطى بالميناء من السن (تاج السن) ، أو جزء منه (التاج الإكلينيكي) ، وقد يشمل قسماً من الجزء غير المغطى بالميناء (الجذر التشريحي) .

تاج مثبت بالدبابيس **pinledge crown**

تاج اصطناعي يثبت بواسطة دبابيس ، والتي يتم إدخالها في آباب تثبيت مخصصة لها داخل السن .

تاجٌ ذُو صائر **pivot crown**

تاج صناعيَ يثبت بواسطة وتاد معدني داخل قناة الجذر للسن الطبيعية .

تاجٌ ذُو شُرُفات خَزَفيَّة **porcelain cusp crown**

تاج صَناعي سطحه الإطباقي مغطى بحدبات خزفية .

تاجُ ديفيس **Davis crown**

هو التاجٌ الدعاميّ .

انظر تحت post crown .

تاج السن **dental crown**

هو تاج السن .

انظر تحت corona dentis .

تاجٌ ذُو وتَد مُنْفَصِل **detached dowel crown**

هو تاج اصطناعَي يرتكز على وتاد مسبق التجهيز بحيث يكون منفصل عنه .

تاج الدسار **dowel crown**

هو تاج اصطناعي يستبدل به كامل الجزء التاجي من السن ، ويثبت بواسطة دسار يمتد إلى داخل قناة الجذر المحشوة .

تاجٌ تَجْميليّ **esthetic crown**

هو تاج اصطناعي مصنوع بصورة تحاكي لون وشكل الأسنان الطبيعية .

تاجٌ خارجَ السِّنْخ **extra-alveolar crown**

هو التاَج الإكلينيكي .

انظر تحت corona clinica .

تاجٌ كامل **full crown**

هو ترمَيم سني يعيد بالكامل تشكيل التاج الإكلينيكي لسن طبيعية . يسمى أيضاً (Complete crown) وكذلك كسوة كاملة (Full venees) .

تاجٌ كاملُ الكسْوَة **full veneer crown**

انظر تحت full crown .

تاجٌ ذَهَبيّ **gold crown**

هو تاجَ اصطناعي مصنوع من الذهب .

تاجٌ نصْفُ قَلَنْسُويٍّ **half-cap crown**

هوَ تاجٌ مَفْتوحُ الوَجْه .

انظر تحت open-face crown .

تاجٌ ذُو واقيَة **hood crown**

هو تاج نَصَف قبعة يغطي الأسطح اللسانية والجانبية والإطباقية للسن .

تاجٌ ذو سُتْرَة **jacket crown**

هو ترميم خزفي أو أكريليكي لتاج السن الإكلينيكي بحيث تمتد حوافه إلى ما تحت اللثة .

هو تاج اصطناعي يرتكز على دعمة مستدقة بحيث يمكن إدخاله في مكانه ونزعه دون أية معيقات .

تاجٌ مُتَداخل **telescopic crown**

هو تاج صَناعي ذو جزئين ، بحيث يثبت الجزء الداخلي منهما على تاج السن المحضرة بواسطة إسمنت تثبيت لاصق ، ثم يثبت الجزء الخارجي فوقه . يستعمل للتغلب على مشاكل توازي الأسنان الداعمة عند تهيئة الأسنان لاستقبال جسر .

تاجٌ مُؤَقَّت **temporary crown**

هو تاج كامل مصنوع من الراتين أو الأكريليك أو الألومينيوم ، أو الفولاذ الصامد ، والذي يستعمل لحماية السن المحضرة والأنسجة الرخوة المحيطة بها . بحيث يمكن نزعه بسهولة ، ويحافظ على إطباق الأسنان وعلى السن المحضرة ، ريثما يتم الانتهاء من صنع التعويض الدائم .

تاجٌ قِشْريٌّ جُزْئيّ **three-quarter crown**

هو تاجَ اصطناعي يغطي بشكل رئيسي ثلاثة سطوح من الأسنان الأمامية (الإنسي واللساني والوحشي) ، وأربعة سطوح من الأسنان الخلفية (الإنسي والوحشي واللساني والإطباقي) ؛ يستعمل كمثبتة لجسر أو كترميم لسن منفردة على سن مكسورة ومصاب بالتسوس . يسمى أيضاً تاجٌ مُغَطًى جزئيًا بكسْوَة خَزَفيَّة (Partial veneer crown) .

تاجٌ ذُو قطْعتَين **two-piece crown**

هو تاجَ اصطناعي مصنوع من شريط معدني يحيط بالسن ، وغطاء معدني مطرق على سطحه الإطباقي .

تاجٌ مَعْدنيٌّ مُغَطًّى بكِسْوَةٍ خَزَفيَّة **veneered metal crown**

هوَ تاجٌ اصطَناعي تتوضع عليه طبقة رقيقة من الراتين ، أو الخزف على السطح الشدقي أو الشفوي ، تلتحم على المعدن المصبوب ؛ يسمى أيضاً تاجٌ نافذيّ (Window crown) .

تاجٌ دعاميّ **post crown**

هو تاجٌ ذُو صائر أو أي تاج اصطناعي يثبت بوتد داخل قناة الجذَر .

انظر تحت pivot crown .

تاجٌ مُثَبَّتٌ بوتَد **post-retained crown**

انظر تحت post crown .

الإكْليلُ المُتَشَعِّع **radiating crown**

اَنظر تحت corona radiate .

تاجُ ريتْشمُونْد **Richmond crown**

هو تاج اصطناعي يتكون من قاعدة معدنية تنطبق على السطح المحضر ، أو جدعة الجذر الطبيعي ، وتحمل وتداً أو محوراً يتم إدخاله في قناة الجذر ، ووجه خزفي مدعم بأساس معدني .

تاجٌ غَيرُ مَختوم **seamless crown**

هو تاج قشري محضر من قبعة معدنية دون أي لحام .

تاجٌ ذُو صَدَفَة **shell crown**

هو تاج اصطناعي يوضع بشكل صدفة أو قلنسوة على القسم المتبقي من التاج الطبيعي للسن ؛ ويملأ الفراغ بين الصدفة والتاج بإسمنت التثبيت . يسمى أيضاً التاج ذو القلنسوة (Cap crown) .

تاجٌ كَتفيّ **shoulder crown**

هو تاج مشكل عند قاعدته بحيث يستقر على الجذر المحضر دون شريط معدني .

تاجٌ ذُو وتَد مُنْشَطِر **split-dowel crown**

هو تاج نزّوع يرتكز على جذر السن بواسطة وتد منفصل يثبت داخل قناة الجذر المبطنة بالذهب .

تاجٌ فولاَذيّ **steel crown**

هو تاج صَناعي مصنوع من الفولاذ .

التَّاجُ الشَّريطيّ **strip crown**

هو تاج صناَعي بشكل شريط يحيط بالسن المحضرة .

تاجٌ مَصْبوبٌ على قَلَنْسُوَة **swaged cast crown**

تاج مستدق **tapered crown**

ذو شكل يشبه الصليب .

crucible **بُوتقة**

وعاء يستخدم لصهر المواد المقاومة للانصهار .

clay crucible **بُوتَقَةٌ فَخَّارِيَّة**

هي بوتقة لصهر المعادن مصنوعة من الفخار .

crucible cradle **سَرِيرُ البوتَقَة**

هو مسند توضع عليه البوتقة بحيث يمكن نقلها وتحريكها دون التعرض لحرارتها الشديدة .

crucible former **مُشكِّلُ البوتَقَة**

هي قاعدة الصب ؛ و قاعدة يثبت عليها النموذج الشمعي .

انظر تحت sprue base .

crucible tongs **مِلْقَطُ البوتَقَة**

ملقط للإمساك بالبوتقة عند تحريكها أو تبريدها .

quartz crucible **بُوتَقَةٌ من الكوارتز**

بوتقة لصهر المعادن مصنوعة من الكوارتز .

cruciform **صَلِيبيُّ الشَّكل**

ذو شكل يشبه الصليب .

crude **خام**

في شكل خام أو غير مكرر .

cruentation **نَزُّ الجُثَّة**

crufomate **كرُوفومات**

دواء بيطريّ مُضادٌّ للدِّيدان في الحَيَوان .

crunch **صَرْصَرَة**

هي أصوات تسمع عند تسمع الصدر .

cruor **جُلْطَة**

هي الجلطة الدموية .

انظر تحت blood clot .

crura **سيقان (ف:ساق)**

(=sing.crus)

صيغة الجمع من مصطلح ساق (Crus) .

crural **ساقِيّ**

يشير إلى الساق أو إلى بنية تشبه الساق .

crureus **العَضَلَة المُتَّسِعَة الوُسْطى**

انظر تحت musculus vastus intermedius .

cruris **ساقي**

verrucous crown **تاجٌ ثُؤْلولِيّ**

فرط نمو شبيه بالثؤلول على ميناء تاج السن .

window crown **تاجٌ نافذِيّ**

انظر تحت veneered metal crown .

crown-heel **التَّاجُ ـ العَقِب**

هي مسافة تستخدم في قياس طول الجنين .

crowning **تَوَجان**

هو طور من المرحلة الثانية من المخاض حين يصبح جزء كبير من فروة رأس الجنين ظاهراً من خلال فوهة المهبل ، ويكون العجان متمدداً .

crownwork **1 ـ صَبُّ التَّاج**

2 ـ التَّاجُ

1 ـ صنع التاج أو التيجان الاصطناعية ، أو تثبيتها على الأسنان .

2 ـ التاج نفسه عندما يكون في مكانه من الفم .

Crozat appliance **طبيقة كروزات،**

clasp **ومشبكة كروزات**

[طبيقة منسوبة للطبيب جورج ب. كروزات (George B.Crozat) ، وهو طبيب أسنان أمريكي ، ولد عام 1876] .

انظر تحت appliance .

انظر تحت clasp .

crozat **كروزات**

[نسبة إلى الطبيب جورج ب. كروزات (George B.Crozat)] ، وهي طبيقة كروزات (Crozat appliance) ، وهي طبيقة لتقويم الأسنان .

cruces (sing.crux) **صُلْبان (ف:صَليب)**

صيغة الجمع من مصطلح صليب (Crux) .

cruces pilorum **صلبان الشعر**

هي أشكال تشبه الصلبان ، والتي تتكون بحسب أنماط نمو الشعر ، حيث تنمو الأشعار في اتجاهات متعاكسة .

crucial **1 ـ عَصيب**

2 ـ حاسِمٌ

شديد أو وخيم ؛ بحثي ؛ قطعي .

cruciate **صَلِيبيُّ الشَّكل**

صيغة الإضافة من مصطلح ساق (Crus) .

cruritis **التِهابُ الوَريدِ الأَبْيَضُ المُؤْلِم**

انظر تحت phlegmasia alba dolens .

crurogenital **فخِذيٌّ تناسُلِيٌّ**

يتعلق بكل من الفخذ والمنطقة التناسلية .

curoscrotal **فخِذِيٌّ صَفَنِيٌّ**

يتعلق بكل من الفخذ والصفن معاً .

crurotomy **1ـ قطعُ السَّاق**

2ـ قطعُ ساقِ الركاب

القطع الجراحي لساق في الركاب ، عادة ما تكون الساق الأمامية .

crus TA (pl.crura) **ساق (ج: سيقان)**

1ـ هو الجزء من الرجل الواقع بين الركبة والقدم

2ـ مصطلح عام يطلق على بنية ذات شكل يشبه الساق .

crus I **الساق I**

هو الفُصَيص الهلاليّ العُلْويّ .

انظر تحت lobulus semilunaris superior

crus II **الساق II**

هو الفُصَيص الهلاليّ السفلي .

انظر تحت lobulus semilunaris inferior .

ampullary membranous crura of semicircular duct **السِّيقانُ الغشائية الأمبوليَّةُ للقَنَوات الهلاليَّة**

انظر تحت crura membranacea ampullaria ductus semicircularis .

ampullary osseous crura **السِّيقانُ العَظْميَّةُ الأَمْبوليَّة**

انظر تحت crura ossea ampullaria .

anterior crus of anterior inguinal ring **السَّاقُ الأماميَّةُ للحَلَقَة الأُرْبِيَّة الأماميَّة**

انظر تحت crus mediale anuli inguinalis superficialis .

anterior crus of internal capsule **السَّاقُ الأماميَّةُ للمحفَظَة البَاطنَة**

انظر تحت crus anterius capsulae internae .

anterior crus of stapes **السَّاقُ الأماميَّةُ للرِّكاب**

انظر تحت crus anterius stapedis .

common membranous crus of semicircular duct **السَّاقُ الأصْليَّةُ الغشائيَّةُ للقَنَوات الهَلاليَّة**

انظر تحت crus membranaceum commune ductus semicircularis .

common osseous crus **السَّاقُ العَظْميَّةُ الأَصْلِيَّة**

انظر تحت crus osseum commune .

crura anthelicis TA **سيقانُ الوَتَرَة**

هما الحرفان الواقعان على الأذن الظاهرة ، واللذان يؤشران إلى موضع النهاية العلوية للوترة ، ويربطان الحفرة المثلثة ؛ تسمى أيضاً أطراف الوترة (Limbs of anthelix) .

crura diaphragmatis **سيقانُ الحجاب**

هي السَّاقُ اليُمنَى للحجاب (Crus dextrum diaphragmatic) ، والسَّاقُ اليُسرَى للحجاب (crus sinistrum diaphragmatic) .

crura membranacea ampullaria ductus semicircularis TA **السِّيقانُ الغشائيَّة للقَنَوات الأَنْبوليَّة الهلاليَّة**

هيَ نَهايات الأقنية الهلالية في الأذن ، والتي تتوضع فيها الأنبولة الغشائية .

crura membranacea TA **السِّيقانُ الغشائيَّة**

هما نهايتا كل من القناتين الهلاليتين في الأذن ، والتي تنفتح كل منهما على القريبة . السَّاقُ الغشائيَّةُ للقَنَاة الهلاليَّة الأَصْليَّة (Crus membranaceum commune ductus semicircularis) ، والسَّاقُ الغشائيَّةُ البَسيطَةُ للقَناة الهلاليَّة (Crus membranaceum simplex ductus semicircularis) .

crura of anthelix **سيقانُ الوَتَرَة**

انظر تحت crura anthelicis .

crura of diaphragm **سيقانُ الحجاب**

انظر تحت crura diaphragmatis .

ويرتبط بالجدار الخلفي للجوف الطبلي بواسطة الرباط السنداني الخلفي ؛ يسمى أيضاً طرف السندان القصير (Short limb of incus) ، أو النتوء القصير للسندان (Short process of incus) .

السُّوَيقَةُ المُخَيخيَّةُ المُتَّجهَةُ نَحوَ الجِسْر **crus cerebelli ad pontem**

هي السُّوَيقَةُ المُخَيخيَّةُ المُتَوسِّطَة .

انظر تحت pedunculus cerebellaris medium .

السَّاقُ الدِّماغيَّة **crus cerebri TA**

1 ـ هو الجزءَ الواقع أمام السوداء ، والمكون من حزمة ضخمة من سبل الألياف العصبية ، والتي تدعى قاعدةُ السُّوَيقَتَين الدِّماغيَّتَين ؛ تسمى أيضاً (Pars anterior pedunculi cerebri) ، أو الجُزْءُ الأماميُّ للسُّوَيقات المُخِّيَّة (Anterior part of cerebral peduncle) .

2 ـ قاعدةُ السُّوَيقتَين الدِّماغيَّتَين .

انظر تحت basis pedunuli cerebri .

ساقُ البَظْر **crus clitoridis TA**

استمرارية كل من الجسمين الكهفيين البظريين ، التي تنحرف في الخلف لترتكز على الرأدين الإسكيين العانيين .

السَّاقُ الأصْليَّةُ للنَّفَق الهلالي **crus commune canalis semicircularis**

انظر تحت crus osseum commune .

السَّاقُ اليُمْنَى للحجاب **crus dextrum diaphragmatis TA**

هو شريط ليفي عضلي ينشأ من الفقرات القطنية العلوية الثلاثة أو الأربعة ، ويصعد بمحاذاة الساق اليسرى لينغرس في الوتر المركزي للحجاب .

السَّاقُ اليُمْنَى للحُزْمَة الأذَينيَّة البُطَينيَّة **crus dextrum fasciculi atrioventricularis TA**

هو مجموعة متميزة من الحزم ، والتي تنشأ من جذع الحزمة الواقعة عند النهاية العلوية للجزء العضلي للحاجز بين البطينين ؛ وتنزل لتتوزع

انظر تحت crus dextrum diaphragmatis .

انظر تحت crus sinistrum diaphragmatis .

سيقان السندان **crura of incus**

هما السَّاقُ القَصيرَةُ للسَّنْدان (Crus breve incudis) ، والسَّاقُ الطويلة للسَّنْدان (Crus longum incudis) .

سيقان الركاب **crura of stapes**

هما السَّاقُ الأماميَّةُ للرِّكاب (Crus anterius stapedis) ، والسَّاقُ الخَلْفيَّةُ للرِّكاب (Crus posterius stapedis) .

السِّيقانُ العَظْميَّةُ الأمْبوليَّة **crura ossea ampullaria TA**

هي تلك الأجزاء من الأقنية الهلالية العظمية في الأذن ، والتي تنغرس في السيقان الغشائية الأمبولية للأقنية الهلالية .

السِّيقانُ العَظْميَّة **crura ossea TA**

هي تلك الأجزاء من الأقنية الهلالية العظمية في الأذن ، والتي تنغرس في السيقان الغشائية الموافقة لها في التسمية للأقنية الهلالية .

انظر تحت crura ossea ampullaria .

انظر تحت crus osseum commune .

انظر تحت crus osseum simplex .

السَّاقُ الأماميَّةُ للمحْفَظَة الباطنَة **crus anterius capsulae internae TA**

هو الجزء من المَحفظة الباطنة للدماغ الذي يفصل بين المذنب والنواة العدسية ؛ ويحتوي على الشعع المهادية الأمامية ، والسَّبيلُ الجَبْهيُّ الجِسْريّ .

السَّاقُ الأماميَّةُ للرِّكاب **crus anterius stapedis TA**

هو الطرف الأمامي من بين الطرفين العظميين اللذين يربطان بين الصفيحة القدمية والرؤيس في الركاب . يسمى أيضاً طرف الركاب الأمامي (Anterior limp of stapes) .

السَّاقُ القَصيرَةُ للسَّنْدان **crus breve incudis TA**

هو النتوء الذي يبرز باتجاه الخلف من السندان

انظـــر تحـــت cornu inferius marginis falci- formis .

السَّاقُ الوَحْشِيَّةُ للحَلَقَةِ الأُرْبِيَّةِ السَّطْحِيَّة **crus laterale annuli inguinalis superficialis TA**

هو الجـزء من الحلقة الأربيـة السطحيـة الذي يلتحم مع الأربطة الأربية فيما تتجه باتجاه الحدبة العانية ؛ تسمى أيضاً السَّاقُ السُّفْلِيَّةُ للحَلَقَةِ الأُرْبِيَّـــة تَحْتَ الجِلْد (Crus inferius annuli inguinalis subcutanei) ، أو الســـاق الظاهرة للحلقـة الأربيـة الأمـاميـة (External crus of anterior inguinal ring) أو الســاق الخلفـيـــة للحلقـة الأربيـة الأمـاميـة (Posterior crus of anterior inguinal ring) .

السَّاقُ الوَحْشِيَّةُ للغُضْروف الجَناحيِّ الكَبير **crus laterale cartilaginis alaris majoris TA**

هوالجزء من الغضروف الجناحي الكبير الذي ينحني بالاتجاه الوحشي حول المنخر ، ويساعد في المحافظة على كفافه .

السَّاقُ الطَّويلَةُ للسَّنْدان **crus longum incudis TA**

هو نتوء على السندان ، والذي يكون متجه إلى الأسفل والداخل ، ومـواز لقـبـضـة المطرقـة ؛ يسمى أيضاً طرف السندان الطويل (Long limb of incus) أو نتــــوء السندان الطـويل (long process of incus) .

السَّاقُ الإِنْسِيَّةُ للحَلَقَةِ الأُرْبِيَّةِ السَّطْحِيَّة **crus mediale annuli inguinalis superficialis TA**

هو الجَزء من الحلقة الأربيـة السطحيـة الذي يرتبط بـالارتفاق ، ويمتـزج مع الرباط المقـلاعي للقضيب ؛ يسمى أيضاً السَّاقُ العُلْوِيَّةُ للحَلَقَةِ الأُرْبِيَّــــة تَحْتَ الجِلْد (Superior corus of subcutaneous lingual ring) ، أو السَّاقُ العُلْوِيَّةُ للحَلَقَـة الأُرْبِيَّـة تَحْتَ الجِلْد (Crus superius anuli innguinalis subcutanei) ، أو الســـــاق حـول بطين القلب الأيمن على شكل الشبكة الانتهائية لألياف بوركيني التي تتمادى مع الألياف العضلية البطينية القلبية . تسمى أيضاً الحـزيمة اليـمنى (Right bundle branch) ، أو الفرع الأيمن للحزمة الأذينية البطينية (Right branch of atrioventricular bundle) .

السَّاقان اليُمْنَى واليُسْرَى للحُزْمَة الأَذَيْنِيَّة البُطَينيَّة **crus fasciculi atrioventricularis TA (dextrum et sinistrum)**

هي السَّاقُ اليُسْرَى للحُزْمَة الأُذَيْنِيَّة البُطَينيَّة والسَّاقُ اليُمْنَى للحُزْمَة الأذَيْنِيَّة البُطَينِيَّة .

انظر تحت crus sinistrum fasciculi atrioventri- cularis .

انظر تحت crus dextrum fasciculi atrioventri- cularis .

ساقُ القَبْو **crus fornicis TA**

أي من الشريطين المسطحين من المادة البيضاء للدماغ المجاورين لشريط الدماغ ، واللذين يتحدان تحت الجزء الخلفي من الجسم الثفني ليكونا جسم القبو .

ساقُ حَشَفَةَ البَظْر **crus glandis clitoridis**

هو لُجَيمُ البَظْر .

انظر تحت frenulum clitoridis .

ساقُ حتار الأُذُن **crus helicis TA**

هي النهاية الأمامية لجدار الأذن الظاهرة والواقعة فوق مدخل الصماخ السمعي الظاهر ؛ تسمى أيضاً عرف جدار الأذن (Crista helices) .

السَّاقُ السُّفْلِيَّةُ للحَلَقَةِ الأُرْبِيَّة تَحْتَ الجِلْد **crus inferius annuli inguinalis subcutanei**

هي السَّاقُ الوَحْشِيَّةُ للحَلَقَةِ الأُرْبِيَّة السَّطْحِيَّة .

انـظـر تحـت crus laterale annuli inguinalis superficialis .

الساق السفلية للحافة المنجلية **crus inferius marginis falciformis**

تسميـة بديلة لمصطلح القَرْنُ السُّفْلِيُّ للحَافَة المنجَلِيَّة

الأذن ، والذي ينغرس في الساق الغشائية الأصلية للقناة الهلالية ؛ يسمى أيضاً السَّاقُ الأَصْلِيَّةُ للنَّفَق الهلالي (Crus commune canalis semicircularis) .

السَّاقُ العَظْمِيَّةُ البَسيطَة **crus osseum simplex TA**

هو ذلك الجزء من القناة الهلالية العظمية في الأذن ، والذي ينغرس في الساق الغشائية البسيطة للنفق الهلالي ؛ يسمى أيضاً السَّاقُ البَسيطَةُ للنَّفَق الهلالي (Crus simplex canalis semicircularis) .

ساقُ القَضيب **crus penis TA**

استمرارية كل من الجسمين الكهفيين للقضيب ، واللذين يتحدان في المنطقة الخلفية ليلتحما مع القوس العانية .

السَّاقُ الخَلْفيَّةُ للمحفَظَةَ البَاطنَة **crus posterius capsulae internae TA**

هو ذلك الجزء من المحفظة الباطنة للدماغ الذي يفصل المهاد عن النواة العدسية ؛ وظيفتها المعروفة الأساسية هي توصيل الألياف الحركية الصادرة المبتعدة عن القشرة من القشرة المخية ، كما أنها تحمل امتدادات عصبية أخرى . وتتكون من الجزء المهادي العدسي والجزء تحت الطبقة العدسية والجزء خلف الطبقة العدسية .

السَّاقُ الخَلْفيَّةُ للرِّكاب **crus posterius stapedis TA**

هو الطرف الخلفي من بين الطرفين العظميين اللذين يصلان بين الصفيحة القدمية ورؤيس الركاب ؛ تسمى أيضاً الطرف الخلفي للركاب (Posterior limb of stapes) .

الساق الأولية للفصيص عروي الشكل **crus primum lobuli ansiformis**

تسمية بديلة لمصطلح الفُصَيصُ الهلالي العُلْويّ (Lobulus semilunaris superior) .

الساقَ الثانوية للفصيص عروي الشكل **crus secundum lobuli ansiformis**

تسمية بديلة لمصطلح الفُصَيصُ الهلاليُّ السفلي الأمامية للحلقة الأربية الأمامية (Anterior crus of anterior inguinal ring) ، أو الساق الباطنة للحلقة الأربية الأمامية (Internal crus of anterior inguinal ring) ، أو الرباط الأربي الأمامي (Anterior inguinal ligament) ، أو الرباط الأربي الباطن (Internal inguinal ligament) .

السَّاقُ الإنْسيَّةُ للغُضْرُوفَ الجَناحيِّ الكَبير **crus mediale cartilaginis alaris majoris TA**

هو الجزء من الغضروف الجناحي الكبير الذي يرتبط بشكل غير محكم بنظيره من الطرف المقابل ، ويساعد في تكوين الحاجز الأنفي المتحرك ؛ يسمى أيضاً السَّاقُ الغائرَةُ للغُضْروف الجَناحيِّ الأنْفيِّ الكَبير.

السَّاقُ الغشائيَّةُ للقَنَاة الهلاليَّة الأَصْليَّة **crus membranaceum commune ductus semicircularis TA**

هي منطقة تتكون من النهايات غير الأمبولية الملتحمة للأقنية الهلالية الأمامية والخلفية في الأذن .

السَّاقُ الغشائيَّةُ البَسيطَةُ للقَنَاة الهلاليَّة **crus membranaceum simplex ductus semicircularis TA**

هيَ النَهاية غير الأمبولية للقناة الهلالية الوحشية في الأذن والتي تنفتح على القريبة .

ساقُ البَظْر **crus of clitoris**

انظر تحت crus clitoridis .

ساقُ القَبْو **crus of fornix**

انظر تحت crus fornicis .

ساقُ حتار الأُذُن **crus of helix**

انظر تحت crus helices .

ساقُ القَضيب **crus of penis**

انظر تحت crus penis .

السَّاقُ العَظْميَّةُ الأَصْليَّة **crus osseum commune TA**

هو ذلك الجزء من القناة الهلالية العظمية في

الأَرْبِيَّة الأَمامِيَّة **anterior inguinal ring**
هو اَلسَّاقُ الوَحْشِيَّةُ للحَلَقَةِ الأَرْبِيَّة السَّطْحِيَّة .
انظر تحت crus laterale annuli inguinalis superficialis .

السَّاقُ الغائِرَةُ للحَلَقَةِ الأَرْبِيَّة الأَمامِيَّة **internal crus of anterior inguinal ring**
انظر تحت crus mediale anuli inguinalis .

السَّاقُ الغائِرَةُ للغُضْروفِ الجَناحيِّ الأَنْفيِّ الكَبير **internal crus of greater alar cartilage of nose**
انظر تحت crus mediale cartiliginis alaris majoris .

السَّاقُ الوَحْشِيَّةُ للغُضْروف الجَناحيِّ الكَبير **lateral crus of greater alar cartilage**
انظر تحت crus laterale cartilaginis alaris majoris .

السَّاقُ الوَحْشِيَّةُ للحَلَقَةِ الأُرْبِيَّة السَّطْحِيَّة **lateral crus of superficial inguinal ring**
انظر تحت crus laterale anuli inguinalis superficialis .

السَّاقُ اليُسْرَى للحجاب **left crus of diaphragm**
انظر تحت crus sinistrum diaphragmatic .

السِّاقُ اليُسْرَى للحُزْمَة الأُذُنيَّة البُطَيَنيَّة **left crus of atrioventricular bundle**
انظر تحت crus sinistrum fasciculi atrioventricularis .

السَّاقُ الطَّويلَةُ للسِّنْدان **long crus of incus**
انظر تحت crus longum incudis .

السَّاقُ الإِنْسِيَّةُ للحَلَقَة الأَرْبِيَّة اَلظَّاهِرَة **medial crus of external inguinal ring**
هو اَلرِّبَاط الأربي المنعكس .
انظر تحت ligamentum inguinale reflexum .

السَّاقُ الإِنْسِيَّةُ للغُضْروف الجَناحِيِّ الكَبير **medial crus of greater alar cartilage**
(Lobulus semilunaris inferior) .

السَّاقُ البَسيطَةُ للنَّفَق الهلاكي **crus simplex canalis semicircularis**
انظر تحت crus osseum simplex .

السَّاقُ اليُسْرَى للحجاب **crus sinistrum diaphragmatis TA**
هو شَريط ليفي عضلي ينشأ من من أول فقرتين أو ثلاث فقرات قطنية علوية ، ويصعد بمحاذاة الساق اليمنى لينغرس في الرباط المركزي للحجاب .

السِّاقُ اليُسْرَى للحُزْمَة الأُذُنيَّة البُطَينيَّة **crus sinistrum fasciculi atrioventricularis TA**
هي مَنظومة مبعثرة من الحزم التي تنشأ من جدعة الحزمة الموجودة في النهاية العلوية للجزء العضلي من الحاجز الأذيني البطيني ؛ وتتمادى على شكل صحيفة مسطحة ، تنقسم عادة إلى طرفين أمامي وخلفي ، وتهبط لتتوزع في العضلات الحليمية للبطين الأيسر على شكل شبكة انتهائية من ألياف بوركيني ، والتي تتمادى مع الألياف العضلية القلبية البطينية . تسمى أيضاً الحزيمة اليسرى (Left bundle branch) ، أو الفرع الأيسر للحزمة الأذينية البطينية (Left branch of atrioventricular bundle) .

السَّاقُ العُلْويَّةُ للحَلَقَة الأَرْبِيَّة تَحْتَ اَلجِلْدَ **crus superius annuli inguinalis subcutaneae**
هي السَّاقُ الإِنْسِيَّةُ للحَلَقَة الأَرْبِيَّة السَّطْحِيَّة .
انظر تحت crus mediale annuli inguinalis superficialis .

الساق العلوية للحافة المنجلية **crus superius marginis falciformis**
تسمية بديلة لمصطلح القَرْنُ العلوي للحافة المنْجَليَّة (Cornu superius marginis falciformis) .

السَّاقُ الظَّاهِرَةُ للحَلَقَة **external crus of**

هي السُّوَيقَةُ المُخَيخيَّةُ المِنْقاريَّة .
انظر تحت pedunculus cerebellaris rostralis .

السَّاقُ العُلْويَّة للحَلَقَةِ الأُرْبيَّة تَحْتَ الجِلْد **superior crus of subcutaneous inguina ring**
هي السَّاقُ الإِنْسيَّةُ للحَلَقَةِ الأُرْبيَّة السَّطْحيَّة .
انظر تحت crus mediale anuli inguinalis superficialis .

إصابة هَرْسِيَّة **crush injury**
هي إصابة تؤدي إلى انهراس أو انسحاق الجسم أو العضو .

هَرْس **crushing**
انضغاط شديد يصيب الجسم أو العضو .

crusotomy **1ـ قطعُ السَّاقِ**
2ـ قطعُ ساقِ الركاب
انظر تحت crurotomy .

جُلْبَة **crust**
1ـ طبقة خارجية متشكلة ، وبخاصة طبقة من مادة صلبة تتكون نتيجة جفاف نضحة أو إفرازات من الجسم .
2ـ جلبة .
انظر تحت scab .

جُلْبَةُ اللَّبَن **milk crust**
انظر تحت crusta lactea .

جُلْبَة (ج: جُلَبات) **crusta (pl.crustae)**
انظر تحت crust .

الجُلْبَةُ الميناِئيَّةُ العاجيَّة **crusta adamantina dentium**
هي المِيناء الأسنان .
انظر تحت enamel .

جُلْبَةُ اللَّبَن **crusta lactea**
هو مث (Seborrhea) يشاهد على فروة رأس الرضع ؛ ويسمى أيضاً (Milk crust) أو قرف اللبن (Cradle cap) .
انظر تحت milk crust .

الجُلْبَةُ الصَّخْريَّةُ للميناء **crusta petrosa dentis**
هو المِلاَط .

انظر تحت crus mediale cartilaginis alaris majoris .

السَّاقُ الإِنْسيَّةُ للحَلَقَةِ الأُرْبيَّة السَّطْحيَّة **medial crus of superficial inguinal ring**
انظر تحت crus mediale anuli inguinalis superficialis .

السِّيقانُ الغشائيَّة **membranous crura**
انظر تحت crura membranacea .

السِّيقانُ العَظْميَّة **osseous crura**

السَّاقُ الخَلْفيَّةُ للحَلَقَةِ الأُرْبيَّة الأَمَاميَّة **posterior crus of anterior inguinal ring**
هي السَّاقُ الوَحْشيَّةُ للحَلَقَةِ الأُرْبيَّة السَّطْحيَّة .
انظر تحت crus laterale anuli inguinalis superficialis .

السَّاقُ الخَلْفيَّةُ للمحفَظَةِ البَاطنَة **posterior crus of internal capsule**
انظر تحت crus posterius capsulae internae .

السَّاقُ الخَلْفيَّةُ للرِّكاب **posterior crus of stapes**
انظر تحت crus posterius stapedis .

السَّاقُ اليُمْنَى للحجاب **right crus of diaphragm**
انظر تحت crus dextrum diaphragmatis .

السَّاقُ اليُمْنَى للحُزْمَة الأُذَينيَّة البُطَينيَّة **right crus of atrioventricular bundle**
انظر تحت crus dextrum fasciculi atrioventricularis .

السَّاقُ القَصيرَةُ للسَّنْدان **short crus of incus**
انظر تحت crus breve incudis .

السَّاقُ الغشائيَّةُ البَسيطَةُ للنَّفَق الهلالي **simple membranous crus of semicircular duct**
انظر تحت crus membranaceum simplex ductus semicircularis .

السَّاقُ العَظْميَّةُ البَسيطَة **simple osseous crus**
انظر تحت crus osseum simplex

السُّوَيقَةُ العُلْويَّةُ للمُخَيخ **superior crus of cerebellum**

هي عكاز ثلاثية الأرجل .

انظر تحت triceps crutch .

عكاز الساعد **forearm crutch**

هو عكاز تكون قمته عند مستوى الساعد ، ويكون له عارضة لقبضة اليد ، وإسوار يحيط بالمعصم لزيادة الثبات .

عكاز لوفتستراند **Loftstrand crutch**

هو أكثر أنواع عكاز الساعد شيوعاً ، وتتكون من قضيب من الألومينيوم ، والذي ينحني قليلاً باتجاه الخلف أعلى قليلاً من مستوى قبضة اليد .

عُكَّازٌ عجانيَّة **perineal crutch**

عكاز ثلاثيـة الأرجل **triceps crutch**

هي عكاز تتكون من عمودين يمتدان إلى منتصف المسافة ما بين المرفق والكتف ، مع قطعة معترضة لليد ، وجزء ذراعي علوي منحن يسند عليه الشخص الجزء الأعلى من ذراعه .

ضمور كروفييه، داء كروفييه ، إلخ. **Cruveilhier atrophy, disease, etc.**

[ضمور أو داء منسوب للطبيب جان كروفييه (Jean Cruveilhier) ، وهو اختصاصي باثولوجيا فرنسي المولد ، عاش ما بين 1791-1874] .

انظر تحت spinal muscular atrophy .

انظر تحت articulatio atlanto-occipitalis .

نظر تحت fascia perinea superficial .

انظر تحت ligamenta palmaria articulationum interphalangearum manus .

انظر تحت ligamenta palmaria articulationum metacarpophalangealium .

انظر تحت disease .

متلازمة (تشمع) كوفييه ـ باومجارتن **Cruveilhier-Baumgarten syndrome (cirrhosis)**

[متلازمة أو تشمع منسوب للطبيب إلى جان كروفييه (Jean Cruveilhier) ، والطبيب بول كليمان فون باومجارتن (Paul Clemens Von

انظر تحت cementum .

الجُلْبَةُ الشَّهْباء **crusta phlogistica**

هي الغلالَةُ الشَّهْباء .

انظر تحَتَ buffy coat .

الجُلْبَةُ الجَذْرِيَّة **crusta radicis**

هو الملاَط .

انظر تحت cementum .

القِشْرِيَّات **Crustacea**

هو صنف ضخم من المفصليات ، والتي تتضمن السلطعون وسرطان البحر وجراد البحر وقمل الخشب وبرغوث الماء والدبق .

كراسْتاسِيُورُوبين **crustaceorubin**

هو صباغ ياقوتي اللون (بروتين ملون) يوجد في أصداف وبيوض بعض أنواع سرطان البحر ؛ يسمى أيضاً زونيريثين (Zoonerythrin) ، أو فيتلوروبين (Vitellorubin)

جُلبات (ف:جُلبَة) **crustae (sing.crusta)**

صيغة الإضافة والجمع من جلبة (Crusta) .

جُلبَوِيّ **crustal**

نسبة إلى جلبة (Crusta) .

ذو جُلبَة **crustosus**

أي أنه مجلب ، وهو وصف يطلق على آفات جلدية معينة .

عُكَاز **crutch**

1 ـ أداة من الخشب أو المعدن ، يكون طولها في المعتاد متناسباً مع المسافة ما بين الإبط والأرض ، ويكون لها سطح محدب تستند عليه الذراع وعارضة لقبضة اليد ، وتستعمل لتساعد على حمل وزن الجسم .

2 ـ المنطقة العجانية ، وخاصة عند الحيوانات من غير البشر .

عُكَّازٌ إِبْطيَّة **axillary crutch**

أي مِنَ أنواع العكازات المختلفة التي يكون لها جسم صلب طويل ودعامة مغلفة ، ويتم وضع الإبط عليها ، ولها دعامة أقصر عند مستوى الخصر تتناسب مع قبضة اليد .

عُكَّازٌ كَنَدِيَّة **Canadian crutch**

Baumgarten) ، *وهو اختصاصي باثولوجيا ألماني* ، *1928-1848]* ، وهو تشمع مترافق بأوعية سرية رادفة ، أو هو متلازمة تشمع الكبد والمصاحب بارتفاع ضغط وريد الباب .
انظر تحت cirrhosis .
انظر تحت syndrome .

صَليب (ج:صُلبان) — **crux (pl.cruces)**

انظر تحت cross .

صَليبُ القَلْب — **crux of heart**

هو تقاطع الجدران التي تفصل بين الجانبين الأيمن والأيسر ، وبين حجرات القلب البطينية والأذينية .

صَرْخَة — **cry**

1 ـ صوت مرتفع مفاجئ لا إرادي .
2 ـ إصدار مثل ذلك الصوت المرتفع الحاد .
3 ـ البكاء .
انظر تحت weep .

صَرْخَةٌ مَفْصَليَّة — **arthritic cry**

هي صَرْخَةٌ لَيْليَّة .
انظر تحت night cry .

صَرْخَةٌ مَفْصَليَّة — **articular cry**

هي صَرْخَةٌ لَيْليَّة .
انظر تحت night cry .

صَرْخَةٌ مُخِّيَّة — **cephalic cry**

هي صرخة صاخبة نافذة ذات نبرة عالية توحي عندما يصدرها الطفل حديث الولادة باحتمال وجود أذية داخل القحف بدرجات متفاوتة من الشدة .

صَرْخَةُ الصَّرْع — **epileptic cry**

هي صيحة عالية تصدر عادة عند بدء النوبة الصرعية .

صَرْخَةُ المَوَه الدِّماغيّ — **hydrocephalic cry**

هي صَرْخَةُ الْتِهابَ السَّحايا السُّلِّيّ .
انظر تحت tuberculous meningitis cry .

صَرْخَةٌ مَفْصَليَّة — **joint cry**

هي صَرْخَةٌ لَيْليَّة .
انظر تحت night cry .

صَرْخَةٌ سحائيَّة — **meningeal cry**

صَرْخَةٌ لَيْليَّة — **night cry**

هي صرخة صاخبة يصدرها الطفل عند نومه ، والتي تحدث غالباً في بداية مرض مفصلي ؛ تسمى أيضاً صرخة مفصلية (Arthritic cry) ، أو (Articular cry) ، أو (Joint cry) .

سابقة بمعنى البَرْد ؛ القَرّ — **cry-**

صيغة تسبق الكلام بمعنى البرد أو القر .

فَرْطُ الحَساسِيَّةِ للبَرْد — **cryaesthesia**

انظر تحت cryesthesia .



Canadian Crutch — العكاز الكندية

ألَمُ التَّبْريد — **cryalgesia**

هو ألم يحدث نتيجة تطبيق البرودة .
انظر تحت psychroalgia .

فِقدانُ حِس البُرودَة — **cryanesthesia**

هو فقدان القدرة على الإحساس بالبرودة .
انظر تحت temperature sense .

رافعة كراير — **Cryer's elevator**

[هي رافعة منسوبة للطبيب إلى ماثيو هنري كراير (Matthew Henry Cryer) ، *وهو جراح أمريكي ، عاش ما بين 1921-1840]* .
انظر تحت elevator .

فَرْطُ حَساسِيَّةِ البَرْد — **cryesthesia**

هو التحسس غير الطبيعي للبرودة .

حرارة منخفضة ، وعادة ما تكون عبارة عن غمس تلك المواد في نتروجين سائل في درجة حرارة (-196.5) درجة مئوية .

cryobiology **البيولوجيا البَرْدِيَّة**

هو العلم الذي يتناول آثار درجات الحرارة المنخفضة على النظم البيولوجية المختلفة .

cryocardioplegia **شَلَلُ القلبِ بالبَرْد**

هو توقف تقلص العضلة القلبية نتيجة تبريد القلب أثناء الجراحة القلبية .

cryocautery **كي بردي، مِكواة بَرْدِيَّة**

هو الكي عن طريق تطبيق مواد ، مثل النتروجين السائل أو ثلج ثنائي أكسيد الكربون ، أو أجهزة تدمر الأنسجة بواسطو تجميدها ؛ يسمى أيضاً الكي البارد (Cold cautery) .

cryocoagulation **تخثيرٌ بالبَرْد**

cryocrit **مِكداسٌ بَرْدِيّ**

حجم الجلوبولين البردي المتثفل عند التنبيذ البارد للمصل في درجة حرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية .

cryode **المستخرِجُ البَرْدِيّ**

هو مسبار بردي يستخدم في استخراج عدسة العين بالتبريد .

انظر تحت cryophake .

cryoextraction **استئصالٌ بَرْدِيّ**

هو تطبيق درجة حرارة منخفضة في عملية إزالة عدسة العين المصابة بالساد ؛ ويتم ذلك من خلال أداة تسمى المسبار البردي أو المستخرج البردي ، وتكون ذروتها شديدة البرودة إلى حد أنها تلتصق بالعدسة (لتكون كرة جليدية) ما يسمح بإزالتها .

cryoextractor **المستخرِجُ البَرْدِيّ**

هو مسبار بردي يستخدم في استخراج عدسة العين بالتبريد .

انظر تحت cryophake .

cryofibrinogen **فِبْرينوجينٌ بَرْدِيّ**

هو فيبرينوجين له خواص فيزيائية غير طبيعية من حيث أنه يترسب في درجات الحرارة

انظر تحت crymodynia .

انظر تحت psychroalgia .

crymo- **سابقة بمعنى البَرْد**

سابقة تشير إلى علاقة مع البرد .

crymoanesthesia **تخديرٌ بالبَرْد**

هو فقد الإحساس المؤقت بالألم ، وذلك نتيجة تطبيق البرودة .

crymodynia **ألمٌ بَرْدِيُّ المَنْشأ**

هو ألم روماتزمي يحدث في الجو البارد أو الرطب .

انظر تحت cryesthesia .

انظر تحت psychroalgia .

crymophilic **بَرْدِيّ**

انظر تحت psychrophilic .

crymophylactic **مُقاوِمُ البَرْد**

انظر تحت cryophylactic .

crymotherapeutics **مُعالجَة بالبَرْد**

انظر تحت cryotherapy .

crymotherapy **مُعالجَة بالبَرْد**

انظر تحت cryotherapy

cryo- **سابقة بمعنى البَرْد**

سابقة تشير إلى علاقة مع البرد .

cryoablation **الاستئصال بالبرودة**

هو إزالة الأنسجة بتدميرها بواسطة تطبيق البرودة الشديدة .

cryoaerotherapy **مُعالجَة بالهَواءِ البارِد**

cryoanalgesia **تسكينٌ بالبَرْد**

هو تسكين الألم بتطبيق البرودة بواسطة مسبار بردي على الأعصاب المحيطة .

cryoanesthesia **تخديرٌ بالبَرْد**

هو تخدير موضعي يجرى بتبريد المنطقة أو العضو إلى ما يقترب من درجة التجمد ؛ يسمى أيضاً تَخْديرٌ بالتَّصْقيع (Frost anaesthesia) ، وتَخْديرٌ تَثْليجي (Refreigeration anaesthesia) .

cryobank **بَنْكٌ بَرْدِيّ**

هي ترتيبات لتجميد وحفظ المواد في درجات

والأمراض التكاثرية اللمفية ، وأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، والذئبة الحمامية المجموعية ومتلازمة شوجرين .

الجلوبولينات البردية من النوع III **type III cryoglobulins**

هي مجموعة من المركبات المناعية التي تحتوي على جلوبولينات مناعية متعددة النسائل ، عادة ما تكون مركبات جلوبولين ـ ضد جلوبولين ، وتتواجد في سياق الأمراض العدوائية واضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، والذئبة الحمامية المجموعية ومتلازمة شوجرين .

وُجودُ الجلوبولينات البَرْدِيَّةِ في الدَّم **cryoglobulinemia**

هي حالة وجود الجلوبولينات البردية في الدم ، والمترافقة بمظاهر إكلينيكية متعددة تشمل ظاهرة رينو ، والفرفرية الوعائية ، وشرى البرد ، ونخر النهايات ، والاضطرابات النزفية والتهاب الأوعية ، وألم المفاصل ، والمظاهر العصبية ، وضخامة الكبد والطحال والْتِهابُ كُبَيبات الكُلَى .

وُجودُ الجلُوبولينات البَرْدِيَّة في الدَّم الأساسيّ المختلط **essential mixed cryoglobulinemia**

هي حالة نادرة تتسم بترسيب الجلوبولينات البردية من النوع II دون سبب واضح ، مما يتسبب في حدوث التهاب الأوعية الجلدية ، والتهاب الزليل ، والتهاب كبيبات الكلى .

هِيدْرات بَرْدِيَّة **cryohydrate**

1 ـ ملح يحتوي على ماء التبلور في درجات حرارة منخفضة .

2 ـ مزيج سهل الانصهار ، وبخاصة ذلك الذي يحتوي على الماء كأحد مكوناته .

3 ـ بلورة يتم الحصول عليها من خلال تجميد محلول فائق التشبع ، والذي يحتوي على المذاب والمذيب بنفس نسبة وجودهما في المحلول .

المنخفضة (4 درجات مئوية) ، ويعود لينحل مرة ثانية في درجة حرارة (37 درجة مئوية) .

فَرْطُ الفيبرينوجين البَرْدِي في الدَّم **cryofibrinogenemia**

حالة وجود الفيبرينوجين البردي في الدم .

جامّاجلوبُولين بَرْدِيّ **cryogammaglobulin**

انظر تحت cryoglobulin .

كريُوجين **cryogen**

مادة تستعمل لخفض الحرارة .

1ـ مُحدِثُ البَرْد **cryogenic**

2 ـ بَرْدِيّ

كل ما هو يتعلق بالحرارة المنخفضة ، أو بما يسبب انخفاض الحرارة .

جلوبُولِينٌ بَرْدِيّ **cryoglobulin**

أي من الجلوبولينات أو مركبات الجلوبولين الموجودة في المصل ، بشكل جلوبولينات مناعية عادة ، التي تترسب في درجات حرارة منخفضة (4 درجات مئوية) ، وتعود لتنحل في حرارة (37 درجة مئوية) ؛ ويمكن تصنيف هذه الجلوبولينات في ثلاث مجموعات تسمى النوع I والنوع II والنوع III .

انظر تحت cryoglobulinemia .

الجلوبولينات البردية من النوع I **type I cryoglobulins**

مجموعة من الجلوبولينات المناعية أحادية النسيلة ، والتي تتواجد أحياناً في حالات خلل المزاج للخلية البلازمية ، أو الأمراض التكاثرية اللمفية مثل الورم النقوي المتعدد ، أو مرض والدنستروم المتعلق بوجود الجلوبولين الكبروي في الدم .

الجلوبولينات البردية من النوع **type II cryoglobulinsII**

هي مجموعة من مركبات الجلوبولينات المناعية المختلطة ذات المكون أحادي النسيلة ، والتي يكون لها نشاط ضد الجلوبولينات المناعية متعددة النسائل ، والتي تتواجد أحياناً في سياق التهاب الكبد ،وخلل المزاج للخلايا البلازمية ،

(برودة) على النسج .

واقٍ مِنَ البَرْد **cryoprotective**

قـادر على الحـمـاية من الأذية الناتجـة عن التجميد ، كما في حالة حماية الجليسرول لكريات الدم الحمراء المجمدة .

بروتين بَرْدِيّ **cryoprotein**

أي بروتين دموي يتسرب عند التبريد ، مثل الجلوبولين البردي ، أو الفبرينوجين البردي .

مِقياسُ دَرَجَةِ الانجماد **cryoscope**

أداة لقياس درجة الانجماد .

متعلق بقِياس دَرَجَة الانجماد **cryoscopical**

نسبة إلى قياس درجة الانجماد .

انظر تحت cryoscopy .

قِياسُ دَرَجَةِ الانجماد **cryoscopy**

هو اختبار السوائل على أساس قاعدة أن درجة تجمد المحاليل تتفاوت بحسب كمية وطبيعة المذاب .

تَشَنُّجٌ بالبَرْد **cryospasm**

رَذاذٌ بَرْدِيّ **cryospray**

ناظِمُ البَرْد **cryostat**

1 ـ جهيزة يمكن بواسطتها المحافظة على مستوى منخفض جداً من الحرارة .

2 ـ في الباثولوجيا وعلم الأنسجة : هو غرفة تحتوي على مشراح دقيق لقطع الأنسجة المجمدة .



ناظم البرد Cryostat

إبْرَة بَرْدِيَّة **cryostylette**

جِراحَة بَرْدِيَّة **cryosurgery**

استِئصالُ النُّخامِيَّةِ بالبَرْد **cryohypophysectomy**

هو تخريب الغدة النخامية عن طريق تطبيق البرودة .

مِقياسُ الحَرارَةِ المُنخَفِضَة **cryometer**

هو مقياس حرارة لقياس درجات الحرارة شديدة الانخفاض .

قَطعُ الكُرَةِ الشَّاحِبَةِ بالبَرْد **cryopallidectomy**

اعْتِلالٌ بَرْدِيّ **cryopathy**

أية حالة مرضية ناتجة عن البرودة .

تَثْبيتُ الشَّبَكِيَّةِ بالبَرْد **cryopexy**

المُسْتَخْرِجُ بالبَرْد **cryophake**

هو مسبار بردي يستخدم في استخراج عدسة العين بالتبريد .

بردي **cryophile**

هو معايش برودي .

انظر تحت psychrophile .

بَرْدِيّ **cryophilic**

هو معايش برودي .

انظر تحت psychrophilic .

مُقاوِمُ البَرْد **cryophylactic**

هو مقاوم لدرجات الحرارة شديدة الانخفاض .

وهو وصف يطلق بعض أنواع الجراثيم .

رُسوبِيَّة بالبَرْد **cryoprecipitability**

إمكانية حدوث الترسب بالبرودة .

رُسابَة بَرْدِيَّة **cryoprecipitate**

أية رسابة تحدث نتيجة البرودة ، مثل الجلوبولينات البردية أو العامل المضاد للناعور .

تَرَسُّبٌ بالبُرُودَة **cryoprecipitation**

هو ترسب مادة من محلول عند تبريده ، مثل العامل المضاد للناعور في مصل الدم .

حِفْظٌ بالبُرُودَة **cryopreservation**

هو المحافظة على عيوشية نسيج أو عضو مستأصل من خلال تخزينه في درجة حرارة شديدة الانخفاض .

مِسْبارٌ بالبَرْد **cryoprobe**

هو أداة لتطبيق حرارة شديدة الانخفاض

القُزَحيَّةُ الصَغيرَة ؛ تسمى أيضاً خبايا فوكس (Crypts of Fuchs) .

خَبايا ليبركون **crypts of Lieberkuhn**

هي الغُدَدُ المعَويَّة .

انظر تحت glandulae intestinales .

خَبايا ليتْر **crypts of Littre**

الغُدَدُ القُلْفيَّة .

انظر تحت glandulae preputiales .

خَبايا اللَّوزَة الحَنَكيَّة **crypts of palatine tonsil**

1 ـ هي الحُفَيراتُ اللَّوزيَّةُ للَّوزَة الحَنكيَّة .

انظر تحت tonsillae fossulae tonsillares palatinae .

2 ـ هي الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة الحَنَكيَّة .

انظر تحت tonsillae cryptae tonsillares palatinae .

خَبايا اللَّوزَة البُلْعوميَّة **crypts of pharyngeal tonsil**

1 ـ هيَ الحُفَيراتُ اللَّوزيَّةُ للَّوزَة البلعومية .

انظر تحت tonsillae fossulae tonsillares pharyngeae .

2 ـ هي الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة البلعومية .

انظر تحت tonsillae cryptae tonsillares pharyngeae .

خَبايا اللِّسان **crypts of tongue**

هي الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة اللسانية .

انظر تحت tonsillae cryptae tonsillares lingualis .

خَبايا تيسون **crypts of Tyson**

هي الغُدَدُ القُلْفيَّة .

انظر تحت glandulae preputiales .

خَبيئَةٌ سِنِّيَّة **dental crypt**

هي خبيئة السن .

انظر تحت tooth crypt .

خَبيئَةٌ مينائيَّة **enamel crypt**

هي مسافَة محاطة بالصفائح المينائية على كل من طرفيها ويجاورها كذلك عادة عضو الميناء ، وتكون ممتلئة باللحمة المتوسطة .

تخريب الأنسجة بواسطة تطبيق برودة شديدة عليها ، وهي عملية تستخدم في بعض أنواع الجراحات داخل القحفية والجراحات الجلدية .

قطعُ المِهاد بالبَرْد **cryothalamectomy**

انظر تحت cryothalamotomy .

قطعُ المِهاد بالبَرْد **cryothalamotomy**

تخريب جزء من المهاد عن طريق تطبيق برودة شديدة عليه .

مُعالجَة بالبَرْد **cryotherapy**

الاستعمال العلاجي للبرودة . يسمى أيضاً (Crymotherapy) ، أو (Frigotherapy) .

مُتحمِلُ البَرْد **cryotolerant**

هو ما يتمتع بالقدرة على تحمل درجات حرارة شديدة الانخفاض بصورة غير طبيعية .

مِبْضَعٌ بَرْدِيّ **cryotome**

هو مشْراحٌ تَجْميديّ .

انظر تحت freezing microtome .

1 ـ خَبيء **crypt**

2 ـ خَبيئَة (ج: خَبايا) **(pl. crypts)**

هو بنية تشريحية نسيجية بشكل وهدة مقفلة ، أو أنبوب مغلق النهاية على سطح حر .

الخَبيئَةُ السِّنْخيَّة **alveolar crypt**

الخَبايا الشَّرَجيَّة **anal crypts**

هو الجُيوبُ الشَّرْجيَّة .

انظر تحت sinus anales .

خَبيئَةٌ عَظْميَّة **bony crypt**

هي الخبيئة التي تكون في العظم السنخي الآخذ بالنمو ، والتي تصبح فيما بعد سنخ السن .

خَبايا فوكس **crypts of Fuchs**

هي خَبايا القُزَحيَّة .

انظر تحت crypts of iris .

خَبايا هولَر **crypts of Haller**

هي الغُدَدُ القُلْفيَّة .

انظر تحت glandulae preputiales .

خَبايا القُزَحيَّة **crypts of iris**

هي انخفاضَات شبيهة بالوهاد ، والتي تشاهد في القزحية ، في منطقة الدَّائرَةُ الشِّريانيَّةُ

هي الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة الحَنَكيَّة .
انـظـر تحـت cryptae tonsillares tonsillae palatinae .

tonsillar crypts of pharyngeal tonsil **الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة البُلْعوميَّة**
هو الخَبايا اللَّوزَيَّةُ للَّوزَة البلعومية .
انظر تحت cryptae tonsillares tonsillae pharyngeae .

tooth crypt **خبيئة السن**
هو الانخفاض الذي يكون في العظم السنخي ، ويملؤه كل من جرثومة السن وجريب السن ؛ ويسمى أيضاً الخبيئة السنية (Dental crypt) .

crypt- **سابقة بمعنى الخبيء؛ المختبئ**
سابقة بمعنى الخَبيء أو المُخْتَبِئ .

crypta TA (pl.cryptae) **خَبيئة (ج: خبايا)**
هي وهدة مقفلة ، أو أنبوب مغلق النهاية على سطح حر .

cryptae mucosae **الخَبايا المُخاطيَّة**
هي الغُدَدُ المُخاطيَّة (Glandulae mucosae) .

cryptae mucosae duodeni **الخَبايا المُخاطيَّة الإِثْنا عَشَريَّة**
هيَ الغُدَدُ الإثْناعَشَريَّة .
انظر تحت glandulae duodenales .

cryptae odoriferae **الخَبايا المُطْلَقَةُ للرَّائحة**
هي الغُدَدُ القُلْفيَّة .
انظر تحت glandulae preputiales .

cryptae praeputiales **الخَبايا القُلْفيَّة**
هي الغُدَدُ القُلْفيَّة .
انظر تحت glandulae preputiales .

cryptae tonsillares **الخَبايا اللَّوزيَّةُ**
هي الخباياَ المصاحبة لأي من الأنواع الأربعة من اللوز الموجودة في الحلق (اللسانية ، والحنكية والبلعومية ، والنفيرية) .

cryptae tonsillae **الخَبايا اللَّوزيَّةُ**
انظر تحت cryptae tonsillares .

cryptae tonsillae tonsillae palatinae TA **الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة الحَنَكيَّة**

lingual crypts **خَبايا اللِّسان**
انظر تحت crypts of tongue .

Luschka's crypts **خَبايا لُوشكا**
تثلمات عميقة في مخاطية المرارة تمتد عميقاً لتصل حتى الطبقة العضلية .

Morgangni crypt **خُبَيْئَةُ مورجاني**
1ـ هي الحُفْرَةُ الزَّورقيَّةُ الإحْليليَّة .
انظر تحت fossa navicularis urethrae .
2ـ هي الجُيوبُ الشَّرْجيَّة .
انظر تحت sinus anales .

mucous crypts of duodenum **الخَبايا المُخاطيَّةُ في الإثْناعَشَري**
هي الغُدَدُ الإثْناعَشَريَّة .
انظر تحت glandulae duodenales .

odoriferous crypts of prepuce **الخَبايا المُطْلَقَةُ للرَّائحة في القُلْفَة**
هي الغُدَدُ القُلْفيَّة .
انظر تحت glandulae preputiales .

synovial crypt **الخُبَيْئَةُ الزَّليليَّة**
هي جيبة في الغشاء الزليلي لمفصل ما .

tonsillar crypts **خَبايا اللَّوزَة**
هي الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة اللسانية .
انـظـر تحـت cryptae tonsillares tonsillae lingualis .
والخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة الحَنَكيَّة .
انـظـر تحـت cryptae tonsillares tonsillae palatinae .
والخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة البلعومية .
انـظـر تحـت cryptae tonsillares tonsillae pharyngeae .

tonsillar crypts of lingual tonsil **الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة اللِّسانية**
هي الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة اللسانية.
انـظـر تحـت cryptae tonsillares tonsillae lingualis .

tonsillar crypts of palatine tonsil **الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة الحَنَكيَّة**

خواص مضادة لفرط ضغط الدم ، ويحتوي على العديد من القلونيات ، بما فيها البروتوفيراترين A ، والبروتوفيراترين B ، والنيوجيرميترين ، وزجيرميترين ، وجيرميرين .

كريبتينامين أسيتات **cryptenamine acetate**

هو مزيج من أملاح الأسيتات لمادة الكريبْتينامين ، ويعطى عن طريق الوريد ، أو عن طريق الحقن العضلي في علاج الارْتعاج ، أو الاعْتلالُ الدماغيُّ بارْتفاع ضَغْط الدَّم .

كريبتينامين تينات **cryptenamine tennates**

هو مزيج من أملاح التينات لمادة الكريبْتينامين ، ويعطى عن طريق الفم لخفض فرط ضَغط الدم المتوسط وحتى الوخيم .

إدْراكُ الخفايا **cryptesthesia**

هو الاسْتِبْصار .

انظر تحتَ clairvoyance .

1ـ خَبيئِيّ **cryptic**

2ـ يرَقِيّ

1ـ مختف أو مختبئ .

2ـ يرقي .

الاخْتِباء **crypticity**

هو وجود إنزيم في خلية لايتمكن من العمل فيها بسبب ظروف غير مواتية له .

الْتِهابُ الخَبايا **cryptitis**

الْتِهابُ الخَبايا الشَّرْجيَّة **anal cryptitis**

هو التهاب الخبايا الشرجية مع ألم ومضض (وبخاصة أثناء التغوط) ، وحكة ، وتشنج المعصرة الشرجية ، وقد تتطور الحالة إلى خراج الخبايا .

سابقة بمعنى الخَبيء؛ المختبئ **crypto-**

سابقة تشير إلى معنى الاختباء أو الاختفاء ، أو إلى علاقة بالخبيئة أو الخبايا .

المداجِيَة **Cryptobia**

هو جِنْسٌ منَ الحَيَوانات الأوالي .

المداجيات **Cryptobiidae**

هو فَصيلَةٌ منَ الحَيَوانات الأوالي .

انظر تحت tonsillae tonsillares cryptae palatinae .

الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة البُلْعوميَّة **cryptae tonsillae tonsillae pharyngeae TA**

انظر تحت tonsillae tonsillares cryptae pharyngeae .

الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة اللسانية **cryptae tonsillares tonsillae lingualis TA**

هو انغلاف عميق غير منتظم ينشأ من سطح اللوز اللسانية .

الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة الحَنكيَّة **cryptae tonsillares tonsillae palatinae TA**

هي الخبايا الموجودة ضمن اللوزة الحنكية ، وتمثل النهايات المقفلة للحفيرات اللوزية .

الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة البُلْعوميَّة **cryptae tonsillares tonsillae pharyngeae TA**

هي الخبايا المَوجودة ضمن اللوزة البلعومية ، وتمثل النهايات المقفلة للحفيرات اللوزية .

الخَبايا اللَّوزيَّةُ للَّوزَة النفيرية **cryptae tonsillares tonsillae tubariae TA**

هي انغلافات صغيرة تمتد داخل اللوز النفيرية .

خَبايا الإحْليل الأُنْثَوي **cryptae urethrae muliebris**

هي الغُدَدُ الإحْليليَّةُ لإحْليل الأُنْثَى .

انظر تحتَ urethrae urethrales glandulae femininae .

خَبايا (ف: خَبيئَة) **cryptae (sing.crypta)**

صيغة الإضافة والجمع من مصطلح خبيئة (Crypta) .

تذكُّرُ الخفايا **cryptanamnesia**

انظر تحت cryptomnesia .

اسْتِئْصالُ الخَبايا **cryptectomy**

استئصال أو طمس الخبايا .

كريبتينامين **cryptenamine**

مزيج من إستر القلونيات المستخلصة من خلاصة الخربق الأبخضر غير المائية ؛ وتكون على شكل مسحوق أبيض لابلوري ذي

عدي الشكل . يسمى أيضاً الفطار البرعمي الأوروبي .

داءُ المُسْتَخْفِيات الرئوي **pulmonary cryptococcosis**

هو عدوى الرئتين بالمستخفية المورمة ؛ تكون معظم حالات المرض لا إعراضية ، أو أنها تتظاهر بسعال وألم صدري غير حاد ، وحمى غير شديدة ، وتكون بعض الحالات خاطفة في الرئة إلا أن بعضاً منها قد ينتشر ليسبب التهاب السحايا الناتج عن المستخفيات .

المُسْتَخفِيَة **Cryptococcus**

هي جنس من الفطريات الناقصة خميرية الشكل من فصيلة المستخفيات الشكلية ، عادة ما تكون ذات محفظة ، ولا تشكل أفطورة كاذبة كما هو حال المبيضات .

المُسْتَخْفِيَة المبيضة **Cryptococcus albidus**

نوع يوجد في عدد قليل من حالات داء المستخفيات ؛ دورها الكامل (الجنسي) هو (Filobasidium Floriforme) .

المُسْتَخْفِيَةُ المُحَفْظَة **Cryptococcus capsulatus**

الاسم المعروف للنَّوسَجَةُ المُغَمَّدَة (Histoplasma capsulatum) .

المُسْتَخْفِيَةُ الجيلكَريستية **Cryptococcus Gilchrist**

هي البُرعُمِيَّةُ المُلْهِبَةُ للجلد (Blastomyces dermatides) .

المُسْتَخْفِيَةُ الحالَّةُ للنُّسُج **Cryptococcus histolyticus**

1 ـ هي المستخفية المورمة .

انظر تحت Cryptococcus neoformans .

2 ـ الاسم القديم للمستخفية المورمة .

المُسْتَخْفِيَةُ البَشَرِيَّة **Cryptococcus hominis**

1 ـ هي المستخفَية المورمة .

انظر تحت Cryptococcus neoformans .

2 ـ الاسم القديم للمستخفية المورمة .

المُسْتَخْفِيَةُ السَّحائيَّة **Cryptococcus meningitidis**

خَفِيُّ الرَّأس (مسخ) **cryptocephalus**

هو صغير الرأس .

المُسْتَخفِيات **Cryptococcaceae**

هو فصيلة شكلية من الفطريات الناقصة ، والتي تصنف عادة ضمن الصنف الشكلي الفطريات البرعمية ، فيما تصنفها بعض المراجع ضمن الفطريات الخوطية ؛ ويكون أفراد هذه الفصيلة خميريي الشكل خلال معظم أو كل دورة حياتهم . وهي تتضمن بعض الأجناس الممرضة مثل المبيضة ، والمستخفية ، والتيربية ، والملاسيزية ، والمتوردة وشعرية الأبواغ .

المستخفية **Cryptococcales**

في بعض أنظمة التصنيف : هي رتبة شكلية من الفطريات الناقصة ، تصنف عادة ضمن الصنف الشكلي الفطريات البرعمية ، فيما تصنفها بعض المراجع ضمن الفطريات الخوطية . وهي تشمل فصيلة المستخفيات الشكلية .

ورم المستخفيات **cryptococcoma**

هي كرة فطرية تتكون من المستخفية المورمة . يسبب حدوثها في الدماغ أعراضاً ، فيما لا يظهر لها أعراض عندما تحدث في الرئة .

داءُ المُستَخفِيات **cryptococcosis**

هو العدوى بالمستخفيات المورمة ، وهي حالة أكثر ما تشاهد عند الأشخاص منقوصي المناعة ، وتكون مميتة إذا تركت دون علاج ؛ وأكثر أنواعها شيوعاً هي داء المستخفيات الجلدي ، وداء المستخفيات الرئوي ، والتهاب سحايا الدماغ الناتج عن المستخفيات . كما قد تتمكن المستخفيات من غزو الجهاز العصبي المركزي والكبد والطحال والمفاصل . يسمى المرض أيضاً (Torulosis) ، وكذلك داء بوشكه (Buscke's disease) ، أو داء بوسه ـ بوشكه (Busse-Buschke disease) .

داءُ المُسْتَخْفِيات الجلدي **cutaneous cryptococcosis**

هو شكل من داء المستخفيات ، والذي يتظاهر أساساً بآفات جلدية ، عادة ما تكون من النوع

مَجْهُوْلُ السَّبَب **cryptogenic**

انظر تحت idiopathic .

خبيئي حشفي **cryptoglandular**

يتعلق بخبيئة شرجية أو ينشأ من خبيئة شرجية .

وَرَمٌ دِبْقِيٌّ خَفِيّ **cryptoglioma**

ابْيضاضُ الدَّم الخَفِيّ **cryptoleukemia**

هو ابْيضاضُ الدَّم اللاَّابْيضاضيُّ .

انظر تحت aleukemic leukemia .

حَصاة خَبيئيَّة **cryptolith**

هي حصاة متوضعة ضمن خبيئة .

حَيضٌ خَفِيّ **cryptomenorrhea**

هي حالة توجد فيها أعراض الطمث دون حدوث إدماء خارجي ، كما في حالة البكارة الرتقاء .

السِّنسِنَةُ المَشْقوقة الخَفِيَّة **cryptomerora-chischisis**

انظر تحت spina bifida occulta .

تَذَكُّرُ الخَفايا **cryptomnesia**

هي استعادة ذكريات لا يدرك المرء كونها ذكريات ، بل يعتقد أنها أفكار مبتكرة .

متعلق بتَذَكُّر الخَفايا **cryptomnesic**

متعلق بتذكر الخفايا أو متصف بتذكر الخفايا .

مُساتِرَة **cryptomonad**

إحْدَى أفراد المُساترات .

المُساتِرات **Cryptomonadida**

فصيلةٌ منَ الحَيَوانات الأوالي البَحريَّة .

المُساتِرَة **Cryptomonas**

جِنسٌ منَ الأوالي البَحْريَّة

خَفِيُّ الجهاز العَصَبي **cryptoneurous**

أي أنه مفتقد إلى جهاز عصبي مميز أو محدد .

اخْتِبَاءُ العَين **cryptophthalmia**

انظر تحت cryptophthalmos .

اخْتِبَاءُ العَين **cryptophthalmos**

هو شذوذ نمائي يكون الجلد فيه متمادياً فوق مقلة العين دون وجود ما يؤشر إلى تكون الجفون .

اخْتِبَاءُ العَين **cryptophthalmus**

1 ـ هي المستخفية المورمة .

انظر تحت Cryptococcus neoformans .

2 ـ اسم قديم للمستخفية المورمة .

المُسْتَخْفِيَةُ المورمَة **Cryptococcus neoformans**

هو نوعٌ يوجَدُ في مختلف أنحاء العالم في أعشاش وذرق الحمام ؛ وهي أكثر أنواع المستخفيات انتشاراً ، وتسبب داء المستخفيات عند البشر ، كما أنها تعدي القطط . ويطلق على دورها الكامل (الجنسي) تسمية الأدعومية المورمة . كانت تسمى في السابق المُسْتَخْفِيَةُ الحَالَّةُ للنُّسُج (Cryptococcus histolyticus) ، والمُسْتَخْفِيَةُ البَشَرِيَّة (Cryptococcus hominis) ، والمُسْتَخْفِيَةُ السَّحَائيَّة (Cryptococcus meningi-tides) ، (Debaryomyces neoformans homi-ni) ، (Torula histolytica) .

خَفِيُّ البِلَّورات **cryptocrystalline**

هو مكون من بلورات مجهرية الحجم .

خفية الأكياس الشعراوية **cryptocystis trichodectis**

هو الاسم القديم للشكل اليرقي من العوساء الكلبية (Dipylidlum caninum) .

مُحدِدَة خَفِيَّة **cryptodeterminant**

أي أنها محددة غير ظاهرة .

تَوأمٌ خَبيء **cryptodidymus**

أي انه مُبْتَطَن (مسخ) .

انظر تحت endadelphos .

دُبَيلَة خَبيئة **cryptoempyema**

هي دبيلة يصعب ارتشافها لكونها متعددة المساكن أو بين الفصوص .

اللازَهْرِيَّات **Cryptogamia**

أي من النباتات الدنيا التي ليست لها أزهار حقيقية ، وإنما تتكاثر بالأبواغ مثل الفطريات والطحالب والسرخسيات .

لا زهري **Cryptogamic**

نسبة إلى اللازهريات .

مَجْهُوْلُ السَّبَب **cryptogenetic**

انظر تحت cryptogenic .

تنظيرٌ تألُّقِيّ **cryptoscopy**

انظر تحت fluoroscopy .

داءُ خَفِيَّاتِ الأبْواغ **cryptosporidiosis**

1 ـ إصابة حيوانات المزارع الفتية (العجول والحملان والمهر والخنازير الصغيرة) بعدوى الحيوانات الأولية من جنس خفية الأبواغ ، والتي يمكن أن ترتبط ، أو تسبب الإصابة بالمرض المعوي .

2 ـ عدوى البشر بخفية الأبواغ ، والتي تتظاهر عادة بشكل إسهال محدود ذاتياً يصيب الأشخاص الذين يعملون في رعاية المواشي ؛ وتكون الإصابة وخيمة بصورة أكبر عند الأشخاص منقوصي المناعة ، وتتظاهر بإسهال موهن يمتد لفترة طويلة من الزمن وفقد في الوزن وحمى وألم بطني وفي بعض الأحيان انتشار العدوى إلى الرغامى والشجرة القصبية .

خَفِيَّةُ الأبْواغ **Cryptosporidium**

جنس من الحيوانات الأوالي الدقيقة مثلية النوى من الأكريات (من رتيبة الأيمريات ومن رتبة الكرويات الحقيقية) ، والتي تتميز بوجود بيضات متكيسة مع أربعة حيوانات بوغية ؛ وهي حيوانات طفيلية تتطفل على المسالك المعوية لعدد من الفقاريات المختلفة ، بما فيها البشر ، وتسبب داء خفيات الأبواغ .

كريبتوستيرول (كيمياء) **cryptosterol**

خَفِيَّةُ السَّدَى **Cryptostroma**

هو جنس من الفطريات من فصيلة الفطريات الخوطية الشكلية ؛ تسمى أيضاً المتغايرة . تنمو المتغايرة اللحائية تحت لحاء شجرة القبقب ، ويسبب استنشاق أبواغها داء لحاء شجرة القبقب عند العاملين في قطع الأخشاب .

خَفِيَّةُ السَّدَى اللِّحائيَّة **Cryptostroma corticale**

هو جنس من خفية السدى ، والتي تنمو تحت لحاء شجرة القبقب ويسبب استنشاق أبواغها داء لحاء شجرة القبقب عند العاملين في قطع الأخشاب .

انظر تحت cryptophthalmos .

كريبتوبين **cryptopine**

أحد المكونات الثانوية القلوانية للأفيون .

خَفِيّ **cryptoplasmic**

ليس له عامل مسبب ظاهر ؛ وهي تسمية تطلق على العداوى التي لا تكون الكائنات الحية المعدية فيها ظاهرة ، ويسمى أيضاً (Occult) .

اخْتِفاءُ القَدَمِ بالتَّوَرُّم **cryptopodia**

هي حالة تتسم بتورم الجزء السفلي من الرجل وظاهر القدم ، بحيث لا يبقى ظاهراً غير أخمص القدم .

خَفِيُّ المَسام **cryptoporous**

أي شيء يتصف بكون المسام خفية .

خَفِيُّ التَّقيُّح **cryptopyic**

يتصف بوجود تقيح غير ظاهر .

خَفِيُّ الخُصْيَة **cryptorchid**

1 ـ يتصف باختفاء الخصية أو يتعلق باختفاء الخصية .

2 ـ شخص مصاب باختفاء الخصية .

اسْتِئْصالُ الخُصْيَةِ الخَفِيَّة **cryptorchidectomy**

هو استئصال خصية غير نازلة .

اخْتِفاءُ الخُصْيَة **cryptorchidism**

هو خلل نمائي يتصف بفشل إحدى الخصيتين أو كلتيهما في النزول إلى الصفن . تسمى أيضاً (Cryptochism) ، أو خصية غير نازلة (Undescended testis) .

تثبيت الخصية **cryptorchidopexy**

انظر تحت orchiopexy .

اخْتِفاءُ الخُصْيَة **cryptorchidy**

انظر تحت cryptorchidism .

اخْتِفاءُ الخُصْيَة **cryptorchism**

انظر تحت cryptorchidism .

مِنْظارٌ تألُّقِيّ **cryptoscope**

انظر تحت fluoroscope .

منظار ستافيوني التألقي **Stavioni's cryptoscope**

هو أحد أوائل المناظير التألقية .

calcium pyrophosphate dihydrate (CPPD) crystals **بلورات ثنائي هيدرات الكالسيوم بيروفوسفات**

هي بلورات مجهرية من ثنائي هيدرات الكالسيوم بيروفسفات ، والتي توجد في السائل الزليلي في داء ترسب الكالسيوم بيروفسفات .

Charcot-Leyden crystals **بلَّوراتُ شارْكُو - لايدن**

بلورات متطاوَلة مزدوجة الانكسارية تتخذ شكل هرمين مسدسي الأضلاع ملتصقان عند قاعدتيهما ، تستخلص من الليزوفسفوليباز الذي تطلقه الأغشية البلازمية لليوزينيات المتنكسة ؛ وتشاهد في السوائل المصلية مثل المفرزات القصبية في حالات الربو ، وفي البراز في بعض حالات التطفل المعوي . تسمى أيضاً بلورات الربو (Asthma crystals) .

Charcot-Neumann crystals **بلَّوراتُ شارْكُو - نُويمان (في السائل المنوي)**

coffin lid crystals **بلَّوراتٌ شَبيهَةٌ بغطاء التَّابوت**

بلَورات مسننة ذات شكل مميز تتكون من أمونيومغنيزيوم فسفات ، والتي توجد في البول القلوي ؛ تسمى أيضاً بَلّوراتُ مَسْنَد السكّين (Knife rest crystals) .

CPPD crystals **بلورات ثنائي هيدرات الكالسيوم بيروفسفات**

انظر تحت calcium pyrophosphate dihydrate crystals .

crystal's of Reinke **بلَّوراتُ راينْكه**

انظر تحت crystalloid .

dumbbell crystals **بلَّوراتُ قَضيب الكُرَتَين**

هي بلورات من أوكسالات الكالسيوم ، والتي توجد في البول .

ear crystals **بلَّوراتُ التَّوازُن**

هي غَبْرَةُ التَّوازُن الأُذُنيَّة .

انظر تحت statoconium .

cryptostromosis **داءُ خَفِيَّاتِ السَّدَى**

cryptotia **اخْتِفاءُ صيوان الأذن**

شذوذ نادر يكون فيه الجزء الظاهر من صيوان الأذن مدفوناً تحت فروة الرأس .

cryptotoxic **خَفِيُّ السُّمِيَّة**

مادة ذات خواص سمية خفية ؛ وهو وصف يطلق على محلول يكون غير سام في المعتاد ، ولكنه يمكن أن يصبح ساماً إذا ما تغير التوازن الغرواني .

cryptoxanthin **كريبتوزانْتين (كيمياء)**

شبه كاروتيني أصفر واسع الانتشار في الطبيعة (صفار البيض ، العشب الأخضر ، الذرة الصفراء ، . . . إلخ) ، يمكن أن يتحول إلى فيتامين A في الجسم .

cryptozoite **خافِيَة**

أحد أطوار أنواع معينة من الأوالي البوغية في المرحلة خارج الكرية الحمراء .

cryptozygous **خَفِيُّ الوَجْنَتين**

أي أنه ذو وجه لا يزيد عرضه عن عرض القحف ، بحيث تكون الأقواس الوجنية مخفية ببروز القحف عندما ينظر إلى الجمجمة من الأعلى .

انظر تحت phenozygous .

crystal **بلّورة (ج: بلّورات)**

هو جسم صلب متجانس متعدد الزوايا مكون من عنصر كيميائي ، أو مركب كيميائي ، أو مزيج متشاكل ، بحيث يكون له شكل محدد تتوضع فيه الوحدات الأساسية المكونة له في ترتيب منتظم .

asthma crystal **بلَّوراتُ الربْو**

هي بلَّوراتُ شارْكُو - لايدن .

انظر تحت Charcot-Leyden crystals .

blood crystals **بلَّورات الدَّم**

هي بلَوَرات الهيماتويدين في الدم .

Bottcher's crystals **بلَّورات بُوتْشَر**

هي بلورات تترسب عند معاملة السائل البروستاتي بالأمونيوم .

الصوديوم التي تحتوي على أثر من شوائب الثاليوم ، والتي تستعمل في كاميرا آنجر لاستشعار إشعاع جاما .

بلوراتٌ مَنَويَّة **sperm crystals**

بلَّوراتٌ مَنَويَّة **spermin crystals**

بلَّوراتُ تايخْمان **Teichmann's crystals**

هي بلورات من الهيمين (Hemin) ، والتي تشاهد في الفحوص المجهرية لتحري وجود الدم .

بلَّوراتُ الدَّاتورَة **thorn-apple crystals**

هي كرات صفراء ، أو ذات لون مائل إلى البني من يورات الأمونيوم المغطاة بشويكات ، أو مواشير حادة ، مثل تلك التي توجد في البول .

بلَّوراتُ فيرْخُوف **Virchow's crystals**

هي بلورَات صفراء أو برتقالية من الهيماتويدين (Hematoidin) ، والتي تشاهد في الدم المتسرب من الأوعية .

بلَّوراتُ المِشْحَذ **whetstone crystals**

هي بلورَات من الزانثين (Xanthine) ، والتي تشاهد في البول احياناً .

1 ـ ألْبومينٌ بلَوريّ **crystalbumin**

2 ـ ألْبومينُ العَدَسَةِ

1 ـ مادة ألبومينية تتواجد في الخلاصة المائية للعدسة البلورية .

2 ـ اسم عام للألبومينات القابلة للتبلور من نوع ألبومين البيض وألبومين المصل .

جلوبُولينُ العَدَسَة **crystallin**

هو جلوبولين يوجد في العدسة البلورية للعين . ويترسب ألفا كريستالين بواسطة حمض الأستيك المخفف ، بينما لا يترسب البيتا كاروتين .

بلَوريّ **crystalline**

هو ما يشبه العدسة في شكله ، أو في صفائه .

العَدَسَة البلورية **crystalline lens**

التِهابُ البلَورَة **crystallitis**

هو الْتهابُ العَدَسَة في العين .

انظر تحت phakitis .

بلَّوراتُ فلُورَانْس **Florence crystals**

بَلَّوراتُ قُنْفُذيَّة **hedgehog crystals**

هو شكل شائك من حصوات حمض اليوريك .

بلورات الهيدروكسي أباتيت **hydroxyapatite crystal**

هما بلورات مجهرية توجد في المفاصل والأجربة في عدد من اضطرابات النسج الضامة .

انظر تحت apatite deposition disease .

بَلَّوراتُ مَسْنَد السِّكِّين **knife rest crystals**

هي بَلَّوراتٌ شَبيهَةٌ بغطاء التَّابوت .

انظر تحت coffin lid crystals .

بلَّوراتُ الكُرَيَّات البيض **leukocytic crystals**

هي بلَّوراتُ شارْكُو ـ لايدن .

انظر تحت Charcot Leyden's crystals .

بلُّورات لايدن **Leyden's crystals**

هي بلَّوراتُ شارْكُو ـ لايدن .

انظر تحت Charcot Leyden's crystals .

1 ـ سائلٌ بلَّوريٌّ **liquid crystals**

2 ـ وراَتٌ سائلَة

هي سوائل معينة تبدي بعض الخواص البصرية للبلورات ، وبعض الخواص الهيدروديناميكية للسوائل ، مثل فسفاتيديلكولين (phosphatidylcholine) .

بلَّوراتُ لُوبارْش **Lubarsch's crystals**

هي بلورات في الخصية تشبه البلورات المنوية .

بلَّوراتُ بلاتنر **Planter's crystals**

هي أملاح أحماض الصفراء .

بلَّورَةٌ صَخْريَّة **rock crystal**

مصطلح مَرادف للكوارتز : وهو شكل شفاف من ثنائي أكسيد السليكون (السيليكا) ، (SiO_2) ، والذي يستعمل في العدسات .

بلورة الومضان **scintilation crystal**

هي مادة تطلق ومضة من الضوء (ومضان) عندما تلامسها جزيئات ذات طاقة عالية ، مثل أشعة ألفا ، أو بيتا ، أو جاما ، مثل بلورة أيوديد

انظر تحت phakitis .

بيلة البلّورات crystalluria

هي إفراغ البلورات في البول مما يثير تهيجاً كلوياً .

كريستيسيلين Cristicillin

علامة تجارية لأحد مستحضرات بنسلين G بروكاين (Penicillin G proocaine) .

كريستوديجين Cristodigin

علامة تجارية لأحد مستحضرات الديجيتوكسين (Digitoxin) .

رمز السيزيوم Cs

انظر تحت cesium .

فطرٌ فاتك cteinophyte

هو فطر له تأثير مدمر على ثويه ؛ بحيث يقتصر على النشاط الكيميائي دون النشاط الطفيلي .

سابقة بمعنى المشط cteno-

سابقة تشير إلى علاقة مع مشط ، أو مع بنية تشبه المشط .

رأسيُّ الأمْشاط Ctenocephalides

جنسٌ منَ البَراغيث كثيراً ما يشاهد طفيلياً على الحيوانات المنزلية .

رأسيُّ الأمْشاط الكَلْبيُّ Ctenocephalides canis

هو نوع من البَراغيث كثيراً ما يوجد عند الكلاب ، وقد ينقل الدودة الشريطية الكلبية إلى البشر .

رأسيُّ الأمْشاط الهرِّيُّ Ctenocephalides felis

هو نوع من البَراغيث يشيع عند القطط ، وينقل تيفوس براغيث القطط ، والتيفوس الفأري .

المِشْطِيَّات Ctenophora

شعبة من اللافقاريات البحرية ، والتي تشمل الهلام المشط أو جوز البحر ، والتي تتكون أجسامها من طبقتين من الخلايا تحصر فيما بينها كتلة شبيهة بالهلام ؛ وتغطي جسمها من الخارج ثمانية صفوف من الأهداب التي تشبه المشط ، والتي تزودها بالقدرة على الحركة .

ممشطي ctenophore

1 ـ يتعلق أو ينتمي إلى شعبة المشطيات .

تبلّوُر crystallization

هو تكون البلورات ، أو التحول إلى الشكل البلوري .

تَبَلْوُرٌ بشكل ورَق السَّرْخَس fern-leaf crystallization

تبلورَ مخاط عنق الرحم وفق نمط سرخسي ، وهي حالة تشاهد أثناء النصف الأول من الدورة الطمثية ، ويقال أنها أكثر ما تكون وضوحاً في وقت الإباضة .

تَبَلْوُرٌ تَجْزيئيّ fractional crystallization

وعاءُ التَّبَلْوُر crystallizer

المخطَط البلَوْريُّ crystallogram

مَبْحَثُ البلَوْرات crystallography

هو العلم الذي يتناول دراسة البلورات .

مَبْحَثُ تَصوير البلَّورات بالأشعَّة السِّينيَّة x ray crystallography

هو تحديد البنية ثلاثية الأبعاد للجزيئات من خلال طور الانعراج التي يظهرها تصوير بلورات الجزيئات بالأشعة السينية .

بلَوْرانيّ (ج: بلَوْرانيَّات) crystalloid

1 ـ يشبه البلورة .

2 ـ مادة أصغر من الغرواني ، في محلول يمر بسهولة من خلال الأغشية نصف النفوذة ، والتي تسبب انخفاض درجة تجمد المحاليل التي تحتوي عليها ، وتكون قادرة بشكل عام على التبلور .

انظر تحت colloid .

بلَّوْرانيَّاتُ شارْكو ـ بُوتْشَر Charcot-Bottcher crystalloids

هي بلورات مغزلية نحيلة طولها بين 10 إلى 25 نانومتر ، توجد بشكل شائع في غدد سيرتولي في خصية البشر دون سواهم من الأحياء .

بلَّوْرانيَّاتُ راينكه crystalloids of Reinke

هي خلايا واضحة متعددة الأشكال توجد ضمن خلايا لايديج .

التِهابُ البلَوْرة crystalloiditis

هو الْتهابُ العَدَسَة في العين .

رمـز عنصـر النحـاس ، ويكتب باللاتينيـة (Cuprm) .

انظر تحت copper .

cuajani **كواهاني**

هو مُسْتَحْضَرٌ طارد للبلغم .

cube **مُكَعَّب**

هو مجسم منتظم له ستة أوجه مربعة متماثلة .

cubeb **كَبابَة**

1 ـ ثمرة الفليفلة الكبابية .

2 ـ الثمرة شبه مكتملة النمو غير الطازجة ، والمجففة من الفليفلة الكبابية والتي تحتوي على مـا بين 10 إلى 18 زيت طيـار ، وكبـابين ، وراتينات ، ودهون ، وشمع . كانت تستعمل فيما مضى لتحفيز شفاء الأغشية المخاطية ، وكمدر للبول ومطهر بولي .

انظر تحت cubebism .

cubebin **كُبابين**

هي مـادة تسـتخلص من الكبـابة ، وكـانت تستعمل كمطهر بولي .

cubebism **التَّسَمُّمُ بالكَبابَة**

هو التسمم بالكبابة ، ويتصف بالغثيان والقيء والإسهال والحمى ، مع أو بدون طفح جلدي وإعياء ، وألم في المفاصل ، وتهيج الكلى ، ونبض ضعف ، وتقبض الحدقة ، وهذيان وغيبوبة . وقد يحدث الموت في حـالات التسمم الشديدة بفعل الفشل التنفسي .

cubic **مُكَعَّب**

أي بينة لها شكل مكعب .

cubic centimeter **سَنْتِي مِتر مُكَعَّب**

(=1 مل)

هي وحدة حجم تعادل حجم مكعب يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه سنتي متراً واحداً .


cubicle **حُجَيْرَة**

هي حجرة من منطقة أوسع ، كمهجع أو جناح ، والتي يفصلها عن الحجرات المجاورة المشابهة وعن بقية الغرفة حواجز منخفضة .

cubilose **كوبيلوز**

2 ـ أحد أفراد شعبة المشطيات .

انظر تحت coelentrate .



مَبْحَثُ تَصْوير البلَّورات بالأَشعَّة السِّينيَّة
X-ray crystalography

Ctenophthalmus **عَينِيُّ الأَمْشاط**

هي جِنْسٌ منَ البَراغيث . ويعتبر عيني الأمشاط الأجـرتيس (Ctenophthalmus agrytes) ، هو البرغوث الفأري الأوروبي .

Ctenopsyllus **البُرْغوثُ المُشطيُّ**

Ctenopsyllus segnis البُرْغوثُ المُشْطيُّ المُتَوَاني

Ctenus **الأَعْكَب**

هي جِنْسٌ منَ العَناكب . ويعتبر الأعكب الفيرس (Ctenus ferus) ، هو العنكبوت الجوال في أمريكا الجنوبية .

C-terminal **النِّهايَةُ الكَرْبُونِيَّة (كيمياء)**

هي نهاية سلسلة الببتيد التي تحمل زمرة ألفا كربوكسيل حرة للحمض الأميني الأخير ، وتكتب عادة باتجاه اليمين .

Ctesias of Cnidus **كتيسياس القنيدوسي**

هو طبيب ومؤرخ إغريقي ، كان معاصراً لأبقراط . وقد عاش لفترة طويلة ، وعمل مؤرخاً وطبيباً في البلاط الملكي الفارسي .

ctetology **عِلْمُ الصفات المُكتسَب**

هو فرع من البيولوجيا ، والذي يختص بدراسة منشأ وتطور الصفات المكتسبة .

Cu **رمزُ النُّحاس (نح؛ Cu)**

cuboidonavicular **نَرْدِيٌّ زَورقِيّ**

كل مـا يتـعلق بالعـظم النردي والعظم الزورقي معاً .

Cubomedusae **كيبوميدوسا**

رتبة من السمك الهـلامي ذات الأجسـام رباعيـة الجــوانـب ، والتي تـشـبــه الجــوانـب ، وبعض أجناسـها ذات أهمـية طبيـة مثل الشـيـرونيكس (Chironex) ، والشيروبزلميس (Chiropsalmus) .

cubomedusan **كيبوميدسان**

1 ـ متعلق بالكيبوميدوسا .

2 ـ سمكة هلامية من رتبة الكيبوميدو .

cucoline **سِيِنُومِينِين**

هو مركب قلواني .

انظر تحت sinomenine .

cucullaris **العَضَلَةُ شِبْهُ المُنْحَرِفة**

انظر تحت musculus trapezius .

cucumber **الخيار**

1 ـ أي من أنـواع النبــاتات المتـعـددة من جنس الخيار (Cucumis) .

2 ـ الثمرة الصالحة للأكل لأي من تلك الأنواع ، وبخاصة الخيار المزروع ؛ والتي تستعمل بذورها كمدر للبول ، وعصـائرها كمواد قابضة تدخل في تركيب الكثير من المركبات التجميلية .

bitter cucumber **حَنْظَل**

انظر تحت colocynth .

Cucumis **الخيار**

هو جنس من النباتات من فصيلة القرعيات . وتشـمل العـديد من الأنواع الصـالحـة لـلأكل ولبعض منها خواص طبية مثل الخيار المزروع .

Cucurbita **القَرْع**

جِنْسُ نَبات منَ القَرْعِيَّات .

cucurbitol **كوكربيتول**

هو اسـتـيـرول (Sterol) ، صيـغتـه الكـيـميـائيـة ($C_{24}H_{40}O_4$) يستخلص من بذور البطيخ .

cucurbitula **كَأسُ الحِجامَة**

انظر تحت cupping glass .

cucurbitula cruenta **كَأسُ الحِجامَة الدَّامِيَة**

cubit **ذِراع (وَحدَة قياس)**

وحدة قياس قديمة تعادل امتداد الذراع .

cubital **1 ـ مِرْفقِيّ**

2 ـ زَنْدِيّ

1 ـ يتعلق بالمرفق .

2 ـ يتعلق بالزند أو الساعد .

cubitalis **مِرْفقِيّ**

انظر تحت cubital .

cubitocarpal **زَندِيٌّ رُسْغِيّ**

كل ما يتعلق بالزند والرسغ معاً .

cubitoradial **زَندِيٌّ كَعْبُرِيّ**

كل ما يتعلق بالزند والكعبرة معاً .

cubitus TA **المِرْفَق**

1 ـ المرفق : وهو المفــصل الواقع بين الذراع والساعد .

2 ـ الجــزء من الطرف العلوي الواقع إلى الوحشي من العضد ، ويشمل المرفق والساعد واليد .

3 ـ الزند .

انظر تحت ulna .

cubitus valgus **مِرْفَقٌ أَرْوَح**

هو تشوه في المرفق (يشخص عندما تكون راحة اليد موجهة إلى الأعلى) ، بحيث ينحرف المرفق مبتعداً عن الخط الناصف للجسم عند ثنيه .

cubitus varus **مِرْفَقٌ أَفْحَج**

هـو تشــوه في المرفق ناتج عن تزو جــانبي للمفـصل ، ويكون مترافق بانحـرافً الساعد باتجاه الخط الناصف للجسم عند مد الساعد ؛ يسمى أيضاً تَشَوُّهٌ شَبِيْهٌ بِمَقْبَضِ البُنْدُقِيَّة (Gun stock deformity) .

cuboid **1 ـ مُكَعَّبِيّ**

2 ـ العَظمُ النَّرْدِيُّ

1 ـ يشبه المكعب .

2 ـ العظم النردي .

cuboidal **1 ـ متعلق بالعَظم النَّرْدِي**

2 ـ مُكَعَّبِيُّ الشَّكل

يشبه المكعب .

cucurbitula sicca **كَأسُ الحجامَةِ الجافَّة**

cucurbocitrin **كوكُرْبُوسيترين**

هو مستحضر نباتي لمعالجة فرط ضغط الدم .

cud **جِرَّة**

هو كتلة الطعام المهضوم جزئياً التي تعيدها المجترات من المعدة الأولى لتعاود مضغها وابتلاعها مرة ثانية .

cudbear **كُدْبِير**

هو مسحوق أحمر بني ، يستحصل من بعض أنواع الحزاز ويستعمل كمادة ملونة في الصناعة الصيدلانية .

cudding **كُدْبِير**

انظر تحت rumination .

cue **إلماع (طِبٌّ نفسيّ)**

هو تصرف يقصد منه الإيحاء إلى شخص ما بفعل شيء ما .

cuff **كِفَّة**

هو بنية شريطية صغيرة تحيط بجزء .

epithelial cuff **كُفَّةٌ ظِهارِيَّة**

هو النسيج الظهاري في قاعدة الميزاب اللثوي أو الجيب حول السني ، والذي يكون ملاصقاً للسن ويربط اللثة بالسن .

musculotendinous cuff **كُفَّةٌ عَضَلِيَّةٌ وَتَرِيَّة**

هي كفة مكونة من تخالط ألياف عضلية ووترية .

انظر تحت rotator cuff .

rotator cuff **كُفَّةٌ مُدَوِّرَة**

هي بنية كفة عضلية وترية قرب محفظة مفصل الكتف ، والتي تتكون من الألياف المنغرسة للعضلة فوق الشوك والعضلة تحت الشوك ، والعضلة المدورة الصغيرة ، والعضلة تحت الكتف التي تمتزج مع المحفظة ، وتوفر لمفصل الكتف الحركية والقوة .

cuffing **استِكْفاف**

هو تشكل محيط شبيه بالكفة ، مثل تجمع الكريات البيض حول الأوعية الدموية الذي يحدث أثناء أمراض فيروسية معينة .

Cuignet's method **طريقة كوينييه**

[طريقة منسوب للطبيب فردينان لوي جوزيف كوينييه (Ferdinand Louis Soseph Cugnet) ، وهو طبيب عيون فرنسي ، من القرن التاسع عشر] وهي طريقة تطبق خلال تنظير الشبكية .

انظر تحت retinoscopy .

cuirass **صِدار**

هو لباس يغطي الصدر ، كمثل الصدفة البلاستيكية أو الفقاعة المعدنية التي تستعمل في المنفاس الصدري .

tabetic cuirass **صدارٌ تابسي**

هي منطقَةَ يكون الإحساس فيها ناقصاً ، والتي تحيط بالصدر عند المصاب بالتابس الظهري .

cul-de-sac **رَدْبَة**

هو أنبوب مغلق النهاية ، أو جيبة مغلقة النهاية ؛ أي أنه تجويف أنبوبي مغلق من إحدى نهايتيه ، مثل الرتج .

conjunctival cul-de-sac **رَدْبَةُ المُلْتَحمَة**

أي من أقبية الملتحمة وهما القَبْوُ السُّفْلِيُّ للمُلْتَحمَة والقَبْوُ العُلْوِيُّ للمُلْتَحمَة .

انظر تحت fornix conjunctivae inferior .

انظر تحت fornix conjunctivae superior .

Douglas cul-de-sac **رَدْبَةُ دوجلاس**

هو اللَّجَفُ المُسْتَقيميُّ الرَّحميُّ .

انظر تحت excavatio rectouterina .

dural cul-de-sac **رَدْبَةُ الجافِيَة**

inferior cul-de-sac **الرَّدْبَةُ السُّفْلِيَّة**

هو القَبْوُ السُّفْلِيُّ للمُلْتَحمَة .

انظر تحت fornix conjunctivae inferior .

culdocentesis **بَزْلُ الرَّدْبَةِ المُستقيمِيَّةِ الرَّحِمِيَّة**

هو بزل السوائل من المسافة المستقيمية الرحمية من خلال وخز قمة الجدار المهبلي .

culdoplasty **رَأْبُ الرَّدْبَةِ (المَهْبِلِيَّة)**

culdoscope **مِنْظارُ جَوفِ الحَوْض**

هو المنظار الذي يستخدم في إجراء تنظير جوف الحوض .

culdoscopy **تَنْظيرُ جَوفِ الحَوْض**

الباعضَةُ الحَلَقِيَّةُ الخَطْم Culex annulirostris
الباعضَةُ السَّوداءُ اللَّوامس Culex nigripalpus
الباعضَةُ النَّابضَة Culex pipiens
الباعضَةُ الخُماسيَّةُ الخُطوط Culex quinquefasciatus
الباعضَةُ الرَّسْغاء Culex tarsalis
الباعضَةُ الشَّريطيَّةُ الأَنْف Culex tritaeniorhynchus

culicicide **مُبيدُ البَعوض**

انظر تحت culicide .

Culicidae **البَعوضيّات**

البعوض ، وهو فصيلة من الحشرات من رُتَيبة خيطيات القرن ، ورتبة ذوات الجناحين . وهناك فُصيلتين منها ذات أهمية طبية : الأنوفيلينات والبعوضات ، والتي تشمل قبائل الأنوفيلات والبـــواعض الأيدنيـــا ، والمانســـونيـــة (Mansoniini) .

culicidal **مُبيدٌ للبَعوض**


هو الفحص البصري للحوض عند الأنثى بواسطة منظار ، والذي يتم إدخاله إلى التجويف الحوضي من خلال قبو المهبل الخلفي .

culdotomy **بَضْعُ المَهْبِل**

هو بضع في الردبة المهبلية (جيبة دوجلاس) ؛ يسمى أيضاً بضع المهبل الخلفي (Posterior colpotomy) .

Culex **الباعِضَة**

جنس من البعوض من قبيلة البواعض ، من فُصيلة البعوضات ، لها لوامس قوية وتضع أجسامها في وضع مواز للسطح الذي تستند إليه . الكثير من أنواعها في أنحاء العالم نواقل لعوامل ممرضة عند البشر والحيوانات الأخرى . من بين أنواعها كل من الباعضة حلقية الخطم ، والباعضة شريطية الأنف ، والباعضة السوداء اللوامس ، والباعضة النابضة ، والباعضة خماسية الخطوط ، والباعضة الرسغاء .



Muscles of the Rotator Cuff عضلات الكفة المدورة

كاشي (Cache Valley) ، وتعتبر البعيضة سوداء الذنب ناقلاً لڤيروسات الْتهاب الدِّماغ والنُّخاع الخَيلِيّ الشرقية والغربية .

البُعَيضَةُ المُذَهَّبَة **Culiseta inornata**

هي بعيضة تعتبر ناقلاً لڤيروس الوادي كاش (Cache Valley) .

البُعَيضَةُ السَّوداءُ الذَّنَب **Culiseta melanura**

هي بعيضة تعتبر ناقلاً فيروسات الْتهاب الدِّماغ والنُّخاع الخَيلِيّ الشرقية والغربية .

علامة كالن **Cullen's sign**

[علامة منسوبة للجراح توماس ستيفن كالن (Thomas Stephen Cullen) ، وهو جراح أمريكي ، 1953-1868] .

انظر تحت sign .

استِنْقاء **culling**

هي عملية الإزالة الانتقائية . ويطلق هذا الاصطلاح لوصف العملية التي يقوم بها الطحال لإزالة الكريات الحمراء الشاذة من الدوران ، كمثل الخلايا الحمراء التي تشاهد في مرض كَثْرَةُ الكُرَيَّات الحُمْر الكُرَوِيَّة الخلقية ، أو للإزالة الانتقائية لعناصر أو كائنات حية أخرى .

قنَّة (ج:قنَن) **culmen TA (pl.culmina)**

1ـ أوج أو قمة .

2ـ قنة المخيخ .

قِنَّةُ المُخَيخ **culmen cerebelli TA**

هو الجزء من الفص المنقاري للمخيخ ، والذي يتوضع في الاتجاه الإنسي بين الفصيص المركزي والشق الأولي ؛ يسمى أيضاً القنة (Culmen) .

قُنَّةُ المُخَيخ **culmen of cerebellum**

انظر تحت culmen cerebelli .

قُنَّةُ الرِّئَة اليُسْرَى **culmen of left lung**

انظر تحت culmen pulmonis sinistri .

قُنَّةُ الرِّئَة اليُسْرَى **culmen pulmonis sinistri TA**

هو الجزء غير اللسيني من الفص العلوي للرئة اليسرى .

انظر تحت lingula pulmonaris sinistri .

هو قاتل للبعوض والقرسة .

مُبِيدُ البَعوض **culicide**

هي مادة قاتلة للبعوض والقرسة .

مُنَفِّرُ البَعوض **culicifuge**

هي مادة طاردة للبعوض والقرسة .

البَعوضات **Culicinae**

هي فُصيلة من البعوض من فصيلة البعوضيات ؛ من أجناسها ذات الأهمية الطبية كل من الزاعجة والباعضة والمنسونية .

1ـ باعِضَة **culicine**

2ـ باعِضِيّ

1ـ أي من أفراد نوع الباعضة أو قبيلة البواعض .

2ـ متعلق أو مرتبط أو متأثر بالبعوض من نوع الباعضة ، أو من قبيلة البواعض .

البَواعِض **Culicini**

قبيلة من البعوض من فُصيلة البعوضات ؛ من أنواعها ذات الأهمية الطبية كل من الباعضة والبعيضة .

البُعَضوضِيَّات **Culicoides**

هو جنس من الذباب العاض من فصيلة الذقطيات ؛ بعضها نواقل لأمراض فيروسية مثل ازرقاق اللسان ، وداء الخيول الأفريقية . وتعمل البعضوضية أيستونا (Culicoides austeni) والبعضوضية جراهما (Culicoides grahami) كثوي متوسط للدودة المدورة المسماة المنسونيلة اللجوجة بينما تعمل البعضوضية فيرانس (Culicoides Furens) وربما أنواع أخرى من البعضوضية كثوي متوسط للمنسونيلة الأوزاردية .

بُعاض **culicosis**

هو الْتهابُ الجِلْد بلَدْغ البَعوض .

البُعَيضَة **Culiseta**

هو جنس بعوض من فُصيلة البعوضات ، والتي ينقل البعض منها فيروسات ممرضة ؛ كانت تسمى في السابق (ثيوبلاديا) (Theobaldia) . تعتبر البعيضة المذهبة ناقلاً لڤيروس الوادي

المزارع الاعتيادية للجراثيم أو الخلايا الحيوانية .

مَزْرَعَةٌ مُوهَّنَة attenuated culture

هي مـزرعـة لمكروبات ممرضـة تم إضـعـاف أو إبطال فوعتها .

مَزْرَعَةٌ وَجيبيَّة batch culture

مَزْرَعَةٌ دَمَويَّة blood culture

هو اختبارَ مكروبيولوجي لعيّنة دموية بغرض تحري وجود المكروبات فيها .

مَزْرَعَةٌ خَلَويَّة cell culture

هو المحافظة على الخلايا الحيوانية أو تنميتها في أنبوب الاختبار ، أو مزرعة من مثل تلك الخلايا .

مَزْرَعَةٌ سقائيَّةٌ مَشيمائيَّةٌ chorioallantoic culture

هو استنبات المكروبات أو الخلايا ، أو الأنسجة على السِّقاءُ المَشيمائيُّ للدجاج الآخذ بالنمو .

مَزْرَعَةٌ مُسْتَمِرَّةُ الجَرَيان continuous flow culture

هو استنبات الجراثيم في جريان مستمر لوسط طازج للمحافظة على النمو الجرثومي في طور لوغارتمي .

1 ـ مَزْرَعَةٌ مُباشِرَةٌ direct culture

2 ـ زَرْعٌ مُباشِر

مزرعة للمكروبات والتي يستحصل عليها بالنقل المباشر من مصدر طبيعي إلى وسط صناعي .

مَزْرَعَةٌ جَنينيَّة embryo culture

مَزْرَعَةُ الإغْناء enrichment culture

هي مزرعة تتم تنميتها في وسط ، وعادة ما يكون سائلاً ، تم إغناؤه لتشجيع نمو نوع معين من الأحياء .

مَزْرَعَةُ الحَوجَلَة flask culture

زَرْعٌ مُجزَّأ fractional culture

مَزْرَعَةُ الكُتْلَة المُعَلَّقَة hanging-block culture

هي مزرعة تَم استنباتها على قطعة من مستنبت أجاري مثبتة على ساترة زجاجية ، ويتم وضعها رأساً على عقب فوق طرف مجوف .

قنن (ف: قنة) culmina (sins.culmen)

صيغة الجمع من قنة (Culmen) .

قنيّ culminal

نسبة إلى القنة .

رأب الحالب والحويضية بحسب كالب و دي ويرد Culp-De Weerd ureteropelvioplasty

[رأب منسوب للجراح أرمند سكينر كالب (Culp - De Weerd) ، وهو جراح أمريكي ، عاش ما بين 1910-1977 ، والجراح جيمس هنري دي ويرد (James Henry De Weerd) ، وهو جراح أمريكي ، ولد عام 1914] .

انظر تحت ureteropelvioplasty .

تطبيبٌ اعتِباطيّ cult

هو نظام لمعالجة الأمراض ، والذي يقوم على نظريات خاصة وغير علمية بالنسبة لمسببات الأمراض .

استِنْبات cultivation

هو إكثار الكائنات الحية ، ويطلق هذا المصطلح تحديداً على تكاثر الخلايا في الأوساط الصناعية .

زروع culturable

أي أنه يمكن زرعه .

1 ـ ثقافِيّ cultural

2 ـ مَزْرَعِيّ

يتعلق بالزرع .

1 ـ ثقافة culture

2 ـ مَزْرَعَة

3 ـ زَرْع

1 ـ إكثار (تكاثر) المكروبات أو الأنسجة الحية في أوساط خاصة ملائمة لنموها .

2 ـ نمو المكروبات أو الخلايا الحية الأخرى .

3 ـ تحفيز تكاثر المكروبات ، أو خلايا الأنسجة الحية في أوساط ملائمة لنموها .

انظر تحت culture medium .

مَزْرَعَةٌ لامُتَزامِنَة asynchronous culture

هي مزرعة تتوزع فيها الخلايا بصورة عشوائية من حيث أطوار الانقسام الخلوي ، كما هو حال

انظر تحت stab culture .

مَزْرَعَةٌ سَلْبِيَّة **negative culture**

مزرعة لا يحدث فيها نمو أو تكاثر للمكروب الذي يتم التحري عنه .

مَزْرَعَةٌ مَمْزوجَةٌ وَحيدَةُ الاتِّجاه لِلْمُفاوِيَّات **one-way mixed lymphocyte culture**

مَزْرَعَةٌ مَمْزوجَةٌ لِلْمُفاوِيَّات تمنع فيها خلايا أحد الشخصين من الاستجابة بواسطة معاملتها بالإشعاع أو الميتوميسين .

زَرْعُ الأَعْضاء **organ culture**

مزرعة الصفيحة **plate culture**

مزرعة تستنبت في وسط ، عادة ما يكون من الأجار أو الهلام ، في طبق بتري .

مَزْرَعَةٌ إيجابيَّة **positive culture**

هي مزرعةَ يثبت فيها نمو وتكاثر المكروب الذي يجري التحري عنه .

مَزْرَعَةٌ أَوَّلِيَّة **primary culture**

هي مزرَعة من الخلايا أو الأنسجة والتي تستحصل بالنقل المباشر من مصدر طبيعي أو من وسط صناعي .

مَزْرَعَةٌ خالِصَة **pure culture**

هي مزرَعة تحتوي على نوع واحد من المكروبات ، دون أية ملوثات .

زَرْعٌ كَمِّيٌّ **quantitative culture**

مزرعة النظير المشع **radioisotopic culture**

مزرعة جرثومية تحتوي على كربوهيدرات موسومة بالكربون 14 . يتم تحري الاستقلاب من خلال انبعاث $14CO_2$ ، مما يوفر مؤشراً مبكراً على النمو أبكر مما توفره الطرق التقليدية .

مَزْرَعَةُ الأُنْبوبَة الدَّوَّارَة **roll-tube culture**

مزرعة يتم فيها تلقيح أنبوب من وسط الأجار الذائب وتدويره فيما يجري تصلبه ، بحيث يتوزع الوسط بشكل طبقة رقيقة على السطح الداخلي للأنبوب . تستعمل هذه الطريقة في عد المستعمرات ، وبخاصة فيما يتعلق بالجراثيم اللاهوائية .

مَزْرَعَةُ القَطْرَةِ المُعَلَّقَة **hanging-drop culture**

هي مزرعة يتم فيها تلقيح المادة المراد استنباتها في قطرة من السائل متصلة بساترة زجاجية ، يتم وضعها رأساً على عقب فوق طرف مجوف .

الزَّرْعُ الهِسْتولوجِيُّ لِمَقاطِعِ الجُرْح **histological culture of wound sections**

مُسْتَنْبَتٌ زَرْعِيّ **medium culture**

مَزْرَعَةٌ مُخْتَلَطَة **mixed culture**

هي مزرعة تحتوي على نوعين أو أكثر من المكروبات .

مَزْرَعَةٌ مَمْزوجَةٌ لِلكُرَيَّات البَيْضاء **mixed leukocyte culture**

مَزْرَعَةٌ مَمْزوجَةٌ لِلْمُفاوِيَّات **mixed lymphocyte culture**

يرمز لها اختصاراً (MLC) ، وهو نوع من اختبار تكاثر اللمفاويات ، ويتم فيه زرع لمفاويات من شخصين مختلفين معاً ويتم قياس الاستجابة التكاثرية (التفاعل اللمفاوي المختلط) بواسطة قبط الثيميدين الموسوم ^{3}H- . يمكن إجراء هذا الاختبار بشكل مزرعة ممزوجة اللمفاويات «ثنائية الاتجاه» تتكاثر فيها خلايا من كل من الشخصين ، أو «وحيدة الاتجاه» وتمنع فيها خلايا أحد الشخصين من الاستجابة بواسطة معاملتها بالإشعاع أو الميتوميسين . وتستعمل ثلاث محددات : مزرعتان من أزواج مسانجة ، بنوعيها غير المعالجة أو المعالجة بالإشعاع أو الميتوميسين ، ومزرعة من زوجين خيفيين غير معالجة بالإشعاع أو الميتوميسين . وتعد الفائدة الإكلينيكية الرئيسية من استعمال مزرعة اللمفاويات الممزوجة هي انتقاء المتبرعين الملائمين لنقي العظم ، أو في حالات الزرع الخيفي للكلية المأخوذة من أحياء ولتنميط مستضدات (HLA-D) ؛ كما تستعمل في تشخيص أمراض عوز المناعة .

مَزْرَعَةٌ إبَرِيَّة **needle culture**

هي مَزْرَعَةٌ وَخْزِيَّة .

بشكل متعرج على سطحه .

مَزْرَعَةٌ فَرْعِيَّة **subculture culture**

مزرعة تستحصل من مزرعة سابقة .

زَرْعٌ سَطْحِيّ **surface culture**

مَزْرَعَةٌ مُعَلَّقَة **suspension culture**

مزرعة تتضاعف فيها الخلايا فيما تكون معلقة في وسط ملائم .

مَزْرَعَةٌ مُتَزامِنَة **synchronous culture**

هي مزرعة من خلايا حيوانية أو جرثومية يكون الخلايا فيها في نفس الطور من الانقسام الخلوي .

1 ـ مَزْرَعَةٌ وَخْزِيَّة **thrust culture**

2 ـ زَرْعٌ وَخْزِيّ

انظر تحت stab culture .

1 ـ مَزْرَعَةٌ نَسيجيَّة **tissue culture**

2 ـ زَرْعُ النُّسُج

هي المحافظة على الأنسجة ، أو مناشم الأعضاء ، أو كامل الأعضاء ، أو أجزاء منها ، أو استنباتها في الأنابيب بشكل يحفظ بنيتها و/ أو وظيفتها .

مَزْرَعَةُ الأُنْبوب **tube culture**

مَزْرَعَةٌ نَمَطِيَّة **type culture**

هي مزرعة من أي نوع من المكروبات تتم المحافظة عليها عادة ضمن مجموعة مركزية من المزارع التنمطية أو القياسية .

مُسْتَنْبَت **culture medium**

(ج: مَنابِت؛ مُسْتَنْبَتات) **(pl.culture media)**

(=agar)

أي مادة أو مستحضر تستعمل في استنبات الخلايا الحية .

مُسْتَنْبَتُ الأَسيتات التَّفْريقيُّ **acetate differential culture medium**

مُسْتَنْبَتٌ أَجاريّ **agar culture medium**

هو الأجار ، أي أنه مستنبت يستعمل فيه الأجار كعامل تصليب .

مُسْتَنْبَتٌ أَلْبوميني **albumin culture medium**

مُسْتَنْبَت أميز لِلنَّقْل **Amies transport medium**

وسط أجاري يحتوي على ثيوجليكولات

مَزْرَعَةٌ ثانَوِيَّة **secondary culture**

هي مزرعة مستحصلة من مزرعة أولية .

مَزْرَعَةٌ انْتِقائِيَّة **selective culture**

هي مزرعة يتم استنباتها على وسط ، عادة ما يكون صلباً ، تم إغناؤه لتحفيز نمو نوع واحد من عينات المكروبات . وقد تتضمن كذلك مواد تثبط نمو أنواع أخرى .

مَزْرَعَةٌ مُحَسَّسَة **sensitized culture**

خلايا جرثومية تم حضنها مع مصل ضدي معين .

مَزْرَعَةٌ مُرَجَّجَة **shake culture**

مزرعة يتم عملها بتلقيح وسط استنبات دافئ من الأجار السائل في أنبوب ، ورجه لتوزيع المحتويات بشكل متساو . يسمح إلقاح المزرعة المعاد تصليبها بنشوء مستعمرات منفصلة ، وهو ما ينفع بوجه خاص في حالات الجراثيم اللاهوائية الإجبارية .

1 ـ مَزْرَعَةٌ مائِلَة **slant culture**

2 ـ زَرْعٌ مائِلٌ

مزرعة يتم عملها على سطح مائل لوسط صلب في أنبوب ، بعد إمالة الأنبوب للوصول إلى سطح أكبر للاستنبات .

1 ـ مَزْرَعَةٌ مائِلَة **slope culture**

2 ـ زَرْعٌ مائِلٌ

انظر تحت slant culture .

1 ـ مَزْرَعَةٌ وَخْزِيَّة **stab culture**

2 ـ زَرْعٌ وَخْزِيّ

هي مزرعة يتم فيها إلقاح أنبوب من وسط صلب بواسطة إبرة تغرس عميقاً داخل محتوياته .

مَزْرَعَةٌ خَزينَة **stock culture**

هي مزرعة للمكروبات تتم المحافظة عليها في حالة عيوشة كسلالة قياسية ، وتزرع بشكل ثانوي في وسط جديد عند الحاجة .

مَزْرَعَةٌ تَلَمِّيَّة **streak culture**

هي مزرعة يتم فيها إلقاح وسط صلب من خلال مد عروة إلقاح سلكية تحمل اللقيحة

خلاصة اللحم والبيبتون وجلوكوز وسلفيت الصوديوم ، وسيترات البزموت أمونيوم والخضرة اللامعة ، يستعمل لاستفراد أنواع السالمونيلة ، وبخاصة السالمونيلة التيفية من البراز ، والعينات الإكلينيكية الأخرى . يسمى أيضاً مستنبت ويلسون ـ بلير (Wilson-Blair culture medium) .

أجار الدم **blood agar**

هو وسط من الأجار يحتوي على نقيع القلب والبيبتون ، وكلوريد الصوديوم ، ويتم تعقيمه بالبخار المضغوط ، ثم إغناؤه بإضافة دم عقيم مزال الفبرين ، يستعمل في مزارع الصفيحة وفي المزارع الفرعية لاختبار انحلالية الدم . يمكن أن يستعمل دم الخراف من أجل العقديات من المجموعة A ، أو الأرانب (من أجل الدموية نظيرة الحالة للدم) ، أو من الحصان .

أجارُ بُورْده ـ جنْجو **Bordet-Gengou agar**

هو أساسٌ (قاعدة) من الأجار ، والذي يحتوي على نقيع البطاطس وجليسرول ، وكلوريد الصوديوم ، تم إغناؤه بالدم ، يستعمل لاستفراد البورديتيلة الشاهوقية والبورديتيلة نظيرة الشاهوقية .

مُسْتَنْبَتُ نَقيعِ الدِّماغِ والقَلْب **brain-heart infusion medium**

وسط من الأجار ، والذي يحتوي على نقيع قلب ودماغ العجل وبيبتون وجلوكوز ودارئة من الفسفات ويمكن إضافة دم الخراف . يستعمل لاستنبات الجراثيم والشعيات والفطريات . ويمكن استعمال وسط من المرق دون أجار لاستنبات المكورة الرئوية في اختبار انحلالية الصفراء .

أجارُ الخُضْرَةِ اللامعَة **brilliant green agar**

هو وسط أساسي (قاعدي) شديد الانتقائية للاستفراد يحتوي على خلاصة الخميرة وبيبتون ولاكتوز وسكروز وكلوريد الصوديوم ، وأحمر الفينول الخضرة اللامعة في أساس (قاعدة) من الصوديوم ، وكلوريد الصوديوم ، أو البوتاسيوم ، ودارئة من الفسفات وكلوريد الكالسيوم وكلوريد المغنيزيوم وفحم متعادل ، يستعمل في نقل العينات للمزارع اللاهوائية .

مُسْتَنْبَتٌ 3FDA بالمُضادِّ الحَيَوي **antibiotic culture medium 3FDA**

وسط من المرق يحتوي على ببتون ، وخميرة وخلاصة اللحم وكلوريد الصوديوم وجلوكوز ، ودارئة من الفسفات ، ويستعمل لاختبار نشاط العوامل المضادة الحيوية في مواجهة الفطريات .

مُسْتَنْبَتٌ 12FDA بالمُضادِّ الحَيَوي **antibiotic culture medium 12FDA**

وسط من الأجَار يحتوي على ببتون وخميرة وخلاصة اللحم وكلوريد الصوديوم وجلوكوز ، ويستعمل لاختبارات حساسية تخفيف الأجار بالمضادات الحيوية المضادة للفطريات . يسمى أيضاً أجار مقايسة النيستاتين (Nystatin assay agar) .

مُسْتَنْبَتٌ قاعديّ **basal culture medium**

مُسْتَنْبَتُ نَقيعِ لَحْمِ البَقَر **beef infusion culture medium**

هي مستنبت نقيعي .

انظر تحت infusion medium .

مُسْتَنْبَتُ أمْلاحِ الصَّفْراء **bile salt culture medium**

أجارُ الصَّفْراء و الإسْكولين **bile-esculin agar**

هو وسط منَ الأجَار يحتوي على خلاصة اللحم والبيبتون وصفراء الثور وسيترات الحديديك والإسكولين ، وقد يتم إغناؤه أحياناً بمصل الحصان ، يستعمل في التحري عن وجود العقديات من المجموعة D .

أجار حب الطائر **birdseed agar**

هو أجار ستيب .

انظر تحت Staib agar .

أجارُ سُلْفيت البزْموت **bismuth sulfite agar**

هو مستنبت من الأجار ، والذي يحتوي على

الأجار ، والذي يستعمل لاستنبات أنواع من السالمونيلة من غير السالمونيلة التيفية .

أجارُ البْرُوسيلاَّت **Brucella agar**

وسط أجار يحتوي على هضامة الكازئين البنكرياسية والهضامة المعدية لنسج حيوانية وحلالة الخميرة الذاتية والجلوكوز لزرع واستفراد البروسيلة . ويمكن إغناؤه بإضافة دم الخراف ومحلول فيتامين K_1 لاستفراد الجراثيم اللاهوائية .

مُسْتَنْبَتٌ الجليسرول والأساس الملحي المَدْروء **buffered glycerol saline base culture medium**

وسط من المرق يحتوي على كلوريد الصوديوم ودارئة من الفسفات وأحمر الفينول وجليسرول ، يستعمل لنقل مواد العينات البرازية وحفظها .

مُسْتَنْبَت العَطائف **Campylobacter medium**

وسط أجاريَ يحتوي على هضامة الكازئين البنكرياسية ، والهضامة المعدية لنسج حيوانية ، وحلالة الخميرة الذاتية وجلوكوز ، وكلوريد الصوديوم وبيسلفيت الصوديوم ، ويتم إغناؤه بالكريات الحمراء من الخراف والفانكوميسين والتريمتوبريم والبوليمكسين والأمفوتريسين والسيفالوثين ؛ يستعمل لاستفراد العطائف من العينات برازية المصدر .

مَرَقُ الكربوهيدرات **carbohydrate broth**

وسط من المرق يحتوي على نقيع القلب أو البيبتون وكلوريد الصوديوم ، ومشعر تتم إضافته مع سكر مفرد ، يستعمل لاختبار القدرة على تخمير السكاكر المتنوعة .

مُسْتَنْبَت كاري ـ بلير للنَّقل **Cary-Blair transport medium**

هو وَسط أجاري يحتوي على ثيوجليكولات وفسفات ، وكلوريد الصوديوم ، يستعمل لجمع وحفظ العينات الإكلينيكية التي تحتوي على المكروبات موجبة الجرام الاختيارية . يمكن إغناء الوسط بكلوريد الصوديوم وبيسلفيت الصوديوم وريسازورين لاستنبات اللاهوائيات .

أجارُ الكازين **casein agar**

وسط يحتوي على لبن مقشود مجفف وأجار ، يستعمل للتفريق بين النوكاردية والمتسلسلة .

أجار سيتريميد **cetrimide agar**

وسط أجاري يحتوي على بيبتون وكلوريد المغنيزيوم وسلفات البوتاسيوم وهيدروكلوريد السيتريمونيوم (سيتريميد) ، وأحياناً الجليسرول ، والذي يستعمل للتفريق بين الذراري المختلفة من الزائفة .

أجارُ تشابْمان ـ ستُون **Chapman-Stone agar**

مُسْتَنْبَت فَحْميّ **charcoal culture medium**

مستنبت منَ نقيع قلب العجل والبيبتون ، والذي يحتوي على نشاء ذواب ، وخلاصة الخميرة والفحم . يتم إغناء الوسط الأساسي بدم الخراف والسيفالكسين للزرع الانتقائي للبورديتيلة الشاهوقية .

أجار الفحم وخلاصة الخميرة **charcoal-yeast extract agar**

هو وسط أجاري يحتوي على الفحم النشط وسيستئين L وبيروفسفات الحديديك ، وخلاصة الخميرة ، يستعمل لاستنبات الفيلقية .



أجارُ البْرُوسيلاَّت **Brucella agar**

لتحري إنتاج اليورياز ، وبخاصة في الجراثيم المعوية مثل أنواع المتقلبة والمستخفية والشعيات الهوائية .

انظر تحت urease test broth .



Chopped meat broth مَرَقُ اللَّحمِ المَفْرُوم

citrate agar **أجارُ السِّيْترات**

وسط أجاري يحتوي على سيترات الصوديوم وكلوريد الصوديوم وسلفات المغنيزيوم ، وزرقة البروموثيمول ، ودارئة من الفسفات ، يستعمل لاختبار قدرة العصيات سالبة الجرام ، وبخاصة الأمعائيات ، على استعمال السيترات كمصدر وحيد للكربون .

Columbia colistin-nalidixin acid (CAN) agar **أجار كولمبيا من الكوليستين وحمض الناليديكسيك**

وسط أجاري يحتوي على البيبتون ، ونشاء الذرة ، وكلوريد الصوديوم ، والكوليستين ، وحمض الناليديكسيك ، ودم الخراف ، يستعمل للزراعة الانتقائية للمكورات موجبة الجرام ، وبخاصة أنواع المتقلبة .

cooked-meat culture medium **مُسْتَنْبَتُ مَطْبوخِ اللَّحْم**

مستنبتٌ يدخل في تركيبه اللحم المطبوخ .

corn meal agar **أجار دَقيقِ الذُّرَة**

charcoal-yeast extract diphasic blood culture medium **مستنبت الدم ثنائي الطور المزود بالفحم وخلاصة الخميرة**

وسط ثنائي الطور يتكون من منحرف سفلي يحتوي على الفحم والأجار ، مغطى جزئياً بمرق سائل يحتوي على خلاصة الخميرة وسيستئين L ونيترات الحديديك . يستعمل في استنبات الفيلقية .

chlamydospore agar **أجارُ الأبْواغِ المُتَدَثِّرَة**

وسط ملحي غير عضوي يحتوي على عديد سكاريد وبيوتين وزرقة التريبان ، يستعمل للكشف عن المبيضات البيض من خلال تهيئة الظروف المفضلة للأبواغ المتدثرة التي يصبغها الصباغ بلون أزرق .

chocolate culture medium **مُسْتَنْبَت شُوكُولاتيّ**

وسط أجَاري يحتوي على هضامة السيستئين والبيبتون ونشاء الذرة ، وكلوريد الصوديوم ، ودارئة من الفسفات ؛ ويضاف إليه الدم أو الهيموجلوبين المعقم ، ويسخن الوسط حتى يتخذ لون الشوكولاتة البني . ويمكن استعمال أوساط أجارية أخرى كأساس . يستعمل لاستفراد المكروبات المرهفة مثل المستدمية النزلية أو أنواع النيسرية .

chopped meat broth (CM broth) **مَرَقُ اللَّحمِ المَفْروم**

هو وسط سائل يحتوي على لحم مفروم معالج بهيدروكسيد الصوديوم ، وهضامة الكازئين وخلاصة الخميرة ودارئة من الفسفات والسيستئين . وقد يتضمن الهيمين وفيتامين K_1 وجلوكوز ، وريسازورين . يستعمل لاستنبات الجراثيم اللاهوائية ، وبخاصة أنواع المطثية .

Christensen's urea agar **أجار يوريا كريستنسن**

وسط أجاري يحتوي على الببتون ، وهضامة الهلام وكلوريد الصوديوم وجلوكوز وحمرة الفينول واليوريا ودارئة من الفسفات ، يستعمل

أجار تشابيك ـ دُوكْس **Czapek-Dox agar**
هو وسط أجاري يحتوي على السكروزونترات الصوديوم وسلفات المغنيزيوم وكلوريد البوتاسيوم وسلفات الحديدوز ، ودارئة من البوتاسيوم ، يستعمل لاستنبات النوكاردية والمتسلسلة والفطريات . يسمى أيضاً محلول تشابيك ـ دُوكْس (Czapek - Dox solution) .

مُسْتَنْبَتُ نازعَة الكَرْبُوكْسَيلَ **decarboxylase culture medium**
مستنبت سائل يحتوي على خلاصة لحم البقر ، والببتون والجلوكوز ، يضاف إليها حمض أميني (عادة يكون لايسين ، أو أرجينين ، أو أورنيثين) ؛ لاختبار فاعلية نازعة كربوكسيل الحمض الأميني كسمة تفريقية لبعض الجراثيم وبخاصة الأمعائيات .

مُسْتَنْبَتٌ مُحَدَّد **defined culture medium**

أجار الديوكْسي كُولات ـ ستْرات **deoxycholate-citrate agar**
هو وسط أجَاري يحتوي على نقيع اللحم والببتون واللاكتوز وسيترات الصوديوم ، وسيترات الحديديك ، وديوكسي كولات الصوديوم الحمرة المعتدلة ، يستعمل للاستنبات الرئيسي واستفراد السالمونيلة والشيجيلة .

أجار الديوكْسي كُولات **deoxycholate agar**
هو وسط أجاري يحتوي على الببتون واللاكتوز وسيترات الصوديوم وكلوريد الصوديوم ، وديوكسي كولات الصوديوم ، والحمرة المعتدلة ، ودارئة من البوتاسيوم ، يستعمل لاستفراد الأمعائيات والتفريق بين الأنواع التي تخمر اللاكتوز والأنواع التي لا تخمر اللاكتوز .

أجار الدَّكْستروز **dextrose agar**

أجار النَّشا والدِّكْستروز **dextrose starch agar**

مُسْتَنْبَتٌ تَفْريقيّ **differential culture medium**
مستنبت ، هو عادة ما يكون صلباً ، يظهر وجود نوعين أو أكثر من المكروبات المتشابهة من خلال الفوارق بين أشكال مستعمراتها . وقد يكون مثل ذلك المستنبت انتقائياً أو غير انتقائي .

هو وسط أجاري يحتوي على نقيع عصيدة الذرة ، ويستعمل لتحفيز التبوغ لتحديد الفطريات . وبإضافة (Tween 80) يحفز إنتاج الأبواغ المتدثرة لأنواع المبيضة . كما يمكن إغناؤه بالجلوكوز والسكروز ، وخلاصة الخميرة لاستنبات الفطريات بشكل عام .

أجار السيكلوسيرين والسيفوكسيتين والفركتوز وصفار البيض **cycloserine cefoxitin fructose egg yolk agar**
هو وسط أجاري يحتوي على الببتون وكلوريد الصوديوم وسلفات المغنيزيوم ، والفركتوز ، والحمرة المعتدلة ، ودارئة من الفسفات ، يتم إغناؤه بالسيكلوسيرين ، والسيفوكسيتين ، وصفار البيض ويستعمل كوسط انتقائي للمطثية العسيرة .

أجار السِّيسْتين والقَلْب **cystine-heart agar**
وسط أجاريَ يحتوي على نقيع قلب البقر والببتون ، والجلوكوز ، وكلوريد الصوديوم والسيستين L . يتم إغناء الوسط بالهيموجلوبين من أجل تطافر أنواع العفن الهياليني ثنائي الشكل .

أجار السِّيسْتين والتِّلُّوريت **cystine-tellurite agar**
هو وسط أجاري يحتوي على نقيع اللحم وتيلوريت البوتاسيوم والسيستين والأجار المدعم بالدم ، يستعمل لاستفراد الوتدية الخناقية .

أجار السِّيسْتين والتربْتيكاز **cystine-trypticase agar**
وسطَ أجاري يحتوي على السيستين وهضامة الكازين البنكرياسية ، وكلوريد الصوديوم ، وسلفيت الصوديوم ، وحمرة الفينول ، ويستعمل كمستنبت تفريقي هوائي للاستنبات العام للجراثيم الممرضة بما فيها المكروبات المرهفة . ويمكن تدعيمه بسكاكر معينة واستعماله لاختبار تفاعلات التخمر الخاصة بأنواع النيسرية .

للاستفراد الرئيسي لأنواع الأمعائيات .

مُسْتَنْبَتُ الإسكُولين **esculin culture medium**

وسط أجَاري يحتوي على نقيع القلب والببتون ، وكلوريد الصوديوم ، وسيترات الحديدين ، والإسكولين ، يستعمل للتفريق بين الإشريكية والشيجيلة .

مستنبت FDA **FDA medium**

1ـ هو مُسْتَنْبَتٌ 3FDA بالمُضادِّ الحَيَوي .

انظر تحت antibiotic culture medium 3FDA .

2ـ هو مُسْتَنْبَتٌ 12FDA بالمُضادِّ الحَيَوي .

انظر تحت antibiotic culture medium 12FDA

مستنبت فيلي ـ جورمان **Feeley-Gorman (F-G) agar**

هو وسط أجاري يحتوي على حلامة الكازين وخلاصة لحم البقر والنشا والسيستئين L ، وبيروفسفات الحديديك ، يستعمل لاستفراد الفيلقية . ويمكن استعمال مستنبت من المرق لا يحتوي على الأجار لنفس الغرض .

مُسْتَنْبَتُ التَّخَمُّر **fermentation medium**

وسط أساسي لا يحتوي على سكريات يضاف إليه سكر وحيد لاختبار تخمره .

أجار فيلدز للإغناء **Fildes enrichment agar**

هو هضامة إنزيمية عقيمة من دم الخراف تضاف إلى المستنبتات الصلبة ، أو السائلة لاستنبات واستفراد المستدمية النزلية والعقديات المرهفة .

مستنبت فليتشر **Fletcher medium**

هو مستنبت سائل يحتوي على الببتون وخلاصة لحم البقر ، مضاف إليه لإغنائه 20٪ مصل أرنب مجمع طازج ، يستعمل لاستفراد واستنبات وحفظ البريمية .

مُسْتَنْبَتٌ هُلامِيّ **gelatin culture medium**

هو مستنبت يحتوي على مرق خلاصة أو نقيع مصلب بواسطة 12٪ هلام ، يستعمل لاختبار نشاط الجيلاتيناز في سياق تحري وجود السراتية والمطثية . يمكن تدعيم المستنبت بالثيوجليكولات لاستنبات المطثية في بيئة هوائية .

أجار اختْبار الدَّناز **DNase test agar**

وسط أجَاري يحتوي على حمض نووي ريبي منزوع الأكسجين والببتون ، وكلوريد الصوديوم ، وزرقة التولوئين ، يستعمل للتفريق بين ذراري السيراتية والأمعائيات والعنقوديات .

أجار مُحِّ البَيْض **egg yolk agar**

وسط أجاري يحتوي على الببتون ، ودارئة من الفسفات ، وكلوريد الصوديوم وجلوكوز ، ومستحلب صفار البيض ، يستعمل لاستنبات العصوية الجمرية . ويمكن استعماله عندما يتم تدعيمه بالهيمين أو خلاصة الخميرة لاستنبات المطثية ولتحري نشاط الليسيثيناز والليباز .



أجار مُحِّ البَيض **Egg yolk agar**

أجار اليُوزين وَزُرْقَة المتيلين **EMB agar (eosin-methylene blue agar)**

أجار إنْدُو **Endo agar**

مُسْتَنْبَتٌ مُغْنَى **enriched culture medium**

مستنبت أساسي أضيفت إليه مغذيات معينة مثل المصل ، أو الدم ، أو الڤيتامينات لتحفيز نمو مكروبات معينة .

أجار اليُوزين وَزُرْقَة الميثيلين **eosine-methylene blue agar**

وسط أجاري يحتوي على الببتون واللاكتوز ، واليوزين Y ، وزرقة الميثلين ثنائي بوتاسيوم الفسفات ، وقد يضاف إليه السكروز . يستعمل

الانتقائي للمكروبات اللاهوائية ، وبخاصة العصوانية .

أجار كليجلَر الحديديُّ **Kligler iron agar**
هو أجار الحَديد الثُّلاَثيِّ السَّكاكر .
انظر تحت triple sugar iron agar .

أجار الدم المنحل **laked blood (LB) agar**
مستنبت صلب يحتوي على دم تم حله لإطلاق الهيمين .

مُسْتَنْبَتُ عَبَّاد الشَّمْس باللَّبَن **litmus-milk culture medium**
مستنبتَ من اللبن يحتوي على كمية كافية من محلول عباد الشمس بما يكفي لمنحه لوناً أرجوانياً غامقاً ، يستعمل لاختبار تخمر اللاكتوز وإنتاج الغاز في سياق تحري المطثية الحاطمة .

أجار ليتمان **Littman agar**
هو وَسط أجاري يحتوي على الببتون ، وصفراء الثور ، وجلوكوز ، وبنفسجية البلور . يمكن إضافة الستريبتوميسين لتثبيط الجراثيم ، ويمكن تدعيم المستنبت بخلاصة حب الطير . ويستعمل لاستفراد واستنبات الفطريات .

مُسْتَنْبَت لُوفلَر مع المصل المتخثر **Loeffler coagulated serum medium**
هو مستنبت يحتوي على نقيع لحم العجل ومصل البقر ، ويكون مصلباً بتخثير المصل ، يستعمل في استفراد الوتدية الخناقية .

مُسْتَنْبَت لُوفنْشتاين ـ يانْسن **Lowenstein-Jensen culture medium**
هو مستَنبت صلبَ يحتوي على أسباراجين وطحين البطاطس وجليسرول ، وسلفات المغنيزيوم ، وخضرة المالاشيت ، وسيترات المغنيزيوم ، والبيض الكامل ، يستعمل للاستفراد الأولي للمتفطرات ؛ يتم تصليب المستنبت بالتخثير الحراري للبيض .

أجار اللِّيزين والحَديْد **lysine-iron agar (LIA)**
هو وسطَ أجاريَ يحتوي على الببتون ، وخلاصة الخميرة ، وجلوكوز ، وليسين L ،

مَرَقُ سَلْبِيَّات الجرام **gram-negative broth**
هو مستنبتَ سائل يحتوي على الببتون وجلوكوز ، ومانيتول D ، وسيترات الصوديوم ، وديوكسي كولات الصوديوم ، وكلوريد الصوديوم ، ودارئة من الفسفات ، يستعمل كوسط إغناء للمزارع الأولية للسالمونيلة والشيجيلة في العينات البرازية .

أجار نَقيع القَلْب **heart-infusion agar**
هو وسطَ أجاري يحتوي على نقيع قلب البقر ، والببتون ، وكلوريد الصوديوم ، ويستعمل كأساس (كقاعدة) لأجار الدم وأجار الإسكولين .

أجار هكْتُون المِعَوي **Hektoen enteric agar (HE agar)**
هو وسط أجاري يحتوي على الببتون ، وأملاح الصفراء ، وخلاصة الخميرة ، ولاكتوز ، وسكروز ، وساليسين وكلوريد الصوديوم ، وثيوسلفات الصوديوم ، وسيترات أمونيوم الحديديك ، والفوكسين الحمضي وزرقة البروموثيمول . وهو مستنبت انتقائي للاستفراد الأولي ، وتحري وجود العوامل الممرضة المعوية ، وبخاصة المكروبات القولونية والسالمونيلة والشيجيلة .

مُسْتَنْبَتٌ مُؤَشِّر **indicator culture medium**

مُسْتَنْبَت نَقيعيّ **infusion medium**
مستنبت يحَتوي على نقيع لحم طازج (عادة ما يكون من العجل أو البقر) ، وببتون ، وكلوريد الصوديوم ، يستخدم كمستنبت سائل (مرق) أو يتم تصليبه بالأجار ، ويستعمل لاستنبات الجراثيم المرهفة وكأساس للمستنبات المغناة .

أجار الدم مع الكاناميسين والجنتاميسين **kanamycin-vancomycin blood agar**
هو وسط أجاري يحتوي على هضامة الكازين وهضامة وجبة فول الصويا ، وكلوريد الصوديوم ، وخلاصة الخميرة ، ودم الخراف ، وسيستين L ، وفيتامين K ، وكاناميسين ، وفانكوميسين ، الذي يستعمل للاستفراد

مُسْتَنْبَت خُلاَصَة اللَّحْم — **meat extract medium**

مستنبت من مكوّناته خلاصة اللحم .

مُسْتَنْبَت نَقيع اللَّحْم — **meat infusion medium**

هو مستنبت نقيعي .

انظر تحت infusion medium .

مُسْتَنْبَت المُرَشِّحَة الغشائيَّة — **membrane filter medium**

مستَنبَتَ اللبن وزرقة الميثلين — **methyline blue milk culture medium**

هو وسط سائل يحتوي على مسحوق اللبن المقشود وزرقة الميثلين ، يستعمل في التحري عن العقديات .

مَرَقُ حُمْرَة الميثيل ـ فُوجس بروسكاور — **methyl red-Voges-Proskauer (MR-VP) broth**

هو مستنبت من المرق يحتوي على الببتون وجلوكوز والفسفات ، يستعمل لاستنبات الجراثيم القولونية ، والتفريق بينها في اختبارات أحمر الميثيل وفوجس ـ بروسكاور .

أجار ميدلبروك 7H10 — **Middlebrook 7H10 agar**

وسط أجاري مركب يحتوي على سلفات الأمونيوم وحمض الجلوتاميك D ، وسيترات الصوديوم وفسفات أمونيوم الحديديك وسلفات المغنيزيوم ، وبيريدوكسين وبيوتين والخضرة الدهنجية ، ودارئة من الفسفات . يضاف إليه مركب الإغناء (OADC) المكون من حمض الأولئيك وألبومين وجلوكوز وكاتالاز لحم البقر . يستعمل هذا المستنبت للاستفراد الأولي للمتفطرات ، ولاختبار التحسس لمضادات المكروبات .

مُسْتَنْبَتُ اللَّبَن — **milk culture medium**

هو لبن مقشود طازج أو مجفف يستعمل كمستنبت .

انظر تحت litmus-milk culture medium .

انظر تحت methyline blue milk culture medium .

وسيترات أمونيوم الحديديك ، وثيوسلفات الصوديوم ، وأرجواني البروم كريزول ، يستعمل في اختبار نازعة كربوكسيل الليزين ، ونازعة أمين الليزين عند الأمعائيات ، وبخاصة أجناس البروفيدنسية والمتقلبة .

أجار ماكُّونكي — **MacConkey agar**

هو وسط أجَاري يحتوي على الببتون ، ولاكتوز ، وأملاح الصفراء ، وكلوريد الصوديوم ، والحمرة المعتدلة وبنفسجية البلور ، يستعمل للتفريق بين العصيات المعوية المخمرة للاكتوز (القولونية) ، وتلك التي لا تخمر اللاكتوز .

مَرَقُ الخُضْرَة الدَّهْنَجيَّة — **malachite green broth**

أجار خُلاَصَة المالْت — **malt extract agar**

هو وسط أجَاري يحتوي على خلاصة المالت (الشعير النابت) ، والببتون وجلوكوز ، يستعمل في استنبات الخمائر والعفن .

أجار المانيتُول المِلْحيّ — **mannitol salt agar**

وسط أجاري يَحتَوي على خلاصة لحم البقر والببتون والمانيتول وحمرة الفينول ، وكلوريد الصوديوم بنسبة 7.5٪ ، يستعمل للاستفراد الانتقائي للعنقوديات الممرضة .

مَرَقُ مارْتِين — **Martin broth**

أجار مارتين ـ ليستر — **Martin-Lester agar**

شكل معدل من أجار الشوكولاتة يحتوي على مضادات حيوية ، يستعمل في النقل والاستنبات الأولي للنيسرية البنية والنيسرية السحائية .

أجار مارتين ـ لويس — **Martin-Lewis agar**

هو أجار مارتين ـ ليستر .

انظر تحت Martin-Lester agar .

مستنبت ماك برايد لاستنبات الليسترية — **Mc Bride Listeria medium**

هو وسط أجاري يحتوي على الببتون ، وخلاصة لحم البقر ، وكلوريد الصوديوم وأنهيدريد الجليسين ، وكلوريد الليثيوم ، وفينيل إيثانول ، يستعمل في استنبات الليسترية .

للنيسرية البنية والنيسرية السحائية ، ولاختبار التحسس للمضادات الحيوية والسلفوناميد . ويمكن استعمال مستنبت من المرق محضر من المكونات السابقة باستثناء الأجار لاختبار الحساسية للمضادات الحيوية من خلال اختبار تخفيف المرق .

أجار مُولَر ـ هينتُون IH — **Mueller-Hinton IH agar**

هَو وسط أجاري يحتوي على نقيع لحم البقر وحلامة الكازين والنشا والهيموجلوبين ، ومواد إغناء إضافية مركبة ، يستعمل لاستنبات الفيلقية .

مُسْتَنْبَتُ اسْتِفْرادِ المَفْطوراتَ — **Mycoplasma isolation culture medium**

وسط أجاري يحتوي على نقيع قلب البقر والببتون ، وكلوريد الصوديوم ، وخلاصة الحصان ، وخلاصة الخميرة ، والبنسلين ؛ ويمكن أن يضاف له كل من أسيتات الثاليوم وأمفوتيريسين B للحد من التلوث بالجراثيم والفطريات . كما يمكن تحضير مستنبت من المرق بحذف الأجار من المكونات . ويستعمل لاستفراد المفطورات .

مُسْتَنْبَتُ نوفي ـ ماكنيال ـ نيكول — **N.N.N. culture medium**

مُسْتَنْبَتُ الحُمْرَةِ المُتَعادِلَة — **neutral red culture medium**


مَرَقُ النِّتْرات — **nitrate broth**

مرق مغذ يحتوي على نترات الصوديوم لاختبار اختزال الجراثيم للنترات إلى نتريت .

مُسْتَنْبَتٌ مُغَذٍّ — **nutrient culture medium**

هو مستنبت جرثومي يحتوي خلاصة لحم البقر والببتون ، يستعمل كوسط سائل (مرق مغذ) ، أو يصلب بالأجار (أجار مغذ أو أجار صافٍ) لاستنبات المكروبات غير المرهفة .

مستنبت مدينة نيويورك — **NYC medium (New york City)**



أجار ميدلبروك 7H10
Middlebrook 7H10 agar

مُسْتَنْبَتُ اخْتبارِ التَّحَرُّك — **motility test medium**

هو مستنبتَ يَحتوي على خلاصة لحم البقر والببتون مصلب جزئياً من خلال اشتماله على 0.4٪ أجار ، يستعمل للتحري عن تحرك الأمعائيات . كما يمكن استعمال مستنبت يحتوي على هضامة الكازين البنكرياسية ، وخلاصة الخميرة وكلوريد الصوديوم ، و 0.3٪ أجار لاختبار تحرك الجراثيم سالبة الجرام غير المخمرة .

مَرَقُ حُمْرَةِ المتيل ـ فُوغْس بروسكاوَر — **MR-VP broth**

انظر تحت methyl red-Voges-Proskauer (MR-VP) broth .

أجار مُولَر ـ هينتُون — **Mueller-Hinton agar**

وسط أجاريَ يحتوي على نقيع لحم البقر والببتون ونشا ، يستعمل للاستفراد الأولي

مُسْتَنْبَتٌ بِتْرانْيانيّ **Petragnani culture medium**

مستنبت يحتوي على اللبن ودقيق البطاطس والبيض الكامل وصفار البيض والخضرة الدهنجية ، لاستنبات العصيات السلية ؛ يتم تصليب المستنبت بالتخثير الحراري للبيض .

مُسْتَنْبَتُ حُمْرَةِ الفينول **phenol red medium**

هو وسط سائل يحتوي على الببتون ، وكلوريد الصوديوم وحمرة الفينول ، يستعمل كمستنبت أساسي يتم تدعيمه بسكريات مختلفة لاختبار تفاعلات التخمر .

أجار الفينيل ألانين **phenylalanine agar**

وسط أجاري يحتوي على خلاصة الخميرة وفنيل ألانين DL وفسفات ثنائي الصوديوم ، وكلوريد الصوديوم ، يستعمل لاختبار نشاط نازعة أمين الفنيل ألانين بين أفراد الأمعائيات ، وبخاصة أنواع البروفيدنسية والمتقلبة .

أجار الكُحول الفنيل ـ إيثيلي بالدَّم **phenylethyl alcohol blood agar**

هو وسط أجاري يحتوي على هضامة الكازين البنكرياسية وهضامة البابائين لوجبة فول الصويا وكلوريد الصوديوم وكحول الفينيل إثيل ، ويمكن إضافة الدم منزال الفبرين . ويستعمل لاستفراد المكورات موجبة الجرام ، وبخاصة في المزارع المختلطة التي تحتوي على المتقلبة والعصيات سالبة الجرام .

مُسْتَنْبَتٌ بالصَّفيحَة **plate culture medium**

أجار البَطاطس بالدَّم **potato blood agar**

هو أجار بُورْدَه ـ جنْغُو .

انظر تحت Bordet-Gengou agar .

أجار البَطاطس بالدِّكْسْتْرُوز **potato dextrose agar**

هو مستنبت يحتوي على نقيع البطاطس جلوكوز (دكستروز) ، لاستنبات وحفز تبوغ العفن .

مستنبت مسبق الاختزال وعقيم اللاهوائيات **PRAS medium**

وسط أجاري يحتوي على ببتون البروتياز ، ونشا الذرة ، ودارئة من الفسفات ، ومصل الحصان والهيموجلوبين وجلوكوز ، وديالة الخميرة والفانكوميسين والكوليستين ، ونيستاتين وأمفوتيريسين ، ولاكتات تريميتوبريم ، يستعمل كمستنبت انتقائي للنيسرية .

أجار اختبار النستاتين **nystatin assay agar**

هو مُسْتَنْبَتٌ FDA[12] بالمُضادِّ الحَيَوي .

انظر تحت antibiotic culture medium FDA[12] .

أجار دقيق الشوفان ومعجون الطماطم **oatmeal-tomato paste agar**

هو وسط أجاري يحتوي على دقيق الشوفان المنقى ومعجون الطماطم ، يستعمل لتكوين الأبواغ الزقية في فطريات الفطر الجلدي .

مُسْتَنْبَتُ التَّأكْسُد والتَّخَمُّر **oxidation-fermentation medium**

هو وسط أجاري يحتوي على الببتون ، وكلوريد الصوديوم ، وزرقة البرمثيمول ودارئة من البوتاسيوم وجلوكوز ؛ ويمكن استخدام اللاكتوز ، أو المانيتول أو سكروز عوضاً عن الجلوكوز . يستعمل المستنبت للتفريق بين الأكسدة والتخمير في تفاعلات السكريات ، وهي سمة تستخدم في التفريق بين الأمعائيات من الراكدة ، والمقلية ، والزائفة .

مُسْتَنْبَتُ ماء البِبْتون **peptone water culture medium**

مُسْتَنْبَتُ البِبْتون وَخُلاصَة الخَميرَة والجلُوكُوز **peptone-yeast extract-glucose medium**

هو وسط سائل يحتوي على الببتون ، وخلاصة الخميرة ، والجلوكوز ، والريسازورين والسيستئين L ، وأملاح ، يستعمل كوسط ناقل للمكروبات اللاهوائية . يمكن تدعيمه بالهيمين وفيتامين K_1 ، واستعماله لتحضير مستنبت المرق الذي يستعمل في الاستشراب الغازي ـ السائل للمكروبات اللاهوائية .

هو وسط أجاري يحتوي على الجلوكوز ، والببتون ، وهضامة الكازئين البنكرياسية ، والهضامة المعدية لأنسجة حيوانية ، ويمكن إضافة المضادات الحيوية إليه . يستعمل لاستنبات وتحري الفطريات .

أجار السَّلْمُونيلاَّت والشِّيجيلاَّت **Salmonella-Shigella agar**

هو مستنبت انتقائي تفريقي يحتوي على خلاصة لحم البقر والببتون ، ولاكتوز ، وأملاح الصفراء وسيترات الصوديوم والحديديك ، وحمرة السلفات المعتدلة والخضرة اللامعة ، ويستعمل للاستفراد الأولي للعصيات المعوية وبخاصة السالمونيلة والشيجيلة .

مُسْتَنْبَتٌ انْتقائيّ **selective culture medium**

هوَ مَستنبت سائل أو صلب يحتوي على مواد ضدية (مضادات حيوية ، أصباغ ، تيلوريت ، أملاح الصفراء ، إلخ) ، والتي تسمح بنمو المكرويات المرغوبة فيما تثبط نمو الملوثات .

مَرَقُ السِّيلينيت **selenite borth**

هو وسطَ سائل يحتوي على ببتون ، واللاكتوز ، وفسفات ، وسيلينيت الصوديوم ، يستعمل كوسط إغناء لاستفراد السالمونيلة والشيجيلة .

مُسْتَنْبَتٌ نصْفُ صُلْبٍ **semisolid culture medium**

1ـ مستنبت يحتوي ما بين 0.3 ، و 0.5٪ من تركيبته أجار ، مما يمنحه قواماً نصف صلب .

انظر تحت motility test medium .

2ـ هو مستنبت يحتوي على أجار أو جيلاتين بحيث يكون سائلاً عند تدفئته ، وصلباً عند تبريده .

أجار سيترات سيمون **Simmons citrate agar**

هو أجار السِّيْترات .

انظر تحت citrate agar .

مستنبت كلوريد الصوديوم (6.5٪) **sodium chloride (6.5 per cent) culture medium**

هي أوساط مسبقة الاختزال ومعقمة من اللاهوائيات ، تستعمل لاستنبات اللاهوائيات .

انظر تحت Cary-Blair transport medium .

انظر تحت peptone-yeast extract-glucose medium .

أساسُ المَرَق الأُرْجُوانيُّ **purple broth basis**

هو مستنبَت من المَرَق يحتوي على ببتون ، وخلاصة لحم البقر ، وكلوريد الصوديوم وأرجوان البروم كريزول ، يستعمل كأساس تضاف إليه المغنيات السكرية في اختبارات التخمر .

أجار خُلاَصَة الرُّز **rice extract agar**

مُسْتَنْبَتُ حُبُوب الرُّز **rice grain medium**

هو مستنبت يَحتوي على الماء والرز الأبيض المقشور والمعقم ، يستعمل للتفريق بين أنواع الأبواغ المكروية والفطور الجلدية الأخرى .

مستنبت التوين والرز **rice-Tween Nyhv**

هو وسط أجاري يحتوي على كريمة الرز وتوين 80 (بوليسوربات 80) ، يستعمل لاستنبات الأبواغ المتدثرة في المبيضات والفطريات الأخرى .

مُسْتَنْبَتُ رُوغوزا الأنْتقائيُّ للمُلَبِّنَات **Rogosa SL medium**

هو مَستنبت انتقائي يحتوي على تريبتون ، وخلاصة الخميرة ، والجلوكوز ، وأرابينوز وسكروز ، وأسيتات وسيترات وأحادي أليئات سوربيتان ، ودارئة من الفسفات والأجار . يستعمل في استنبات وتحري الملبنات .

أجار سابحي **Sabhi agar**

[هو أجار سابورو بالدكستدوز مع نقيع القلب والدماغ] ، وهو وسط أجاري يحتوي على نقيع الدماغ ، ونقيع القلب وهضامة الجيلاتين ، والجلوكوز ، وكلوريد الصوديوم وببتون ، ودارئة من الفسفات ، ويمكن إضافة الكلورامفينيكول إليه . يستعمل لاستفراد الفطريات ذات الأهمية الإكلينيكية .

أجار سابُورُو **Sabouraud agar**

مَرَقٌ سُكَّرِيّ sugar borth

أجار جيلاَتين التِّيلُّوريت والتاوروكولات tellurite taurocholate gelatin agar


هوَ وسط أجـاري انتـقـائي يحـتـوي على توروكولات الصوديوم ، وتيلوريت البوتاسيوم وكربونات الصوديوم ، يستعمل لاستفراد الضمات .

مَرَقُ التِّتْراثيُونات tetrathionate broth

هو وسط سائل يحتوي على الببتون ، وأملاح الصفراء ، وكربونات الكالسيوم ، وثيوسلفات الصوديوم التي يتم تحويلها إلى التترا ثيونات بإضاقة اليود قبل الاستعمال مباشرة ، يستعمل كمستنبت انتقائي لاستفراد السلمونيلة من غير السلمونيلة التيفية .

أجار ثايَر ـ مارتن Thayer-Martin agar

هو أجار شوكولاتة تم إغناؤه بالڤيتامينات والعناصر المكملة الأخرى ، تضاف إليه المضادات الحيوية المثبطة (فانكوميسين وكوليستسن ونيستاتين) ، يستعمل للنقل وللاستنبات الأولي للنيسرية البنية والنيسرية السحائية .



أجار الفينيل ألانين Phenylalanine agar

هو مستنبت من المرق يحتوي على نقيع قلب البقر ، والببتون و 6.5٪ كلوريد الصوديوم ، يستعمل للاستنبات الانتقائي للمكورات المعوية (وبخاصة العقديات من المجموعة D) ، والمكروبات الأخرى المتحملة للملح . كما يمكن استعمال المرق المغذي أو أجار هضامة الكازين وفول الصويا المدعم بنسبة 6.5 بالمئة كلوريد الصوديوم للزائفة والجراثيم الأخرى غير المَخمرة سالبة الجرام .

أجار الصُّويا وَهُضامَة الكازين soybean casein digest agar

هو وسطَ أجاري يحتوي على هضامة الكازين البنكرياسية وهضامة البابائين لوجبة فول الصويا وكلوريد الصوديوم ، يستعمل كمستنبت متعدد الاستعمالات للاستفراد الأولي وكأساس لأجار الدم .

أجار ستيب Staib agar

هو وسط أجاري يحتوي على خلاصة حبوب (Guizottia abyssinica) ، والكرياتينين ، والجلوكوز والكلورامفنيكول وثنائي الفنيل ، يستعمل في التحري عن خميرة المستخفية المورمة . يسمى أيضاً أجار حب الطائر (Birdseed agar) .

أجار النَّشا starch agar

هو وسط أجاري يحتوي على الببتون ، وخلاصة لحم البقر ، وكلوريد الصوديوم ، ونشا ذواب ، يستعمل لاختبار حلمهة النشا . يمكن إضافة أرجوان البروم كريزول للتحري عن المستدمية المهبلية .

مُسْتَنْبَتُ اختْبار العَقَامَة sterility test culture medium

مَرَقُ ستيوارت المعدل Stuart borth, modified

هو مستنبت يحتوي على أملاح غير عضوية وأسباراجين وجليسرول ، يتم إغناؤه بمصل الأرنب ويستعمل لاستفراد واستنبات البريمية (جنس جراثيم من رتبة الملتويات) .

هو مستنبت يستعمل لنقل العينات الإكلينيكية بغرض الفحص الجرثومي وهم مُسْتَنْبَت أميز للنَّقْل ، ومُسْتَنْبَتٌ الجليسرول والأساس الملحي المَدْروء ، و مُسْتَنْبَت كاري ـ بلير للنَّقل ، ومُسْتَنْبَتُ البِبْتون وَخُلاَصَة الخَميرَة والغلُوكُوز .

انظر تحت Amies transport medium .

انظر تحت buffered glycerol saline base culture medium .

انظر تحت Cary-Blair transport medium .

انظر تحت peptone-yeast extract-glucose medium .

أجار الحَديد الثُّلاثِيِّ السَّكاكر **triple sugar iron agar**

هو وَسَط أجارِيّ يحتوي على البِبتون ، واللاكتوز والسكروز ، والجلوكوز وسلفات أمونيوم الحديدوز وثيوسلفات الصوديوم ، وكلوريد الصوديوم ، وحمرة الفينول ، يستعمل للفحص التمهيدي للأمعائيات . يسبب إنتاج سلفيد الهيدروجين تكون سلفيد الحديدوز الأسود على طول خط الوخز ، ويسبب إنتاج الغاز ظهور فقاعات في الأجار ، ويمكن تحري تخمر السكر من خلال كمية الحمض الناتج .

مَرَقُ فول الصُّويا بالتريبتيكاز **trypticase soy bean broth**

هو وسطٌ يحتَوي على هضامة التربسين لوجبة فول الصويا والببتون ، وكلوريد الصوديوم ، ودارئة من الفسفات ، وجلوكوز و0.1٪ أجار ، يستعمل للاستنبات الأولي للجراثيم المرهفة بما فيها اللاهوائيات .

أجار التيروزين والزانثين **tyrosine xanthine agar**

وسط أجاري يحتوي على الأجار المغذي ، والتيروزين أو الزانثين ، يستعمل للتفريق بين أنواع الشعيات الهوائية .

أجار اليوريا كريستنسن **urea agar of Christensen**

مُسْتَنْبَتُ الثِّيوجليكُولات **thioglycollate culture medium**

هو وسطٌ سائل يحتوي على الببتون والجلوكوز وكلوريد الصوديوم ، وثيوجليكولات الصوديوم ، والسيستين L ، وسلفيت الصوديوم ، و0.7٪ أجار ، يتم إغناؤه بمصل الأرنب . يستعمل كمستنبت متعدد الاستعمالات لاستنبات كل من الجراثيم الهوائية واللاهوائية . يمكن إضافة زرقة الميثيلين إليه كمشعر اختزال وأكسدة ، كما يمكن إغناء المستنبت بخلاصة الخميرة وفيتامين K_1 والهيمين . يسمى أيضاً مرق الثيوجليكولات .

أجار الثِّيوسُلْفات ـ سيتْرات ـ أمْلاَح الصَّفْراء السَّكَّارَوزِيُّ **thiosulfate citrate bile salts sucrose agar**

هو مستَنبت انتقائي يحتوي على الببتون ، وخلاصة الخميرة ، وسيترات ، وثيوسلفات ، وصفراء الثور ، وكولات الصوديوم ، وسكروز ، وكلوريد الصوديوم ، وسيترات الحديديك ، وزرقة البرومثيمول ، وزرقة الثيمول ، يستعمل لاستفراد الضمة الكوليرية والضمة نظيرة الحالة للدم .

مُسْتَنْبَتُ تندال **Tindale's medium**

أساس (قاعدة) يتركب من بروتيوز ـ ببتون ، وكلوريد الصوديوم ، وأجار يضاف إليه على سبيل الإغناء مصل بقري والسيستين L ، وثيوسلفات الصوديوم ، وتيلوريت البوتاسيوم ، يستعمل للتحري عن الوتدية الخناقية التي تكون مستعمرات ذات لون أسود رمادي محاطة بهالات سوداء .

مَرَقُ تُود ـ هيويت **Todd-Hewitt broth**

هو وسط سَائل يحتوي على نقيع قلب البقر والببتون ، والجلوكوز ، وكلوريد الصوديوم وبيكربونات الصوديوم ، ودارئة من الفسفات ، يستعمل لاستنبات العقديات بغرض التصنيف السيرولوجي .

مُسْتَنْبَتُ النَّقْل **transport culture medium**

أي أنه يتزايد بالإضافة المضطردة ، بحيث يكون المجموع أكبر من الكميات المتوقعة لأجزائه .

cumuli **رُكَم ؛ رُكْمات (ف:رُكْمَة)**

صيغة الإضافة والجمع من ركمة (Cumulus) .

cumulus **رُكْمَة**

كومة صغيرة ، عادة ما تنتج عن تجمع الخلايا .

cumulus oophorous TA **رُكْمَةٌ مَبيضيَّة**

هي كتلة صَلبة من الخلايا الجريبية تحيط بالبيضة في طرف الجريب المبيضي الحويصلي المتكون ؛ تسمى أيضاً القُرْصُ المَبيضيّ (Discus oophorus) ، أو (Discus ovigerus) ، أو القرص التوالدي (Discus proligerous) .

cumulus ovaricus **رُكْمَةٌ مَبيضيَّة**

انظر تحَت cumulus oophorous .

ovarian cumulus **رُكْمَةٌ مَبيضيَّة**

انظَر تحت cumulus oophorous .

cuneate **إسْفينيّ**

مشكل بشكل إسفين .

cunei (sing.cuneus) **أسافين (ف:إسْفيْن)**

صيغة الإضافة والجمع من إسفين (Cuneus) .

cuneiform **إسْفينيّ**

مشكل بشكل الإسفين .

cuneocuboid **إسْفينيّ نَرْدِيّ**

متعلق بالعظم الإسفيني والعظم النردي .

cuneonavicular **إسْفينيّ زَورَقِيّ**

متعلق بالعظم الإسفيني والعظم الزورقي .

cuneoscaphoid **إسْفينيّ زَورَقِيّ**

انظر تحت cuneonavicular .

cuneothalamic **إسْفينيّ مِهادِيّ**

متعلق بالعظم الإسفيني والمهاد .

cuneus TA **الإسْفين**

هو فصيص ذو شكل إسفيني من الفص القذالي للمخ من جهته الإنسية ، بين التَّلَمُ الجِداريّ القَذاليّ والتَّلَمُ المِهْمازيّ .

cunicular **نَقَبيّ**

متعلق بنقبة .

cuniculi (sing.cuniculus) **نُقَب (ف:نقبَة)**

انظر تحت Christensen's urea agar .

urease test broth **مَرَقُ اخْتبار اليُورياز**

هو المستَنبَت الذَي يستعمل في اختبار اليورياز ، وهو وسط سائل يحتوي على خلاصة الخميرة واليوريا وحمرة الفينول ودارئة من الفسفات ، ويستعمل لاختبار نشاط اليورياز في سياق اختبار التفريق بين المتقلبة وكل من السالمونيلة والشيجيلة في العداوى المعوية .

انظر تحت Christensen's urea agar .

veal infusion culture medium **مستنبت نقيع العجل**

هو مستنبت نقيعي .

انظر تحت infusion medium .

Wilson-Blair culture medium **مُسْتَنْبَتُ ويلْسُون ـ بلير**

هو أجار سلفيت البزموت .

انظر تحت bismuth sulfite agar .

xylose-lysine-deoxycholate agar (XLD agar) **مُسْتَنْبَت الزَّايلُوز ـ ليزين ـ ديُوكسي كُولاتَ (أجار الزايلُوز ـ ليزين ـ ديُوكسي كُولات)**

هو وسَط أجاري يحتوي على الزايلوز ، والليزين L ، ولاكتوز ، وسكروز ، وكلوريد الصوديوم ، وخلاصة الخميرة ، وحمرة الفينول وديوكسي كولات الصوديوم وسيترات أمونيوم الحديدوز ، يستعمل لاستفراد المكروبات المرضة ، وبخاصة السالمونيلة والشيجيلة .

yeast extract agar **أجار خُلاَصَة الخَميرَة**

هو وسط أجَاري يحتوي على خلاصة الخميرة ، ودارئة من الفسفات ، يستعمل للتحري عن النوسجة المغمدة ، والبرعمية الملهبة للجلد ، والكروانية اللدودة .

cum **مَع (صَيدَلة)**

بمعنى مع في الصيدلة .

cumidine **كوميدين**

هو مركب قلواني .

cumulative **تراكُمِيّ**

فصيلة من الفطريات من رتبة العفناوات ، والتي تفتقر إلى مباغ ؛ وتتضمن جنساً مرضاً وحيداً هو الكانينْجهاميلّة .

فَرْجُ المَرْأة cunnus

انظر تحت pudendum femininum .

كيُورين cuorin

هو مركب شحمي في عضل القلب .

1ـ كوب cup
2ـ مِحْجَم
3ـ لجَفٌ

1ـ كأس الحجامة .

2ـ بنية أو جزء بشكل الكوب .

لَجَفٌ ضُموريّ atrophic cup
(في القرصَ البصري)

قَلَنْسوةٌ ذَقَنِيَّة chin cup

انظر تحتَ chin cap .

كوبُ ديوجينيس Diogenes cup

هو تَجْويفُ الكَف .

انظر تحت poculum Diogenis .

مِحْجَمٌ جافّ dry cup

َهو كأس الحجامة ، والذي يوضع على الجلد السليم لاستثارة تدفق الدم إلى المنطقة ؛ لم يعد يستعمل حالياً .

كوبٌ عَيني ّ eye cup

كوبُ الإطْعام feeding cup

لَجَفٌ زَرَقي ّ glaucomatous cup

هو نوعٌ من انخساف القرص البصري ، والذي يكون مميزاً للزرق ؛ يسمى أيضاً لجَفُ قُرْص العَصَب البَصَري ّ (Glaucomatous excavation) .

الكُؤَيس ُالعَيني ّ ocular cup

انظر تحت caliculus ophthalmicus .

الكُؤَيس ُالعَيني ّ ophthalmic cup

انظر تحت caliculus ophthalmicus .

1ـ لجَفُ القُرْص البَصَري optic cup
2ـ الكُؤَيس ُالعَيَني ّ

1ـ اللجف الفيزيولوجي .

صيغة الإضافة والجمع من نقبة (Cuniculus) .

الناقبة Cuniculus

جنس من القوارض الناقبة التي توجد في المناطق المدارية من الأمريكيتين .

نَقبَة (ج:نقب) cuniculus (pl.cuniculi)

1 ـ نفق .

2 ـ النقب الذي يحدثه سوس الحكة ، أو القارمَةُ الجَرَبِيَّة ، في الجلد .

النَّقَبَةُ الظاهِرة cuniculus externus TA

هو النفق الخارجي .

انظر تحت outer tunnel .

النَّقْبَةُ الغائرَة cuniculus internus TA

هو النفقَ الداخلي في عضو كورتي .

انظر تحت inner tunnel .

النقبة الوسطى cuniculus medius

هي قناة مملوءة بالسائل في عضو كورتي بين الخلايا العمادية وخلايا الشعر الخارجية ؛ تسمى أيضاً حيز نويل (Nuel's space) .

رَيحانُ الأرْض Cunila

جنْسُ نَبات منَ الشَّفَوِيَّات .

لَعْقَ الفَرْج cunnilinctus

انظر تحت cunnilingus .

لَعْقَ الفَرْج cunnilinguism

انظر تحت cunnilingus .

لَعْقَ الفَرْج cunnilingus

هو إثارة الأعضاء التناسلية الأنثوية بواسطة الفم .

الكانيْنجهاميلَة Cunninghamella

هي جنس من الفطريات من الفصيلة الكانينجهاميلية (Cunninghamellaceae) ، والذي يتميز بافتقاره إلى مباغ ، وبوجود غبيرات تنشأ من حويصلة . أحد أنواعه ، الكانينْجهاميلّة البورثولية (Cunninghamella bertholetiae) ، والذي يسبب فطاراً عفنياً في الرئة عند المرضى الواهنين أو مثبطي المناعة ، مع غزو وعائي مترق وخثار واحتشاء .

الكانيْنجهاميلَة Cunninghamellaceae

كبريمين **Cuprimine**

علامة تجارية لأحد مستحضرات البنسيلامين (Penicillamine) .

كُبْريميكسين **cuprimyxin**

مضاد جرثومي ومضاد فطري بيطري .

بيلة نحاسِيَّة **cupriuria**

هو وجود النحاس في البول .

كبروفان **cuprophane**

غشاء يصنع من السليلوز المتجدد ، ويستعمل في الديال الدموي .

كُبْرُوس **cuprous**

هو مركب يحتوي على النحاس في شكل أحادي التكافؤ .

بيلة نحاسِيَّة **cupruresis**

الإفراغ البولي للنحاس .

مُدرٌّ نحاسِيّ **cupruretic**

يتعلق أو يحفز إفراغ النحاس عن طريق البول .

قُبَيبَة (ج:قُبَيبات) **cupula (pl.cupulae)**

لجف صغير مقلوب أو قلنسوة صغيرة بشكل القبة تعلو بنية تشريحية ما .

قُبَيبَةُ العُرْف الأَمْبولي **ampullary cupula**

هو غطاء مِن سائلٍ جيلاتيني لزج يغطي العرف الأمبولي للأذن ، في المواد المثبتة يكون هذا الغطاء قليل الاصطباغ مما يميزه عن باقي السائل الأمبولي . يسمى أيضاً (Cupula cristae ampullaris) .

قُبَيبَةُ العُرْف الأَمْبولي **cupula ampullaris**

انظر تحت ampullary cupula .

قُبَيبَةُ القَوقَعَة **cupula cochleae TA**

هو القمة المدورة ، أو التي تتخذ شكل القبة للقناة القوقعية الحلزونية .

قُبَيبَةُ العُرْف الأَمْبولي **cupula cristae ampullaris TA**

انظر تحت ampullary cupula .

قُبَيبَةُ العُرْف الأَمْبولي **cupula of ampullary crest**

انظر تحَت ampullary cupula .

2 ـ الكُؤَيسَةُ العَينيَّة .

اللَّجَفُ الفيزيولوجيّ **physiologic cup**

هي وهدة في مركز القرص البصري ؛ يسمى أيضاً الكؤيس العيني (Optic cup) ، أو لجف القرص (Excavatio disci) .

كوبُ الصَّقْل (أسنان) **polishing cup**

هو قمع يستعمل في طب الأسنان للتلميع .

كوبٌ مَطَّاطِيّ **rubber cup**

هو قمع يستعمل في طب الأسنان مصنوع من المطاط ، يستعمل غالباً للصقل والتلميع .

محْجَمٌ رَطْب **wet cup**

هو كأس حجامة يوضع على جلد تم إجراء شق فيه بغرض سحب الدم . لم يعد يستعمل حالياً .

قُبَيبَة **cupola**

انظر تحت cupula .

مُلَجَّف **cupped**

مجوف بشكل يشبه الكوب .

1 ـ تلَجُّفٌ **cupping**

2 ـ حجامَة

1 ـ استعمال كؤوس الحجامة .

2 ـ تكون وهدة بشكل الكوب .

التَّلَجُّفُ المَرَضيّ **pathologic cupping**

هو انخساف القرص البصري لسبب مرضي .

كوبْرامُونيا **cuprammonia**

هو كاشف مخبري .

كوبرين **cupreine**

هو قلواني يستخلص من لحاء الكويرية (Cuprea) ، يشبه السينكونيدين ، وله خواص مضادة للملاريا .

وُجودُ النُّحاس في الدَّم **cupremia**

هو وُجودُ النُّحاس في الدَّم .

انظر تحت hypercupremia .

كُبْريك **cupric**

مركب يحتوي على النحاس في شكله ثنائي التكافؤ (bCu) ، ويعطى أيونات النحاس ثنائية التكافؤ (Cu^{2+}) في المحلول المائي .

الأشكال التي تستخلص من غضروفية الأغصان الورقاء في تخفيف تشنجات التكزز ، وفي معالجات الصدمة ، وفي الصمل العضلي الرأبي والشلل التشنجي والحالات المشابهة ، وكذلك كعامل مساعد في التخدير العام .
انظر تحت tubocurarine .

curaremimetic **مُحاكِي الكورار**
انظر تحت curarimimetic .

curari **كورار**
انظر تحت curare .

curariform **شُبيهُ الكورار**
أي شيء يشبه الكورار .
انظر تحت curare .

curarimimetic **مُحاكِي الكورار**
له مفعول يشبه أثر الكورار ، أو ينتج عنه مثل ذلك الأثر .

curarization **كَوْرَرَة**
إعطاء الكورار للعلاج .

curative **شافٍ،عِلاجِيّ**
له خاصية التغلب على المرض وحفز الشفاء .

curative medicine **الطِّبُّ العلاَجِيُّ**
الفرع مِن الطِّب الذي يبحث في التغلب على الأمراض وتحقيق الشفاء .

curb **دَخْس**
هو ثخانة الرباط المشطي العقبي عند الحصان ، مما يسبب تورم مؤخر مفصل العرقوب ، ويؤدي إلى العرج .

Curcuma (=turmeric) **كُركُم**
(نبات طبي تستعمل جذوره للصباغ)
جنس من النباتات من فصيلة الزنجبركيا (Zingiberaceae) ، موطنه الهند والصين وجزر الهند الشرقية . الكركم الطويل هو الكركم المعروف ، والذي يستعمل كمادة ملونة وكنوع من التوابل .

curcumin **كُرْكُمِين**
هي مادة بلورية صفراء برتقالية ، تعتبر أساس

cupula of cochlea **قُبيبَةُ القَوقَعَة**
انظر تحت ampullary cupula .

cupula of pleura **قُبيبَةُ الجَنْبَة**
هو السقف الشبيه بالقبة الذي يعلو الجوف الجنبي من كل من الجانبين ، ويمتد إلى الأعلى عبر فتحة الصدر العلوية .

cupula pleurae TA **قُبيبَةُ الجَنْبَة**
انظر تحت ampullary cupula .

cupulae (sing.cupula) **قُبَيبات (ف:قُبَيبَة)**
صيغة للإضافة والجمع من قُبَيبَة (Cupula) .

cupular **قُبَيبِيّ**
كل ما هو متعلق بقبيبة .

cupule **قُبَيبَة**
انظر تحت cupula .

cupulogram **مُخَطَّط القُبَيبَة**
هو التقرير الذي ينتج عن تخطيط القبيبة ، ويكون مدوناً على شكل مرتسم .

cupulolithiasis **تحَصي القُبَيبَة**
هو تواجد حصاة في قبيبة القناة الهلالية الخلفية ، مما قد يسبب دُوارُ الوَضْعَةِ الانْتِيابِيُّ الحَمِيْد .

cupulometry **تخْطيطَ القُبَيبَة**
هي طريقة لاختبار الوظيفة الدهليزية حيث يتم تسريع وإبطاء دوران الأشخاص الجالسين في كرسي دوار ، ويتم تسجيل زمن الدوخة والرأرأة التالين للدوران بالقياس إلى التباطؤ الزاوي .

curability **بَرُوئِيَّة**
هو إمكانِيَّةُ الشِّفَاء .

curable **بَرُوء**
أي شيء مُمْكِنُ الشِّفَاء .

curare **كورار**
تسمية تطلق على عدد كبير من الخلاصات واسعة التنوع من العديد من المصادر النباتية ، بما فيها العديد من أنواع جوز القيء ، أو شجر الستريكنين ؛ استعملت بادئ ذي بدء كسم للسهام في أمريكا الجنوبية . ويستعمل أحد

هو كَشْطٌ حَولَ القمَّة .
انظر تحت periapical curettage .

كَشْطٌ لثَوِيّ **gingival curettage**
هو استَعمَال المكشطة في إزالة الجدار النسيجي الملتهب لجيبة دواعم السن ، بما في ذلك الظهارة الجيبية والموصلية والنسيج الضام الواقع تحتها مباشرة . يسمى أيضاً كَشْطٌ تَحْتَ اللِّثَّة (Subgingival curettage) .


الكركم Curcuma

كَشْطٌ طبِّيّ **medical curettage**
هو إحدَاث نزف من بطانة الرحم بواسطة إعطاء عامل بروجستيروني الفعل ثم سحبه .

كَشْطٌ حَولَ القمَّة **periapical curettage**
استعمال المكشطة في إزالة النسج الرخوة المريضة من الخبيئة العظمية المحيطة بقمة جذر السن وصقل السطح القمي للسن دون إزالة قمة السن . يسمى أيضاً كشط قمي (Apical curettage) .

كَشْطٌ جَذْرِيّ **root curettage**

لون الكركم .

رَوْب **curd**
القسم من اللبن الذي يتخثر عند الحموضة ، أو عندما يعامل بالإنزيمات .

رَوْبٌ شَبِّيّ **alum curd**

1ـ شِفاءٌ **cure**
2ـ عِلاج
1ـ مسار علاج أي مرض أو حالة خاصة .
2ـ المعالجة الناجحة لمرض أو جرح .
3ـ نظام علاج الأمراض .
4ـ دواء ناجع في علاج مرض ما .
5ـ حفظ منتج ما ، مثل التبغ أو اللحم أو السمك .
6ـ تقسية مادة ما من خلال عملية التصليب .
7ـ عملية لبلمرة المواد الراتينية من مثل المواد التي تصنع منها بدلات الأسنان .
انظر تحت curing .

العلاَجُ بالنُّظُم الغذائيَّة **diet cure**
هو علاج بعض الأمراض عن طريق اتباع نظم غذائية معينة .

علاجٌ جَذْرِيّ **radical cure**
هو علاج شامل يطال أصل المشكلة المرضية ومسبباتها .

العلاَجُ بالعَمَل **work cure**

مِكشَطة **curet**
1ـ أداة بشكل الملعقة تستخدم في إزالة المواد من جدار تجويف أو من سطح ما .
2ـ إزالة الأورام أو المواد الأخرى من جدار تجويف أو من سطح آخر باستعمال أداة بشكل الملعقة .

مِكْشَطَةُ هارْتْمان **Hartmann's curet**
أداة تستعمل في إزالة الغدانيات .

كشْط **curettage**
إزالة الأورام أو المواد الأخرى من جدار تجويف ما أو من سطح ما ، كما في حالة استعمال المكشطة ؛ يسمى أيضاً (Curettement) .

كشط قمي **apical curettage**

هو إنضار إنزيمي .

انظر تحت enzymatic debridement .

كوري 1 **Curie 1**

[هي ماري سلودوفسكا (Marie Sllodwska) ، بولندية المولد ، وهي عالمة كيمياء وفيزياء في فرنسا ، عاشت ما بين 1867-1934 ؛ اكتشفت مع زوجها بيير كوري(Pierre Curie) البولونيوم والراديوم ، وكان لها عمل رائد في مجال النشاط الإشعاعي ، بما في ذلك استعمالاته الطبية . فازت بجائزة نوبل في الفيزياء لعام (1903) بالمشاركة مع بيير كوري وهنري بيكيريل (Henri Becquerel) ، تقديراً لعملهم في دراسات النشاط الإشعاعي التلقائي ، وفازت بجائزة نوبل في الكيمياء لعام (1911) لاكتشافها واستخلاصها لعنصر اليورانيوم] .

كوري 2 **Curie2**

[هو بيير كوري (Pierre Curie) عالم كيمياء وفيزياء فرنسي ، عاش ما بين 1859-1906 ، اكتشف مع زوجته ماري البولونيوم والراديوم ، وكان له عمل رائد في مجال النشاط الإشعاعي . فاز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام (1903) بالمشاركة مع ماري كوري وهنري بيكيريل تقديراً لعملهم في دراسات النشاط الإشعاعي التلقائي] .

قانون كوري **Curie's law**

انظر تحت law .

كوري **curie**

هي وَحْدَةُ النَّشاط الإشْعاعي ، وتعرف بأنها كمية أي نويدة مشعَةَ عندماَ يكون عدد مرات التفكك في الثانية مساوياً (3.700×10^{10}) ، رمزه (Ci) ، وكان في السابق (C) .

مُعالَجَةٌ شُعاعيَّة **curie therapy**

هي في الأصل المعالجة بالراديوم أو الرادون ؛ ثم باتت التسمية تطلق على أية معالجة تتم بواسطة انبعاث صادر عن أي مصدر مشع .

كوري ـ ساعة **curie-hour**

إزالة النفايات وتسوية الجذر ليصبح ذا سطح أملس للمساعدة على شفاء النسيج اللثوي .

كَشْطٌ تَحْتَ اللِّثَة **subgingival curettage**

1 ـ كشط لثوي في المنطقة الواقعة بالاتجاه القمي بالنسبة إلى المرتكز الظهاري بغرض فصل المرتكز النسيجي الضام وصولاً إلى القشرة العظمية دون الحاجة إلى سديلة .

2 ـ كشط لثوي .

انظر تحت gingival curettage .

كَشْطٌ مَصِّيّ **suction curettage**

هو الكَشْطٌ بالتَّخْلِيَة .

انظر تحت vacuum curettage .

كشط جراحي **surgical cutettage**

هي عملية سديلة ، والتي تجرى بغرض استئصال جدار جيبة دواعم السن الملتهبة والمرتكز النسيجي الضام وصولاً إلى القشرة العظمية ، متبوعة بإعادة ارتكاز السديلة على الأسنان . تسمى أيضاً سديلة ويدمان المعدلة (Modified Widman flap) .

كَشْطٌ فَوقَ ـ صَوتيّ **ultrasonic curettage**

هو إزالة الأنسجةَ الملتهبة من سطح السن والعنق اللثوي باستعمال جهاز أو مقلحة فوق صوتية .

كَشْطُ الرَّحِم **uterine curettage**

كَشْطٌ بالتَّخَلْيَة **vacuum curettage**

إزالة محتويات الرحم ، عقب التوسيع العنقي ، باستعمال مكشطة مجوفة ، والتي يتم إدخالها إلى داخل الرحم ، ويتم من خلالها إجراء عملية مص (شفط) للمحتويات . يسمى أيضاً تَجْرِيفٌ بالمَصّ (Suction curettage) ، وكذلك شفط بالتخلية (Vacuum aspiration) .

مِكشَطة **curette**

انظر تحت curet .

مِكْشَطَةُ الغُدَّانيَّات **adenoid curette**

مِكْشَطَةٌ مَصِّيَّة **suction curette**

كَشْط **curettement**

انظر تحت curettage .

كَشْطٌ فِيزْيُولُوجِيّ **physiologic curettement**

1ـ أي شيء في حالة جريان .
2ـ تيار كهربائي .

تَيَّارٌ عَصَبيٌّ المُنْطَلَق **abnerval current**

تَيَّارُ الفعْلَ **action current**

هو التَيار المتولد في غشاء الخلية العصبية أو العضلية بتأثير جهد الفعل ؛ وهو يعمل على إزالة استقطاب الأغشية المجاورة إلى درجة تتجاوز العتبة ، وبذلك فهو يستثير تكرار عملية جهد الفعل على طول الليف العصبي . يسمى أيضاً تيار فعل العصب (Nerve-action current) .

تَيَّارٌ تلْويّ **after current**

تَيَّارٌ مُتَناوب **alternating current**

هو تيار يَجري بالتناوب في اتجاهين متعاكسين . اختصاره (AC) .

تَيَّارٌ مَصْعَدي تَوَتُّري **anelectrotonic current**

تَيَّارٌ مَصْعَديّ **anodal current**

تَيَّارٌ صاعدَ **ascending current**

هو تَيَّارٌ نابذ .

انظر تحت centripetal current

تَيَّارٌ محْوَريّ **axial current**

هو القسم المركزي من جريان سريع (جريان صفائحي) في مركز قناة ، كما في تجويف وعاء دموي ، تحيط به منطقة تجري فيها العناصر بسرعة أبطأ ، أو أنها لا تتحرك بالمطلق .

تَيَّارٌ مَهْبطي تَوَتُّري **catelectrotonic current**

تَيَّارٌ نابذَ **centrifugal current**

هو تيَار كهربائي في الجسم يكون قطبه الموجب قرب مركز العصب وقطبه السالب على المحيط ؛ يسمى أيضاً تيار نازل (Descending current) .

تَيَّارٌ جابذ **centripetal current**

هو تيارَ كهربائي يمر عبر الجسد يكون مسراه الكهربي الموجب على العصب ، أو المحيط ومسراه الكهربي السالب قرب مركز العصب ؛ يسمى أيضاً تيار صاعد (Ascending current) .

تَيَّارٌ مُخثِّر **coagulating current**

هو تيار كهربائي يطبق بواسطة إبرة ، أو كرة ، أو

هي وحدة التراكم الإشعاعي ، وتعرف بأنها وجود كوري واحد في ساعة واحدة . يرمز لها (Ci-hr) .

تصْليب **curing**

هي طريقة لإحداث وتسريع عمليات التقسية من خلال استعمال الرطوبة أوالحرارة أو المواد الكيميائية أو الإشعاع الكهرومغناطيسي أو عوامل أخرى .

تَصْليبُ البدْلَة السِّنِّيَّة **denture curing**

العملية التي تتم من خلالها بلمرة المواد الراتينية لقاعدة البدلة السنية .

انظر تحت resin .

تَنْظيرُ الإشعاع **curioscopy**

هو دراسة الأشياء ووضع مخططات لها بحسب الإشعاعات النووية التي تنبعث منها .

الكوريُوم **curium**

هو عنصر كيميائي عدده الذري (96) ، ووزنه الذري (247) ، ورمزه (Cm) ، ويستحصل بقصف اليورانيوم أو البلوتونيوم بالسيكلوترون .

التِواء **curling**

على شكل ملف أو لفة ، كما هو شكل المريء في حالة التشنج المريئي المنتشر .

ثالوث كورينو **Currarino's triad**

[هو ثالوث منسوب للطبيب جويدو كورينو (Guido Currarino) ، وهو طبيب أشعة أمريكي ، ولد عام 1920] .

انظر تحت triad .

متلازمة كورينو- سيلفرمان **Currarino-Silverman syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب ج كورينو (G. Currarion) ، والطبيب فريدريك نوح سيلفرمان (Frederic Noah Silverman) ، وهو طبيب أطفال أمريكي ، ولد عام 1914] .

انظر تحت syndrome .

1ـ حاليّ؛جارِ **current**

2ـ تيَّارٌ

الجلفاني ؛ ولهذا التيار قطبية متميزة هامة وآثار كيميائية ثانوية مهمة .

تَيَّارٌ كَهْرَبِيّ **electric current**

هو تدفقَ الكهرباء عبر الموصلات . رمزه (I) ، وينتج التيار الكهربائي عن فرق الجهد ، بين نقطتين ، ويقاس فرق الجهد بالفولت . ويعتمد حجم التدفق على الفرق في الجهد ، وعلى المقاومة التي يواجهها التيار ، ويقاس بوحدة قياس تسمى الأمبير . أما وحدة قياس كمية التيار فتسمى الكولوم (Coulomb) .

تَيَّارٌ كَهْرَبِيٌّ تَوَتُّرِي **electrotonic current**

هو تيار يَستثار في غمد العصب بواسطة تيار يمر من الجزء الموصل من ذلك العصب ، أو بجهد فعل في العصب المجاور .

تَيَّارٌ لماسيّ **ephaptic current**

هو تَيَّارٌ بَيْنَ المَحاوير .

انظر تحت interaxonal current .

تَيَّارٌ فاراديّ **faradic current**

تَيَّارٌ صَعْقِيّ **fulguration current**

هو تيار عَالي التردد يستعمل في تخريب الآفات الجلدية السطحية .

تَيَّارٌ غَلْفانيّ **galvanic current**

هو تيار مَباشر ثابت .

تَيَّارٌ عالي التَّرَدُّد **high-frequency current**

هو تيَار متناوب يتصف بأن تواتر التقطع ، أو تبدل الاتجاه الخاص به مرتفع بما يكفي لأن لا يتسبب في حدوث تقلصات تكززية عند مروره في نسيج حي قلوص .

انظر تحت d'Arsonval current .

تَيَّارٌ مُحرِّض **induced current**

هي كهرباء تتدفق في دارة كهربية بفعل قربها من تيار آخر ، أي بما يعرف باسم التحريض (Induction) .

تَيَّارُ التَّحْرِيض **induction current**

تَيَّارٌ بَيْنَ المَحاوير **interaxonal current**

تَيَّارٌ عكسيّ **inverse current**

تَيَّارُ لُودوك **Leduc current**

نوع آخر من المساري الكهربية بغرض تخثير الأنسجة .

تَيَّارٌ مُعاوِض **compensating current**

هو تيارَ يتولد من الحركة الناتجة عن حملان السوائل الأكثر دفئاً في منطقة من السوائل الأبرد .

تَيَّارُ الإصابَة **current of injury**

هو تَدفق التيار الكهربي إلى أو من الجزء المصاب من قلب مصاب بالإقفار ، بسبب التبدل الناحي في الجهد عبر الغشائي .

انظر تحت diastolic current of injury .

انظر تحت systolic current of injury .

تَيَّارٌ مُخْمَد **damped current**

تَيَّارُ دارسُونْفال **d'Arsonval current**

هو تيار عالي التردد منخفض الفولطية مرتفع الأمبيرية نسبياً .

انظر تحت high-frequency current .

تَيَّارُ ديواتْفيل **De Wattevile current**

تَيَّارُ التَّحْدِيد **demarcation current**

انظر تحت current of injury .

تَيَّارُ زَوال الاسْتِقْطاب **depolarization current**

تَيَّارٌ نازلَ **descending current**

هو تَيَّارٌ نابذ .

انظر تحت centrifugal current .

تيار الإصابة الانبساطي **diastolic current of injury**

هو تدفق التيار الصافي من الأنسجة القلبية الإقفارية إلى الأنسجة القلبية الطبيعية أثناء الانبساط ، بفعل إعادة الاستقطاب التي تحدث بشكل أكثر سرعة في المنطقة المصابة ، وبالتالي يكون الجهد عبر الغشائي أكثر إيجابية من النسج المجاورة .

انظر تحت systolic current of injury .

تَيَّارٌ ثُنائيُّ الطَّور **diphasic current**

تَيَّارٌ مُباشر **direct current**

هو تيارَ يتدفق في اتجاه واحد فقط . وعندما يستعمل في المجال الطبي تطلق عليه تسمية التيار

. (Curriculum)

مِنْهَاجٌ دِراسِيّ **curriculum**

هو مقرر تعليمي نظامي ومعترف به .

حلزونات كورشمان **Curschmann's spirals**

[حلزونات منسوبة للطبيب هاينريش كورشمان (Heinrich Curschmann) ، وهو طبيب ألماني ، عاش ما بين 1846-1910] .

انظر تحت spiral .

متلازمة كورشمان ـ باتن ـ شتاينرت **Curshmann-Batten-Steinert syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب هانز كورشمان (Hans Curschmann) ، وهو طبيب ألماني ، عاش ما بين (1875-1950) ؛ والطبيب فريديريك يوستاس باتن (Frederick Eustace Batten) ، وهو طبيب عيون بريطاني ، عاش ما بين (1865-1918) ؛ والطبيب هانز شتاينرت (Hans Steinert) ، وهو طبيب ألماني ، ولد في مطلع القرن العشرين] . وهي متلازمة حثل التأتر العضلي .

انظر تحت dystrophy .

لَعْنَة **curse**

هو ابتلاء يعتقد أنه يحل بتأثير روح خبيثة .

لَعْنَةُ أُونْدين **Ondine's curse**

هو نَقْصُ التَّهْوِيَة السِّنْخِيُّ البدْئِيُّ .

انظر تحت primary alveolar hypoventilation .

رَكَّاض (حاسوب) **cursor**

1 ـ أي جزء من جهاز علمي يتحرك جيئة وذهاباً للدلالة على الوضعية .

2 ـ رمز متحرك على شاشة الحاسوب ، والذي يمثل موقع جهاز الإشارة .

متلازمة كورشوس **Curtius' syndrome**

[متلازمة منسوبة للطبيب فريدريش كورشوس (Friedrich Curtius) ، وهو اختصاصي طب باطني ألماني ، ولد عام 1896] .

انظر تحت syndrome .

انْحِناء (ج: انْحِناءات) **curvatura TA (pl.curvaturae)**

هو انحراف غير زاوي عن المسار المستقيم لخط

تَيَّارٌ وَحيدُ الطَّور **monophasic current**

تَيَّارُ فِعْلِ العَصَب **nerve-action current**

هو تَيارَ الفعل .

انظر تحت action current .

تَيَّارٌ مُتَذَبْذَب **oscillating current**

تَيَّارُ أُودان **Oudin current**

تيار الناظمة **pacemaker current**

هو التيار الموجب الخالص الصغير ، والذي يتدفق ضمن خلايا قلبية معينة ، مثل خلايا العقدة الجيبية الأذينية ، فيسبب زوال استقطابها .

تَيَّارٌ نَبْضِيّ **pulsating current**

تَيَّارُ الرَّاحَة **resting current**

هي كمية التيار في أنبوب الأشعة عندما تكون الفولطية كافية لتوجه كافة الإلكترونات التي ينتجها خيط المهبط بنفس سرعة إنتاجها .

تَيَّارُ الإِشْباع **saturation current**

تَيَّارُ المَوجَة الجَيبيَّة **sine-wave current**

تيار جيبانيّ **sinusoidal current**

هو تيار متناوب يتخذ شكل موجة جيبية .

تَيَّارٌ استاتيكيٌّ مُحَرِّض **static induced current**

تَيَّارُ المَوجَة الاستاتيكيَّة **static-wave current**

تَيَّارٌ جراحِيّ **surgical current**

هو تيار كهربي يستخدم لإجراء تسليخ أو تصعيق جراحي .

تيار الإصابة الانقباضي **systolic current of injury**

هو تدفق التيار الصافي من الأنسجة القلبية الطبيعية إلى الأنسجة القلبية الإقفارية أثناء الانقباض ، ويتكون بفعل تناقص مدى وزمن جهد الفعل بحيث يكون الجهد عبر الغشائي للنسيج الإقفاري أقل سلبية من الجهد عبر الغشائي للأنسجة المجاورة .

انظر تحت diastolic current of injury .

تَيَّارٌ غَيرُ مُخْمَد **undamped current**

مَناهِجُ دِراسِيَّة **curricula**

كلمة تشير إلى صيغة الجمع من منهاج دراسي

انْحناءٌ تَعْويضيّ **compensatory curvature**
انظَر تحت curve .

الانْحناءُ اللَّثَوِيُّ **gingival curvature**

الانْحَناءُ الكَبِيرُ للمَعدَة **greater curvature of stomach**
انظرَ تحت curvatura major gastris .

الانْحناءُ الكَبِيرُ للمَعدَة **greater gastric curvature**
انظرَ تحت curvatura major gastris .

الانْحناءُ الجانبيّ **lateral curvature**
هو اَلجَنَف .
انظر تحت scoliosis .

الانْحناءُ الصَّغِيرُ للمَعدَة **lesser curvature of stomach**
انظر تحت curvatura minor gastris .

الانْحناءُ الصَّغيرُ للمَعدَة **lesser gastric curvature**
انظرَ تحت curvatura minor gastris .

الانْحناءُ الإطْباقيّ (أسنان) **occlusal curvature**
انظرَ تحتَ curve .

انْحناءُ بُوتْ **Pott's curvature**
هَو انحناء خلفي غير طبيعي للعمود الفقري يحدث بفعل النخر السلي .

انحناء سبي **Spee's curvature**
انظر تحت curve .

انحناء سبي **curvature of Spee**
انظر تحت curve .

انْحناءُ السِّيْسَاء **spinal curvature**
هَو انحراف اَلسيساء عن الاتجاه أو الوضع الطبيعيين ؛ وهو ما يطلق عليه الحُداب ، والقَعَس ، والجَنَف .
انظر تحت kyphosis .
انظر تحت lordosis .
انظر تحت scoliosis .

مُنْحَنًى (ج:مُنْحَنَيات) curve

هو انحراف غير زاوي عن المسار المستقيم لخط ما ، أو لسطح ما .

الانْحناءُ الكَبِيرُ للمَعدَة **curvatura gastrica major TA**
انظر تحت curvatura major gastris .

الانْحناءُ الصَّغيرُ للمَعدَة **curvatura gastrica minor TA**
انظر تحت curvatura minor gastris .

الانْحناءُ الكَبِيرُ للمَعدَة **curvatura major gastris TA**
هي اَلحافة اليسرى ، أو الحافة الوحشية والسفلية للمعدة ، وتعتبر منطقة الوصل السفلية بين السطحين الأمامي والخلفي . تسمى أيضاً (Greater gastric curvature) .

الانْحناءُ الصَّغيرُ للمَعدَة **curvatura minor gastris TA**
هي اَلحافة اليمنى ، أو الإنسية للمعدة ، وتعتبر منطقة الوصل العلوية بين السطحين الأمامي والخلفي . تسمى أيضاً (Lesser gastric curvatuere) .

الانْحناءُ الكَبِيرُ للمَعدَة **curvatura ventriculi major TA**
انظر تحت curvatura major gastris .

الانْحناءُ الصَّغيرُ للمَعدَة **curvatura ventriculi minor TA**
انظر تحت curvatura minor gastris .

انحِناء curvature

هو انحراف عن الاتجاه مستقيم الخطوط .

الانْحناءُ الزاويّ (للعَمود الفَقري) **angular curvature**

الانْحناءُ الأماميّ **anterior curvature**
هو اَلحُداب .
انظر تحت kyphosis .

الانْحناءُ الخَلْفيّ **backward curvature**
هو اَلقَعَس .
انظر تحت lordosis .

انْحناءٌ معاوِض **compensating curvature**
انظَر تحت curve

adaptation curve **مُنْحَنَى التَّكَيُّف**

alignment curve **مُنْحَنَى التَّراصُف** (أسنان)

هو المنحنى السني الذي يمثله خط يمر عبر مراكز الأسنان موازياً للقوس السنية .

anti-Monson curve **مُنْحَنَى مونسون العكْسيّ**

انظر تحت reverse curve .

audibility curve **مُنْحَنَى المَسْموعيَّة**

هو مخطط للعلاقة بين تواتر وشدة الموجات الصوتية اللازمة لاستثارة الإحساس .

Barnes's curve **مُنْحَنَى بَارْنز**

هو الجزء من الدائرة التي يقع مركزها عند طنف عظم العجز ، ويتجه تحدبها بالاتجاه الظهراني .

bell-shaped curve **منحنى جرسي الشكل**

هو منحنى تابع لشدة الاحتمالية للتوزيع الطبيعي .

biphasic curve **مُنْحَنَى ثُنائيُّ الطَّور**

انظر تحت diphasic curve .

Bragg curve **منحنى براج**

هو منحنى يظهر زيادة شدة التأين الناتجة عن جزيء مؤين عندما يفقد السرعة والطاقة .

انظر تحت Bragg peak .

buccal curve **المُنْحَنَى الشِّدْقيّ** (أسنان)

هو الجزء من منحني الإطباق الممتد من السطح الإنسي للضاحكة الأولى ، وحتى السطح الوحشي للرحى الثالثة .

cardiac output curve **منحنى النتاج القلبي**

هو تمثيل بياني للناتج القلبي كتابع للضغط الأذيني ؛ وهو قياس لقدرة ضخ القلب تحت ظروف معينة .

انظر تحت Starling curve .

انظر تحت venous return curve .

curve of Carus **منحنى كاروس**

هو المحور الطبيعي لمخرج الحوض ؛ يسمى أيضاً دائرة كاروس (Circle of Carus) .

compensating curve **مُنْحَنَى مُعاوِض** (أسنان)

هو المنحنى الذي يتم إنشاؤه عند صناعة بدلات الأسنان الصناعية ؛ لمعاوضة تأثير الفتح الناتج عن المرشدة اللقمية والمرشدة القاطعية أثناء حركات الفك السفلي السيوحية التبارزية والوحشية . يسمى أيضاً انحناء معاوض (Compensating curvature) .

curve of Ellis and Garland **مُنْحَنَى إليس وجيرلاند**

هو منحنى في الانصباب الجنبيّ .

انظر تحت Ellis line .

curve of occlusion **مُنْحَنَى الإطْباق** (أسنان)

1 ـ سطح منحن يلامس بشكل متزامن الأجزاء الكبرى من التبارزات الإطباقية والقاطعة الواقعة على الأسنان الموجودة ؛ يسمى أيضاً المنحنى السني (Dental curve) ، والانحناء الإطباقي (Occlusal curvature) .

2 ـ انظر تحت curvea occlusalis

Damoiseau's curve **مُنْحَنَى داموازو**

هو منحنى في الانصباب الجنبيّ .

انظر تحت Ellis line .

decay curve **مُنْحَنَى التَّلاشي** (للمواد المشعة)

dental curve **المُنْحَنَى السِّنِّيّ** (أسنان)

1 ـ هو مُنْحَنَى الإطْباق .

2 ـ انظر تحت curvea occlusalis .

انظر تحت curve of occlusion .

diphasic curve **مُنْحَنَى ثُنائيُّ الطَّور**

dissociation curve **منحنى التفَارق**

انظر تحت oxygen dissociation curve .

هو مُنْحَنَى تَفارُق الأكْسجين .

dose-effect curve **مُنْحَنَى الفعْل ـ الجُرْعَة**

هو تمثيل بياني للأثر الحادث (مثل الاستجابة العلاجية ، أو نسبة الإصابة بالسرطان) قياساً إلى جرعة العامل المسبب (مثل دواء ما ، أو التعرض للأشعة) ، والذي يظهر العلاقة بين الأثر والتغيير في جرعة العامل .

dose-frequency curve **منحنى التواتر ـ الجرعة**

هو تمثيل بياني للعلاقة بين عدد مرات الاستجابة (مثل عدد حالات الإصابة

نمو الطفل ، أو تضاعف المكروبات .

مُنْحَنَى هاريسون **Harrison's curve**

هو تشوه جدار الصدر بالرخد ؛ ويطلق عليه تَلَمُ هاريسون .

انظر تحت Harrison's groove

منحنى تخفيف المشعر **indicator dilution curve**

هو تمثيل بياني لتركيز مشعر ما عندما تتم إضافته بكمية معلومة إلى جهاز الدوران ، ويتم قياسه مع مرور الوقت عند نقطة معينة من الجهاز ، وعادة ما يكون المشعر ملوناً ، أو نوكليد مشع أو سائلاً بارداً ، ويستعمل هذا المنحنى في دراسات الوظيفة القلبية الوعائية .

انظر تحت dye dilution curve .

انظر تحت thermodilution .

مُنْحَنَى الضَّغْط داخِلَ القَلْبَ **intracardiac pressure curve**

مُنْحَنَياتٌ إسْوِيَّةُ الجُرْعات **isodose curves**

هي مخطَطاتَ تبدي المساحات من الجسم التي تتلقى كميات متساوية من الأشعة ، وذلك في حالة العلاج بالأشعة .

منحنى التدفق ـ الضغط إسوي الحجم **isovolume pressure-flow curve**

هو منحنى ينتج من قياس قيم الضغط المختلفة بالنسبة إلى تدفق الهواء الموافق لكل من هذه القيم في حجم رئة واحدة . لا يمكن الوصول إلى التدفق الأقصى ، أو الحد الأقصى للتدفق في الأحجام الرئوية العالية (التي تقترب من السعة الإجمالية للرئة) .

منحنى البقاء بحسب كابلان ـ ماير **Kaplan-Meier survival curve**

هو تقييم ثابت لمنحنى البقاء ، والذي يمكن احتسابه من قيم تم تسجيلها عشوائياً . عند كل حالة موت لمريض (أو أية نقطة انتهائية أخرى) ، وتحتسب الاحتمالية الشرطية للبقاء في الفترة الفاصلة بين آخر حالة موت على أساس عدد المرضى الذين يبقون أحياء بعد تلك النقطة (أي بالسرطان) بين السكان والتغيرات في جرعة عامل ما .

منحنى الشدة ـ الجرعة **dose-intensity curve**

هو تمثيل بياني للعلاقة بين شدة الأثر (مثل كمية التوسع الوعائي) التي تظهر على شخص ما والتغيرات في جرعة عامل ما .

مُنْحَنَى الاسْتِجابَة للجُرْعَة **dose-response curve**

هو مُنْحَنَى فعْل الجُرْعَة .

انظر تحت dose effect curve .

مُنْحَنًى ثُنائِيُّ الارْتِفاعات **dromedary curve**

هو منحنًى يمثل الحرارة ، أو منحنى آخر يظهر طورين من الارتفاع يفصل بينهما طور من الانخفاض .

مُنْحَنَى تَخْفيف المُلَوِّن **dye dilution curve**

هو منحنى تخفَيف مشعر ما عندما يكون المشعر عبارة عن ملون ، وعادة ما يكون خضرة الإندوسيانين ؛ ويستعمل في دراسات النتاج القلبي والنواحي الأخرى من الوظيفة القلبية الوعائية .

منحنى فرانك ـ ستارلينج **Frank-Starling curve**

هو منحنى ستارلينج .

انظر تحت Starling curve .

مُنْحَنَى التَّواتُر **frequency curve**

مُنْحَنَى جيرلاند **Garland's curve**

هو منحنى في الانصباب الجنبيّ .

انظر تحت Ellis line .

مُنْحَنَى جاوس **gaussian curve**

هو منحنى في التوزع الإحصائي وهو منحنى جرسي الشكل .

انظر تحت bell-shaped curve .

مُنْحَنَى تَحَمُّل الجلوكوز **glucose-tolerance curve**

مُنْحَنَى النَّمو **growth curve**

هو المنحنى الحادث من قياس الزيادة في الحجم أو العدد بالنسبة للوقت ، كما في حالة قياس

القسري بدءاً من السعة القصوى للرئة وانتهاءً بالحجم الثمالي ؛ وذلك بقياس التدفق الزفيري بالنسبة إلى الحجم الرئوي الموافق ؛ كما يمكن الحصول على المنحنى اعتماداً على سلسلة من منحنيات الضغط–التدفق إسوية الحجم عند قيم مختلفة للسعة الحيوية .

مُنْحَنَى مُونسُون (أسنان) **Monson curve**

هو منحنى إطباقي يتوافق مع جزء من سطح دائرة قطرها 8 بوصات ، والتي يقع مركزها في منطقة المقطب .

انظر تحت compensating curve .

مُنْحَنَى عَضَلِيّ **muscle curve**

هو مُخَطَّطُ العَضَل .

انظر تحت myogram

منحنى نظامي **normal curve**

هو منحنى جرسي الشكل .

انظر تحت bell-shaped curve .

مُنْحَنَى التَّوَزُّع النِّظامِيّ **normal curve of distribution**

هو منحنى جرسي الشكل .

انظر تحت bell-shaped curve .

مُنْحَنَى الاحتمال النِّظامِيّ **normal probability curve**

الذين لم يموتوا بعد ولم يغادروا التجربة لأسباب أخرى) مقسوماً على عدد المرضى المعرضين للاخطار . تحتسب قيمة منحنى البقاء في نقطة معينة على أساس أنها الاحتمالات المشروطة للبقاء في كل الفترات الفاصلة حتى تلك النقطة . يسمى أيضاً تقدير الناتج الحدي (Product-limit estimate) .

المُنْحَنَى الشَّفَوِيّ (أسنان) **labial curve**

هو الجزء من منحنى الإطباق الذي يمتد بين السطوح الوحشية للأنياب في القوس السنية .

مُنْحَنَى التَّعَلُّم **learning curve**


المُنْحَنَى اللُّوجستي **logistic curve**

هو منحنى بشكل حرف S يعبر عن النمو السكاني تحت ظروف محددة كعامل للوقت مثلاً ؛ فعندما يكون تعداد السكان منخفضاً ، يبدأ النمو بطيئاً ، ثم يزداد ويتسارع باطراد قبل أن يعود ليتباطأ ويصل إلى التوازن حينما يصل عدد السكان إلى الحد الأقصى الذي تسمح به البيئة . ويطلق عليه أيضاً مُنْحَنَى النُّمُو.

مُنْحَنَى زُهْرِيّ **luetic curve**

منحنى الحجم ـ التدفق الزفيري الأقصى **maximal expiratory flow-volume curve**

هو منحنى يتم الحصول عليه أثناء الزفير



Audibility curve منحنى المسموعية

هو مُخَطَطُ النَّبْض .
انظر تحت sphygmogram .

منحنى مميزات مستقبل العمليات **receiver operating characteristic curve**
هو رسم بياني يقيس الحساسية بالنسبة إلى النوعية (1- النوعية) (أو معدل الخطأ المتعلق بالإيجابية الكاذبة) ، ويساعد على تحديد نقطة أو نقاط القطع لإظهار البيانات البعدية في الاختبارات التشخيصية للأمراض بشكل يوضح التوازن بين الحساسية والنوعية .

منحنى التحوف **regression curve**
هو منحنى يصف العلاقة بين القيمة المتوسطة لمتغير ما (المتغير المعتمد) ، وقيمة متغير مستقل واحد أو أكثر ؛ منحنى التحوف للعلاقة بين Y وX : هو التمثيل البياني لقيمة Y قياساً إلى كل قيمة من قيم X .

منحنى ROC **ROC curve**
هو منحنى مميزات تشغيل المستقبل .
انظر تحت receiver operating characteristic curve .

مُنْحَنَى عكْسيّ (أسنان) **reverse curve**
هو حالة ترافق الاهتراء الشديد للأسنان حيث تنطمس الحدبات ، وتتكون سطوح إطباقية إما مسطحة أو مقعرة ، تترافق بانقلاب المستوى الإطباقي للضواحك والأرحاء الأولى والثانية ، بحيث تنحدر السطوح الإطباقية للأسنان السفلية بالاتجاه الوجهي بدل الاتجاه اللساني ، وتميل السطوح الإطباقية للأسنان العلوية بالاتجاه اللساني ، يسمى أيضاً مُنْحَنَى مونسون العكْسيّ (Anti-Monson curve) .

مُنْحَنَى S **S-curve**
هو مُنْحَنَى سيني .
انظر تحت sigmoid curve .

مُنْحَنَى سينيّ **sigmoid curve**

مُنْحَنَى سبيَ (أسنان) **Spee's curve**
هو الانحناء التشريحي لمنظومة الأسنان الإطباقية ، بدءاً من قمة الناب السفلي ، ومروراً

المنحنى الإطباقي **occlusal curve**
انظر تحت curvea occlusalis .

مُنْحَنَى تَفارُق الأكْسجين **oxygen dissociation curve**
هو منحَنى بياني يمثل التغيرات الطبيعية في كمية الأكسجين التي تتحد مع الهيموجلوبين كتابع للضغط الجزئي للأكسجين . يعتقد أن المنحنى يميل إلى اليمين (أثر بور) عندما تكون كمية الأكسجين التي تدخل إلى الدم في ضغط أكسجين جزئي معين أقل من الطبيعي ، ويميل إلى اليسار (أثر هالدان) عندما تكون الكمية أكثر من الطبيعي . تتضمن العوامل التي تتحكم في شكل المنحنى كل من التغيرات في درجة احمضاض الدم ، وضغط ثنائي أكسيد الكربون ، والحرارة ، ووجود أحادي أكسيد الكربون ، وتبدل مكونات الكريات الحمراء ، وكذلك وجود حالات مرضية معينة . يسمى أيضاً مُنْحَنَى تَفارُق الأكْسجين و الهيمُوجلُوبين (Oxygen-hemoglobin dissociation curve) .

مُنْحَنَى تَفارُق الأكْسجين والهيمُوجلُوَبين **oxygen-hemoglobin dissociation curve**
هو مُنْحَنَى تَفارُق الأكْسجين .
انظر تحت oxygen dissociation curve .

مُنْحَنَى تَفارُق الأوكسي هيَموجلوبين **oxyhemoglobin dissociation curve**
هو مُنْحَنَى تَفارُق الأكْسجين .
انظر تحت oxygen dissociation curve .

مُنْحَنَى شَلَليّ **paretic curve**
(في فحص السائل النخاعي)

مُنْحَنَى برايس ـ جونز **Price-Jones curve**
هو منحنى توزع تكراري لأقطار الكريات الحمراء ، يحتسب إلكترونياً بواسطة عداد كولتي أو أداة مشابهة . ويمكن له أن يساعد في اكتشاف حالات مثل فقر الدم كبير الكريات أو فقر الدم صغير الكريات .

مُنْحَنَى الاحْتمال **probability curve**

مُنْحَنَى النَّبْض **pulse curve**

وطول الزمن الذي ينبغي أن يتدفق خلاله لإحداث حد أدنى من التقلص .
انظر تحت chronaxy .
انظر تحت rheobase .


مُنْحَنَى البَقَاء **survival curve**
هو شكل بياني لاحتمالية البقاء بالنسبة للوقت ، ويستعمل بشكل شائع لإظهار نتائج التجارب الإكلينيكية ، مثل الخط البياني الذي يمثل نسبة المرضى الذين ينجحون في البقاء (قبل الموت أو النكس أو أية نقطة انتهائية معينة أخرى) في كل مرة بعد علاج معين .
انظر تحت life table .

مُنْحَنَى دَرَجَة الحَرَارَة **temperature curve**
هو مخطط بياني يظهر التبدلات في درجة حرارة الجسم .

بالحدبات الخدية للضواحك والأرحاء الطبيعية ، ووصولاً إلى الحافة الأمامية للرأد ؛ يسمى أيضاً انحناء سبي (Spee's curvature) ، أو (Curvature of Spee) .

منحنى ستارلينج **Starling curve**
هو تمثيل بياني للناتج القلبي أو الأشكال الأخرى لقياس الأداء لامتلاء ، كتابع لامتلاء البطين عند مستوى معين من القلوصية ؛ يزداد الناتج القلبي في البداية مع زيادة الضغط الأذيني والعائد الوريدي ، ثم يستقر قبل أن يتناقص . يسمى أيضاً منحنى الوظيفة البطينية (Ventricular function curve) .

مُنْحَنَى الشِّدَّة ـ المُدَّة **strength-duration curve**
هو تمثيل بياني للعلاقة بين شدة التحريض الكهربائي عند النقطة الحركية لعضلة ما ،



Oxygen dissociation curve منحنى تفارق الأكسجين

هو منحنى التسنين الذي تقع فيه السطوح الإطباقية . يسمى أيضاً (Curve of occlusion) .

المنحنية **Curvularia**

جنس من الفطريات الناقصة من رتبة الفطريات الخوطية الشكلية ، ومن فصيلة المريساوات الشكلية . توجد بعض أنواعه في عداوى الورم الفطري الحقيقي وفي عداوى أخرى .

كوسكاهيغرين **cuscahygrine**

هو مركب قلواني .

كوسكاميدين **cuscamidine**

هو مركب قلواني من الكينا (Cinchona) .

كوسكامين **cuscamine**

مركب قلواني من الكينا (Cinchona) .

كوشينجيُّ الشَّكل **cushingoid**

أي أنه يشابه المعالم والأعراض والعلامات المرافقة لمتلازمة كوشينج .

داء كوشينج أو ظاهرة، أو متلازمة، أو قرحة **Cushing's disease, phenomenon, syndrome, ulcer**

[داء أو ظاهرة أو متلازمة منسوبة للجراح هارفي ويليامس كوشينج (Harvey Williams Cushing) ، وهو جراح أمريكي ، عاش ما بين 1869-1939].

انظر تحت disease .

انظر تحت phenomenon .

انظر تحت syndrome .

انظر تحت ulcer .

قرحات كوشينج- روكيتانسكي **Cushing-Rokitansky ulcers**

[قرحات منسوبة للطبيب منسوبة هارفي ويليامس كوشينج (Harvey W.Cushing) والطبيب كارل فرايهر فون روكيتانسكي (Karl Freiherr Von Rokitansky) ، وهو اختصاصي باثولوجيا نمساوي ، عاش ما بين 1804-1878] ، وهي قرحات المعدة المترافقة للمرض في الجهاز العصبي المركزي .

انظر تحت Rokitansky-Cushing ulcers .

مُنْحَنَيات التَّوَتُّر **tension curves**

هي خطوط تشاهد على ترتيبات النسيج الإسفنجي للعظام ، وتعتمد على اتجاهات التواتر المطبق على العظام .

منحنى التخفيف الحراري **thermal dilution curve**

هو التمثيل البياني للنتائج المستحصلة من التخفيف الحراري .

منحنى التخفيف الحراري **thermodilution curve**

انظر تحت thermal dilution curve .

منحنى العائد الوريدي **venous return curve**

هو تمثيل بياني للعائد الوريدي كتابع للضغط الأذيني ؛ وهو يقيس مساهمات العوامل المحيطة التي تؤثر على تدفق الدم من الأوردة إلى القلب . تندمج المنحنيات المتعددة المستحصلة من ظروف مختلفة مع منحنيات الناتج القلبي المستحصلة من ظروف مماثلة ، وذلك لتحليل التناظم القلبي .

منحنى الوظيفة البطينية **ventricular function curve**

هو منحنى ستارلينج .

انظر تحت Starling curve .

مُنْحَنَى مَدَى الرُّؤْيَة **visibility curve**

هو تمثيل للعلاقة بين الطول الموجي وشدة الضوء اللازم لاستثارة الإحساس .

منحنى ويلسون **Wilson curve**

هو انحناء حدبات الأسنان كما يظهر في المستوى الجبهي ؛ وذلك يكون المنحنى الخاص بالقوس السنية السفلية مقعراً ، والمنحنى الخاص بالقوس السنية العلوية محدباً .

مَنْحَنَى وندرلنج **Wunderlich's curve**

هو التبدل النَمطي المشاهد في درجات الحرارة عند مريض الحمى التيفية .

منحنى **curvea**

انظر تحت curve .

المنحنى الإطباقي **curvea occlusalis**

وهي تعمل وظيفياً كصمامات تتحكم في تدفق الدم من خلال إغلاق تجويف الشريان .

وسادة باسافان **Passavant's cushion**
هي وسادة تظهر على البلعوم أثناء البلع .
انظر تحت Passavant's bar .

الوسادَةُ البُلْعوميَّةُ المَريئيَّة **pharyngoesophageal cushion**

وسادَةُ الأَخْمَص **plantar cushion**
هَو وسادة الأصابع .
انظر تحت digital cushion .

وسادَةُ المَصّ **sucking cushion**
هو الجِسْمُ الشَّحْميُّ الشِّدْقيّ .
انظر تحَت corpus adiposum buccae .

كوسكوهيجرين **cuskohygrine**
هو مركب قلواني .

شَرَفَة؛ حدبة **cusp**
بروز مستدق ؛ وبخاصة أحد القطع المثلثة من صمام قلبي أو من شرفة السن .

الشرفة الأمامية للصمام المترالي **anterior cusp of mitral valve**
هي الشُّرْفَةُ الأَمامِيَّةُ للصِّمامِ الأُذَينيُّ البُطَينيّ الأَيسَر .
انظر تحت cuspis anterior valvae atrioventricularis sinistrae .

الشرفة الأمامية للصمام الرئوي **anterior cusp of pulmonary valve**
هي الشُّرْفَةُ الهِلاَليَّةُ الأَمامِيَّةُ لصِمامِ الجِذْعِ الرِّئَويّ .
انظر تحت valvula semilunaris anterior valvae trunci pulmonalis .

الشرفة الأمامية للصمام ثلاثي الشرفات **anterior cusp of tricuspid valve**
هي الشُّرْفَةُ الأَمامِيَّةُ للصِّمامِ الأُذَينيِّ البُطَيْنيّ الأَيمَن .
انظر تحت cuspis anterior valvae atrioventricularis dextrae .

شُرُفَات أورطية **aortic cusps**

خياطة كوشينج **Cushing's suture**
[خياطة منسوبة للطبيب هيوارد كوشينج (Hayward W.Cushing) ، وهو جراح أمريكي ، عاش ما بين 1854-1934] .
انظر تحت suture .

وسادة (ج: وَسائِد) **cushion**
هي بنية تشريحية لحمية شبيهة بالوسادة .

الوِسادَةُ التَّاجيَّة **coronary cushion**
انَظر تحت band .

الوِسادَةُ الرِّخْوَة **cushion laxa**
هَو تَهَدُّلُ الجِلْد .

وِسادَةُ لِسانِ المِزْمار **cushion of epiglottis**
هي حُدَيبَةُ لِسَانِ المِزْمار .
انظر تحت tuberculum epiglotticum .

وسادَةُ فُوْهَة قَناة يوستاكيوس **cushion of eustachian orifice**
هو الحَيَدُ النَّفيريّ .
انظر تحت torus tubarius .

وِسادَةُ الأَصابِع **digital cushion**
هي كتلة وتدية الشكل من الألياف المرنة البيضاء ، والتي تحتوي على نسيج دهني وغضاريف ، وتغطي منطقة من قدم الحصان . تسمى أيضاً الوسادة الأخمصية (Plantar cushion) .

وَسائِدُ شَغافيَّة **endocardial cushions**
هيَ تبارزات من نسيج ضام جنيني مغطاة بالبطانة والتي تندفع إلى داخل القناة الأذينية البطينية في قلب الجنين ، وتلتحم فيما بعد مع الحافة الحرة للحاجز الأول ، وذلك لتفصل ما بين الأذين الأيمن والأذين الأيسر .

وِسادَةُ يوستاكيوس **eustachian cushion**
هو الحَيَدُ النَّفيريّ .
انظر تحت torus tubarius .

وَسائِدُ بَاطنَةِ الشِّرْيان **intimal cushions**
هيَ ثخانَات طولانية في باطنة بعض الشرايين مثل الشريان القضيبي ، والتي تتكون من تجمعات بارزة من الألياف العضلية الملساء ؛

هي الشُّرْفَةُ الهلاَلَيَّةُ اليُسْرَى لصمام الجذْع الرِّئَوِيّ .
انظرَ تحت valvula semilunaris sinistra valvae trunci pulmonalis .

الشرفة الحافوية للصمام ثلاثي الشرفات **marginal cusp of tricuspid valve**
هي الشُّرْفَةُ الخَلْفِيَّةُ للصِّمامِ الأُذَيني البُطَيني الأَيمَن .
انظر تحت cuspis posterior valvae atrioventricularis dextrae .

الشرفة الإنسية للصمام ثلاثي الشرفات **medial cusp of tricuspid valve**
هي الشُّرْفَةُ الحاجِزيَّةُ للصِّمامِ الأُذَيني البُطَيني الأَيمَن .
انظر تحت cuspis septalis valvae atrioventricularis dextrae .

الشرفة الخلفية للصمام الأورطي **posterior cusp of aortic valve**
هي الشُّرْفَةُ الهلاليَّةُ الخَلْفيَّةُ للصِّمام الأورطي .
انظر تحت valvula semilunaris posterior aortae .

الشرفة الخلفية للصمام المترالي **posterior cusp of mitral valve**
هي الشُّرْفَةُ الخَلْفِيَّةُ للصِّمامِ الأُذَيني البُطَيني الأَيسَر .
انظر تحت cuspis posterior valvae atrioventricularis sinistrae .

الشرفة الخلفية للصمام ثلاثي الشرفات **posterior cusp of tricuspid valve**
هي الشُّرْفَةُ الخَلْفِيَّةُ للصِّمامِ الأُذَيني البُطَيني الأَيمَن .
انظر تحت cuspis posterior valvae atrioventricularis dextrae .

الشرفة اليمنى للصمام الأورطي **right cusp of aortic valve**
هي الشُّرْفَةُ الهلاَلَيَّةُ اليُمْنَى للصِّمام الأورطي .
انظر تحت valvula semilunaris dextra valvae

هي الشرفات الهلالية للصمام الأورطي .

حدبة كارابيلّي (أسنان) **Carabelli cusp**
هي حدبة ثانوية على الناحية اللسانية للحدبة الإنسية اللسانية لرحى علوية ، قد تكون أحادية الجانب أو ثنائية الجانب ، ويختلف حجمها من حالة لأخرى ؛ وهي شائعة عند أفراد العرق القوقازي ، ونادرة عند الأشخاص من الأعراق الآسيوية الشرقية وجماعات أخرى . تسمى أيضاً حديبة كارابيلي (Carabelli tubercle) .

الشرفات الصوارية **commissiral cusps**
انظر تحت cuspides commissurales .

زاويةُ الشُّرْفَة (أسنان) **cusp angle**
هَي الزاوية الجانبية لميل الحدبة ، والمتكونة مع الخط العمودي المنصف للحدبة .

شرفات الصمام الأورطي **cusps of aortic valve**
الشرفات الهلالية للصمام الأورطي .

شرفات الصمام الرئوي **cusps of pulmonary valve**
هي الشرفات الهلالية للصمام الرئوي .
انظر تحت semilunar cusps of pulmonary valve .

الحدبة السنية **dental cusp**
انظر تحت cuspis dentis .

الشرفة القمعية للصمام ثلاثي الشرفات **infundibular cusp of tricuspid valve**
هي الشُّرْفَةُ الأَمامِيَّةُ للصِّمامِ الأُذَيني البُطَيْنيّ الأَيمَن .
انظر تحت cuspis anterior valvae atrioventricularis dextrae .

الشرفة اليسرى للصمام الأورطي **left cusp of aortic valve**
هي الشُّرْفَةُ الهلاليَّةُ اليُسْرَى للصِّمام الأورطي .
انظر تحت valvula semilunaris sinistra aortae .

الشرفة اليسرى للصمام الرئوي **left cusp of pulmonary valve**

. cularis dextrae

حدبة قاصَّة (أسنان) **shearing cusp**

هي حدبة سنية تستعمل في قطع الطعام .

حدبة طاحنَة (أسنان) **stamp cusp**

هي حدبةَ سنية تستعمل في طحن الطعام .

حدبة سِنِّيَّة **tooth cusp**

انظر تحَت cuspis dentis .

تداخُلُ الشُرفات **cuspal interference**

هي حالة من تماس الأسنان يحدث فيها أن يتحول الفك السفلي عن مسار إغلاقه الطبيعي بفعل تماس مبكر لأية حدبة مع سن مقابلة بشكل يمنع الإطباق الطبيعي لبقية الأسنان .

1ـ وَحيدُ الشُرْفَةِ **cuspid**

2ـ النَّاب (أسنان)

1ـ له شرفة أو قميعة واحدة .

2ـ الناب .

انظر تحت canine tooth .

ذو شُرُفاتٍ **cuspidate**

له شرفة أو شرفات .

شُرُفات؛ شُرَف (ف:شُرْفَة) **cuspides (sing.cuspis)**

صيغة الجمع من شرفة (Cuspis) .

الشرفات الصوارية **cuspides commisurales**

هما شرفتان صغيرتان يشكلان الصدفتين الخارجيتين من بين الصدفات التي تكون الشرفة الخلفية للصمام المترالي . تسمى أيضاً الشُّرْفَةُ الخَلْفِيَّةُ للصِّمامِ الأُذَينِيِّ البُطَينِيِّ الأيسَرَ (Cuspis posterior valvae atrioventricularis sinistrae) .

مِبْصَقة (أسنان) **cuspidor**

هو وعاء ملحق بوحدة معالجة الأسنان مزودة بجهاز دافق للماء بغرض تنظيفها بشكل مستمر .

شُرْفَة (ج:شُرَف)؛ حدبة **cuspis TA (pl.cuspides)**

1ـ بروز مستدق أو بنية مستدقة ، وهي تسمية تطلق بوجه خاص على أي من القطع المثلثية للصمام القلبي .

2ـ الحدبة السنية .

. aortae

الشرفة اليمنى للصمام الرئوي **right cusp of pulmonary valve**

هي الشُّرفَةُ الهِلالِيَّةُ اليُمْنَى لصمام الجِذْعِ الرِّئوي .

انظرَ تحت valvula semilunaris dextra valvae trunci pulmonalis .

شُرْفَة هلالِيَّة **semilunar cusp**

أي من القَطَع الهلالية للصمامات الرئوي أو الأورطي ؛ تسمى أيضاً (Valvula semilunaris) .

الشرفات الهلالية للصمام الأورطي **semilunar cusps of aortic valve**

هي الشرفات الهلالية الثلاثة المحيطة بفوهة الصمام الأورطي . وهي تصنف رسمياً كشرفة يمنى وشرفة يسرى وشرفة خلفية بحكم وضعيتها في قلب الجنين ، ويطلق عليها أحياناً تسمية شرفة أمامية وشرفة خلفية يمنى وشرفة خلفية يسرى على التوالي بحسب مواقعها في قلب الشخص البالغ ، أو تسمية الشرفة التاجية اليمنى والشرفة التاجية اليسرى والشرفة غير التاجية بحسب علاقتها بفوهات الجيوب التاجية .

الشرفات الهلالية للصمام الرئوي **semilunar cusps of pulmonary valve**

هي الشرفات الهلالية الثلاثة المحيطة بفوهة صمام الجذع الرئوي ؛ وهي تصنف رسمياً كشرفة يمنى وشرفة يسرى وشرفة أمامية بحكم وضعيتها في قلب الجنين ، ويطلق عليها أحياناً تسمية شرفة هلالية أمامية يمنى وشرفة خلفية وشرفة أمامية يسرى على التوالي بحسب مواقعها في قلب الشخص البالغ .

الشرفة الحاجزية للصمام ثلاثي الشرفات **septal cusp of tricuspid valve**

هي الشُّرفَةُ الحاجِزِيَّةُ للصِّمامِ الأُذَينِيِّ البُطَينِيِّ الأيْمَن .

انظر تحت cuspis septalis valvae atrioventri-

الشُّرْفَةُ الخَلْفيَّةُ للصِّمامِ الأُذَينيِّ البُطَينيِّ الأيسَر **cuspis posterior valvae atrioventricularis sinistrae TA**

هي الشَرفة الخلفية من بين شرفات الصمام الأذيني البطيني الأيسر ؛ تطلق التسمية أحياناً لوصف المناطق الصدفية الثلاثة الواقعة إلى الخلف من الشرفة الأمامية للصمام المترالي ، وفي أحيان أخرى لوصف الصدفة المركزية تحديداً ، فيما تسمى الصدفتان الخارجيتان بالشرفات الصوارية . تسمى أيضاً الشرفة الخلفية للصمام المترالي (posterior cusp of mitral valve) .

الشُّرْفَةُ الخَلْفيَّةُ للصِّمامِ الثُّنائيِّ الشُّرَف **cuspis posterior valvulae bicuspidalis**

الشُّرْفَةُ الخَلْفيَّةُ للصِّمامِ الثُّلاثيِّ الشُّرَف **cuspis posterior valvulae tricuspidalis**

الشُّرْفَةُ الحاجزيَّةُ للصِّمامِ الأُذَينيِّ البُطَينيِّ الأيمَن **cuspis septalis valvae atrioventricularis dextrae TA**

هي الشَرفة من الصمام الأذيني البطيني الأيمن المتصلة بالحاجز الغشائي بين البطيني ؛ تسمى أيضاً الشرفة الحاجزية للصمام ثلاثي الشرفات (Septal cusp of tricuspid valve) .

custodial **وصائيّ**

أي أنه يوفر الوصاية ، أو يتعلق بالوصاية .

عنايَةٌ وصائيَّة **custodial care**

هي عَناية غير طبية توفر المساعدة للشخص في مجالات نشاطات حياته اليومية .

وَسيلَةُ العنايَةِ الوصائيَّة **custodial care facility**

هي المرافق التي توفر العناية الوصائية .

custom impression tray **طابِعٌ إفرادِيّ (أسنان)**

هو طابع يصنع وفق النماذج الخاصة بالمريض ، بغرض التحكم بمادة الطبع وبالتالي الحصول على طبعة أكثر دقة ، ويسمى أيضاً طابع خاص (Special imression tray) .

customary fee **أجورٌ اعتِياديَّة**

هو أجر ثابت محدد يدفع لقاء الحصول على

الشُّرْفَةُ الأماميَّةُ للصِّمامِ الأُذَينيِّ البُطَينيِّ الأيمَن **cuspis anterior valvae atrioventricularis dextrae TA**

هي الشرفة الأمامية من شرفات الصمام الأذيني البطيني الأيمن ؛ تسمى أيضاً الشرفة الأمامية للصمام ثلاثي الشرفات (Anterior cusp of tricuspid valve) .

الشُّرْفَةُ الأماميَّةُ للصِّمامِ الأُذَينيِّ البُطَينيِّ الأيسَر **cuspis anterior valvae atrioventricularis sinistrae TA**

هي الشرفة الأمامية من شرفات الصمام الأذيني البطيني الأيسر ؛ تسمى أيضاً الشرفة الأمامية للصمام المترالي (Anterior cusp of mitral valve) .

الشُّرْفَةُ الأماميَّةُ للصِّمامِ الثُّنائيِّ الشُّرَف **cuspis anterior valvulae bicuspidalis**

الشُّرْفَةُ الأماميَّةُ للصِّمامِ الثُّلاثيِّ الشُّرَف **cuspis anterior valvulae tricuspidalis**

شرفة تاجية **cuspis coronae**

انظر تحت cuspis dentis .

حدبة سِنِّيَّة **cuspis dentalis TA**

انظر تحت cuspis dentis .

حدبة سِنِّيَّة **cuspis dentis**

هو بروز على تاج السن يكون جزءاً من السطح الإطباقي ؛ يسمى أيضاً الحديبة السنية (Dental tubercle) ، أو (cusp) .

انظر تحت dental tubercle .

انظر تحت tuberculum dentis .

الشُّرْفَةُ الإنْسيَّةُ للصِّمامِ الثُّلاثيِّ الشُّرَف **cuspis medialis valvulae tricuspidalis**

الشُّرْفَةُ الخَلْفيَّةُ للصِّمامِ الأُذَينيِّ البُطَينيِّ الأيمَن **cuspis posterior valvae atrioventricularis dextrae TA**

هي الشَرفة الخلفية من بين شرفات الصمام الأذيني البطيني الأيمن ؛ تسمى أيضاً الشرفة الخلفية للصمام ثلاثي الشرفات (Posterior cusp of tricuspid valve) .

هي جليدة أولية .

انظر تحت primary cuticle .

جُلَيدَةٌ أَوَّلِيَّة (أسنان) **primary cuticle**

هي غلالة رقيقة تغطي ميناء الأسنان التي لم تبزغ بعد ، يعتقد أنها النتاج النهائي لأرومات الميناء التي بدأت بالتنكس بعد أن أتمت تكوين الميناء ؛ يظهر الفحص المجهري الإلكتروني أنها تتكون أساساً من أرومات الميناء من الظهارة الميناثية المختزلة والمرتبطة بالميناء من خلال الصفيحة القاعدية . تسمى أيضاً جليدة مينائية (Enamel cuticle) تسمى أيضاً جليدة السن (Cuticula dentis) .

جليدة ثانوية **secondary cuticle**

هي جليدة السن .

انظر تحت cuticula dentis .

جُلَيدَةٌ صَفْراء **xanthosis cuticle**

هي جُلَيدَةٌ مِلاَطِيَّة .

لَونُ الجِلد **cuticolor**

جُلَيدَة (ج:جُلَيدات) **cuticula (pl.cuticulae)**

هي طبقة متقرنة مفرزة .

جُلَيدَةُ السِّنّ (أسنان) **cuticula dentis TA**

هي طبقة رقيقة تتواجد على بعض الأسنان على كل من الميناء والملاط ، إلى الظاهر من الجليدة الأولية التي تتحد معها ، ويخلفها المرتكز الظهاري أثناء هجرته على طول السن منفصلاً عن التاج والجذر . ولا تتواجد على الملاط الذي لا يرتكز عليه رباط دواعم السن . يعتقد بعض الباحثين أنها نتاج غير متقرن لخلايا المرتكز الظهاري ، وربما يشارك في تكوينها أيضاً كل من اللعاب والسائل اللثوي ؛ فيما يرى باحثون آخرون أنها نتاج مرضي للثة الملتهبة أو مفرز غرّي من الكريات الحمراء . تسمى أيضاً الجليدة الثانوية (Secondary cuticle) ، أو غشاء نازميث (Nasmyth's membrane) .

انظر تحت primary cuticle .

جُلَيدات (ف:جُلَيدَة) **cuticulae (sing.cuticula)**

هي صيغة الإضافة والجمع من جليدة

خدمة ما مثل خدمات الرعاية الطبية .

1ـ يقطع **cut**

2ـ قطع

هو فلح أو جرح ضيق ينتج عن استخدام حافة حادة .

جلديّ مُخاطِيّ **cutaneomucosal**

كل ما يتعلق بالجلد والأغشية المخاطية .

جلديّ **cutaneous**

كل ما يتعلق بالجلد .

خُراجٌ سِنِّيٌّ جِلْديّ **cutaneous dental abscess**

هو خراج سِنّي يَنفتح على ظاهر الجلد .

فغر **cutdown**

عمل فتحة بضعية صغيرة فوق أحد الأوردة للسماح بالفصد ، أو بضع الوريد .

فَغْرُ الوَريد **venous cutdown**

انظر تحت venostomy .

ثاقِبَة الجلد **Cuterebra**

هو جنس من ذبابة النبر من فصيلة ثاقبات الجلد ، كثيراً ما تحتشر يرقاتها وتصيب القوارض .

ثاقِبات الجلد **Cuterebridae**

هو فصيلة من ذبابة نبر العالم الجديد (رتبة ذوات الجناحين) ، والتي تتطفل يرقاتها على العديد من الثدييات ، بما فيها البشر . الجنس الذي ينتمي إليها ويتمتع بأهمية طبية هو ثاقبة الجلد .

جُلَيدَة **cuticle**

1ـ طبقة أو أكثر أو أقل من مادة صلبة بدرجات متفاوتة تغطي السطح الحر للخلية الظهارية .

2ـ هي سليفة .

انظر تحت eponychium .

جُلَيدَةُ غِمْد الجذْر **cuticle of root sheath**

هي طبقَة مَن الخَلايا التي تغطي جريب الشعرة .

جُلَيدَةٌ سِنِّيَّة **dental cuticle**

هي جُلَيدَةُ السِّنّ .

انظر تحت cuticula dentis .

جُلَيدَةٌ مينائِيَّة (أسنان) **enamel cuticle**

طيات رخوة متدلية ، ويعتقد أنها ترتبط بنقص تكون النسيج المرن إضافة إلى شذوذ في تكون الإيلاستين ، وتحدث عادة كاضطراب جيني وتكون من الشكل المكتسب أحياناً . يكون للنوع الخلقي الذي يشاهد عند الولادة أو يبدأ بالظهور بعد الولادة بقليل عدة أنواع : الشكل الكروموسوم الجسدي المتنحي ، والذي يكون مترافقاً بمضاعفات وخيمة تتضمن مظاهر رئوية وقلبية ورتوج في السبل البولية والمعدية المعوية وفتوق متعددة ، والشكل الكروموسوم الجسدي السائد الذي يكون حميداً بشكل عام ، وتقتصر أهميته على الناحية التجميلية ، والشكل المتنحي المرتبط بالكروموسوم X (المترافق مع قصور وظيفة إنزيم ليزيل أكسيداز ، وهو الإنزيم المسؤول عن تكوين مجموعات الألدهيد الضرورية لحدوث ارتباط الكولاجين المتصالب) ، والذي يتميز برتوج وخلل في أداء المثانة ونمو قرون قذالية عظمية وذكاء طبيعي نسبياً .

جِلْدٌ مَرْمَرِيّ — **cutis marmorata**

هو شكلَ انتقالي من أشكال التزرق الشبكي ، والذي يحدث كاستجابة طبيعية للبرد . يسمى أيضاً التزرق الشبكي (Marble skin) .

انظر تحت livedo reticularis .



Cuticle of Nail جليدة الظفر

جِلْد مَرْمَري مُصْطَبِغ — **cutis marmorata pigmentosa**

(Cuticula) .

تكوُّنُ الظهارة — **cuticularization**

انظر تحت epithelializatio .

كوتيكولين — **cuticulin**

مادة في المفصليات .

جُلَيْدة — **cuticulum**

جُلَيْدة فليكسيج — **Flechsig's cuticulum**

شَرِيط إكليليّ — **cutidure**

انظر تحت coronary band .

شَرِيط إكليليّ — **cutiduris**

انظر تحت coronary band .

cutification

1 ـ تكوُّنُ الجُلَيْدة

2 ـ تكوُّنُ الظهارة

كوتين — **cutin**

هي مادة شمعية تشكل ، عندما تتحد مع السلولوز ، جليدة النبات .

تفاعُلٌ جِلدِيّ — **cutireaction**

انظر تحت cutaneous reaction .

التَّفاعُلُ الجِلْديُّ لِفُونْ بيرْكِيه (في السُّل) — **Von Pirquet's cutireaction**

الجلد — **cutis TA**

هو الغطاء الواقي الخارجي الذي يغلف الجسم ، ويتكون من البشرة والأدمة ، ويستند إلى النسيج تحت الجلد .

جِلْدُ الوَز — **cutis anserina**

هو تبدل موضعي انتقالي في سطح الجلد ، والذي ينتج عن بروز جريبات الأشعار نتيجة تقلص العَضَلاَتُ المُقَفَّةُ للشَّعْر ، وهو انعكاس لتفريغ عصبي وديَ . يسمى أيضاً لحم الوز (Goose flesh) .

جِلْدٌ مَرِن — **cutis elastica**

جَلْدٌ مُفْرِطُ المُرونَة — **cutis hyperelastica**

هي متلازمة إهلرـ دانلوس .

انظر تحت Ehler-Danlos syndrome .

تُهَدُّلُ الجِلْد — **cutis laxa**

هي مجموعة من أمراض النسج الضامة ، والتي يحدث في سياقها أن يتهدل الجلد على شكل

هو وعاء ذو أبعاد محددة (بخاصة فيما يتعلق بالثخانة)، وخواص بصرية محددة، يستعمل لفحص السوائل الملونة وعديمة اللون الخالية من العكر، وكذلك تشتيت الضوء الذي تبديه بعض المستعلقات العكرة مثل المستعلقات الجرثومية. وتعتمد كفاءة وعاء الفحص على تركيبه الكيميائي، فمثلاً تستعمل الأوعية المصنوعة من الكوارتز في فحص المواد الواقعة في المجال فوق البنفسجية من الطيف فيما تستعمل الأوعية المصنوعة من الزجاج المقسى لفحص المواد الواقعة في المجال المرئي.

Cuvier's canal, duct قناة كوفييه أو نفق كوفييه

[قناة أو نفق منسوب للطبيب جورج ليوبولد كريتيان فريديريك داجوبير (Georges Lepold Chretien Frederic Dagobert, Baron Cuvier)، بارون كوفيير، وهو تاريخ عالم طبيعي فرنسي، عاش ما بين 1769-1832]، وهي القنوات الوريدية في الجنين.

انظر تحت ductus venosus.

انظر تحت canal.

cyan- سابقة بمعنى الأزرق

سابقة بمعنى اللون الأزرق.

cyanalcohol سيانوهِدْرين

انظر تحت cyanohydrin.

cyanamide سياناميد

1 ـ هو نتريل حمض الكارباميك تركيبه الكيميائي (NcC-NH).

2 ـ هو أنهيدريد اليوريا (HNbCbNH).

3 ـ سياناميد الكالسيوم.

انظر تحت calcium cyanamide.

cyanate سيانات

cyanhematin سيانهيماتين

cyanhemoglobin سيانهيموجلوبين

هو مركب من الهيموجلوبين والسيانيد؛ ويسمى أيضاً سيانميتهيموجلوبين (Cyanmethemoglobin).

cyanide سيانيد

الجِلْدُ المَرْمَرِيُّ المُتَوَسِّعُ الشُّعَيرات الخَلْقِيُّ cutis marmorata telangectica congenita

جِلْدٌ مَرْمَرِيٌّ وِعائِيّ cutis marmorata vascularis

تَهَدُّلُ الجِلْد cutis pendula

انظر تحت cutis laxa.

تَهَدُّلُ الجِلْد cutis pensilis

انظر تحت cutis laxa

جِلْدُ القَفا المُعَيَّنِيُّ التَّقْسيمات cutis rhomboidalis nuchae

هو شكل من أشكال تَنَكُّسُ النَّسيجِ المَرِن السَّفْعِيّ يحدث بشكل رئيسي عند الرِجال، يصبح فيه الجلد عند مؤخر الرقبة ثخيناً وغليظاً وجلدياً ومصفراً ومثلماً، ويتخذ مظهراً معيناً.

جِلْدُ الفَرْوَة و التَّلافيف cutis verticis gyrata

هو تثخن الفروة، والذي يشمل في كثير من الأحيان قمة الرأس، ويتسبب في تكون طيات وأثلام تشبه أثلام وتلافيف الدماغ. قد تحدث هذه الحالة منفردة، أو قد تكون مظهراً مميزاً لحالة أخرى مثل ثخَنَ الجِلْد وتَعَظُّمُ السِّمْحاق؛ يسمى أيضاً فَرْوَةٌ تَلْفيفيَّة (Gyrate scalp).

جِلْدُ داءُ الاصْفِرار xanthosis cutis

cutisector مِبْضَعُ الجلد

Cutivate كيوتيفيت

علامة تجارية لأحد مستحضرات فلوتيكازون بروبيونات (Fluticasone propionate).

cutization تجلُّد

cutting 1 ـ قاطع
2 ـ قطع

1 ـ القيام بفعل القطع.

2 ـ أداة تؤدي مهمة القطع، أو تساعد في القطع

حافَةٌ قاطعة cutting edge

هو الطرَف القاطع من الأداة.

cuttlebone العظم الحباري

هو عظم الحبار.

انظر تحت sepium.

cuvette كفيّت

الضوء . تكون الخلايا مغلفة بجدار صلب يحتوي على ببتيدوجليكان ، وهي متحركة بشكل عام ، وتتكاثر بالانشطار . تشمل الأصبغة المتبدلة بالضوء كل من الكلوروفيل ألفا ، وبروتينات الفيكوبيلين (صباغ في الطحالب) . تعتبر الزراقم المكروبات الوحيدة التي تثبت كلاً من ثنائي أكسيد الكربون (بوجود الضوء) والنتروجين . معظم أنواعها ضوئية التخليق ، والكثير منها مثبتات قوية للنتروجين . الكثير من أنواعها مسببات شائعة لتلوث المياه ، وكثيراً ما تستخدم كمشعرات لتتريف (نمو مفرط لأحد العضويات على حساب عضويات أخرى) البحيرات والجداول ، تسمى أيضاً (Cyanophyceae) ، (Schizophyceae) .

انظر تحت cyanobacteria poisonong .

cyanobacteria **زراقِم**

cyanobacterium **الزراقمية**

هي جرثومة مفردة من مجموعة الزراقم .

cyanochroic **زراقِيّ**

انظر تحت cyanotic .

cyanochrous **زراقِيّ**

انظر تحت cyanotic .

cyanocobalamin **سَيانوكوبالامين**

1 ـ مشتق الكوبالامين الذي يكون البديل فيه أيون السيانيد ؛ وهو أول الأشكال التي استفردت من صيغ ڤيتامين B_{12} ، وبذلك فقد اعتمد على أنه الصيغة المعتمدة كيميائياً والصيغة القياسية لذلك الفيتامين ، رغم كون ذلك نتيجة استفراد اصطناعية .

2 ـ مستحضر من السيانوكوبالامين ، والذي يستخدم في معالجة الأمراض التي تنتج عن عوز ڤيتامين B_{12} ، وبخاصة للوقاية والعلاج في حالات فقر الدم الوبيل وحالات فقر الدم ضخم الأرومات الأخرى ، والاعتلال العصبي المرافق لها ؛ يعطى بالحقن تحت الجلد أو في العضل ، أو في بعض الأحيان عن طريق الفم .

هو أنيون (CN) ، أو ملح يحتوي على هذا الأيون ؛ وتعتبر كل مركبات السيانيد شديدة السمية .

انظر تحت (Cyanide poisoning) .

cyanin **سَيانين**

cyanmethemoglobin **سَيانميتهيمُوجلوبين**

هو مركب شديد الارتباط بين الميتهيمجلوبين وأيون السيانيد . وتعتمد الطريقة القياسية لمعايرة الهيموجلوبين (قياس محتوى الهيموجلوبين) على تحديد كمية هذا المركب بواسطة قياسُ الطَّيْف الضَوئي ؛ يمكن الحصولَ على السَيانمَيتهيمُوجَلُوبين بشكل كمي بواسطة إضافة مَحلول دَرابكين إلى الأوكسي هيموجلوبين ، أو ديوكسي هيموجلوبين ، أو كربوكسي هيموجلوبين ، أو ميتهيموجلوبين (باستثناء سلفهيموجلوبين) .

cyanmetmyoglobin **سَيانمِيتمَيُوجلوبين**

مركب يتكون من إضافة أيون السيانيد إلى الميتميوجلوبين لتحقيق الاختزال إلى حالة الحديدوز .

cyano- **سابقة بمعنى الأزْرَق**

سابقة بمعنى اللون الأزْرَق

caynoacrylate **سيانوأكريلات**

هو البلمر ، أو موحود من الأكريلات القابل للاستبدال مع مجموعة سيانية أو أكثر .

انظر تحت adhesive .

انظر تحت resin .

cyanoalcohol **سَيانوهدْرين**

انظر تحت cyanohydrin .

Cyanobacteria **الزّراقِم**

هي الجراثيم ذات اللون الأزرق ـ الأخضر (التي كانت تسمى في السابق الطحالب الزرقاء ـ الخضراء) ، وهي زميرة من صنف المؤكسجات الضيائية ، من مملكة بدائيات النواة . وهي مكروبات أحادية الخلية أو مكروبات خيطية موجهة بالضوء ، والتي تستعمل الماء كمعطي للإلكترونات ، وتنتج الأكسجين في وجود

يستعمل في استدخان المنازل والأغنام ، إلخ . وهو على نفس درجة سمية حمض الهيدروسيانيك بالنسبة للجرذان والدويبات الأخرى إلا أنه أقل منه خطراً على الإنسان . وعلى اعتبار أنه يسبب سيلان الدموع ، يمكن استخدامه بشكل مفيد كغاز تحذير في المركبات المستدخنة .

تكوُّنُ السَّيَان **cyanogenesis**

تكوين أو إنتاج السيانوجين ، أو حمض الهيدروسيانيك .

مُكوِّنُ السَّيَان **cyanogenetic**

منتج للسيانوجين ، أو حمض الهيدروسيانيك .

سَيانوهِدْرين **cyanohydrin**

هو مركب يتكون من زمرة سيانية وزمرة هيدروكسيل ؛ ويتشكل بإضافة حمض الهيدروسيانيك إلى زمرة ألدهيد ، يسمى أيضاً (Cyanalcohol) .

قبَّالٌ للأزرَق **cyanolabe**

اسم يقترح استخدامه في وصف الصباغ الموجود في المخاريط الشبكية الذي يكون أكثر تحسساً لمجال اللون الأزرق من الطيف من بقية الأصباغ الشبكية .

انظر تحت chlorolabe

انظر تحت erythrolabe

أليفُ الأزرَق **cyanophil**

1 ـ هو أليفُ الأزْرَق .

انظر تحت cyanophilous .

2 ـ خلية أو عنصر هيستولوجي آخر يمكن صبغه بسهولة باللون الأزرق .

أليفُ الأزرَق **cyanophilous**

ممكن الاصطباغ بالأصباغ الزرقاء .

مُوَلِّدُ الهيدْرُوسَيانيك **cyanophoric**

ينتج عنه حمض الهيدروسيانيك ؛ كما في حالة الحصول على (HCN) من حلمهة الجليكوزيد أميجدالين .

ضُواءٌ أزرَق **cyanophose**

هو إحساس بصري شخصاني أزرق .

اختصاره (CN-Cbl) ، ويسمى أيضاً ڤيتامين B_{12} .

سَيانُوكُوبالأمين Co 57 **cyanocobalamin Co 57**

هو السيانوكوبالامين المعالج والموسوم شعاعياً بالواسمة ^{57}Co ؛ ومستحضراته الرسمية هي كبسولات سَيانُوكُوبالأمين Co 57 ، ومحلول سَيانُوكُوبالأمين Co 57 الفموي الذي يكون فيه قسم من الجزيئات الموسومة شعاعياً . تستعمل هذه المستحضرات في تشخيص فقر الدم الوبيل واضطرابات امتصاص ڤيتامين B_{12} الأخرى .

انظر تحت Schilling test .

سَيانُوكُوبالأمين Co 58 **cyanocobalamin Co 58**

هو السيانوكوبالامين المعالج والموسوم شعاعياً بالواسمة ^{58}Co ، ويستخدم في تشخيص فقر الدم الوبيل واضطرابات امتصاص ڤيتامين B_{12} الأخرى .

انظر تحت Schilling test .

سَيانُوكُوبالأمين Co 60 **cyanocobalamin Co 60**

هو السينوكوبالامين الذي يكون قسم من جزيئاته موسوماً شعاعياً بالواسمة ^{60}Co ، والذي يستعمل في تشخيص فقر الدم الوبيل واضطرابات امتصاص ڤيتامين B_{12} الأخرى .

انظر تحت Schilling .

سَيانوكريستالين (مُلَون) **cyanocrystallin**

هي مادة ملونة زرقاء من جلد عشاريات الأرجل .

سَيانوفورم **cyanoform**

سَيانوجين **cyanogen**

1 ـ هو الجذر الكيميائي (-CN) ، ورمزه Cy .

2 ـ غاز شديد السمية ، صيغته الكيميائية (NCCN) ؛ ويُسمى أيضاً إيثانيدينيتريل (Ethanedinitrile) .

بروميد سَيانُوجين **cyanogen bromide**

غاز مسيل للدَموع شديد السمية يستعمل في الحروب صيغته الكيميائية (BrCN) .

كلوريد سَيانُوجين **cyanogen chloride**

غاز صيغته الكيميائية (ClCN) ، والذي

Cyanophyceae **الزَّراقِم**
انظر تحت Cyanobacteria .

cyanopia **رُؤيَة زرقاء**

cyanopsia **رُؤيَة زرقاء**
هو نوع من خلل إدراك الألوان يحدث فيه أن تبدو جميع الأشياء ، وكأنها قد اكتست مسحة من اللون الأزرق .

cyanopsin **سَيانوبْسين**
صباغ مرئي ذو لون مزرق في المخاريط الشبكية عند بعض الحيوانات وهو هام للرؤية .

cyanose **زراق**

cyanose tardive **زُراقٌ مُتأخِّر**

cyanosed **زراقيّ**
انظر تحت cyanotic .

cyanosis **زراق**
هو تبدل اللون إلى الزرقة ، وبخاصة فيما يتعلق بالجلد والأغشية المخاطية نتيجة لزيادة تركيز الديوكسي هيموجلوبين في الدم .

autotoxic cyanosis **زُراقٌ تَسَمُّميٌّ ذاتيّ**
هو زُراقٌ مَعَوِيٌّ المَنْشأ .
انظر تحت enterogenous cyanosis .

central cyanosis **زُراقٌ مَركَزيّ**

compression cyanosis **زُراقٌ انْضغاطيّ**

cyanosis bulbi **زُراقُ المُقْلَة**

cyanosis lienis **زُراقُ الطِّحال**

cyanosis retinae **زُراقُ الشَّبَكيَّة**

enterogenous cyanosis **زُراقٌ معَويُّ المَنْشأ**
هو متلازمة تنتج عن امتصاص مركبات النتريت والسلفيد في الأمعاء ، والتي تتظاهر بشكل رئيسي بحدوث متهيموجلوبينية الدم ، أو سلفهيموجلوبينية الدم ، والتي تترافق بالزراق . وتكون مصحوبة بالتهاب معوي وخيم ، وألم بطني ، وإمساك أو إسهال ، وصداع ، وزلة ، ودوخة ، وغشي ، وفقر الدم ، وأحياناً تعجر الأصابع ووجود الإنديكان في البول . يسمى أيضاً متلازمة ستوكفيز ـ تالما (Stokvis -Talma syndrome) ، و داء فان دير بيرج (Van den Bergh's disease) ، وزراق تسممي ذاتي (Autotoxic cyanosis) .

false cyanosis **زُراقٌ كاذب**
زراق ينتَج عن وجود صباغ مثل الميتهيموجلوبين وليس عن عوز أكسجة الدم .

hereditary methemoglobinemic cyanosis **زُراقٌ وراثيٌّ ميتهيموجلوبيني**
هو زراق ينتج عن تبدل بنيوي في جزيء الهيموجلوبين ، بحيث تتبدل بنيته إلى أشكال مثل هيموجلوبين M .
انظر تحت methemoglobinemia .

cyanosis lienis **زراق طحالي**
هو احتقان لا فاعل في الطحال .

peripheral cyanosis **زُراقٌ مُحيطيّ**

pulmonary cyanosis **زُراقٌ رئَويّ**
هو زراق مركزي ينتج عن نقص أكسجة الدم في الرئتين .

retinal cyanosis **زراق شبكي**
هو زراق مميز يصيب الشبكية ، يشاهد في بعض حالات داء القلب الزراقي الخلقي ، والقناة الشريانية السالكة والشذوذات القلبية الخلقية الأخرى .

shunt cyanosis **زُراقٌ تَحويليّ**
هو زراق مَركزي ينتج عن امتزاج الدم غير المؤكسج بالدم الشرياني في القلب أو في الأوعية الكبيرة .

tardive cyanosis **زُراقٌ مُتَأَخِّر**
هو زراق يحدث في سياق الأمراض القلبية الخلقية ، ولا يظهر إلا بعد حدوث الفشل القلبي .

toxic cyanosis **زُراقٌ سُمِّيّ**
زراق يتصاحب مع بعض أنواع التسمم .


cyanotic **زراقِيّ**
يتعلق أو يتصف بالزراق .

Cyantin **سيانتين**
علامة تجارية لأحد مستحضرات نتروفورانتوين (Nitrofurantoin) ، وهو دواء مضاد للجراثيم .

انظر تحت zamia .

سيكاز **Cycas**

هو جنس من النخيل يوجد في غوام، وجزر أخرى في جنوب المحيط الهادئ. لبعض أنواعها بذور كانت تستخدم في النظام الغذائي لسكان غوام، وتحتوي على جليكوزيدات سامة مثل السيكازين والماكروزامين. يمكن للأغنام والقطعان أن تصاب عند تناولها لتلك البذور بأذى كبدي ومعوي معدي مميت أو بالحالة العصبية التي تسمى ترنح زاميا (Zamia) .



الزراق Cyanosis

سيكازين **cycasin**

هي مادة سامة ومسرطنة تستخلص من أنواع من شجر السيكاز(Cycas)، والتي تسبب عند البشر ظهور الأورام في الكبد والكلى والأمعاء، والرئتين بعد حلمهتها من قبل جراثيم الأمعاء، مما يسبب تفككها إلى ميثيل أزوكسي ميثانول؛ وتسبب عند الماشية أذية كبدية ومعوية معدية مميتة .

cycl-

1ـ سابقة بمعنى دَوْرَة؛ حَلَقَة

2ـ سابقة بمعنى الجِسْمُ الهُدَبِيّ

بِيلَة زُرْقاء **cyanuria**

اصطباغ البول بلون أزرق .

حَمْضُ السَّيانوريك **cyanuric acid**

هو مركب حلقي ينتج عن تسخين اليوريا .

سَيانورين **cyanurin**

هو لون أزرق نيلي يشاهد في البول عند إضافة حمض معدني إليه .

كأسيات الفم **Cyathostoma**

هو جنس من الديدان المسودة من فصيلة المعترسات تتطفل على القناة التنفسية العليا عند الطيور .

داء كأسيات الفم **cyathostomiasis**

هي عدوى الأمعاء الغليظة عند الحصان بالديدان المسودة من جنس كأسية الفم؛ وتتضمن الأعراض فقر الدم والإسهال الذي قد يكون مميتاً .

كأسِيَة الفم **Cyathostomum**

جنس من الديدان المسودة الصغيرة من فصيلة الأسطوانيات؛ وهي تتطفل على الأمعاء الغليظة عند الخيول، وتسبب داء كأسيات الفم .

السَّيبَرْنِيَّات **cybernetics**

هو علم التواصل وآليات التحكم ضمن الأنظمة. يعتمد التحكم على التواصل ضمن النظام ومع البيئة الخارجية، ويؤثر على أفعال النظام بصورة تصل به إلى حالة مستقبلية مرغوبة، أو تحافظ على حالة الاستتباب. يتضمن هذا العلم مفاهيم التنظيم الذاتي والارتجاع إضافة إلى نقل المعلومات وتصحيحها الذاتي، ويمكن تطبيقه ليشمل كل من الآلات مثل الحاسوب وكذلك الكائنات الحية، بما فيها البشر، وحتى التنظيمات المعقدة والمجتمعات .

هَجِينٌ خَلَوِيّ **cybrid**

سيكاد **cycad**

هي نخلة من جنس السيكاز (Cycas)، أو الأجناس القريبة منها مثل الزميا المكروية (Macrozamia)، والزاميا (Zamia) .

مَفصِلٌ تدَوّيريّ **cyclarthrosis**

هو مفصل يسمح بالدوران .

مُحَلقَة (إنزيم) **cyclase**

هو إنزيم يحفز تشكيل مركب حلقي .

مُحَلَقَةُ الأدينيل **adenyl cyclase**

مُحَلَقَةُ الأدينيلاَت **adenylate cyclase**

سيكلازوسين **cyclazocine**

هي مـادة مناهضـة للمخـدر كانت تستعـمل كمسكن ، وفي علاج الاعتماد على المخدرات .

1ـ دَوْرَة **cycle**

2ـ حَلَقَة

جولة أو تعاقب لظاهرة قابلة للملاحظة ، والتي تتكرر بفواصل منتظمة ، وتحدث بتكرار ثابت .

دَورَةٌ زائغَة **aberrant cycle**

هي دوَرة تبدي تبدلاً في الفواصل ، أو في تتابع الأحداث .

دَورَةٌ لاإباضيَّة **anovulatory cycle**

هي دوَرة جَنسية لا يحدث فيها إطلاق بيضة .

دَورَةٌ لاجنْسيَّة **asexual cycle**

هو توالدَ عَن طريق التبـرعم ، أو الانقسـام من المكروب الأب .

دَورَةٌ صَفْراويَّة **biliary cycle**

هي دورة شَيف الصفراوية .

انظر تحت Schiff's biliary cycle .

دَورَةٌ بيُولُوجيَّة **biologic cycle**

هي مجموعَة الأحداث التي تمر في حياة جيل من الكائن الحي .

دَورَةُ المَوجَة الدِّماغيَّة **brain wave cycle**

دَوْرَةُ كالْفين **Calvin cycle**

هو تفـاعل ظلامي يـحدث في سيـاق التـخليق الضـوئي في النبـاتات ، والـتي يثبت فيـهـا ثنائي أكسيـد الكربون إلى جـزيء سكر خـمـاسي الكربون ، ثم يختزل فيـما بعد لتكوين سكريات أخرى .

دَورَةُ الكَرْبون **carbon cycle**

هي الخطوات التي يسـتـخلص من خـلالهـا الكربون (على شكل ثنائي أكسيد الكربون) من

1ـ سابقة بمعنى الجسم الهدبي (Ciliary) .

2ـ سابقة بمعنى دورة أو حلقة (Cycle) .

سيكلاسيلين **cyclacillin**

هو عـامل مضـاد للجراثيم فعـال ضد طائفة واسـعـة من المكروبات مـوجـبـة الجـرام ، والمكروبات سالبة الجرام .

سيكلامات **cyclamate**

هو أي من أمـلاح حـمض السكلاميك . وقـد كـان سيكلامـات الصـوديوم ، وسيكلامـات كـالسيوم يستعـملان في الماضي بشكل واسع كمحليات غير مغذية ، ولكن ارتباطها بأورام المثـانة عند بعض الحـيـوانات تم حظرها كمكملات غذائية في الولايات المتحدة في عام 1969 .

بَخورُ مَريَم **Cyclamen**

جنس من النبـاتات من فـصيلة البـرمـيلوكـا (Primulaceae) . النوع المعروف ببـخـور مـريم الأوروبي ، هو نبـات منزلي شـائع في أمـريكا الشـمـالية له جذر حـراق ، ومسهل ، ويحتـوي على القلواني السام سيكلامين .

حمض سيكلاميك **cyclamic acid**

الحمض الحر لمادة سيكلامات (Cyclamate) .

سيكلامين **cyclamin**

جليكـوزيد سام من بـخور مـريم الأوروبي ؛ له خواص مسهلة قوية .

سيكلاميسين **cyclamycin**

عـلامـة تجـارية لأحـد مـسـتـحـضـرات التـروليـانـدوميـسين (Troleandomycin) ، وهو مضاد حيوي .

سيكلانديلات **cyclandelate**

هو مضاد للتشنج له تأثير مباشر على العضلات الوعائية الملساء ، يتواجد على شكل مسحوق بلوري لونه أبيض إلى أصفر شـاحب ، يستعمل كـمـوسع وعـائي بشكل أسـاسي في أمـراض الأوعية المحيطة ، ويعطى عن طريق الفم .

متعلق بالمَفصِل التَدْويري **cyclarthrodial**

انظر تحت cyclarthrosis .

دَورَةُ حَمْض السِّيتْريك **citric acid cycle**

هي دَورَةُ الحَمْض الثُّلاثيِّ الكَرْبُوكْسيل .

انظر تحت tricarboxylic acid cycle .

دَورَةُ كُوري **Cori cycle**

هي الآلية التي يتم من خلالها نقل اللاكتات المتولد من العضلات إلى الكبد ، وإعادة تحويله إلى جلوكوز من خلال عملية تكون الجلوكوز ، ثم إعادته مرة ثانية إلى العضلات .

دَورَةٌ بالدَّقيقَة **cycle per minute**

هو عدد مرات تكرار الدورة في دقيقة واحدة .

دَورَةٌ بالثَّانيَة **cycle per second**

هو عدد مَرات تكرار الدورة في ثانية واحدة .

دَورَةٌ هَيوليَّة **cytoplasmic cycle**

هي المرحَلة من حياة الطفيلي التي يعيش خلالها في هيولى خلايا الثوي .

دَورَةُ إمْبدن ـ مايَرهُوف **Embden-Meyerhof cycle**

هو سَبيْلُ إمبدن ـ مايرهوف .

انظر تحت Embden- Meyerhof pathway

دَورَةٌ داخليَّة **endogenous cycle**

هو الجزءَ من حياة الطفيلي الذي يمضيه داخل جسم الثوي .

دَورَةٌ وداقيَّة **estrous cycle**

هو نوعٌ مَن أنواع الدورة الجنسية ، والتي تشاهد عند معظم إناث الثدييات البالغات ، ويتميز بدورات متعاقبة ، والتي تتضمن تبدلات وداقية وترابطية في السبيل التناسلي بين دورة إلى أخرى . وتمر هذه الدورة بمراحل هي مرحلة مقدمات الوداق ، ومرحلة الوداق ، والمرحلة التالية للوداق ، ومرحلة هجوع الوداق (وقد تتضمن المرحلة الأخيرة حالة من التجفر ، والتي تستمر لفترات زمنية متفاوتة) .

انظر تحت ovarian cycle .

انظر تحت menstrual cycle .

دَورَةٌ خارجيَّة **exogenous cycle**

هو الجزءَ مَن حياة الطفيلي الذي يمضيه خارج جسم المضيف النهائي .

الغلاف الجوي بواسطة الكائنات الحية ويعاد بعد ذلك إلى الغلاف الجوي . وتتكون هذه الخطوات من سلسلة من التحولات المتبادلة بين مركبات الكربون ، والتي تبدأ بإنتاج السكريات من قبل النباتات من خلال عملية التخليق الضوئي ، وتنتقل إلى الاستهلاك الحيواني ، وتنتهي قبل أن تبدأ مرة أخرى بتحلل الحيوانات أو النباتات ، أو إطلاق الحيوانات لثنائي أكسيد الكربون مع الزفير .

الدَّورَةُ القَلْبيَّة **cardiac cycle**

هي حركةٌ كاملة من حركات القلب ، أو نبضة كاملة الفترة الزمنية من بداية نبضة قلبية إلى بداية النبضة التالية ؛ أي أنها حركة الانقباض والانبساط مع الفاصل بينهما .

الدَّورَةُ القَلْبيَّةُ الوعائيَّة **cardiovascular cycle**

هو نظام جَريانَ الدَم انطلاقاً من القلب ومروراً بالأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى كل من الرئتين وأعضاء الجسم ، وعودة الدم إلى القلب حيث يعمل على ضخه مرة ثانية في دورة جديدة .

دَورَةٌ خَلَويَّة **cell cycle**

هي دورةَ الأحداث الكيميائية الحيوية والمورفولوجية التي تحدث في تجمعات الخلايا الآخذة بالتكاثر ؛ وتتكون من الطور S الذي يبدأ مع نهاية الطور البيني الذي يتم فيه تخليق الدنا (DNA) ؛ ثم الطور G2 وهو فترة هدوء نسبي ؛ ثم الطور M الذي يتألف بدوره من أربعة أطوار من الانقسام الفتيلي ؛ ثم الطور G1 ، أو الطور البيني الذي يستمر حتى بداية الطور S من الدورة التالية .

دَورَةٌ مَضْغيَّة **chewing cycle**

انظر تحتَ masticating cycle .

دورة السيترات ـ البيروفات **citrate-pyruvate cycle**

هي الآلية التي تنتقل بواسطتها زمر الأسيتيل والإلكترونات عبر غشاء المتقدرة أثناء تخليق الحمض الدهني .

جسيمات دقيقة تسمى الجليوكسيلات . وهذا المسار هو شكل معدل من دَورَةُ الحَمْض الثُّلاَثيِّ الكَرْبُوكْسيل ، ويختلف عنها في أنه يَستعمَل إنزيمين مساعدين اثنين هما (إيزوسيتراتاز ، وإنزيم تخليق المالات) ، ويحتاج إلى جزيئين من أستيل التميم A بدلاً من جزيء واحد .

دَورةٌ سِرْئِيَّة **gonotrophic cycle**

هي المرحَلة الفاصلة في حياة الحشرة بين وقت الإطعام ووضع البيوض .

دَورَةُ الشَّعْرَة **hair cycle**

هي الأطوار المتلاحقة لتشكل الشعرة ، انطلاقاً من بدء نموها وحتى فقدها من جريبها ، وتتألف من طور التنامي ، وطور التراجع ، والطور الانتهائي .

دورة حرارية **heat cycle**

هي الدَورَةُ والداقيَّة .

انظر تحت estrous cycle .

دَورَةُ هُودْجكين **Hodgkin cycle**

في التنبيه الحسي للأعصاب : هو تعاقب تنكسي دوري للأحداث التي تطرأ في الخلايا المستثارة ما بين إزالة الاستقطاب والنفوذية للصوديوم ، والتي تزيد زيادة الاستقطاب من النفوذية للصوديوم (Na^{++}) ، وبذلك تزيد نسبة دخوله إلى الخلية ، وتؤدي الزيادة في تركيز الصوديوم إلى مزيد من إزالة الاستقطاب في غشاء الخلية .

دَورَةٌ إسْوِيَّةُ الهيدْرُوجين **isohydric cycle**

هي سَلسَلة مَن التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الكرية الحمراء ، والتي يتم من خلالها قبط ثنائي أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين دون إنتاج فائض من أيونات الهيدروجين .

انظر تحت buffer .

دَورَةُ كريبْس **Kerbs cycle**

هي دَورَةُ الحَمْض الثُّلاَثيِّ الكَرْبُوكْسيل .

انظر تحت tricarboxylic acid cycle .

دَورَةُ كريبس - هنسلايت **Krebs-Henseleit cycle**

دَورَةٌ قَسْرِيَّة **forced cycle**

هي دورة قلبية تقطعها ضربة قسرية .

دَورةٌ عَبَثِيَّة **futile cycle**

في النشاط الإنزيمي : هو اجتماع تفاعلين كيميائيين حيويين أو أكثر ، والتي تقتصر نتيجته على حلمهة ثلاثي فسفات الأدينوزين (ATP) أو المركبات الأخرى عالية الطاقة ؛ وقد ينتج توليد الحرارة . تسمى أيضاً دورة الركيزة .

دورة المشية **gait cycle**

هي سلسلة حركات الرجل والقدم التي تحدث بين كل مرة يلمس فيها عقب القدم الأرض والمرة التي تليها التي يلمس فيها نفس العقب الأرض وتتكون من طور الوقفة وطور التأرجح .

انظر تحت stance phace .

انظر تحت swing phase phase .

دَورةٌ مَعدِيَّة **gastric cycle**

هي تبدَلاَت نظمية تطرأ على شكل المعدة نتيجة الموجات التمعجية .

دَورَةٌ إنْجابيَّة **genesial cycle**

هي الفترَةَ الإنجابية من حياة المرأة .

دَورَةُ الجلوكوز - لاكتات **glucose-lactate cycle**

هي دَورَةُ كُوري .

انظر تحت Cori's cycle .

دورة الجاما جلوتاميل **γ-glutamyl cycle**

هي دورة استقلابية لنقل الأحماض الأمينية إلى الخلايا . تتضمن التفاعلات نقل زمرة الجاما جلوتاميل في الجلوتاثيون إلى الأحماض الأمينية خارج الخلوية مما يسمح لها بدخول الخلايا ؛ وتقوم تفاعلات إضافية بإعادة تكوين الأحماض الأمينية الحرة ، وإعادة تخليق الجلوتاثيون .

دَورَةُ الجليُوكْسيلاَت **glyoxylate cycle**

هو مسار استقَلابي تقوم من خلاله مكروبات ونباتات معينة بتحويل الدهن إلى سكريات . وتتواجد الإنزيمات الخاصة بهذا المسار في

إضافة زمرة أمينية إلى المركبات الكربونية التي تم الحصول عليها من خلال عملية التخليق الضوئي ؛ (3) قيام الحيوانات بتناول النباتات ؛ (4) ومن ثم عودة النتروجين إلى التربة إما من خلال الإفراغات الحيوانية ، أو من خلال موت وتحلل النباتات والحيوانات .

دورة تكْوين البَيضَة **oogenetic cycle**

هو الدَورَةُ المَبيضيَّة .

انظر تحت ovarian cycle .

دَورَةُ الأُورنيثين **ornithine cycle**

هي دَورَةُ اليُوريْا .

انظر تحت urea cycle .

دَورَةٌ مَبيضيَّة **ovarian cycle**

هو تتابع التبدلات الفيزيولوجية التي تحدث في المبيض ، وتتضمن نمو وتمزق الجريب ، وانطلاق البيضة ، وتكون وتقهقر الجسم الأصفر ؛ وتتكون أيضاً من دورة الحيض (Menstrual cycle) ، وكذلك الدورة الدرقية (Estrous cycle) ، تسمى أيضاً دورةُ تكْوين البَيضَة (Oogenetic cycle) .

دَورَةُ فُسفات البنْتُوز **pentose phosphate cycle**

دَورَةٌ سُكَّانيَّة **population cycle**

دَورَةٌ حَمْليَّة **pregnancy cycle**

دَورَةٌ نَبْضيَّة **pulse cycle**

دَورَةٌ إنْجابيَّة **reproductive cycle**

هي التي تَطرأ على الأعضاء التناسلية للأنثى ، بدءاً من وقت إخصاب البيضة ومروراً بالحمل والمخاض والولادة .

دَورَةٌ مُسْتَرَدَّة **restored cycle**

هي دورة قلبية تتبع دورة العودة ، وتحل محل النظم الطبيعي للقلب .

دَورَةُ العَودَة **returning cycle**

دورة قلبية تبدأ بانقباضة خارجة (Extrasystole) .

دَورَةُ رُوس **Ross's cycle**

دَورَةُ شيفْ الصَّفْراويَّة **Schiff's biliary cycle**

هي الدَورة التي تقوم من خلالها الزغابات

هي دَورَةُ اليُوريْا .

انظر تحت urea cycle .

دَورَةُ الحَيَاة **life cycle**

هي الأحداث المتعاقبة في تاريخ حياة الكائن الحي ، ومثاله الحياة الكاملة لطفيلي دموي أولي بما فيها الدورة الداخلية والدورة الخارجية .

دَورَةٌ ثَدْييَّة **mammary cycle**

هو النمو النظمي للغدد الثديية بعد حدوث بدء الإحاضة بالتوافق مع الدورة المبيضية .

دَورَةُ المَضْغ **masticating cycle**

هو المسار الكامل لحركة الفك السفلي التي تحدث عند مضغ الطعام . تسمى أيضاً دورة مضغية (chewing cycle) .

دَورَةُ المَضْغ **masticatory cycle**

انظر تحت masticating cycle .

دَورَةُ الحَيْض **menstrual cycle**

هو شكل من أشكال الدورة الجنسية ، والذي يشاهد عند إناث البشر وبعض الرئيسيات الأخرى ، تطرأ فيه تبدلات على بطانة الرحم تحدث بفواصل منتظمة أثناء السنوات الإنجابية ؛ وتبلغ الدورة أوجها عندما يحدث طرح جزئي لبطانة الرحمية ونزيف مهبلي (الحيض) .

انظر تحت ovarian cycle .

انظر تحت estrous cycle .

دَورَةُ البَعوض **mosquito cycle**

هي الفترة من حياة طفيلي الملاريا التي يمضيها داخل جسم البعوضة المضيفة .

دَورَةٌ أنْفيَّة **nasal cycle**

دَورَةُ النِّتْروجين **nitrogen cycle**

هي الخطوات التي يتم من خلالها استخلاص النتروجين من النترات الموجودة في التربة والماء ، وإدخاله في تركيب الأحماض الأمينية والبروتينات في الكائنات الحية ، ثم إعادة تحويله في النهاية إلى نترات : (1) قيام الجراثيم بتحويل النتروجين إلى نترات ؛ (2) قيام النباتات باستخلاص النترات واستعمالها في بناء الأحماض الأمينية والبروتينات من خلال

دَورَةٌ جِنْسِيَّة **sexual cycle**

انظر تحتَ sex cycle .

دَورَةٌ تَبَوُّغِيَّة **sporogenic cycle**

هي الدورَة الجنسية عند الحيوانات الأوالي التي تحدث أثناء وجودها داخل مضيف ثان .

دَورَةٌ تَبَوُّغِيَّة **sporogenous cycle**

انظر تحتَ sporogenic cycle .

دورة الركيزة **substrate cycle**

هي الدورة العبثية .

انظر تحت futile cycle .

دَورَةُ الحَمْض الثُّلاثيِّ الكَرْبُوكْسيل **tricarboxylic acid cycle**

هو المَسار الأصلي النهائي لأكسدة جزيئات الوقود (الطاقة) إلى ثنائي أكسيد الكربون ، وتدخل معظم جزيئات الوقود (الطاقة) إلى الدورة على شكل إنزيم أسيتيل التميم A ؛ وهي تنتج كذلك وسائط تفاعلات التخليق الحيوي . تحدث الدورة في المتقدرات وينتج عنها ثلاثي فسفات الأدينوزين (ATP) من خلال تزويد سلسلة نقل الإلكترون بالإلكترونات .

المعوية بامتصاص الأملاح الصفراوية الموجودة في الصفراء ، وإعادة توجيهها إلى الكبد حيث تتم إعادة استخدامها .

انظر تحت enterohepatic circulation .

دَورَةُ التَّكاثُر التَّقَسُّميّ **schizogenic cycle**

هي الدورةَ الجنسيةَ عند الحيوانات الأوالي التي يحدث خلالها النمو والتقطع .

دَورَةُ التَّكاثُر التَّقَسُّمي **schizogenous cycle**


انظر تحت schizogenic cycle .

دَورَةٌ جِنْسِيَّة **sex cycle**

1 ـ هيَ سَلسلة من التبدلات الفيزيولوجية المتكررة التي تطرأ على الأعضاء التناسلية لإناث الثدييات ؛ وتقع هذه السلسة من التبدلات عندما لا يحدث الحمل بفواصل منتظمة . ولهذه الدورة نوعان هما دورة الحيض ودورة الوداق .

انظر تحت ovarian cycle .

2 ـ فترة التكاثر الجنسي عند كائن حي يمكنه أيضاً أن يتكاثر بشكل لا جنسي (أي أنه يتكاثر جنسياً ولا جنسياً) .



Nitrogen cycle دورة النتروجين

الكيميائية التي تحتوي على حلقة من الذرات في نواتها .
انظر تحت clsed chain .

AMP حَلَقِيّ **cyclic AMP**
هو أُحاديّ فُسْفات الأدينُوزين الحلقي .
انظر تحت cyclic adenosine monophosphate .

كيناز البروتين المعتمد على AMP الحلقي **cyclic AMP-dependent protein kinase**
هو كيناز البروتين المعتمد على أُحاديّ فُسْفات الأدينُوزين الحلقي .

GMP حَلَقِيّ **cyclic GMP**
هو أحاديّ فسفات الجوانوزين الحلقي .
انظر تحت cyclic guanosine monophos-phate .

فسفودايستراز GMP الحلقي ´3 و´5 **3´,5´-cyclic GMP phosphodiesterase**
هو إنزيم من صنف إنزيمات الهيدرولاز ، والذي يحفز تشطر أحادي فسفات الجوانوزين الحلقي لتكوين أحادي فسفات الجوانوزين .

دَوْرَوِيَّة **cyclicity**
كون الحوادث المتعلقة بعملية ما تقع بصفة دورية .

بَضْعُ الجِسْمِ الهَدَبِي **cyclicotomy**
انظر تحت cyclotomy .

سيكلين **cyclin**
هو ضد نووي للخلايا الآخذة بالتكاثر .

سِيكلينْدُول **cyclindole**
هو دواء مضاد للاكتئاب .

الْتِهابُ الجِسْمِ الهَدَبِي **cyclitis**

الْتِهابُ الجِسْمِ الهَدَبِي المُخَيِّف (المُتَغَايِرُ التَّلَوُّن) **heterochromic cyclitis**
هو التهاب مزمِن للجسم الهدبي ، والذي ينتج عنه تغير في لون القزحية ، بحيث تكون قزحية العين الملتهبة أفتح لوناً .

الْتِهابُ الجِسْمِ الهَدَبِيِّ المُنَسِّج **plastic cyclitis**
التهابَ الجسم الهدبي المترافق بنضح مادة ليفية

وتسمى أيضاً دورة كريبس (Kerbs cycle) ، ودورة حمض السيتريك (Citric acid cycle) .

دَوْرَةُ اليُورْيا **urea cycle**
هي سلسلة من التفاعلات الاستقلابية التي تحدث في الكبد ، والتي يتم من خلالها تحويل الأمونيا ، وذلك إلى يوريا باستعمال الأورنيثين المتولد (المتجدد) بشكل حلقي كحامل .

دَوْرَةٌ رَحِمِيَّة **uterine cycle**
هي الظَوَاهر التي تطرأ على بطانة الرحم أثناء الدورة الوداقية ، أو دورة الحيض ، والتي تهيئ بطانة الرحم لانغراس الكيسة الأريمية .

دَوْرَةٌ مَهْبِلِيَّة **vaginal cycle**

دَوْرَةٌ إِبْصَارِيَّة **visual cycle**
هو الارتباطَ الحلقي بين الريتينال المقرون -11 مع الأوبسين (بروتين في الشبكية العينية) ، ويعقب ذلك حدوث تبدلات هيئية مستثارة بالفوتون في مركب البروتين (رودوبسين أو يودوبسين) ، وانفصال الأوبسين ، وريتينال مفروق إسوي القياس ؛ تكتمل الدورة بإعادة تحويل الريتينال بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المصاوغ المقرون -11 تنتج تلك التبدلات الهيئية جهد كهربائي ، وتطلق المتتالية التي تولد التدفع العصبي الحسي في الإبصار .

اِسْتِلابُ الدَّوْرَة **cycle stealing**

cyclectomy
1 ـ قطعُ الجِسْمِ الهَدَبِي
2 ـ قطعُ حافةِ الجَفْن
1 ـ استئصال قطعة من الجسم الهدبي .
2 ـ استئصال جزء من الحافة الهدبية للجفن .

مُصَقَلَبُ الدماغ (مسخ) **cyclencephalus**
هو جنين يلتحم عنده نصفا الكرة المخية في جسم واحد .

تصَقَلُبُ الدماغ (مسخ) **cyclencephaly**
هو التحام نصفي الكرة المخية .

cyclic
1 ـ دَوْرَوِيّ
2 ـ حَلَقِيّ
مصطلح يشير إلى ، أو يحدث على شكل دورة أو دوائر ؛ وتطلق التسمية على المركبات

خواص واستعمالات مشابهة للأساس ، ويعطى كذلك عن طريق الفم .

سِيكلوبندازول cyclobendazole

هو دواء مُضادٌّ للدِّيدان .

هيدروكلوريد سِيكلوبنزابرين cyclobenzaprine hydrochloride

هو مركب ينتمي من ناحية البنية إلى مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ، يستعمل كمرخٍ للعضلات ويعطى عن طريق الفم .

مُصَقلَبُ الرَّأس (مسخ) cyclocephalus

انظر تحت cyclops .

التِهابُ الجِسْمِ الهَدَبِيّ والقَرْنِيَّة cycloceratitis

انظر تحت cyclokeratitis .

التِهابُ الجِسْمِ الهَدَبِيّ والمَشيمِيَّة cyclochoroiditis

هو الْتهابٌ في الجِسْمِ الهَدَبِيّ ويصاحبه أيضاً التهاب في المَشيميَّة العَينية .

سِيكلوكورت Cyclocort

علامة تجارية لأحد مستحضرات أمسينونيد (Amcinonide) ، وهو من الستيرويدات القشرية والذي يملك فاعلية عالية جداً أو متوسطة .

مُعالجَةُ الجِسْمِ الهَدَبِي بالبَرْد cyclocryotherapy

هو تجميد الجسم الهدبي ؛ وهي عملية تستخدم في معالجة الزرق .

سِيكلوكومارُول cyclocumarol

دواء مُضادٌّ للتَّخَثُّر .

كَبْتُ تكَيُّفِ العَيْن cyclodamia

تكيف مقموع أو مكبوت للعين .

زَيغ تَدْويريّ cyclodeviation

سِيكلوديكسترين cyclodextrin

أي من زمر المركبات الحلقية غير المختزلة ، والتي تنتج من الحلمهة الإنزيمية للنشا ، وتعطى لها صيغ سيكلوديكسترين ـ ألفا ، أو سيكلوديكسترين ـ بيتا ، أو سيكلوديكسترين ـ جاما ؛ وتستخدم كعوامل معقدة ، وتستخدم أيضاً في دراسات النشاط الإنزيمي .

بيتا سيكلوديكسترين beta cyclodextrin

انظر تحت betadex .

في غرفة العين الأمامية .

الْتهابُ الجِسْمِ الهَدَبِيِّ الخالص pure cyclitis

اَلتهاب الجِسمِ الهدَبِي الذيَ لا يشمل القزحية .

الْتهابُ الجِسْمِ الهَدَبِيِّ المُقَيِّح purulent cyclitis

هو تقيح الجِسم الهَدبي ؛ وهو عادة ما يشمل كامل السبيل العنبي بما يصل إلى التهاب باطن المقلة .

الْتهابُ الجِسْمِ الهَدَبِيِّ المَصْلِيُّ serous cyclitis

هو التهابَ بسيط فيَ الجسمَ الهدبي .

سِيكليزين cyclizine

هو دواء مضاد للهيستامين ، والذي يستعمل بشكل ملح لاكتات كمضاد للقيء والدوار ، وبخاصة للوقاية من داء الحركة وعلاجه ، يعطى عن طريق الحقن العضلي .

هيدروكلوريد السيكليزين cyclizine hydrochloride

هو الملح أحادي الهيدروكلوريد من السيكليزين . له نفس خواص واستخدامات الأساس (السيكليزين) ، ويعطى عن طريق الفم .

لاكتات سيكليزين cyclizine lactate

انظر تحت cyclizine .

1 ـ سابقة بمعنى دَوْرَة؛ حَلَقَة cyclo-

2 ـ سابقة بمعنى الجِسْمُ الهَدَبي

سابقة بمعنى دوري أو متكرر . تستخدم على وجه خاص في المصطلحات التي تشير إلى العين أو إلى الجسم الهدبي في العين .

سِيكلوأميلوز cycloamylose

إقفارُ الجِسْمِ الهَدَبِيّ cycloanemization

هو عمل جراحي لمعالجة الزرق .

سِيكلوباربيتال cyclobarbital

هو نوع قصير الأمد من الباربيتورات ، والذي يستعمل أساساً كمنوم ، ويعطى عن طريق الفم .

كالسيوم سيكلوباربيتال cyclobarbital calcium

هو ملح الكالسيوم من السيكلوباربيتال ، له

إينوزيتول **cyclohexanehexol**

هو موسع وعائي .

انظر تحت inositol .

حمض سيكلوهيكسانسلفاميك **cyclohexanesulfamic acid**

هو حمض السيكلاميك .

انظر تحت cyclamic acid .

سيكلوهيكسانول **cyclohexanol**

هو المشتق أحادي الهيدروكسي من السيكلوهيكسان ؛ والذي يستعمل كمذيب وعامل خلط .

سيكلوهيكسيميد **cycloheximide**

هو مضاد حيوي يعزل من المتسلسلة السنجابية ، ويستعمل كمضاد للفطريات الزراعي ، وفي بعض مستنبتات الفطريات الانتقائية . وهو يثبط معظم الفطريات الرمية فيما يسمح بنمو الفطريات الجلدية ومعظم الفطريات الجهازية ، ويثبط الانقسام النووي في المكروبات ذات النواة (Karyotic) دون أن يؤثر على الخلايا بدائية النواة (الجراثيم) .

دَوْرِيُّ المزاج **cycloid**

هو ما يتصف بمزاج يتناوب بين الشماق والاكتئاب . وتستعمل مصطلحات (Cycloid) ، (Cyclothymic) وهوسي اكتئابي (Manic-depressive) بالتبادل للدلالة ، إلا أن مصطلح دوروي المزاج (Cycloid) ، هو اللفظ يستعمل بصفة عامة للحالة الأقل شدة فيما يستعمل مصطلح هوسي اكتئابي (Manic-deprssive) ، للحالة الأكثر شدة .

سِيكلوإيزوميراز (إنزيم) **cycloisomerase**

هو مصطلح يطلق في سياق التسميات المبتذلة (المتعارف عليها) على مركبات الليباز داخل الجزيئي من صنف الإنزيمات المصاوغة ، والتي تحفز أشكالاً معينة من إعادة تكوين الجزيئات بحيث تتحطم أو تتخذ شكلاً حلقياً ، كما في تخليق فسفات ميو ـ إينوزيتول ـ العضل من الجلوكوز 6- فوسفات .

فَصْلُ الجِسْمِ الهَدَبِي **cyclodialysis**

هو إجراء وصل جراحي بين غرفة العين الأمامية ، وبين الحيز فوق المشيموي ؛ والذي يجرى في سياق معالجة الزرق .

تَخْرِيبُ الجِسْمِ الهَدَبِي بِالحَرَارَةِ **cyclodiathermy**

هو تخريب جزء من الجسم الهدبي بالإنفاذ الحراري ؛ وهي عملية يتم إجراؤها كنوع من العلاج في بعض حالات الزرق .

شَفْعٌ تَدْوِيرِيّ **cyclodiplopia**

ادْوِرارُ العَيْن **cycloduction**

هو شوس العين الناتج عن فعل العضلة المائلة .

حَلُّ الجِسْمِ الهَدَبِي بِالكَهْرُبَاء **cycloelectrolysis**

هو الحَلُّ الكهربائي للجسم الهدبي ، وهي عملية تجرى لخفض الضغط داخل المقلة في حالات الزرق .

دَوْرَةٌ نَمائِيَّة **cyclogeny**

هي الدورة النمائية أو التطورية للمكروبات أو الجراثيم .

مُخَطَّطُ الجِسْمِ الهَدَبِي **cyclogram**

إمبونات سيكلوجوانيد **cycloguanide embonate**

هي باموات السيكلوجوانيل .

انظر تحت cycloguanil pamoat .

باموات سيكلوجوانيل **cycloguanil pamoate**

هو مستقلب لدواء البروجوانيل المضاد للملاريا ، والذي يتمتع بخواص ذاتية مضادة للملاريا . يسمى أيضاً إمبونات سيكْلُوجوانيد (Cycloguanide embonate) ، وإمَبونات سيكْلُوجوانيل (Cycloguanil embonate) .

سيكلوَجيل **Cyclogyl**

علامة تجارية لأحد مستحضرات هيدروكلوريد سيكلوبنتولات (Cyclopentolate hydrochloride) ، وهو دواء مضاد للكولينيات .

سيكلوهيكسان **cyclohexane**

هو مركب هيدروكربونيٌّ أليفاتيٌّ حَلَقِيّ ، صيغته الكيميائية $C6H_{12}$ ، ويتَواجد عَلى شكلين : المركب (Boat) والكرسي (Chair) .

سِكلوبِنتولات **cyclopentolate**
هو دَواءٌ مُضادٌّ للكولينيَّات يستعمل في علاج شلل العضلة الهَدبية ، وتوسع الحدقة عن طريق التستيل داخل قطرة العين .

احْولالٌ تَدْويريّ **cyclophoria**
هو احولال تلوي يحدث فيه انحراف العين عن المحور الأمامي الخلفي في غياب المنبهات البصرية الاندماجية . ويشمل احولال تدويري وحشي ، احْولالٌ تَدْويريٌّ إنْسيّ ، وتسمى أيضاً حول تدويري (Cyclotropia) .
انظر تحت excyclophoria .
انظر تحت incyclophoria .

احْـولالٌ تَدْويريٌّ تكيُّفيّ **accommodative cyclophoria**
هو احولال تدويري يحدث بسبب لابؤرية مائلة .

احْولالٌ تَدْويريٌّ مَجْهولُ السَّبَب **essential cyclophoria**

احْولالٌ تَدْويريٌّ سَلْبيّ **minus cyclophoria**
هوَ احْولالٌ تَدْويريٌّ إنْسيّ .
انظر تحت incyclophoria .

احْولالٌ تَدْويريٌّ إيجابيّ **plus cyclophoria**
هوَ احولال تَدويري وَحشي .
انظر تحت excyclophoria .

مِقياسُ الاحْولالِ التَّدْويري **cyclophorometer**
هو جهاز يستعمل في قياس الاحولال التدويري .

سِيكلوفسْفاميد **cyclophosphamide**
عامل مؤلكل سام للخلايا من زمرة الخردل النتروجيني ، والذي يستعمل كمضاد للأورام ، ويكون عادة مصاحب لعوامل أخرى ، ولعدد واسع من الحالات ، بما فيها داء هودجكين والساركومة اللمفية وابيضاض اللمفاويات الحاد ، ولمفومة بوركيت ، وسرطانة الثدي ، والورم النقوي المتعدد ، وابيضاض اللمفاويات المزمن ، والورم الأرومي العصبي ، وسرطانة المبيض ، وسرطانة عنق الرحم ؛ كما يستعمل

الْتِهابُ الجِسْمِ الهَدَبي والقَرْنِيَّة **cyclokeratitis**
هو التهاب القرنية والجسم الهدبي معاً ، يسمى أيضاً داء دارليمبلي (Darlymple's disease) .

سِيكلوليجاز (إنزيم) **cyclo-ligase**
هو أحد الإنزيمات التي تنتمي إلى الأصناف الفرعية من إنزيم الليجاز ، والتي تحفز تكون روابط الكربون ـ النتروجين لإنتاج حلقة متباينة الحلقات ، بتأثير حلمهة ثلاثي فسفات الأدينوزين .

اعْتِلالُ الثَّدْيِ الدَّوْرِيّ **cyclomastopathy**
هو اعتلال يصيب الأثداء ، والذي يتظاهر بشكل فرط نمو زائد للنسيج الضام ، أو تكاثر ظهاري مفرط ، أو الاثنين معاً ؛ كاستجابة لتحري النمو أو كمظهر للأوب الشاذ التالي لاستجابة طبيعية .

سِيكلوميتيكائين (بَنْجٌ موضِعِيّ) **cyclomethycaine**

سيكلوأكسجيناز **cyclooxygenase**
هو نشاط إنزيمي يتعلق بإنزيم إندوبيروكسيد سينثاز في البروستاجلاندين .

صُقلوبيّ (مسخ) **cyclopean**
هو مسخ ذو عين واحدة .

سِيكلوبنْتامين **cyclopentamine**
هو دَواءٌ مُخَفِّفٌ لاحْتِقان الأَنف .

سِيكلوبِنْتان **cyclopentane**
هو نوع من السكريات تركيبه الكيميائي C_5H_{10} ، والذي تنتظم فيه ذرات الكربون الخمسة جميعها في حلقة واحدة .

سِيكلوبنتينبير هيدروفينانثرين **cyclopentenoper-hydrophenanthrene**
هو الهيكل البنيوي الأساسي المشترك بين الستيرويدات ، ويتكون من حلقة فينانثرين مشبعة (ثلاث حلقات كربوكسيلية ثلاثية الأعضاء ملتحمة) متصلة بسيكلوبنتين .

سِيكلوبينثيازيد **cyclopenthiazide**
هو دواء مدر للبول فعال يعطى عن طريق الفم ، يستعمل في معالجة الوذمة المرافقة للعديد من الاضطرابات ، وفي حالات فرط ضغط الدم .

سِكلوبرُوبان **cyclopropane**

هو غاز عديم اللون قابل للاشتعال له رائحة مميزة ومذاق لاذع يستعمل كمخدر عن طريق الاستنشاق. قل استعماله حالياً بسبب قابليته للاشتعال.

سيكلوبروبانون هيدرات **cyclopropanone hydrate**

هو المستقلب الفعال من حمض الجلوتاميك المشتق من الكوبرين (Coprine)، وهو يوجد في الفطور الصالحة للأكل مثل الكوبرينس اترامنتيراز (Coprinus atramentarius)؛ يؤدي وجود الكوبرين في الجسم لمدة ثلاثة إلى سبعة أيام بعد تناول الفطور إلى حدوث تفاعل سمي شبيه بثنائي السلفيرام إذا تم تناول الكحول.

1 ـ جادِف (جِنسٌ مِنَ القِشْرِيَّات) **Cyclops**
2 ـ صُقْلوب (كائِنٌ خُرافِيٌّ ذو عَيْنٍ واحِدَة)

هو جنس من القشريات الدقيقة، تعمل أنواعها كمضيف لكل من التنينة والعوساء.

1 ـ جادِف (ج: جَوادِف) **cyclops**
2 ـ صُقْلوب (مسخ)

حنين يبدي أعراض التصقلب، ويسمى أيضاً (Cyclocephalus).

صُقْلُوبٌ سُفْلِيُّ الفَك **cyclops hypognathus**

هو صقلوبٌ مختلف عن الشكل المعتاد بكونه يفتقر إلى الخرطوم النمطي، وبكون أذناه منخفضتين على نحو شاذ، وفكه السفلي رديمي وفمه صغير.

إلوائي **cyclorotary**

يتعلق بالالتواء.

التواء **cyclorotation**

انظر تحت torsion.

مِنْظارُ الجِسْمِ الهَدَبي **cycloscope**

سيكلوز **cyclose**

سِيكلوسيرين **cycloserine**

هو مضاد حيوي واسع الطيف ذو خواص كابحة للسل، ينتج عن نمو المتسلسلة الخصوبة (Cycloserine orchidaceus)، أو نحصل عليه كعامل كابت للمناعة للحيلولة دون رفض الطعوم، وفي معالجة أمراض معينة تكتنف الشذوذ في الوظيفة المناعية. يعتبر سيكلوفسفاميد بحد ذاته عاملاً خاملاً فارماكولوجياً؛ إلا أن العديد من مستقلباته الفعالة تنتج من خلال الأنظمة الإنزيمية الصغرورية.

دَوْرَوِيَّة المِزاج **cyclophrenia**

انظر تحت cyclothymia.

حَلَقِيَّاتُ المَحاجِم **Cyclophyllidea**

هي رتبة من الديدان الشريطية من صنف الشراطيات الفرعي صنف الشريطانيات، تشتمل على سبع فصائل تتصف بأنها تتطفل على البشر، أو الحيوانات الأليفة إما بشكل اعتيادي أو بشكل استثنائي. وهذه الفصائل هي: الشريطيات (Taeniidae)، والمحرشفات (Hymenolepididae)، وذوات المنفذين (Dipylidiidae) والدافينيات (Davaineidae)، وعزلاوات الرأس (Anoplocephalidae)، واللينستوفيات (Linstowiidae) والمزقيات (Mesocestoididae).

تصَقْلُب (مسخ) **cyclopia**

أي شذوذ نمائي يتسم بوجود حجاج واحد. وفيه يتراوح وضع الكرة ما بين أن تكون مفقودة أو رديمية أو طبيعية ظاهرياً أو مزدوجة. وقد يكون الأنف مفقوداً أو موجوداً بشكل زائدة أنبوبية (خرطوم) فوق الحجاج.

مُصَقْلَب (مسخ) **cyclopic**

متصف بالتصقلب.

سيكلوبين **cyclopin**

مبيد للفيروسات.

شَلَلُ العَضَلَةِ الهَدَبِيَّة **cycloplegia**

شلل العضلة الهدبية؛ أو شلل التطابق.

مَشْلولُ العَضَلَةِ الهَدَبِيَّة **cycloplegic**

1 ـ متعلق أو متصف أو مسبب لشلل العضلة الهدبية.

2 ـ عامل يسبب شلل العضلة الهدبية.

سيكلوسبورين **cyclosporine**

هو ببتيد حلقي ينتج على شكل مستقلب بفطريات التربة مثل المتمادية منتفخة القدم (Tolypocladium inflatum Gams) ، التي تثبط بشكل انتقائي تنشيط اللمفاويات التائية المساعدة ؛ ويستعمل ككابت للمناعة للحيلولة دون حدوث الرفض عند المرضى الذين يتلقون طعوم الأعضاء .

مِدْوار **cyclostat**

هي أسطوانة من الزجاج يتم فيها تدوير حيوان التجربة حول محوره العمودي .

سيكلوتات **cyclotate**

التسمية المعتمدة من قبل الولايات المتحدة (USAN) لـ كربوكسيلات (4-methylbicyclo-[2.2.2]oct-2-ene-1-carboxylate) .

مُعالجة بالدَّرَّاجة **cyclotherapy**

سيكلوثيازيد **cyclothiazide**

دواء مدر للبول من زمرة الثيازيد ، والذي يستعمل في معالجة فرط ضغط الدم ، ويعطى عن طريق الفم .

دُوروِيُّ المِزاج **cyclothyme**

هو شخص ذو شخصية دوروية أو تظهر عليه أعراض اضطراب المزاج الدوروي .

دُورويَّةُ المِزاج **cyclothymia**

هو اضطراب المزاج الدوروي .

دُوروِيُّ المِزاج **cyclothymiac**

انظر تحت cyclothymic .

دُوروِيُّ المِزاج **cyclothymic**

يتعلق أو يتصف باضطراب المزاج الدوروي .

دُورويَّةُ المِزاج **cyclothymosis**

انظر تحت cyclothymia .

سيكلوتول **cyclotol**

هي أحد مركبات بولي هيدروكسي سيكلوهيكسان (Polyhydroxy cyclohexane) ، مثل إينوزيتول (Inositol) .

مِبْضَعُ الجِسْمِ الهَدَبِي **cyclotome**

هي أداة قاطعة تستعمل في عملية بضع الجسم عن طريق التخليق ، ويتواجد على شكل مسحوق بلوري أبيض أو أصفر شاحب ، فعال ضد العديد من الجراثيم سالبة الجرام وموجبة الجرام ، ويستعمل في معالجة السل والعداوى الرئوية وخارج الرئوية ، وأحياناً عداوى السبيل البولي الناتجة عن العوامل الممرضة الحساسة لهذا الدواء ؛ يعطى عن طريق الفم .

دَوَرانُ الهَيولى **cyclosis**

حركة الهيولى داخل الخلية ، دون تشويه جدار الخلية ؛ تسمى أيضاً جريان الهيولى (Cytoplasmic streaming) . أو الجريان الجبلي (Protoplasmic streaming) .

تَشَنُّجُ التَّكيُّف **cyclospasm**

تشنج تكيف العين .

سيكلوسبازمول **Cyclospasmol**

علامة تجارية لأحد مستحضرات سيكلانديلات (Cyclandelate) ، وهو دواء مضاد للتشنج الوعائي .

حلقية الأبواغ **Cyclospora**

جنس من الحيوانات الأوالي من الأكريات (رتيبة الأيمريات ورتبة الكرويات الحقيقية) تتميز بوجود كيستين بوغيتين اثنتين في كل بيضة متكيسة . وتكون البيضة المتكيسة مغطاة بقشرة ثنائية المصراع ويتواجد حيوانان بوغيان في كل كيسة بوغية . أكثر أنواعها شيوعاً هي (Cyclospora cayetanensis) ، وتنتشر عن الطريق البرازي الفموي .

انظر تحت cyclosporiasis .

داء حلقية الأبواغ **cyclosporiasis**

هي عدوى الحيوانات الأوالي من جنس حلقية الأبواغ ، وبخاصة (Cyclospora cayetanensis) ، والتي تشاهد غالباً عند المرضى منقوصي المناعة ؛ وتكون الأعراض الغالبة هي الاعتلال المعوي المعدي المتكرر والإسهال المائي .

سيكلوسبورين A **cyclosporin A**

انظر تحت cyclosporine .

كَمْخَة الحَمْل cyestein

هي تشكلات جلدية تشاهد أحياناً على سطح بول المرأة الحامل .

كَمْخَة الحَمْل cyesthein

انظر تحت cyestein .

حَمْلِيّ cyetic

سيلرت Cylert

علامة تجارية لأحد مستحضرات بيمولين (Pemoline) ، وهو دواء منبه للجهاز العصبي المركزي .

بَضْعُ الجِسْم الهَدَبي cylicotomy

انظر تحت cyclotomy .

1ـ أسْطوَانَة cylinder

2ـ أسْطوانة (ج: أسْطوانات)

1ـ جسم صلب شكله يشبه العمود .

2ـ عدسة أسطوانية .

المِحْوَرُ الأَسْطُوانيّ axis cylinder

هو المِحوار .

انظر تحت axon .

أُسْطُواناتُ بِنْس جُونْز Bence Jones cylinders

هي أجسامَ جيلاتينية أسطوانية تشكل محتويات الحويصلات المنوية ؛ وتسمى أيضاً أجسام لالماند (Lallemand's bodies) ، أو أجسام لالماند ـ تروسو (Lallemeand-Trousseau bodies) ، أو أجسام تروسو لالماند (Trousseau-Lallemand bodies) .

عَدَساتٌ أُسْطُوانِيَّةٌ مُتَصالبَة crossed cylinders

هما عدستان أَسطوانيتانَ متعامدتان إحداهما مع الأخرى .

أُسْطُوانَةُ كولتس Kulz's cylinder

هي أُسْطُوانَةُ الغَيبوبَة السُّكَّرِيَّة .

انظر تحت coma cast .

أُسْطُواناتُ لايديج Leydig's cylinders

هي حزمة من الألياف العضلية ، والتي تفصلها عن بعضها البعض فواصل جبلية .

أُسْطُواناتُ رُوفيني Ruffini's cylinders

انظر تحت corpuscle .

الهدبي أو العمليات الأخرى التي تجرى على العين .

بَضْعُ الجِسْم الهَدَبي cyclotomy

هو تقسيم أو بضع العضلة الهدبية .

التِفافُ العَيْن cyclotorsion

سيكلوترون cyclotron

هو جهاز يستعمل لتسريع الجزيئات المشحونة (مثل البروتونات أو الإلكترونات أو الأيونات) إلى مستويات طاقة عالية بواسطة مزيج من مغناطيس متواصل ، وحقل كهربائي متذبذب .

حَوَلٌ تَدْويريّ cyclotropia

هو نوع من أنواع الحول ، والذي يحدث فيه احولال تدويري دائم لإحدى العينين حول المحور الأمامي الخلفي حتى في وجود تنبيه بصري اندماجي ، وينتج عنه شفع أو ازدواج في الرؤية .

انظر تحت excyclophoria .

انظر تحت incyclophoria .

حَوَلٌ تَدْويريٌّ سَلْبيّ minus cyclotropia

هو احْولالٌ تَدْويرِيٌّ إنْسيّ .

انظر تحت incyclophoria .

حَوَلٌ تَدْويريٌّ إيجابيّ plus cyclotropia

هو احولالَ تدويريَ وحشي .

انظر تحت excyclophoria .

هيدروكلوريد سِيكريمِين cycrimine hydrochloride

هو دَواءٌ مُضادٌّ للكولينيَّات ، صيغته الكيميائية ($C_{19}H_{29}NO.HCL$) ، يستعمل في علاج الباركنسونية ويعطى عن طريق الفم .


سيكرين Cycrin

علامة تجارية لأحد مستحضرات أسيتات الميدروكسي بروجستيرون (Medroxyprogesterone acetate) .

نظمُ قلبِ الجَنين cyematocardia

حَمْل cyesis

انظر تحت pregnancy .



Cyclosporiasis داء حلقية الأبواغ

تمفصل النَّاتِئُ السِّنِّيُّ الشَّكْل مع الأطلس .

cylindraxile **مِحْوَار**

انظر تحت axon .

cylindrical **أسْطوانِيّ**

كل مـــا يتـــعلق بأسطوانة ، أو شكله مـــثل أسطوانة .

cylindriform **أسْطوانِيُّ الشَّكْل**

انظر تحت Cylindrical .

terminal cylinders **أُسْطُوانَاتٌ انْتِهائِيَّة**

هو جسيم رَوَفينِي .

انظر تحت Ruffini's corpuscle .

urinary cylinders **أُسْطُوانَاتٌ بَولِيَّة**

انظر تحت urinary cast .

cylindrarthrosis **مَفْصِلٌ أسْطوانِيّ**

مفـصل تكون السطوح المفصلية فيه أسطوانية ، كـمـا في المَفْصل الكُعْبُرِيُّ الزَّنْدِيُّ ، الدَّاني أو

Cylindrocarpon **سيلندروكربون**

هو جنس من الفطريات الناقصة من صنف الفطريات الخوطية الشكل ، وقد تم عزل العديد من أنواعه من العداوى البشرية مثل داء الخوطاء الزجاجية (Hyalohyphomycsis) ، أو الورم الفطري الحقيقي (Eumycotic mycetomas) .

cylindrocellular **أسْطوانِيُّ الخَلايا**

يتكون من ، أو يحتوي خلايا أسطوانية .

cylindrodendrite **تَغَصُّنٌ مِحْوَرِيٌّ**

Cylindrogloea **المُسْتَطِنَة**

جِنْسٌ مِنَ الجَراثيم .

cylindroid **1 ـ أسْطوانَة بَولِيَّة**

2 ـ أسْطوانِيُّ الشَّكل

1 ـ يشبه أو يتخذ شكل الأسطوانة .

2 ـ أسطوانة بولية من مصادر متنوعة وبأشكال مختلفة ، تشبه عادة الأسطوانة الهيالينية إلا أنها تختلف عنها في أنها تستدق لتكون ذيلاً نحيلاً غالباً ما يكون منثنياً أو ملتفاً على نفسه ؛ تسمى أيضاً أسطوانة مخاطية (Mucous cast) ، أو أسطوانة كاذبة (Spurious cast) .

cylindroma **وَرَمٌ أسْطوانِيُّ الخَلايا**

1 ـ ورم عادة ما يكون حميداً ذو منشأ إما مفترز أو ناتج يحدث في المراحل الباكرة من الحياة ويتظاهر بشكل عقيدات مفردة أو متعددة تتوضع على فروة الرأس وبشكل أقل على الوجه أو الأطراف ، ويتكون من كتل ظهارية أسطوانية تحتوي على خلايا صغيرة قعدة وخلايا أكبر حجماً شاحبة الاصطباغ تكون جميعها محاطة بغمد هياليني وردي اللون وتكون الآفات متعددة ، والتي يغلب أن تصيب الإناث ، وقد تشمل كامل فروة الرأس (مما يفسر تسمية الورم العمامي) عادة موروثة بصفة سائدة ، وقد تكون مصاحبة للورم الظهاري الشعري .

2 ـ سرطانة غدانية كيسية .

انظر تحت Adenoid cystic carcinoma .

cylindromatous **متعلق بالوَرَم الأسْطوانِي الخَلايا**

يتعلق بالورم أسطواني الخلايا ، أو له طبيعة الورم أسطواني الخلايا .

Cylindrothorax **أسْطوانِيَّاتُ الصَّدْر**

جِنْسٌ مِنَ الخَنافس .

Cylindrothorax melanocephala **أُسْطُوانِيَّةُ الصَّدْر سَوداءُ الرَّأس**

خنفساء منفطة أفريقية تفرز مادة كانثاريدين (Cantharidin) .

cylindruria **بِيلَةُ الأسْطوانات**

هو وجود أسطوانات أنبوبية في البول .

cylite **سيليت**

هو برُوميد البِنْزيل .

انظر تحت benzyl bromide .

cyllosis **حَنَفُ القَدَم**

أي تشوه مشابه في القدم أو في الساق .

انظر تحت clubfoot .

cyllosoma **أَحْنَفُ الجَسَد (مسخ)**

هو جنين مصاب باندحاق (تبارز الأمعاء من البطن) بطني وحشي سفلي ، وغياب أو نقص نمو الطرف السفلي في جهة الاندحاق .

cyllosomus **أَحْنَفُ الجَسَد (مسخ)**

انظر تحت cyllosoma .

cymarine **سيمارين**

cymarose **سيماروز**

هو سكر نادر ، تركيبه الكيميائي 2 ، 6 ديوكسي -3- ميثيل ألدوهكسوز (2,6، deoxy -3- methoxyaldohexose) ، والذي ينتج عن حلمهة عدد من غليكوزيدات الستروفانثين وهو دواء مقو للقلب .

cymba **زَورَقَة**

بنية تشريحية بشكل الزورق .

cymba conchae auriculae **زَورَقَةُ مَحارَةِ الأُذُن**

الجزء العلويّ من محارة الأذن .

cymbiform **زَورَقِيُّ الشَّكل**

شكله يشبه الزورق .

cymbo- **سابقة بمعنى الزَّوْرَق**

سابقة تعطي معنى شكل الزورق .

cyno- **سابقة بمعنى الكلب**

سابقة تعطي معنى العلاقة مع الكلب ، أو ما يشبه الكلب .

cynocephalic **كلبيُّ الرَّأس (مسخ)**

له رأس يشبه رأس الكلب .

cynocephalus **استِكلابُ الرَّأس**

هي الحالة المسخية التي يحدث فيها أن يكون للجنين المسخ رأس يشبه رأس الكلب .

Cynocephalus **المَيمون**

هو جنس ُنسْناس مَنْ فَصيلَة القُرْدوحيَّات .

cynocephaly **استِكلابَ الرَّأسَ**

هي الحالة المسخية التي يحدث فيها أن يكون للجنين المسخ رأس يشبه رأس الكلب .

Cynodon **سينودون**

جنس من الأعشاب من فصيلة النجليات (Gramineae) . والذي يسبب طلع بعض أنواعها حمى الكلأ .

cynodont **النَّاب**

انظر تحت canine tooth .

cynodontism **استِنْيَابٌ**

كون الأسنان ذات جذور طويلة وتاج لبي صغير .

cynolyssa **داءُ الكلَب**

انظر تحت rabies .

cynomolgus **الرُبَّاح**

هو جنسٌ مِنَ النَّسانيس .

انظر تحت Macaca cynomolgus .

Cynomyia **ذُبابُ الكَلَب**

هو جنس من ذبابة الخومع التي تضع بيوضها على اللحم المتفسخ ، وفي الجروح .

Cynomys **القِميس**

هو كلب البراري ، وهو جنس من فصيلة السكرريدا (Sciuridae) ، والتي تحمل بعض أنواعه براغيث ناقلة للطاعون .

cynophobia **رُهابُ الكِلاب**

هو الخوف غير العقلاني من الكلاب .

Cynopithecidae **القَرْدوحيَّات**

cymbocephalia **تَزوَرُق الرَّأس**

انظر تحت scaphocephaly .

cymbocephalic **مُزوَرق الرَّأس**

انظر تحت scaphocephalic .

cymbocephalous **مُزوَرق الرَّأس**

انظر تحت scaphocephalic

cymbocephaly **تَزوَرُق الرَّأس**

انظر تحت scaphocephaly .

Cymbopogon **سمبوبوجون**

هو جنس من الأعشاب التي توجد في المناطق الدافئة من أوربا وأفريقيا وآسيا . بعض أنواعها يستخدم كمعطر ومصدر لزيت الإذخر (Citronella) .

cyme **سَنَمَة**

شكل من الأزهار ، والذي يتألف من عنقود من الأزهار مسطحة القمة .

cymene **سيمين**

cymograph **مِخْطاطُ التَّمَوُّج**

انظر تحت kymograph .

cyn- **سابقة بمعنى الكلب**

cynanche **خُناقيَّة**

هو التهاب الحلق .

انظر تحت sore throat .

cynanche maligna خُناقيَّةٌ خَبيثَة

cynanche tonsillaris خُناقيَّةٌ لَوزيَّة

cynanthropy **تَوهُّمُ الاستِكلاب**

هو وهام يعتبر الشخص في سياقه نفسه كلباً ، أو يتصرف مثل الكلب .

cynapin **سينابين**

هو قلواني سام .

cynara **حَرْشَف**

هو جنس نبات من الفصيلة المركبة .

cynarase **سيناراز (إنزيم)**

cynic **1ـ نابيّ**

2ـ كلبي

هي بمعنى تَكْشيرَةٌ سَرْدونيَّة .

انظر تحت risus sardonicus .

خواص مضادة للكولينات ومهدئة . يستخدم كمضاد للهيستامين لتخفيف أعراض الأرجية ، وكمضاد للحكة لتخفيف الحكة المرافقة للعديد من الأمراض الجلدية . يعطى عن طريق الفم .

cyproquinate **سَيبْرُوكِينات**

هو كابح للأكريات ، والذي يستعمل عند الدواجن .

cyproterone acetate **أسيتات سَيبْرُوتيرُون**

ستيرويد صناعي مضاد للأندروجين يستعمل في علاج الاضطرابات الجنسية عند الذكور .

Cyriax's syndrome **متلازمة سيرياكس**

[متلازمة منسوبة للجراح إدوارد ف سيرياكس (Edward F.Cyriax) ، وهو جراح عظام *بريطاني ، عاش في بداية القرن العشرين]* ، هو ألم صدري عصبي المنشأ .

انظر تحت syndrome .

cyrto- **سابقة بمعنى الانحناء**

سابقة تشير إلى معنى الانثناء أو الانحناء .

cyrtograph **مخطاط انحناءات الصَّدْر**

cyrtometer **مقياس الانحناءات**

Cyrtophorida **المحتبَّات**

هي رُتْبَةٌ من الْمُهَدَّبات .

cyrtosis **1ـ الحُدابُ**

2ـ تحدُّبُ العظام

1ـ الحداب .

انظر تحت kyphosis .

2ـ تشوه العظام .

cyst **كيسة (ج: كيسات)**

1 ـ المثانة ، أو بنية في الجسم بشكل كيس .

2ـ تجويف مغلق شاذ في الجسم ، مبطن بالظهارة وممتلئ بمادة سائلة أو شبه صلبة .

3ـ مرحلة في حياة طفيليات معينة يكون فيها الطفيلي مغلفاً بجدار واق .

انظر تحت hydatid cyst .

انظر تحت multiolcular cyst .

انظر تحت pseudocyst .

adventitious cyst **كيسةٌ غلافِيَّةٌ برَّانيَّة**

cynorexia **الجوعُ الكَلْبيُّ**

هو النُّهام .

انظر تحت bulimia .

cyogenic **مُسَبِبٌ للحَمْل**

Cyon's experiment, nerve **تجربة سيون ، عصب**

[هي تجربة أو عصب منسوب للعالم إيلي دي سيون (Elie de Cyon) ، وهو عالم فيزيولوجيا *روسي ، عاش ما بين 1842-1912]* .

انظر تحت experiment .

انظر تحت nerve .

cyophoria **حَمْل**

انظر تحت pregnancy .

cyophoric **حَمْلِيّ**

cyopin **سَيُوبين**

مادة زرقاء في القيح .

cyotrophy **اغتِذاءُ الجَنين**

Cyperus **السُّعْدَة**

هو جنس نباتات من فصيلة النجيليات (Cyperaceae) ، وهي برديات أو قصبات شبيهة بالعشب ، وجذور أحد أنواعها له فوائد طبية .

cypho- **سابقة بمعنى الحُداب**

سابقة بنفس معنى حداب (-Kypho) .

cypionate **سَيبْيُونات**

التسمية المعتمدة من قبل الولايات المتحدة (USAN) لمركب سيكلوبنتا نيبروبيونات (Cyclopentanepropionate) ، وهو دواء مُبَنِّج .

cypothrin **سَيبُوترين**

هو داوء مُضادٌّ للدِّيدان في الطِّبِّ البَيطَري .

cyprazepam **سَيبْرازيبام**

هو دَواءٌ مُهَدِّىء .

Cypressus **السَّرْو**

هو نَباتٌ من الصَّنَوبَرِيَّات .

cyprinin **سِيبْرينين**

هي مادة سامة تشتق من لقح الشبوط

cyproheptadine **سِيبْرُوهيبْتادين**

هو مناهض للسيروتونين والهيستامين ، له

هي كيسة مملوءة بالسائل تقع بين طبقات السحايا الرقيقة ، مبطنة بغشاء عنكبوتي ، يغلب أن تحدث في شق سيلفيوس ؛ تسمى أيضاً كيسَةُ السَّحايا الرَّقيقَة (Leptomeningeal cyst)

كيسةٌ عَصيديَّة **atheromatous cyst**

هي كيسةٌ بَشْرَويَّة .

انظر تحت epidermal cyst .

كيسةٌ بيكر **Baker's cyst**

هو تورم يحدث خلف الركبة ، وينتج عن تسرب السائل الزليلي الذي يتجمع ضمن كيس غشائي ؛ وذلك في حالة الْتهابُ الجراب المَأبضيّ (Popliteal bursitis) ؛ والكيسة الزَليلية فيَ الحَيز المَأبضي .

كيسة بارثولين **Bartholin's cyst**

هي كيسة مملوءة بالموسين ، والتي تنتج عن انسداد قناة الغدة الدهليزية الكبيرة (غدة بارثولين) .

كيسةٌ صَفْراويَّة **bile cyst**

كيسات بليسَيغ **Blessig's cysts**

هي أحياز كيسية كثيراً ما تظهر في محيط الشبكية قرب الحاشية المشرشرة دون أن يكون لها تأثير مهم على الإبصار ؛ تسمى أيضاً جوبات بليسيج (Blessig's lacunae) ، أو أحياز بليسيج (Blessig's spaces) ، أو تنكس كيساني (Cystoid degeneration) ، أو كيسات إيفانوف (Iwanoff's cysts) .

كيسةٌ دَمَويَّة **blood cyst**

كيسةٌ زَرْقاءُ السَّائل **blue dome cyst**

هي كيسة احتباسية حميدة تظهر في الثدي ، وتحتوي على سائل تبني اللون ، وتبدي لوناً أزرقاً عندما لا تكون الكيسة ممزقة .

انظر تحت fibrocystic disease of breast .

كيسةٌ عَظْميَّة **bone cyst**

هي آفة داخل العظم منفذة للأشعة وغير مبطنة بنسيج ظهاري ، ولا تعتبر كيسة حقيقية .

كيسةُ بوايَر **Boyer's cyst**

هو تضخم تدريجي غير مؤلم في الجراب تحت

انظر تحت pseudocyst .

كيسةٌ سقائيَّة **allantoic cyst**

هي كيَسَةٌ مُرَيطائيَّة .

انظر تحت urachal cyst .

كيسَةٌ سنْخيَّة **alveolar cyst**

هو توسَع الأسناخ الرئوية ، والتي قد تلتحم من خلال تحطم الحواجز التي تفصل بينها لتشكل أكياساً هوائية (قيلات رئوية) كبيرة .

كيسةٌ عُداريَّةٌ سنْخيَّة **alveolar hydatid cyst**

هي كيسَة عدَاريَة تتشكل من يرقات الدودة الشريطية المُشوكَةُ العَديدَةُ المَساكن .

انظر تحت alveolar hydatid disease .

كيسَةٌ سنْخيَّةٌ سنِّيَّة **alveolodental cyst**

هي كيَسةَ من مَنشأ سني في العظم السنخي .

كيسَةٌ سَلَويَّة **amnionic cyst**

هي نتوءآت شبيهة بالأكياس تحتوي على سائل سلوي تنتج عن التصاق الطيات السلوية .

كيسَةٌ عَظْميَّةٌ أُمْدَمِيَّةُ الشَّكْل **aneurysmal bone cyst**

هي آفة حالّة للعظم سريعة النمو حميدة تحدث عادة في فترة الطفولة أو المراهقة ؛ قد تكون آفة أولية أو ثانوية تنتج عن آفة سابقة الوجود . والتي تتسم بمسافات كيسية كبيرة غالباً مملوءة بالدم ومبطنة بحواجز عظمية أو ليفية تحتوي على خلايا عظمانية ، وخلايا عملاقة متعددة النوى .

كيسَةٌ أَروميَّةٌ وعائيَّة **angioblastic cyst**

هو نشوبَ لنَسيجَ اللحمة المتوسطة الذي يتمتع بالقدرة على تكوين الدم في جنين ما .

كيسَةٌ غاريَّة **antral cyst**

هي كيسَة مخاطية حميدة في الجيب الفكي العلوي .

كيسَةٌ قِمِّيَّة **apical cyst**

هي كَيسة مبطنة بنسيج ظهاري تتوضع عند قمة سن فاقدة للب .

كيسَةٌ سَكْتيَّة **apoplectic cyst**

كيسَةٌ عَنْكَبوتيَّة **arachnoid cyst**

اللامي .

كيسَةُ الفَلْح الخَيْشُومِيِّ **branchial cleft cyst**

هي كيسة تَنشأ في الجَهة الوحشية من العنق من البقايا الظهارية للفلح الخيشومي ، عادة بين القوسين الخيشوميتين الثانية والثالثة . تسمى أيضاً كيسة عنقية لمفية ظهارية (Cervical lymphoepithelial cyst) ، أو كيسة لمفية ظهارية (Lymphoepithelial cyst) .

كيسَةٌ خَيْشُومِيَّة **branchial cyst**

هي كيسَةُ الفَلْح الخَيْشُومِيِّ .

انظر تحت branchial cleft cyst .

كيسَةٌ خَيْشُومِيَّة **branchiogenic cyst**

هي كيسَةُ الفَلْح الخَيْشُومِيِّ .

انظر تحت branchial cleft cyst .

كيسَةٌ خَيْشُومِيَّة **branchiogenous cyst**

هي كيسَةُ الفَلْح الخَيْشُومِيِّ .

انظر تحت branchial cleft cyst .

كيسَةٌ قَصَبِيَّة **bronchial cyst**

هي كيسَةٌ قَصَبِيَّةُ المَنْشَأ .

انظر تحت bronchogenic cyst .

كيسَةٌ قَصَبِيَّةُ المَنْشَأ **bronchogenic cyst**

هي كيسةَ خلقية كروية تنشأ من تبرعم شاذ أثناء تكون الشجرة الرغامية القصبية ؛ والتي تتواجد عادة في المنصف ، أو في الرئة وتكون مبطنة ببشرة قصبية يمكن أن تضم عناصر إفرازية . قد تحتوي على الهواء ، وإذا كانت متصلة بالرغامى أو بإحدى القصبتين فقد تقوم بشكل دوري بإفراغ محتوياتها السائلة في مجرى الهواء مما يسبب هجمات من القذف الغزير للبلغم . تؤدي إصابة هذه الكيسة بالعدوى إلى تشكل خراج منصفي أو خراج رئوي . يسمى أيضاً كيسة قصبية (Bronchial cyst) .

كيسَةٌ قَصَبِيَّةٌ رِئَوِيَّة **bronchopulmonary cyst**

هي كيسةَ قصَبيَةَ توجد في الرئة .

كيسَةٌ جرابِيَّة **bursal cyst**

هي كيَسةَ تنشأ من جراب مصلي .

كيسَةٌ زُبْدِيَّة **butter cyst**

كيسة مكونات السن المتكلسة **calcifying odontogenic cyst**

هو ورم حميد بطيء النمو يحدث إما في الفك السفلي أو في اللثة ، ويتنوع ما بين أن يكون صلباً أو طرياً وكيسياً ؛ يحتوي مركزه على طبقة تشبه الشبكة النجمية مع خلايا شبحية بعضها يبدي تكلساً حثلياً . تسمى أيضاً كيسة جوراين (Gorlin's cyst) .



كيسية عظمية أنورزمية الشكل
Aneurysmal bone cyst

كيسَةٌ رَقَبِيَّة **cervical cyst**

هي كيسَة في العنق . مثل الكيسَةُ الخيشومية ، والكيسة الدَرَقِيَّةُ اللسانيَّة .

انظر تحت branchial cyst .

انظر تحت thyroglossal cyst .

كيسة عنقية لمفية ظهارية **cervical lymphoepithelial cyst**

هي كيسَةٌ خَيْشُومِيَّة .

انظر تحت branchial cyst .

هي كيسة مبيضية تتكون من تجمع مصلي ينتج عن جسم أصفر .

كيسةٌ قحفيَّةٌ شدْقيَّة **craniobuccal cyst**

هي كَيسةَ راتكه .

انظر تحت Rathke's cysts .

كيسةُ القَناة القحفيَّة البُلْعوميَّة **craniopharyngeal duct cyst**

هيَ كَيَسَة راتكه .

انظر تحت Rathke's cysts .

كيسةٌ جلْديَّة **cutaneous cyst**

هي كيَّسةٌ جُلَيْديَّة .

انظر تحت cuticular cyst .

كيْسةٌ جُلَيْديَّة **cuticular cyst**

كَيسةٌ بنْت **daughter cyst**

هي كَيسة طفيلية صغيرة تنمو من جدار كيسة أكبر حجماً ، كما في حالة الكيسة العدارية للدودة الشريطية المشوكة الحبيبية ؛ تسمى أيضاً كيسة ثانوية (Secondary cyst) .

كيسةٌ سنِّيَّة **dental cyst**

هي كيَسة تنشأ من أحد أجزاء المركب المكون للسن .

كيسةٌ حاويةٌ على السِّن **dentigerous cyst**

هي كيسَة من كيسات مكونات السن ممتلئة بالسائل تحيط بتاج سن غير بازغة ، عادة ما تصيب تيجان الأسنان الطبيعية الدائمة .

كيسةٌ جلْدانيَّة **dermoid cyst**

1 ـ كيَسةَ بشروية تكون موجودة عادة منذ الولادة ، وتمثل خللاً في النمو الجنيني ، وتحدث عادة على طول خطوط الالتحام الجنيني ، بما فيها مواضع الفلح ، والفلح منصف السطح البطناني ، والفلح الخيشومي ، وغالباً ما تصيب الرأس ، وبخاصة حول العينين والعنق ، وتكون مبطنة بظهارة حرشفية مطبقة الخلايا ، والتي تشتمل على لواحق جلدية ، بما فيها الشعر .

2 ـ ورم مسخي حميد في المبيض يصيب عادة النساء الشابات ، ويفترض أنه ينشأ من تمايز أدمي ظاهري لخلايا شاملة الوسع ، وتكون

كيسةٌ شُوكُولاتيَّة **chocolate cyst**

هي كيسة محتوياتها غامقة شرابية تتكون من تجمع الهيموسيديرين في أعقاب نزيف موضعي ، كما يحدث أحياناً بعد استئصال الثدي ، أو في المبيض في سياق الانْتباذُ البطانيُّ الرحميُّ المَبيضيّ . تسمى أيضاً كيسة بَطانيَة رحمَية (Endometrial cyst) ، وكذلك كيسة سامبسون (Sampson's cyst) .

كيسَةُ قَناة الصَّفْراء **choledochal cyst**

هو توسعَ كيسي خلقي للقناة الصفراوية المشتركة ، قد يسبب ألماً في الربعية العلوية اليمنى ، ويرقان وحمى وقيء ، أو قد يكون عديم الأعراض .

كيسَةُ قَناة الصَّفْراء **choledochus cyst**

هو توسعَ في النهاية السفلية للقناة الصفراوية المشتركة ، والذي يتم اكتشافه عادة أثناء الطفولة .

كيسَةٌ كَيلوسيَّة **chyle cyst**

هو كيس شاذ في المساريق يحتوي على الكيلوس .

كيسَةٌ ظهاريَّةٌ مُهَدَّبَة **ciliated epithelial cyst**

هي كيَسة مَبطنة بظهارة مهدبة .

كيسةٌ غَرَوانيَّة **colloid cyst**

هي كيسة تحتوي على مادة هلامية ، وبخاصة في البطين الثالث .

كيسةٌ مُركَّبَة **compound cyst**

هي كيسة متعددة المساكن .

انظر تحت multilocular cyst .

كيسَةٌ خلْقيَّةٌ أمامَ الأُذُن **congential preauricular cyst**

هي كيسة تنتج عن التحام معيب للأقواس الخيشومية أثناء تشكل صيوان الأذن ، وتتصل بوهدة أذنية عند السطح .

انظر تحت congenital preaucular fistula .

كيسَةٌ مُلْتَحميَّة **conjunctival cyst**

كيسَةٌ تاجيَّة **coronal cyst**

كيسَةُ الجِسْمِ الأَصْفَر **corpus luteum cyst**

انظر تحت enteric cyst .

كيسةٌ بطانيَّةٌ عَصَبيَّة **ependymal cyst**

هو توسعَ متحدد في أحد أجزاء البطانة العصبية .

كيسةٌ بَشْرَوِيَّة **epidermal cyst**

هي كيسة حميدة تنشأ من بشرة أو ظهارة جريب الشعرة ، وتتكون من انغمادات كيسية للظهارة ضمن الأدمة ، والتي تمتلئ بالكيراتين المختلط بكميات متفاوتة من البقايا الغنية بالدهن . والنوعان الرئيسيان لهذه الكيسة هما الكيسة البشروية المشتملة (Epidermal inclusion cyst) والكيسة الشعرية (Pilar cyst) ، ومن الأشكال الأخرى الأقل شيوعاً كل من الكيسة الجلدانية والورَمٌ الكيسيٌّ الدُّهْنيٌّ المُتَعَدِّد . تسمى أيضاً كيسة بشرانيَة (Epidermoid cyst) ، وكيسة زهمية (Sebaceous cyst) وكيسة بشروية (Wen) .

كيسةٌ بَشْرَوِيَّةٌ مُشْتَمَلَة **epidermal inclusion cyst**

هي كيسة بشروية متحركة محددة بشكل واضح تحدث في الرأس أو العنق أو الجذع ، وتتكون من ظهارة حرشفية متقرنة مع طبقة حبيبية ، مشابهة للظهارة الطبيعية للمخروط الشرياني الجريبي .

انظر تحت pilar cyst .

كيسةٌ بَشرَانيَّة **epidermoid cyst**

1 ـ كيسة بشروية .

2 ـ ورم حميد يحدث من انغماد عناصر بشروية ، وبخاصة عند انغلاق التَّلَمُ العَصَبيّ ، ويتوضع في القحف أو السحايا أو الدماغ . قد تنمو بشكل تدريجي بسبب تراكم البقايا المتوسفة وقد تصبح متكلسة ؛ تسمى أيضاً ورم بشراني (Epidermoid tumor) ، أو (Epidermoidoma) .

انظر تحت ihtracranial cholesteatoma .

كيسةٌ البَرْبَخ **epididymis cyst**

كيسةٌ ظهاريَّة **epithelial cyst**

الكيسة مبطنة بما يبدو أنه جلد ، والبنى الملحقة المرافقة له ، وتكون مملوءة بشكل نموذجي بمادة زهمية جبنية ، ويتواجد فيها شعر حقيقي . تسمى أيضاً الورم المسخي الكيسي الحميد (Benign cyctic teratoma) ، أو الورم المسخي الكيسي (Cystic teratoma) ، أو الورم المسخي الناضج (Mature teratoma) .

انظر تحت malignant teratoma .

كيسةٌ نَمَائيَّة **developmental cyst**

هي كيسة تنشأ نتيجة نمو شاذ للأنسجة المحيطة .

كيسةٌ تَوَسُّعيَّة **dilatation cyst**

هي كيسة تنشأ من توسع تجويف مسبق الوجود .

كيسَةٌ تَمَدُّديَّة **distention cyst**

هو تجمع لسائل مائي ضمن تجويف طبيعي متمدد .

كيسَةٌ مضاعفة **duplication cyst**

كيسَةٌ مُشْوِكَة **echinococcus cyst**

هي الكيسَةُ العُداريَّة .

انظر تحت hydatid cyst .

كيسَةٌ بطانيَّةٌ رَحميَّة **endometrial cyst**

1 ـ كَيسَة شوكَولاتية تحدث بوجه خاص في المبيض ، وتحتوي على حطام دموي وبطانة رحمية .

2 ـ ورم بطاني رحمي .

انظر تحت endometrioma .

كيسَةٌ بطانيَّةٌ رَحميَّة **endometriotic cyst**

انظر تحت endometrial cyst .

كيسَةٌ بطانيَّة **endothelial cyst**

هي كَيسَة تتكون من كيس ذي غلاف داخلي بطاني .

كيسَةٌ معَويَّة **enteric cyst**

هي كَيسَة في الأمعاء تنشأ أو تنمو من طية أو جيبة على طول السبيل المعوي . تسمى أيضاً ورم كيسي معوي (Enterocyst) ، (Enterocystoma) .

كيسَةٌ معَويَّة **enterogenous cyst**

هو ورم مهبلي كيسي حميد ينمو من بقايا قناة جارتنر ، أو الكلوة الموسطة الجنينية ، أو مركب قناة وولف .

كيسَةٌ جارتْنَريَّة **Gartner's cyst**

انظر تحت gartnerian cyst .

كيسَةٌ غازيَّة **gas cyst**

هي كيسَة صغيرة ممتلئة بغاز من مصدر جرثومي .

كيسَةٌ لِثَوِيَّة **gingival cyst**

هي كَيْسَة من كيسات مكونات السن ، والتي تنمو في النسيج الرخو للثة الحرة أو الملتصقة على السواء ، وتتظاهر بشكل تورم صغير واضح الحدود غير مؤلم ، يشبه أحياناً السليلة المخاطية السطحية .

كيساتٌ غُدِّيَّةٌ تكاثُريَّة **glandular proliferous cysts**

كيسَةٌ فكيَّةٌ عُلْويَّةٌ كُرَويَّة **globulomaxillary cyst**

هي كيسَة اشتمالية تنمو في عظم الفك العلوي ، وتتوضع في الشق الكروي الفكي العلوي عادة بين الرباعية (القاطعة الوحشية) والناب ، ونادراً ما تتظاهر لها بأية أعراض إكلينيكية .

كيسَةٌ كُبَيبيَّة **glomerular cyst**

كيسة جورَلين **Gorlin's cyst**

هي كيسة مكونات السن المتكلسة .

انظر تحت calcifying odontogenic cyst .

كيسَةٌ حَفيدَة **grand-daughter cyst**

هي كيسة تشاهد أحياناً داخل كيسة بنت .

كيسَةُ شَعْر **hairy cyst**

كيسَةٌ نَزْفيَّة **hemorrhagic cyst**

هي كيسَة عظمية بسيطة .

انظر تحت simple bone cyst .

كيسَةٌ كَبديَّة **hepatic cyst**

كيسة فمَوَيَة معوية معدية مغايرة التوضع **heterotopic oral gastrointestinal cyst**

1 ـ أية كيسة مبطنة بظهارة حرشفية مطبقة متقرنة ، يغلب أن تتواجد في الجلد ، وتشمل الكيسات البشروية والشعرية والجلدانية ، والدخينات والأورام الدهنية .

2 ـ كيسة بشروية .

كيسَةٌ مَبَاضيَّة **epoophoral cyst**

كيسَةٌ بُزوغيَّة **eruption cyst**

هو كيسَة حاوية على السن ، والتي تتظاهر بشكل توسع في الحيز الجريبي حول تاج السن اللبنية أو الدائمة الآخذة في البزوغ عند الأطفال ، وتنتج عن تراكم السوائل النسيجية أو الدم .

كيسة مريئية مضاعفة **esophageal duplication cyst**

هي تكون كيسي ، يوجد عند الأطفال عادة ، يتكون من تضاعف جزء من المريء الصدري .

كيسَةٌ تَسَرُّبيَّة **extravasation cyst**

هي كيسةَ عظمية بسيطة .

انظر تحت simple bone cyst .

كيسَةٌ نَضْحيَّة **exudation cyst**

هي كيسة تَتكون نتيجة تجمع نضحة في تجويف مغلق .

كيسَةٌ كاذِبَة **false cyst**

انظر تحت pseudocyst .

كيسَةٌ خَمَليَّة **fimbrial cyst**

كيسَةٌ شَقِّيَّة **fissural cyst**

هي كيسة اشتمالية .

انظر تحت inclusion cyst .

كيسَةٌ جُرَيبيَّة **follicular cyst**

1 ـ هي كَيسة تحدث نتيجة انسداد قناة جريب أو غدة صغيرة .

2 ـ كيسة تتكون بسبب تضخم جريب نتيجة تراكم الرشحة .

كيسَةٌ عُقْديَّة **ganglionic cyst**

هي كيسةَ تحت الغضروف .

انظر تحت subchondral cyst .

كيسَةٌ جارتْنَرِيَّة **gartnerian cyst**

تضاعف للمعى ، أو كيسة احتباسية تشكل في أحيان نادرة مصدراً لانسداد داخلي المنشأ عند الأطفال حديثي الولادة .

كيساتٌ داخلَ النُّخاميَّة **intrapituitary cysts**

هي كيسة راتكه .

انظر تحت Rathke's cysts .

كيسةٌ أوبيَّة **involution cyst**

انظر تحت mammary duct ectasia .

كيساتُ إيفانوف **Iwanof's cysts**

هي كيساتُ بليسينج .

انظر تحت Blessing's cysts .

كيسةٌ مُتَقَرِّنَة **keratinizing cyst**

هي أية كيسة تحتوي على مادة متقرنة .

انظر تحت Epithelial cyst .

كيسةٌ مُتَقَرِّنَة **keratinous cyst**

انظر تحت keratinizing cyst .

كيسة كليشتات **Klestadt's cyst**

هي كيسةٌ أنْفِيَّةٌ سِنْخِيَّة .

انظر تحت nasoalveolar cyst .

كيسةٌ لَبَنِيَّة **lacteal cyst**

هي كيسة في الثدي تنتج عن انسداد قناة ناقلة للبن ؛ تسمى أيضاً كيسة اللبن (Milk cyst) .

كيسَةٌ حَنْجَرِيَّة **laryngeal cyst**

كيسةُ دَواعِمِ السِّنِّ الجَانِبيَّة **lateral periodontal cyst**

هي كيسة في غشاء دواعم الأسنان الوحشي لسن بازغة ، يحدث عادة في منطقة الضواحك من الفك السفلي .

كيسةُ السَّحايا الرَّقيقَة **leptomeningeal cyst**

هي كيسةٌ عَنْكَبوتِيَّة .

انظر تحت arachnoid cyst .

كيسةٌ لُوتينيَّة **lutein cyst**

هي كيسة في المبيض تنمو من الجسم الأصفر .

كيسة لمفية ظهارية **lymphoepithelial cyst**

هي كيسةٌ خَيْشُومِيَّة .

انظر تحت branchial cyst .

كيسةُ الفَكِّ السُّفْليّ **mandibular cyst**

هي كيسة مبطنة بمخاطية معدية أو معوية إلا أنها تتواجد في التجويف الفموي ، عادة على اللسان أو قاع الفم أو في العنق أو بالقرب من الغدة تحت الفكية .

كيسَةٌ نَقيريَّة **hilar cyst**

كيسَةٌ عُدارِيَّة **hydatid cyst**

هي المرحلة الكيسية اليرقانية من حياة الديدان الشريطية المشوكة عديدة المساكن ، والمشوكة الحبيبية ، والتي تحتوي على كيسات بنات ، والتي تحتوي كل منها بدورها على العديد من الروائس ؛ تسمى أيضاً كيسَةٌ مُشْوِكَة (Echinococcus cyst) .

انظر تحت uniocular hydatid disese .

كيسةٌ انْغِراسيَّة **implantation cyst**

هي كيسَةٌ بَشْرَوِيَّةٌ مُشْتَمِلَة .

انظر تحت epidermal inclusion cyst .

كيسَةُ النَّفَقِ القاطعي **incisive canal cyst**

هي كيسَةُ الفَكِّ العُلْوِيِّ النَّاصِفَةُ الأماميَّة .

انظر تحت median anterior maxillary cyst .

كيسَةٌ اشْتِماليَّة **inclusion cyst**

1 ـ كيسة تتكون من انغماد جزء صغير من الظهارة ، أو نسيج الطبقة المتوسطة ضمن النسيج الضام على طول أحد خطوط التحام النواتئ الجنينية ؛ من أنواعها التي تتواجد في المنطقة الفموية كل من الكيسة الحنكية الناصفة ، وكيسة الفك العلوي الناصفة الأمامية ، والكيسة الكروية الفكية العلوية ، والكيسة الأنفية السنخية . تسمى أيضاً كيسة شقية (Fissural cyst) .

2 ـ كيسةٌ بَشْرَوِيَّةٌ مُشْتَمِلَة .

انظر تحت epidermal inclusion cyst .

كيسَةٌ داخلَ القِحْف **intracranial cyst**

الكيساتُ داخلَ الظِّهاريَّة **intraepithelial cysts**

هي تجاويف مستديرة أو بيضوية في ظهارة الحالب ، أو المثانة ، أو الإحليل ، والتي تحتوي على مادة غروانية متميزة .

كيساتٌ داخلِ التجويف **intraluminal cysts**

انظر تحت appendix testis .

انظر تحت Appendices vesiculosae epoo-phori .

كيسةٌ أُمّ **mother cyst**

هي كيسة تشتمل بداخلها على كيسات أخرى ، كما في المرحلة الكيسية للدودة المشوكة الحبيبية .

كيسةٌ مُوسينيَّة **mucinous cyst**

كيسةٌ مُخاطيَّة **mucous cyst**

هي كيسة احتباسية تحتوي على مخاط .

كيسة احتباسية مخاطية **mucus retention cyst**

هي كيسة احتباسية تحتوي على المخاط ، والتي تنتج عن انسداد قناة إحدى الغدد اللعابية ، تبدو بشكل عقيدة صغيرة على المخاطية الفموية ؛ تسمى أيضاً سليلة مخاطية (Mucocele) .

انظر تحت mucuc extravasation phenomenon .

كيسةٌ متعدِّدةُ المَساكن **multilocular cyst**

1ـ كيسة تتكونَ من عدد من الأحياز أو المساكن .

2ـ كيسة عدارية ذات تجاويف صغيرة متعددة غير منتظمة يمكن أن تحتوي على روائس إلا أن محتواها غالباً ما يكون القليل من السائل ؛ وهي تميل إلى أن تتضخم عن طريق التبرعم بحكم احتوائها على جليدة هيالينية ناقصة التطور ، كما في المشوكة عديدة المساكن .

انظر تحت alveolar carcinoma .

3ـ كيسة ثخينة الجدران في الكلية ، تتواجد على شكل عناقيد ، وعادة ما تكون وحيد الجانب . تحتوي عند الأطفال على مأرمة ، وقد تتطور لتصبح ورم ويلمز . الأنواع التي تصيب البالغين منها تحتوي على نسبة أكبر من النسيج الليفي من الأنواع التي تصيب الأطفال .

كيسةٌ مُخاطانيّة **myxoid cyst**

هي آفة عقدية تقع عادة فوق مفصل وحشي بين سلاميات الأصبع في الناحية الظهرانية الجانبية

هي كيسة في الفك السفلي .

كيسةُ الفَكِّ العُلْويِّ **maxillary cyst**

هي كيسة في الفك العلوي .

كيسَةُ الفَكِّ العُلْويِّ النَّاصفَةُ الأماميَّة **median anterior maxillary cyst**

هي كَيسة اشتمالية تنمو في عظم الفك العلوي ، وتتوضع عند أو بالقرب من النفق القاطعي ، تنشأ من تكاثر البقايا الظهارية للقناة الأنفية الحنكية . تسمى أيضاً كيسَةُ النَّفَق القاطعي (Incisive canal cyst) ، أو كيسَةُ القَنَاة الأنْفيَّةُ الحَنكيَّة (Nasopalatine duct cyst) .

كيسَةُ الفَكِّ السُّفْليِّ النَّاصفة **median mandibular cyst**

هي كَيسة اشتمالية نادرة تحدث في الخط الناصف للفك السفلي ، يعتقد أنها تنتج عن انغماد الظهارة التي تكون محتبسة داخل التَّلَمُ المَرْكَزيّ لناتئ الفك السفلي ، أو من تنكس كيسي لبرعم سن زائدة .

كيسَةُ الفَكِّ العُلْويِّ النَّاصفَة **median maxillary cyst**

هي كَيسَةَ تقع على الخط الناصف للفك العلوي .

كيسَةٌ حَنَكيَّةٌ ناصفَة **median palatal cyst**

هي كيسَة اشتمَالية تقع على الخط الناصف للحنك الصلب بين النواتئ الحنكية الوحشية .

كيسَةٌ مَيبُوميَّة **meibomian cyst**

انظر تحت chalazion .

كيسَةٌ مَساريقيَّة **mesenteric cys**

هي كيسة خَلقية رقيقة الجدران في البطن بين ورقات المساريق ، قد يعود منشؤها إلى قناة وولف أو إلى منشأ قناة لمفية ؛ وفي حال تضخمها قد تسبب ألماً مغصياً وانسداداً معوياً .

كيسَةٌ لَبَنيَّة **milk cyst**

انظر تحَت lacteal cyst .

كيسَةٌ مُورْجانيَّة **morgagnian cyst**

هي زائدَةُ الخُصْيَة أو الزَّوائدُ الحُوَيصَليَّةُ المَبَاضيَّة .

أو الظهـرانيـة الإنسيــة ، وتتكـون من التنكس البـؤري الموســيني لكـولاجين الأدمــة ؛ وهي ليست بالكيسة الحقيقية ، بحكم افتقارها إلى جدار ظهاري ، ولا تتصل بالحيز الزليلي المجاور لها . تسمى أيضاً كيسة زليلية (Synovial cyst) ، أو عقدة زليلية (Synovial ganglion) .

كِيْسَاتُ نابوت **nabothian cysts**

هي جُرَيبات نابُوت .

انظر تحت Naboth's follicles .

كيساتُ نابوت **Naboth's cysts**

هي جُرَيبات نابُوت .

انظر تحت Naboth's follicles .

كيسَةٌ أَنْفيَّةٌ سِنْخيَّة **nasoalveolar cyst**

هي كيسَةُ الفَكِّ العُلْويِّ النَّاصفَةُ الأماميَّة .

انظر تحت median anterior maxillary cyst .

كيسَةٌ أَنْفيَّةٌ شَفَويَّة **nasolabial cyst**

هي كيسَة نمائيَة تتكون من النسيج الرخو للطية الأنفية الشفوية .

كيسَةُ القَنَاة الأَنْفيَّة الحَنَكيَّة **nasopalatine duct cyst**

هي كيسة تنشأ من البقايا الظهارية للمجرى الأنفي الحنكي .

كيسَةٌ أَنْفيَّةٌ بلْعوميَّة **nasopharyngeal cyst**

كيسَةٌ نَخَريَّة **necrotic cyst**

هي كيسةَ تحتوي على مادة نخرية .

كيسةٌ وَرَميَّة **neoplastic cyst**

كيسَةٌ عَصَبيَّة **neural cyst**

هي كيسة أو بنية شبيهة بالكيسة تظهر في الجهاز العصبي المركزي ، على شكل كيسة رغوية أو كيسةٌ دماغيَّةٌ مَساميَّة .

كيسَةٌ عَصَبيَّةٌ معَويَّة **neurenteric cyst**

هي كيسةَ تظهَر في الناحية الخلفية من المنصف وتحتوي على نسيج من الجهاز العصبي وأعضاء أخرى ، وتتصل بالأم الجافية النخاعية .

كيسَةٌ وَحْمانيَّة **nevoid cyst**

هي كيسة شاذة ذات جدران وعائية .

كيسَةٌ لاسِنِّيَّة **nonodontogenic cyst**



Morgagnian cyst كيسة مورجانية

كيسَةُ مُكَوِّنات السِّن **odontogenic cyst**

هي كيسة تنشَأ من الظهارة ، وعادة ما تحتوي مادة سائلة أو شبه سائلة ، وتنمو في مراحل مختلفة من تخلق السن . وتكون جميع كيسات مكونات السن تقريباً مشتملة داخل العظم . ومن أنواعها المحددة كل من الكيسَةُ البَدْئيَّة وكيسة دواعم السن والكيسة اللثوية .

كيسَةٌ زَيتيَّة **oil cyst**

هي كيسَة تحتوي مادة زيتية ، بسبب التنكس الدهني للبطانة الظهارية .

كيساتٌ ثَرْبيَّة **omental cysts**

هي كيسات مشابهة من جميع النواحي للكيسات المساريقية باستثناء كونها تقتصر على الثرب .

كيسَةٌ مَبيضيَّة **oophoritic cyst**

هي كيسة تَظهر على المبيض المخصوص .

كيسَةٌ احْتباسيَّةٌ فَمَويَّة **oral retention cyst**

كيساتٌ عُداريَّةٌ عَظْميَّة **osseous hydatid cysts**

هي كيساتَ عدارية تَتشكل من يرقات الشائكة الحبيبية ، وتنمو في العظم الذي قد يضعف ويتآكل نتيجة النمو المفرط للكيسات .

كيسَةٌ مَبيضيَّة **ovarian cyst**

كيسَةٌ حَنَكيَّة **palatal cyst**

كيسة فيَ الحنك .

كيسَةٌ بَنْكرِياسيَّة **pancreatic cyst**

هي كيسَةَ احتباسية تظهر على القناة البنكرياسية ؛ تسمى أيضاً ضُفَيدعَةٌ بَنْكرِياسيَّة

تجمع حميد لسائل صاف ، دائماً ما يقع مباشرة إلى جوار التأمور ؛ وينبغي تفريق مثل هذه الكيسات عن الأورام المنصفية الأكثر خطورة .

perineurial cyst **كيسة ظهارة الحزمة العصبية**

هو تجيب خارجي في الحيز المحيط بالحزمة العصبية في الجزء خارج الجافية من جذور الأعصاب العجزية أو العصعصية عند نقطة التقاء الجذر مع العقدة ؛ قد تتسبب في ألم أسفل الظهر ، وعرق النسا .

periodontal cyst **كيسَةُ دَوَاعِم السِّن**

هي كيسة تظهر في الرباط الداعم للسن والبنى المجاورة له ، عادة عند قمة السن (كيسة قمية) ، إلا أنها يمكن أن تحدث أحياناً على طول السطوح الجانبية للأسنان (كيسة دواعم الأسنان الجانبية) .

perirenal cyst **كيسَةٌ مُحيطَةٌ بالكُلْيَة**

pilar cyst **كيسَةٌ شَعْرِيَّة**

هي كيسة بشروية تظهر عادة على شكل عقيدة تحت بشروية ، صلبة ذات حدود واضحة ، غالباً تتواجد على فروة الرأس ، وتتكون من جدار خارجي من بشرة متقرنة دون طبقة حبيبية ، وتكون مشابهة للبشرة العادية لجريب الشعرة عند القناة الزهمية أو بجانبها . تسمى أيضاً كيسة زهمية (sebacious cyst) ، أو كيسة شعرية (Trichilemmal cyst) .

انظر تحت epidermal inclusion cyst .

proliferating trichilemmal cyst **كيسة شعرية تكاثرية**

انظر تحت tumor .

piliferous cyst **كيسَةٌ شَعْرِيَّة**

هو الجيبَ الشعري .

انظر تحت pilonidal sinus .

pilonidal cyst **كيسَةٌ شَعْرِيَّة**

هو الجيبَ الشعري .

انظر تحت pilonidal sinus .

placental cyst **كيسَةٌ مَشيميَّة**

هي كيسة قرصية بيضاء رمادية تظهر على (Pancreatic ranula) .

انظر تحت pancreatic pseudocyst .

paradental cyst **كيسَةُ دَوَاعِم السِّن**

انظر تحت periodontal cyst .

paraesophageal cyst **كيسَةٌ مُجاوِرَةٌ للمَرِيء**

paranephric cyst **كيسَةٌ مُجاوِرَةٌ للكُلْيَة**

هي كيسة في النسيج الدهني المجاور للكلية .

parapyelitic cyst **كيسَةٌ مُجاوِرَةٌ للحُوَيضَة**

هي كيسات مُجاورَةٌ للحُوَيض .

انظر تحت parapyelitic cysts .

parapyelitic cysts **كيساتٌ مُجاوِرَةٌ للحُوَيضَة**

هي كيسات خلقية ظاهرياً غير معروفة المنشأ تظهر في جيب الكلية ، بشكل عناقيد صغيرة عادة ، وتسبب انضغاطاً حوضياً وتشوهاً موضعياً ، مع ألم وبيلة دموية وعدوى وبيلة قيحية .

parasitic cyst **كيسَةٌ طُفَيلِيَّة**

هي كيسة تتشكل من يرقة الطفيلي ، من مثل الكيسة العدارية .

paratracheal cyst **كيسَةٌ مُجاوِرَةٌ للرُّغامَى**

parent cyst **كيسَةٌ أُمّ**

انظر تحت mother cyst .

paroophoritic cyst **كيسَةٌ مَبَاضِيَّة**

هي كيسة تظهر في المباض .

parovarian cyst **كيسَةٌ مَبَاضِيَّة**

هي كيسة تظهر في المباض .

pearl cyst **كيسَةٌ لُؤْلُؤِيَّة**

هي كيسة أو كتلة صلبة من نسيج ظهاري في القزحية تحدث نتيجة انغراس هدب أو قطن أو جسم أجنبي (غريب) آخر .

periapical cyst **كيسَةٌ مُحيطَةٌ بالقِمَّة**

هي كيسة من كيسات دواعم السن تظهر حول قمة سن بازغة ، غالباً نتيجة عدوى تصل من خلال حجرة اللب وقناة الجذر انطلاقاً من إصابة نخرية تصيب السن . تسمى أيضاً كيسَةٌ جَذْرِيَّة (Radicular cyst) .

pericardial cyst **كيسَةٌ تَأْمُورِيَّة**

البلعومي . تسمى أيضاً كيسَات قحفيَّةٌ شدْقيَّة (Craniobuccal cysts) ، وكيسَات قحْفيَّة بُلْعَوميَّة (Craniopharyngeal cysts) .

كيسةٌ مَضاعفة **reduplication cyst**

كيسةٌ كُلْويَّة **renal cyst**

كيسةٌ مُتبقِّيَة **residual cyst**

هي كيسة من كيسات دواعم الأسنان ، والتي تتبقى بعد خلع السن أو تنمو بعد خلع السن .

كيسةٌ احْتباسيَّة **retention cyst**

هي كيسة تحدث نتيجة انسداد القناة المفرغة لغدة ما بحيث تحتبس مفرغات الغدة ؛ تسمى أيضاً كيسَةٌ إفْرازيَّة (Secretory cyst) .

كيسةٌ خَلْفَ الصِّفَاق **retroperitoneal cyst**

كيسةٌ جَذْريَّة **root cyst**

انظر تحت radicular cyst .

كيسةٌ عَجُزيَّة **sacral cyst**

كيسةٌ عَجُزيَّةٌ عُصْعُصيَّة **sacrococcygeal cyst**

هو الجيبَ الشعري .

انظر تحت pilonidal sinus .

كيسةٌ سامبسون **Sampson's cyst**

هي كيسَةٌ شُوكُولاتيَّة .

انظر تحت chocolate cyst .

كيسةٌ دَمَويَّة **sanguineous cyst**

كيسات المُتَكيِّسَات العَضَلَيَّة **sarcosporidian cysts**

هي كيْسَةٌ عَضَليَّة .

انظر تحت sarcocyst .

كيسةٌ زُهْميَّة **sebaceous cyst**

1 ـ كيسةَ بشروية .

انظر تحت epidermal cyst .

2 ـ كيسةٌ شَعْريَّة .

انظر تحت pilar cyst .

كيسةٌ ثانَويَّة **secondary cyst**

هي كيسَةَ بنت .

انظر تحت daughter cyst .

كيسةٌ إفْرازيَّة **secretory cyst**

هي كَيسةَ احتباسية .

المشيمة ، وتنتج عن تنكس خلايا الأرومة الغازية .

كيسَةٌ دماغيَّةٌ مَساميَّة **porencephalic cyst**

هي كَيسَة تظهرَ في مادة الدماغ في سياق تنخرب الدماغ .

كيسَةٌ بَدْئيَّة **primordial cyst**

شكل غَير شائع نسبياً من أشكال كيسة مكونات السن ، والتي تنمو نتيجة تنكس كيسي ، وانحلال النسيج الشبكي النجمي في عضو الميناء قبل تكون أي ميناء أو عاج متكلسين . تنشأ مثل تلك الكيسات من أسنان زائدة وتتواجد عوضاً عن سن بديل على أن تكون مصاحبة لسن موجودة .

كيسَةٌ تكاثُريَّة **proliferous cyst**

كيسَةٌ موسيَنيَّةٌ كاذبَة **pseudomucinous cyst**

هي كيسة مَوسينيةَ .

انظر تحت mucinous cyst .

كيسات المُتَكيِّسَات العَضَليَّة **psorospermal cysts**

انظر تحت sarcosporidian cysts .

كيسَةٌ كَأْسيَّةٌ حُويَضيَّة **pyelocalyceal cyst**

هو الرتْجُ الكَأسيّ .

انظر تحت calyceal diverticulum .

كيسَةٌ حُويَضيَّةٌ كُلْويَّة **pyelogenic renal cyst**

هو الرتْجُ الكَأسيّ .

انظر تحت calyceal diverticulum .

كيسَةٌ جَذْريَّة **radicular cyst**

هي كيسةَ قمية .

انظر تحت periapical cyst .

كيسَةٌ جَذْريَّةٌ سِنِّيَّة **radiculodental cyst**

هي كيسة قمية .

انظر تحت periapical cyst .

كيساتُ راتْكه **Rathke's cysts**

هي مجموَعات من الخلايا الظهارية ، والتي تشكل كيسات صغيرة مملوءة بمادة غروانية في الجزء المتوسط من الغدة النخامية ؛ وهي آثار من جيبة راتكه ، وتشبه كثيراً الورم القحفي

كيسة تحت لسان المزمار **subepiglottic cyst**
هي كيسة خلقية في المخاطية تحت لسان المزمار عند الحصان ، والتي تترافق عادة بصرير تنفسي .

كيسَةٌ تَحْتَ اللِّسَان **sublingual cyst**
هو كيس ضفدعي .
انظر تحت ranula .

كيسَةٌ تَحْتَ الزَّلِيْل **subsynovial cyst**
كيسة تحدث نتيجة تراكم سائل زليلي ، أو سائل التهابي تحت الزليل .

كيسَةٌ فَوقَ السَّرْج **suprasellar cyst**
هو وَرَمٌ قِحْفِيٌّ بُلْعومي .
انظر تحتَ craniopharyngioma .

كيسَةٌ زَليليَّة **synovial cyst**
هي كيسَة مخاطانية .
انظر تحت myxoid cyst .

كيسة تارلوف **Tarlov cyst**
هي كيسة ظهارة الحزمة العصبية .
انظر تحت perineurial cyst .

كيسَةٌ قَطرَانيَّة **tarry cyst**
1 ـ كيسَةَ من كيسات الجسم الأصفر ، والتي تحدث نتيجة نزف في جسم أصفر .
2 ـ كيسة دموية تنتج عن انتباذ بطاني رحمي .

كيسَةٌ جَفْنيَّة **tarsal cyst**
انظر تحتَ chalazion .

كيسَةٌ جِلْدانيَّةٌ مَسْخيَّة **teratodermoid cyst**
هي كيَسَةٌ جَلْدانيَّة .
انظر تحت chalazion .

كيسَةٌ قِرابيَّة **thecal cyst**
هو تمَدَدَ غمد الوتر .

كيسَةٌ قِرابيَّةٌ لُوتينيَّة **theca-lutein cyst**
هي كَيسَة مبيَضية تكون فيه الخلايا المبطنة للتجويف الكيسي خلايا قِرابيَّةٌ لُوتينيَّة .

كيساتٌ توتيَّة **thymic cysts**
هي كيسات نادرة وحيدة المسكن ، أو متعددة المساكن على المنصف العلوي الأمامي ، والتي تحتوي نسيجاً يشبه نسيج التوتة ؛ وتكون خلقية

انظر تحت retention cyst .

كيسَةٌ مَنَويَّة **seminal cyst**
هي كيسَة تحتوي على المني .

كيسَةٌ احْتِجَازيَّة **sequestration cyst**

كيسَةٌ مَصْلَيَّة **serous cyst**
هي كيسةَ تحتوي على سائل رقيق أو مصل .

كيسة عظمية بسيطة **simple bone cyst**
هي آفة عظمية وحيدة المسكن كيسية عديمة الأعراض ، غالباً تظهر في العظام الأنبوبية الطويلة عند الأطفال والمراهقين ؛ وتكون جوفاء أو ممتلئة بالسائل ، وتفتقر إلى بطانة ظهارية ، ولا تخترق القشرة أو تمتد إلى النسج الرخوة . ولا يوجد اتفاق حول منشئها ، إلا أنه يعتقد أنها تحدث كآفة ثانوية تتبع تشكل ورم دموي رضي . تسمى أيضاً كيسَةٌ عَظْميَّةٌ مُفْرَدَةُ الغُرْفَة (Unicameral bone cyst) .

كيسَةٌ صابونيَّة (في الثَّدْي) **soap cyst**

كيسَةٌ رَغَويَّة **soapsuds cyst**
هي كيسات تظهر على القشرة المخية في سياق داء المستخفيات .

كيسَةٌ عَظْميَّةٌ مُفْرَدَة **solitary bone cyst**
هي كيسةَ عظمية بسيطة .
انظر تحت simple bone cyst .

كيسَةُ الحَبْلِ المَنَوي **spermatic cord cyst**

كيسَةٌ تَأمُوريَّة **springwater cyst**
انظر تحت pericardial cyst .

كيسَةٌ عَقيمَة **sterile cyst**
هي كيسة عدارية حقيقية تفشل في إنتاج محافظ الحضن ؛ تسمى أيضاً كيسة خالية من الرؤوس (Acephalocyst) .

كيسَةٌ تَنْبيهيَّة **stimulatory cyst**

كيسَةٌ تَحْتَ الغُضْروف **subchondral cyst**
هي كيسة عظمية في المشاشة الملتحمة تحت الصفيحة المفصلية ، تكون مبطنة بغشاء (يحتمل أن يكون من زليل معدل) يحتوي على مادةٍ موسينية . تسمى أيضاً كيسَةٌ عُقْديَّة (Ganglionic cyst) .

هو شكل من أشكال التمدد الكيسي والذي يصيب المريطاء ؛ يسمى أيضاً كيسَةٌ سقائيَّة (Allanotic cyst) .

كيسةٌ بَوليَّة **urinary cyst**

هي كيسَة تحتوي على البول .

كيسةٌ مُحيَّة **vitelline cyst**

كيسةٌ مُحيَّةٌ معَويَّة **vitellointestinal cyst**

هي ورم كيَسي في السرة ، ينتج عن بقاء جزء من الحبل السري ؛ ويسمى أيضاً كيسةٌ سُريَّة .

كيسةٌ وُولفيَّة **Wolffian cyst**

هي كيسةَ من مخلفات قناة وولف (قَناةُ الكُلْوَة الجَنينيَّة المُوسَّطَة) .

1ـ سابقة بمعنى المثانة **cyst-**

2ـ سابقة بمعنى الكِيْسَة

1ـ سابقة بمعنى كيسة .

2ـ سابقة بمعنى مثانة .

سَرَطانَة غدِيَّة كيسِيَّة **cystadenocarcinoma**

هي سرطانة غدية تتميز بتجاويف كيسية ذات بطانة ورمية ؛ والتي تحدث عادة في المبيضين إلا أنها يمكن أن تظهر في مواضع أخرى مثل الزائدة أو البنكرياس أو الغدة الدرقية .

سَرَطانَةٌ غُديَّة كيسيَّة موسينية **mucinous cystadenocarcinoma**

هي سَرَطانَةٌ غُديَّةٌ كيسيَّة موسينية كاذبة .

انظر تحت pseudomucinous cystadenocarcinoma .

سَرَطانَةٌ غُديَّة كيسيَّة حليمية **papillary cystadenocarcinoma**

هي سَرَطانَةٌ غُديَّةٌ كيسيَّة تتميز ببروزات حليمية تمتد في التجاويف الكَيسية ، عادة ما تظهر في المبيض .

سَرَطانَةٌ غُديَّة كيسيَّة كاذبة **pseudomucinous cystadenocarcinoma**

هي سَرَطانَةٌ غُديَّةٌ كيسيَّة تُنتج فيها الكتل الكيسية المبطنة بالظهارة سَائلاً لَزجاً هلامياً غنياً بالبروتين السكري ؛ عادة ما تظهر في المبيض ، وغالباً ما تكون حميدة .

المنشأ .

كيسَةٌ دَرَقيَّةٌ لسانيَّة **thyroglossal cyst**

هي كيسَة في العنق تنتج إما عن بقاء جزء من القناة الدرقية اللسانية ، أو عن عدم انغلاقها .

كيسَةٌ دَرَقيَّةٌ لسانيَّة **thyrolingual cyst**

هي كيسَة في العنق تنتج إما عن بقاء جزء من القناة الدرقية اللسانية ، أو عن عدم انغلاقها .

كيسة نسيجية **tissue cyst**

انظر تحت pseudocyst .

كيسَةُ تورنفالدت **Tornwaldt's cyst**

هو الجرابُ البُلْعومي .

انظر تحت bursa pharyngea .

كيسَةٌ عَظْميَّةٌ رَضْحيَّة **traumatic bone cyst**

هي كيسةَ عظمية بَسيطة .

انظر تحت simple bone cyst .

كيسَةٌ شَعْريَّة **trichilemmal cyst**

انظر تحت pilar cyst .

كيسَةٌ حَقيقيَّة **true cyst**

هي أية كيسَة لا تكون بنية طبيعية ، ولا تنتج عن توسع ممر أو تجويف .

كيسَةٌ نُبَيبيَّة **tubular cyst**

انظر تحت tubulocyst .

كيسَةٌ سُريَّة **umbilical cyst**

هي كيسَةٌ مُحيَّةٌ معَويَّة .

انظر تحت vitellointestinal cyst .

كيسَةٌ عَظْميَّةٌ مفرَدَةُ الغُرْفَة **unicameral bone cyst**

هي كيسة عظمية بسيطة .

انظر تحت simple bone cyst .

كيسَةٌ وَحيدَةُ الغُرْفَة **unicameral cyst**

هي كيسَةٌ وَحيدَةُ المَسْكَن .

انظر تحت unilocular cyst .

كيسَةٌ وَحيدَةُ المَسْكَن **unilocular cyst**

هي كيسة تحتوي على تجويف واحد فقط ، وذلك بخلاف كيسة متعددة المساكن (Multilocular cyst) .

كيسَةٌ مُرَيطائيَّة **urachal cyst**

1 ـ أي ورم يبدي أنماطاً كيسية وحليمية في نفس الوقت .

2 ـ شكل من أشكال الورم الغدي تكون عنيباته متمددة بفعل السوائل أو بفعل انتباتات نسيجية . يسمى أيضاً ورم غدي كيسي حليمي (Papillary cystic adinoma) .

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كيسيٌّ حُلَيميٌّ لِمْفي **papillary cystadenoma lymphomatosum**

هي لَمفومة غدَية .

انظر تحت adenolymphoma .

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كيسيٌّ حُلَيميٌّ في الدَرقية **papillary cystadenoma of thyroid**

هو ورم حميد يصيب الغدة الدرقية ، والذي يتميز بحليمات متفرعة وتجاويف كيسية ؛ وقد يكون مرحلة مبكرة من السرطانة الحليمية .

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كيسيٌّ موسيني كاذِب **pseudomucinous cystadenoma**

هو وَرَمٌ غُدِّيٌّ كيسيٌّ موسينيٌّ ، اكتسب تسمية كاذب لأنه كان يعتَقد أنه ممتَلئ بموسين كاذب .

انظر تحت mucinous cystadenoma .

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كيسيٌّ مَصْلِيٌّ **serous cystadenoma**

هو ورم كيسي يظهَر في المبيض ، والذي يحتوي سائلاً رقيقاً رائقاً أصفر مصلياً وكميات متفاوتة من نسيج صلب ، وتكون قابليته للتحول إلى الخباثة أعلى بمرات عديدة من قابلية الخباثة للورم الغدي الكيسي الموسيني .

ساركومة غديَّة كِيْسيَّة **cystadenosarcoma**

سيستاجون **Cystagon**

علامة تجارية لأحد مستحضرات سيستيامين بيطرطرات (Cysteamine bitartrate) .

وَجَعُ المثانة **cystalgia**

مصطلح يشري إلى وجود ألم في المثانة ؛ يسمى أيضاً (Cystodynia) .

انقِلابُ المثانة **cystanastrophe**

سيستَاتيُونَاز (إنزيم) **cystathionase**

انظر تحت cystathionnine g-lyase .

سيستَاتيُونين **cystathionine**

سَرَطانَةٌ غُدِّيَّةٌ كيسيَّة مصلية **serous cystadenocarcinoma**

تكونَ فيها التجاويف الورمية الكيسية المبطنة بالظهارة ممتلئة عادة بسائل مصلي ؛ عادة ما تظهر في المبيض ، ويمكن أن تتميز ببروزات حليمية أو كتل أو ثخانات في جدار التجويف .

وَرَمٌ غَديٌ لِيفِيٌ كيسِيٌّ **cystadenofibroma**

وَرَمٌ غَديٌ كيسِيٌّ **cystadenoma**

هو ورم غدي يتميز بكتل كيسية مبطنة بالظهارة ، والتي تحتوي على مواد إفرازية عادة ما تكون مصلية أو موسينية ؛ عادة ما تظهر في المبيض أو الغدد اللعابية أو البنكرياس .

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كيسيٌّ مفترز **apocrine cystadenoma**

هي كَيسَةٌ احْتِباسيَّةٌ عَرَقيَّة .

انظر تحت hidrocystoma .

ورم القناة الصفراوية الغدي الكيسي **bile duct cystadenoma**

هو ورم كيسي متعدد المساكن ضخم يظهر في الكبد ، في الفص الأيمن عادة ، ويمتلئ بسائل رائق أو غائم .

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كيسيٌّ مينائيٌّ **cystadenoma adamantinum**

هو وَرَمٌ أرُومِيٌّ مينائيٌّ .

انظر تحت ameloblastoma .

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كيسيٌّ هُلامِيٌّ **gelatinous cystadenoma**

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كيسيٌّ موسينيٌّ **mucinous cystadenoma**

هو وَرَم متعدد المساكن ينتج عن خلايا المبيض الظهارية ، ويحتوي على تجاويف ممتلئة بالموسين ؛ الغالبية العظمى من هذه الأورام تكون حميدة .

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كيسيٌّ مُخاطيٌّ **mucous cystadenoma**

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كيسيٌّ حُلَيميٌّ **papillary cystadenoma**

2 ـ وجود فائض من السيستاثيونين في البول .

ضُمورُ المَثانة **cystatrophia**

هو ضمور يصيب المثانة .

التِهابُ عُنُقِ المَثانة **cystauchenitis**

هو التهاب يحدث في عنق المثانة .

بَضْعُ عُنُقِ المَثانة **cystauchenotomy**

هو البضع الجراحي لعنق المثانة .

تَوَسُّعُ المَثانة **cystauxe**

سيستيامين **cysteamine**

هو بيتا ـ ميركابتو إثيل أمين .

انظر تحت b-mercaptoethylamine .

سيستيامين بيطرطات **cysteamine bitartrate**

هو ملح الهيدروكلوريد من السيستيامين ، والذي يستعمل في الوقاية من اعْتلالُ عَضَلَة القَلْب النَّاجمُ عن اعْتلال الكُلْيَة ، ويعطى فموياً .

توسيعُ عُنُقِ المَثانة **cystectasia**

هو إحداث شق في الجزء الغشائي من الحالب لتوسيع عنق المثانة بهدف استخراج الحصيات .

توسيعُ عُنُقِ المَثانة **cystectasy**

انظر تحت cystectasia .

1 ـ استِئْصالُ المَثانة **cystectomy**

2 ـ استِئْصالُ الكيسَةِ

1 ـ استئصال كيسة ما .

2 ـ قطع المثانة .

استِئْصَالُ المَثانَة الجُزْئيُّ **partial cystectomy**

استِئْصَالُ المَثانَة الجَذْريُّ **radical cystectomy**

هو علاج جراحي لسرطان المثانة الغزوي ، والذي يتم بإزالة المثانة مع غلافها الصفاقي ، والجزء السفلي من الحوالب والعقد اللمفية الحوضية والأعضاء والبنيات المجاورة . توازي هذه العملية عند الإناث عملية اجْتثاثُ أَحْشاء الحَوض الأَماميَّة (Anterior pelvic exenteration) أما عند الرَجال ، فيتم فيها أيضاً إزالة البروستاتة والحويصلات المنوية والأسهر الحوضي وأمبولة الأسهر ، وفي بعض الأحيان

هو مركب ثيو ـ أيثر غير متناظر من الهوموسيتئين والسيرين ، والذي يعمل كوسيط في نقل ذرة الكبريت من الميثيونين إلى السيستئين .

سيستاثيونين **cystathionine**

بيتا ـ سينثاز **β-synthase**

هو إنزيم من صنف اللياز ، والذي يحفز تكثف كل من السيرين والهوموسيستئين لتكوين السيستاثيونين كخطوة في استقلاب الميثيونين . وهو بروتين بيريدكسال ـ فسفات ، يتواجد في كبد الثدييات .

عوز سيستاثيونين بيتا ـ سينثاز **cystathionine β-synthase deficiency**

اعتلال حمضيني كروموسومي جسدي متنح يتميز ببيلة هوموسيستينية مصحوبة بفَرْطُ ميثيونين الدم . تتظاهر الأعراض الإكلينيكية بشكل رئيسي في العين والأجهزة العصبية والعضلية الهيكلية والوعائية ؛ وأكثر المظاهر الإكلينيكية شيوعاً هي انتباذ العدسة ، وتخلخل العظم ، والتخلف العقلي والخثار . كان المرض يسمى في المؤلفات القديمة بيلة الهوموسيستين (Homocystinuria) .

سيستاثيونين جاما ـ لياز **cystathionine γ-lyase**

إنزيم من صنف اللياز ، والذي يحفز انشطار السيستاثيونين إلى سيستئين وألفا ـ كيتوجلوتاريت ، وأمونيا كخطوة في عملية استقلاب الميثيونين . وهو بروتين بيريدكسال ـ فسفات . ويتم التفاعل في الكبد . وينتج عن عوز هذا الإنزيم ، وهي خلة جسمية (جسدية) متنحية ، حدوث بيلَةُ السِّيسْتاثيُونين . يسمى أيضاً جاما ـ سيستاثَيوناز (g-cystathionase) .

بيلَةُ السيسْتاثيُونين **cystathioninuria**

1 ـ اعتلال حمضيني كروموسومي جسدي متنح يتميز بوجود فائض من السيستاثيونين في البول وأنسجة الجسم دون أن يترافق بأعراض إكلينيكية ؛ ويحدث نتيجة عوز إنزيم سيستاثيونين جاما ـ لياز .

الجلدية .

ببتيداز سيستئين **cysteine**
الداخلي **endopeptidase**

أي إنزيم من مجموعة إنزيمات الببتيداز الداخلية التي تحتوي في موقعها النشط على أثر للسيستئين فعال في التحفيز . تضم هذه الزمرة كلاً من البابائين والعديد من إنزيمات الكاتبسين . يسمى أيضاً ببتيداز الثيول الداخلي .

كربوكسي ببتيداز **cysteine-type**
من النمط السيستئين **carboxypeptidase**

1 ـ أي إنزيم من مجموعة إنزيمات الببتيداز الخارجية ، والذي يشتمل على أثر من السيستئين في موقعه النشط ، ويحفز الانشطار المعتمد على الثيول لارتباط ببتيد انتهائي أو قبل النهائي عند النهاية الطرافية الكربونية لببتيد أو لعديد ببتيد .

2 ـ كربوكسي ببتيداز جسيم حال واسع النوعية إلا انه لا يؤثر على بقايا آثار البرولين عند جزء من الإحليل أو كامل الإحليل .

اسْتِئْصالُ المَثانَةِ البَسيط **simple cystectomy**

حمضَ السيستيئيك **cysteic acid**


هو وسيط يتكون من أكسدة زمرة الثيول في السيستئين إلى زمرة كبريتية وطليعة التورين .

سِيستئين **cysteine**

1 ـ هو مركب اسمه الكيميائي حمض .
2 ـ أمينو .
3 ـ مركابتوبروبانويك 3 - (2-amino mercaptopropanoic acid) وهو حمض أميني غير أساسي يحتوي على الكبريت يتكون من خلال الحلمهة الإنزيمية أو الحمضية للبروتينات . يمكن بسهولة أن يتأكسد ليتحول إلى سيستين ، يظهر أحياناً في البول وله خواص مزيلة للسمية محدودة . رمزه (Cys) أو (C) .
انظر تحت amino acid .

هيدروكلوريد **cysteine**
سيستئين **hydrochloide**

مركب يوصف أحياناً لعلاج القرحات



Radical Cystectomy **استئصال المثانة الجذري**

العديد من الحيوانات بشكل كيسات تتواجد في العضلات المخططة ، ولا تسبب أية أعراض ضائرة (تسمى أيضاً حصبة البقر أو حصبة الغنم أو حصبة الخنازير) . يمكن أن يصاب البشر الذين يتناولون لحم الخنزير ناقص الطهو بالعدوى بالأشكال اليرقانية من الشريطية الوحيدة ، والتي تخترق جدار الأمعاء وتغزو النسج مثل النسيج تحت الجلد أو الدماغ أو العين أو العضلات أو القلب أو الكبد أو الرئة أو الصفاق . وتؤدي عدوى الدماغ إلى الإصابة بداء الكيسات المذنبة العصبي . أما البشر الذين يتناولون لحم البقر منقوصي الطهو فيكونون عرضة للإصابة بعدوى الكيسة المذنبة البقرية (الشريطية العزلاء) التي يمكن أن تنمو في الأمعاء لتصبح دودة شريطية يمكن أن يصل طولها إلى ما بين 4 و 8 أمتار .

الكيسةُ المُذَنَّبَة **Cysticercus**

هو جنس قديم من الأشكال اليرقية للديدان الشريطية من جنس الشريطية .

الكيسَةُ المُذَنَّبَةُ البَقَرِيَّة **Cysticercus bovis**

يرقة الشريطية العزلاء .

الكيسَةُ المُذَنَّبَةُ الخَلَوِيَّة **Cysticercus cellulosae**

يرقة الشريطية الوحيدة .

الكيسَةُ المُذَنَّبَةُ الغَنَمِيَّة **Cysticercus ovis**

يرقة الشريطية الغنمية .

الكيسَةُ المُذَنَّبَةُ الرَّقيقَةُ العُنُق **Cysticercus tenuicollis**

يرقة الشريطية المعذرة .

كيسَة مُذَنَّبَة **cysticercus**

(ج: كيسات مذنبة) (pl.cysticerci)

شكل يرقي من الدودة الشريطية ، يتكون من رؤويس واحد مغلف بكيسة تشبه المثانة ؛ تسمى أيضاً دودة المثانة Bladder worm .

انظر تحت hydatid cyst .

إزالةُ حصاةِ قناةِ المَرارَة **cysticolithectomy**

هي عملية إزالة حصاة من قناة المرارة .

تَهْشيمُ حَصاةِ قَناةِ المَرارَة **cysticolithotripsy**

النهاية المطرافية الكربونية .

سيستئينيل **cysteinyl**

هو جذر الأسيل من سيستئين .

تقرُّحُ المَثانة **cystelcosis**

هو إصابة المثانة بالتقرح .

كيسيُّ الرَّأس (مسخ) **cystencephalus**

هو جنين يوجد كيس غشائي عنده بدل الدماغ .

هَيُوْجِيَّةُ المَثانَة **cysterethism**

تهيج المثانة .

تَثَخُّنُ عَضَلاتِ المَثانة **cysthypersarcosis**

ثخانة الغلاف العضلي للمثانة .

cysti-

1 ـ سابقة بمعنى المثانة

2 ـ سابقة بمعنى الكِيْسَة

3 ـ سابقة بمعنى المرارة

انظر تحت cysto- .

cystic

1 ـ مَثانِيّ

2 ـ كيسِيّ

1 ـ يتعلق بكيسة .

2 ـ يتعلق بالمثانة البولية أو المرارة .

انظر تحت vesical .

الوَرَمُ الأَرُومِيُّ المِيْنائِيُّ الكِيسِي **cystic ameloblastoma**

وَرَمٌ سِنِّيٌّ كَيسِي **cystic odontoma**

هي كَيسة جَرابية مصاحبة للورم سني المنشأ

الكيسات المُذَنَّبَة **cysticerci**

(ف: كِيسَة مُذَنَّبَة) (sing.cysticercus)

هو صيغة الجمع من كِيْسَةٌ مُذَنَّبَة (Cysticercus) .

الكيسانيَّة المُذَنَّبَة **cysticercoid**

هو شكل من أشكال يرقة الدودة الشريطية المسماة بالكيسة المذنبة ، والتي تختلف بكون كيستها صغيرة وخالية من السائل ومزودة بلاحقة ذنيبة ، كما هو حال في المحرشفة (Hymenolepis) .

داءُ الكيساتِ المُذَنَّبَة **cysticercosis**

هي عدوى الكيسات المذنبة . والتي تتظاهر عند

عملية يتم فيها تحطيم حصاة في قناة المرارة .

cysticorrhaphy **رَفْوُ قناةِ المَرارة**

رفو او إصلاح قناة المرارة .

cysticotomy **بَضْعُ قناةِ المَرارة**

cystides (sing.cystis) **كيسات (ف: كيسة)**

صيغة الجمع من كيسة (Cystis)

انظر تحت cystis .

cystido- **1 ـ سابقة بمعنى المَثانة**

2 ـ سابقة بمعنى الكِيْسَة

3 ـ سابقة بمعنى المَرارَة

انظر تحت -cysto .

cystidoceliotomy **بَضْعُ المَثانةِ بطريْقِ البَطن**

انظر تحت cystidolaparotomy .

cystidolaparotomy **بَضْعُ المَثانةِ بطريْقِ البَطن**

هو بضع المثانة من خلال جدار البطن .

cystidotrachelotomy **قطعُ عُنُقِ المَثانة**

cystifellotomy **فغْرُ المَرارة**

cystiferous **مُشْتمِلة على الأكيا**

انظر تحت cystigerous .

cystiform **كيسيُّ الشَكْل**

كل ما يتخذ شكل أو مظهر الكيسة .

cystigerous **مُشْتمِلة على الأكْياس**

أي أنه يحتوي على أكياس .

cystine **سِيسْتِين**

اسمه الكيميائي 3 ، ´3 ثنائي الثيو المضاعف (3,´3dithiobis) (حمض -2 أمينوبروبانويك) .

هو حمض أميني ينتج من هضم البروتينات أو الحلمهة الحمضية للبروتينات . يتواجد في البول أحياناً وفي الكلية على شكل بلورات دقيقة مسدسة الأضلاع ، تعمل بشكل متكرر على تشكيل حصوات سيستينية في المثانة . يعد السيستئين المركب الرئيسي المحتوي على الكبريت في جزيء البروتين ويختزل بسهولة إلى جزيئين من السيستئين (ولذلك يسمى أحياناً ثنائي السيستئين) .

cystinemia **وُجودُ السِيسْتِين في الدَّم**

cystinosis **الدَّاءُ السِيسْتينِيُّ**

هو اضطراب في تخزين الأجسام الحالة ، والمتعلق بعيب جزيئي مجهول ، يتميز بترسيب واسع لبلورات السيستين في الخلايا الشبكية البطانية . توجد من هذا الداء ثلاثة أنواع إكلينيكية : الداء السيستيني المبكر ، والداء السيستيني المتأخر اليفعي ، والداء السيستيني الحميد . يسمى أيضاً داء تخزين السيستين (Cystine storage disease) ، و متلازمة ليناك ـ فانكوني (Lignac-Fanconi syndrome) .

adolescent nephrotic cystinosis **داء المراهقة الكلائي السيستيني**

هو الداء السيستيني اليفعي المتأخر .

انظر تحت late onset juvenile cystinosis .

adult nephrotic cystinosis **الداء السيستيني عند البالغين**

هو الداء السيستيني الحميد .

انظر تحت benign cystinitis .

benign cystinosis **الداء السيستيني الحميد**

هو نوع من أنواع الداء السيستيني ، والذي لا يؤثر على الكلى ، ولا يتسبب في تقصير أمد العمر ، يتسم في ترسب السيستين في نقي العظم والكريات البيض ، والقرنية . ويتم تشخيصه بالفحص العيني . يسمى أيضاً الداء السيستيني عند البالغين (Adult nephrotic cystinosis) .

early onset cystinosis **الداء السيستيني المبكر**

هو أكثر أسباب حدوث متلازمة فانكوني شيوعاً ، وهو نوع يتميز برخد مقاوم لڤيتامين D وحماض معاوض مزمن ، وبوال ، وتجفاف ، تنتج كلها عن خلل أداء النبيبات الكلوية الدانية ، وبعتامات في القرنية ، وفشل النمو ، واليوريمية والموت قبل سن العاشرة . يسمى أيضاً الداء السيستيني الكلائي الطفلي (Infantile nephrotic cystinosis) .

infantile nephrotic cystinosis **الداء السيستيني الكلائي الطفلي**

هو الداء السيستيني المبكر .

المَرارَة **cystis fellea**

هي الحـــوصلـة المرارية (Vesica biliaris) ؛ أو المرارة (Gallbladder) .

المَثانَة **cystis urinaria**

هي المثانة البولية .

انظر تحت urinary bladder .

نَزْدَمَويٌّ مَثانِيّ **cystistaxis**

هو نـزف الدم من الغـشــاء المخـاطي إلى داخل المثانة .

التِهابُ المَثانَة **cystitis**

هو التـهــاب المثــانة البــوليــة ؛ يسـمى أيضــاً (Urocystitis) .

اَلْتِهابُ المَثانَة اَلنَّزْلِيُّ الحادُّ **acute catarrhal cystitis**

هو اَلتـهـاب في المثانة ينتج عن إصـابة أو تـهيج نـاجم عـن جـــسـم أجنبي (غـــريـب) ، أو داء السـيلان ، ويتـميـز بحرقـة في المثـانة وألم في الأحليل مع تبول مؤلِم .

اَلْتِهابُ المَثانَة الأَرَجِي **allergic cystitis**

هَو التهاب فَي المثَانَة ينتج عن فرط تحسس غير اعتيادي ، ويتسم بازدياد كبير في عدد الكريات البيضاء وحيدة النوى واليوزينية في مخاطية المثـانة ، وفي المجمـوع العضلي للمثـانة ، وفي الثفالة البولية .

اَلْتِهابُ المَثانَة الجُرْثومِيُّ **bacterial cystitis**

هَو التهاب اَلمثانة نتيجَة عدوى جرثومية .

اَلْتِهابُ المَثانَة اَلخلالِيُّ المُزْمِن **chronic interstitial cystitis**

هوَ حَالة مرضَية تصيب المثانة ، والتي تحدث في الأغلب عند النسـاء وتتـألف من آفة التـهابية عند قمة المثانة عادة تـشمل كامل ثخانة الجدار ، وتتظاهر بشكـل رقعة من مـخاطيـة حمراء بنية اللون محـاطة بشبكة من الأوعيـة الشعـاعيـة . ويمكن أن تشـفى الآفـات ، التي تعـرف بـاسم قـرحـات فينويك ـ هانر (Fenwick - Hunner) ، أو قـرحــات هانر (Hunner) ، سطحــيـة . ومن المعروف أن اكتشاف هذه القرحات أمر صعب .

انظر تحت early onset cystinosis .

الداء السيستيني اليفعي المتأخر **late onset juvenile cystinosis**

هي نوع من الداء السيستيني يقع بين النوع المبكر والنوع الحـميـد ؛ تحدث في سياقه مظاهر عينية وكلوية ، إلا أن إصابة الكلية لا تؤدي بالضرورة دائمـاً إلى القـصـور الكلوي . يـسمى أيضـاً داء المراهقـة الكلائي الســيـســتـيـنـي (Adolescent nephrotic cystinosis) .

بيلَة سِيسْتينِيَّة **cystinuria**

هي حالة وراثيـة يحدث في سياقها إفراغ مفرط في البول للسيـستين ، وثلاثة أحمـاض أمينية ثنائيـة القـاعـدة هم : الليـزيـن ، والأورنيـثين ، والأرجينين ؛ وهي تنتج عن خلل النقل الكلوي في إعادة الامتصاص النبيبي لتلك الأحماض الأمينية . المظهر الإكلينيكي السائد لهـذا المرض هي تشكل الحصى البولية السيستينية .

سِيسْتِينِيُّ البِيلَة **cystinuric**

كل ما يتعلق بالبيلة السيستينية أو يتأثر بها .

نَزْفُ المَثانَة **cystirrhagia**

انظر تحت cystorrhagia .

نَزْلَة مَثانِيَّة **cystirrhea**


انظر تحت cystorrhea

كِيسَة (ج: كيسات) **cystis (pl.cystides)**

1 ـ حوصلة أو مثانة .

2 ـ كيسة .

انظر تحت cyst .



الداء السستيني **Cystinosis**

هو التهاب مزمن في المثانة يحدث عند النساء المتقدمات في السن ، ويتميز بزيادة غير عادية في عدد مرات التبول ، والتي تترافق بزحير وحرقة .

الْتهابُ المَثانَة الخُنَاقيّ **diphtheritic cystitis**

هَو التهابَ في المثَانة ، والذي يحدث نتيجة العدوى بالوتدية الخناقية ، ويتميز بتكون غشاء كاذب ؛ يسمى أيضاً الْتهابُ المَثانَة الخانوقيّ (Croupous cystitis) .

الْتهابُ المَثانة اليوزينيّ **eosinophilic cystitis**

هو التهاب في المثانة ، والذي يتميز بوجود أعداد كبيرة من اليوزينيات في الثفالة البولية .

الْتهابُ المَثانَة التَّقَشُّريّ **exfoliative cystitis**

هَو التهاب في المثانَة يحدث في سياقه تخشر لخاطية المثانة .

الْتهابُ المَثانَة الغنغرينيّ **gangrenous cystitis**

الْتهابُ المَثانَة الجُلْبَويّ **incrusted cystitis**

هَو التهاب شَديد في المثانة يتميز بترسيب أملاح فسفاتية ، أو أملاح غير عضوية أخرى على جدار المثانة المصاب بالالتهاب المزمن ، وعادة ما يحدث ذلك في مناطق التقرحات أو التحببات أو الأورام .

الْتهابُ المَثانَة التَّشْعيعيّ **irradiation cystitis**

الْتهابُ المَثانَة الميكانيكيّ **mechanical cystitis**

هَو التهابَ في المثانةَ ينتج عن تهيج ناجم عن حصاة مثانية ، أو عن معالجة ، أو عن جسم أجنبي (غريب) في المثانة .

الْتهابُ المَثانَة الشَّاملُ للجَدار **panmural cystitis**

هو التَهابُ المَثانَة الخلاليُّ المُزْمن .

انظر تحت chronic interstitial cystitis .

الْتهابُ المَثانَة التَّالي للوَضْع **postpartum cystitis**

الْتهابُ المَثانَة تَحْتَ المُخاطيَّة **submucous cystitis**

هو الْتهابُ المَثانَة الخلاليُّ المُزْمن .

انظر تحت chronic interstitial cystitis .

ويتظاهر هذا المرض في صورته النمطية بالتبول المتكرر ، والألم عند امتلاء المثانة وعند انتهاء التبول . يسمى أيضاً الْتهابُ المَثانَة الشَّاملُ للجدار (Panmural cystitis) ، والتهاب المثانة تحتَ المخاطية (Submucous cystitis) ، و تليف المثانة الشامل للجدار (Panmural fibrosis of the bladder) .

الْتهابُ المَثانَة الخانوقيّ **croupous cystitis**

هَو الْتهابُ المَثانَة بالوَتَديَّة الخُناقيَّة .

انظر تحت diphtheritic cystitis .

الْتهابُ المَثانَة التَّكَيُّسيّ **cystic cystitis**

هَو التهابَ مثانة يترافق بتكون كيسات متعددة في الطبقة تحت المخاطية من جدار المثانة .

الْتهابُ عُنُق المَثانَة **cystitis colli**

الْتهابُ المَثانَة التَّكَيُّسيّ **cystitis cystica**

انظر تحت cystic cystitis .

الْتهابُ المَثانَة النُّفاخيّ **cystitis emphysematosa**

هَو التهابَ غير شائع يصيب المثانة ، ويتميز بوجود حويصلات ممتلئة بالغاز في مخاطية المثانة وفي المجموع العضلي للمثانة .

الْتهابُ المَثانَة الجُرَيبيّ **cystitis follicularis**

هَو التهابَ في المَثانة تنتشر في سياقه في مخاطية المثانة عقيدات تحتوي جريبات لمفية .

الْتهابُ المَثانَة الغُدِّيّ **cystitis glandularis**

هَو التهاب في المثانة تحتوي في سياقه مخاطية المثانة على غدد مفرزة للموسين ، أكثر ما يشاهد في حالات الإكشاف المثاني (انقلاب المثانة للخارج) ويؤدي أحياناً إلى تنكس خبيث .

الْتهابُ المَثانَة الوَرَميُّ الحُبَيبيّ **cystitis granulomatous**

الْتهابُ المَثانَة الوَرَميُّ الحُلَيميّ **cystitis papillomatosa**

هو التَهاب في المثانة يتميز بوجود أورام حليمية على الغشاء المخاطي المصاب بالالتهاب .

الْتهابُ المَثانَة الشَّيخوخيُّ الأُنْثَويّ **cystitis senilis feminarum**

هو العمل الجراحي الذي يتم بموجبه إيجاد ممر دائم بين المثانة والقولون .

تَنْظيرٌ شُفوفِيٌّ مَثانِيّ **cystodiaphanoscopy**

هو إجراء فحص باطن المثانة ، أو تضوّء المثانة البولية باستعمال المنظار الشفوفي .

1ـ تفاغرٌ كيسيٌّ إثناعَشَري **cystoduodenostomy**

2ـ تفاغرٌ مَراريٌّ إثناعَشَري

هو النزح الداخلي لكيسة مجاورة إلى داخل الإثنا عشري .

ألمُ المَثانة **cystodynia**

انظر تحت cystalgia .

رَأبٌ مَثانيٌّ مَهْبلِي **cystoelytroplasty**

هو الإصلاح الجراحي للأذيات المهبلية المثانية .

قيلة مَثانيَّة معَويَّة **cystoenterocele**

هو فتق يشمل جزءاً من المثانة والأمعاء .

قيلة مَثانيَّة ثَرْبيَّة **cystoepiplocele**

هو فتق يشمل جزءاً من المثانة والثرب .

وَرَمٌ ظِهاريٌّ كِيْسِيّ **cystoepithelioma**

وَرَمٌ لِيفِيٌّ كيسيّ **cystofibroma**

1ـ مُفاغرَة كيسيَّة مَعِديَّة **cystogastrostomy**

2ـ مُفاغرَة مَراريَّة مَعِديَّة

هو النزح الداخلي لكيسة مجاورة إلى داخل المعدة .

تَكوُّنُ الكيسَة **cystogenesis**

هو تشكل الكيسة .

تَكوُّنُ الكِيسَة **cystogenia**

انظر تحت cystogenesis .

صُورَة المَثانَة **cystogram**

هي صورة شعاعية للمثانة .

تَصْويرُ المَثانة **cystography**

هو التصوير الشعاعي للمثانة بعد حقن العضو بمحلول ظليل .

تَصْويرُ المَثانَة الآجل **delayed cystography**

هو تصوير شعاعي تؤخذ فيه الأفلام بفواصل زمنية تمتد إلى 3 دقائق أو أكثر ، والذي يفيد في دراسة الجزر البولي .

تَصْويرُ المَثانَة الإفْراغيُّ **voiding cystography**

الْتِهابُ المَثانَة التَّقَرُّحيُّ **ulcerative cystitis**

مِبْضَعُ مِحفَظَةِ العَدَسَة **cystitome**

أداة لفتح محفظة عدسة العين ؛ تسمى أيضاً (Cibisotome) ، و (Kibisotome) .

1ـ بَضْعُ الكيسَة **cystitomy**

2ـ بَضْعُ المِحْفَظَة

هو التقسيم الجراحي لمحفظة عدسة العين .

انظر تحت capsulotomy .

1ـ سابقة بمعنى المَثانة **cysto-**

2ـ سابقة بمعنى الكِيْسَة

هي سابقة تشير إلى علاقة بكيس أو كيسة او مثانة ، وغالباً ما يستخدم في الإشارة إلى المثانة البولية . ومثله (Cysti-) .

وَرَمٌ غديٌّ كيسيّ **cystoadenoma**

انظر تحت cystadenoma .

أرومَة كيسيَّة **cystoblast**

هي طبقة الخلايا التي تبطن الجوف السلوي في المراحل المبكرة من حياة الجنين في طرف الطبقة المنغلقة .

قيلة مَثانيَّة أرْبيَّة **cystobubonocele**

سَرَطانة كيسِيَّة **cystocarcinoma**

سيستوكاليس **Cystocaulus**

جنس من الديدان المسودة (دودة مدورة) من فصيلة المسطنات (فصيلة من الديدان) ، العديد من أنواعها ديدان رئوية عند الأغنام والماعز .

قيلة مَثانيَّة **cystocele**

هو تبارز فتقي تبرز من خلاله المثانة البولية من جدار المهبل ؛ يسمى أيضاً الفتق المثاني (Cystic hernia) .

سِيستوكرُوم **cystochrome**

هو مزيج من القرمز النيلي والميثينامين (دواء مطهر بولي) ؛ والذي يستعمل عن طريق الحقن في العضل أو الحقن في الوريد في سياق اختبار وظائف الكلية .

تَنْظيرُ المَثانَة المُلوَّن **cystochromoscopy**

انظر تحت chromocystoscopy .

مُفاغرَة مَثانيَّة قولونيَّة **cystocolostomy**

انظر تحت cystolithectomy .

سِيستُولوتين **cystolutein**

هو صباغ أصفر في كيسات المبيض .

وَرَمٌ كيسيّ **cystoma**

وَرَمٌ كيسِيّ مَبيضِيّ غَرَوانِيّ **colloid ovarian cystoma**

وَرَمٌ كيسِيّ مَصْلِيٌّ بَسيط **cystoma serosum simplex**

هي كَيسة بسيطة في المبيض .

وَرَمٌ كيسِيٌّ مُخاطانيّ **myxoid cystoma**

وَرَمٌ كيسِيٌّ مَبَاضِيّ **parovarian cystoma**

هي كيسَةٌ مَبَاضيَّة .

انظر تحت parovarian cyst .

اِلْتِهابُ الوَرَمِ الكِيسِيّ **cystomatitis**

مُتعلق بالوَرَم الكيسِي **cystomatous**

كل ما يتعلق بورم كيسي ، أو يحتوي على ورم كيسي .

مِقياسُ المَثانة **cystometer**

هي أداة لقياس الآلية العصبية العضلية للمثانة البولية من خلال قياسات الضغط والسعة .

مُخَطَّطُ المَثانة **cystometrogram**

هو المخطط الذي يستحصل عليه من تخطيط المثانة .

تَخْطيطُ المَثانة **cystometrography**

هو التسجيل البياني لضغط المثانة ، وذلك البولية في مراحل مختلفة من امتلائها .

قِياسُ المَثانة **cystometry**

هو دراسة كفاءة المثانة ، وذلك باستعمال مقياس المثانة .

1 ـ مَثانِيُّ الشَّكل **cystomorphous**

2 ـ كيسِيُّ الشَّكل

لفظ يطلق على كل ما شكله يشبه الكيسة ، أو المثانة .

تَمَدُّدُ الكُلْيَةِ الكيسِيُّ **cystonephrosis**

هو تمدد الكلية ، أو تضخم الكلية كيسي الشكل .

أَلَمُ المَثانَةِ العَصَبِيُّ **cystoneuralgia**

هو إجراء تصوير شعاعي للمثانة البولية ، والذي يجرى أثناء قيام المريض بالتبول .

كِيْسِيُّ الشَّكل **cystoid**

1 ـ يشبه الكيسة .

2 ـ تجمع محدد كيسي لمادة طرية ، والذي يختلف عن الكيس الحقيقي في أنه لا يكون مغلفاً بمحفظة .

متماثلة البوائغ الكيسية **Cystoisospora**

مصطلح يطلق على جنس من الحيوانات الأوالي من الأكريات ، والذي يعدي أمعاء الكلاب والقطط ؛ كان يصنف في السابق على أنه جزء من الأيمريات متماثلة البوائغ (felis) يمكن أن تكون العدوى تحت إكلينيكية أو أن تسبب داء الأكريات بدرجة خفيفة . تعدي كل من متماثلة البوائغ الهرية (Cystoisospora) ، والمتماثلة البوائغ المنقلبة (Cystoisospora rivolta) ، فيما تعدي كل من متماثلة البوائغ البورروزية (Cystoisospora burrowsi) ، ومتماثلة البوائغ الكلبية Cystoisospora (neorivolta) ، ومتماثلة البوائغ الأوهنسية (Cystoisospora ohioensis) الكلاب .

مُفاغَرَةٌ كيسِيَّةٌ صائِمِيَّة **cystojejunostomy**

هو النزح الداخلي لكيسة مجاورة إلى داخل الصائم .

حَصاةُ المَثانة **cystolith**

هي حصاة في المثانة البولية .

اسْتِخْراجُ حَصاةِ المَثانة **cystolithectomy**

هو استخراج الحصاة البولية من خلال الشق الجراحي للمثانة البولية . وقد يستعمل هذا المصطلح خطأً للإشارة إلى استئصال حصاة مرارية من المرارة .

تَحَصِّي المَثانة **cystolithiasis**

هي عملية تكون حصوات داخل المثانة البولية .

حَصَوِيٌّ مَثانِيّ **cystolithic**

كل ما يتعلق بحصوات المثانة البولية .

اسْتِخْراجُ حَصاةِ المَثانة **cystolithotomy**

تدلي المثانة **cystoptosis**

هو تدلي جزء من الغلاف الداخلي للمثانة على الإحليل .

التهاب المثانة والحُوَيضة **cystopyelitis**

هو التهاب يشمل كلاً من المثانة البولية وحويضة الكلية .

تصوير المثانة والحُوَيضة **cystopyelography**

هو التصوير الشعاعي للمثانة البولية وحويضة الكلية .

التهابُ المثانة والحُوَيضة والكلية **cystopyelonephritis**

هو اجتماع كل من التهاب المثانة والتهاب الحويضة والكلية .

تصويرُ المثانة الشُّعاعيّ **cystoradiography**

مُفاغرة مثانيّة مُستقيميّة **cystorectostomy**

انظر تحت cystoproctostomy .

نَزْفٌ مَثانِيّ **cystorrhagia**

رَفْوُ المثانة **cystorrhaphy**

نَزْلَة مَثانِيَّة **cystorrhea**

ساركومة كيسيَّة **cystosarcoma**

هو الورم ورقي الشكل .
انظر تحت phyllodes tumor .

ساركومة كيسية ورقـيـة **cystosarcoma phyllodes**

هو الورم ورقي الشكل .
انظر تحت phyllodes tumor .

انشقاق المثانة **cystoschisis**

تصلُّبُ الكيسة **cystosclerosis**

هي كيسة يطرأ عليها تليف ، أو تصلب .

مِنْظارُ المثانة **cystoscope**

هو منظار يستخدم في الفحص البصري للمثانة .

متعلق بتنظير المثانة **cystoscopic**

كل ما يتعلق بتنظير المثانة ، أو يتم إجراؤه بواسطة منظار المثانة .

تَنْظيرُ المثانة **cystoscopy**

هو الفحص البصري المباشر للسبيل البولي

هو ألم عصبي المنشأ في المثانة .

شَلَلُ المثانة **cystoparalysis**

انظر تحت cystoplegia .

شَلَلُ المثانة **cystoparesis**

تثبيتُ المثانة **cystopexy**

هو تثبيت المثانة إلى جدار البطن في معالجة القيلة المثانية ؛ يسمى أيضاً (Vesicofixation) .

مُشتمِلة على الكيسات **cystophorous**

أي أن هيحتوي على كيسات .

تصويرُ باطِنِ المثانة **cystophotography**

هو التصوير الفوتوجرافي لباطن المثانة .

سُلُّ المثانة **cystophthisis**

رأبُ المثانة **cystoplasty**

أية عملية رأبية أو ترميمية تجرى على المثانة .
مثل : الرأب المثاني المعدي ، أو الرأب المثاني اللفائفي .

انظر تحت gastrocystoplasty .

انظر تحت Ileocystoplasty .

رَأبُ المَثانَة التَّكْبيريّ **augmentation cystoplasty**

هو تكبير المثانة عن طريق تطعيمها بقطعة تنزع من المعى (اللفائفي أو الأعور أو السيني) .

رأب المثانة السيني **sigmoid cystoplasty**

هو رأب المثانة الذي يستعمل في جزء من القولون السيني لترميم أوتكبير المثانة .

شَلَلُ المثانة **cystoplegia**

مُفاغرة مثانيَّة مُستقيميَّة **cystoproctostomy**

هو العمل الجراحي لاتصال بين المثانة البولية والمستقيم ، يسمى أيضاً(Cystorectostomy) .

استئصال المثانة والبروستاتة **cystoprostatectomy**

هو الإزالة الجراحية للمثانة البولية وغدة البروستاتة .

استئصال المثانة والبروستاتة الجذري **raidical cystoprostatectomy**

هو الاستئصال الجذري للمثانة البولية وغدة البروستاتة عند الذكور .

العاني مباشرة .

بَضْعُ عُنُقِ المثانة **cystotrachelotomy**

هو البضع الجراحي لعنق المثانة .

التِهابُ المَثانةِ والحالبَيْن **cystoureteritis**

هو التهاب يشمل المثانة البولية والحالبين .

صورة المَثانةِ والحالبَيْن **cystoureterogram**

هي صورة شعاعية للمثانة البولية والحالبين .

التِهابُ المَثانةِ والحالِبِ والحُوَيْضَة **cystourete-ropyelitis**

هو التهاب يشمل المثانة البولية والحالب وحويضة الكلية .

التِهابُ المَثانةِ والحالِبِ والحُوَيْضَةِ والكُلْيَة **cystoureterop-yelonephritis**

حالة مرضية يحدث فيها التهاب المثانة البولية والحالبين وحويضة الكلية وأهرام الكلية .

التِهابُ المَثانةِ والإحْليل **cystourethritis**

هو التهاب الإحليل والمثانة .

انظر تحت urethrocystitis .

قيلَة مَثانيَّة إحْليلِيَّة **cystourethrocele**

هو تدلي الحالب والمثانة عند الأنثى .

صورة المَثانةِ والإحْليل **cystourethrogram**

هي صورة شعاعية للمثانة البولية والإحليل .

صورَةُ المَثانَةِ والإحْليلَ الإفراغية **voiding cystourethrogram**

هي الصورة الشعاعية التي تصوير المثانة والإحليل الإفراغي (أي أثناء نفريغ البول) .

تَصويرُ المَثانةِ والإحْليل **cystourethrography**

هو التصوير الشعاعي للمثانة البولية والإحليل .

تَصْويرُ المَثانَةِ والإحْليلِ السِّلْسِليُّ **chain cystourethrography**

هو التَصَوير الشعاعي للمثانة البولية والإحليل الذي يتم فيه إدخال سلسلة معدنية عقيمة محببة إلى داخل المثانة والإحليل باستعمال قثطار معدل ؛ يستعمل في تقييم العلاقات التشريحية للمثانة البولية والإحليل .

تَصْويرُ المَثانَةِ والإِحْليلِ التَّبَوُّلِيُّ **micturating cystourethrography**

بواسطة منظار المثانة .

تَنْظيرُ المَثانَةِ الهَوائِيُّ **air cystoscopy**

تَنْظيرُ المَثانَةِ المائِيُّ **water cystoscopy**

1 ـ كيسيُّ الشَّكْل **cystose**

2 ـ مُتكيِّسٌ

كل ما يشبه الكيسة ، أو يحتوي على كيسة أو كيسات .

تَشَنُّجُ المَثانة **cystospasm**

هو تشنج عصبي يصيب المثانة .

سيستوسباز **Cystospaz**

علامة تجارية لأحد مستحضرات هيوسيامين (Hyoscyamine) .

التِهابُ الحُوَيصِلةِ المَنَويَّة **cystospermitis**

نَزْفٌ مَثانِيّ **cystostaxis**

انظر تحت cystistaxis .

كيسَة زَهَميَّة **cystosteatoma**

انظر تحت sebaceous cyst .

فَغْرُ المَثانة **cystostomy**

هو إحداث فتحة في المثانة . يسمى أيضاً (Vesicostomy) .

فغر المثانة فوق العانة **suprapubic cystostomy**

عملية يتم فيها تحويل مسار الإحليل نحو فتحة في الجلد فوق الارتفاق العاني لنزح البول من المثانة في حالة انسداد الإحليل .

فَغْرُ المَثانَةِ العَديمُ الأُنْبوب **tubeless cystostomy**

هو فغر المثانة الجلدي .

انظر تحت cutaneous vesicostomy .

1 ـ مِبْضَعُ المَثانة **cystotome**

2 ـ مِبْضَعُ محفظةِ العَدَسَة

1 ـ أداة تستخدم في بضع المثانة .

2 ـ مبضع محفظة العدسة .

انظر تحت systitome .

بَضْعُ المَثانة **cystotomy**

هو البضع الجراحي للمثانة البولية ؛ يسمى أيضاً (Vesicostomy) .

بَضْعُ المَثانَةِ فَوقَ العانَة **suprapubic cystotomy**

هو عملية قطع المثانة بإجراء بضع فوق الارتفاق

ابيضاض اللمفاويات الحاد ، والابيضاض النقوي الحاد والطور الأرومي من الابيضاض النقوي المزمن ، وابيضاض الدم الإحمراري ، واللمفومة اللاهودجكينية ، يعطى عن طريق الحقن الوريدي ، والحقن تحت الجلد ؛ كما يستعمل للوقاية من ولعلاج ابيضاض الدم السحائي ، ويعطى عن طريق الحقن داخل القراب . يسمى أيضاً (ara-C) ، وكذلك سيتوزين أرابينوزيد (Cytosine arabinoside) .

cytarme **تسطُّحُ الأرِيمَة**

هو تسطح القسيمات الأرومية المدورة في ختام التشظر .

cytase **سيتاز (إنزيم)**

cytaster **كوكب**

انظر تحت aster .

cyte **لاحقة بمعنى خلية**

لاحقة تشير إلى معنى الخلية ، بحيث يتحدد نوع الخلية المقصودة بالجذر الذي يسبق تلك اللاحقة ، كما في (Erythrocyte) تكون الخلية الحمراء ، أو (Leukocyte) الخلية البيضاء .

Cytellin **سيتلين**

علامة تجارية لأحد مستحضرات سيتوستيرول (Sitosterols) .

cythemolysis **انحِلالُ الدَّم**

انظر تحت hemolysis .

cytherean **مَنْقولٌ جِنْسِيًّا**

مرض أو أي شيء ينتقل عن طريق الممارسة الجنسية .

انظر تحت venereal .

cytheromania **غُلْمَة**

انظر تحت nymphomania .

cytidine **سيتيدين**

هو نوع من أنواع نوكليوزيد البورين ، وهو عبارة عن سيتوزين مرتبط عند موقع النتروجين N9 بكربون الموقع C1 في الريبوز . وهو أحد مكونات الحمض النووي الريبي والنوكليوتيدات الهامة في عملية تخليق عدد

هو تصوير المثانة والإحليل أثناء التبول .

تَصْويرُ المَثانَة والإحْليل بالطَّريْق الرَّاجِعَ **retrograde cystourethrography**

تَصْويرُ المَثانَة والإحْليل الإفْراغيُّ **voiding cystourethrography**

هو التصوير الشعاعي للمثانة البولية والإحليل ، والتي تؤخذ فيه صور شعاعية قبل وأثناء وبعد إفراغ البول . واختصاره (VCU) .

cystourethroscope **مِنْظارُ المَثانَةِ والإحْليل**

هي أداة لفحص المثانة البولية والإحليل الخلفي .

cystous **1 ـ كيسيُّ الشَّكل**

2 ـ مُتَكَيِّس

انظر تحت cystose .

cystil **سيستيل**

هو جذر الأسيل ثنائي التكافؤ من السيستين .

cyt- **سابقة بمعنى الخَلِيَّة**

Cytadren **سيتادرين**

علامة تجارية لأحد مستحضرات أمينو جلوتيثيميد (Aminoglutethethimide) ، وهو دواء لفرط قشر الكظر والكارسينومة .

cytapheresis **فِصادَة الكُرَيَّات**

هي فصادة كريات الدم ؛ والتي تشمل فصادة الكريات الحمراء ، وفصادة الكريات البيضاء ، وفصادة الصفيحات .

انظر تحت erythrocytapheresis .

انظر تحت leukocytapheresis .

انظر تحت thrombocytapheresis .

cytarabine **سيتارابين**

هو مضاهئ للديوكسي سيتيدين ، وصيغته سيتوزين أرابينوزيد (ara-C) ، وهو مركب ينشط استقلابياً إلى النوكليوتيد ثلاثي الفسفات (ara-CTP) ، والذي يعمل كمثبط تنافسي لإنزيم بوليمراز الدنا (DNA) ، وينتج سمية خلوية نوعية متعلقة بالطور S ؛ يستعمل كمضاد للأورام ، وذلك بشكل عام كجزء من مجموعة من أنظمة العلاج الكيميائي في علاج

سيتيديليل **cytidylyl**

هو الجذر المتشكل من نزع زمرة الهيدروكسيل (OH) من زمرة الفسفات في السيتيدين أحادي الفسفات .

الجِدارُ الخَلَويُّ **cytioderm**

انظر تحت cell wall .

سيتيزين **cytisine**

هو قلواني شديد السمية ، والذي يستحصل من العديد من جنس اللزان (جنس نبات من الفصيلة القرنية) ، وبخاصة لزان الأبنوس ، وهو يسبب التسمم بنبات اللزان ، وكان يستخدم في السابق كمضاد للقيء ومضاد للسعال .

التَسَمُّمُ بِنَبَاتِ اللَزّان **cytisism**

هو التسمم الناتج عن تناول النباتات التي تحتوي على السيتيزين ، مثل لزان الأبنوس ، أو عدد من أفراد جنس الأبنوس ، ويتسم بحدوث حرقة في الفم والبلعوم وعطش وغثيان والقيء وإسهال وإعياء وعدم انتظام في النبض ، وفي بعض الأحيان حبسة واضطراب البصر وهذيان وفقد الوعي مع شلل تنفسي ثم الموت .

اللَزّان **Cytisus**

جنس من الأشجار من الفصيلة القرنية ، يستوطن أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا . يعتبر لزان الوزال هو مصدر السكوبارين والوزال ، وسبب لحدوث التسمم بالوزال . أما لزان الأبنوس فهو شجرة الأبنوس التي تحتوي على السيتيزين ، وتسبب التسمم بنبات اللزان . يسمى أيضاً وزال الشيح (Sarothamnus) .

سابقة بمعنى الخَلِيَّة **cyto-**

سابقة تعطي معنى الخلية ، أو ما يتعلق بالخلية .

مُحَلِّلٌ خَلَوِيٌّ **cytoanalyzer**

هو جهاز بصري إلكتروني يستعمل في التحري عن الخلايا الخبيثة في اللطاخات .

متعلق بالتَهَنْدُسِ الخَلَوِيِّ **cytoarchitectonic**

هو متعلق بالتهندس الخلوي ، أو بعلم التهندس الخلوي .

من المشتقات الشحمية . رمزه (C) .

سيتيدين ثنائي الفسفات **cytidine diphosphate (CDP)**

هو نوكليوتيد هو عبارة عن المشتق ´5 بيروفسفات من السيتيدين ، والذي يعمل كناقل للكولين وإيثانول أمين في عملية تخليق المركبات الشحمية الفسفورية .

سيتيدين أحادي الفسفات **cytidine monophosphate (CMP)**

هو نوكليوتيد عبارة عن المشتق´5 فسفات من السيتيدين ، والذي يعمل كناقل لمركب حمض N- أسيتيل نيورامينيك في عملية تخليق البروتينات السكرية . يسمى أيضاً حمض السيتيديليك(Cytidylic acid) .

سيتيدين ثلاثي الفسفات **cytidine triphosphate**

هو نوكليوتيد عبارة عن المشتق ´5 ثلاثي الفسفات من السيتيدين ، والذي يعتبر طليعة منشطة في عملية تخليق الحمض النووي الريبي والمركبات المرتبطة بكل من السيتيدين ثنائي الفسفات والسيتيدين أحادي الفسفات .

نازعة أمين السيتيدين **cytidine deaminase**

هو إنزيم من صنف إنزيمات الهيدرولاز ، والذي يحفز نزع الأمين من السيتيدين لتشكيل اليوريدين . هذا التفاعل الذي يحدث في أنسجة الحيوانات وفي الجراثيم هو جزء من مسار تدرك البيريميدين .

سيتيديلات **cytidylate**

هو الشكل المتفارق من حمض السيتيديليك .

كيناز سيتيديلات **cytidylate kinase**

هو إنزيم من صنف الإنزيمات الناقلة ، والذي يحفز فسفرة (سيتيدين أحادي الفسفات) (CMP) ، أو سيتيدين ثنائي الفسفات (CDP) للحصول على المركب ثنائي الفسفات المرتبط .

حمض السيتيديليك **cytidylic acid**

هو السيتيدين مفسفر ، عادة ما يكون سيتيدين أحادي الفسفات .

cytochemism **الكيميائية الخلوية**

النشاط الكيميائي للخلايا .

cytochemistry **الكيمياء الخلوية**

هو دراسة المواقع والعلاقات البنيوية والتفاعلات التبادلية لمكونات الخلايا عن طريق وسائل مثل المجهر الإلكتروني ، والتجزيء الخلوي والتقنيات الكيميائية المناعية .

cytochrome **سيتوكروم**

هو أي هيموبروتين ناقل للإلكترون يعمل وفق النمط الذي يتأثر فيه نقل إلكترون منفرد بتبدل تكافؤي عكسي لذرة الحديد المركزية في مجموعة الهيم الضميمة بين حالات الأكسدة (+2) ، و (+3) ؛ ويصنف على أنه سيتوكروم a ، عندما يحتوي الهيم على سلسلة فورميل طرفية ، وعلى أنه سيتوكروم b عندما لا يكون البروتوهيم (أو أي هيم وثيق الشبه) مرتبطاً بشكل تساهمي بالبروتين ، وعلى أنه سيتوكروم c عندما يكون البروتوهيم ، أو أي هيم آخر مرتبطاً بشكل تساهمي بالبروتين ، وسيتوكروم d عندما يحتوي تيترابيرول الحديد على روابط اقترانية مضاعفة أقل مما يحتوي عليه الهيم . وقد تم ترقيم السيتوكرومات المشهورة بالتتابع في مجموعات ، وأطلقت عليها تسميات رمزية تعتمد على أرقام ملحقة بحيث يخلو رمز العضو الأول من المجموعة من رقم ملحق كما في السيتوكرومات c و c_1 و c_2 إلخ. أما السيتوكرومات الجديدة فتتم تسميتها اعتماداً على الطول الموجي مقدراً بالنانومتر للامتصاص الأعظم لشريط a في صيغة الحديد II في البيريدين ، كما في سيتوكروم (c-555) .

cytochrome aa_3 **سيتوكروم aa_3**

هو أكسيداز سيتوكروم c .

انظر تحت cytochrome-c oxidase .

cytochrome b **سيتوكروم b**

هو سيتوكروم يوجد في الغشاء الداخلي للمتقدرة ، يعمل بالاشتراك مع سيتوكروم c_1 ، وبروتين حديدي كبريتي كحامل الإلكترون

cytoarchitectonics **علم التَّهَنْدُسُ الخَلَوِيُّ**

1 ـ التهندس الخلوي .

انظر تحت cytoarchitecture .

2 ـ دراسة التهندس الخلوي .

cytoarchitectural **متعلق بالتَّهَنْدُس الخَلَوِيُّ**

متعلق بالتهندس الخلوي .

cytoarchitecture **التَّهَنْدُسُ الخَلَوِيُّ**

هو انتظام الخلايا في بنية من عضو ، أو نسيج مثل القشرة المخية .

cytobiology **الخَلَوِيَّاتُ البِيولوجِيَّة؛ السيتولوجيا البِيولوجِيَّة**

بيولوجيا الخلايا .

cytobiotaxis **التَّداعِي الخَلَوِيُّ**

انظر تحت cytoclesis .

cytoblast **1 ـ أَرومَة خَلَوِيَّة (جنين) 2 ـ نواة الخَلِيَّة**

1 ـ نواة الخلية .

2 ـ أرومة خلوية .

cytoblastema **السَّائِلُ الأَرومِيُّ الخَلَوِيُّ**

cytocentrum **الجُسَيمُ المَرْكَزِيُّ**

هو الكرة المركزية .

انظر تحت centrosphere .

cytocerastic **متعلق بالارْتِقاءِ الخَلَوِي**

انظر تحت cytokerastic .

cytochalasin **سيتوكالاسين، مثبط حركة الخلايا**

أي فرد من أفراد مجموعة من المستقلبات الفطرية التي تتدخل في تكون الخييطات ، وبالتالي تعرقل الآليات الخلوية المعتمدة على تلك الخييطات .

cytochalasin B **سيتوكالاسين B**

هو نوع من السيتوكالاسين يستعمل في دراسة دور الخييطات في مورفولوجيا وفيزيولوجيا الخلايا ؛ وهو يسبب اختفاء الخييطات من خلال تثبيط تجميع خيوط الأكتين ، وبذلك فهو يمنع العديد من العمليات الخلوية من مثل الحرائك الخلوية والالتقام والإيماس وتقلص العضلات الملساء والهجرة الخلوية .

سيتوكروم P-450 **cytochrome P-450**

هو الاسم المبتذل [P من كلمة صباغ (Pigmentation)] ، و (450) هي (450) نانومتر ، وهو الطول الموجي للامتصاص الأعظم لمشتقات أحادي أكسيد الكربون للسيتوكروم ، والذي يتواجد في معظم الأنسجة ، ويحتوي على مجموعة البروتوهيم IX الضميمة . وهو يعمل كمحفز مؤكسد في طائفة واسعة من التفاعلات التي تحفزها إنزيمات الأكسجيناز الأحادية مثل إضافة الهيدروكسيل إلى الهرمونات الستيرويدية وتفاعلات الأكسدة التي تحدث في سياق إزالة سمية العديد من الأدوية ؛ وينشط سيتوكروم (P-450) الأكسجين الجزيئي لمهاجمة الركيزة .

سيتوكروم P450 **cytochrome P450**

انظر تحت cytochrome P-450 .

مختزلة سيتوكروم b_5 **cytochrome-b_5 reductase**

هو إنزيم يتواجد في الشبكة الهيولية الباطنة ، وفي الكريات الحمراء ، والذي يحفز العديد من سلاسل تفاعلات الخزلدة التي تنقل الإلكترونات من ثنائي نوكليوتيد النيوكتين والأدنين المختزل (NADH) إلى متقبل عن طريق حامل الإلكترون الوسيط سيتوكروم b_5 ، وهو بوتين فلافيني . يتكون عندما يكون في الشبكة الهيولية الباطنة من قطع قطبية وكارهة للماء ويكون مرتبطاً بالغشاء ؛ يحمل سيتوكروم b_5 المختزل الإلكترونات في العديد من تفاعلات إزالة إشباع الأحماض الدهنية وتفاعلات إطالة الأحماض الدهنية . أما في الكريات الحمراء فيتكون الإنزيم من القطعة القطبية فقط ويكون ذواباً ؛ ينقل سيتوكروم b_5 الإلكترونات إلى ميتهيموجلوبين فيختزله إلى هيموجلوبين . ويؤدي عوز هذا الإنزيم ، وهي خلة جسمية متنحية ، إلى ميتهيموجلوبينيَّة الدَّم . ويؤدي عوزه في الكريات الحمراء فقط إلى الزراق ، فيما يرتبط عوزه في الكريات البيضاء ، وأحياناً لإنزيم مختزلة اليوبيكوينول ـ سيتوكروم c .

سيتوكروم b_5 **cytochrome b_5**

هو سيتوكروم يتواجد في الشبكة الهيولية الباطنة ، ويعمل كحامل وسيط للإلكترون في بعض التفاعلات التي تتحفز بإنزيمات الأكسيداز مختلطة الوظيفة مثل إزالة تشبع الأحماض الدهنية . وهو ينشط الأكسجين الجزيئي لمهاجمة الركيزة .

سيتوكروم c **cytochrome c**

هو سيتوكروم يوجد في الغشاء الداخلي للمتقدرة بحيث يقبل الإلكترونات من إنزيم مختزلة اليوبيكوينول ـ سيتوكروم c وينقلها إلى إنزيم أكسيداز سيتوكروم c ، وهو جزء من سلسلة انتقال الإلكترون .



اللـــزان Cystisus

سيتوكروم c1 **cytochrome c1**

هو سيتوكروم يوجد في الغشاء الداخلي للمتقدرة ، يعمل بالاشتراك مع سيتوكروم b ، والبروتين الحديدي الكبريتي كحامل الإلكترون لإنزيم مختزلة اليوبيكوينول ـ سيتوكروم c .

مبيد للخلايا **cytocidal**

مادة ذو فعل مبيد للخلايا .

مبيد الخلايا **cytocide**

هو عامل يبيد الخلايا .

انظر تحت cytolytic .

انظر تحت cytotoxic .

حركِيَّة الخَلِيَّة **cytocinesis**

هي الحرائك الخلوية .

انظر تحت cytokinesis .

إهْلاكُ الخلايا **cytoclasis**

هي عملية تدمير الخلايا .

مهلك للخلايا **cytoclastic**

هو كل ما يتعلق بإهلاك الخلايا ، أو يتصف بالتسبب في إهلاك الخلايا .

التَداعِي الخَلَويّ **cytoclesis**

هي شكل من أشكال الطاقة ، لا يشبه أبداً الكهرباء أو الضوء أو الحرارة أو الصوت ، يتولد من الأنسجة الحية ؛ وهو الأساس الحيوي لكل الأنسجة الحية . تم استعمال هذا المصطلح لأول مرة عام (1923) من قبل فريدريك وود جونز (Frederic Wood Jones) الذي عرفه على أنه تأثير خلايا الجسم على بعضها البعض ؛ أو ما يطلق عليه (مناداة الخلية للخلية) . يسمى أيضاً (Cytobiotaxis) .

متعلق بالتَّداعِي الخَلَوي **cytocletic**

يتعلق بالتَّداعي الخَلَوي .

سيتوكوبرئين **cytocuprein**

ديسموتاز فوق الأكسيد (Superoxide dismutase) .

خَلِيَّة عَدِيْمَة النَّوَاة **cytode**

خلية أو عنصر من خلية عديمة النواة .

تَغَصُّنٌ خَلَويّ **cytodendrite**

انظر تحت dendrite .

التَرابيطُ الخَلَويَّة **cytodesma**

هي الأنسجة الصفاحية ، أو الأنسجة الجسرية الأخرى التي تربط الخلايا الحيوانية بعضها ببعض .

في الدماغ والعضلات بحدوث كل من الزراق والتخلف العقلي .

أكسيداز سيتوكروم c. **cytochrome-c oxidase**

معقد إنزيمي في الغشاء الداخلي للمتقدرة يحفز نقل الإلكترونات من سيتوكروم C إلى الأكسجين ، فيؤكسد الأول ، ويختزل الثاني في الخطوة الأخيرة من سلسلة نقل الإلكترون التي يستعمل فيها الأكسجين لاحتراق الوقود . يحتوي الإنزيم على سيتوكرومات a وa_3 وذرتي نحاس ، ويرتبط بإزفاء البروتون وما ينتج عنه من تخليق ثلاثي فسفات الأدينوزين (ATP) والتي تبدي شاردة الحديد ثنائي التكافؤ في الهيم a ألفة قوية لأحادي أكسيد الكربون ؛ أما في الصيغة ثلاثية التكافؤ فترتبط بالنحاس أحادي التكافؤ أو الكبريت ثنائي التكافؤ أو النتروجين ثلاثي التكافؤ . يعطل الارتباط بهذه المركبات الإنزيم ، وهو السبب وراء سميتها الشديدة في كل الكائنات الحية الهوائية . يسمى أيضاً سيتوكروم (Cytochrome aa_3 aa_3) ، وأكسيداز سيتوكروم (Cytochrome oxidase) .

عوز أكسيداز سيتوكروم c **cytochrome-c coxidase deficiency**

هو عيب وراثي في مركب أكسيداز سيتوكروم c ، والذي يمنع انتقال الإلكترونات من سيتوكروم c إلى الأكسجين الجزيئي ، مما يؤدي بالنتيجة إلى الحيلولة دون تشكل ثلاثي فسفات الأدينوزين (ATP) ، وتختلف مظاهر هذا المرض بشدة وتشمل الاعتلالات العضلية والاعتلالات الدماغية والعيوب العينية والقلبية والصمم الحسي العصبي ومتلازمة فانكوني والداء السكري وقصر القامة ، وذلك بحسب الجزء المصاب بالخلل من مركب أكسيداز سيتوكروم c .

أكسيداز السيتوكروم **cytochrome oxidase**

انظر تحت cytochrome-c oxidase .

الجِبْلَة الشَّفَّافة **cytochylema**

انظر تحت hyaloplasm .

المترتبة عليها .

1ـ متعلق بتكوُّن الخلايا **cytogenic**
2ـ مكوِّنُ الخلايا

1ـ متعلق بتكون الخلايا .
2ـ يكون الخلايا أو ينتج الخلايا .

مكوِّنٌ للخلايا **cytogenous**

منتج للخلايا .

1ـ تكوُّنُ الخلايا **cytogeny**
2ـ نَسَبُ الخلايا

1ـ تكون الخلايا .
انظر تحت cytogenesis .
2ـ سلالة خلوية .

مِكوامُ الكريَّات **cytoglomerator**

نقصُ السُّكَّرِ الخلوي **cytoglucopenia**

انظر تحت cytoglycopenia .

نقصُ السُّكَّرِ الخلوي **cytoglycopenia**

هو نقص في محتوى خلايا الجسم ، أو خلايا الدم من الجلوكوز .

التَّكاثرُ الخلويُّ **cytogony**

هو عملية التكاثر المنتجة للخلايا .

تكوُّنُ البِنى الخلويَّة **cytohistogenesis**

هو تطور بنية الخلايا .

متعلق بالهيستولوجيا الخلويَّة **cytohistologic**

يشتمل على وسائل من كل من السيتولوجيا والهيستولوجيا .

الهيستولوجيا الخلويَّة **cytohistology**

اجتماع الوسائل من كل من السيتولوجيا والهيستولوجيا .

هُرْمونٌ خَلَويّ **cytohormone**

هو أحد هرمونات الخلية .

الهَيولى الشَّفَّافة **cytohyaloplasm**

هو المادة الرائقة في الهيولى .

شَبيهُ الخَليَّة؛ خَلَوَانِيّ **cytoid**

يشبه الخلية .

تثبيطٌ خَلَويّ **cyto-inhibition**

كبح نمو أو تكاثر الخلايا .

نقصُ البُوتاسْيُوم الخَلَويُّ **cytokalipenia**

انقسام خلوي **cytodieresis**

الانقسام الخلوي بأنواعه من مثل الانتصاف أو التفتل .

التمايز الخلوي **citodifferentiation**

نمو البنى المتخصصة والتطور في الوظائف المتخصصة في الخلايا الجنينية .

مبتعد عن الخلية **cytodistal**

وصف يشير إلى الجزء من المحوار البعيد عن الخلية المنشأ .

سيتوكتايز **Cytoecetes**

هو الاسم المقترح لجنس من الريكتسيات التي يعتبرها البعض أفراداً من الإيرليخيات (Ehlichia) ، ومنها نوع يوجد في كينيا ، يسبب الحمى الحبرية البقرية .

سيتوفلاف **cytoflav**

سيتوفلافين **cytoflavin**

جينٌ خَلَويّ **cytogene**

هو جينٌ بلاَزْمي .
انظر تحت plasmagene .

تكوُّنُ الخلايا **cytogenesis**

منشأ ونمو وتطور الخلايا .

متعلق بالوراثِيَّاتِ الخلَويَّة **cytogenetic**

1ـ كروموسومي .
انظر تحت chromosome .
2ـ متعلق بالوراثيات الخلوية .

متعلق بالوراثِيَّاتِ الخلَويَّة **cytogenetical**

انظر تحت cytogenetic .

اِخْتِصَاصِيُّ الوراثيَّاتِ الخلَويَّة **cytogeneticist**

مختص بعلم الوراثيات الخلوية .

الوراثِيَّاتُ الخلَويَّة **cytogenetics**

هو الجزء من علم الوراثة الذي يختص بدراسة المكونات الخلوية المتعلقة بالوراثة ، أي تحديداً بالكروموسومات .

الوراثِيَّاتُ الخَلَوِيَّةُ الإكْلينيكية **clinical cytogenetics**

هي الدراسة العلمية للعلاقة بين أشكال الزيغ الكروموسومي والحالات الباثولوجية المرضية

سيتولوجيا الخزْعَة الشَّفْطيَّة **aspiration biopsy cytology**

هي الدَّراسة المجهرية للخلايا ، والتي نحصل عليها من آفات سطحية أو عميقة عن طريق الشفط باستعمال إبرة رفيعة .

مُختَبَرُ السيتولوجيا **cytology laboratory**

هو المختبر الذي تتم فيه دراسة الخلايا .

السيتولوجيا التَّقَشُريَّة **exfoliative cytology**

هو الفحص المجهرَي لخلايا متوسفة من أحد سطوح الجسم ، أو من آفة ما كوسيلة للتحري عن الخباثة أو لقياس المستويات الهرمونية ، . . . إلخ . يمكن الحصول على مثل تلك الخلايا بوسائل مثل الشفط أو النضح أو اللطاخة أو السحج ، ويمكن استخدام هذه التقنية في فحص الإفرازات المهبلية أو القشع ، أو البول ، أو السوائل البطنية أو إفرازات البروستاتة ، . . . إلخ .

السيتولوجيا النَّوَويَّة **nuclear cytology**

هو علم النوى .

انظر تحت karyology .

الهَيُولَى الشَّفَّافة **cytolymph**

هي الجبلة الشفافة .

انظر تحت hyaloplasm .

حُلالَة خَلَويَّة **cytolysate**

هو مستحضر من الخلايا المنحلة .

حُلاَلَةُ الكُريَّات الدَّمَويَّة **blood cytolysate**

هي الحلالة الدَموية .

انظر تحت hemolysate .

حالَّة الخَلايا **cytolysin**

هي مادة أو ضد يسبب انحلال الخلايا (ذوبان الخلايا) ؛ تسمى المادة الحالة للخلايا ذات التأثير المحدد على أنواع معينة من الخلايا تبعاً للخلايا التي تؤثر فيها ، مثل حالة الدم ، والتي تؤثر على الدم .

انحِلالٌ خَلَويّ **cytolysis**

انحلال أو تخرب الخلايا .

انظر تحت cytotoxicity .

نقص في محتوى خلايا الجسم أو خلايا الدم من البوتاسيوم .

متعلق بالارْتِقاءِ الخَلَوي **cytokerastic**

متعلق بتطور الخلايا من رتبة أدنى إلى رتبة أعلى .

سيتوكيراتين **cytokeratin**

أي بروتين من مجموعة البروتينات التي توجد في خيوط الكيراتين .

سِيتوكِين **cytokine**

هو مصطلح عام للبروتينات غير الضدية التي تفرزها مجموعة معينة من الخلايا (مثل اللمفاويات التائية المبرمجة) عندما تصبح على تماس مع مستضد معين ، والتي تعمل كوسطاء في التفاعلات بين الخلوية ، كما في توليد استجابة مناعية . ومن أمثلتها اللمفوكينات والمونوكينات .

الحَرائِكُ الخَلَويَّة **cytokinesis**

هي التغيرات التي تحدث في الهيولى أثناء الانقسام الخلوي ؛ انقسام الهيولى ، وهي آلية تتزامن في الخلايا حقيقة النواة مع انقسام النواة (الانقسام الفتيلي) .

سِيتوكايِنين **cytokinin**

أي فرد من أفراد صنف من الهرمونات النباتية أدنين مستبدل (N^6) التي تكون وظائفها الأساسية هي تحريض الانقسام الخلوي (الحرائك الخلوية) ، وتنظيم تمايز الأنسجة (تخلق الأعضاء) .

الغِمْدُ الخَلَويُّ **cytolemma**

هو الغشاءُ البلاَزْميّ

انظر تحت plasma membrane .

سِيتولوجيّ **cytologic**

متعلق بالسيتولوجيا .

اخْتِصاصِيُّ السيتولوجيا **cytologist**

عالم اختصاصي في مجال السيتولوجيا .

السيتولوجيا **cytology**

دراسة الخلايا ومنشئها وبنيتها ووظائفها وباثولوجيتها .

تكون خفيفة جداً أو تحت إكلينيكية . يسمى أيضاً ڤيروس الغدة اللعابية (salivary gland virus) .
انظر تحت cytomegalic inclusion disease .

ضَخامَةُ الخَلايا **cytomegaly**

سيتوميل **Cytomel**
علامة تجارية لأحد مستحضرات صوديوم ليوثيرونين (Liothyronine) دواء هرموني درقي .

الغِشاءُ الخَلَوِيُّ **cytomembrane**
هو غشاء الخلية .

قُسَيمٌ خَلَوِيّ **cytomere**
هو الجزء متعدد النوى من متقسمة بوائغ معينة ، والذي ينفصل لتنشأ منه الأقسومات .

حُؤولٌ خَلَوِيّ **cytometaplasia**
هو تبدل في شكل أو في وظيفة الخلية .

عَدَّادُ الكُرَيَّات **cytometer**
هي جهيزة تستعمل في عد الخلايا ، إما بصرياً كما في حالة عدادة الكريات ، أو آليا كما في حالة عداد الكريات الانسيابي .

عداد الكريات الانسيابي **flow cytometer**
هي أداة تستعمل لإجراء عد الكريات الانسيابي .

عَدُّ الكُرَيَّات **cytometry**
هو تمييز وقياس الخلايا والمكونات الخلوية .

عد الكريات الانسيابي **flow cytometry**
هي تقنية تمرر فيها الخلايا المعلقة ضمن سائل بحيث تنساب واحدة بعد الأخرى من خلال بؤرة ضوء تحريضي ، بما يجعل الضوء يتشتت في أنماط مميزة لنوع الخلايا ولمكوناتها ؛ وعادة ما يتم وسم الخلايا بواسمات تألقية بحيث يجري امتصاص الضوء أولاً ، ثم انبعاثه وفق ترددات متبدلة . ويقيس مستشعر خاص يتحسس الضوء المنبعث أو المتشتت الحجم والخواص الجزيئية لكل خلية على حدة ؛ ويمكن فحص عشرات الآلاف من الخلايا في الدقيقة ويقوم الحاسوب بتحليل المعطيات التي تم الحصول

انْحلالٌ خَلَوِيٌّ مَناعِيّ **immune cytolysis**
هو انحلال الخلايا الناتج عن تأثير ضد معين بمشاركة المتممة .

جُسَيْمٌ حالٌّ خَلَوِيّ **cytolysosome**
انظر تحت autophagosome .

حالٌّ للخَلِيَّة **cytolytic**
هو متعلق بالانحلال الخلوي ، أو متصف بالانحلال الخلوي ، أو مسبب للانحلال الخلوي .

وَرَمٌ خَلَوِيّ **cytoma**

مُضَخِّمُ الخَلايا **cytomegalic**
متعلق بخلايا بالغة الضخامة ذات مشتملات داخل نووية تشاهد في عداوى الڤيروس المضخم للخلايا .

بِيلَةُ الفَيروس المُضَخِّم للخَلايا **cytomegaloviruria**
هو وجود الڤيروس المضخم للخلايا في البول .

الفيروس المضخم للخلايا **Cytomegalovirus**
هو جنس من الڤيروسات واسعة الانتشار من الفصيلة الفرعية الڤيروس الحلائي بيتا (Betaherpesvirinae) (فصيلة الحلائية) ، والتي تحتوي على النوع الوحيد الڤيروس الهربسي (الحلائي) البشري 5 ، والذي ينتشر بطرق متعددة ، ويسبب عدوى عادة ما تكون خفيفة أو تحت إكلينيكية إلا أنها أحياناً تكون عرضية (داء المشتملات المضخمة للخلايا) .

الفَيروسُ المُضَخِّمُ للخَلايا **cytomegalovirus**
هو أي ڤيروس من ڤيروسات الفصيلة الفرعية (الڤيروس الحلائي بيتا) ، وهي ڤيروسات هربسية بشرية شديدة النوعية للمضيف ، والتي تعدي البشر والقرود والقوارض ، وتتسبب في إنتاج خلايا متميزة ضخمة تحتوي على مشتملات داخل نووية . وبحسب العمر والحالة المناعية للشخص المصاب بالعدوى يمكن لهذه الڤيروسات أن تسبب عدداً من المتلازمات الإكلينيكية المختلفة ، تعرف بمجموعها باسم داء المشتملات المضخمة للخلايا ، على الرغم من أن معظم العداوى

بَاثولوجيّ خَلَويّ **cytopathological**

انظر تحت cytopathologic .

إخْتِصاصِيُّ الباثولوجْيا الخَلَويَّة **cytopathologist**

هو خبير في دراسة الخلايا أثناء المرض ؛ أو هو خبير في باثولوجيا الخلايا .

الباثولوجْيا الخَلَويَّة **cytopathology**

هي دراسة الخلايا أثناء المرض .

قِلَّة الكُرَيَّات **cytopenia**

نقص في عدد أي من العناصر الخلوية للدم ؛ تسمى أيضاً قلة كريات الدم (Hematocytopenia) ، نقص الكريات (Hypocytosis) .

اللاغِفة **Cytophaga**

هي جنس من الجراثيم ، وهي عيدان سالبة الجرام هوائية أو لا هوائية اختيارياً ، تعتبر اللاغفة المعايشة البرودية (Cytophaga psychrophila) نوعاً يفضل الماء البارد ، ويسبب داء الماء البارد عند الأسماك . أما اللاغفة المعايشة الدافئة (Cytophaga columaris) فتفضل الماء الدافىء ، وتسبب داء الماء الدافىء عند الأسماك .

اللاغِفات **Cytophagaceae**

هي فَصيلَةٌ منَ الجَراثيم .

اللَّواغِف **Cytophagales**

هي رُتْبَةٌ منَ الجَراثيم .

بَلعَمَة خَلَويَّة **cytophagocytosis**

هو التهام الخلايا .

انظر تحت cytophagy .

ملتهم للخلايا **cytophagous**

صفة لما يلتهم أو يستهلك الخلايا ، وهو ما توصف به البلاعم .

اِلْتِهامُ الخَلايا **cytophagy**

هو ابتلاع الخلايا من قبل البلاعم .

بَلعومٌ خَلَويّ **cytopharynx**

هي قناة غير مهدبة تشبه المريء ، والتي تمتد بين المثغر والهيولى الباطنة عند الحيوانات الأوالي المهدبة وعدد من الحيوانات الأوالي الأخرى .

عليها .

عد الكريات التصويري **image cytometry**

هي تقنية يتم فيها تصوير الخلايا المحضرة هيستولوجياً باستعمال تقنية تفرس تعتمد على تجزئة الصورة الكلية إلى عناصر وأجزاء أصغر ومن ثم تحليلها بواسطة الحاسوب ، ومقارنتها بالعديد من خلايا سلسلة معينة .

جُسَيْمٌ صِغريّ خَلَويّ **cytomicrosome**

انظر تحت microsome .

لُيَيفٌ خَلَويّ **cytomitome**

هو خيط أو بنية خيطية داخل الهيولى .

المورْفولوجيا الخَلَويَّة **cytomorphology**

تشكُّل الخلايا **cytomorphosis**

هي سلسلة الأحداث التي تمر بها الخلية أثناء التكون والتطور والنمو والشيخوخة ، . . . إلخ .

خَلِيَّة العَصَبُون **cyton**

هي حوائط النواة .

انظر تحت perikaryon .

نَخَرٌ خَلَويّ **cytonecrosis**

موت الخلايا بعينها .

متعلق بالاعْتِلال الخَلَوي **cytopathic**

يتعلق أو يتصف بتبدلات باثولوجية تصيب الخلايا .

إمْراضُ الخلايا **cytopathogenesis**

إحداث تبدلات باثولوجية في الخلايا .

متعلق بإمْراض الخلايا **cytopathogenetic**

متعلق أو متصف بإمراض الخلايا .

مُمْرِضٌ للخلايا **cytopathogenic**

قادر على إحداث تبدلات باثولوجية في الخلايا .

إمْراضِيَّة الخلايا **cytopathogenicity**

خاصية القدرة على إحداث تبدلات باثولوجية في الخلايا .

بَاثولوجيّ خَلَويّ **cytopathologic**

كل ما هو متعلق بالباثولوجيا الخلوية ، والذي يتعلق بتبدلات الخلايا أثناء المرض .

1 ـ نشاطٌ خَلَويّ **cytophylaxis**
2 ـ وِقايَةٌ خَلَوِيَّة
1 ـ حماية الخلايا .
2 ـ زيادة النشاط الخلوي .

متعلق بالنَّسَبِ الخَلَوي **cytophyletic**
هي عملية دراسة سلالات الخلايا .

فيزياءُ الخَلايا **cytophysics**
فيزياء النشاط الخلوي .

الفيزيُولوجيا الخَلَويَّة **cytophysiology**

صِباغٌ خَلَويّ **cytopigment**
أي صباغ يوجد في الخلايا .

مِمَصٌّ خَلَويّ **cytopipette**
ممص يستعمل للحصول على لطاخات سيتولوجية .

الهَيولَى **cytoplasm**
جبلة الخلية باستثناء جبلة النواة ؛ وتتكون من سائل مائي مستمر (العصارة الخلوية) والعضيات والمشتملات المعلقة بداخلها (الهيولى المرئية) ، وهي مكان حدوث معظم الأنشطة الكيميائية للخلية .
انظر تحت nucleoplasm .

هَيولِيّ **cytoplasmic**
متعلق بالهيولى أو موجود داخل الهيولى .

خَلِيَّةٌ مَنْزوعَةُ النَّواة **cytoplast**
خلية تم نزع نواتها ، وبقيت تتمتع بالعيوشية لبعض الوقت .

خلوية المستقيم **cytoproct**
مسم خلفي دائم يشاهد في بعض المهدبات ، يمكن التخلص من فضلات المبترزات من خلاله .

واقي للخلية **cytoprotectant**
انظر تحت cytoprotective .

وقاية الخلية **cytoprotection**
هو الارتقاء بقدرة الخلايا على مقاومة الأذى .

واقي للخلية **cytoprotective**
1 ـ يحمي الخلية من المواد الكيميائية الضارة أو المهيجات الأخرى .

انظر تحت cytopharyngeal apparatus .

أليفُ الخَلايا **cytophil**
هو أي عنصر أو مادة تبدي ألفة للخلايا .


أليفُ الخَلايا **cytophilic**
ما يتمتع بألفة للخلايا ، مثل الأضداد أليفة الخلايا .

مِقياسٌ ضَوئِيٌّ خَلَويّ **cytophotometer**
هو مقياس ضوئي لقياس توضع المركبات العضوية ضمن الخلايا من خلال قياس شدة الضوء المارة عبر مناطق معينة مصطبغة من الهيولى .

متعلق بالقِياس الضَّوئِي الخَلَوي **cytophotometric**
يتعلق بالمقياس الضوئي الخلوي ، أو يتم إجراؤه باستعمال المقياس الضوئي الخلوي .

قِياسٌ ضَوئِيٌّ خَلَويّ **cytophotometry**
هو ما دراسة المركبات العضوية داخل الخلايا باستعمال المقياس الضوئي الخلوي .

1 ـ متعلق بالنَّشاطِ الخَلَوي **cytophylactic**
2 ـ متعلق بالوقايَةِ الخَلَويَّة
هو ما يتعلق بالوقاية الخلوية أو بالنشاط الخلوي



Cytophaga اللاغفة

نازعة أمين السيتوزين **cytosine deaminase**

هو إنزيم من صنف الإنزيمات الهيدرولاز ، والذي يحفز نزع الأمين من السيتوزين لتشكيل اليوراسيل ، وهي خطوة في عملية تدرن نوكليوتيديات البيريميدين .

متعلق بهيكل الخلِيَّة **cytoskeletal**

هَيكلُ الخليَّة **cytoskeleton**

هي التدعيمات الجلية (الصريحة) الداخلية في هيولى الخلية ، والتي تتكون من الليفات الموترة ، والوترة الانتهائية وخييطات أخرى .

لطاخة خلَويَّة **cytosmear**

العُصارة الخلَويَّة **cytosol**

هو الوسط السائل في الهيولى ، أي الهيولى بدون العضيات والمكونات غير الغشائية غير الذوابة .

ببتيداز العُصارة الخلَويَّة **cytosol aminopeptidase**

هو لوسيل أمينوببتيداز .
انظر تحت leucyl aminopeptidase .

عُصاريٌ خلَويّ **cytosolic**

هو كل ما يتعلق بالعصارة الخلوية ، أو يتواجد في العصارة الخلوية .

جَسَدُ الخليَّة **cytosome**

1 ـ جسم الخلية من دون نواتها .
2 ـ الجسم عديد الصفاحات .
انظر تحت multilamellar body .

الإسفَنجة الخلَويَّة **cytospongium**

هي الجِبْلَةُ الاسْفَنْجيَّة .
انظر تحت spongioplasm .

سِيتوسِت **cytost**

هو ذيفان محدد ، والذي يطرح من الخلية نتيجة إصابتها بأذية ؛ وهو عامل محدد يطرح من نسيج ما في حالة التحلل .

رُكودٌ خلَويّ **cytostasis**

انغلاق الأوعية الشعرية بكريات الدم البيضاء في المراحل الأولى من الالتهاب .

كابح خلوي **cytostatic**

2 ـ عامل يقوم بهذا النوع من الحماية . يسمى أيضاً (Cytoprotectant) .

مُداني الخلِيَّة **cytoproximal**

هي تسمية تشير إلى الجزء من المحوار القريب من الخلية المنشأ .

اختزال الخلايا **cytoreduction**

1 ـ هو تناقص عدد الخلايا ، كما في الأورام .
2 ـ انظر تحت debulking .

مختزل للخلايا **cytoreductive**

هي عملية يحدث فيها ينقص عدد الخلايا كما في جراحة الأورام .

الشَّبكة الخلَويَّة **cytoreticulum**

هي الجِبْلَةُ الاسْفَنْجيَّة .
انظر تحت spongioplasm .

مُغْمورات خلَويَّة **cytorrhyctes**

هي مشتملات خلوية ، والتي تشاهد في عدد من الأمراض المختلفة ، والتي قد تكون أوالي ممرضة نوعية ، أو مظاهر لاستجابات خلوية للطفيليات المسببة للمرض ، أو قد تكون تنكسات ناتجة عن المرض .

سيتوزار U **Cytosar- U**

علامة تجارية لأحد مستحضرات سيتارابين (Cytarabine) ، وهو دواء مضاد للأورام .

فحْصُ الخلايا **cytoscopy**

سِيتوسيدرين **cytosiderin**

هو اصطباغ داخل خلوي يحتمل أن يكون ناتجاً عن خلل في استقلاب الحديد .

سِيتوزين **cytosine**

هو أساس من البيريدين يوجد في الخلايا الحيوانية والنباتية ، عادة ما يتواجد متكثفاً مع الريبوز أو الريبوز منزوع الأكسجين ليكون نوكليوزيدات السيتيدين والسيتيدين منزوع الأكسجين ، وهي من المكونات الهامة للأحماض النووية رمزه (C) .

سيتُوزين أرابينوزيد **cytosine arabinoside**

هو السيتارابين .
انظر تحت cytarabine .

سُميَّة للخَلايا **cytotoxicity**

هي الدرجة المقدرة لعامل ما على أن يكون له أثر تدميري نوعي على خلايا معينة ، أو امتلاك مثل ذلك التأثير ؛ وهو اصطلاح يستعمل تحديداً للإشارة إلى انحلال الخلايا بفعل الظواهر المناعية ، وبفعل الأدوية المضادة للأورام التي تستهدف وتقتل الخلايا المنقسمة .

سمية خلوية للخلايا معتمدة على الضد **antibody-dependent cell-mediated cytoxicity**

هو انحلال الخلايا المستهدفة المغطاة بالأضداد من قبل الخلايا المستفعلة ذات الأثر الحال للخلايا ومستقبلات القطعة Fc (مستقبلات للمعقدات الضدية المستضدية) ، بما فيها الخلايا K والبلاعم والحبيبات ؛ وهو شكل من أشكال تَفاعُلُ فَرْط التَّحَسُّس من النوع الثاني ، وتقوم السمية الخلَوية للخلايا المعتمدة على الضد على ربط الخلايا المستفعلة بواسطة مستقبلات القطعة Fc بجزء من القطعة Fc من جزيء الجلوبولين المناعي IgG ، ويتم انحلال الخلية المستهدفة بشكل خارج خلوي ، ويتطلب تماساً خلوياً ـ خلوياً ، ولا تشترك المتممة في هذا التفاعل .

سمية خلوية للخلايا معتمدة على الضد **antibody-dependent cellular cytoxicity**

انظر تحت antibody-dependent cell-mediated cytoxicity .

سمية خلوية للخلايا **cell-mediated cytotoxicity**

الانحلال الخلوي للخلايا المستهدفة بفعل اللمفاويات المستفعلة ، مثل اللمفاويات التائية السامة للخلايا ، أو خلايا NK (خلايا فاتكة طبيعية) ؛ قد تكون معتمدة على الضد سمية خلوية للخلايا معتمدة على الضد ، أو غير معتمدة على الضد ، كما في تفاعلات فرط تحسس معينة من النوع الرابع .

انظر تحت antibody-dependent cell-mediated

1 ـ كابت لنمو وتضاعف الخلايا .

2 ـ عامل يكبت نمو وتضاعف الخلايا .

مَثْغَر **cytostome**

هي الفتحة الفموية عند المهدبات وأنواع معينة أخرى من الحيوانات الأوالي ، والتي تنفتح على البلعوم الخلوي ، والذي ينفتح بدوره على الهيولى الباطنة .

سَدَويّ خَلَويّ **cytostromatic**

هو كل ما يتعلق بسداة الخلية .

متعلق بالانجِذاب الخَلَوي **cytotactic**

هو كل ما يتعلق بالانجذاب الخلوي .

مُوَلِّدُ عامِل الجَذْبِ الكيمْيائي **cytotaxigen**

هي مادة تتوسط بشكل غير مباشر في التجاذب الكيميائي بين الخلايا من خلال تحريض تكون عوامل الجذب ؛ وبذلك تعتبر مركبات الأضداد والمستضدات ذات طبيعة مولدة لعوامل الجذب الكيميائي لأنها تثبت المتممة عندما تضاف إلى المصل ، مما يؤدي إلى إطلاق عوامل انجذاب كيميائية مشتقة من المتممة .

عامِلُ الجَذْب **cytotaxin**

هو عامل انجذاب ذو طبيقة كيميائية .

انْجِذابٌ خَلَويّ **cytotaxis**

هي حركة وانتظام الخلايا بالنسبة إلى مصدر محدد من مصادر الاستثارة .

سيتوتك **cytotec**

عامة تجارية لأحد مستحضرات ميزوبروستول (Misoprostol) .

تِقْنيُّ السيتولوجيا **cytotechnologist**

هو طبيب اختصاصي في السيتولوجيا (علم دراسة الخلايا) .

مُعالجَة خَلَويَّة **cytotherapy**

تَرْميمٌ خَلَويّ **cytothesis**

هو إعادة ترميم الخلايا المتأذية إلى حالتها الطبيعية .

سامٌّ للخَلايا **cytotoxic**

هو كل ما يتعلق بسمية الخلايا ، أو يتصف بكونه سام للخلايا .

cyttarrhagia **نَزْفٌ سِنْخِيّ**

cytula **بُيَيْضَة مُلَقَّحَة**

cytuloplasm **هيولي البيضة الملقحة**

cyturia **بيلة خلوية**

هو وجــود الخــلايا من أي نوع من الأنواع في البول .

Czapek-Dox agar (solution) **أجار تشابيك - دُوكس (محلول تشابيك - دُوكس)**

[أجـار منسـوب للعـالم فـريدريك يوهان فـرانز تشـابيك (Friedrich Johann Franz Czech) ، وهو عـالم نبـات تشـيكي ، عـاش مـا بين 1921-1868 ؛ والعـــالم آرثر ويلاند دوكس (Arthur Wayland Dox) ، وهو عالم كيمياء أمريكي ، بالقرن 20] .

انظر تحت culture medium .

Czermak's space (lines) **حيز تشيرماك (خطوط تشيرماك)**

[حيز منسوب للطبيب يوهان نيبوموك تشيرماك (Johann Nepomuk Czermak) ، وهو طبـيب تشـيكي ، عـاش مـا بين 1873-1828 ، وهي الأَحْيازُ بَينَ الكُرَيْوِيَّة] .

انظر تحت spatia interglobularia .

Czerny's suture **خياطة تشيرني**

[خيـاطة منسـوبة للجـراح فـينسنز تشـيرني (Vincenz Czerny) ، وهو جـراح تشـيكي في ألمانيا ، عاش ما بين 1916-1842] ، وهي خياطة جـراحيـة تسـتخـدم في جـراحـات الأمعـاء والأوتار .

انظر تحت suture .

Czerny-Lambert suture **خياطة تشيرني - ليمبيرت**

[خيـاطة منسوبة للجـراح فـينسنز تشـيرني (Vincenz Czerny) ، والطبـيب أنتـوان ليمبيـرت (Antoine Lembert) ، وهو جـراح فـرنسي ، عاش ما بين 1851-1802] ، وهي جراحة لرفو الأمعاء .

انظر تحت suture .

cytoxicity .

cytotoxicosis **1 - تسمُّمٌ خَلَوِيّ**
2 - دَرَجَة التَّسَمُّم الخَلَوِيّ

cytotoxin **ذِيفَانٌ خَلَوِيّ**

هو ذيفان أو ضد له أثر سمي نوعي على خلايا عضو معين ؛ وتسمى الذيفانات الخلوية بحسب الصنف الخاص من الخلايا التي تكون نوعية لها ، كما في الذيفان الكلوي (Nephrotoxin) .

cytotrophoblast **الأرومَة الغاذِيَة الخَلَوِيَّة**

1 - الطبقة الخلوية (الباطنة) للأرومة الغاذية ؛ تسمى أيضاً طبقة لانجهانز (Langhan's layer) .

2 - خلية أرومية غاذية خلوية .

cytotrophoblastic **أرومي غاذي خلوي**

كل ما يتعلق بالأرومة الغاذية الخلوية ، أو من طبيعة الأرومة الغاذية الخلوية .

cytotropic **مُوَجِّهٌ للخلايا**

أي أنه يجذب الخلايا ؛ ويمتلك ميلاً للخلايا ؛ وهو وصف يطلق بشكل نوعي على الأضداد التي تلتصق على سطوح الخلية .

انظر تحت antibody .

cytotropism **1 - توَجُّهٌ خلَوِيّ**
2 - توجيهُ الخلايا

1 - حركة الخلية التي تحدث بتأثير استثارة خارجية .

2 - ميل الفيروسات والجراثيم والأدوية ، . . . إلخ لممارسة تأثيرها على خلايا معينة في الجسم .

Cytovene **سيتوفين**

علامة تجارية لأحد مستحضرات الجانسيكلوفير (Ganciclovir) .

Cytoxan **سيتوكسان**

علامة تجارية لأحد مستحضرات السيكلوفسفاميد (Cyclophosphamide) ، وهو دواء مضاد للأورام .

cytozoic **مُسْتَوطِنُ الخَلِيَّة**

هو ما يعيش داخل الخلية أو ملتصقاً عليها ؛ وهو وصف يطلق على الطفيليات .

Appendix - Abbreviations

ملحق ـ المختصـرات

C

Abbreviations — المختصرات

c

calculus	حصاة
calorie	سُعر ، كالوري (وحدة حرارية)
carbohydrate	السكريات ، الكربوهيدرات
carbon	كربون
cathodal	مهبطي (كاثودي)
cathode	مهبط (كاثود)
Caucasian	الجنس الأبيض ، قوقازي (أنثروبولوجيا)
Celsius	سلسيوس : درجة حرارة = درجة مئوية (أندريس ~ ، [1744-1701] فلكي سويدي)
centigrade	درجة مئوية
L. centum (hundred)	مائة (باللاتينية)
cervical vertebrae (C1-C7)	الفقرات العنقية (ع1-ع7)
chest	الصدر
clearance	تصفية
clonus	رمع
closure	غلق
color sense	الحس اللوني
communicating (pacemaker code)	متواصل (رمز من رموز الناظمة)
complement (C1- C9)	المتممة (C9-C1)
compound	مركب
contraction	تقلص
contracture	تقفع
coulomb	كولوم (وحدة الشحنة الكهربائية) [A.C دي كولوم (1801-1736) فيزيائي فرنسي]
curie	كوري (وحدة النشاط الإشعاعي) [بيير وماري كوري ، كيميائيان وفيزيائيان فرنسيان]
cylinder	اسطوانة
cytidine	سيتيدين
cytosine	سيتوزين
hematocrit	هيماتوكريت
hundred	مائة
speed of light	سرعة الضوء

C.

L. congius (gallon)	جالون (مقياس للحجم) (باللاتينية)

C

capacitance	مواسعة (كهرباء)
clearance	تصفية
Clostridium	المطثية (جنس من الجراثيم اللاهوائية)
Cryptococcus	المستخفية (جنس فطر من فصيلة المستخفيات)

ºC

degree Celsius	درجة الحرارة السلسيوسية أو المئوية

C_{II}

second cranial nerve	العصب القحفي الثاني

C_{alb}

albumin clearance	تصفية الألبومين

C_{am}

amylase clearance	تصفية الأميلاز

C_{cr}

creatinine clearance	تصفية الكرياتينين

C_H

constant region of an immunoglobulin heavy chain	المنطقة الثابتة لسلسلة الجلوبولين المناعي الثقيلة

C_{in}

insulin clearance	تصفية الإنسولين

C_L

constant region of an immunoglobulin light chain	المنطقة الثابتة لسلسلة الجلوبولين المناعي الخفيفة

C_p

heat capacity	السعة الحرارية

C_{pah}

para- aminohippurate clearance	تصفية البارا ـ أمينوهيبورات

C_u

urea clearance	تصفية اليوريا (البولينا)

C

symbol for complement	رمز المتممة

©

confidential (patient may be unaware)	سري (قد لا يخطر به المريض)

C§

cesarean section العملية القيصرية

c

capillary 1 ـ شعيرة 2 ـ شعري

centi- جزء واحد من مائة = (10^{-2})

contact 1 ـ تماس 2 ـ مخالطة 3 ـ مخالط

curie كوري (وحدة النشاط الإشعاعي)

small calorie كالوري صغير

c.

L. cibus (food) طعام (باللاتينية)

L. cum (with) مع (باللاتينية)

c

molar concentration التركيز المولي (= تركيز المادة)

specific heat capacity السعة الحرارية النوعية

velocity of light in a vacuum سرعة الضوء في الخلاء

c

L. cum (with) مع (باللاتينية)

c

coefficient of partage معامل الانشطار

CA

cancer سرطان

carbonic anhydrase الأنهيدراز الكربونية (إنزيم)

carcinoma سرطانة

cardiac arrest توقف القلب

cathode مهبط (كاثود)

cervicoaxial عنقي محوري (أسنان)

Chemical Abstracts الملخصات الكيميائية

chronologic age العمر الزمني

cold agglutinins راصات بردية

common antigen مستضد مشترك

coronary artery الشريان التاجي

corpora amylacea أجسام نشوية

croup-associated (virus) (الفيروس) المرتبط بالخناق

cyclophosphamide, doxorubicin سيكلوفوسفاميد، ودوكسوروبيسين (مركب دوائي)

(CA)n

contain يحتوي

ca

calcium كالسيوم (عنصر معدني، الرقم الذري 20)

cancer سرطان

Cancer - A Cancer Journal for Clinicians «السرطان» ـ مجلة عن السرطان موجهة للأطباء الإكلينيكيين

carcinoma سرطانة

carpal رسغي

carpal amputation بتر رسغي

cathodal مهبطي (كاثودي)

cathode مهبط (كاثود)

NIOSH recommends that the substance be treated as a potential human carcinogen يوصي المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية بأن تعالج المادة على أنها من المسرطنات المحتملة في البشر

ca

cancer سرطان

ca.

L. circa (about) حول (باللاتينية)

CAA

carotid audiofrequency analysis تحليل التردد السمعي السباتي

CAAT

computer-assisted axial tomography التصوير المقطعي المحوري المساعد بالحاسوب

CAB

coronary artery bypass مجازة الشريان التاجي

CABG

coronary artery bypass graft طُعم مجازة الشريان التاجي

CACC

cathodal closure contraction تقلص الغلق المهبطي (الكاثودي)

CaCC

cathodal closure contraction تقلص الغلق المهبطي (الكاثودي)

CACMS

Committee on Accreditation of Canadian Medical Schools لجنة منح التراخيص لكليات الطب الكندية

$CaCO_3$

calcium carbonate كربونات الكالسيوم

CAD

coronary artery disease مرض الشريان التاجي

CaDTe

cathodal duration tetanus تكزز الأمد المهبطي

CAE
cellulose acetate electrophoresis — الرحلان الكهربي لأسيتات السليلوز

CaEDTA
calcium disodium edetate — إيديتات الكالسيوم ثنائي الصوديوم

CAF
cyclophosphamide, doxorubicin, and 5-fluorouracil — سيكلوفوسفاميد ، ودوكسوربيسين و5ـ فلوروبوراسيل (مركب دوائي)

CAFT
cisplatin, doxorubicin, 5- fluorouracil, and teniposide — سيسبلاتين ، ودوكسوروبيسين ، و5ـ فلورويوراسيل وتينيبوزيد (مركب دوائي)

CAG
chronic atrophic gastritis — التهاب المعدة الضموري المزمن

CAH
chronic active hepatiti — التهاب الكبد النشط المزمن
chronic aggressive hepatitis — التهاب الكبد العدواني المزمن
congenital adrenal hyperplasia — فرط التنسج الكظري الخلقي

CAHD
coronary atherosclerotic heart disease — مرض القلب التاجي التصلبي العصيدي

CAHEA (AMA)
Committee on Allied Health Education and Accreditation — لجنة التعليم والترخيص للمهن الطبية المساعدة

Cal
large calorie (kilocalorie) — سُعر (كالوري) كبير (= كيلو كالوري) (وحدة حرارية)

cal
calorie — سُعر (كالوري) (وحدة حرارية)

calc
calculate — يحسب ، احتسب

calcd
calculated — محسوب

Calef.
L. calefac (make warm) — دفّئ (باللاتينية)
L. calefactus (warmed) — مُسخّن ، مدفى (باللاتينية)

CALGB
cancer and leukemia group B — السرطان وابيضاض الدم من المجموعة (B)

CALLA
common acute lymphoblastic leukemia antigen — مستضد الابيضاض اللمفاوي الحاد الشائع

CAM
chorioallantoic membrane — الغشاء السقائي المشيمائي
contralateral axillary metastasis — النقيلة الإبطية بالجانب المقابل

CAMP
cyclophospharnide, doxorubicin, methotrexate, and procarbazine — سيكلوفوسفاميد ، ودوكسوروبيسين ، وميثوتريكسات وبروكاربازين (مركب دوائي)

cAMP
cyclic adenosine monophosphate — الأدينوزين أحادي الفسفات الحلقي

CANCERLIT — كانسرليت
an electronic database including citations relating to oncology — قاعدة بيانات إلكترونية مشتملة على المراجع المتعلقة بعلم الأورام

CAO
chronic airway obstruction — انسداد الممرات الهوائية المزمن

CaOC
cathodal opening contraction — تقلص الفتح المهبطي

CaOCl
cathodal opening clonus — رمع الفتح المهبطي

CAP
capsule — محفظة
catabolite activator protein — البروتين المنشط للمقيضة
cellulose acetate phthalate — فثالات أسيتات السيلولوز
chloramphenicol — كلور أمفينيكول (مضاد حيوى)
cyclophosphamide, doxorubicin, and cisplatin — سيكلوفوسفاميد ودوكسوروبيسين وسيسبلاتين (مركب دوائي)
cystine aminopeptidase — أمينوبيبتيداز السيستين

Cap.
- L. capiat (let him take) — دعه يتناول (باللاتينية)

cap
- capsule — محفظة

cap.
- L. capsule (capsule) — محفظة (باللاتينية)

CAPD
- continuous ambulatory peritoneal dialysis — الديال الصفاقي المستمر المتنقل

Capsul.
- L. capsule (capsule) — محفظة (باللاتينية)

CAR
- Canadian Association of Radiologists — الجمعية الكندية لأطباء الأشعة

CARF
- Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities — لجنة منح التراخيص لمؤسسات التأهيل

CAS
- Chemical Abstracts Service — خدمة الملخصات الكيميائية
- Council of Academic Societies — مجلس الجمعيات الأكاديمية

CASS
- Coronary Artery Surgery Study — دراسة جراحة الشريان التاجي

CAT
- Children's Apperception Test — اختبار الإدراك الحسي في الأطفال
- chloramphenicol acetyltransferase — ناقلة أسيتيل الكلورأمفنيكول
- chlormerodrin accumulation test — اختبار تراكم الكلورميرودرين
- computed axial tomography — التصوير المقطعي المحوري المحوسب
- computerized axial tomography — التصوير المقطعي المحوري المحوسب

CAT-CAM
- contoured adducted trochanteric-controlled alignment method — طريقة الترصيف المحوطة المقربة المحكمة بالمدورين (طب العظام)

Cath.
- L. catharticus (cathartic) — مُسهل (باللاتينية)

cath
- catheter — قثطار
- catheterization — قثطرة

CATS
- combined abdominal transsacral resection technique — تقنية الاستئصال البطني عبر العجزي المشترك

CAV
- congenital absence of vagina — غياب المهبل الخلقي
- congenital adrenal virilism — الاسترجال الكظري الخلقي
- cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine — سيكلوفوسفاميد ، ودوكسوروبيسين وڤنكريستين (مركب دوائي)

CAVB
- complete atrioventricular block — إحصار أذيني ـ بطيني تام

CAVmP
- cyclophosphamide, doxorubicin, teniposide, and prednisone — سيكلوفوسفاميد ، دوكسوروبيسين ، تنيبوزيد وبريدنيزون (مركب دوائي)

CAVP
- lomustine, melphalan, etoposide, and prednisone — لومستين ، ميلفالان ، إيتوبوزيد وبريدنيزون (مركب دوائي)

CAWO
- closing abductory wedge osteotomy — القص الإسفيني الإبعادي الإقفالي للعظم

CB
- L. Chirurgiae Baccalaureus (Bachelor of Surgery) — بكالوريوس الجراحة (باللاتينية)
- chronic bronchitis — التهاب القصبات المزمن
- contrast baths — حمامات التباين

Cb
- symbol for columbium — رمز الكولومبيوم (الإسم القديم للنيوبيوم **niobium**)

CBA
- chronic bronchitis with asthma — التهاب القصبات المزمن مع الربو

CBB

Coomassie brilliant blue أزرق كوماسي المتألق (صبغ بروتيني يستخدم في الرحلان الكهربي نظراً لحساسيته الفائقة)

CBC

complete blood count تعداد دموي كامل

cbc

complete blood count تعداد دموي كامل

CBD

closed bladder drainag تصريف المثانة المغلق

common bile duct قناة الصفراء الأصلية

CBF

cerebral blood flow تدفق الدم المخي

coronary blood flow تدفق الدم التاجي

CBG

corticosteroid-binding globulin الجلوبولين الرابط للكورتيكوستيرويد

cortisol-binding globulin الجلوبولين الرابط للكورتيزول

CBI

continuous bladder irrigation إرواء المثانة المستمر

Cbl

cobalamin كوبالامين

CBPP

contagious bovine pleuropneumonia التهاب الجنب والرئة البقرية المُعدية

CBR

complete bed rest راحة تامة في السرير

CBS

chronic brain syndrome متلازمة دماغية مزمنة

CBV

central blood volume حجم الدم المركزي

circulating blood volume حجم الدم الدوار

corrected blood volume حجم الدم المُصحَّح

cyclophosphamide, carmustine, and etoposide سيكلوفوسفاميد ، كارموستين وإيتوبوزيد (مركب دوائي)

Cbz

carbobenzoxy (benzyloxycarbonyl) كاربوبينزوكسي (بنزيل أوكسي كاربونيل)

CC

cardiac cycle الدورة القلبية

chief complaint الشكوى الرئيسية

circulatory collapse وهط دوراني

colony count تعداد المستعمرة (جراثيم)

compound cathartic المركب المسهِّل

coracoclavicular غرابي ترقوي

cord compression انضغاط الحبل (الشوكي)

corpus callosum الجسم الثفني

costochondral ضلعي غضروفي

creatinine clearance تصفية الكرياتينين

critical condition حالة حرجة

cc

cubic centimeter سنتي متر مكعب

cc

with meals مع الوجبات

CCA

chick-cell agglutination تراص خلايا الكتكوت

chimpanzee coryza agent (respiratory syncytial virus) عامل زكام الشمبانزي (الفيروس المخلوي التنفسي)

common carotid artery الشريان السباتي الأصلي

congenital contractural arachnodactyly عنكبية الأصابع التقفعية الخلقية

CCAT

conglutinating complement absorption test اختبار امتصاص المتممة المتلازب

CCC

cathodal closure contraction تقلص الغلق المهبطي (الكاثودي)

chronic calculous cholecystitis التهاب المرارة الحصوي المزمن

CCCl

cathodal closure clonus رمع الغلق المهبطي (الكاثودي)

CCDPHP

Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion مركز الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة

CCE

clubbing, cyanosis, and edema تعجر ، زراق ، ووذمة

CCF

cephalin-cholesterol flocculation تندف السيفالين ـ الكوليستيرول

compound comminuted كسر مفتت مركب

fracture
congestive cardiac failure — قصور قلبي احتقاني
crystal-induced chemotactic factor — عامل الانجذاب الكيميائي المحرّض بالبلورة

CCI
chronic coronary insufficiency — قصور تاجي مزمن

CCK
cholecystokinin — كوليسيستوكينين

CCK-PZ
cholecystokinin - pancreozymin — كوليسيستوكينين ـ بانكريوزيمين

CCM
critical care medicine — طب رعاية الحالات الحرجة

c cm
cubic centimeter — سنتي متر مكعب

CCME
Coordinating Council on Medical Education — المجلس التنسيقي للتعليم الطبي

CCMSU
clean catch midstream urine — عيّنة بول نظيفة مأخوذة من منتصف التيار

CCNU
lomustine — لوموستين (دواء مضاد للأورام)

Ccnu
lomustine — لوموستين (دواء مضاد للأورام)

CCP
ciliocytophthoria — تهتك الخلايا المهدبة

Ccr
creatinine clearance — تصفية الكرياتينين

CCRN
Critical Care Registered Nurse — ممرضة مسجلة للرعاية الحرجة

CCS
Cronkhite-Canada syndrome — متلازمة كرونكيت ـ كندا

CCSG
Children's Cancer Study Group — مجموعة دراسة سرطان الأطفال

CCTe
cathodal closure tetanus — تكزز الغلق المهبطي

CCU
Cherry-Crandall units — وحدات شيري ـ كراندال
coronary care unit — وحدة العناية التاجية

CCV
conductivity cell volume — حجم الخلية الموصلي

CCW
counterclockwise — عكس اتجاه عقارب الساعة

CD
cadaver donor — متبرع بجثته
cardiac disease — مرض قلبي
cardiac dullness — أصمية قلبية
cardiovascular disease — مرض قلبي وعائي
caudal — ذنبي
cesarean delivered — مولود بالقيصرية
circular dichroism — ازدواج اللون الدائري
cluster designation — التصنيف العنقودي
common duct — القناة الأصلية المشتركة
compact optical disk — القرص البصري المكتنز
L. conjugate diagonalis (diagonal conjugate diameter) — القطر المتقارن المائل (باللاتينية) (توليد)
consanguineous donor — متبرع ذو قرابة
convulsive disorder — اضطراب اختلاجي
curative dose — الجرعة الشافية
cystic duct — القناة المرارية

Cd
cadmium — الكادميوم (عنصر معدني ، الرقم الذري 48)
coccygeal — عصعصي

cd
candela — القنديلة (وحدة شدة الإنارة ، شمعة (باللاتينية)

C&D
cystoscopy and dilatation — تنظير المثانة والتوسيع (للإحليل)

C/D
cigarettes per day — (كذا) سيجارة في اليوم

CDA
chenodeoxycholic acid — حمض الكينوديوكسي كوليك
congenital dyserythropoietic anemia — فقر الدم الناجم عن خلل تكون الحمر

CDB
cough and deep breath — سعال ونفس عميق

C&DB

cough and deep breath سعال ونفس عميق

CDC

calculated date of confinement تاريخ الولادة المحسوب (توليد)

Centers for Disease Control مراكز مكافحة الأمراض

chenodeoxycholic acid حمض الكينوديوكسي كوليك

CDC/AIDS

Centers for Disease Control definition of acquired immuno deficiency syndrome تعريف مراكز مكافحة الأمراض لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

CDD

certificate of disability for discharge شهادة عجز للخروج (من المستشفى)

CDE

blood group antigen (Rh system) مستضدات مجموعات الدم (نظام ريزوس)

canine distemper encephalitis التهاب الدماغ الكلبي الناجم عن مرض الحيوانات

chlordiazepoxide كلورديازيبوكسيد

common duct exploration استكشاف القناة الأصلية

cdf

cumulative distribution function وظيفة التوزيع التراكمي

CDGP

constitutional delay of growth and puberty التأخر البنيوي للنمو والبلوغ

CDH

ceramide dihexoside سيراميد ثنائي الهكسوزيد

congenital dislocation of hip خلع الورك الخلقي

congenitally dysplastic hip الورك المثدون خلقيا

CDI

Cotrel-Dubousset instrumentation استعمال أدوات كوتريل - دوبوسيه

CDL

chlorodeoxylincomycin كلوروديوكسي لينكوميسين

cDNA

complementary DNA الدنا المتمم (الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين المُتمم)

copy DNA نموذج (نسخة) الدنا (نموذج الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين)

CDP

continuous distending pressure الضغط التمددي المستمر

cytidine diphosphate سيتيدين ثنائي الفسفات

CDS

cul-de-sac ردب [جيب دوجلاس] (بالفرنسية)

cdyn

dynamic compliance مطاوعة ديناميكية

CE

California encephalitis التهاب الدماغ الكاليفورني

cardiac enlargement تضخم قلبي

chick embryo جنين الكتكوت

cholesterol esters إسترات الكوليستيرول

contractile element العنصر القَلُوص

Ce

cerium السيريوم(عنصر معدني ، الرقم الذري 58)

CEA

carcinoembryonic antigen المستضد السرطاني الجنيني

crystalline egg albumin ألبومين البيض البلوري

CEEV

Central European encephalitis virus ڤيروس التهاب الدماغ الوسط أوروبي

CEF

chick embryo fibroblast الأورمة الليفية لجنين الكتكوت

Cel

Celsius درجة الحرارة السلزية

Cels

Celsius درجة الحرارة السلزية

CEM

lomustine, etoposide, and methotrexate لوموستين ، إيتوبوزيد وميثوتريكسات (مركب دوائي)

CEN

Certified Emergency Nurse ممرضة طوارئ مُجَازة

CEP

congenital erythropoietic porphyria البرفيرية المكونة للكريات الحمر الخلقية

countercurrent electrophoresis الرحلان الكهربي بالتيار المعاكس

lomustine, etoposide, and لوموستين ، إيتوبوزيد

prednimustine — وبريد نيموستين (مركب دوائي)

CER

ceruloplasmin — سيرولوبلازمين

conditioned emotional response — الاستجابة الانفعالية المتكيفة

conditioned escape rsponse — استجابة الهروب المتكيفة

Cer

ceramide — سيراميد

cerv

cervical — رقبي ، عنقي

ces

central excitatory state — حالة استثارة مركزية

CESD

cholesteryl ester storage disease — مرض اختزان إستر الكولستيريل

CEU

continuing education unit — وحدة التعليم المستمر

CEVD

lomustine, etoposide, vindesine, and dexamethasone — لوموستين ، إيتوبوزيد ، ڤينديزين وديكساميثازون (مركب دوائي)

CF

antibody titer — عيار الضد

calibration factor — عامل التعيير

cancer-free — خال من السرطان

carbolfuchsin — كربول فوكسين (ملون للجراثيم)

cardiac failure — فشل (قصور) قلبي

carrier-free — خال من الحامل

chemotactic factor — عامل الانجذاب الكيميائي

chest and left leg — الصدر والساق اليسرى

Chiari-Frommel syndrome — متلازمة كياري ـ فروميل

Christmas factor — عامل «كريسماس» [العامل التاسع لتخثر الدم]

citrovorum factor — حمض الفولينيك

complement fixation — تثبيت المتممة

contractile force — قوة قلوصة

count fingers — يُعد الأصابع

cystic fibrosis — التليف الكيسي

Cf

californium — الكاليفورنيوم (عنصر صناعي ، الرقم الذري 98 ، تم تحضيره أولاً في مختبرات جامعة كاليفورنيا)

cf

L. confer (bring together, compare) — ضم ، قارن (باللاتينية)

CFA

complement-fixating antibody — ضد مثبت للمتممة

complete Freund's adjuvant — مساعد فرويند التام (جول ~ ، -1960 ، 1890 ، بكتريولوجي أمريكي)

CFF

critical flicker fusion test — اختبار الاندماج التَوْمَاضي الحرج

cff

critical fusion frequency — تردد الاندماج الحرج

CFMG

Commission on Foreign Medical Graduates — لجنة خريجي الطب الأجانب (في الولايات المتحدة)

CFP

chronic false-positive — إيجابي كاذب مزمن

cyclophosphamide, 5 - fluorouracil, and prednisone — سيكلوفوسفاميد ، 5 ـ فلوروبوراسيل ، وبريدنيزون (مركب دوائي)

cystic fibrosis of the pancreas — التليف الكيسي للبنكرياس

CFPMV

cyclophosphamide, 5-fluorouracil, prednisone, mthotrexate, and vincristine — سيكلوفوسفاميد ، 5 ـ فلوروبوراسيل ، بريدنيزون ، ميثوتريكسات وڤينكرستين (مركب دوائي)

CFPT

cyclophosphamide, 5-fluorouracil, prednisone, and tamoxifen — سيكلوفوسفاميد ، 5 ـ فلوروبوراسيل ، بريدنيزون وتاموكسيفين (مركب دوائي)

CFR

Code of Federal Regulations — دستور القواعد الفيدرالية

CFT

complement-fixation test — اختبار تثبيت المتممة

CFU

colony-forming unit — وحدة تكوين المستعمرة

CFU-C

colony-forming unit-culture — مزرعة وحدة تكوين المستعمرة

CFU-E
- **colony-forming unit-erythroid** — الوحدة الحمرائية المكونة للمستعمرة

CFU/mL
- **colony-forming units/mL** — وحدات تكوين المستعمرة/ ملي لتر

CFU-S
- **colony-forming unit-spleen** — وحدة الطحال المكونة للمستعمرة

CFWM
- **cancer-free white mouse** — فأر أبيض خال من السرطان

CG
- **Cardio-Green** — اسم تجاري لأخضر الإندوسيانين (صبغ)
- **chorionic gonadotropin** — موجهة القند المشيمائية
- **chronic glomerulonephritis** — التهاب الكلوة الكبيبي المزمن
- **colloidal gold** — الذهب الغرواني
- **phosgene (choking gas)** — فوسجين (الغاز الخانق)

cg
- **centigram** — سنتي جرام ($=10^{-2}$ جرام ؛ وحدة كتلة)

CGA
- **catabolite gene activator** — منشط جين المقيضة
- **chromogranin-A** — كروموجرانين-A

CGD
- **chronic granulomatous disease** — مرض حبيبومي مزمن

CGFNS
- **Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools** — لجنة خريجات كليات التمريض الأجنبية (في الولايات المتحدة)

cgi
- **clinical global impression** — انطباع إكلينيكي شامل

CGL
- **chronic granulocytic leukemia** — ابيضاض الدم المزمن بالمحببات
- **correction with glasses** — تصحيح (البصر) بالنظارات

cgm
- **centigram** — سنتي جرام ($=10^{-2}$ جرام) (وحدة كتلة)

cGMP
- **cyclic guanosine monophosphate** — جوانوزين أحادي الفسفات الحَلَقي

CGN
- **chronic glomerulonephritis** — التهاب كبيبات الكلى المزمن

CGNA
- **Canadian Gerontological Nursing Association** — الرابطة الكندية لتمريض المسنين

CG/OQ
- **cerebral glucose oxygen quotient** — حاصل أكسجين الجلوكوز المخي

CGP
- **choline glycerophosphatide** — جليسيروفوسفاتيد الكولين
- **chorionic growth hormone prolactin** — برولاكتين هرمون النمو المشيمائي
- **circulating granulocyte pool** — جُميعة الكريات المحببة الدورانية

CGPM
- **Conference Generale des Poids et Mesures** — المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (بالفرنسية)

CGS
- **centimeter-gram- second** — سنتي متر-جرام-ثانية (نظام وحدات)

cgs
- **centimeter-gram-second** — سنتي متر-جرام-ثانية (نظام وحدات)

CGT
- **chorionic gonadotropin** — موجهة القند المشيمائية

CGTT
- **cortisone glucose tolerance test** — اختبار الكورتيزون لتحمل الجلوكوز

cGy
- **centigray** — سنتي جراي ($=10^{-2}$ جراي) (وحدة الجرعة المشعة الممتصة)

CH
- **cholesterol** — كوليستيرول
- **crown-heel (length of fetus)** — التاج (قمة الرأس) العقب (طول الجنين) [توليد]

CH_{50}
- **total serum hemolytic complement** — المتممة الانحلالية المصلية الكلية

Ch
- **chapter** — فصل

Ch[1]

Christchurch chromosome كروموسوم كرايستشيرش (كروموسوم شاذ- غالبا رقم 21 أو 22- يوجد في بعض حالات ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن)

ch

chest صدر

ch[1]

Christchurch chromosome كروموسوم (صبغي) كرايستشيرش

CH50

total serum hemolytic complement المتممة الانحلالية المصلية الكلية

CHA

congenital hypoplastic anemia فقرالدم ناقص التنسج الولادي

cyclohexylamine سيكلوهيكسيلامين

CHAC

cyclophosphamide, hexamethylmelamine, doxorubicin, and carboplatin سيكلوفوسفاميد ، سداسي ميثيل الميلامين ، دوكسوروبيسين وكاربوبلاتين (مركب دوائي)

CHAD

cyclophosphamide, hexamethylmelamine, doxorubicin, and cisplatin سيكلوفوسفاميد ، سداسي ميثيل الميلامين ، دوكسوروبيسين وسيسبلاتين (مركب دوائي)

CHAMOCA

cyclophosphamide, hydroxyurea, dactinomycin, methotrexate, vicristine, and doxorubicin سيكلوفوسفاميد ، هيدروكسي يوريا ، داكتينوميسين ، ميثوتريكسات ، فينكرستين ودوكسوروبيسين (مركب دوائي)

CHAMPUS

Civilian Health and Medical Program of the Uniformed Services برنامج الصحة المدنية والبرنامج الطبي للخدمات العسكرية

CHAP

cyclophosphamide, hexamethylmelamine, doxorubicin, and cisplatin سيكلوفوسفاميد ، سداسي ميثيل الميلامين ، دوكسوروبيسين وسيسبلاتين (مركب دوائي)

chart.

L. charta (paper) ورقة (باللاتينية)

CHB

complete heart block إحصار القلب التام

Ch.B.

L. Chirurgiae Baccalaureus (Bachelor of Surgery) بكالوريوس الجراحة (باللاتينية)

CHD

childhood disease مرض طفولي

congenital heart disease مرض القلب الخلقي

congestive heart disease مرض القلب الاحتقاني

coronary heart disease مرض القلب التاجي

ChD

L. Chirurgiae Doctor (Doctor of Surgery) دكتور في الجراحة (باللاتينية)

ChE

cholinesterase كولينستيراز (إنزيم)

Chem

chemotherapy معالجة كيميائية

chem

chemical كيميائي

chemistry كيمياء

ChemoRx

chemotherapy معالجة كيميائية

CHF

congestive heart failure فشل القلب الاحتقاني

cyclophosphamide, hexamethylmelamine, and 5-fluorouracil سيكلوفوسفاميد ، سداسي ميثيل الميلامين ، و5 فلوروريوراسيل (مركب دوائي)

CHH

cartilage-hair hypoplasia نقص تنسج الشعر والغضاريف

CHINA

chronic infectious neuropathic (or neurotropic) agent عامل اعتلال عصبي (أوعصبي التأثير) عدوائي مزمن

CHL

chlorambucil كلورأمبيوسيل (دواء مضاد للأورام)

chloramphenicol كلورأمفينيكول (مضاد حيوي)

Chl

chlorambucil كلورأمبيوسيل (دواء مضاد للأورام)

ChlVPP

chlorambucil, vinblastine, كلورأمبيوسيل ، ڤينبلاستين ،
procarbazine, بروكاربازين ،
and prednisone وبريدنيزون (مركب دوائي)

ChM
L. Chirurgiae Magister ماجستير في الجراحة
(Master of Surgery) (باللاتينية)

CHMD
clinical hyaline membrane مرض الغشاء الزجاجي
disease الإكلينيكي

CHN
central hemorrhagic النخر النزفي المركزي
necrosis

CHO
carbohydrate السكريات ، الكربوهيدرات
Chinese hamster ovary مبيض الجرذ الأرنبي
(الهمستر) الصيني
cyclophosphamide, سيكلوفوسفاميد ،
doxorubicin, دوكسوروبيسين
and vincristine وڤينكرستين (مركب دوائي)

Cho
choline كولين

Chol
cholesterol كوليستيرول

chol
cholesterol كوليستيرول

CHOP
cyclophosphamide, سيكلوفوسفاميد ،
doxorubicin, vincristine, دوكسوروبيسين ، ڤينكرستين
and prednisone وبريدنيزون (مركب دوائي)

CHOP-B
cyclophosphamide, سيكلوفوسفاميد ،
doxorubicin, vincristine, دوكسوروبيسين ،
prednisone, and ڤينكرستين ، بريدنيزون
bleomycin وبليوميسين (مركب دوائي)

CHOP-BLEO
bleomycin, بليوميسين ،
cyclophosphamide, سيكلوفوسفاميد ،
doxorubicin, vincristine, دوكسوروبيسين ، ڤينكرستين
and prednisone وبريدنيزون (مركب دوائي)

CHPX
chickenpox الحُماق (الجديري)

chpx
chickenpox الحُماق (الجديري)

chr
chronic مزمن

Chr.
Chromobacterium المُتصابغة (جنس من الجراثيم)

CHS
Chediak-Higashi متلازمة شيدياك ـ هيجاشي
syndrome
cholinesterase كولينسترارز (إنزيم)
contact hypersensitivity فرط التحسس التماسي

CI
cardiac index المنسب القلبي
cardiac insufficiency قصور قلبي
cerebral infarction احتشاء مخي
chemotherapeutic index المنسب العلاجي الكيميائي
colloidal iron حديد غرواني
color index حاصل الدم
(نسبة كمية الهيموجلوبين إلى عدد
الكريات الحمر)
Colour Index المنسب اللوني (مطبوعة متخصصة
في كيمياء الأصباغ ؛ وتندرج كل منها
تحت رقم خاص من 5 حروف)
confidence interval فترة الثقة
continuous infusion تسريب مستمر
coronary insufficiency قصور تاجي
crystalline insulin أنسولين بلوري

Ci
curie كوري (وحدة النشاط الاشعاعي)

CIB
Current Intelligence لائحة بيانات الذكاء السائد
Bulletin

Cib.
L. cibus (food) طعام وجبة (باللاتينية)

CICU
coronary (cardiac) وحدة العناية التاجية (القلبية)
intensive care unit المركزة

CID
cytomegalic inclusion المرض الاشتمالي المُضخّم
disease للخلايا

CIDS
cellular متلازمة نقص المناعة الخلوية
immunodeficiency

syndrome

CIE

counterimmunoelectrophoreis — الرحلان الكهربي المناعي العكسي

countercurrent immunoelectrophoresis — الرحلان الكهربي المناعي ذو التيار العكسي

CIEP

counterimmunoelectrophoresis — الرحلان الكهربي المناعي العكسي

CIF

clonal inhibitory factor — عامل مثبط نسيلي

cig

cigarettes — سجائر

CIH

Certificate in Industrial Health — شهادة في الصحة الصناعية

Ci-hr

curie - hour — كوري ـ ساعة

CIN

cefsulodin-irgasan-novobiocin (agar) — سيفسولودين ـ إيرجازان ـ نوفوبيوسين (أجار)

cervical intraepithelial neoplasia — ورم عنقي داخل الظهارة (أمراض النساء)

chronic interstitial nephritis — التهاب الكلية الخلالي المزمن

circ

circulation — دوران

circumcision — ختان

CIS

carcinoma in situ — سرطانة لابدة (في موضعها)

central inhibitory state — حالة تثبيط مركزية

***cis*-DDP**

cisplatin — سيسبلاتين

CIXU

constant infusion excretory urogram — تصوير الجهاز البولي الإفراغي بالتسريب المستمر

CJD

Creutzleldt-Jakob disease — مرض كرويتزفلت ـ ياكوب (الاعتلال الدماغي الفيروسي الإسفنجي الشكل) [مرض جنون البقر]

CK

check — يدقق ، يفحص

creatine kinase — كيناز الكرياتين (إنزيم)

CKD

Creutzfeldt-Jakob disease — مرض كرويتز فلت ـ ياكوب (=الاعتلال الدماغي الفيروسي الإسفنجي الشكل)

C/kg

coulomb per kilogram — كولوم لكل كيلو جرام (كولوم= وحدة الشحنة الكهربية)

CL

chest and left arm — الصدر والذراع اليسرى

critical list — قائمة الحالات الحرجة

Cl

chloride — كلوريد

chlorine — كلورين

C*l*

Clostridium — المطثية (نوع من الجراثيم)

cl

centiliter — سنتي لتر(=10^{-2} لتر : وحدة سوائل)

corpus luteum — الجسم الأصفر (تشريح)

CLAS

congenital localized absence of skin — غياب الجلد الموضعي الخلقي

CLBBB

complete left bundle branch block — الإحصار التام لفرع الحزيمة الأيسر (في القلب)

CL/CP

cleft lip and cleft palate — الشفة المشقوقة والحنك المشقوق

CLD

chronic liver disease — مرض الكبد المزمن

chronic lung disease — مرض الرئة المزمن

CLH

chronic lobular hepatitis — التهاب الكبد الفصيصي المزمن

ClHgBzO

chloromercuribenzoate — كلورومركوري بنزوات

clin

Clinic — عيادة

clinical — سريري (إكلينيكي)

CLIP

corticotropin-like intermediate lobe peptide — ببتيد الفص المتوسط شبيه الموجهة القشرية

CLL

chronic lymphatic leukemia — الابيضاض اللمفاوي المزمن

chronic lymphocytic leukemia — الابيضاض اللمفاوي المزمن

CLMA

Clinical Laboratory Management Association — جمعية إدارة المختبرات الإكلينيكية

CLO

cod liver oil — زيت السمك (=زيت كبد القُدّ)

CLQ

cognitive laterality quotient — حاصل المعرفة الجانبية

CLSH

corpus luteum-stimulating hormone — الهرمون المحرض للجسم الأصفر

CLSL

chronic lymphosarcoma (cell) leukemia — ابيضاض (خلايا) الساركومة اللمفية المزمنة

CLT

clot-lysis time — زمن انحلال (الجلطة) الخثرة

ClT

total plasma clearance — تصفية كامل المصل

CM

capreomycin — كابريوميسين (دواء مضاد للتدرن)

cardiac monitor — مرقب قلبي

L. Chirurgiae Magister (Master of Surgery) — ماجستير في الجراحة (باللاتينية)

chloroquine - mepacrine — كلوروكين ـ ميباكرين

cochlear microphonics — سمعيات قوقعية

costal margin — الهامش الضلعي

cow's milk — لبن البقر

C.M.

L. eras mane (tomorrow morning) — غداً صباحاً (باللاتينية)

Cm

curium — الكوريوم [عنصر صناعي ، الرقم الذري 96]

cM

centimorgan — سنتي مورجان (= 10^{-2} مورجان) (وحدة خرائط الكروموسومات)

cm

centimeter — سنتي متر (=10^{-2} متر) (وحدة مسافة)

cm^2

square centimeter — سنتي متر مربع

cm^3

cubic centimeter — سنتي متر مكعب

CMA

California Medical Association — جمعية كاليفورنيا الطبية

Canadian Medical Association — الجمعية الطبية الكندية

Certified Medical Assistant — مساعد طبي مجاز

Chinese Medical Association — الجمعية الطبية الصينية

CMAJ

Canadian Medical Association Journal — مجلة الجمعية الطبية الكندية

CMAP

compound muscle action potential — كمون فعل العضلة المركب

CMB

carbolic methylene blue — أزرق الميثيلين الكربولي

***p* -CMB**

para - chloromercuribenzoate — بارا ـ كلوروبنزوات الزئبق

CMC

carboxymethylcellulose — كاربوكسي ميثيل سلولوز

carpometacarpal — رسغي سنعي

critical micelle concentration — التركيز الحرج للمُذَيْلات

CM-cellulose

carboxymethylcellulose — كاربوكسي ميثيل سلولوز

CMD

cerebromacular degeneration — تنكس مخي بقعي

Current Medical Dialog — الحوار الطبي السائد

CME

continuing medical education — التعليم الطبي المستمر

Council on Medical Education — مجلس التعليم الطبي

CMF

chondromyxoid fibroma — ورم ليفي غُضروفي مُخاطي

cyclophosphamide (Cytoxan), methotrexate, and 5-fluorouracil سيكلوفوسفاميد (سيتوكسان) ، ميثوتريكسات ، و5ـ فلوروواسيل (مركب دوائي)

CMFP

cyclophosphamide, methotrexate, 5-fluorouracil, and prednisone سيكلوفوسفاميد ، ميثوتريكسات ، و5ـ فلوروويوراسيل ، وبريدنيزون (مركب دوائي)

CMFVP

cyclophosphamide, methotrexate, 5-fluorouracil, vincristine, and prednisone سيكلوفوسفاميد ، ميثوتريكسات ، 5ـ فلوروويوراسيل ، فينكرستين ، وبريدنيزون (مركب دوائي)

CMG

cystometrogram مخطط قياس الضغط(داخل المثانة)

CMGN

chronic membranous glomerulonephritis التهاب كبيبات الكلية الغشائي المزمن

CMHC

community mental health center المركز المجتمعي للصحة العقلية

CMI

carbohydrate metabolism index منسب استقلاب السكريات

cell-mediated immunity المناعة المتواسطة خلوياً

CMID

cytomegalic inclusion disease المرض المُضخّم للخلايا الاشتمالية

c/min

cycles per minute دورة في الدقيقة

CML

cell-mediated lymphocytotoxicity تسمم اللمفاويات الموسط خلويا

cell-mediated lympholysis الانحلال اللمفي الموسط خلوياً

chronic myelocytic leukemia ابيضاض نقوي مزمن

chronic myelogenous leukemia ابيضاض نقوي مزمن

CMM

cutaneous malignant melanoma ورم ميلانيني جلدي خبيث

c mm

cubic millimeter مللي متر مكعب

CMN

cystic medial necrosis نخر إنسي كيسي

CMN-AA

cystic medial necrosis of the ascending aorta نخر إنسي كيسي في الأورطي الصاعد

CMO

cardiac minute output النتاج القلبي في الدقيقة

cMo

centimorgan سنتي مورجان (وحدة خرائط الكروموسومات)

CMoL

chronic monocytic (monoblastic) leukemia الابيضاض المزمن بالوحيدات

C-MOPP

cyclophosphamide, mechlorethamine, vincristine, procarbazine and prednisone سيكلوفوسفاميد ، ميكلوريثامين ، فينكرستين ، بروكاربازين وبريدنيزون (مركب دوائي)

CMOS

complementary metal oxide semiconductor شبه الموصل الأكسيدي المعدني المتمم

CMP

cardiomyopathy اعتلال عضلة القلب

cytidine monophosphate سيتيدين أحادي الفسفات

CMR

cerebral metabolic rate معدل الاستقلاب المخي

crude mortality rate المعدل التقريبي للوفيات ـ المعدل الخام للوفيات

CMRG

cerebral metabolic rate of glucose معدل الاستقلاب المخي للجلوكوز

CMRNG

chromosomally resistant *Neisseria gonorrhoeae* النيسرية البنية ذات المقاومة الصبغية (الكروموسومية)

CMRO

cerebral metabolic rate of oxygen معدل الاستقلاب المخي للأكسجين

$CMRO_2$

cerebral metabolic rate of oxygen معدل الاستقلاب المخي للأكسجين

CMRR

common mode rejection ratio — نسبة الرفض للنمط المشترك

CMS

circulation, muscle sensation — إحساس العضل بالدوران

Clyde Mood Scale — ميزان كلايد ـ مود

c.m.s.

L. eras mane sumendus (to be taken tomorrow morning) — يؤخذ صباح الغد ، غداً صباحاً (باللاتينية)

CMSS

Council of Medical Specialty Societies — مجلس جمعيات التخصصات الطبية

CMT

Certified Medical Transcriptionist — كاتب طبي مجاز

CMU

chlorophenyldimethylurea — كلوروفينيل ثنائي ميثيل اليوريا

CMV

cisplatin, methotrexate, and vinblastine — سيسبلاتين ، ميثوتريكسات وڤينبلاستين (مركب دوائي)

cytomegalovirus — الڤيروس المضخم للخلايا

CN

cranial nerve — عصب قحفي

cyanide anion — أنيون سيانيدي

cyanogen — سيانوجين (غاز سام)

L.cras nocte (tomorrow night) — مساء الغد (باللاتينية)

CNA

Canadian Nurses Association — الجمعية الكندية للممرضين والممرضات

CN-Cbl

cyanocobalamin — سيانوكوبالامين (ڤيتامين B_{12})

CNE

chronic nervous exhaustion — إنهاك عصبي مزمن

CNHD

congenital nonspherocytic hemolytic disease — داء انحلال خلايا الدم اللاكروية الخلقي

CNL

cardiolipin natural lecithin — اللسثين الطبيعي للكارديوليبين

CNM

Certified Nurse-Midwife — ممرضة ـ قابلة مُجازة (قانونية)

CNP

continuous negative pressure — ضغط سلبي مستمر

CNS

central nervous system — الجهاز العصبي المركزي

c.n.s

L. eras nocte sumendus (to be taken tomorrow night) — يؤخذ مساء الغد (باللاتينية)

CNV

conative negative variation — التباين الإرادي السلبي

contingent negative variation — التباين العَرَضي السلبي

CO

carbon monoxide — أول أكسيد الكربون

cardiac output — النتاج القلبي

castor oil — زيت الخروع

centric occlusion — انسداد مركزي

cervicoaxial — رقبي محوري

coenzyme — تميم الإنزيم

compound — مركب

corneal opacity — عتامة قرنوية

C/O

check out — يغادر (المستشفى)

complains of — يشكو من

CO_2

carbon dioxide — ثاني أكسيد الكربون

Co

cobalt — الكوبالت (عنصر معدني ، الرقم الذري 27)

COA

Canadian Orthopaedic Association — الجمعية الكندية لجراحة العظام

CoA

coenzyme A — تميم الإنزيم ـA

COAD

chronic obstructive airway disease — مرض المسالك الهوائية السادّ المزمن

coag

coagulation — تخثر ، تجلط

COAP

cyclophosphamide, vincristine, cytarabine, prednisone — سيكلوفوسفاميد ، ڤينكرستين ، سيتارابين ، بريد نيزون (مركب دوائي)

CoA-SH

coenzyme A — تميم الإنزيم A

COBMAM

cyclophosphamide, vincristine, bleomycin, methotrexate, doxorubicin, and semustine — سيكلوفوساميد ، ڤينكرستين ، بليوميسين ، ميثوتريكسات ، دوكسوروبيسين ، وسيموستين (مركب دوائي)

COBS

cesarean-obtained barrier-sustained — الولادة القيصرية للحيوانات في بيئة من الجراثيم والمحفوظة تحت نفس الظروف

COBT

chronic obstruction of biliary tract — انسداد السبيل الصفراوي المزمن

COC

calcifying odontogenic cyst — كيسة متكلسة سنية المنشأ

cathodal opening clonus — رمع الفتح المهبطي (الكاثودي)

cathodal opening contraction — تقلص الفتح المهبطي (الكاثودي)

coccygeal — عصعصي

cochl.

L. cochleare (a spoonful) — ملء ملعقة (باللاتينية)

cochl. amp.

L. cochleare amplum (a heaping spoonful) — ملء ملعقة مفعمة (باللاتينية)

cochl. mag.

L. cochleare magnum (a tablespoonful) — ملء ملعقة طعام (باللاتينية)

cochl. med.

L. cochleare medium (a dessertspoonful) — ملء ملعقة حلوى (باللاتينية)

cochl. parv.

L. cochleare parvom (a teaspoonful) — ملء ملعقة شاي (باللاتينية)

COCI

cathodal opening clonus — رمع الفتح المهبطي (الكاثودي)

Coct.

L. coctio (boiling) — يغلي (باللاتينية)

COD

cause of death — سبب الوفاة

cod.

codeine — كودين

coef

coefficient — مُعامل

COG

Central Oncology Group — المجموعة المركزية لعلم الأورام

COGTT

cortisone-primed oral glucose tolerance test — اختبار تحمل الجلوكوز الفموي المحفَّز بالكورتيزون

COH

carbohydrate — السكريات ، الكربوهيدرات

COHb

carboxyhemoglobin — كربوكسي هيموجلوبين

Col.

L. cola (strain) — يصفي (باللاتينية)

Colat.

L. colatus (strained) — مُصفّى (باللاتينية)

COLD

chronic obstructive lung disease — مرض الرئة الانسدادي المزمن

Colet.

L. coletur (let it be strained) — دعه يُصفّى (باللاتينية)

coll.

L. collyrium (eyewash) — غسول العين (باللاتينية)

coll

college — كلية

collat

collateral — رادف

Collut.

L. collutorium (mouth-wash) — غسول الفم (باللاتينية)

coil. vol.

collective volume — الحجم التراكمي

Collyr.

L. collyrium (eyewash) — غسول العين (باللاتينية)

Color

L. coloretur (let it be colored) دعه يتلون (باللاتينية)

COMLA

cyclophosphamide, vincristine, methotrexate, leucovorin, and cytarabine سيكلوفوسفاميد ، ڤينكرستين ، ميثوتريكسات ، لوكوڤورين وسيتارابين (مركب دوائي)

Comm

Committee لجنة

commn.

commission تفويض ، مهمة ، لجنة

commissioner عضو لجنة ، مندوب ، مفوض

COMP

cyclophosphamide , vincristine, methotrexate, and prednisone سيكلوفوسفاميد ، ڤينكرستين ، ميثوتريكسات وبريدنيزون (مركب دوائي)

Comp.

L. compositus (compound) مركب (باللاتينية)

compd

compound مركب

complic

complicating مضاعف (مسبب للمضاعفات)

complication(s) مضاعفة (ج : مضاعفات)

compn

composition تركيب

COMT

catechol - *o* - methyltransferase ناقلة الكاتيكول – *o* – ميثيل

CON

certificate of need شهادة إثبات العوز (الحاجة)

ConA

concanavalin A كونكاناڤالين A

conc

concentrated مُركّز

Concis.

L. concisus (cut) (1) مقطع ، (2) مختصر (باللاتينية)

concn

concentration تركيز

conf

conference مؤتمر

config

configuration شكل ، صورة ، هيئة

cong.

L. congius (gallon) جالون (مقياس للسوائل) (باللاتينية)

cong

congress اجتماع ، كونجرس

congen

congenital ولادي ، خِلْقي

Cons.

L. conserve (keep) احفظ (باللاتينية)

const

constant ثابت

constit

constituent مُقوِّم

Cont.

L. contusus (bruised) متكدم (باللاتينية)

contd

continued مستمر

contg

containing محتوٍ (على)

Contin.

L. continuetur (let it be continued) ليستمر (باللاتينية)

Cont. rem.

L. continuetur remedium (Let the medicine be continued) ليستمر العلاج (باللاتينية)

COP

colloid osmotic pressure الضغط التناضحي الغرواني

cyclophosphamide, vincristine, and prednisone سيكلوفوسفاميد ، ڤينكرستين وبريد نيزون (مركب دوائي)

COP-BLAM

cyclophosphamide, vincristine, prednisone, bleomycin, doxorubicin, and procarbazine سيكلوفوسفاميد ، ڤينكرستين ، بريدنيزون ، بليوميسين ، دوكسوروبيسين وبروكاربازين (مركب دوائي)

COPD

chronic obstructive pulmonary disease مرض الرئة المسُد المزمن

COPE

chronic obstructive pulmonary emphysema نُفاخ رئوي ساد مزمن

COPP
cyclophosphamide, vincristine, prednisone, and procarbazine سيكلوفوسفاميد ، ڤينكرستين ، بريدنيزون ، وبروكاربازين (مركب دوائي)

CoQ
coenzyme Q تميم الإنزيم "Q"

Coq .
L. coque (boil) إغلِ (باللاتينية)

Coq . in s. a.
L. coque in sufficiente aqua (boil in sufficient water) إغلِ في كمية كافية من الماء (باللاتينية)

Coq.s.a.
L. coque secundum artem (boil properly) إغلِ جيداً (باللاتينية)

COR
comprehensive outpatient rehabilitation facility مؤسسة للتأهيل الشامل لمرضى العيادة الخارجية
heart قلب

CORA
conditioned orientation reflex audiometry قياس السمع بمنعكس التوجيه المكيّف

cor
corrected مُصحَّح

corr
corrected مُصحَّح

corresp
corresponding متطابق ، متناظر

Cort.
L. cortex (bark) قشرة ، لحاء (باللاتينية)

COS
Canadian Ophthalmological Society جمعية طب العيون الكندية

COTA
Certified Occupational Therapy Assistant مساعد مُجاز في المعالجة المهنية

COTe
cathodal opening tetanus تكزز الفتح المهبطي (الكاثودي)

COTH
Council of Teaching Hospitals مجلس المستشفيات التعليمية

CP
candle power قوة الشمعة
carotid pressure الضغط السباتي
cerebral palsy شلل مخي
chemically pure نقي كيميائياً
chest pain ألم الصدر
chloropurine كلوروبيورين
chloroquine and primaquine (combination tablets) كلوروكين وبريماكين (توليفة حبوب)
chronic pyelonephritis التهاب الكلوة والحويضة المزمن
cleft palate فلح الحنك ـ الحنك المشقوق
closing pressure ضغط الانغلاق
cochlear potential الجهد (الكمون) القوقعي
coproporphyrin كبروبرفيرين
creatine phosphokinase فسفوكيناز الكرياتين (إنزيم)

C&P
cystoscopy and pyelography تنظير المثانة وتصوير الحويضة

C/P
cholesterol-phospholipid ratio نسبة الكوليستيرول للشحم الفسفوري

cp
centipoise سنتبواز (وحدة اللزوجة الحركية)

CPA
cerebellar pontine angle الزاوية الجسرية المخيخية
chlorophenylalanine كلوروفينيل ألانين
cyclophosphamide سيكلوفوسفاميد

C3PA
C3 proactivator سليفة المنشط C3

C3PAase
C3 proactivator convertase محولّة سليفة المنشط C3 (إنزيم)

CPAN
Certified Post Anesthesia Nurse ممرضة مُجازة لفترة ما بعد التخدير

CPAP
continuous positive airway pressure الضغط الإيجابي المستمر للمسلك الهوائي

CPB
cardiopulmonary bypass مجازة قلبية رئوية
competitive protein binding ارتباط البروتين التنافسي

CPC
- **cetylpyridinium chloride** كلوريد السيتيل بيريدينيوم
- **chronic passive congestion** احتقان سلبي مزمن
- **clinicopathological conference** مؤتمر العلوم الإكلينيكية الباثولوجية

CPD
- **cephalopelvic disproportion** اللاتناسب الرأسي الحوضي (توليد)
- **citrate phosphate dextrose compound** مركب دكستروز سترات الفسفات

CPDA-1
- **citrate phosphate dextrose adenine** أدنين دكستروز سترات الفسفات

CPDD
- **calcium pyrophosphate deposition disease** مرض ترسب بيروفسفات الكالسيوم

CPE
- **chronic pulmonary emphysema** نفاخ رئوي مزمن
- **cytopathic effect** التأثيرالمرض للخلايا

C Ped
- **Certified Pedorthist** خبير مجاز في تقويم القدمين

CPH
- **Certificate in Public Health** شهادة في الصحة العامة
- **chronic persistent hepatitis** التهاب الكبد المستمر المزمن

CPHA
- **Committee on Professional and Hospital Activities** لجنة الأنشطة المهنية وأنشطة المستشفيات

CP \ I
- **chest pain or indigestion** ألم الصدر أو عسر الهضم

CPI
- **coronary prognostic index** منسب المستقبلية التاجي

CPIB
- **chlorophenoxyisobutyrate** كلوروفينوكسي أيزوبوتيرات

CPK
- **creatine phosphokinase** فسفوكيناز الكرياتين

CPM
- **continuous passive motion** حركة سلبية مستمرة

cpm
- **counts per minute** عَدّة في الدقيقة

CPN
- **chronic pyelonephritis** التهاب الكلوة والحويضة المزمن

CPNA
- **Certified Pediatric Nurses Association** جمعية ممرضات طب الأطفال المجازات

CPNP
- **Certified Pediatric Nurse Practitioner** ممرضة مجازة ممارسة لطب الأطفال

CPP
- **cerebral perfusion pressure** ضغط التروية المخية
- **cyclopentenophenanthrene** سيكلوبنتينو فينانثرين

CPPB
- **continuous positive pressure breathing** التنفس بضغط إيجابي مستمر

CPPD
- **calcium pyrophosphate dihydrate** بيروفسفات الكالسيوم ثنائي الهيدرات
- **calcium pyrophosphate dihydrate disease** مرض بيروفسفات الكالسيوم ثنائي الهيدرات

CPPV
- **continuous positive pressure ventilation** التهوية بضغط إيجابي مستمر

CPR
- **cardiopulmonary resuscitation** الإنعاش القلبي الرئوي
- **cerebral cortex perfusion rate** معدل تروية القشرة المخية
- **cortisol production rate** معدل إنتاج الكورتيزول

CPS
- **carbamoyl phosphate synthetase** ستتاز الكاربامويل فسفات (إنزيم)
- **Center for Preventive Services** مركز الخدمات الوقائية
- **Compendium of Pharmaceuticals and Specialties** دليل المستحضرات الصيدلية والتخصصات الطبية

CPSI
- **carbamoyl phosphate synthetase I** ستتاز الكاربامويل فسفات (إنزيم)(1)

CPS -I

Cancer Prevention StudyI الدراسة الأولى عن الوقاية من السرطان

CPSII
carbamoyl phosphate synthetase II ستتاز الكاربامويل فسفات (2) (إنزيم)

CPS -II
Cancer Prevention Study II الدراسة الثانية عن الوقاية من السرطان

cps
cycles per second دورات كل ثانية

SPT
chest physiotherapy العلاج الطبيعي الصدري

CPU
central processing unit (in a computer) وحدة المعالجة المركزية (في الحاسوب)

CPZ
chlorpromazine كلوربرومازين

CQ
chloroquine-quinine كلوروكين ـ كينين
circadian quotient الحاصل اليوماويّ

CR
cardiorespiratory قلبي تنفسي
chest and right arm الصدر والذراع الأيمن
chloride كلوريد
closed reduction ردّ مغلق
cold recombinant مأشوب بارد (نتاج عودة الاتحاد الجيني)
colon resection استئصال القولون
complement receptor مستقبلة المتممة
complete remission هدأة تامة
complete response استجابة تامة
conditioned reflex منعكس مشروط
conditioned response استجابة مشروطة
creatinine كرياتينين
crown-rump الطول التاجي المقعدي [مقياس لطول الجنين]

CR_1
first cranial nerve العصب القحفي الأول

Cr
creatinine كرياتينين
chromium الكروم (عنصر معدني هش ، الرقم الذري 24)

CRA
central retinal artery الشريان الشبكي المركزي

cran
cranial قحفي

Crast.
L. crastinus (for tomorrow) للغد (باللاتينية)

CRBBB
complete right bundle branch block إحصار فرع الحزيمة الأيمن التام (في القلب)

CRC
colorectal cancer سرطان قولوني مستقيمي

CRCS
Canadian Red Cross Society جمعية الصليب الأحمر الكندية

CRD
chronic renal disease مرض كلوي مزمن
chronic respiratory disease مرض تنفسي مزمن
complete reaction of degeneration التفاعل التام للتنكس

CREAT
creatinine كرياتينين

CREG
cross-reactive group (of HLA antigens) المجموعة المتبادلة التفاعل (لمستضدات الـ « هلا »)

C region
constant region المنطقة الثابتة

CREST
calcinosis, Raynaud's phenomenon, esophageal motility disorders, sclerodactyly, and telangiectasia الكُلاس ، وظاهرة «رينو» ، والاضطرابات الحركية المريئية ، وتصلب الأصابع ، وتوسع الأوعية الشعرية

CRF
chronic renal failure فشل كلوي مزمن
corticotropin releasing factor العامل المطلق للموجهة القشرية

CRH
corticotropin-releasing hormone الهرمون المطلق للموجهة القشرية

CRIE

crossed imunoelectrophoresis — رحلان مناعي تبادلي

crit

hematocrit — 1ـ مكداس الدم (جهاز) 2ـ النسبة المئوية الحجمية للكريات الحمر

CRITOE

capitellum, radial head, internal condyle, trochlea, olecranon, external condyle (ossification sequence in elbow) — رؤيس العَضُد ، الرأس الكعبري ، اللقمة الداخلية ، البكرة ، الزجّ ، اللقمة الخارجية (ترتيب التعظم في المرفق)

crit press

critical pressure — الضغط الحرج

crit temp

critical temperature — درجة الحرارة الحرجة

CRL

crown-rump length — الطول التاجي المقعدي [لقياس طول الجنين]

CRM

Certified Reference Materials — مواد مرجعية مُجازة

cross-reacting material — مادة تبادلية التفاعل

Crn

corrin — الكورين (نظام حلقي رباعي البيرول يشبه نظام البرفيرين في الهيموجلوبين)

CRNA

Certified Registered Nurse Anesthetist — ممرضة تخدير قانونية مجازة

cr ns

cranial nerves — الأعصاب القحفية

CRO

cathode ray oscilloscope — مرسمة الذبذبات للأشعة المهبطية

CROS

contralateral routing of signals — تسيير الإشارات بالجانب المقابل

CRP

C-reactive protein — البروتين المتفاعل ـC

CRS

Chinese restaurant syndrome — متلازمة المطعم الصيني

colon-rectal surgery — جراحة القولون والمستقيم

CRST

calcinosis cutis, Raynaud's phenomenon, sclerodactyly, and telangiectasia — كُلاس الجلد ، ظاهرة «رينو» ، تصلب الأصابع ، وتوسع الأوعية الشعرية

CRT

cathode ray tube — أنبوب الأشعة المهبطية

CRU

clinical research unit — وحدة الأبحاث الإكلينيكية

CRV

central retinal vein — الوريد الشبكي المركزي

Crys.

crystal — بلّورة

cryst

crystalline — بلّوري

crystallization — تبلور

CS

cesarean section — العملية القيصرية (توليد)

chondroitin sulfate — سلفات الكندرويتين

chorionic somatomammotropin — الموجهة الثديية الجسدية المشيمائية

clinical specialist — إخصائي في الطب الإكلينيكي

clinical stage — (طور) مرحلة إكلينيكية

clinical state — حالة إكلينيكية

colorimetric solution — محلول قياس الألوان

conditioned stimulus — مُحرض مشروط

coronary sinus — الجيب التاجي

corpus striatum — الجسم المخطط (في الدماغ)

corticosteroid — ستيرويد قشري ، كورتيكوستيرويد

cycloserine — سيكلوسيرين (مضاد حيوي)

C&S

conjunctiva and sclera — الملتحمة والصلبة

culture & sensitivity — (اختبار) المزرعة والحساسية

Cs

cesium — السيزيوم (عنصر معدني ، الرقم الذري 55)

c/s

cycle (s) per second — دورة (دورات) في الثانية

CSA

canavaninosuccinic acid	حمض الكاناڤانينو سكسينيك
chondroitin sulfate A	سلفات الكندرويتين ـA
colony-stimulating activity	نشاط محرض للمستعمرات
compressed spectral assay	معايرة طيفية مضغوطة
CsA	
cyclosporin A	سيكلوسبورين ـA
CSAA	
Child Study Association of America	جمعية دراسات الطفولة الأمريكية
CSC	
Fr. coup sur coup (in small doses at short intervals)	بجرعات صغيرة على فترات متقاربة (بالفرنسية)
CSE	
control standard exotoxin	ذيفان خارجي قياسي شاهد
CSF	
cerebrospinal fluid	السائل المخي النخاعي
colony-stimulating factor	عامل تحريض المستعمرات
CSF-1	
macrophage colony-stimulating factor	عامل تحريض مستعمرات الخلايا البلعمية (البلاعم)
CSGBI	
Cardiac Society of Great Britain and Ireland	الجمعية القلبية لبريطانيا العظمى وأيرلندة
CSH	
chronic subdural hematoma	ورم دموي مزمن تحت الجافية
cortical stromal hyperplasia	فرط التنسج السدوي القشري
CSL	
cardiolipin synthetic lecithin	ليسثين الكارديوليبين الصناعي
CSM	
cerebrospinal meningitis	التهاب السحايا المخية النخاعية
CSN	
carotid sinus nerve	عصب الجيب السباتي
CSOM	
chronic suppurative otitis media	التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن
C-spine	
cervical spine	العمود الفقري العنقي
CSR	
Cheyne- Stokes respiration	تنفس تشين ـ ستوكس
corrected sedimentation rate	سرعة التثفل المصححة
cortisol secretion rate	معدل إفراز الكورتيزول
CSS	
carotid sinus stimulation	تحريض الجيب السباتي
chewing, sucking, and swallowing	المضغ ، والمص ، والبلع
CST	
contraction stress test	اختبار جهد التقلص
convulsive shock therapy	المعالجة بالصدمات الاختلاجية
static compliance	مطاوعة ساكنة
cSt	
centistoke	سنتي ستوك (وحدة اللزوجة الحركية)
CSU	
catheter specimen of urine	عينة بول من القثطار
CT	
calcitonin	كالسيتونين
cardiothoracic	قلبي صدري
carotid tracing	التخطيط السباتي
carpal tunnel	النفق الرسغي
cerebral thrombosis	خثار دماغي
chemotherapy	معالجة كيميائية
chlorothiazide	كلوروثيازيد (دواء مدر للبول)
circulation time	زمن الدوران
clotting time	زمن التجلط
coagulation time	زمن التخثر
collecting tubule	النبيب الجامع
computed tomography	التصوير المقطعي المحوسب
computerized tomography	التصوير المقطعي المحوسب
connective tissue	نسيج ضام
contraction time	زمن التقلص
Coombs' test	اختبار كومبس
corneal transplant	طعم قرنوي
coronary thrombosis	خثار تاجي
corrected transposition	تغيير الوضع المصحّح
corrective therapy	المعالجة التصحيحية
counseling and testing	المشورة والاختبار
crest time	زمن الذروة
cytotechnologist	أخصائي التقانات الخلوية

CTA

Canadian Tuberculosis Association — جمعية التدرن الكندية

chromotropic acid — حمض منحاز للّون

CTAB

cetyltrimethylammonium bromide — بروميد سيتيل ثلاثي ميثيل الأمونيوم

CTAT

computerized transaxial tomography — التصوير المقطعي عبر المحوري المحوسب

CTBA

cetrimonium bromide — بروميد السترِيمونيوم

CTC

chlortetracycline — كلورتتراسيكلين (مضاد حيوي)

CTD

carpal tunnel decompression — إزالة الضغط عن النفق الرسغي

congenital thymic dysplasia — خلل التنسج التوتي الولادي

CTFA

The Cosmetic , Toiletry, and Fragrance Association — جمعية مستحضرات التجميل والزينة والعطور

CTFE

chlorotrifluoroethylene — كلوروثلاثي الفلوروإيثيلين

CTH

ceramide trihexoside — ثلاثي هكسوسيد السيراميد

CTL

cytotoxic T lymphocytes — اللمفاويات التائية السامة للخلايا

CTLp

cytotoxic T lymphocyte precursor — طليعة اللمفاويات التائية السامة للخلايا

CTM

calibration and test material — مادة الاختبار والتعيير

CTN

Certified Transcultural Nurse — ممرضة مجازة للثقافات المتعددة

CTP

cytidine triphosphate — سيتيدين ثلاثي الفسفات

CTR

cardiothoracic ratio — النسبة القلبية الصدرية

carpal tunnel release — تحرير النفق الرسغي

CTS

carpal tunnel syndrome — متلازمة النفق الرسغي

CTX

cyclophosphamide (Cytoxan) — سيكلوفوساميد (سيتوكسان)

CTZ

chemoreceptor trigger zone — منطقة حث المستقبلة الكيميائية

chlorothiazide — كلوروثيازيد

Cu

copper (L. cuprum) — النحاس (عنصر معدني ، الرقم الذري 29)

cu

cubic — مكعب

curved — منحن

CUC

chronic ulcerative colitis — التهاب القولون التقرحي المزمن

cu cm

cubic centimeter — سنتي متر مكعب

CUG

cystourethrogram — صورة المثانة والإحليل

Cuj.

L. cujus (of which) — من الذي (باللاتينية)

Cuj. Lib.

L. cujus libet (of any you desire) — مما تشاء (باللاتينية)

cu mm

cubic millimeter — ملي متر مكعب

CuO

cupric oxide — أكسيد النحاسيك

CUSA

Cavitron ultrasonic aspirator — رشّافة (شفاطة) الكافيترون فوق الصوتية

CV

cardiovascular — قلبي وعائي

cell volume — حجم الخلية

central venous — وريدي مركزي

cerebrovascular — مخي وعائي

coefficient of variation — معامل التباين

color vision — رؤية ملونة ، رؤية الألوان

corpuscular volume — الحجم الجسيمي (الكريوي)
cresyl violet — بنفسجية الكريزيل

C.V.

conjugate vera (true conjugate diameter of the pelvic inlet) — القطر المتقارن الحقيقي لمدخل الحوض (باللاتينية) [توليد]
L. cras vespere (tomorrow evening) — مساء الغد (باللاتينية)

CVA

cardiovascular accident — حادثة قلبية وعائية
cerebrovascular accident — حادثة مخية وعائية
costovertebral angle — الزاوية الضلعية الفقرية

CVC

central venous catheter — قثطار وريدي مركزي

CVD

cardiovascular disease — مرض قلبي وعائي
color vision deviant — منحرف الرؤية الملونة

CVF

cyclophosphamide, vincristine, and 5-fluorouracil — سيكلوفوسفاميد ، ڤينكرستين ، و5 ـ فلوروويوراسيل (مركب دوائي)

CVH

combined ventricular hypertrophy — التضخم البطيني المزدوج
common variable hypogammaglobulinemia — نقص الجلوبولين جاما بالدم المتباين الشائع

C.V.O.

L . conjugate vera obstetrica (obstetric conjugate diameter of pelvic inlet) — القطر المتقارن التوليدي لمدخل الحوض (باللاتينية) [توليد]

CVOD

cerebrovascular obstructive disease — مرض مخي وعائي سادّ

CVP

cell volume profile — شاكلة (بروفيل) حجم الخلية
central venous pressure — الضغط الوريدي المركزي
cyclophosphamide, vincristine, and prednisone — سيكلوفوسفاميد ، ڤينكرستين ، وبريدنيزون (مركب دوائي)

CVPP

cyclophosphamide, vinblastine, procarbazine and prednisone — سيكلوفوسفاميد ، ڤينبلاستين ، بروكاربازين و بريدنيزون (مركب دوائي)

CVR

cardiovascular-renal — قلبي وعائي ـ كلوي
cerebrovascular resistance — المقاومة المخية الوعائية

CVRD

cardiovascular renal disease — المرض الكلوي القلبي الوعائي

CVS

cardiovascular surgery — الجراحة القلبية الوعائية
cardiovascular system — الجهاز القلبي الوعائي
chorionic villus sampling — أخذ عينة من الزغابة المشيمائية
clean voided specimen — عينة (بول) مفرزة نظيفة

CVT

costovertebral (angle) tenderness — إيلام (الزاوية) الضلعية الفقرية

CW

chest wall — جدار الصدر
clockwise — باتجاه حركة عقارب الساعة
continuous wave — موجة مستمرة

CWDF

cell wall-deficient bacterial forms — أشكال جرثومية معوزة جدار الخلية

CWI

cardiac work index — منسب العمل القلبي

CWP

childbirth without pain — الولادة بدون ألم
coal workers' pneumoconiosis — تغبر رئة (سُحار) عمال الفحم

cwt

hundredweight — هندردويت [وحدة وزن تساوي 100 باوند (الولايات المتحدة) أو 112 باونداً (انجلترا)]

cx

cervix — عنق
complaints — شكاوى
convex — محدَّب

CXR

chest x-ray — أشعة سينية على الصدر

CxR

chest x-ray — أشعة سينية على الصدر

Cy

symbol for cyanogen رمز السيانوجين
[غاز سام عديم اللون]

Cyath.

L. cyathus (a glassful) ملء كوب (باللاتينية)

CYC

cyclophosphamide سيكلوفسفاميد (دواء)

Cyc

cyclophosphamide سيكلوفسفاميد (دواء)

cyclic AMP

cyclic adenosine monophosphate الأدينوزين الحلقي أحادي الفسفات

cyclic GMP

cyclic guanosine monophosphate الجوانوزين الحلقي أحادي الفسفات

Cyclo

cyclophosphamide سيكلوفسفاميد (دواء)

cyclopropane سيكلوبروبان

Cyd

cytidine سيتيدين

cyl

cylinder اسطوانة

cylindrical lens عدسة اسطوانية

Cys

cysteine سيستئين (حمض أميني)

Cys-Cys

cystine سيستين (حمض أميني)

cysto

cystoscopic examination الفحص بتنظير المثانة

Cyt

cytosine سيتوزين (حمض أميني)

Cy/TBI

cyclophosphamide and total body irradiation السيكلوفسفاميد وتشعيع كامل الجسم (لعلاج السرطان)

CyVADIC

cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, and dacarbazine سيكلوفسفاميد ، ڤينكرستين ، دوكسوروبيسين ، وداكاربازين (مركب دوائي)

CZI

crystalline zinc insulin إنسولين الزنك البلوري

References ـ المـــراجـــع

* أولاً: المراجع الأجنبية

1- Collins York Concise Dictionary & Thesaurus Librairie du Liban (2000).

2- Dorland's Illustrated Medical 30th Dictionary - (2000).

3- Dorland's Medical Abbreviations - W. B. Saunders Company - (1992).

4- Mosby's Medical, Nursing, & Allied Health Dictionary-(1998).

5- Medical and Scientific Abbreviations J. B. Lippincott Company - (1987).

6- Melloni's Illustrated Medical Dictionary - Williams & Wilkins - (1985).

7- Stedman's Medical Dictionary - Lippincott Williams & Wilkins (V.5.0) - (2000).

8- Taber's Cyclopedic Medical Dictionary - F.A. DAVIS- (1985).

9- The York Concise Dictionary - Librairie du Liban - (1997).

*ثانياً: المراجع العربيـة

1 ـ الرافد ـ نديم آل ناصر الدين ـ مكتبة لبنان ـ (الطبعة الثانية 1981).

2 ـ مختار الصحاح ـ الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ـ مكتبة لبنان ـ (1995).

3 ـ كنز اللغة العربية ـ د. حنا غالب ـ مكتبة لبنان ـ (2003).

4 ـ محيط المحيط ـ بطرس البستاني ـ مكتبة لبنان ـ (1998).

5 ـ معجم مصطلحات طب الأسنان ـ مكتبة لبنان ـ (2005).

6 ـ معجم مصطلحات تشخيص الأمراض ـ د. إيلي سليم شلهوب ـ مكتبة لبنان (2004).

7 ـ المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية ـ د. فريد النجار ـ مكتبة لبنان ـ (2003).

8 ـ معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديد ـ أحمد شفيق الخطيب ـ مكتبة لبنان ـ (2005).

9 ـ قاموس حتّي الطبي الجديد ـ د. يوسف حتّي ـ أحمد شفيق الخطيب ـ مكتبة لبنان ـ (2008).

10 ـ قاموس أطلس الطبي الشارح ـ رمضان بخيت ـ دار أطلس جروب للنشر ـ (2007).

11 ـ قاموس الطب البيطري ـ د. آدم محمد إبراهيم ـ مكتبة لبنان ـ 2006

12 ـ معجم تكنولوجيا الوسائل السمعية والبصرية ـ د. محمود إسماعيل صيني ـ عمر الصديق عبد الله ـ مكتبة لبنان ـ (1987).

13 ـ قاموس الجيولوجية المصور ـ أحمد شفيق الخطيب ـ مكتبة لبنان ـ (1995).

14 ـ قاموس الفيزياء المصور ـ أحمد شفيق الخطيب ـ مكتبة لبنان ـ (1992).

15 ـ ورتبات قاموس ـ جون ورتبات وهارفي بورتر ـ مكتبة لبنان ـ (2002).

16 ـ معجم النباتات الطبية ـ د. يوسف أبو نجم ـ مكتبة لبنان ـ (1999).

17 ـ معجم مرعشي الطبي الوسيط ـ د. محمد أسامة مرعشي ـ مكتبة لبنان ـ (2003).

18 ـ قاموس العلوم المصور بالتعريفات والتطبيقات ـ أحمد شفيق الخطيب ـ مكتبة لبنان ـ (2001).

19 ـ معجم طب الأسنان الموحد ـ (WHO) ـ مكتبة لبنان ـ (2004).
20 ـ معجم الصيدلة الموحد ـ (WHO) ـ مكتبة لبنان – (2004).
21 ـ معجم التشريح الموحد ـ (WHO) ـ مكتبة لبنان – (2005).
22 ـ المعجم الطبي الموحد ـ الطبعة الرابعة ـ منظمة الصحة العالمية ـ مكتبة لبنان (2006).
23 ـ التسمية التشريحية ـ د. حافظ والي ـ المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية ـ (1995).
24 ـ معجم الاختصارات الطبية ـ د. محمد حجازي وآخرون ـ المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية ـ (1999).
25 ـ معجم مصطلحات الطب النفسي ـ د. لطفي الشربيني ود. عادل صادق ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2002).
26 ـ معجم مصطلحات الأشعة والأورام ـ د. ضياء الدين الجماس وآخرون ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2003).
27 ـ معجم مصطلحات أمراض النساء والتوليد ـ د. أحمد شيخ السروجية وآخرون ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2003).
28 ـ معجم مصطلحات الباثولوجيا والمختبرات ـ د. سيد الحديدي وآخرون ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2004).
29 ـ معجم مصطلحات أمراض الفم والأسنان ـ د. فتحي وفا وآخرون ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2008).
30 ـ معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل ـ د. عبدالرزاق السباعي وآخرون ـ مركز تعريب العلوم الصحية ـ (2008).
31 ـ المعجم الموحد لمصطلحات الكيمياء ـ مكتب تنسيق التعريب ـ (1992).
32 ـ المعجم الموحد لمصطلحات علم الصحة وجسم الإنسان ـ مكتب تنسيق التعريب ـ (1992).
33 ـ المعجم الموحد لمصطلحات علم الأحياء ـ مكتب تنسيق التعريب ـ (1993).
34 ـ المعجم الموحد لمصطلحات تقانات الأغذية ـ مكتب تنسيق التعريب ـ (2004).

Introduction
By
Abdul Rahman A. AL-Awadi, MD
Secretary General of Arabization Center for Medical Science

We are honoured by the God who preserves the Arabic language by preservation of the Holy Koran, when Almighty God said: ***(Verily We, it is We who have sent down the Dhikr, and surely, We guard it)*** - [Al-Hagger﴿9﴾]. This language also included the meanings of words and Hadith and Shari'a. However, we are still neglecting our language and adhere to fight, and resort to the education of our children in foreign language education institutions, and sometimes we talk with our children in our homes in another language or language hybrid of Arab and foreign countries.

It is surprising to find some limited capacity and potential in their interest and knowledge of various studies, including medical sciences and health, many of the countries of the world put laws to deal with the language and not replace other languages in messaging, education, translation, copyright and other, on the basis of national pride in their own languages, and on the basis that the language related to national identity and existence and thinking. But we are witnessing in the Arab world, the present situation reflects problems of forcing our children in educational institutions, especially the various faculties of medicine, to learn in foreign languages.

Having a glance on this reality in teaching and studying in non-mother tongue languages make you feel the risks that the students face, especially a sense of alienation and normalization of ideas and culture with the nature of foreign language, and by providing cultural, intellectual and psychological effects which can not be avoided by the students at school or university . At the same time, we are fully aware that educational theories, psychological and social studies stress the risk of non-Arabic education, especially in the early stages of education.

UNESCO also discovered the problems of education in non-mother tongue languages, issuing a statement reaffirming the

importance of using the national language in education to the maximum possible extent. Where are we from these international recommendations and the results of research studies in the areas of education, language, thought and knowledge, especially as the world is an era of competing languages, cultures and role negatives and positives, seeking to preserve the United languages through the issuance of legislation binding uses of national languages in education and messaging, culture and others.

The reality of language is not very pleased as long as our children learn a foreign language, and offer incentives and jobs in the precedence set to open both graduated from foreign universities have preference over other Arab university graduates. It is therefore not surprising that our children learn in foreign language in more than 90% of medical schools that teach in non-Arabic language. Also the university faculties such as science administration etc. teach in non-mother tongue language.

Foreign language education in Arab medical colleges has innumerable disadvantages, most notably to graduate from the Arabic Faculty of Medicine, does not have basic skills in Arabic language or foreign language, specially considering the teacher teaches sometimes bilingual and a hybrid. Often heard about lectures have been taught in the lecture halls of Arab prestigious universities in a hybrid language with mixed local vernacular terms and foreign terms in an astonishing way.

Opponents of the Arabization of Health Sciences, with regret, focusing on the fight against Arabization of medical terminology as foreign terminology can not be translated, or the creation of modern Arab medical terminology as what was played by scientists Arabs and Muslims in the Arab civilization. They do not have an argument against Arabization, only invoked the terminology of foreign institutions that deal with thousands of keywords. But they deliberately ignored out of the Arab-term problem that stems from our negligence of terminology, and it has nothing to do with the rich Arabic language and terminology to absorb all of the explanations and principles.

This is evidenced by the Arab doctors who put, since the sixties, a glossary of medical uniform, evolved over time to a folder containing thousands of standardized medical terminology from all

disciplines and in Arabic. Indeed, that is common under medical dictionary and glossary is still a reliable source in Arabization Center for Medical Sciences in Kuwait (ACMLS) and the use of all its terms, the Center has developed its explanations in Arabic from the letter (A), which is in our hands now and in the first edition. Having the letter (A) of Illustrated Dictionary for Medical and Health Sciences is a pioneering step on the path of continuing work in the completion of the rest of the letters, and pending the completion of the entire dictionary before we complete a major medical explanations for more than 15000 medical term printed and electronically stored.

There is no doubt that the medical terms are part of the language, even though they constitute a particular language, and they may differ in forms and patterns of variations and complexities of the general acceptance of the unification of all terms. This phenomenon has many reasons including bias of jurisdiction, different cultural, social, philosophical and logical backgrounds and others, but the linguistic dimension of the term is the most influential factor, and therefore, the term rely on it more than on other dimensions. This dimension of language helped to overcome the many obstacles faced by the Center, in their ongoing quest for the completion of the draft of Illustrated Dictionary for Medical and Health Science which is a medical encyclopaedia and reference includes explanations of medical terminology and supported forms, photos and aids necessary to understand and follow-up.

We hope that this work will stimulate further steps of the work and achievements that develop and maintain the Arabic language, and make it more solid and robust competitor in the competition with other languages, especially the widening impact of intellectual, linguistic and cultural world. The importance of language stems from the fact that the entity extended culture and civilization, always need care and feeding and contributions depends not only on individuals but also governments, institutions and relevant bodies over the Arab nation. Work with dictionaries needed to organize and coordinate and support the human and material so that it is not the current fragmentation of a large number of those who have worked in the development of terminology in various fields of knowledge, but in terms often duplicates, and some are scientifically accepted because they are not based on the methodology and the principles of

unification of terminology, or on the Scientific basis of which should underlie.

We hope at the Arabization center of the of Medical Sciences that the interpreter Dictionary of Medicine and Health Sciences (letter A) a specific and beneficial to every medical student, physician, researcher, writer, translator and publisher and anyone interested in medical science and health. Many of distinguishing Arab doctors have contributed with their observations on the terminology standard. They develop explanations based on multiple sources. The adjustments have been made in many explanations, it was not an easy work, the pathway was not paved, and the center provided all the necessary tools required to complete the work as required. Moreover, the cooperation of doctors and acceptance of work and enthusiasm of its important factors that helped to bring action plan and Crafts Center in the completion of (A) of the medical dictionary.

There is no doubt that any scientific work is not without obstacles, but the experience of working in the Center and for many years in the field of translation and copyright and building specialized dictionaries, and the cooperation of doctors with the center, and its relation with research institutions, language and translation in the Arab world, all of which helped to overcome these obstacles. This dictionary which contains more than 15000 term is commendable, it must pursue medical development, and keep up with changes and follow-up to find everything in every period of time.

In conclusion I would like to thank all of the doctors who have worked years to develop explanations of medical terminology, using different sources and consultations as well as bodies and institutions interested in Arabization, culture and science, specially Kuwait Foundation for the Advancement of Science, which provided half the cost of the project to support all the interest in developing and enriching the cultural life, and enhance the status of the Arabic language in Arab countries. Appreciation and praise for the Kuwait Foundation for the Advancement of Science, also thanks go to all the staff for their continuing status in the completion of the letter (A) of the Illustrated Dictionary of Medicine and Health Science, God bless them all.

Contents

Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS)

KFAS in brief

Established : 1976 Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS), a Private organization oriented towards public service, was established according to an Amiri Decree issued on Thel Hijja, 1396 A.H., 12th December, 1976. KFAS is managed by a “Board of Directors” chaired by His Highness The AMIR of Kuwait. The Board comprises six members nominated by “Kuwait Shareholding Companies” for a period of three years. The general aims of KFAS are to support efforts for modernization and scientific development within the State of Kuwait.

AIMS

1. Sponsoring Basic and Applied Research through grants awarded in the fields of Natural Science, Engineering, Health, Food, Sociology, Economics and others.
2. Awarding grants to support and encourage research related to investment projects development works, and experiments related to Kuwait's economy.
3. Awarding grants, prizes and recognition to enhance the intellectual development in Kuwait and other Arab countries.
4. Training Kuwaiti nationals by granting scholarships and fellowships for academic /training purposes and holding symposiums and scientific conferences.
5. Encouraging, supporting and developing research projects and scientific programs jointly executed by Kuwaiti scientific establishments on one hand, and Arab and International scientific establishments on the other.

ARABIZATION CENTER FOR MEDICAL SCIENCE (ACMLS)

The Arabization Center for Medical Science (ACMLS) is an Arab regional organization established in 1980 and derived from the Higher Council of Arab Ministers of Public Health, the Arab League and its permanent headquarters is in Kuwait.

ACMLS has the following objectives:

- Provision of scientific & practical methods for teaching the medical sciences in the Arab World.
- Exchange of knowledge, sciences, information and researches between Arab and other cultures in all medical health fields.
- Promotion & encouragement of authorship and translation in Arabic language in the fields of health sciences.
- The issuing of periodicals, medical literature and the main tools for building the Arabic medical information infrastructure.
- Surveying, collecting, organizing of Arabic medical literature to build a current bibliographic data base.
- Translation of medical researches into Arabic Language.
- Placement of Arabic medical curricula to serve medical and science Institutions and Colleges.

ACMLS consists of a board of trustees supervising ACMLS' general secretariate and its four main departments. ACMLS is concerned with preparing integrated plans for Arab authorship & translation in medical fields, such as directories, encyclopeadias, dictionaries, essential surveys, aimed at building the Arab medical information infrastructure.

ACMLS is responsible for disseminating the main information services for the Arab medical literature.

ISBN: 978-99966-11-01-8

ARABIZATION CENTER FOR MEDICAL SCIENCE
(ACMLS - KUWAIT)

Editing

Dr. Iman H. Sayed   Dr. Heba H. Ibrahim

Designing

Amal M. Agha

P.O. Box 5225, Safat 13053, Kuwait

Tel. : + (965) 25338610/25338611
Fax. : + (965) 25338618/25338619

E-Mail: acmls@acmls.org
http:// www.acmls.org

Printed and Bound in the State of Kuwait.

Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences
(KFAS)

Arabization Center for Medical Science
(ACMLS)

Illustrated Dictionary for Medical & Health Science

English - Arabic

Yaqoub A. Al-Sharrah, PhD

Supervision

Abdul Rahman A. Al-Awadi, MD


First Edition
2010

Illustrated Dictionary
for Medical and Health Science

المعجــم المفســر
للطــب والعلــوم الصحيــة

Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS)

Arabization Center for Medical Science (ACMLS)



Illustrated Dictionary for Medical & Health Science

(Letter C)

English - Arabic





Yaqoub A. Al-Sharrah, PhD

Supervision

Abdul Rahman A. Al-Awadi, MD

First Edition

Kuwait - 2010